





DE FEBRIBVS
OPVS SANE
AVREVM.
NON MAGIS VTILE,
QVAM REI MEDICAE
PROFITENTIBVS
NECESSARIVM:

In quo trium sectarum Clarissimi Medici
habentur, qui de hac re egerunt;

*Nempè Graci, Arabes, atque Latini, quorum nomina
versa pagina indicabit.*

Cum indice, tum capitum, tum rerum accomodatissimo;

CVM PRIVILEGIIS.

*Bibliotheca NAZ.
ROMA
P. TORIO EMANUEL*
*Bibliotheca NAZ.
ROMA
P. TORIO EMANUEL*
Domus
S. Pantaleonis
BB Scholarem
Præm

VENETIIS,
Apud Gratosum Perchacinum, expensis
Gasparis Bindoni.

M. D. LXXVI.

Ex Sarcod: Fran: de Lu...

14-1-F-17

2

OPVS SANI

AVK EVM

NON MAGIS VITAE

QVAM MORI

PROFICIT

MAGIS

In doctrina et in conversatione

liberatus est a peccatis

et a peccatis liberatus est a peccatis

et a peccatis liberatus est a peccatis

et a peccatis liberatus est a peccatis

CAM PRÆFECTIS



VENETIS

Apud Gualterum Rostmannum, excudit

Calpurnius Blandini

M. D. LXXVI

SEIL EN CHAVIS

A V C T O R V M.



G R A E C I.

Hippocrates,
Galenus,
Paulus Aegineta,
Alexander Tralianus,
Actius,
Oribasius,
Nonius Medicus,

Haly abatis,
Actuarius,

L A T I N I.

A R A B E S.

Auicenna,
Rasis,
Abimeron Auenzoar,
Auerrois,
Isaac,
Serapion,

Cornelius Celsus,
Q. Serenus,
Plinius Secundus,
Gariopontus,
Costantinus Aphricanus,
Bernardinus Gordonius,
Petrus de Abano,
Arnaldus de Villanova,
Philonius,
Nicolaus Nicolus.

CLARISSIMIS
ATQVE
PRAESTANTISSIMIS
MEDICIS VENETIS

Gaspar Bindonus.



NULLA est egritudo, quæ nostra magis affligat corpora, quàm febris, ac præterea quæ Medicorum animos maiori sollicitudine exerceat, & quæ præ manibus eorum frequentius habeatur: quod cum viderim; Medicorum tum Græca volumina, tum Arabica, tum Latina vetustiora, illustriora quæ, quæ de febribus agant in vnum imprimenda curavi. In hoc præfecto compertis, Clarissimi Doctores Medici, quidquid de Febribus scriptum est ab antiquioribus, & artis medicæ peritis viris Græcis; quidquid à celeberrima Arabum familia; & quæcunque ad præcis Latinis tradita sunt ad febres attinentia, intelligetis: nam ij quid sit nominis febris, quid rei, in his declarant libris: quæ causæ, quæ notæ, quæ curationes expositæ sunt, ac tandem si quid inter se conueniant, dissentiant quæ, ab ipsis patefit. Hanc igitur, quæ de febribus tractat, materiam, quemadmodum peroptatumam esse sentio; sic vestris Excellentijs dono do libentissimè: & si quid excudendum post hac mihi delatum fuerit, quod commodum fore esse videar; hilari animo, libenter quàm dicabo.

INDEX CAPITVM,

QVAE IN HOC OPERE

CONTINENTVR.

A **N**HELYVS confectio-
nis cura. ex Amic. 80
Animi defectio ex Alex. 49. ex
copia humorum animi defe-
ctio Alex. 49. ex vtero A-
lex. 49. ex imbecillitate
stomacbi ex Alex. 49. ex piuita, ex frigidi-
tate, vel caliditate, vel ignea inflammatione
ex Alex. 40. ex felleione abscellus ex Alex.
50. ex gaudio, vel dolore ex Alex. 50. ex vi-
rium imbecillitate ex Alex. 50.

Aluus in febribus adftricta. 44

B
De Bilis vomitu ex Pan. Egin. 43

C
Capitis dolor in feb. ex Nonpa. 14. ex Pan. 42.
ex Amic. 79. ex Gariop. 196. 197.

Cardiac a pulso ex Gariop. 191. cura ibidem.

Causi differentie, causi, signa, & curatio ex Hip-
poc. 43. signa & cura ex Alex. 47. cause si-
gna, & cura ex Amic. 82. signa, & cura ex
Hesl. 103. cura ex Amer. 114. causi signa, &
cura ex Hsa. 124. cognitio, & cura ex Gario.
190. signa, & cura ex Confl. 202. cura ex
Confl. 205. causa signa, & cura ex Gnd 209
causi, signa, & cura ex Arnal. 244. 245.
quid sit, causa iudicia, an cura ex Arnal.
267. causa, & signa, cura ex Nico. 303

Cibi subsidium in febribus 43. cibi febricitantium

in generali. ex Avic. 76. cura ex Gariop. 198.

Coniugatio in febribus ex Grib. pag. 12

Cupressa ad febrem parat ex Nicol. 285

D
Deglutienti d. fiscalat in feb. ex Amic. 80

Diurium febrium curatio ex Act. 50. motha et
curatio ex Alex. 45. ex obstruione ex A-
lex. 46. quomodo diuria ab hostia discerni-
quas ex Ale. 50. diuria febri ex Act. 47.
ex infirmitate Act. 78. diuria ex Act. 78. ex
cruditate obori ex Act. 58. logo Ephemera.

Difformia curatio. 33

Diurna febri medela ex Haly. 165. ex eibis, &
potibus ibidem ex labore, & ira, ex tristitia,
ex vigilijs, ex apostomae curat. ex Haly.
165. 166.

E
Ephemera species ex Amic. 69. ex angustia falli-

signis, & cura 69. ex cogitatione, & ex ira
69. ex vigilijs ex Amic. 70. ex somno & quia

se signa, & cura ex Amic. 70. ex gaudio, ex
timore, ex Amic. 70. ex labore signa, & cu-
ra ex Amic. 70. ex euacuatio ne causi, & cura
ex Amic. 70. ex dolore signa, & cura ex A-
mic. 70. ex syncope signa, & cura ex Amic. 70.
ex fame, & siti, & ex opilatione ex Amic. 70
71. ex namfeatijs satietate causa, & cura ex
Amic. 71. ex apo lemata, siccitate, calore ex
Amic. 72. ex soliditate, & condensatio ne
tis signa, & cura ex Amic. 72. ex vino cura
ex Amic. 73. ex sole cura ex Amic. 73. causa,
signa & curatio ex Hsa. 99. 100. quid sit,
& causa, & signa ex Amic. 105. 106. signa
ex Amer. 108. cura ex Amer. 110. in specia-
litate cura cum fluxu ventris ex Amer. 110.
confl. & signa ex Hsa. 118. cura ex Hsa. 122.
propter aeris frigidi tatem cura ex Hsa. 121.
propter balneum cura, propter ieiunium, pro-
pter laborem, propter bubones, & vigilijs,
ira & angustiam curatio ex Hsa. 122. 123.
causa signa ex Hsa. 123. propter calorem solis
cura ex Hsa. 124. causa frigidi. cura ex Hsa. 124.
propter balnea ex Hsa. 124. propter cibos, &
potus calidos 123. propter labores, ieiunium,
bubones in regione, & vigilijs, iram, angustiam,
tristitiam curatio ex Hsa. 125. 126. causa
ex Ser. 123. propter foetorem calorem, frigorem, bal-
neum, cibum calidum, ex labore corpo, ex ira
& cogitatione, vigilijs, dolore in ignium cura-
tione ex Hsa. 127. 128. causa, signa, & cura
ex Confl. 202. causa signa, & cura ex Gor.
207. 208. causa signa, & cura ex Arnal. 242.
243. causa signa, cura ex Phil. 255. cura eph-
mera in specialitate ex Phil. 255. species ex rei
Hicra, somno, & ex eorum curatio ex Phil.
256. propter d. spissitudinem corporis in feb. la-
bor, causa, & curatio ex Phil. 256. 257.
causa signa & cura ex Nic. 206. ab ira & so-
le, opilatione pororum, a balneo, a vigilijs,
a somno, a quiete, nimio motu, calore solis, fame
siti, cibis calidis signa, & cura ex Nico. 286
287.

Ephemera d. dolore, catarrho, inflammatione, opi-
latione, materia in stomacho contenta, a phlo-
gixu ventris, sudore, coitu, & mod. sine solu-
tione signa, & cura ex Nicol. 288. 289.

Epistola signa, & causa ex Gal. 14. cura ex Ac-
tio. 68. ex Amic. 84. ex Hsa. 128. & 149. &
150.

Erysipelacea inflammatio 47. signa ex Alex. 47.
erysipelas effusus diffusus ex Act. 57.

Extrematum frigus ex Auic.	80
Fames iagens ex Orib. pag. 12. ex Paul. 43. ex Auic.	80
Febris quid nominis ex Hip.	pag. 1
Febris quid sit ex Alex. 45. ex Auic. 67. ex Isa. 171. ex Aëtia. 176. ex Gariopon. 187. quid sit ex Gordo. 207. ex Petro de Abb. 227. 218. ex Arnal. de vil. no. 240. ex Phil. 234. ex Nicol.	285
Febrim differentia ex Hip.	pag. 1
Febrim differentia ex Nono 13. ex Gal. pag. 7. differentia, & indicationes ex Gal. pa. 20. & differentia ex Nicol.	286
Febrim natura ex Gariop.	186
Febris quibus de causis fiat ex Hip. p. 1. ex Gal. pag. 8. quibus de causis ex Isaac. 117. causa quot fiat ex Nicol.	285
Febris quacommodum interdum repetant per circutionem, interdum continue sunt ex Gal. p. 19	
Febrim accessiones quam ob causam desinat ad integritatem ex Gal.	39
Febrim species ex Gariop.	188
Febrim diuersitas ex Gariop.	185
Febris quam corporis partem primum corripit ex Hip.	pag. 1
Febrilis calor quomodo consideratur.	285
Febris quomodo fiat ex Hip.	pag. 1
Febrim implexus ex Gal.	14
Febris que in calidis, & sicci temperatioris sunt ex Act.	84
Febrim signa, prognostica, & indicantia, quada in genere ex Hip.	2
Febrim signa que ab urina sumuntur ex Orib.	3
Febrim significationes ex Aue. Isaac. 117. signa generalia ex Nicol.	286
Febris ardentis differentia, causa, signa, & curatio ex Hip. pag. 5. ardentium augmentio & curatio ex Pau. Aegin. 40. cura ex Act.	61
Febris cholericæ causæ, signa & cura ex Nico.	302
Febris cholericæ ex Auic. 80. causæ, & signa ex Auer.	109
Febris continens, & continens species, causæ, signa, & curatio ex Non. p. 13. signa ex Act. 79. diata, ex Act. 80. signa ex Auic. 74. continua febris putridæ causa.	243
Febris ex cruditate ex Alex.	45. 46
Febris apostematum ex Auic. 96. signis, & eorum iudicijs ex Auic. 96. cura ibidem. signa, & cura ex Raf.	204
Febris a bile, & signa, & curatio ex Hip. pag. 4. accenditur ex iung. patref. 4. Gal.	16
Febris ex obstructione pag. 8. ex Gal. 20. species, & curatio 20. curatio ex Gal.	21
Febris ex cutis densitate ex Act.	58
Febris ex insp. inflammatione ex Act.	58

Febris ex fame ex Act.	38
Febris ex grauedine, & destillatione ex Act. 98	
Febris ex frigore ex Act.	58
Febrim omnium in pene curatio ex Hip. p. 3	
Febris diuturna, siue longa ex Hip.	pag. 6
Febris ex cholera vitellina.	
Febris hiberna ex Hip.	pag. 6
Febris ephemera causa, signa & curatio ex Non. pag. 13. causa, signa ex Gal. 7. ex bubone d. Gal. pag. 9. signa pag. 9. & 10. quomodo inter se distrepent ex Gal. 12. vitellus ratio ex Gal. 20. ex cruditate, & ventriculi dolemis curatio ex Gal. 21. accessio transit in putrida & bestia ex Gal. 22. quando fiant diuturniores, & effectus harum multiplex, atque differentia, curatio ex Gal. 34. causa, & signa ex Auic. 68. permutatio, & signa permutatiois ex Auic. 69. curatio.	ibi.
febrim hora ex Auic. 67. horarum universalium cognitio ex Auic.	68
febris erratica causa & cura ex Arnal.	252
febris erronea ex Hip.	pag. 6
febrim compositarum dispositio ex Auic. 96. causa ex Raf. 103. signa, & cura ex Raf. 105. compositio ex Auer. 109. causa, & signa ex Isa. 120. de compositione feb. ex Isa. 122. medela ex Haly. 172. composita febris ex Gor. 214. species, causa, signa, iudicia, & cura ex Phil. 278. 279.	
febrim intermittentium tres differentie ex Gal. p. 13. signa ex Gal. 35. dispositio ex Isa. 128.	
febris inflans cura ex Isa.	125
febris periodica ex Gariop.	175
febris lipiria ex Hip. pag. 6. ex Auic. 85. ex Isa. 128. 150. ex Ser. 163. ex Haly. 132. ex Arnal.	283
febris lenis ex Hip. pag. cura ex Corn.	182
febris melancholicæ causa signa ex Nico.	310
febris nocturna ex Hip.	pag. 6
febris nocturna, et diurna signa ex Auic. 85. regimen ex Auic.	87
febris nona, septimana & c. ex Hip. pag. 6. causa, & cura ex Auic. 90. medela ex Haly. 173. causa, signa, & cura ex Nicol.	313
febris pestilens ex Hip. pag. 6. causa, signa, & curatio ex Non. 14. causa ex Gal. pag. 8. causa signa ex Auic. 93. curatio ex Auic. 93. signa, & curatio ex Raf. 104. causa ex Isa. 142. cura ex Corn. 181. causa, & signa, & cura ex Gor. 215. causa, signa, & cura ex Arnal. 252. 253	
febris phlegmaticæ causa, signa period. ex Auic. 84. signa phleg. in separab. ex Auic. 84. cura phleg. period. ex Auic. 86. cura continua ex Auic. 87. causa & signa ex Auer. 109. cura ex Auer. 114. causa, signa, & cura ex Serap. 160. medela ex Haly. 171. causa, signa, & cura ex Gordo. 213. species, causa, signa, & cura ex Arnal. d. 248. nota causa, signa, &	cura

INDEX

- cura, ex Arual. 349. ex phleg. acetoso. 349.
ex phleg. vitreo 349. causa, signa ex Nic. 306
febris putrida signa ex Ori. p. ex Gal. p. 8. signa
ex Gal. p. 10. differentia ex humorum putredine
ex Gal. 13. differentia ex Gal. 28. causa ex A-
lex. 46. signa ex Alex. 47. causa signa.
febrim putridarum curatio ex Ori. pag. 9. quando
et quomodo mittenda est sanguis ex Gal. 30
febris putrida 35. putridarum febrim agnitio ex
Paul. Aegi. 38. curatio 38. causa ex 60. diata
ex Ale. 60. causa ex Aus. 73. signa ex An. 74
curatio ex Auic. 75. causa, et signa ex Auer. 1
08. cura in generali ex Auer. 112. causa ex
Isa. 118. signa ex Auer. 119. cura ex Isa. 126.
causa ex Isa. 144. cura ex Haly. 166. curatio
ex Nic. 205. et signa ex Nic. 291. 292. etc.
febris semiteriana ex Hip. p. 106. signa, et cura-
tio ex Nonio p. 14. confirmatio ex Gal. 15. dif-
ferentia ex Gal. 15. quid sit ex Gal. 16. semiteri-
ana quomodo fiat ex Paul. Aegi. 40. curatio
ex Cornel. 181.
febris syncopalis humerosi causa, et signa ex Auic.
85. syncopalis minutæ ex Auic. 85. cura ex A-
uic. 87. cura minutæ ex Auic. 87. signa, et cura
syncopalis malitia humorum, et eorum acuitate
ex Raf. 103. signa, et cura ex cruditate hum.
ex Raf. 104.
febris vertiginosa ex Hip. pag. 6
febris vehementis ex Hip. pag. 6
figus ex quo non calefit patiens ex Ar. Raf. 103
cura ex Cornel. 182
H
Hellica nota in Marafinom transmutat Alex.
50. cura. Ale. 50. causa ex cura ex Act. 65.
causa signa ex Auic. 90. signa marafini ex A-
uic. 91. cura hellica ex Auic. 91. causa bec. sene-
litis ex Auic. 92. signa, et cura ex Auic. 93.
signa, et cura ex Raf. 101. 103. signa, et cura
ex Auer. 107. signa ex Auer. 110. cura ex
Auer. 115. febris ex ardore ex Act. 58
Hellica signa, et curationes ex Isa. 120. causa, et
cura ex Isa. 122. hellica diffusio ex Isa. 122.
hellica simplic. cura ex Isa. 122. cura ex Isa. 126
127. hellica composita cura cum febre putrida
ex Isa. 127. causa, et signa ex Ser. 154. cura,
155. medela ex Haly. 174. cura ex Affu. 178
cura ex Corn. 207. quid sit causa signa, et cura
ex Gord. 214. 215. causa, species, signa, et cura
ex Arual. 242. 243. quid sit causa, signa iudicia,
et curatio ex Phil. 280. 281. quid sit cau-
sa signa, et cura ex Nicol. 288. 289. hellicæ
senectutis causa signa, et cura ex Nicol. 290
Hellicæ febris differentia, et curatio ex Non. p. 14
signa ex Gal. p. 11. 12. 13. quando sit ex pestan-
da, ac vietus ratio ex Gale. 26. vietus ratio ex
Gal. 27. hellicæ cognitio, et curatio ex Pan. Aeg-
gin. 40. signa ex Alex. 50. quomodo hellica a
putridis discernat ex Ale. 50. notæ bec. Ale. 50
Hemiritei causa signa, et cura ex Auic. 98. 99.
Hemiritei cura ex Isa. 127. causa, et cura ex Is-
147. causa, et signa ex Sera. 163. cura ibid. cu-
ra 183. et ex Plinio. 184. cura ex Haly. 167.
causa, et cura ex Corn. 206. signa, causa, et
cura ex Arual. 245. 246
Horror quid sit 25. cura ex Cornel. 182
I
Ignis sacri affectio ex Act. 62
L
Lingua aspera in febris curatio ex Ori. pag. 12.
cura ex Auic. 79. cura ex Gariop. 192. 193
Lingua scabritici 42. cura ex Cornel. 182
M
Marafinom quid sit, causa, signa iudicia, et cura
ex Phil. 282
Morbilli causa, ex Auic. 92. signa et cura ex A-
uic. 94. signa, et cura ex Raf. 103. causa, signa,
et cura ex Gord. 216. 217
N
Nausea in febris ex Ori. p. 12. nausea ex Pan.
Aegin. 42
O
Obstruatio non est aperienda nisi euacuata plenitu-
dine obstru. notæ ex Alex. 50
P
Parotidarum signa, et cura ex Gario. 197
Pestilencia ex commentarijs Rusti Pan. Aegi. 41.
signa ex Auic. 93. praeservatio ex Auic. 24
Phtisis cura sine febre ex Isa. 123
Phtisis calida cura. 123
Pulmonis viciis cura ex Isaac. 123
Putredini que requiruntur. 23
Putredo quid sit, et quo modo sananda 29. quo
modo vacuanda. 29. causa ex Isa. 141
Q
Quartana signa ex Auer. 107. signa ex Auer. 109.
cura ex Auer. 115. cura ex Isa. 127. cura
ex Isaac. 129. duplicis quartana ibid. cura ex
Isa. 148. causa, et signa ex Sera. 163. cura ibi-
medela ex Haly. 170. cura ex Corn. 182
Quartana febris ex Plin. 186. vera quar. causa si-
gna, et cura ex Gario. 195. causa signa, et cura
ex Corn. 204. causa, et cura ex Corn. 206. causa
signa, et cura ex Gord. 212. vera quar. causa si-
gna, et cura 250. non veræ causæ signa, et cu-
ra ex Arual. 251. causa signa, et cura ex Ar-
ual. 252. 253. quid sit causa signa iudicia, et cu-
ra ex Phil. 275. 276. notæ signa ex Nic. 311.
notæ curatio ex Nic. 311. nota curatio ex Ni-
313. quartana cūtinus signa, et cura ex N. 313
Quotidianæ signa ex Gal. 35. cura ex Gal. 36. agni-
tio, et curatio ex Pan. Aegi. 39. diuotio et cu-
ratio ex Act. 63. cura ex Isa. 127. cura ex Isa.
129. cura ex Affu. 178. curatio ex Corn. 182
cura ex Corn. 182. ad tipum quotidianæ 183. cu-
ra ex Plin. 186. causa signa, et cura ex Gario.
192. signa, et cura ex Gario. 194. causa signa,

INDEX

Et cura ex Confl.	204	116. <u>causa doloris</u> ex Auer. 116. <u>ex superflua</u>
Quotidiana febris signa ex Ori. pag. 9. <u>causa signa</u> ,		evacuazione ex Auer. 117. <u>ex superflua fluxu</u>
Et curatio ex Nonio. pag. 14. <u>signa</u> , Et cura ex		sang. cura ex Auer. 117.
Alex. 53. <u>signa</u> , Et cura ex Raf. 104. <u>causa</u> , si-		Synopsis ex Serap. 164.
gna, Et cura ex Auer. 106. <u>continua causa</u> , si-		Synocha febris quæ vocatur, Et quid sit harum
gna Et cura ex Arnal. 251. <u>quid sit causa signa</u>		genus ex Gal. 22. 3. <u>lites differentia</u> , Et in qui-
indicia, Et cura 273. 274. <u>quotid. Period. cura</u> .		bis corporibus non possint gigni ex Gal. 22. <u>pre-</u>
ex Nicol.	307	sidium maximum est sang. missio ex Galen. 23.
Quotidiana <u>causa</u> , Et cura ex Confl.	205	quando oriatur ex Gal. 23
R		Synochis febris quæ dicitur, Et eius curatio ex
Rigor quomodo fiat ex Gal. 13. <u>sine febre efficitur</u>		Gal. 28. <u>nutrimenti quantitas</u> 28. <u>signa</u> , Et cu-
ex Gal. 14. <u>de immodico rigore in febribus Pau.</u>		ra ex Raf. 104. cura ex Isa. 126. <u>causa</u> , Et <u>signa</u>
Aegin.	42	ex Isa. 141. <u>cura</u> ex Isa. 143. <u>causa</u> , Et <u>signa</u>
Rigor quid sit.	25	ex Sera. 156. <u>cura ibid. causa signa</u> , Et cura ex
Rigoris regimen ex Auic.	78	Confl. 203. <u>causa signa</u> , Et cura ex Confl. 205.
S		<u>causa signa</u> , Et cura ex Gord. 211. <u>causa</u> ex Pe-
Sanguis e naribus profusum ex Pau. Aegin. 44		tro. 222
Sanguis de stillationis curatio in febribus ex		T
Orib.	pag. 13	Tertiana cura ex Plin. 186. <u>cognitio</u> , Et cura ve-
Sanguinis narium fluxus regimen ex Auic.	79	ra tert. ex Gario. 192. <u>non vera cognitio</u> . 192.
Singulus in febribus ex Orib. pag. 12. ex Pau. 44.		Tertiana simplicis curatio ex Gor. 194.
Et Gariop.	148	Tertiana non vera signa ex Gariop. 194. <u>vera</u> st-
Sinocha inflatim causa, signa Et cura ex Ar. 244		gna, Et cura ex Gariop. 194. <u>causa signa</u> , Et
Sinocht putrida causa, signa Et cura ex Arn. 244		cura ex Confl. 202. 203.
quid sit, causa signa, indicia ex Phil. 270. <u>sine</u>		Tertiana cura ex Confl. 205. <u>causa signa</u> , Et cura
chus quid sit causa signa, Et cura ex Philon.		ex Gordo. 210. <u>species causa signa</u> , Et cura ex
271. 272		Arnal. 246. 247. <u>nota causa signa</u> , Et cura ex
Sitis ingens ex Orib. 12. ex Pau. 43. ex Auic. 79.		Arnal. 247
ex Haly.	173	Tertiana continus causa, Et cura ex Arnal. 242.
Sopor grauis in febribus ex Orib. pag. 12. ex Non.		causa signa, indicia, Et cura ex Phil. 264. 265.
14. <u>curatio</u> ex Pau. Aegin.	42	nothæ causa signa, indicia ex Philo. 266. <u>cura</u>
Sternutatio in febribus. 43. <u>cura sternutationis fre-</u>		ex Nicol. 302
quentius ex Auic. 79. <u>medela</u> ex Haly.	173	Tremor in acutis febribus ex Gariop. 199.
Stomachi quomodo curam habere conueniat ex		tussis in febribus 42. <u>cura</u> ex Auic. 80.
Pau. Aegin.	42	typica febris ex Gariop. 186.
Sudorem in feb. mouentia ex Non. 14. ex Pau. 42.		V
Sudor superflus ex Auic. 79. ex Haly. 174. ex		Varioli <u>causa</u> Et <u>signa</u> ex Auic. 94. <u>signa</u> , Et cu-
Gari. 198. <u>iudiciu</u> 109. <u>cura</u> ex Phil. 283. 284		ra ex Raf. 105. <u>causa</u> , Et <u>signa</u> ex Isa. 143. cu-
Sudores silentia ex Non. 14. ex Gor.	216	ra ex Serap. 157.
Synopsis ex iumanitione in febribus, vel plenitudi-		Ventriculi os offensus in febre quomodo sit curan-
ne ex Orib. pag. 13. <u>quale vinum exhibendum</u>		du. 32
ex Gal.	32	Ventris fluxus in febribus ex Auic. 79
Synopsis quomodo cognoscatur 32. <u>quibus succede-</u>		Vigiliæ in febribus ex Orib. pag. 17. ex Non. p. 14
re causis soleat.	33	Vigiliæ ex Pau. Aegin. 42. <u>cura</u> ex Auic. 79. <u>me-</u>
Synopsis in febribus accedens ex Alex. 48. <u>nota</u>		dela ex Haly. 174. <u>signa</u> , Et cura ex Gari. 199.
ex copia humorum erudoruni ex Al. 48. <u>nota</u>		Visceribus quæ imponi solent in feb. ex Non. p. 14
ex bilioso 48. <u>curatio synopsis</u> ex Ale. Tra. 48		Vomitibus regimen ex Auic. 9
Synopsis accedens in trismo Alex. 51. <u>causa</u> , Et		
cura ex Auic. 80. <u>signa</u> ex Auer. 109. cura ex		
Auer. 116. <u>ex causa stomachi cura</u> ex Auer.		

HIPPOCRATIS

COI DE FEBRIBVS

liber

Ex commentarijs Ioan. Marinelli

in Lib. Hip.

De febris nominibus.



Fea i s sepe ab Hip-
po. appellatur calor,
& ignis, qui calor nō
est naturalis, nec in-
ter res nō natura-
les commemoratur,
sed praternaturalis,
hoc est, cōtrariū na-
ture, quemadmodū
sunt morbi omnes

ac eorū causę, & symptomataque tria sunt om-
nino nature humane contrariissima. & pro-
pterea multoties reperies in lib. de mor. pop.
calorem, ardorem, & ignem pro febre scriptos
quin & aliquando, cum dicit febrem, signifi-
cat calorem febilem, quemadmodum in libr.
5. de morb. pop. nu. 8. ubi inquit, vigesima ru-
mor capie circū autem, & febris, & rigor. &
nu. 10. eiusdem lib. cum rigor subrepens dimi-
ssisset, febris venisset, ut videtur, appellat
quandoq; febrem; calorem, ut in li. 7. de mor.
pop. nu. 28. cum ait, ad noctem, calores. & n.
37. ex fontibus, ut videtur, calores nullo tem-
pore relinquēbant, magis tū ad vespēram
augescēbant, sudores sēbant per totū corpus.

*Febris quam corporis partem primū cor-
ripit, eamque morbum vniuersalem
minime tempore esse asserit.*

Verū quam partē primū corripit febris
nostrī corporis, videamus, prodū est in lib. 6.
de mor. pop. sect. 5. par. 3. 1. rigor & superiori
ventre, ignis verō magis ab inferiori. Et Gal.
in com. ait, ex partibus ventris superiori rigō-

rem magis, inferior verō febrem facit, aut sen-
tit, aut inchoat. Et morbum vniuersalem nō
esse asseruit, in lib. de Nat. mul. pag. 94. n. 13.
si veri prater naturam hic febris, rigor, &
dolor in vniuerso ventre, & lumbos corripit. Et
in lib. de loc. in homi. pag. 3. n. 39. hunc mo-
dicū etiam potare oportet, quod eduxit, qua
parte magis haret, siue superne, siue inferne,
& in lib. 7. de mor. pop. nu. 1. febris adeo levis
facta est, ut obscura cōsisteret, praterquam
in temporibus. & multū a vniuerso abigit.

Febris quomodo fiat, & quibus de causis

Ceterum transeamus ad illam partem, qua
nobis declarat, quonam modo fiat febris, &
quibus de causis, scriptum est in lib. 4. de mor.
pag. 76. nu. 17. si cibi mancant in ventricu-
lo ampliore tempore, quā oportuū est,
& alij ad ipsos incidant, corpus reliquē reple-
tur, & dum premittitur plenitudo, venit
calor, ac dolor corpori accenditur, venit scilicet
cor calefcentibus, & sentibus, hanc quādam
citius, hyeme verō posteriora hanc etiam cali-
dus est aer ambiens, & calidior corpus in
seipsum trahit, & si calido adhuc existente
ventriculo calidior, quā oportuū est, spi-
ritus homini accedat, nihil citius est hominem
ex tali febre. hyeme verō, cum frigidum
spiritum, trahat in se ipsum, multo magis
potente, corpus repletionem ferre, hō mi-
modicē ventrem exonerante. Et in lib. 1. de
loc. in homi. nume. 38. febris propterea sunt,
cum corpore superinflamato carnes intume-
scent, & putent, ac bilis condita quiescat in se,
& neque refrigeretur quicquam, neque exeat,

neque

neque mouetur, neque aliud quid subeat. hęc duo loca Hip. non solum modum exponunt, quod fiat febris, sed causas materiales, quę sub cibis multis, vel pituita, ac bilis, deinde obstruuntur, quę est causa secundaria à primis p[ro]p[ri]a. Et in dicto lib. 4. de mor. n. 2. 5. cum homines laborant, quibus sanę maxime sanguinis afflictiōe contrigerit, si illic moritur, ac calefit, & ex hoc dolor oboritur. Si autem alius, ac vesica non breui copiam expulerint, febris ex hoc irruit. & siquidem prior humor equalis fuerit, nequaquam, si verò in labore ipsorum plurimus in corpore permaneat, superat ille, at n. 2. ait febris h[uius] modo oboriscens non periculosa, neque fortis est. Et subditur si calefacte sanguine exhalat maxime per hunc humor aquolus, qui febris est infestissimus, & remanet pinguis, ac leuis, quia est biliosus, & febris maxime nutrimentum, & attenuatus h[ic] biliosus humor, corpus magis calere facit, quę ratio nobis indicat non solum humoris quantitatem producere febrem, sed etiam qualitatem. Et propterea in lib. de vet. Modi pag. 5. n. 1. me. 30. ego hoc maximum signum esse putō, quod non propter calidum simpliciter homines febricitant, neque hoc sit simpliciter agnoscibilis causa, sed est amarum, ac calidum idem, & calidum ac acidum, & falsum ac calidum, & alia infinita. & tunc frigida etiam alia causa culatibus conueniunt, propterea quę in ardenti febre febricitant, & alijs febribus morbis non cito et calore liberantur, & neque adeo sic frigidum aduersus calidum. hæc itaque sunt, quę ledunt, simul adest autem & calidum robore participans, atque in ducens, & emulcerans, & augens simul cum illis, verum nullam potentiam maiorem, quam conuenit, habens videmus igitur, quomodo fiat febris, & causas febrium primarias esse in ultitudine, siue repletionem ciborum, secundariam vero pituitam, & bilem, utraque, terna, & has consequenter obstruunt. has porro causas iuuat, ut plurimum loci, tempus, & res non naturales, quę à medicis sex numerantur, & hæc ex ipsis febres efficiere possunt, sed simplicissimas; illas verò minime. Causę porro sunt ætas, sexus, cognitio, temperatūra, &que habitudine corporis totius, vel partis, consuetudo in cibis, paucis, vel multis, studia, negotia, fortune, modus viuendi, & huiusmodi. & causę hęc omnes appellatur primarię, siue externę à Cæ. & ab alijs, qui ex secuti innt sed humor, & obstruunt, internt. Ab his igitur causis febres fiunt,

De febrium differentijs.

HAs porro plures suscipiunt diuisiones, quas nonnulli species n[on]nupant, siquidem alię di-

uiduntur secundum substantiam, alię secundum accidens, quę substantiales appellantur, alię tales sunt à forma, alię à materia, alię ab utroque. Febres autem, quę à forma dicuntur, diuisionem habent, prout magna fuerit, vel parua forinque vis, propterea quod alia febris dicitur vehemens, ut apparet in lib. 7. de mor. lib. pop. n. 1. 5. & in cō. 4. de vict. ratione mor. acut. par. 46. & cō. 3. prog. par. 13. & in lib. 4. ph. 3. alię tepides, ut cō. 2. prog. par. 60. alię simplicissimę, ut cō. 3. prog. par. 12. alię mediocres, ut in 1. 2. prog. par. 49. Quę verò febres denominationem accipiunt à materia, alię dicuntur siccę, ut legitur in lib. 4. de mor. pop. n. 1. 2. alię saluiginosę, ut in lib. 6. sec. 1. alię acutę, ut lib. 1. aph. 14. & lib. 3. aph. 7. alięque plurimas in locis, alię ardentes, ut 7. de mor. pop. n. 5. 4. & 5. & lib. 4. aph. 5. 4. & 5. 8. & lib. 4. alię statim ambulantes ad manum, ut lib. 6. de mor. pop. sec. 1. & alię statim ad manum submordentes, ut eodem lib. 6. sec. 6. Quę vero denominantur à materia, ac forma simul, alię dicuntur implacidę, ut scilicet cō. 1. 4. de vict. ratione. par. 45. alię pestilencię, ut cō. 2. prog. par. 2. alię borridę, ut in lib. 1. de mor. pop. sec. 1. & lib. 2. sec. 3. alię malignę, ut in lib. 7. nunc. 3. & in lib. 2. prog. par. 4. 4. & hæc est diuisio febrium secundum substantiam.

Diuiduntur porro etiam per accidens, quoniam alię denominantur à quantitate, alię à qualitate, alię à tempore, alię à loco. A quantitate verò alię dicuntur continue, ut in cō. 3. prog. par. 13. & in lib. 4. de mor. pop. sec. 1. alię non continue, hæc dicuntur intermitientes, quarum alię appellantur æphemę, siue diutę, ut in lib. 4. aph. 5. alię nocturnę, ut in lib. 1. de mor. pop. sec. 2. alię tertianę, ut in eodem lib. alię quartanę, ut ibidem, alię quidam tunc septimanę, nouanę, ut in eodem lib. alię quidam longę, ut in lib. 4. aph. 14. & æstivę magnę, ut in lib. 2. de mor. n. 1. Quę diuiduntur à qualitate, denominantur ab actionibus, vel à passionibus, quę originem ducunt à qualitatibus. Et propterea alię dicuntur laboriosę, quę laboris ac doloris infortis, ut in lib. 4. aph. 7. alię sudorifę, siue indorifę, ut in lib. 4. de mor. pop. n. 1. alię letales, & letales, ut in lib. 4. aph. 14. alię anxiosę, horridę, ut in lib. 2. sec. 3. alię tremule, singultuosę, mentē contingentes, ut in lib. 4. de mor. n. 1. & 3. alię lethales, maxime venenę, 4. alię de lib. Quę autem diuiduntur secundum locum alię videntur intra, & frigidificunt extra, vel contra, ut febris Epialos, & febris lipitia, de quibus legitur in lib. 4. de super. n. 1. 4. & in lib. 2. de mor. n. 16. & 1. 4. de lib. de affect. n. 4. alię dicuntur à splene, ut in lib. 4. de mor. pop. n. 2. 0. alię à capite, alię ab aha corporis parte, veluti ab utero, ut in lib. 4. de mor. n. 1. 4.

Que

Quæ autem diuiduntur secundum tempus alie sunt diurnæ, vt in lib. 1. de morb. popn. sect. 3. alie nocturnæ, ut ibidem, alie ærotæ, vt in eodem lib. sect. 2. Et in com. 2. prog. par. 60. alie diurnæ, vt in lib. de inter. affect. n. 3. Et tales sunt diuisiones febrium, quæ reperiuntur in lib. Hip. quæ omnes cū principium habeat, & finem quoque habent, igitur & medium. quod vigor, & status appellatur. inter principium, & statum est augmentum febris; inter statum, & finem est declinatio, quæ propter quætor, vel quinque describuntur singulorum febrium partes, quæ à medicis temporis febrium nuncupantur.

Neque tempus est, vt aliam aggrediamur diuisionem. legimus in l. de Flat. nu. 7. sunt febrium genera duo, quorum alterum propter malam dietam priuatim his contingit, qui ea vitur. communis febris propterea omnibus accidit, quod eundem spiritum omnes attrahunt, sique, vt simili corpori, similes spiritus, similiter permixti similes gignant febres. Et nu. 10. propter malam dietam fit febris, cum corpus cibis expletum est, ac spiritus quoque multitu do vehementer excellit, dum cibi, & ventri diu immorantur, & inferior venierit obstratus; per vniuersum corpus permeant status, sanguineque plenas corporis partes maxime petentes ac frigesciunt. frigescent his locis, unde fontes, & radices sanguinis procedunt, per vniuersum corpus horror consequitur, & tremor & hiatus, de quibus lege n. 11, & 12. & de sudore n. 13. harum igitur febrium alie sunt simplicissimæ, alie acutæ, & alie longæ. Simplicissimæ febres, vt legitur in com. 3. prog. part. 2. ac signis firmatæ securissimis, quarto die, aut citius desinunt, deterimæ verò, ac signis affligentes difficillimas, quarto die, aut citius interinunt. ac tunc verò febres sic appellantur, vel quia sunt breues, & deterimæ; vel quia sunt à causis acutis, veluti à bile metacæ, vt legitur in l. de Fract. nu. 44. in constipatione sicca, vt in lib. 3. apho. 7. vel quia habent grauia symptomata, vt legitur in l. 7. de mor. popn. nu. 3. & omnis febris aut est continua, vt in acutis, nam de acuta ratione symptomatum est intermitte, & ratione febris est continua, vt eodem num. 38. videre possumus. præterea inter continua est febris ardens; at primum de continua in genere, deinde de acutis, tertio de ardentibus agemus. sed primum varia febrium in vniuersum signa tunc prognostica, tum indicantia sunt recitanda) postea ad particulares febrium species veniemus.

Febrium signa, & prognostica, & indicantia quædam in genere.

At Hip. in l. de Coac. præno. pag. 173. col. 2. rigores, veluti in febre tertiana hi in media inordinata febre exacerbantur, valde maligni sunt si vero contrario conuellentibus modo exacerbentur cum rigore, & febre perniciosam est. Et febres ex præcordiorum dolore malignæ sunt, sopor in his pessimus est. Et, in febre vocis interceptiones malignæ sunt. Et, qui insuper exudant in febre; malignæ habent. Et in febribus inflata aluo status non erumpere malum. Et subdit. in febre tractus velut à vomitu, in secretionem desinens malum. Et in febribus mentis emotiones taciturnæ, in eo, qui voce priuatus non est, perniciosæ sunt. Et, in febre liuores sientes deiui morte affore significant. Et, quibus in febre dolore lateris siccæ, alius multa aquosa, ac biliosa egerit, hi alleuantur, & febrienti si atra bilis in principio sursum, aut deorsum prodierit letale. Et, qui cum perfrigitationibus, non sine febre superne exudant, moleste ferentes, & phrenitici in acuto morbo perniciosæ habent. Et subdit, pag. 176. in febribus inguinis dolor, morbum diuturnum significat. Et in febribus indicationes impediunt, ac sublatæ temporis quidem diuturnitatem inducunt, non autem perniciosæ sunt. Et febres ex doloribus vehementibus diurnæ. Et quibus desinunt febres, non in diebus indicationibus, his recidisse sunt. Et febres vertiginosæ cum voluntis, vel sine voluntis, perniciosæ. & quibus in febre dolores circa lumbos, & infernas partes sientes, septem transuerum continent, infernas partes relinquentes, perniciosæ sunt, tum alias; tū si aliquid quoddam signum præteritum accedat, si verò alia signa non fuerint præterita, suppurationum forte timor est. & quibus febres aliquando intermitte periculo vacit, & in febribus longis aut tuberculis, aut doloribus, in articularibus sunt. & si facti fuerint, non sunt inuiles. & in febribus secundum venam, quæ in collo, pulsus, ac dolor in dysenteriam desinit. Et, quibus in febribus inuente in temporibus pulsant, & facies fans est, & præcordium non molle, diuturnum morbum significat, & non desinentem cursum multi sanguinis ex oribus fluxum, aut singultum, aut conuulsionem, sor coarctatum dolorem. Et quibus cum in febribus tremores circa iudicationem cessant, his temporis progressu abscessus dolorosus, suppuratus in articulos fit, & vesica dolorosa. Et, febrientibus, quibus rubores sunt in facie, & dolor capitis fortis, & venarum pulsus, his sanguinis fluxio plerumque contingit. Et, quæcumque signa febre se opponant, & non abscessus

significationem habent maligna sunt. Et, febres quæ neque in diebus iudicatorijs, neque post solutionem signum decesserunt, recedunt. Et, quibus febrite incipientibus, sanguis de naribus sternutatione fiens destillat, & vrinæ subfidentium albam in quarta die habet, his in septima die solutionem significat. Et septima die, aut nona, aut decima quarta fluxiones sanguinis à naribus fientes, plerumque febres solvunt, similiter, & alui fluxio, biliosa, & qualis in dysenteria fieri solet, & genum, ac coxendicum dolor, & vrinæ concocta ad iudicationem. In muliere verò etiam menstruæ purgationis fluxus. Et, qui in febribus exudat, caput dolens alui suppressa, convulsus sunt. Et, convulsio in febre fiens in eadem die delinens bona est. Et convulsio in febre fiens sedat febrem eadem die, aut postera, aut tertia. Si verò tempus in quo incipit, transgreditur, & non desinat, malum est. Et, febres intermittentes, verum iniquitate calecentes alui inflata, pauca egerente, in his post iudicationem lumborum dolore consequntur, alui etumpunt, at ambulantes ad manum torpide, fluctuolæ, anxiosæ, in his alui suppressa grauati exoluntur, quandoque, verò, & rubicundæ in pedibus ambulationes, eadem significant. Et subdit, capitis dolor moderatus cum si cibum capiente, aut cū sudore non soluent febrem, abscessus in gingivis, aut circa aurem significat alui non exturbata. Et pa. 176. in febribus turbaus alui non sinit. Et, rubores in febribus fiens circa aurem ex pregresso dolore signum quidem sunt erysipelatis in facie futuri, sed & convulsiones extalibus sunt cum vocis interceptione, ac exolutione. Et, ex febribus furiditatem, sanguinis à naribus fluxio soluit, item alui turbaus. Et, subdit, oculorum rubor in febre fiens alui diuturnam affectionem significat. Et, in oculorum distorsione febrienti lassato rigor perniciosus, & soporosis in his male habet. Et, viro lippienti febre superueniente solutio. Si minus, periculum est, necesse fiat, aut perire, aut utrunque. Et qui febres ad tacitum non aduertere habet, phrenitici sunt, & magis si sanguis fluxerit. Et lingua circa bifida sui parte, velut salina alba obduci, febri remissionis signum est. Cætera verò ibi lege. Et ex dentis corruptio ne vehemens febri superaccedens, & delirium lethale est. Si verò feracur, vlcera suppurabunt, & ossa discidunt. Et, sputi excretiones in febre linide, nigre, biliosæ si quidem supprimantur male sunt, succedentes vero pro ratione vales. Et, quibus vox cum febre deficit, & cum iudicatione intercepta, reemuli mortitur. Et, vocis interceptiones in febre convulsorio modo fiens, ad mentis emotionem cum silentio deveniunt, perniciosum. Et, lethalis

est spiritus febriculosus, & fuliginosus. Et subdit, colli dolor malum quidem in omni febre, pessimum autem his, quibus timor est, vi etiam insistant. Et in pectoris dolore febriculosus, alui turbata, torpida nigrarum egestionum signa sunt. Et, fauces exulcerate in febre cum alio signo ex his, quæ difficilia sunt, periculosa sunt. Et, in febribus decrepente suffocari, & deglutire non posse, circa tumorem malum est. Et, oris ventriculi dolor, & pulsus præcordiorum, & febre perfrigerata malum, tum alias, tum si in super exudarint. Et subdit, quibus de repente dum sine febre sunt præcordij, & oris ventriculi dolor, & circa crura, & infernas partes, & alui in tumore elenata est, soluit venæ sectio. & alui fluxio his febrite notum est, longe enim & vehementes salubres sunt, & tules, & singultus, & spiritus sunt. Et, dolores ad præcordia in febre, voce intercepta sine sudore soluti malum est, his ad coxendices dolores sunt. Et, iuxta ventrem in breve palpitantes, mentis emotiones inducunt. Et dolores in febre ad præcordia eriscentes, sine sudore soluti maligni sunt. Et durities circa ventrem cum dolore in febribus cum horrore, cum austerantibus, si alui in super parum humecta purgationem non faciunt, ad suppuratorem perveniunt. Et subdit, dolor in pectus firmatus corpore, malus in febre est. Si repente perennat, ex lumborum dolore recursiones ad os ventriculi febriculosæ horrorem inducunt. alia verò ibi lege. Et in 1.4. aph. 37. quibus in febribus sanguinis multitudine aliquid etiam peti, his dum rescinduntur, alui humectantes. Et apho. 29. quibus in febribus sextum diem agentibus rigores sunt, difficilis sunt iudicij. Et apho. 30. quibus febri accessiones sunt quacunque hora eas febri dimiserit, postero die eadem hora si invaserit difficilis sunt iudicij. Et apho. 34. si febricitanti tumore non exsistente in faucibus, strangulatio statim superuenit lethale. Et aph. 35. si febricitanti collum repente pervertitur, & vix deglutire possit, ra more in collo non apparente, lethale est. Et m. 36. sudores febricitantium si inceperint boni tertio die, & quinto, & septimo, & nono, & undecimo, & quatuordecimo, & decimoseptimo, & vigesimo primo, & vigesimo septimo, & trigesimo primo, & trigesimo quarto. hi enim sudores morbum indicant, qui autem nesciunt, laborem significant, & longitudinem morbi, & recidivam. & aph. 46. si rigor in die febre non desinit, ager iam imbecillus, lethale. & aph. 51. in febribus abscessus si non solvantur in primis iudicationibus longitudo morbi significant. & aph. 52. qui in febribus, aut alijs morbis ex voluntate lacrymant, nihil ablutum est, qui verò non ex voluntate,

ablutus. Et aph. 67. ei qui convulsione, aut
distentione ventris, si febris successerit, soluit
morbum. Et aph. 61. febricitatem nisi impa-
ribus diebus febris dimiserit, ea redire solet. Et
aph. 62. quibus in febris morbus regius
ante septimum diem succedit, malum. Et aph.
63. Quibus in febris quotidie rigores eue-
niant, ijs quotidie febres solvantur. Et aph. 64.
quibus in febris septimo, vel nono, vel vno
decimo, vel quatuordecimo morbus regius suc-
cesserit, bonum est, nisi dextrum hypochondri-
um fuerit, si vero non malum est, non bo-
num. Et aph. 65. in febris circa ventriculum
flus vehemens, & cordis motus, malum. Et
aph. 67. in febris ex somnis pavores, aut
convulsiones, malum. Et aph. 68. in febris spi-
ratio ostendit, malum: convulsio nem. n. signi-
ficat. Et aph. 69. Quibus sunt vrinae crassae, gru-
mosae, plures, non sine febre existibus, si mul-
titudine ex eis adveniet tenuis, unaq, praecipua
antem tales ab initio exeunt, aut brevi sedime-
nto. Et aph. 70. quibus in febris vrinae
perturbatae sunt, vel in umentis alciuis, ijs ca-
pituli dolores, vel adus, vel aderit. Et aph. 71.
quibus in febris die septimo indicia sic, ijs
nubeculam obducat vrina quarto die rubram,
& alia, secundum rationem. Et aph. 72. quibus
in febris vrinae perspicuae, & albae, male,
praecipue autem si in phrenitis apparent. Et
aph. 73. quibus hypochondria leuata a turbu-
rum dolore succedente, alui ijs homo occidit, ni-
si illas erumpant, vrinae multitudine exeat,
in febris autem haec accidit. Et in 16. aph.
40. Quibus circa hypochondria dolor sit sine
inflammatione, ijs febris succedens dolorem
soluit. & aph. 44. eiusdem lib. Quibus post ita-
gurum illos succedit, in septem diebus mo-
runtur, nisi febre subsecuta, suis crinis flueat.
Et aph. 50. Quibus canque cerebri vni discul-
sum fuerit, ijs necesse est febrem, & bilis vom-
tu succedere. & aph. 41. quibus sanis dolo-
res sunt tepentes in capite, & flammis oborta
sunt, & sterunt, moriuntur in septem diebus;
nisi eos febris apprehenderit. & aph. 54. in acu-
tis morbis qui cum febre existunt, in 20. die
respiratione, male, & in lib. 7. aph. 31. Quibus
cum febricitantibus in vrinis velut farin-
gulae, subdensitate sunt longum & gruidinem
fore significat, & aph. 37. eiusdem lib. quibus
cum sanguinem vomunt, si sine febre illabro
est, si vero cum febre malum. & aph. 52. Quibus
hepar vehementer dolet, ijs si febris super-
tenuerit, soluit dolorem. Et in 1. de mor. n. 6.
Febricitans biliosus in tempore foedis bilis bo-
num, diffusa verba ad dispersa, & ad vnam ali-
quam corporis partem alapsa malum. Et in 1.
prog. com. 3. par. 22. quibus febres cessant, ne-
que signis solutorijs apparentibus, neque

diebus indicatoris, his rederfuras esse expectandum. quæcumque febris longiorem morâ traxerit, homine alioqui ad salutem disposito; ira vi, neq; dolor teneat ob inflammationem, aut ob aliquam manifestam causam, huic abcessum expectare oportet cum tumore, ac dolore ad aliquam articulum, vel maxime infernum. Et, in L4. aph. 43. quibus in febribus circa dentes viscosi adherent, his fortiores breves sunt, & in L3. prædictin. 23. in febrium principijs sine delirium accessent, sine aliquis membri syderatio peritum hominē sciedum est, si non omnino; aut ex optimis signis aliquod accedat, aut corporis vires desine. 60 in L. de Coac. præ. n. 4. cum febre, & sine febre egessio alii nigra velut sanguis, mala est. finale item omnes varie, abinde ex bile coloratur, & in L. prog. com. 3. quicunque in febre non ita thali splendor ob oculos versari, cum præcordium in dextra, aut sinistra parte transi-
on sanguinis de naribus fluxum significat; & in L. de Coa. præ. n. 4 in febre tenuis, ac mol-
is egessio mala est, mala quoque sicca fratri hi decolor, cum aliis, tum si aliquid humore detra-
gis verò ante egressus occidit. Et ibidem fe-
bris his exacerbat, quibus ad op. sic, & ad eg-
ressus egessio alui in super. exultat. Et in h2
de mor. pop. sec. 3. si febre tenente præteritis
graciles fuerint in die impati, scijuenti
die solueret, sed ad curacionē quæ febris durat

Febrium omnium curatio in genere

Cura vero omnium febrium sic coditio-
nimus, ut percipitur in Ide. Vir. med. 371:
et 373. conuocatio autem fit, ut ibidem scriptum
est, est permittit, et temporariaque, ut supra,
de qua coditio. Et in Ide. loc. in to. 36. Cum la-
tusdo occupatus, et febris, ac repletio, laiare
multaqua an potest, et oleo illi notet, et max-
ime calficere, ut illi calicet, aperto corpore, pra
sudore egrediatur, consequetur autem hoc fa-
cienda sunt per tres, aut quatuor dies, si
non solentur ac cesset, pharmacum in potib
hibendum est, quod bibum educat, et febri
perfigeranda est, prae ter quatuor quartana, me-
dicamentum tamen, donec corpus sibi dicit
est, ac propius fore, non obicit: vancque nisi
parum, ut potest corpus surgente, cum aucto
gracie fuerit, ac celerum, tunc bibendum
exhibet, et enacubatur. Et sic patet in morbi
principio lotiones faciendas esse, et medica-
mentum purgans minimis exhibendum, et in
eodem loco, de plenitudine autem: febris so-
lenda est, et per septem dies: septima laetudo
est, ager, si febris dimittitur, oia velit, quod pra
balneo sudor contingat, ut verò neque septima
dimittitur, non cessat, non aliud quod peti-
culo.

culolum accedat. si dimiserit, triticeis forbitio-
nibus utaris. in Lausum de Vi& ra. comm. 4.
par. 36. si febris hominem corripiat, vetere ex-
cremento descēdente, vel nuper cibatum, siue
cum laeris dolore, siue nō, is quieti tantisper
permittendus, donec cibus ad ventrem imuni
descenderit, & par. 39. observa febrim accē-
siones, ut nunquam cum adfuit, neq; cum su-
tūre sunt, forbitiones exhibeas, sed vel cum
cessant, vel quieverunt, & maxime à principio
recesserunt. frigentibus ergo pedibus neq; po-
tum, neque forbitionem, neque aliud quip-
piam huiusmodi dabis, donec valde in-
caluerint, deinde id, quod confert, exhibe. cau-
sam horum ibi lege. sic in li. 1. aph. 12. in ac-
cessionibus abstinere oportet, nam cibum dare
nocuum est, & quibus per circuitum sunt ac-
cessionēs, & aph. 19. his, qui per circuitum ac-
cessionem habent, nihil dare oportet, neque
cogere, sed subtrahere adfectioni ante iudica-
tiones. & aph. 4. victus tenuis, & exquisitus in
morbis quidem longis semper, in acutis verò,
in quibus non cōuenit, periculofus. & aph. 7.
ubi morbus est peracutus, extreme tenuissimo
victu utendum est, ubi non, sed pleniorē vi-
ctum contingit adhibere, tantum cibi indul-
gendum est, quanto morbus extrēmīs est mol-
lior. & aph. 8. cum morbus in suo vigore con-
sistit, victu tenuissimo utendum est. & aph.
9. conie&are oportet, an æger cum victu suffi-
ciat perdurare, donec morbus consistat &c. & aph.
17. & quibus semel, aut bis, & quibus plu-
ra nec, an pauciora particulatim oportet offer-
re. considerandum est, & aph. 18. in ipso con-
sistendi tempore, & parū ante illud cibus sub-
trahendus, prius verò vberius alendum, ut æ-
ger possit perdurare. Et sic habemus quoniam mor-
bi tempore sit cibandus æger. at illud aduer-
tendū est, quod legitur in lib. 7. aph. 63. si quis,
ait, cibum febricitanti dederit, vel sano robur,
sic laboranti morbus, & in li. de lo. in hom. n. 39.
Febricenti cibum ne offeras, neque forbitioni-
bus subrus alium ducas, in potu dabis aquam
calidam, & aquam mulsam, & acetum cum a-
qua. hæc autem quamplurima bebāt, si enim
non frigidus ingressus fuerit porus calidus exi-
stēs, ac manens, ex corpore ægroto detrahet,
& vel per urinam deiciet, vel exudabit. vnde
quaque autem apertum, & respirans, & mo-
tum corpus, id, quod conducibile est, faciet.
Hinc fortasse ille apho. qui scriptus est in li. 1.
aph. 16. Victus humidus febricitantibus om-
nibus confert, maxime verò pueris, & alijs, qui
tali victu uni consueverunt, sed & id notandū
est. læ dare his, quos caput dolet malum, item
febricitantibus, ut legitur in li. 5. aph. 63. præ-
terea inquit in com. 4. de Vi& rat. par. 44. cor-
pus quieti, permittit, vngere, & equaliter cō-

tegere oportet, mulsamque aquosam biben-
dam, & pisanæ cremorem vespertī subbedū
dabis, ventrem ab initio clystere duces, sed mo-
dicamenta purgantia non admovebis, nempe
si ventrem moueris, urina non maturabitur, sa-
brisque citra tum sudorem, tum iudicationē
in longum protrahetur tempus. & par. 43.
quibus principio vrinz, & nebulosæ, & crassæ
exstant horum annuentibus cæteris purgare cō-
uenit, q; si vrinz inter initia tenues fuerint, ra-
les autem ita curare confert. & in li. 7. aph. 41.
si febris non à bile habeat, aqua multa calida
in caput affusa, febris solutio fit, sed in 1. de
mor. mul. nu. 58. cum mulieri potius purga-
menta non fuerint purgata, aut menses non
prodierint, aut veteris durus fuerit, si sine fe-
bre fuerit, balneo curato, ex talibus autem fe-
bres sunt acutæ. Et in li. de Coa. præ. n. 1. fe-
brem sedar conuulsio in ipsa siens eadem die,
aut postera, aut tertia.

De febre continua.

Legitur in li. 1. de morb. popu. sect. 3. febre
quædam contrariæ sunt, quædam in terditiō
tenent, noctu intermittunt, vel contra sunt au-
tem acutissimi, & maximi, ac gravissimi mor-
bi, ac maxime lethales in continuis febre.

Prognostica sunt hæc. legitur in li. de Coa.
pæ. pag. 176. col. 2. in febre continua quicun-
que voce destituit inacentes, oculis conuulsi
nictæ, hi si postquam sanguis ipsis ex naribus
fluxit, & ubi vomuerunt, loquuntur, & ad se
ipsos redeant, seruiuntur, & quibus in febris
continuis, pustule per totum corpus erumpunt,
lethale, & non purulenti abscessus fiat, maxi-
me autem circa aurem his fieri solet. & febris
continua per tertiam diem augescens peri-
culosa. & subdit, qui diutius secute ex febre cō-
tinua laborant circa dolorem, aut inflammationem,
aut aliam causam, his abscessus expec-
tandus est cum dolore, & tumore, & magis
infernis partibus. expectare autem oportet ab-
scessus, his magis qui vigesimum annum egres-
si sunt, & tunc expectare abscessus oportet, ubi
viginæ dies febris transierit, senioribus au-
tem minus sunt. & ubi multo tempore febris
durant, & n. 3. cum febre continua vesicæ du-
ræ, & dolentes, pessimi sunt. Et in li. 3. aph. 21.
estare febris continua, & ardentes, & certianq;
plurimæ, & quarantæ. & in li. 1. de morb. pop.
sect. 2. in febre continua acutissimi, & maximi
ac gravissimi morbi maxime lethales, & in li.
de iudicatio. pag. 160. n. 9. in febre continua si
quis quarta die, & septima affligatur, & vnde-
cima non iudicatus fuerit, plerumque perit. &
in li. 4. aph. 46. si rigor incidat febre non de-
ficiēte, ægro iam debili, lethale est, & aph. 47.

Excretiones in febris non intermittibus luidæ, cruentæ, fetidæ, & bilioſæ omnes malæ, & ſi bene exeunt, ſiue per alui excretionem, ſiue per urinas bonæ. ſi verò non aliquid eorū, quæ iuant, per hæc loca excernitur, malum, & aph. 48. in febris non intermittibus, ſi partes exteriores frigide, interiores utantur, & ſitim habeat, lethale eſt. & aph. 49. in febre non intermittente, ſi labrum, vel oculus, vel naſus, vel ſupercilium peruerſatur, vel nō videat, vel non audiat, iā debili exiſtente corpore, quicquid horum euenierit, mors proxima eſt. & apho. 50. ubi in febre non intermittente difficultas ſpirandi, & delirium acciderit, lethale.

At uerò de continua febre curanda hæc pauca ſcribuntur in l. 2. de mor. pag. 67. n. 36. ſi febris neq; noctu, neque interdum remittat, & ad contactum ſuperſnas partes habeat calidas, uenter autem, & pedes frigidi ſint, & lingua aſpera, huic medicamentum ne dederis, ſed molli inſuſo per clyſterem ſoluito, & piſanæ ſuccum bis in die frigidum ſorbendum dato; & uinum aquoſum aliquot bibendum. reliquò uerò tempore aquam frigidiffimam bibat. & hic ſi quidem ſeptima die exudarit, & febris ipſum dimiſerit, bene eſt: ſi minus; decima quarta die plerumque moritur. ſic ait. & propterea quòd ſupra dixit, ſi bile inſeſatur homin; hæc febris ſcilicet continua ſit à bile.

De febre acuta.

Febris porro acuta, ut diximus, & ſic appellatur; propterea quòd ſit continuo calida, uel cauſa eius ſit acuta, ut bilis, uel quæ ſymptoma ſit ſeuæ. quapropter mirum non eſt, cum tot modis dicatur acuta; ſi quādoque ex cauſa extrinſeca fiat, nā legitur in l. 2. de morb. popul. ſect. 2. Zoilo iuxta murum ex tuſſi maturata febris acuta. & in l. 3. de mor. pop. ſect. 3. Aegro. 3. ex laboribus, & laſſitudinibus, & neglecta uictus ratione, rigor magnus, & febris acuta corripit, ſiticuloſus, bilioſus non dormiuit. reliqua ibi l. Et Aegro. 1. eiſdem lib. febris corripuit acuta, ab initio continua, ardens ſiticuloſa, & c. ſed in l. 1. eiſdem lib. ſect. 3. Aegro. 12. calefactus cœnauit, & bibit amplius, vomuit omnia noctu, febris acuta. & in l. 1. ſect. 3. Aegro. 9. Pedis dolor ſortis à magno digito cepit, & ſubdit, ſecunda die puſtule nigre febris acuta, inſanit. Et Aegro. 10. Febris uemens corripuit, dolebat caput, collum, lumbos ab initio, ſubditque Febris acuta inuaſit, præcordium eleuabatur cum tumore, diſtentionon ualde, lingua ſicca. Et Aegro. 11. Vxorem, quæ filiam peperat, ſecunda die rigor corripuit, febris acuta, ac ſympto. lege, & l. 7. n. 37

Corpiſ febris acuta, robur facit ex nalla cauſa manifeſta. paulò poſt in die rigore habuit &c. Hos recipimus acute febrientes; ut cauſæ, & ſymptomata innoteſceſſent, quæ ibi lege, & in pluribus locis in l. de mor. pop. nā & in l. 1. ſe. 3. Aegro. 1. febre acuta primo die correptus eſt. & Aegro. 2. ſecundo die febris acuta. Et Aegro. 3. febris acuta. & Aegro. 4. octaua ſuperveniit febris acuta. & Aegro. 5. poſt triè die parva febris acuta, cordis dolor, & muliebriū partium. ubi uerò glandem ſubdiſſerit; hæc quidè leuiora facta ſunt. & ſubdit. decima quarta ſuperriguit. febris acuta.

Quibus uerò ſiant acutę febres, & quo anni tempore, ſcribit Hip. in l. 1. aph. 14. febris ſenibus non ſimiliter acutę ſunt, ſicut ſcilicet creſcentibus, frigidum enim eorum corpus. & in l. 3. aph. 29. iuuenibus ſanguinis ſpuriſſiones, tales, febres acutę. & aph. 1. ſi hyems ſicca, & aquiloſa fuerit, verò autem pluiioſum, & aſtrale, neceſſe eſt eſtate febris acutas fieri, & aph. 14. ſi autumnus aquiloſus fuerit, & ſiccus, his qui naturam habent humidiorẽ, & mulieribus conſerret, reliquis autem erunt ſimpliciter ſiccę, & febres acutę. & apho. 71. in ſiccitatibus febres acutę ſunt. & in lib. de ac. aq. & loc. n. 25. lege quando hominibus, & quia de cauſa febres acutiſſimę maxime pituitioſis occidunt.

Prægnoliſca uerò ſint hæc ſi febris fuerit, & uenter non egeſſerit, conuulſiones pueris ſiut, ut legitur in com. 3. prog. & febris acuta ſuperueniens conuulſionem ſoluit, ut legitur in l. de Coac. præ. n. 3. ſed n. 2. febris acuta, & bilioſis ſpiritus magnus poſt præcordiorum tumorem, abſceſſus circa aurem attollit. & in l. de Denti. nu. 2. febris acuta pueris in deſtinatione accedens conuulſionem quandam inducit, & in l. de ludia. nu. 8. cum febre acuta ſudores frigidi lethales, cum miſiore uerò morbi longitudinem, & in l. de præf. n. 2. cum febre acuta conuulſiones pernicioſę ſint, & in l. 7. prædi. in morbis acutis bilioſis ualde albe ſpumoſę circumbulioſę egeſtiones malę. malę iſtę & vrinę cinſmodi. num his hepar doloroſum eſt? Et ſubdit. ſitis præter rationem ſoluta in acutis morbis mala eſt, ſudor multus cum febris acutis oboriens malus eſt, & vrinę doloroſę malę ſunt. & in l. prog. com. 1. Qui febre acuta manus ſubinde ob oſa fert aut fructus venatur muſcas, aut colligit ſteſnas, aut de uſte euellit pilos, aut de pariete ſtipulas caput, lethale eſt, & in l. de Coac. præ. n. 177. col. 2. cum febre acuta auris dolor perſtinax, & alio quodam ſigno aliquantulum maligno, tu ueneris quidem ſeptima die occidit, & cetera ibi lege. Et in febre acuta aures obſerueſcere ſtupidoſum, & cum febre acuta tumores circa au-

rem ex plurimis graueolentibus. & cum prae cordio interio tardius excitati occidant. & in febre acuta nocis interceptiones cum exolatione sine sudore sunt quidem lethales, minus uero quam cum sudore: uerum diuturnitate temporis significat. fortassis autem, & qui ex recidiva tale quid patiuntur, tutissimi sunt. perniciosissimi autem ex talibus habere quibus sanguis ex naribus fluit, & quibus alii humectantur. Er bona autem spiratio in omnibus morbis, qui cum febre acuta sunt, & in quadraginta diebus iudicantur, magnam momentum ad salutem habet. & pag. 179. anhelosis febris postea acuta. Et ibidem pueri febris acuta, & alans suppreffa cum uigilijs, & calcitrare, & colorem mutare, & ruborem habere conuulsorium est. & pag. 176. capitis dolor pertinax cum febre acuta, & alio signo maligno lethale.

Febrim quidam acutam curatione si defideras, lege in l. de Affect. pag. 80. h. 12. & 13. & 14. sed haec pauca nos addemus: scriptum est in lib. de Coacis prepo. nume. 4. febrim acutam cum sudore soluit alii egestio pitra superueniens. Et, ibidem. n. 3. febris acuta turbulenta, non biliosa iustitiae os uentriculi dolenti solauit. & in l. 4. de mor. popu. n. 30. curatus hemorroidibus insauuit. febre acuta succedente cessauit in febris acutis siticulosi, a medicis potu interdicto, aut etiam a seipsis abstinentes, multum sibi bibere posse uidentur: his aqua frigida data, ut reuocant, prodessit biliosa enim aderuat.

Febris a bile.

SCRIBITUR in l. 2. de morbis pag. 67. si a bile infestatur homo, febris ipsum coarctat quotidie admittit. & in l. de Natu. hom. pag. 11. n. 27. Febris plurima a bile sunt species ipsa quatuor sunt, praeter eas quae ab oculis doloribus generantur. nomina ipsarum sunt, conuulsus, quotidiana, tertiana, quartana. Continent a plurima, ac meracissima bile propere, & iudicationes quoniam brevissimo tempore facit: corpus enim tempore persingerat cito colliquefecit, nimirum in multa caliditate calida. & de Quotidiana, Tertiana, & Quartana suis dicemus locis. sed in lib. 2. de morbo. cita loco subdit. detinet autem febris a bile maxime in meridie, & os amarum est. & cum sine cibo manet, offendit ipsum. ubi uero edere, strangulatur, & a modicis quibusquam cibis impletur, & abominatus, & uomitiones ipsorum inuadunt, & ad lumbos, ac crura grauitas incumbit, & multum dormit. hic si post febrem exudarit frigidum, ac multum sudorem, & febre non liberetur, morbum diuturnum

sentiet. si uero non sudarit, citius iudicatur, cum sic habuerit, & ad nonum diem deueniet, praeterquam dato, nam si statim a febris initio dederit, postquam purgatus est, febris terpetit, & rursus medicamentum opus habet. at si os non afficiatur, uerum ad intum. ventrem tormen irruat, pharmacum deorsum purgans bibendum dato, & postea lac alinum, aut serum, aut aliquem succum, si uero debilis fuerit, per clysterem cluito. ante medicamentum uero potionem si quis febrat, danda est ipsi aqua multa a quola, altera autem die, qua febris detinet, aquam frigidam, quantum bibere uolet dabis, ubi uero remiserit febris, pisanum succum, aut milium tenue sorbeat, & uinum album, neque doratum, aquosum bibat. si uero febris neque potu, neque interdiu remittat, quid facient dum sit l. supra de Febre. continua. caeterum illud non est omittendum, quod legitur in l. 4. de mor. pag. 77. n. 25. & ad est. si in homine fuerit aliquid morbo, & ea quae ex caelo ueniunt, incommoda fuerint, & calefaciat hominem, turbatur humor omnis in corpore calefactus, hoc autem uolentia facit. & si purgetur humor, humore illo turbato, secerit quantum eius plusquam commodum est, sedundat, & quemadmodum lac coactum, ac turbatum spumescit, ac secerit, & butyrum in superficie consistit, cum leue sit graue uero, & crassum deorsum. serum lactis medium locum tenet, sic in homine dum turbatur humor, id quod lenissimum est in superficie consistit, & est bilis, secundo loco sanguis, tertio pituita, grauissima autem harum humorum est aqua. his uero ita se habentibus, quilibet pluri mus fuerit, in principio contingente turbatione, deuenit ad locum, ubi plurimus esse possit in turbatione uero, spaciofa capacitate euadente, secretus distrahitur, & calefacit corpus aut aliqua corporis parte firmatus, quod cum alio humore cum quo est in alio loco, dolorem, ac calorem exhibet. ille uero, qui calefactus est locus, reliquum quidem corpus calefacit, & ex hoc febris oboritur, & oboritur magis a bile, & pituita & sanguine, calidissimi enim hi humores existunt. ab aqua uero non ualde febris oboritur, neque diuturna, nam igni non bonum alimentum aqua prebet, sic scriptum est de bile, & sanguine, sed potissimum de bile, ut pote quae sit febris causa materialis potissima.

Causae.

CAUSUS est febris ardens, & est duplex alter exquisitus, alter nothus. sit, ut scribit Hipp. l. de uict. ratione comm. 4. par. 1. cum ueniat tempore aestiuo caliccate acres, & biliosos, quos tenues.

tenues sint trahunt ad se humiditates, quas ichoras vocant. sic in lib. 1. de mor. scribit. n. 27. cum bilis commota fuerit per corpus, & contigerit, ut venæ, & sanguis attrahant bilem, eamque plurimum ex caribus ac ventriculo, ad eum, quæ prius inest, usque cum etiam natura calidissimos sanguis in corpore existat. cum itaque percaluerit ex caribus, & ventriculo supra eum, quia in, est adhuc magis à bile percalfacit etiam reliquum corpus, & quædam sanæ partes præ multa humiditate penitus resiccant, non possuntque iterum resiccatæ fuerint; homo moritur. extremæ vero corporis partes ut pote natura siccæ, resiccantur, & plurima humiditas ex ipsis occidit: & si ipsas congeruerit, frigidas compertis, ac siccas, quapropter hi, qui à febre ardente corripuntur, inter nunc quidem partibus à febre exarantur, externis autem frigidi sunt, & lingua, & fauces ab interno spiritu, ac caliditate exasperantur, & arefcunt quantum autem in ventriculo, & in vesica inest bilis, quod quidem in ventriculo est, aliquando deorsum excurbat, plerumque vero in primis diebus vomitur, aut in quatuor, aut quinque. vomitur autem hac de causa cum superius ventriculus supercalafactus fuerit, attrahit in se ipsum, & sic vomitur: & ob hoc etiam est febre ardente, & ex pleuritide, ad peripneumoniā maxime morbi transmutantur: ubi enim superius ventriculus supercalafactus fuerit, trahit in se ipsum, & suscipit pulmo, & fit peripneumonia, & pleurisque pereunt, minitum debiles iam existentes, morbo alio nouo in super generato, dies transigere nequeunt, donec spiritum in pulmone concoquantur. verum ut plurimum pereunt præ debilitate, aliqui tamen evadunt, at quibus in vesicâ conluit quid bilis, his crassa urina mingitur, crassa autem à pituita. bilis vero alui egestio prodit, eo quod combusta sint ea, quæ sunt in ventre.

Causam autem recenset Hip. in loco dicto de morbis acutis par. 3. & inquit si ex magna parte ob longam sitim & in lib. de aere, & c. n. 11. senioribus sunt febres ardentes ob venteris duritiem. humor autem, ut dictum est, bilis, & pituita, eam scribit Hipp. in libro 1. de mor. n. 37. febres ardentes corripit item pituitosus.

Signa porro demonstrantia febrem acutam exquisitam explicat Hip. in li. de Vict. ratione dicto, par. 4. commenta. his verbis. si & lingua aspera, sicca, & ualde nigra, utrisque morbus dolet, & deiectionesque liquide & palide sunt, urgetque sitis vehemens, & vigilie, febres interdum mentis alienatio, & par. 3. febres vehemens habet, hoc est, quæ multam, & acerrimam habet qualitatem, propter na-

turam tenuium humiditatum, corpusque veluti ab olearia lassitudine habitum labor, doletque propter tenuium acrimoniam, ut ibi ait Gal. & propterea exquisita febris ardens fieri viderat à bile, non à uero à bile, & pituita, quoniam accidentia sunt remissiora, nam in prædicto com. 4. par. 13. inquit Hip. causi generis aliud, hoc est nonnullum aliud solutissimis magna, aspera sicca, salia, utrinque defecit, vigiliæ, & refrigerata extrema.

Signa prognostica habentur in libro 4. aph. 58. cuius verba sunt. à febre ardente habito rigore superueniente solutio. & in lib. 1. pror. par. 18. si in ardente febre autem sonitus caliginis fuerit provenientque in nartibus gratias mæie ex melancholia aberrant. & in lib. 2. par. 35. dolor pectoris firmatus, & ægre suscipibilis cum in corpore malus, super febrientis huius acute ardent moriuntur. & par. 48. in ardentibus febribus cum aliquid perficitione & deiectionibus aequale bilis multumque, oculorum peruersio, signum malum tum aliis, tum si catochi fiant, & lib. 1. par. 7. qui in hypocondrio refrigerata febre ardore reliquitur tum aliis, tum in sudoribus mali sunt. & in lib. de Coacis præno. n. 2. in febre ardente si alius eruperit mortale, ex alui dolore laboriose febres ardentes perniciosa. tremores in febribus ardentibus mentis percussio soluit. in febre ardente fluxio sanguinis ex naribus quarta die mala est, si non aliud quid boni conciderit. verum quoniam minus periculosa, quæ febribus ardentibus aliquantulum perfrigerantibus cum egestionibus alui aequis, ac biliosis laborant oculis malum est, tum aliis, tum si stupidi fiant. febris ardens rigore super accedente soluitur, febres ardentes recidivare solent, & ubi per dies quatuor significationem de se præbuerint, postea exdant, si non in septima die, febres ardentes quatuordecim dies diutius, aut alleuant, aut perimentes, ex febre ardente abiectione purulenta circa autem non sentit, non valde levatur, & postea inquit, soporosis ab initio exadentes vixit concoctus ardentes. verum citra iudicacionem per perfrigerationem, & breui rursus ardentes torpidi soporosis, conspici perniciosa habent, & in lib. 4. aphor. 54. quibus plurimum sicce riles leuiter irritantes in febribus ardentibus sunt, non enultum sit infestantur, causam vero cur si moriantur qui febre ardenti laborant, moriantur, narrat Hippocret. in lib. 1. de mor. nume. 30. & inquit, quoniamque ex febre dente moriuntur, oes præ fixitate moriuntur, & resiccantur primum quidem extremæ ipsorum partes, manus, ac pedes deinde partes liciores. ubi autem humiditas ex corpore penitus exusta, & resiccata fuerit,

sanguis quidem congelatur penitus, ac perfri-
getur: reliquum vero corpus efficitur, ac
sic homo moritur. Quo autem tempore anni
magis febres ardentibus fiunt, declarat Hip. in
lib. 2. de mor. pop. sect. 1. his verbis. febres
ardentes in aestibus magis fiunt, & in aliis tem-
poribus: sed refectus aut magis estate.

Sed curam agrediamur. febrem ardentem
exquisita hoc pacto curat Hip. in lib. de Vict.
ratione in mor. acu. com. 4. par. 5. a. buic aque,
mulsaque coctæ, & aquosæ quantum voluerit
bibendum dabis, quod si os amarum fuerit,
vomere confert, & ventrem subluere. verum
si ad hæc non aperiatur, lactæ asinæ cocto por-
gabis, salsum autem nihil, neque acie exhiben-
dum, non enim descendet, forbitio nem verò
nisi dies iudicatorij transierint non dabis, & si
de naribus fluxerit sanguis, soluitur ægritudo,
atque si sudores superuenerint iudicium le-
giimum cum urinis albis crassisque, & leuibus
subidentis, & si abscessus aliquis factus fue-
rit. verum si absque his soluat reuoluetur
ægritudo, vel crux, vel crus dolebit, expue-
tque crassa, si sanus est futurus. febrem verò ar-
dentem non exquisitam, sed notham sic curat
par. 17. causus hic, nisi sanguis de naribus fluxe-
rit, vel circa collum abscessus fiat, vel crus do-
luerit, & æger sputa crassa excreauerit, hæc au-
tem adstricta alio sunt, vel coxæ dolor, vel pu-
dendi liuor superuenerit non indicatur. testis
quoque intensus iudicatorius existit, forbitio-
nes dato attractorias, hoc tandem curetur fe-
bris ardens huiusmodi instrumentis cum quibus
curantur morbi acuti, propterea quod & ipsa
est morbus acutus.

Febres ardentes.

DE Febre ardenti, quamuis autem scrip-
tum sit in cap. de Caulo, tamen illi parti hæc
pauca addemus, quæ ex libro. 3. de morb. pag.
70. n. 1. tradidimus. verba autem hæc sunt. fe-
bris tenet, & sitis uehemens, & lingua aspera,
& nigra, & cum virore pallida, & sicca uehe-
menter rubicunda, & oculi cum virore palli-
di sunt. & excrementum egerit rubicundum,
& cum virore pallidum. talem quonque urinam
mihi, & multum spiritus. sæpe transmutatur
ueluti ad peripneumoniam, & delyrat. ex qua
te cognouerit, quod peripneumonia sit. hic si
quidem peripneumonicus fiat, & quatuordecim
dies transgrediatur, sanus sit. si uero in de-
cem, & octo diebus peripneumonicus fiat,
quomodo sit curandus ibi L. Et in l. de Affec-
pag. 80. n. 1. febris ardens, siue canos cum
habuerit, febris desinet, & sitis fortis, & lin-
gua aspera, ac nigra si a spiritus caliditate, &
color subbiliosus sit, & sputa biliosa, æger ex-

trinsecus frigidus sit. intrinsecus uero inde
calidos.

Prognostica autem sunt hæc. leguntur in l. de
Coac. præno. pag. 137. col. 2. quibus cum fe-
bre ardente tumores somnolenti torpidi fiunt,
his dolor in latera superueniens leuis sydetar-
tionis, & resolutionis modo occidit. & pag.
170. in febre ardente si alius eruperit, mortale
est. Et, febris ardens ex alui dolore laboriosa
perniciosa. Et, in febribus ardentibus si aurum
ionitus accedant cum uisus hebetudine, & gra-
uitate secundum nates melancholico modo
ab acta bile mente moventur sanguine ipsius
non erumpente: Et iremores in febribus ar-
dentibus mentis periculosus soluit. Et in febri-
bus ardentibus fluxio sanguinis ex naribus
quarta die malum. mala est si non aliud quid
boni coinciderit. uerum quinta minus pericu-
losa. & qui ex febribus ardentibus alui aquo-
sis, ac biliosis laborant, ocula malum est, tū
aliam, tum si stupidi fiant. & febris ardens rigore
superaccedente se soluitur. & ibidem, febres
ardentes recidiant solent. & ubi per dies qua-
tuor significationem de se prebuerint, postea
exudant. si non minus septima die. & subdit, fe-
bres ardentes quatuordecim dies diiudicant
aut alleuant, aut perimunt. & ex febre ar-
dente abscessus purulento circa aurem non sien-
te non ualde seruatur. pag. 177. abscessus lux-
te aurem ex acuris morbis maxime in febri-
bus ardentibus fuit, & si non iudicationem
fecerint, & murescant, aut sanguis ex naribus
fluxerit, aut urinx subfidentis crassam habue-
rint, ægri pereunt alia uero ibi leg. Huic con-
ducit frige facientia adhibere, & ad alnum, &
forinsecus ad corpus canendo ne inhotrescat
positiones quoque ac forbitiones dande sunt
frequentes, & paulatim, quoniam frigidissime
uenter autem curetur. & si quidem non subeat
quæ insunt, infusa frigidissima per Clysterem
imitantur, aut quouide, aut alterius diebus
hic autem morbus si a bile commota si intra
corpus firmata fuerit, solet etiam in peripneu-
moniam transire. indicatur autem brevissimu-
s quidem nona, aut decima die. longissi-
mus autem decimaquarta. & si quidem tran-
sierit in peripneumoniam, pauci effugiunt,
atque hi morbi acuti uocantur.

Et oportet hoc sic curare. in libr. de
loc. homi. pag. 39. cum uero gracilem existē-
tem febrem urati manifestum est, quod non pro-
pter corporis tumorem febris occupat, & si
non celsa in urere oportet, ac tumidum face-
re. & si neque sic conducit, palam est quod
non oportuerit febrem inducere. hæc itaque
medicamentum potare oportet, quod educat:
qua febris parte magis hæret, siue superne siue
inferne. & si quidem luperne hæreat, super a ea

Febres pestilentes.

Febres pestilentes, ut placet Gale. vocantur ab Hip. pemphingodes, aspectu terribiles: manui mordaces, ut in lib. 6. mor. pop. sec. 1. haec dat Hip. febri diuisione: febres alię mordaces sunt manui, alię mites, alię nō mordaces, sed post insurgentes, alię uerō acutę, sed quę à manu uincuntur, alię statim percurrentes, alię in totum debiles, alię mites, alię saluati uos, alię pemphingodes, aspectu terribiles, alię tunc humectę, alię ualde rubrę, alię ualde pallidę alię ualde liuidę, & id genus alię.

Febres diuturna siue longa.

Febres diuturnę pueris, senioribus, & ad pubertatem accedentibus fiunt, ut scribitur in lib. 1. aph. sect. 3. par. 27. Et in lib. de Iudica. u. 8. febres diuturnę signa sunt in manibus palpitantes, aut breues iudicationes in deterius. & in lib. de Coac. p. 1. num. 4. febrem diuturnam uriga cruenta in principio micta significat turbata, cum sudore reciduiam. & num. 3. Eiusdem lib. in febribus iudicationes impeditę, ac sublata temporis quidem diuturna iram inducunt, non autem perniciose fiunt, & in lib. aphor. sect. 3. par. 16. febres longę in pluiarum multitudine plerunque fiunt. & in lib. p. 1. num. 24. quęcunque febres longio rem morā traxerit, homine aliquo ad salutem disposito, ita ut neque dolor ob inflammationem, neque aliquid aliam manifestam causam; huius abscessum expectare oportet cum tumore, ac dolore ad aliquem articulum, uel maxime inferum. & in lib. de Victus ratio. in morb. acu. solent autem longę hęc fieri febres: & imperuicinos humorum de loco, ad locum illapsus habere, si quidem inferas partes frigida fuerint circa artres, & colum. cetera uerō ibi lege. & in lib. de Coac. p. 1. num. 4. in febribus longis tunc erroris, tunc tenuium mictiones plenitudo fiunt. Et in lib. aphor. sect. 4. par. 44. quibus febres longę his tubercula ad articulos, aut dolores fiunt. Et in eodem lib. sec. 7. par. 63. etiam parcellulud. & in lib. de Coac. p. 1. num. 1. in febribus longis, aut tubercula, aut dolores in articulis fiunt. & si facti fuerint, non sunt inutiles. & in lib. aph. sect. 5. par. 64. lac in febribus longis conuenit.

Febres uehement.

Legitur in lib. 7. de morb. pop. num. 5. Theodori uxor in febre uehementi sanguinis eructio facta est hyeme. reliqua ibi lege. & in 3.

sect. 1. Aegro. 2. Hemocratem, qui ad Nouum murum decumbat febris uehemens corripuit, caput autem dolere caput, & lumbos, & in 1. sectio. 3. Aegro. 7. Meronem febris uehemens corripuit, lumborum grauitas dolorosa alia uerō ibi lege. & in lib. de Coac. p. 1. num. 2. febris uehemens, & delirium ex dentis corruptione letalis est. Scribitur in lib. aphor. sect. 4. par. 54. febres fortiores fiunt, quibus circa dentes in febribus alicosa adherent. Et in lib. de Medi. purg. p. 41. num. 4. in febribus fortioribus bile à medicamento commota, æger neque bibens, neque forbens plerumque perit. & ibidem, febre correptus, si prima die qua medicamentum sumpsit superflus maneat, & uia com purgatione remittat febri sanus fit. & ibidem num. 5. à febris forti correptus, si detinet medicamentum, ante meridiem nihil purgatur, à meridie uerō nimium purgatur, & perit. Et in lib. 2. de morb. num. 37. fortis ad contactum febri debilis est, interuallum autem ardet, & lingua ipsius aspera fit, & per os, & per nates calida spirat. reliqua ibi lege. Et lib. de Afectio. num. 13. in febre fortis per superiora, aut inferiora purgatio. & in lib. de Medi. purg. pag. 41. num. 4. febribus fortibus correptis medicamenta purgatoria dare non oportet, donec remissio febri: carnes enim ipsorum & uentres cum sint calidi, medicamentum adsumunt, & nihil depurgantur.

Febres Hyberna.

Febres ex hyeme astringunt, uere, & astate facis lege in lib. 2. de morb. pop. sect. 3. & in lib. 7. de morb. pop. num. 10. Hermotopoli uxor hyemis tempore febri, & capitis dolores, alia ibi leg. & in lib. de Victus ratione in morb. acu. num. 48. si in febre hyberna lingua aspera fiat, & animi deliquia adsint, talis missio febri contingere solet. & in lib. de Afectio. uo. 1. 1. febri hyemalium in acutas transitus fit, cum duo humores, bilis uidelicet, & pituita commoti ac inter se coacti parti alteri ubicunque tamen contingerit allabuntur. Et ibidem, febrium hyemalium siue ex uino, siue ex lassitudine, siue ex aliqua fiant causa obseruatio, & rutela quam ibi lege.

Febres uertiginosa.

Febres uertiginosę cum uolantibus, & sine uolantibus perniciose, ut patet in lib. de Coacis p. 1. num. 3. & in lib. de Victus ratione in mor. acutis, num. 44. quibus in febribus uertiginosibus ab initio, & capitis pulsus fiunt, & urinae tenues, in his expectare oportet, ut ad iudicationes

nones febris febris exacerbat, nec verò ad-
mitat, si delyrasset.

H. *Tertiana febris.*

Scipiam est in lib. de Affect. pag. 8 t. n. 7.
& 18. morbi, qui in plase sunt, licet fieri solent.
cum corpus a sole fuerit calefactum; hume-
ctatur, humectatum autem egrotat, aut totum,
aut ea parte, in quam pituita, & bilis incum-
buerunt, si quidem igitur quis ipso incipien-
tes, cures; neque longi sunt, neque periculo-
si, si verò non cures, aut male cures, & longio-
res sunt, & saepe quoque occidunt, sed & ter-
tiana, & quartanae febres ex talibus fieri solent.
haec morborum constitutio maximè quidem
estate fit, aliquibus verò etiam hyeme, tertiana
febris cum apprehenderit, si quidem vide-
bitur tibi non purgatus esse; quarta die phar-
macum dabo, si verò pharmacum non videbi-
tur opus habere; medicamenta in potu exhi-
beto, quibus febris aut transmutetur, aut de-
ficiat. exhibeto autem velut scriptum est in
medicamentis, & in apprehensione quidè sor-
bitione, & potu nutritio, interposito verò tẽ-
pore, cibis per alium feculentibus, apprehen-
dit autem plerumque non ita sepe, si verò nõ
curetur, in quartanam transire solet, & diu-
turna fieri, aut verò tertiana exquinta cito in-
dicatur, & non est lethalis, vt scribit Hip. in l.
1. de mor. po. sec. 3. Et in l. 4. aph. 59. tertiana
exquinta in septem circuibas, quod tẽpus
lõgissimũ est, indicatur. Et in l. de Coac. præp. n.
1. tertiana exquinta in quinque, aut septem
circuibas, aut ad summam in nouem iudi-
catur. Et in l. 6. de mor. po. sec. 3. quęcunq; ue
tertiane naturam habent, his nox molesta an-
te exacerbationem: quę verò sequitur, tolera-
bilior plerumque est. Et in lib. de Coac. præp. n.
3. si tertia die cohibiti in febre, quarta exacer-
bentur, malũ est, nõ tales exacerbationes
phreniticę sunt. Et in lib. 4. aph. 43. febresq;
non intermittunt si tertia die fortiores fiant,
magisq; periculosę. quocunq; autem modo
intermiserint, periculum abesse significatur.

Quartana febris.

Quartana febris tertianis diuturniores sũt,
quãto pauciores bilis parte participant, unde
caliditas augeat, & propterea q; corpus in ip-
sis plus perfrigidat id quod ab atra bile ipsis
contingit superflua adeo vt ægre frigus de-
pellit possit: atra enim bilis inter omnes cor-
poris humores viscosissima, & sedes diutur-
nissima facit, q; autem quartanę febres atra
bilis participet sunt, vel hinc condiscere licet:
autumno enim maxime homines a quartanis

corripiuntur, & in ætate a quinque, & vigin-
ti annis vsq; ad quadagesimum quintum,
hęc, n. ætas præ omnibus alijs maxime a bile
atra infestatur, & autumnũ tempus omnium
anni temporum ad eandem spiritum est:
quicunq; autem extra hoc tempus, & æta-
tem a quartana corripiuntur, pro certo scire
oportet eam febrem non fore diuturnam nisi
quid aliud grauioris mali hominem infesta-
uerit. hæc Hip. in lib. de natura hom. pag. 11
n. 3. 8. & 29. in quibus probat febrium quar-
tanarũ esse atrũ bilem materiã, in laudat prog-
nosim ait. Quartanę magis sũt his, qui triginta sunt
annorum, & senioribus, signum autẽ quartanę
naturę habetur in l. de Coa. præp. n. 4. hoc est in fe-
brib. nigri vtrina nubeculę quartanę indicat.

Quid verò prælagiendum sit de quartanis, i
scriptum est in lib. 2. de mor. po. sec. 3. his vera
bis, quartana securissima omnium, & facillima,
ac longissima est: non enim solum ipsa æ
se ipsa talis est, sed etiam ab alijs magnis mor-
bis liberat. unde in lib. 6. de mor. po. sec. 6.
quartana correpti a magno morbo non corri-
piuntur: si verò corripiantur prius, & accedat
quartana, liberantur, & propterea in li. 3. aph.
70. a quartanis capere non admodum a comuni-
onibus capiuntur. si verò prius capiuntur, &
quartana superuenient, liberantur. Sed in li. 7.
aph. 3. quartanę sũt plerumq; sunt breues,
autũales verò longę, & maxime quę ad hye-
mẽ pertingunt. Et in li. de Coa. præp. n. 1. quar-
tanę hybernę leniter in acutos morbos tran-
seunt. Et in lib. 6. de mor. po. sec. 2. quartanę
sanguinis est paribus eruptiones egre iudicant.
Et in lib. de Coa. præp. n. 4. in quartanis malę
sunt egestionis valde robur, eruginosę. & ta-
les sanguinis fluxiones soporosę sunt: ex his
conuulsione moriuntur, nigris autem egressis.

Curatio verò legitur in lib. 3. de mor. pag.
67. n. 39. & est hæc: cum febris quartana ex alio
morbo non purgatũ apprehenderit; phar-
macum deorsum purgans bibendum dato de
inde caput purgato, postea rursus infra purga-
to. si verò his factis nõ cesserint repositi duab;
bus inuasiõibus post purgationem infernã,
multa calida ipsum lauari, & seminis hyo-
scyami milij magnitudine, & mädtagore tan-
tundę, & succi tilij triũ fabarũ magnitudi-
nẽ & trifolij tantundem in vino meraco bi-
bat, at, si firmum & sanum se esse putans ex
lassitudine, aut profusione febre correptus
ad quartanam deueniat, sementis ipsi adhibi-
tis alitũ dato, in melle tinctũ, deinde keticulę
decoctũ bibat, melle, & aceto misis, postquã
autem repletus fuerit, vomat: postea calida lo-
tus vbi frigidus factus fuerit, cyconẽ ex aqua
bibat, vel pericibis mollibus, & nõ multis vta-
tur. altera verò exacerbatiõẽ, vbi multæ calida

laueris, & stragula ipsi integeris, donec exa-
det, statim verari albi radices trium digito-
rum, longitudine, & trifolij drachmam, &
succu silphij duarum fabarum magnitudinem
in viomeraco bibat. & si vomitiones ipsum
vserint; vomat: sin minus; similiter post ca-
put purgatum. cibis autem vtatur quam mol-
lissimis, & acerrimis. cum vero exacerbatio
ipsum inuasit; leiuosus medicamentum ne
bibat. Et in lib. de affectu. n. 19. si verò quarta-
na apprehenderit, si quidem impurgatus fue-
rit; primum caput purgato: & interpositis tri-
bus, vel quatuor diebus pharmacum sursum
versus purgans dato in ipsa apprehensione. si
vero ex his non sedetur; rursus interpositis
diebus, multa calida lauato, & pharmaca, quæ
scripta sunt dato. potibus autem, & forbitio-
nibus, & reliqua dicta vtendum est velut in
tertiana. apprehendit autem hæc febris pluri-
mos multo tempore, alios verò pauco. & sit
tum tertiana, tum quartana a bile, & pituita.
Cur autē tertiana, & quartana alibi à me scrip-
tum est. vim porro habet medicamenta in his
febris, vt potis his corpus in loco sit, in con-
sueti caliditate, & frigiditate: & neque præ-
ter naturam calefat, neque frigefiat. danda
sunt autē velut scriptum est in medicamenta-
rio libro. Sed in lib. de loc. in ho. pag. 32. uu.
38. Febris perfrigeranda est, præter quam si
quartana existat. In l. autem 7. de mor. po. pa.
149. nume. 24. Quæsiat autē circa autumnum
lippitudo: postea verò febris quartana.
Incipiente quartana cibos valde auersaba-
tur: in progressu verò libenter accipiebat.
Et in libr. 6. de morb. popul. sect. 6. post pilo-
rum defluuium quartana febris non vltra au-
num. & in l. 4. pag. 137. n. 5. post pleiadum oc-
casum seruus Attici à quartana correptus stu-
pidus sedatus est. Et in lib. 3. sec. 3. pag. 134. au-
tumno, & sob pleiada rursus multi morieban-
tur quartanarij. at verò in lib. prog. comm. 3.
par. 7. quartanæ conditio ex eodem ordine
est scilicet tertianarum: nam vt exponit Gal.
in com. quartanæ febris iudicationes ex nu-
mero circuituum accidunt, & non dierum,
quemadmodum tertianæ.

*De febris, quas varia comitantur
symptomata.*

Febri, quæ post capitis affectum fiat, vel an
recedat, vel comitetur, mentio fit his in locis.
scribitur in lib. 1. de mor. pop. sect. 3. ægro. 10.
Febris vehemens contripuit, dolebat autem ca-
put, collum, lumbos ab initio. & in lib. de iudica-
tione. nume. 2. Quibus in febre capitis dolor,
& alia signa circumsunt, in his bilis domina-
tur. Et in lib. 1. de morb. popul. sect. 3. ægro. 14.

Melidiz, quæ decumbebat iuxta Iononis tem-
plum, capitis, & colli, & pectoris dolor fortis
cepit, statim autem febris acuta contripuit. Et
in lib. 3. eiusdem lib. sect. 1. ægro. 2. Hermo-
cratem qui ad Nouum murum decumbebat
febris vehemens contripuit, cepit autem do-
lere caput, & lumbos. Et in lib. sect. 7. par. 5. 1.
quibuscuque sanis derepente dolores fiunt
in capite, & statim voce intercepta iacent, ac
stertunt, & in septem diebus pereunt, si non
febris apprehendat. Et ibidem par. 50. quibus
cerebrum dissectum fuerit his necesse est fe-
brem, & bilis vomitum accedere. Et in lib. 2.
predic. uu. 23. febrem in capitis valnere in-
tercipere quarta die, aut septima, aut vndeci-
ma lethale est. alia verò ibi lego. Et lib. de capi-
tulo. nu. 28. febre innascente ex capitis vlce-
re, quid faciendum ibi lege. & in lib. de loc. in
hom. uu. 44. febricitanti caput ne purgato, vt
ne furiosus fiat, reliqua ibi lego.

Febris cum affectibus aurium. ait Hipp. in
lib. 7. de mor. pop. nu. 5. Cydij filio circa solsti-
tium hybernium rigor, & febris, & aures dex-
træ dolor, & capitis dolor, reliqua ibi lege. Et
in lib. de iudi. nu. 1. 1. Quibus in febris auri-
res obduerunt, his non solum febre infanti
re necesse est. soluit autem sanguis è naribus
erumpens, aut alius biliosus egerens, aut dys-
senteria accedens, aut coarum, aut genium
dolor. Et in lib. aphor. sect. 4. par. 60. quibus
in febris aures obduerunt, his sanguis
è naribus effusus, aut alius extrusata mor-
bum soluit.

Febris in affectionibus colli. scribitur in li-
de Coac. præno. uu. 2. in omni febre malum
est colli dolor, pessimum autem in his, qui-
bus timor est, vt etiam infantes. Et in libr. æ-
phor. sect. 4. par. 3. si à febre occupato collis
repente obuersum fuerit, & vix deglutire poi-
uerit tumorem non existente, lethale est. Et in
lib. 1. predic. uu. 9. colli dolor malum quidem
in omni febre, pessimum autem his, quibus ti-
mor est, vt infantes.

Febris cum affectibus præcordiorum. Scri-
bitur in li. de Coac. præno. nu. 1. febris ex præ-
cordiorum dolore malignæ sunt, sopor in
his pessimus. Et in eodem lib. 4. febris dolo-
res circa præcordia absque inflammatione
soluit. Et nu. 3. in febre malus est dolor in p-
ctus firmatus torpore. & uu. 2. in febre dolo-
res ad præcordia exilientes, siue febre solu-
ti maligni. his ad coxendices dolores fiunt.
& ipsis vna cum febre ardente alius deorsum
erumpens perniciosus est. Et ibidem.
in febre ad præcordia dolores voce interce-
pta, siue sudore soluti, malum est, quibus
derepente dum siue febre sunt, præcordij, &
oris ventriculi dolor, & circa crura, ac infen-

nas partes, & alius in tumorem eleuata est. longè enim & vehemens febris sunt, & tules, & spiritus, & singultus sunt &c. Et in lib. prædic. uu. 7. febris ex præcordiorum dolore malignè sunt. Et in lib. de Victus ratione in morbo. acut. uu. 5. Quibusunque febres anxiosæ sunt, & quæ præcordia intendent, & de cubentibus in eodem loco decubitus non sustinent, & extremæ partes perfrigerantur, hi plurima omnino diligentia, & custodia opus habent.

Febris cum affectibus vocis. Inquit Hip. in lib. 1. prædic. uu. 12. quibus voces cum febribus deficientes post iudicationem; hi tremētes, ac soporosi moriuntur. Et lib. de Vict. ratione in mor. acut. uu. 50. cum febricitanti de cima quarta die vocis interceptio accesserit, non cito soludo contingere solet, neque liberatio à morbo fieri, sed temporis diuturnitatem tali significat. Et in lib. de Coac. præno. uu. 2. in febre vocis interceptiones conuulsorio modo fientes ad mentis emotionem cum silentio deueniunt. Et ibidem, cum febre vox deficiat, & cum iudicatione intercepta, hi tremuli moriuntur.

Febris cum alio affectu scribitur in lib. de Coac. prænotio. uu. 1. in febribus inflata alio statum non erumpere malum. Et in lib. 1. de morbo. uu. 6. febrienti aut vulnerato alius resificata malum. Et in lib. de Coac. præno. uu. 4. vna cum febre alius turbata sanguinosa modo, soporoso, torpidus non valde comitatur. Et in eodem lib. in 1. febris amburentes ad manum torpidæ, siticulis, anxiosæ, in his al-

uo suppressa graui exoluantur.

Febris cum affectionibus lateris, legitur in lib. de Coac. præno. uu. 3. cum febre diuturna lateris dolor, puris educationem fore significat. Et in lib. 7. de mor. pop. uu. 47. Metu circæ plejadum occasum febribus, lateris sinistri dolor vsque ad clauiculam, cætera ibi lege. Et in lib. de Coac. præno. uu. 3. in febribus iuxta lateris dolores consistentes citra notias, venæ sectione, siue cibum auerferur eger siue præcordium sublime habuerit, &c.

Febres cum affectibus glandularum coniunctæ, febres omnes ex glandularum tumores malè sunt. & febris ex glandularum copiosa fluxione legitur in lib. de Glan. uum. 2.

Febris cum icteritia, quibus in febribus morbus regius sit ante septimum diem mali, ut patet in lib. 4. aph. 62. ar. verò aph. 64. quibus in febribus septimo, vel nono, vel vndecimo, vel quartodecimo morbus regius succedit, bonum, nisi dextrum hypochondrium durum fuerit: si verò non, malum, i. non bonum. Et in lib. de Iudic. 3. deficiente febre ardente si accedat morbus regius, non solet amplius exudare, neque vsquam alibi abscessum facere, sed sanus fit.

Febris in affectibus crurum scribitur in lib. de Vict. ratione in mor. acut. uu. 49. quibus in febribus crura sunt tuberculosa, & hæc tubercula moram trahentia non mirantur, febribus persequantibus, &c. talibus sanguis & naris fluere solet. si quidem malus fluxerit, solutionem morbi significat: sin minus, morbum longum.

FINIS

8

ORIBASII SYNOPSIS ADEVSTACHIVM FILIVM,

De Febribus Liber.



De signis, quæ ab urina sumuntur.
Cap. Primum.



FEBRIVM dilatium proprium, & inseparabile signum est urinarum in primo die concoctionis & caloris suavitatis post primam vero febris solutionem certiore earum cognitionem habebis: in hac enim

motus arteriarum ei motus, qui fuit in secunda valetudine, est omnino similis: cum nulla ex alijs febribus ad naturalem statum revertatur: maximum quoque inditium est, cum æger facile fert. His febribus opportuni sunt, in quorum corpore quod transpirat, non balneosum, sed acre, ac veluti fumosum est: huiusmodi sunt, quorum calida est natura, atque sicca, & ad summam, biliosa. Qui igitur ex lassitudine in febrem inciderunt, pingunt, & molliter sunt perfricandi, & ad balneum ducendi. Qui ex siccitate, minus fricandi sunt illi quidem, sed laudari sunt liberalius. Qui ex curis, mororibus, vigiliis, atque ira febricitant, non sæpe laudandi, sed multo oleo tepido, cui minime adstringens vis iussit, fricandi paululum, & ex consuetudine laudandi. Qui vero exustione febricitant, protius ab initio refrigerantibus curandi sunt, & cre-

brius laudandi, minime tamen eis largo oleo, & frictio est opus: sunt autem refrigerantia rosaceum, & omphacium salis experta: eadem vero refrigerantia sincipiti vehementer oportet infundere, & cum febris inclinaverit, lavare: si quis vero ex frigore febrim contraxerit, is etiam in declinatione laudandus erit, si vero febris, & destillatione, grauedineque vexetur, prius quam hæc concocta sint, laudandus non est: at qui propter visum febricitant, si vel cum hæc ad sint, lauari debent. A balneo vero amborum capita ipsidem madefacienda sunt: atque eorum quidem quibus visio febrim attulit, refrigerantibus, sijs vero, quibus frigus, calescentibus, quæ sint mediocria, quale est trivium, & uardium unguentum. Quibus vero meatuum conspissatio febrem excitavit, ijs balnea dulcium aquarum, temperatarum conueniunt: tum frictio rarefaciens, & exercitationes, & visus succis dulcibus procreandis idoneus. Qui vero ob inediam febris correpti sunt, eos ubi prima accessio remiserit, in balneum perducere, & plurimo oleo repente perfundere, tum mitissime fricabis, & diutissime in calida solij aqua detinebis: simulatque exierint, seque recollecterint, in balneum introducendi sunt deinde aqua calida potui danda, mox pnsang cremor offerendus, quandoque etiam lactuca, & pisces, qui molli carne sunt, ex albo iure omnium autem communis visus species esto, quæ bovis succi sit, & quæ facile concoquatur, & quæ uisquam meatibus inhebeat. Viuum dandum quod

tum aspectu, tum viribus sit aquosum. In primo autem accessione insolito nonnulla horum quandoque notanda sunt in ijs, in quibus corporis intemperies ad calidam; siccumque conuersa febris gignit. Qui vero ex bonioribus febriunt, ij ne medicum quidem interrogant, quid facio opus sit, sed vlceri, à quo excutatus est bubo, prospicientes; ubi accessio declinauerit, lauantur; ijs vinum circuncidendum est, donec bubo fuerit solutus: suntque tenuiori victu nutriendi.

Ex Galeno de putridarum febrium notis.
Cap. II.

Putridarum febrium notę sunt hæc: vt nulla causa euidentis præcellerit, vt neque à rigore febris inceperit, neque ab æstus, neque frigore vehementi præcedenti, id quod non secus est putridarum febrium proprium quam etiam pulsuum depressio: sic enim nominant, cum incipiente accessione pulsus admodum exigui, & inæuales sunt: quod quidem est, huiusmodi febrium proprium vel maxime: porro caloris qualitas maxima est putridarum febrium nota: ita enim signosa est, vt vel tactum erodet, maxime vero proprium huiusmodi febrium est vrinę crudas, & offensa concoctio: magnum vero, & notabile concoctionis indicium in vrinis nūquam in hisce febribus apparetur.

Cursus febrium putridarum.
Cap. III.

Ergo si vires eius, qui ex putredine febricitat, valetres fuerint, mittendus statim sanguis est: si cruditas vorticis non sit, vires sint infirmę, & a velle prohibeat, non erit incidenda vena: corpore euacuato patria per vrinam, aluum, & sudores expurganda sunt; sin autem sponte sua non nunquam ad ventriculum impetu ferantur, etiam per vomitum: alioquin non sunt præter naturam irritanda. Materię autem deligi debent huiusmodi, quę non valde calefaciendo, & siccando prædictas euacuationes perficiant: cuiusmodi sunt pistillę æneę, aqua molla, ozymel, apomel, & apij radix: si alius non deiecit, clistere de aqua molla cum oleo ciebitur. Totum vero corpus, prius quam euacuatum sit, rascificare non oportet: ubi fuerit euacuatum, licebit rascificare medicamento, quod repidum calorem ha-

beat, quale est, quod ex chamæmelo conficitur. Hoc etiam tempore vinum aquosum potui datum omnes excretiones mouet: itemque balneum aque dulcis temperaturum. Verum cum febris magnitudo obsteret, tum neque vino, neque lauacro, neque vactione rarefaciente vtendum erit; sed aqua frigida in his febribus potui data est accommodatissima, nisi etiam aliquid huius vsum impediatur: ergo si omnes vires robultę sint, febriſque ardentissima, & euidentia signa concoctionis appareant, frigidam cum fiducia dabis: ad huc vero si bonę habitudinis homo sit, calidaque, & sicca sit constitutio, etiam si in frigidam nationem hunc dimiseris, nihil lędes: si autem mediocritas sit febris, vireſque inualide, vnā cum signis concoctionis, & balneum, & vini potio, & omnes vactiones rarefacientes ijs profuant.

Signa tertiana. Cap. IIII.

Tertiana febris cum ex motu fluxus bilis exoritur, statim ab initio rigorem non paruum inferre: differt autem à rigore quartanę, quod pungere, & conuulnere cutim videatur: in quartanis autem accessione ingreſſio uehementiorem persfrictionem habet: quotidianas verò non rigor præcedit, sed corpus modo perfrigeratur. In tertianis autem est etiam exquisitis ordo pulsuum: eaque in stato sitim uehementem affert, atque hominem exurit, & paulo post consistit, calorque per omnes partes æqualiter diffunditur, si manum inijcias, primo contactu calor copiosus, & acer, ac veluti cum aapore quodam elatus, occurrit sed paulo post à manu vincitur. Cum vero ingereribit, statim copia vaporis calidi ex cute prodit, quę sudores futuros nunciat, vomitus fluxus bilis apparet, alui soluitur: biliosa per vrinam excreantur: præterea ad integritatem febris peruenit, ubi tempus accessionis non plurius, quam duodecim horarum compleuerit: ergo quę duodecim horis terminatur, exquę sitam tertianam nominamus: quę vero diuturniorem accessionem habet, eam simpliciter uocabulo tertianam appellamus, atque accessionem habet longissime productam, & exiguum interuallum intercedit; ea tertiana extensa uocabatur.

TERTIANA febris exquisita, vt pote quæ à stana bili procreetur, humectanda, & refrigeranda est. quodque in ventrem insinuat, vomitibus; quod ad inferiora vergit, alui excretionibus euacuandum. & item per vias, atque sudorem educendum. alius igitur mollibus clysteribus cienda est, vrina vero potionibus, in quibus apium, & anethum maduerint prouocanda. Si quæ signa concoctionis appareant, cōfidenter ablinthium dabis. Balnea profunt ex aqua calida potabili, in quibus neque nitrum, neque sal, neque sinapi, sint inspersa, sed oleo maxime calido infuso æger est in balneum dandus. Qui balneis valde oblectantur; eos etiam si bis laueris, non errabis. Si vero signa concoctionis morbi se se ostendant, etiam si sæpius laueris, nihil delinques. A vino autem, prius quam morbus concoquatur, omnino abstinendum, vbi vero concoqui ceperit, tenue, dilutam, & modicum ab initio dandum. cibi, quicunque humectant, & refrigerant, accommodati sunt porro à melle, sinapi, fassamentis atque acris omnibus, & à vinis natura calidis abstinere ægrum oportet.

Tertiana nocte curatio.

Cap. VI.

IN noctis hisce febribus in initio lauare non expedit: sed cum iam coctinnis signa se nobis offerant; neque cibis est quotidie dandus, sed alternis diebus satis est. Quies & situs præcordiorum, & sorbitiones concoctu faciles, & clysteres non admodum molles iuuant. Si vero sanguinis mifione opus sit, ne hæc quidem erit omittenda. Si autem tota victus ratio, non quæ refrigeret, humectetque, sed etiam modis aliquis qui magis calefaciat, atque incidat, adhibeatur. maxime vero conueniet pitissimæ cremor imiecto pipere, vel hyssopum, vel origanum, vel spicam nardi multa aqua infundens, & decoquens potui dabis: itemque alia omnia, quibus vrina cieri potest, præter ea quæ vehementer calefaciant, & exliccant. Maxime vero post septimum diem ablinthij coma danda est, iam oxymel quoque epotum multos lauit; & nonnulla etiam ex ijs, quæ alium leniter subducunt. Vomitus autem à cibo iis, in quibus hæc febris inueterarit, vtilissimus est.

QUARTANA febris cum magna refrigeratione inuadit, vt quæ ex frigido humore atræ bilis originem ducat. Calorem vero, atque feruorem, sicut tertiana, non habet; immo vero neque bilis vomitus eam comitatur. Si præterea vrinæ albæ tenuisquæ sint, quartanæ febris erit. eximium vero quartanæ indicium fuerit pulsus tardus, atque rarus.

Quartana curatio.

Cap. VIII.

QUI febre quartanam habent, leuiter tractandi sunt, eisquæ neque medicamentum vllum vehemens dandum, neque tentanda vacuatio; si non vtrique sanguis redundare videatur: quo casu secanda vena est. Viçtus optimus, & minime inflans instituendus; & venter emolliiri consuevis rebus debet. si nihil hæc proficiant, mollibus clysteribus in principio, deinde vero acrioribus ægetur. Suilla caro ipsi est circuncidenda, itemque omnes cibi glutinosi, quique tarde permancant: & denique omnes, quicunque refrigerant, atque humectant; Vinum conuenit, quod tenue, albumque, & modice calidum est. Salsis & sinapi vel expedit: tum aliquor diebus interpositis modicamentum ex tribus piperebus, aut quod diosporiticum dicitur, sumere. pipere quoque solum ex aqua quotidie recto capitur. Si æger in morbi principio sit, tenniore victu alendus est: statim vero etiam diurnæ quies imperanda: visceribusque prospiciendum est per ea, quæ molliunt, atque relaxant. post vero vtendum erit medicamentis; quæ vrinam cient: siquæ signa coctinnis appareant, tum melancholici humores purgandi sunt: itque non semel tantum, sed etiam sæpius, post validam vero purgationem, medicamentum quod ex viperis constat, dandum erit: & item alia, quæcunque ad huiusmodi febres commendantur, inter quæ est etiam nobis familiare, quod ex cyuensis succo conficitur.

Quotidiana febris signa.

Cap. IX.

QUOTIDIANA vero febris non statim primo die cum rigore inuadit: sed temporis progressu perfrigeratio potius, quam rigor exoritur. ægro vero intus scit, & incrementum diurnum habet.

zgotantes tamen non exurit, neque multum, & crebro trahere spiritum, neque ex ore exsufflare, neque frigidam bibere compellit. Pituitosi vomitus sunt. quæ uero alio exornantur, frigidiora, crudiora, & diluoria in hisce febribus iuuenies. sudores primis diebus non emittuntur, neque ad integritatem veniunt. Calor est ex pallido, & albo mistus. urinae tenues, & albæ: vel crassæ, & turbulente, & rubræ sunt.

Quotidiana curatio. Cap. X.

Quotidianam curantes oximelite primis diebus vitium. itemque iis, quæ mouere valenter vitium possunt. tota vero ratio victus ad incidendum dirigatur, circa statum est habenda ventriculi, & præsertim oris ipsius ratio. deinde ægri iubendum, ut radícula, & cibus assumptis vomant. & ijs, quæ vacuant pituitam; vitantur.

Febrim continuam inditit.

Cap. XI.

Continua febris singulis intermittentibus finitæ dicuntur: ac tertianæ quidam exquisitæ ea quæ exquisita ardens est; quotidianæ ea, quæ singulis diebus habet accessiones, neque ad integritatem redit; sic etiam quartanæ ea, quæ quarto accedit die. Exquisita enim ardens cum alia omnia exquisitæ tertianæ febris iudicia seruet, in hoc solum ab illa differt, quod neque cum rigore inuadit, neque ad integritatem redit. Ea quoque quæ singulis diebus accenditur, omnia signa quotidianarum habet, nisi quod ad integritatem non peruenit. quia in reab ipsa quotidiana, quæ specie consumilis est, discrepat. Præterea quæ quarto quoque die accedit, neque ad integritatem cessat, eiusdem generis est cum quartana. Est ergo febris continua, quæ non prius ad integritatem finitur, quam omnino fuerit soluta. Cuius autem nulla inclinatio appareat, hæc quoque ex ardentium est genere. sed ex eo quod illa acuta est differt.

Continuam febrim curatio.

Cap. XII.

Continuarum febrim curatio est missio sanguinis usque ad animi defectionem. qui si non fuerit missus, qui eam febrem habent, ad extremum periculum deducuntur. Si quid

autem euacuare per venæ sectionem prohibuerit, alijs vtendum est remedijs, quæ aperiant, materię copiam vacuent, & febrium feruorem leniant. Cum vero signa coctionis humorum perspicias, neque in principio particula inflammatio aliqua, aut tumor edematidis, aut scirrhii speciem præ se ferens fuerit, neque particula aliqua adeo frigida, ut noxam ipsa contrahat, audacter aquam frigidam bibendam propinabis, præsertim vero si eger eius assuetus potioni sit.

Ardentium febrim cognitio.

Cap. XIII.

Ardentes febres hæc comitantur, lingua arida, scissa, & nigra, ventriculi morbus, deiectiones pallide, sitis vehemens, vigiliæ, & nunquam delirium.

Ardentium curatio. Cap. XIV.

In febribus ardentibus, si perfecte morbus solui debet, horum alterutrum faciendum est, aut biliosos humores excerni, aut extingui. excernuntur autem aut sudoribus, aut vomitibus, aut per aluum: extinguuntur vero frigide potione, qua uos febres ardentibus ex toto curauimus. Victus autem ardenti laborantibus conueniens non ex aqua sola, neque ex sola mulsa, sed ex diluta mulsa cocta. nam qui hoc morbo conficiuntur, sola potione sunt alendi. Balneum vero ardentem febrem habentibus solum conuenit ijs, qui tumorem inflammationis, aut erysipelatis speciem referentem nullum habent, ac tum maxime conueniet, si coctionis signa appareant. ijs vero qui propter salum succum ardente febre sunt correpti, minime accommodatum est. Sed eos cremore etiam pituitæ nutritie conueniet.

Febrim, quæ ex affectione erysipelas referre originem trahit, curatio.

Cap. XV.

In febribus, quæ ex affectione, quæ erysipelas refert, exoriantur, à balneo est omnino abstinendum. aqua frigida per morbi statum vehementi, hoc est frigidissima vtendum est, in principio non item. Sed refrigerantia foris imponuntur, si quæ nihil hæc inueniunt, etiam intra corpus sumere cogentur. Ijs autem humidæ lactucæ præcipue conueniunt. extrinsecus vero ipse lactucæ succus est accommodandus, itemque temperuuium, & reliqua refrigeran-

tia hoc autem ut præstantissimo vitur, vel maxime humorem alicuius refrigerantis expressum in pilam cum portulaca iniijcimus, deinde his cutibus exprimimus, vasque in aqua gelida statuentes cum usus exigit, parum polentæ tenuis admiscemus: tum in testæ conduplicatum hoc medicamentum innauctum extrinsecus præcordijs admonemus. idque diu adherere uobis sinimus, sed aliud frigidum subinde adhibemus. ceterum huic medicamentum quandoque omphacium, aut rosaceum oleum admiscemus.

Hædicarum febrium cognitio.

Cap. XVI.

Hædica febris non solum in humoribus, spiritibusque, sed etiam in solidis partibus consistit. hæc dolore vacat: quique ea detinentur, se omnino non febricitare existimant. calorem enim non sentiunt, cum particulæ omnes corporis sunt in eis æqualiter calefactæ. Hædicarum sunt duo genera: quorum alterum ardentibus febribus magna ex parte superuenit. quod usque adeo protrahitur, ut tractu temporis madorem corporis cordis, etiam si copiosus adhuc sit, consumat. alterum genus est, quod manente adhuc humore cordis corpus occupans inde accenditur. hæcque est una febrium hædicarum origo nobis exposita. reliqua est, cum ab initio protinus inuadit, primam originem diarij similem sortita ex morore, ira, & lassitudine nimia una cum exultatione contrahitur. Atque has febres haud difficiliter curabimus. Quæ verò ex ipsis ad marcorem perueniunt, sanescere nullo pacto possunt. facillime autem cognoscuntur, nam eorum oculos cruos præter modum videbis, crassiores pituitam siccam ipsi inherentem: squallidam affectionem quandam. vitalis flos coloris euauit. frons sicca est, atque inextincta. conuulsiueque plerumque ut dormitantes: verum affectio non somnus est, sed quia vigilare non possunt. præterea collapsa sunt tempora. nam quid porro aliud præter ossa, cutemque solam habent? hos si nudaueris, & partes ventris inspexeris, profecto in eis neque iustitiam, neque viscera vlla tibi superesse videbuntur. præcordia verò sursum vehementer conuelluntur: enterisque ipsa est ad summum rescicata. pulsus gracilis, durus, & crebor, calor verò primo contractu, languidus, paulo postacer, & erodens ostenditur. Ita sit, ut visquidum aliquid humiditatis superest, hædica sola febris sit, cum vero periclitatur, ne quid præterea huiusce humiditatis reli-

quum sit, tum exquisitus marcor iam effectus est.

Hædicarum febrium curatio.

Cap. XVII.

Qui febrem hædicam habent, statim ab initio nutrirî propter humores erodentes desiderant, maximum vero remedium est victus humidus. oportet igitur cremorem pituitæ, & alij forbitione egrum nutritæ, & panis aliquid adde, eumque potionem, non vehementer, sed moderate frigide curare; cum neque inflammatio aliqua, neque humorum subest putrefactio. Si vero magnam fore noxam coniectura consequeris, à frigide potione abstinendum est, vrendumque ijs remedijs, extrinsecus impolita refrigerandi vim libent. Balua verohuiusmodi egrotis in quocunque tempore coueniunt.

De semitertianis, quæ hemitritici dicuntur.

Cap. XVIII.

Cum tertiana cum rigore, quotidiana vero citra rigorem inuadat, quæ ex his utriusque constat, horrorem asserit, qui rigore quidem est minor, & perfrictione certe maior: quæ res coniunctis inter se extremis efficitur, ex quo sit, ut non immerito huic febri semitertianæ nomen sit impositum. Duplici autem modo gignitur, vel enim duæ accessiones in idem tempus concurrunt, vel statim ab initio ambæ inter se commiscuntur. Cum igitur tertiana superat, plus horrores accidit, eidemque in accessione non nihil rigoris adiungitur: protinus verò hæc calidior est, atque ardentior: & aliquem bilis vomitum, vel excretiorem, vel madorem inducit cum vero altera pituitosa superior est, tunc frigidas partes extremas exercet, enigmique horrores sunt. qui ut siticulosi quidem sunt, neque æstu consistuntur. at cum pares sunt tertiana in terminans, & quondam continua; cum accessio in ingressus cum horrore accidit. cumque febris orta ex pituita excelli, contractio ues pulsum, horroresque sunt; cum vero calidior præstat, subito iualescunt, atque ea quidem ex exquisita semitertiana, quæ ex pari missione duarum febrium, tertianæ intermittentis, & quotidianæ continuæ exoritur. non exquisita uero maiorem biliosi, aut pituitosi humoris habet copiam.

De morbis publicis. Cap. XIX.

Morbos publicos, communesque nominat, qui multis simul accidunt: quorum ut origo, ita etiam est causa communis. Cibi igitur communes pravi, communes morbos pariant: potio item aque vitiatæ, nimis ærumæ, consueti labores omisi, inedia, repletio dum fames vagatur, aut cum summa est ætatis utilitas: regionum quoque naturæ communes morbos inferunt, quæ interdum palustres sunt, nonnunquam barathrum vicinum habent, quod exitiosum, prauumque vaporem exhalat, atque hæc quidem accidere continenter consueverant. Aer uersus uos circumflans, qui tum calidior, quam par est, tum siccior, tum frigidior, tum humidior effectus naturas nostras continuo mutat: in istas namque causas neque omnes simul incidimus, neque in eis totos dies versamur: ac aer nos ambiens, & omnibus est foris circumfusus, & per inspirationem attrahitur: ergo necesse est corpora animantium pro aeris temperaturæ commutationibus affici. Hæc qui norit, non solum qui morbi in quaque cõlitatione futuri sũt, prælagiet: sed etiam contrarium immoderati circumflui aeris temperaturæ uictum instituit, ne sũt prohibebit. Corpora autem quæ morbo alicui ex propria intemperie uicini sunt, ea & simili circumdantis nos aeris remperatura deprehendunturque uero remperatam cælo cõuerariam sortita sũt, ea præterquam quod ab aere non afficiuntur, sũnt meliora, cum remperatura cõtraria immoderationem cortigat: quod qui cognoscit, secundum ualitudinem tuebitur, contraria corporibus inducens, partim refrigerantibus; aquæ per fasonibus refrigerans, itemque ocio, & alimentorum penuria, & potione largiore: calefaciens autem operimento, laboribus, cibo liberaliore, & quandoque parciore. Iam uero si quis pyram incendat; is non mediocriter aeris prius humidum, ac calidum, siccumque; permittauerit: quemadmodum aiant Acronem Agrigentinum secisse.

De pestilentia ex Ruffo. Cap. XX.

N pestilentia terribilissima sũnt omnia; uelque quicquam, ori in singulis morbis, occurratur: nam & delitria, & bilis uomitiones sũnt, & multi sudores erant punct, & extrema algent, alui profluuius biliosus, tenuis, flatu pleua urgent, urinae excernuntur aquosæ, tenues, biliosæ, nigrae, quæ mala habent subsidentia, quæque in eis innatant, pessima; sanguis uis naribus destillationes sũnt, pectus estuat, lin-

gua torrida, siticulosaque, tristitia oboritur, itemque uigilia, conuulsionessue uolentæ, & alia permulta praua, & exulcerantia: atque in pestilentia quidem aliquid quod terribile non sit, terribile, contraque quod aliqui terribile est, non terribile fiet. Si quis uero futuram pestem prospiciat, animum attendens ad anni tempora, quæ mala sũnt, ad uitæ studia bonæ ualitudinis minus conferentia, & ad ceterorum animalium interitum, cum hæc diligenter animo uoluerit, illud etiam debet perpendere, qualis sit præsens temporis constitutio, qualis denique totus sit annus, quibus ex rebus uictus rationem optime sciet institueret: ueluti cum tempus siccum esse deberet, siquidem recte processisset, nunc humidum factum sit, uictus ratione exsiccare necesse est, ut superuacuum humor absorbatur. Ventris quoque cura habenda est quibus uitæ superior nenter pituitam conuuet, eos uominibus euacuare: quibus sanguis redundat, uenam secare oportet: itemque purgatio per uiam, & ceteræ omnes ex toto corpore factæ utiles sũnt: si uero ægrotus ardore æstuet, flammaque ad pectus usque pertineat non ab re fuerit super pectus imponere resrigerantia, & frigidam offerre potionem, eamque uou paulatim, siquidem magis incederet, sed assatum, ut flammam resinguar: si uero ardor interiora occupat, extremaque algent, & summa cutis est frigida, præcordia tēduntur, ueter colligationes partim sursum, partim deorsum mittit, uigiliæ urgent, deliria sũnt, lingua est aspera, ita calefacientibus opus est, ut calor per totum corpus distundatur: ut ab interioribus partibus ad exteriora trahatur, quacunque fieri ratione poterit entendum.

De ijs, qui ob crudorum humorum copiam in syncope cadunt. Cap. XXI.

Febriticare quidam incipiunt, cum magna crudorum humorum copiam ore uentriculi simul offenso congefferunt. His præcordia intumescunt, & os uentriculi in maiorem molem, quam secundum naturam sit, attollitur, colorque ad albidius, aquosiusque mutatur, quibuldam etiam nigrior efficitur. Nemini ex ijs sanguis mitti sine magna noxa solet, atqui uacuatione iudiget. sed neque neque scio uem, neque purgationem seruat ut pote qui etiam sine his in syncope de repente cadant ergo frictione sũnt curandi: per uictia uero morbi incipiendum est, ac primum quidem ac cruribus superue deorsum linteis modice asperioribus: dein de uero tota brachia super ne deorsum fricare conuenit: ubi autem as-

tus faris calidi uidentur, & metus est, ne lassitudinis sensus aliquis inuehatur, tum oleo relaxari utendum est, ab adstringentibus uerò abstinendum; si hyems sit, etiam digerentibus, quale est scytonium, & chamamelinum uteretur: cum uero artus diu, multumque fricuerimus, oleum erit deinde abstergendum, tum ad totam spinam accedendum, eaque simili modo perficienda: deinde rursus ad crura redeundum, ab his accedendum iterum ad brachia, tum ad spinam, ita ut per totum diem ad hunc modum pertractetur. Commodissima est his aqua malsa, in qua coctum hyssopum sit: uerò neque cibis, neque sorbitio, neque aqua eis danda est, neque permittendum, ut large bibant, sed contenti sint multa tribus primis diebus, ita deinceps fricando. Quod si robur mediocre sit, neque recte sit affecta aluus, auidacter clystere vitior: si uero impetus excrementorum maior, quam oporteat, ad aluum feratur, principio malsa magis coquenda est, quoniā ita minus subducit; si autem sit citatior, ne tum quidē sistatur, sed aique malsa loco, pristinam cremor detur: si uero fluere pergat, sorbitione ex alica nutries: si uero propter imbecillitatem uires collapsas esse ex pulsu cognouerimus, par erit panem ex uino diluto dare: si neque uentriculus, neque iecur inflammatione teneatur, quæ quidem si inflammatione urgentur, cum plenum crudorum humorū corpus sit, desperatus agrotus est: si uero crassos esse humores uideas, pro malsa perpetuo oxymel dabis, si quæstas sit, agrotusque frigide potioni sit assuetus, oxymel frigidum dabis, hyeme uero calidum. Balneum est his aduersissimum: uero quis te uocet ad eos, qui in syncopam iam inciderunt, cū patet, de quibus mentionem modo feci, nō sint inflammata, panem exhibere modicum ex uino poteris, statimque ad frictionem erit ueniendum, eaque, ut dictum est, utendum. At quibus propter fluxum bilem os uentriculi ledentem syncopæ accidit, eis potio frigida offerri debet: hæcque uinum tenue, antiquum, atque suluum esto.

De iis, qui ob humores tenues syncopam tentantur. Cap. XXII.

Qui ob tenues humores in syncopen cadunt, contra atque iis, de quibus supra diximus, curandi sunt: hos paulatim continuo nutrimus, si quæ iecur, aut uentriculus inflammatione vexetur, uiribus iam laegnentibus, hi nulla curatione possunt releuari. In hisce affectionibus cadaueris facies statim apparet: eos igitur nutrire necesse est, eorumque cutē den-

sare non secus, quam in superioribus erat rarefacienda: frigidus aer est iis comparandus; vnguentis adstringentibus vngendi; alimentanda, quæ non admodum facile deficiunt: ergo panis, & sorbitiones ex alica conueniētes, itemque sugaces siccūs austeri, & qui difficulter corrumpuntur: hi quæ & per se, & uero etiam cum pane; danda etiam sunt oua, & præsertim eorum vitelli, & cerebrum porcel lotum, uinum autem dilutum statim bibinitio post cibum sumptum est eis necessarium.

De alijs causis, ex quibus syncopa oriuntur. Cap. XXIII.

ALix porro causæ quatuor sunt, ex quibus syncopæ fiunt, dolor vehemens, uigilie, immodica euacuatio, & interdum motio delirantis, si vis tu quintam adde, principiorum intemperiem, ac celerissima quidem perniciēs sublequitur affecto corde, deinde cerebro, tū breui, iecore.

De dolore. Cap. XXIII.

Dolor igitur, qui stuporē affert, ex affectione frigida oritur, pulsans uero dolor magnæ inflammationis est proprius: uero tantquam ab aculeo in fixo, aut tanquam a terebro perforati pates, doloris species est crassi intestini, pungens dolor in membranis uersatur, peritidens uero vehemētissimis, non heterocraniis solum, sed etiam cephalis accidit. Est hic dolor, cum à parte quæ primo loco affecta est, cetera radice, statim in uicinas partes perferuntur. Distendentes ex utraque parte, neruorum dolores sunt, quæ ad utraque extrema nerui tenduntur; carent autem nerui doloribus in latam tendentibus; at membrana sub cute ex porrecta tendētes, stupefactionesque dolores inducit, quæ uero inter carnē in huiusmodi earū dolores ueluti dilaniantes sunt; multæ. n. sunt, & inæqualiter in se, quæ carcem amplectuntur; at earum quæ ossibus adiacent, profundis sunt dolores, & ipsorum ossium dolentium imaginem referunt. Cum igitur ulla doloris causa extrinsecus orta uideatur, antecedens uictus ratio perpendenda est: uerum in maiore ocio quis uixerit, quam consueuerit, an plus cibi ingesserit, id quæ ex ualentia materia, an uero excretio aliqua consueuerit retineatur, si quid horum, aut hæc omnia subesse uideatur, doloris in causa est repletio. quo casu hominem quam celerissime euacuabis, hoc enim ratione tibi lucebit, cum summa turela remediis, in partibus dolore affectis uti, quæ fluxione expellunt. Ergo si copia sanguinis sit, quæ sedat, procius in cidede est magne uena, quæ parti

parti affectu propinqua sit. Si uiciosi humores solum uentent, est adhibenda purgatio. Si utrumque adsit, utroque vacationis genere utendum ita, ut primum vena secetur. His peractis, si dolor perseveret, planum est id quod dolorem inchoit, in affectu particula impactu esse: consultatque curatio nem ipsam tu digerentibus medicamentis esse positam. Dolores quoque quos spiritus flatusque excitauit, carabimus: sed in ijs magis extenuantibus cibis, portionibusque utemur, & per sedem iniectionibus, & irrationibus, atque somnibus ipsum corpus ambiens rarefaciemus. Si vero rumor aliquis aut grauius, aut contrahens dolorem, creet, tumor ipse curandus est. Sin humor erodens affligat, aduersissima ei sunt extenuantia, & calefacientia. anethum uero oleo iunctum dolorem lenit, somnumque conciliat. id quod viride potius, quam succum facit.

De colliquatione. Cap. XXX.

Cum excernitur aliquid per uentrem, quod non ab esculentis, & poculentis, sed ex corpore procedit, humore in aluum consurgente, qui similis est ei sive buli, quae continuo euomitur, & per secessum deicitur, ab eaque differt tum seditate odoris, tum quod deiectionis excrementum magis rufum est, & habet crassitudinem friguenti, & quandoque etiam olei, tunc caro pinguis, & recens compacta ab ardenti febre resoluuntur, & colliquantur. Si malum inueterat, etiam aliquid ex solidis partibus liquescit. In hac perniciosissima febri uilis est potio frigida, quae a fonte frigidissimo hauriatur. Eiusmodi quoque esse debent cataplasmata, & epithemata refrigerantia quae super thoracem, & praecordia imponantur. Cibi etiam refrigerantes dandi sunt.

De vigiliis in febris, ex Galeno.

Cap. XXXI.

Cum ultimis vigilis agri torquentur, ita crura & brachia vinciri quo tempore somno se tradere consueverunt, & item excitari iubemus. eosque palpebras aperire & conuocare cogimus, donec abunde fatigati sint, tum de repente viuacula solvimus, lucernam aufertimus, multamque quietem impetramus.

De asside ex Herodoto. Cap. XXXII.

Si vero vehementius vigilae urgeant, in accessibus remissione ablucenda facies est nigro rum papauerum decocto. uariis autem admoventur papaueris albi cortex tostus & trius, & mandragore radices tantundem leui-

gabis, & cum uino ac rosaceo malagma conficies. Frontique imponendum est serpillum cum meliloto in passio decoctum. hoc in accessibus etiam utendum est. Vel trita papauera pane cum rosaceo, vel cerato excipimus, & adhibemus. Vicus est quodammodo plenior. Sorbitionibus autem imponatur seminis papauerum alborum quantum tria impleat cochlearia. oleribus uero admiscatur papaueris nigri, si folia sint, quantum tribus digitis possis comprehendere, si ea non adsint, tria, quatuor uel papauera sicca simul in coquantur. Si ne ita quidem somno corripiantur, liquore papaueris, aut succo mandragore illinantur.

De grani sopore qui cataphora dicitur ex Herodoto. Cap. XXXIII.

Facies posca, in qua lactis parum sit adiectum, abstergenda est, extremitatesque sunt ualidis excipienda ligamentis. uariis quae uim incidendi habeant, admoventur. in remissionibus quae sternutamenta excitant, adhibeantur. ciborum uero materia sit, quae incidendi, diuidendique uim habeat.

De canina appetentia. Cap. XXXIV.

Qui appetitu, qui caninus appellatur, laborant, ijs pro summo remedio uindictum est ex eorum numero, quae abunde calefaciunt. eiusmodi sunt quae colore salua, rabaeque sunt, & minime adstringentia. ijs porro cum ad praedium accedunt, primum pinguis, mox alia omnia ex veteri oleo praeparata, in quo nihil austeri vel adstringentis est insit, offerenda sunt. post haec uinum, quod dixi, licet illi non sitiant, dari tamen: cum enim id diutius fecerint, ipse morbus ita sedabitur.

De cibi fastidio. Cap. XXXV.

Si uiciosi humores cibi fastidii indixerint, ijs cibos & potiones dare conuenit, quod eiusmodi succos uel per uomitum, uel per aluum excernendos, uel ad reddendos sint accommodati. In quibus uero uirum imbecillitas cibi fastidium peperit, in ijs quoniam omnes vires ex particulari intemperie sunt infirmas, species intemperiei ipsius est curanda contrariis.

De fame ingenti, quam bulimiam nominant.

Cap. XXXVI.

Qui tuuicibus aut aliis, magna fame corripitur, reficiendi sunt cum iis quae naribus

naribus admoveantur, tum etiam carnibus suis illis affatis, atque hordinis, & ad summam, omnibus, quæ nidorosum odorem referunt. Extremæ eorum partes deligandæ sunt, ipsique erigendi, maxillæ item pungendæ, & capilli, aut aures vellicandæ. Cum refecti fuerint, panem ex diluta uini portione, aut aliquid aliud, quod facile distribuatur, eis dabimus.

De siti immodica. Cap. XXXII.

Sitiim admodum longam ex siccitate, aut caliditate particulatum, per quas humor ex ore in ventriculum importatur, oriri existimandum est. Siccitatis autem remedium est fomnus, vigilis vero caliditatis. Nonnulli vero ex uini portione sitibundi sunt, & ex caliditate esculentorum. his remedium est frigida portio, sed qui siti quæ extingui non potest, eneant sunt, quemadmodum cibos vitiosos expetunt pro portione humoris vitiosi qui exuperat, ita etiam prauas portiones desiderant, ex quibus etiam mortui sunt. noui ego, qui viperas displidas comedissent, itemque alios, qui uino veteri se inebriassent, & item nautigantes quicumque ob aquæ potabilitatem inopiâ, marinam bibere ausi essent, omnes interuisse.

De siti, Pilulæ. Cap. XXXIII.

Sitiim, quæ in febribus oritur, lenire consuevit capitis irrigatio ex oleo frigidissimo, aut rosaceo desuper ittorato. Opus est vero ad sitim facit nigra lactuce semen commandacatum, & radix quæ dulcis appellatur, & cucumeris semen edam commandacatum, & in ore retentum.

Dioscorida cataplasma ad sitim leniendum. Cap. XXXIII.

Habet hoc cataplasma, seminis cucumeris satui drachmas octo. tragacanthæ drach. quatuor. tragacantha dissoluitur albo ouorū crydorum retentum. cum dissoluta fuerit, contritam ceteris adiunge. cumque emollietis catapotia conficito, atque in umbra exsiccato. ex his vnum sub lingua tenendum præbetur. ut dissolutus humor depluiatur. iam vero dilutum malorum cydoniorum, aut pirorū, aut rhespilorum, aut pæpionū vitis, aut malignanti liquorem, aut omphacii succum forbeis.

De nausea. Cap. XXXV.

CVm eger absque cibi sumptione nausea tentatur, possumus, arbitror, ratione facile comprehendere, ventriculum prauis humoribus

vezari. nonnulli quidem vellicantur, sed cum humor in tuniciis impactus sit, nihil vomunt. ergo pituitosi humores concoquendi sunt, seruando ægrum in quiete, inedia, & somno. tenuiores vero humores reicit vomitus, qui nonnunquam ex prisaque crepore, nonnunquam vero ex aqua multa sit excitus. Quicumque autem glutinosi & crassi sunt, atque nantis de siderant.

Ex Philumeno, quæ sit vomitioni bilis adhibenda curatio. Cap. XXXVI.

Bilem vomentibus applicandum est cataplasma ex palmulis, aut malicorio, aut galla uino incoctis, vel posca. pane simul dissoluto. Acacia item, hypocythus, balastium, & thus cataplasmati adiungantur. Cucurbitula quæ cum largiore flamma affixa, magnopere adiuvat. Cibus sepe & paulatim dabimus. iis vero, qui attam bilem vomunt, & stomachus statim est plenus, spongiæ, accerrimo madefactas aceto imponito. vel hederæ folia in uino cocta adhibeto.

De singultu ex Galeno. Cap. XXXVII.

Singultus oritur ex repletione, aut inanitione, aut scribis humoribus stomachum erodentibus, quibus vomitu reiectis singultus sedatur. Pletique autem sumpto medicamento, quod ex tribus piperis generibus constat, si statim uinum superbibent, singultus nonnulli vero cibo intus corrupto à singultu corripitur. Comperit ergo est, vomitum satis esse ad curandum eum singultum, quæ repletio, aut morsus excitaui cum uero, quæ à frigore ortum ducat, calore finiri. Cum autem ex humorum repletione singultus oritur, uolenta euacuatione indiget, quæ sternutamentum præstat, at singultus ab inanitione oborcos sternutamentum non sanat. singultus autem cura cum uino, vel calaminta, vel narum celticæ datur.

Quæ curatio sit linguiæ essetq; adhibenda. Cap. XXXVIII.

Linguiæ asperitas humectanda est decocto seminis lini in os laborantis dato. melius autem facit si mixta cum liui semine coquamus, ac digito in hunc succum introducto linguam cum fricatam, aqua pura abluamus. vel spongia abstergamus, deinde rosaceo illinamus. Atque etiam ipsum rosaceum mellis admistum in id vehementer efficax est. itemque portulacæ succus in ore retentus, & rhu obsoniorum multis commissum. Egregie quoque faciunt dama-

scenorum, & mixarum ossa in ore detentae necnon & lacryoscauliculas.

Curatio exulcerationis, qua circa os sacrum exoritur. Cap. XXXIX.

Cum locus incipit rubescere, circulum infuse magnitudinis ex lana eidem subiciemus: deinde emplastrum, aut myrrinum ceratū conficiemus, quod argenti spumam, aut cerussam habeat, & imponemus. Exorta vero inflammatione cataplasma ex pane cum solano, aut herba sanguinali, aut plantagine, aut tenera brassica admauetur: si vicerat in pascendo serpat, leucitula cum malicorin illinenda erit.

De animae defectione ex inanitionibus.

Cap. XL.

Cum propter euacuationes anima deficit, iis, aqua aspergenda est, nares apprehendendae, os ventriculi conficiendum, vomitus impetandus, quin etiam brachia, & crura liganda sunt ligamentaque plura, & vehementinra esse debent, atque à superioribus partibus ad inferiores, & ab inferioribus ad superiores pertinere. Dissolutiones porro ex subiectis euacuationibus ortas vinum frigida temperatum curat, si nihil, ipsum dari, veter. Balnea ad defluentes in ventriculum sunt accommodata vel maxime: sed sanguinis profluvia vehementer prouocant: iis praeterea qui pro-

pter nigritiam sudoris copiam resoluuntur, in sensillima sunt: quandoquidem eorum cutis non laxanda, sed refrigeranda, atque adstringenda est: iisque praecipue frigidum vinum dare conuenit.

Si anima deficiat ob plenitudinem.

Cap. XLI.

Qui ob plenitudinem animo destituuntur, iis conficiendi sunt artus, calefaciendique, ac viuendi a vino ciboque abstinendi; itemque à balneo, si febrem habeant. iis satis est potio mulsa, in qua uel thymum, vel origanum eisdem quoque nymel est idoneum.

Curatio ad sanguinis destillationem.

Cap. XLII.

Quia destillatio, quae ex contusione, vel destitate euenit, tantius corporis, aut capitis rodat nam indicat, largior autem excretio potest redundantiam minuire, atque laxare, cum sentantem est, ipsam inde moliri, unde nam ra initium manendi sumperit: accommodatius enim inde, quam aliunde ducitur. Cum hoc mecum ipse reputarem, non veritus sum in quarantiarum destillationibus scalpello, ut est in more positum, vasa quae in naribus sunt vulnerare: quia quidem in re non exiguo sanguinis fluore contentum esse, sed detrahere pro viribus oportet.

N O N I I

De febribus liber.

De febrium differentia. Cap. I.



QUOD igitur febris permixtio quædam caloris nativum cor de fit, omnibus incofesso est, ob hoc itaque illius affectibus quoque annumerari debet. Sed dicamus prius, quid sit febris. Febris est calor præter naturam, quæ à corde ad singulas corporis partes fertur. Eius autem differentie sunt multe.

De febribus diarijs & multorum dierum. Cap. II.

Diaris febris facile soluitur. Diem enim tantum durat, fit ex ira, molestia, lassitudine, curis, solis æstu, & id genus alijs. Vnde & urinae illorum secundum naturam habent. Curantur cum à tertio die in balneum ducuntur, & oleo iunguntur, & à lotionibus cibum capiunt, & ad operationes consuetas ablegantur. Fit interdum, ut non unum tantum diem, sed ad tertium & quartum duret, & tunc dicitur multorum dierum febris. Causam vero & curandi rationem eandem habet.

De febre continenti & continua. Cap. III.

Febis continens est, quæ nullum habet caloris intervallum, sed remissionem tantam & inclinationem in vigore accessione. Continua vero quæ nullam prorsus habet quietem. Huius tres sunt species. Alias. n. calor par, fuit, similis toto febris decursu manet, & synochus apagmastica dicitur, vel calor continuus incremento inuasit, & pagmastica, id est, incrementum vocatur vel statim à summo vigore incipit, & sensim minuitur, dum finem integrum habet, & fit synochus paragmastica. In universum vero & continuæ & continentes febres sunt, cum materia intra vasa vel putrescit, vel effertur, & in singulis ferè, maxime vero continuis sanguinem mittere oportet, & cibis frigidis & humidis nutrire, ut lactuca, ixybo, & similibus, & frigidam offerre, nisi præcordia male fuerint affecta. Extrinsecus vero iungetur

re aliquo ex medicamentis, quæ febrem cessare faciunt, ut Amaranthi succo, vel solani, vel cucurbitæ sylvestris, & similibus. Præcordiis vero cataplasmata adhibere, ex semine lini, psyllio, althea, chamæmelo, senecione, portulaca & solano, aut lenticula aquæ cum ovo, & quæcunque his sunt similia.

De febre tertiana. Cap. IIII.

Tertiana febris est intermittens, quæ altero die accedit. Fit ex flava bile, extra vasa putrescente, & cum rigore invadit, terminatur vero sudore. Hanc quoque subsequuntur bilis vomitio, deiectiones ventris cum impetu biliofa & urinae acres: spacium vero maximum accessioneis duodecim horarum est, & tunc desinit: His victus humidus & frigidus salubris est, & aquæ porio, & quod in ventriculum coëst biliosum, id nominibus, vel infra clysteris mollibus enocari debet. Urina vero portioneis, in quibus apium & anethum maduerunt, exhibitis, & absinthio etiam, sicut etiam in balneum aquarum potabilium ducendi. Et si qui balneis admodum gaudet, eos etiam si bis die laverit, non peccabis.

De tertiana spuria. Cap. V.

In febre porro tertiana spuria non interitina, sed cum signa coctionis apparuerint, lauari debent, & si sanguinis mittendi necessitas inciderit, neque illud prætermitti. Victu vero ut oportet non refrigerante, tantum, ut in tertiana exquisita dictum fuit, sed qui magis incidat, quemadmodum cremore prisanæ pipere iuncto, vel hyssopo, vel origano, vel spicanardi. Dare item quæ urinas movent, ut decoctum apii vel foniculi, vel capilli veneris, & post septimum acetum mulsum etiam, & absinthium. Moram vero trahentibus conducit à cibo vomitus & per alvum purgatio.

De quartana. Cap. VI.

Quartana febris intermittens est, & singulo quoque biduo invadit. Fit ex humore melancholico, extra vasa putrescente. Accessio rigorem obtinet, pulsus rari sunt, urinae tenues, & albæ vel nigrae, subiecta crassa, præterea lien quoque in his male habet, & inter iuvicia nec medicamentum trahens exhibendum,

De febribus:

14

dū, nec euacuatio istanda est. Quod si sanguis exoperat, tum vicia incidere, & optimū cibum offerre oportet, & alium emollire Epithymi & pulegii decocto, & triduo integro medicamentum, quod ex triplici pipere constat, & quod Dioscorides appellatur, vel piper solum ex aqua tepida sumere, ante accessiooē. Vti præterea medicamentis quæ viciam mouēt, quale est apium, asarum, capillus veneris. Visceri vero prosciendum malagmate, quale est copton, & quod autem dicitur, & polyarchio. Vbi vero coctionis opus apparuerit, eam quæ ex sulphore constat, & melle antidotum, prius tamen per sedē atra bile euacuata, & theriacam nouissimē, & medicamentum ex liquore cyrenico, exhibere, & salsamentis ac sinapi in cibo vti oportet. Est enim hic morbus longus quidem, sed neminem iugulat.

que etiam ex euaporatione pestifera, ut in locis paludosis, & quæ barathrum vicinū hēnt, oouunquam ex aere, vt cum in temperie præter naturam acquirit, vel frigidiorē, vel liciorē, vel calidiorē, vel homidiorē, & in ipsam ad cor defertur, & ita pestē excitat, in his ventris pet clysteribus habēda rō est. si superior ventriculus pituita coctior, vomito euacuare, sin vero sanguis exoperat, venā incidere oportet. Quæ pet viciam quoque sit purgatio, salubris est. Io peruentibus aut febribus, frigidam quoque offerre, oon pet interualla, sed consertim & copiosē, vt feruor extinguatur oportet. Mulam denique in portu gatē, vel pilanæ cremorem cum coici semine, vel bolum armenam, vel laxuli lapidem.

De febribus beſticiis. Cap. X.

De febre quotidiana. Cap. VII.

Quotidiana febris & ipsa iō termitte eos est, quæ quotidie iouadit, sed accessio ultra horarum octodecim spacium oon exēditur. Fit ex pituita potrescente extra vasa, sed maxime cum ventriculus oon ritē suo muere fuogitur. In accessione pot rō extrema frigus occupat, siue horrore tamen, cum pituita vomitu, vrinis tenuibus, albis crassis & turbidis pueris & mulieribus, n̄ plurimum accidere solet. His inter initia acetum mullum dandū, & medicamentis quæ vrinam eliciunt, quale est apium, asarum, capillus veneris, vtendum erit. Acetum mullum deiode cum radica in cibo offerendum, & vomitus imperandus erit. Deuique purgatio molienda pet colocyothidem & agaricum, seu ea quæ pituitā in corpore educunt. Viſtus ratio ex extenuantibus quale est cyminum, pipet, & id genus alia constet. Ventriculi quoque orificii curā habere oportet, & cataplasmatibus & emplastris, & reliquis duceo tibus.

Tres harum sunt differentie, vna n. a marcore marasmos græcis appellatur, altera in totum consumpta & torrefacta dicitur. Hoc aut proprium hēor hæ febres, vt a cibo calor in crementum habeant, petinde a c in calore vide re est, iniecta. n in eis aqua, calor in ea reconditur, seu delitescens ebollit, seu effluuēcit. Hos itaque lauare, & in frigida immergere, & hanc ipsam quandoque in potu dare oportet, cum nidelicet nulla pars, imbecilla est, vel corpus admodum extenuatum. Lac præterea muliebre, vel asininū somere, corpus vero inūgere & rosaceo, & id genus aliis.

De semitertiana. Cap. VIII.

De nigiliis in febribus. Cap. XI.

Semitertiana febris cōposita est tertiana intermitteente & quotidiana cōtinna, potrescētibus & bile & pituita. Itaq; cōtrādi rōē quoque cōpositam esse oportet. Si n. pituita sit superior, prædictis maxime vtētor, quæ in quotidiana exposuimus, sin autem flaua bilis, is quæ iō tertiana comprehensa sunt, in totum ei quod vtget iocumbentes.

At vero eorō, qui immodicis torquerur nigiliis, crura & manus deligare oportet, eo potissimū tēpore, cū ad somnū conuerti solent, & pedes fricare, iō piēdo sursum ab humeris, & descendēdo deorsum. Iode subito vincula soluimus, lucroamq; tollimus, & silētiū summam imperamus. Perseuerantibus vero nigiliis & modum ferē excedentibus faciē decocto papaueris calicum itrigamus, vel aqua & pedes & manus & faciē persundimus. Vel mādragorē succo faciem illinimus, vel opio, vel pastillo paochresto, vel qui ex feminibus constat. Huc facit & papaueris semen & cymū, vel caput oleo quod ex mandragora, constat, iouogimus, vel oxyrhodio. Aquam præterea forbendam damus, & quod ex papaueris calicibus constat, decoctam. Aliud, quod somnū prouocat uoguentum. Ladanū, opii, singulorum pares portiones, tritæ & frooti inducunt. Aliud. Apii semen, opium, mandragoræ succum terito, & cum eo iungito.

De peste seu pestilente febre. Cap. IX.

Huius febris origo ex praouis, & vitiosis focis alimen tis est, vel aquis cuiusmodi, quando-

De gravi sopore, qui cataportha Græcis dicitur.
Cap. XI I.

Eorum vero qui in grauē somnum sunt lapsi, faciem posca tepida cum spongia fouere, & summas corporis partes valide ligare; & pulegium cum aceto, vel hyssopum vel origanum odorari oportet. Cucurbitulas denique pectoribus & pingui ad mouere, & in affectionum remissione, ea quæ altera ueramenta mouent, & cibū iucundē facultate peditū offerre.

Curtatio doloris capitis in febribus. Cap. 13.

Si capitis dolor in febribus affligit, post conuenientem sepius uacuationem, in accessio num declinationibus, caput inungit debet oleo acerbo, uel rosa cum aceto,estate quidem & cum febris ardens est, frigidis, hyeme uero calidis incoquatur etiam oleo serpyllum, uel papaueris capita, uel pencedanum. Aestate et in oleum iniciatur sanguinalis herba, quam polygonon Græci uocant, succus, uel cucurbitæ syluestris. Fronti uero conueniunt cataplasmata ex pane, polygono, ocymo, scorpio lides, papaueris capitibus, rosis, farina hordeacea, cum psyllio uel liquore cyrenaico.

De his que uisceribus imponi solent. Cap. XIII II.

Quod si itaque stomachus imbecillis fuerit,

que robur ipsi addere possunt, oblinetur, e quorum numero sunt, palmulæ, rosæ, crocus, cenanthe, absinthium, melilotus, masticæ, aloë, cyperos, niuum & polenta. Irrigabitur autem & ioungetur oleis ex absinthio, meluo, masticina. Quod si ardorem quoque patiantur uiscera, aliquod ex refrigerantibus miscere oportet, cucurbitæ nimirum succum uel lactucæ, uel portulacæ, uel solani, uel echinorii. Si uero inflammationi aliquid uel scirrhus simile apparuerit, aspersioibus olei chamæmelinum, cyprinum, anethinum, gallinæ item seu anseris adipem, adiungendi sunt. Cataplasmatibus autem, lini semen, fenugræci, altheæ, chamæmelorum flos, melilotus, psyllium, palmulæ, rosæ, absinthium.

Quæ sudorem mouent. Cap. XIV.

Nitrum cum oleo chamæmelino illitum, uel pastillus Heliacus eodem modo adhibitus

Ad intempestiuos sudores coercendos.

Cap. XVI I.

A refrigeridiis & euentatio semper uero corpus myrtheo oleo perungitur, uel acerbo, uel lentiscano. Inspergatur præterea myrrhus in pollynem redacta, uel galla, uel picæ cortex, cortex, uel posca frigida per spongiam adhibeatur.

F I N I S

7

CL. GALENI PERGAMENI
DE DIFFERENTIIS FEBRIVM
LIBER PRIMVS,

INTERPRETE LAVRENTIO LAVRENTIANO
FLORENTINO.



*Quanam sint febrium differentia principales, & quod essentia febrium sit
in genere caloris prater naturam. Cap. I.*



DIFFERENTIAE
febriv, maximè qui-
dem propriæ, ac prin-
cipales, secundû ear-
um substantiâ sunt :
aliæ verò secundum
aliquid accidens.
Quoniam verò & ip-
sorum accidentium
non una est natura,

sed alia quidem propinquiora, magisq; propria
diuidendæ substantiæ sunt : alia verò remotio-
ra, ac magis aliena ; idcirco & earum, quæ hinc
sumuntur differentiarum minimè vnum genus
est. Itaque maximè quidem peccant, quicunque
differentias proprias, ac maximè principales
omittunt. Deinde verò, quicunque mentione
harum facta permiscant cum eis differentias ac-
cidentales, æqualiter omnes, minimè discernē-
tes viles ab inutilibus. Non solum autem pec-
carunt plerique medicorum in ipsis differenti-
arum generibus, aut plures quàm oporteret tra-
dendo, ut inutilium quoque meminerint : aut
pauciores, ut nonnullas etiam viles omiserint :
sed etiam diuidendo genera ipsa in proprias
differentias, similiter errant. Ne longius a-
beas, cû primû, ac maximè proprium differen-
tiarum genus, ab ipsa diuidendæ rei substantia
sumatur, videas tamen nonnullos medicos præ-
termisisse vniuersum hoc genus, alios verò diui-
dendo plura, quàm opus esset statuisse, aut in
primis substituere : tamen Hippocrates optimè
faceret diuisionem libro sexto Epidemion. Di-
ctio autem habet in hunc modum. Febres, hæ
quidem manu sunt mordaces, illæ verò mites :
quædam autem non mordaces, sed increfcentes :
nonnullæ acutæ, sed ab ipsa manu deuictæ :
quædam statim ardentess : quædam verò semper
debiles, siccæ : aliæ falsæ, aliæ inflatæ, aspectu
grauæ, aliæ ad manum humidæ, aliæ rubicun-
dæ valde, aliæ liuidæ, aliæ præpallidæ, & aliæ

istiusmodi. Apertissimè etiam hoc loco ab ip-
sa rei substantia, simulque ab ipsa dignotione
in proprias differentias fecit diuisionem : nam
essentia quidem febrium est in genere caloris
præter naturam. Differentiæ uero caloris, & ex
eo quodd maioris minorisq; rationem admit-
tat, sumuntur, & ab ipsa materia, in qua calor
ille præter naturam existit, & ab ipso mouen-
di modo : quas omnes complicans, cum digno-
scendarum earum ratione scripsit, quemad-
modum procedente sermone docebimus. Por-
rò autem quæ à maioris, minorisq; ratione
ducuntur, sunt manifestæ : & in hoc genere dif-
ferentiæ medicis mos est magnam, ac paruum
febrem nominare. verûm improprie quidem
de rei qualitate quantitatis vocabulum enun-
ciant : sed ita facere consueuerunt, non in fe-
bre solum, sed in alijs sexcentis, quæ in quali-
tate quidem ipsa essentiam habent, cæterum ma-
gna, paruaq; nominantur. Quæ uerò differen-
tiæ à materia sumuntur, in qua calor ille præter
naturam consistit, maximè propriæ caloris præ-
ter naturam differentiæ sunt : siue corpus ipsum
cordis præhenderit, siue humores conditos in
ipsius ventriculis. Reliqua autem ac tertia dif-
ferentia est, ubi æreæ substantia sola admo-
dum incaluit, humida verò ac solida corpora
adhuc quidem incallescunt, sed nondum inca-
luerunt. Non enim parum differt, incallescere
aliquid dicas, an incaluisse. Sed discas eiden-
tissimè id quod dicitur, ex his exemplis. Finge
aquam calidam inditam lebeti frigido, deinde
ab ea ipsa aqua calefieri contactu ipsius lebetis
corpus, nondum autem totum exquisitè inca-
luisse. & rursus finge in calidum atque ignitum
lebetem frigidam aquam inditam, deinde cale-
fieri quidem adhuc, nondum aut incaluisse. Ex
his exemplis, cum secûdo quidè prima febrium
differentia similitudinem habet, quas corpus ip-
sum cordis præhendisse docuimus : cum primo
autem, secunda, quas conditos in ventriculis bu-

mores occupasse diximus. Reliqua autem ac ter-
tia differentia exemplum omnino simile nō ha-
bet: sed claritatis causa, finge fabrillem sollem
trahere ad se acrem alio modo tūtilidum: dein-
de calefieri adhuc ab eo, nondum autem inca-
luisse. Sed exemplum magis indicabit rei decla-
randæ naturam, si finxeris, in folle contineri hu-
morem: atq; adhuc magis, si foramina folli per
quæ trahit atq; eunittit aerem, ita angusta effe-
ceris, ut humori quidem inuiat, aeri uero peruia
sint. Qua sanè in re potissimum dissident natu-
ræ opera ab his quæ homines ipsi efficiunt. Et
enim substantia aerea permixta cum sanguine
est in omnibus arterijs, per multa foramina pa-
riter spirantibus: ac nihilominus in ipso corde;
vt quæ per eas omnes confluat.

*Calorem accendi interdum in spiritibus, interdum
in humoribus, interdum in partibus animalis so-
lidis, qui Hippocrates continentia nominauit,
Cap. 11.*

Hic ergo calor præter naturam, quem ap-
pellamus febrem: aliàs ex alio de prædi-
ctis incipit. Occupat autem ac simul affi-
cit cum eo quod affectum est, reliqua duo gene-
ra. Facillimè ergo calor ex humoribus ad spiri-
tum transmeat. humores autem tardiùs ignem
conciunt à succento spiritu: atque etiam soli-
dum corpus promptius tribuit calorem humo-
ribus aeris quæ substantiæ, quàm ipsum ab illis
accipiat: omnis enim substantia tenuis faciliùs
quàm crassa alteratur. Tenuissimus autem aer,
crassissima autem corpora solida sunt: humo-
res medio genere ambigunt. Nec quæquàm re
fert præsentis loco, spiritum vel aerem appellare.
nam de his alibi fusiùs diffinitum iam est. Nunc
verò sufficere illud tantummodo scire, quod (pu-
ro) Hippocrates indicans dixit, Continentia, ac
contenta, & impetum facientia. Continentia
quidem appellat, ipsas corporis partes solidas:
còtenta autem, humores: impetum uero facien-
tia, spiritus. Febrilis. n. dispositio aliàs ex alio
de prædictis incipit: uerùm in eo genere quod
primum affectum est minimè permanet, sed oc-
cupat reliqua duo: ac nisi priùs soluitur, pro-
cessu temporis illa similiter afficit, atq; hæc su-
ma sermonis est. Sed oportet ea quæ dicta sunt,
demonstrare, noras quæ uniuscuiusq; generis fe-
briù percurrere. Statim itaq; de generatione ea-
rum dicere aliquid opus est.

*Quoniam modo febris ephemera, id est, diaria ex cau-
sis primitiuis atque euidentibus præbandat, qualis
empiricorum qualis rationalium via sit ad inuen-
tionem, quæ quoniam partim experientia partim
ratione perficiatur, sine methodis logicis esse non
potest. Ex suppositione paulatim ad genus fe-*

*brium descendit, & hoc ex materia diuidit.
Cap. 111.*

Ex lassitudine ergo, ira, amore, uestione,
frigore, insomnio, cruditate, temulentia,
ac satietate, quosdam febricitare cunctis
hominibus perspicuum est, ab ipsa rei euidentia
edoctis. Quinetiam pestilente aeris conditio-
nem asserere febrem, minimè ignorant, quicquid;
intellectu participant: quemadmodum & uer-
sari cum his qui peste laborant, periculosum es-
se. Affici enim periculum est, quasi à scabie qua-
dam aut ophthalmia. Periculosum præterea est,
consuecere his qui tabe tenentur, atq; in totum
cum omnibus qui putridam adeo expirat, ut
domicilia in quibus decumbunt, grauiter ole-
ant. Constat præterea ex longo rerum usu, ut
qui consuetudinem exercitationis omiserint,
ut alijs multis morbis, ita nihilominus febris-
libus corripantur. Et item, ut quæ uocatur
plethora generet febres, atque etiam prauis ci-
bijs, ac medicamentis, & ætus circa Canis syde-
ris ortum: & alia huiusmodi cunctis homini-
bus (ut ita dixerim) perspicuum est. Quæ uero
ab ipsis in corporibus nostris fiat affectus ex qua
febricitamus, minimè sciunt, neque pleriq; ho-
minum, neque quidem medicorum. Duplex
autem genus ignorantium talia est: alteri quid-
dem, quod ipsa experientia tantummodò niti-
tur, tanquàm nulla rei cuiusquàm natura, ra-
tione possit inuestigari. Alterum autem genus
est eorum qui sapientes quidem videntur, sed
cùm ignorent quæ quàm priores, scientiæ ta-
men habent exultationem. Ignorare autem
eo contingit, quia nullam habent in methodis
logicis exercitationem, ex quibus cognoscun-
tur ac discernuntur à demonstratiuis sumptio-
nibus uersimilia quidem, sed quæ nihil uerè aut
inuenire aut demonstrare possunt. Huic autem
insestis insolentia accessit, ob quam nonnulli ex
eis in tantam audaciam atque amentiam deue-
nerunt, ut nec ea quæ omnes homines cogno-
seunt, experientiâ ipsa edocti, febrium causa esse
se concedant. De quibus est libro de causis pro-
catartictis abundè docuerim, nihil opus est hoc
loco mentionem facere temerariæ loquacitatis
eorum. Neque enim contradicere, neque solue-
re sophismata hoc libro instrui: sed instituere
ac docere, subiiciendo ea quæ alibi à nobis sunt
demonstrata, ac docendo differentias febrium.
Subiiciunt ergo, caliditatem, frigiditatem, siccita-
tem, atq; humiditatem esse elementa corpo-
rum, ac fieri primas ægitudines ex intemperie
horum, è quibus una febris existit, quoties calor
quidam præter naturam in corde extiterit. Differen-
tiæ autem secundum genus caloris, de quibus præ-
sens sermo tractat, ab ipsa materierum genere
triplicium differentia ducuntur, suscipiuntium
ignem caliditatem. Aut, n. in ipso corpore cordis,

aut in humoribus prima ipsa accenditur, ut dicebamus, aut in spiritu. Præueniunt autem omnium febrium constitutionem nonnullæ causæ omnibus manifestæ, de quibus paulò antè docuimus, ex quarum observatione empiricus quidè medicus ad curationem nonnihil iuuatur. Rationalis verò ad ipsam rei naturam accedens, per indicationes ab illa in futurorum præsentio nem æque inuentionem curationis, iunatur: utens omnibus quidem experientiâ ipsa inuentis, adiectionibus autem ipsius multa ex docendi via rationali. Quæ ergo sint per utrâque partem inuenta (experimentum intelligo ac rationem) alio loco docuimus. Quæ verò dispositio ab vna quaque causa procatartica in corpore consistat accendens febrem, nunc docere instituiamus.

Multa esse causas caloris præter naturam, ex quibus gignitur febris, quoties suscipientia corpora promp te se habeant ad continentiam diutius caliditatem.
Cap. 1111.

CUM ergo videamus non unum modum, neque generationis, neque actionis caliditatis (quando ne ipsius quidem ignis modus unus est) sed gignitur aut propter motum, aut propter putrefactionem, aut quia æteri caliditati consuescit, aut propter suppressionem calidi effluuii, aut propter permutationem calide substantiæ, tanquam de fonte quodam ebullientis, aut genitæ, scilicet ad nostrum sensum, aut augmentis caliditatem: necesse est omnes febrium causas in prædictos modos reuocari: qualis si nobis æstus est, siue ex ipso sole actio talem habeat appellationem, siue affectio quæ in corpore efficitur, siue ea quæ iam effecta est. Nam & ea ipsa calor est præter naturam: nondum tamen febris, nisi cor ipsum concalescerit. Sanè totum hoc genus causæ ex consuetudine efficitur rei calefacientis, siue sol, siue ignis, siue medicamentum fuerit id quod calefacit, extrinsecus quum aut attingit, aut propius accedit aut consuescit, vel quous alio modo libeat appellare. At uero ita quasi ebullitio quædam ac motus vehemens est irascibilis facultatis quæ in ipso corpore cordis sedè habet. Concalescit autem interdum cum ea spiritus, atque interdum sanguis. & si promp te se habeant suscipientia corpora ad continentium diutius caliditatem: quamuis ipsius cordis motus destiterit, hæc permanent calida præter naturam, tuncq; febricitare hominem necesse est. Hæc ergo febris principium habet, motum atque ebullitionem naturæ caliditatis. Febris autem quæ ex morore consistit, non etiam ebullitionem, sed motum tantummodò principium habet. Si autem ex lassitudine efficiatur, principium quidem habet motum ampliorè masculorum, ac

neruorum, & ligamentorum, & articularum, quæ quidem prima calefiunt: calor autem continenter cordi distribuitur, ac tunc febricitant. Vbi verò febris propter densitatem cutis accenditur, qualis maximè alitridis refrigeratisque fieri solet: collectio in corpore mordaci effluuii consistit. Diffusantur enim semper animalia corpora duobus modis, emisissis foras quotidie vaporosis, fumosisque excrementis: attracta autem intrò ærea substantia refrigerante, atque ventilante naturalem caliditatem. Vbi igitur fortis causa condensando cutem prædictos meatus astringat, sæpe plethoram inducit, quoties uaporosa ac benigna materia affluit: interdum febrem committit, quoties acris ac mordax fuerit. Idque maximè quum ex eo augetur calor, quia refrigerans aer intra corpus non trahitur. Exermitur autem excrementum acre ac mordax aut ijs qui sunt naturæ malis humoribus pleni, aut ijs qui malos cibos ingesserunt, aut sæpe non bene cõcoxerunt, præsertimq; ijs qui præterquam quod cibis dictis vescuntur, etiam limosam, aut lutosam, aut cerosam, aut pascuam, aut stagnantem, aut alio quouis modo corruptam & putrefactam aquam bibunt. Eodè modo euenit, ubi immoderatè laborant, aut uigilent, aut angore afficiantur, aut acria medicamenta frequenter ingesserint. Cibos autem malos intelligo, & qui ex natura tales sunt, ut allia, cæpe, naturium, porrum, brassaica, ocymum, urtica: & alij quicunque nominantur agrestes, ut lapsanæ apud nos: atq; etiam qui boni sunt ex natura: sed ob putredinem quandam prædictæ æquales, aut maius sæpenumero vicium acceperunt, ut ordeum ac triticum, & aliæ oēs fruges: partim ob temporis longitudinem ad putridam dispositionem deductæ: partim seu quodam repletæ, quia præuè repositæ sunt: partim ex prima generatione ab ipsa rubigine vitiaæ. Tales igitur cibos etiam nunc pleriq; comedere coacti præfati, uel febribus putridis ac pestilètibz mortui sunt, uel postulis scabiosis aut leprosis recepti. Vbi igitur corpus fuerit plenum calibus humoribus, nulla autem obstructio in uisceribus fuerit, atque animal in cute tota liberè diffusetur ac refrigeretur, sanum quidem existit: sed breuem, lubricamque obinet sanitatem. Vbi uero exterior terminus aut astringatur, aut in profundo meatus obstructur: si astringatur, nunc dictum febrium genus, si oppilectur, id quod paulò post dicendum est, consistit. Nihil igitur minus uideri debet, si ex cruditate, hi quidè febricitant: illi nihil eiusmodi patientur. Etenim ijs qui malis iis humoribus pleni sunt, ac male diffusantur, aut interpellantur laborant, aut lassæ tamen, promptè est febricitare. Ijs aut qui bonis sunt pleni humoribus, ac probè diffusantur, & quiescunt, ac fouent ad iecur & nectriculū artinentes.

partes, impulsibile est febricitare (in iecore. n. ac ventre manet quicquid corruptum est, ac teporis spacio paulatim cōcoquitur atq; efficitur benignum.) Quemadmodum & ijs qui motus fortiores sustinuerint, aut in sole æstiuo steterint, aut in balneum calidum dulcium aquarum descenderint, cibi corrupti in vniversum corporis habitu transsumuntur: sic eos quibus corrupta cibaria deoefum deferuntur, febris minimè sequitur nisi propter aliquam aliā causam: ut si sepe numero surgendo in lasitudinē inciderint, aut ventrem ipsum inflammatio tentauerit.

*Ex putredine accendit febrem, cuius causa est obstru-
ctio: ac potissimum putrescere, quæcunque calida
atque humida sunt.* Cap. V.

CAETERVM si meatus obstruantur atque humores stipentur (nam de ea re docere distuli) animalia putridis febribus tentantur. Promptissimè enim putrescunt, quæcunque calida & humida, & multa sunt in locis calidis, nisi dissilientur ac refrigerentur. Ergo neq; mirum uideri debet, quamobrem febres sequantur plethoram: quoniam per eiusmodi dispositiones multæ obstructions efficiuntur, ac totū corpus difficulter dissilatur. Igitur ex plenitudine quæ est ad ipsas vires, humores ipsi citò corrumpuntur, neq; cuius, nec concocti, probe: quippe quod vires cōficiētes eos, debiliores existant. Quo circa quæcunque cibaria glutinosa crassaq; sunt, morbos committere magis possunt, obstruere enim atq; stipare humores ex illis facilius est. Sed nonne contraria, s. extennantia & acrida, morbos committere possunt? Videntur, n. qui akeruto victus genere frequentius vrantur, febre similiter præhendi: quia hæc omnia (ut antè diximus) malos humores gignere assolent. Hæc ergo, ratione ea quod malos humores gignūt, febrium causa sunt: alia verò ratione putredinis, quæcunque glutinosa, crassaq; existūt. Nec secus pariter inflammatione affectæ ratione putredinis accendunt febrem. Impactus, n. in eas qui influxit humor, vbi fuerit naturæ calidus, quia non bene dissilatur, putrescit. Vbi igitur decurrens humor fuerit planè biliosus, caliditas facit igni sublimis occupare partem, vbi sanguineus inflammationi sublimis, ex ambobus uero militus, uel erysipelas sit phlegmonodos, vel phlegmone erysipelatodes: nomen quidem sumens ab humore dominante, denominationem verò accipiens ab altero. At nec ex his omnibus acceditur febris, ratione societatis. Semper enim simul cum eo quod incaluit, pars cōtinua calefit, quousque affectio ad eor ipsam peruenit. Nam & consensu carbunculis partes cum eis simul calefiunt, genitis ex sanguine perquam calido, sed magis melancholico propter adustionem.

Pestilentis febri causam esse inspirationem, potissimum quoties corpus in eam dispositionē sit preparatum, quoniam maxima pars generationis morborum est corporis preparatio. Cap. VI.

CALIDiores præterea ambientis nos æris conditiones (quales sunt circa Canis syderis ortum) potissimum per inspirationem perspicuè eor ipsam calefaciunt: extrinsecus verò circumfusa corpori, totum ipsum calidum reddunt, maximeque arterias: ut quæ non nihil substantiæ ipsius ambientis aeris attrahant ex quibus omnibus simul afficiatur cor necesse est, atque ipsam in primis immodicè calefiat, maximeque febrili dispositione tentetur, atque toti subinde corpori immittat oportet. Vbi uerò pestilentes subeant conditiones, inspiratio potissimum causa est. Interdum enim efficitur febris propter humores in corpore aptos in putredinem, quoties animal breuem quandam occasionem ab aere circumfluente suscepit: sed magna ex parte incipit ex aeris circumfluentis respiratione, quem putrida exhalatio inficit. Principium autem putredinis, aut multitudo mortuorum est minimè crematorium, quemadmodum in bello fieri solet: aut exhalatio paludis cuiusdam, aut stagni tempore æstiuo atque interdum immoderatus calor circumfluentis aeris est principium, quemadmodum in pestilentia quæ Atheniensis inuasit (ut Thucydides ait) viucentes homines in suffocatis nec ita perflatis tugurijs estate corruptio afficiebat. Est autem initium pestilentis febri, eod quod humores corporis ex prauo victu sint in putrefactionem parati. Forsitan autem accidit id propter continuitatem, quod ex Aethiopia fluxerunt quædam mala inquinamenta: quæ ijs qui habebant corpora læsioni parata, causæ febriis extiterunt. Huius enim semper meminisse oportet toto hoc sermone, ut nulla causa sine corporis aptitudine efficeretur possit alioquin omnes qui in sole diuersantur æstiuo, in febrem inciderent, & qui plus æquo mouentur, aut bibunt, aut irascuntur, aut merent. Nec secus omnes ægrotarent circa Canis syderis ortum, atq; in pestilentia perirent. Sed (ut est dictum) maxima pars generationis morborum est, afficiendi corporis preparatio. Subijciat ergo pro exemplo in ipso acre inuichi quædam pestilentia semina: atque eorum corporum quæ uersantur in eo, hæc esse uariarum excrementorum plena, paratorum quidem ex seipsis putrefieri, illa sine excrementis ac pura: atq; addatur prioribus inesse obstruccionem meatuum undique, ac plethoram appellatam, ac vitam otiosam in multis epulis & ebrietatibus & Veneris usus immodico & cruditatibus, quæ omnia prædicta necessaria consequuntur. Alijs autem omnibus corpore

corporibus puris ac sine excrementis insit ultra ea quæ diximus commoda, quod omnibus spiraculis corporis neque obstructis neque pressis angustia bene transpirat: exercitatio uero prudenter insiliens, ac victus ratio moderata. deinde his ita subiectis, cogitabis num sit nerisimile utraque corpora conspiratione putridi aeris affici. Nonne consonum est hæc statim à prima inspiratione initium putredinis accipere, unde in maiorem noxam prolabatur, quæcumque uero uacua excrementis & pura sunt, ea uel nullo modo uel exigua labe infici, ut facili ad habitum naturæ recurrant? Itidem quoties aeris temperamentum ab ipso naturæ habitu immoderate recessit ad humiditatem & caliditatem, pestilentes forte morbos necesse est: affici autem his maxime eos, qui iam prius pleni fuerint humiditate excrementofa: quemadmodum qui laboribus moderatis ac victus ratione temperata vsi sunt, penitus impatibiles permanent per omnes eiusmodi affectiones. Hic sermo super uno exemplo dictus est, sed in omni genere causæ uerus est. Ac cui liceat integrè in eo exerceri, legat librum de causis procatartidis, id est, externis. Ego uero præsentis libro parcens longitudini uno capite omnem eum comprehendens, finem faciam. Oportet enim in unoquoque causarum genere scutantem qua potissimum facultate morbos committere soleat, deinde considerare congruentes & repugnantes ei dispositiones corporum: scientem ut congruentibus quidem prompta lesio est, aduersus autem ac repugnantibus, quantam uim habeat & magnitudinem contrarietas, tantum inuicti permaneant. Ipse namque uidi nonnunquam eueniente tali cõditione qualem Hippocrates in oppido Cranone fieri dixit, carbunculos grassa non paucos, quorum generatio & alia omnia eo quo ille scripsit modo, planè fuerunt. Quinetiam quæcumque tertio libro Epidemion pestilentia scripsit conditione, ea etiam omnia per aliam similem illi conditionem extiterunt. Summa eorum (ut ipse Hippocrates dixit) putredo fuit, atque id ipsi cognoscentes, statim incipiente conditione quæcumque corpora uidimus humida, statim quouis modo exicare tentauimus: quæcumque uero sicciora, pristinam naturam in his custodiuius: quæcumque uero excrementis plena, purgationibus sanauimus: quas cumque uero obstructiones meatuum, soluius atque aperuius. Sed hæc quidem iam quodam modo ad medendi methodum pertinent, & scilicet in eo opere fulsime dicuntur. Nunc autem eorum mentionem feci, sequutus sermonem docentem quouam modo ab una causa exuperante quidam præhenduntur febre, alij impatibiles permancnt. Dispositiones enim corporum dissimiles, multiformesque sunt: & idcirco quidam facili uincuntur, ac

promptissime patiuntur à causa agente: alij inuicti penitus & impatibiles sunt, aut difficulter patiuntur. Ad eius rei demonstrationem coacti sumus mentionem fecisse etiam curationis, perinde ut Hippocrates facientes, qui alicubi eodem quodam modo celebre illud uerbum adscripsit. Id autem sanatio ipsa indicat.

De præcautione, & quouam modo diaria febris ex bubone consistat. Cap. VII.

Precautio igitur secundum talem quendam modum sanatio est. Quando & ipsa nomina sepe numero confunduntur apud medicos. Vt enim alio libro diximus, omnis medici operatio corporis ipsius uicia corrigit. Sed nihil ad proposita, huiusmodi nominum subtilitate egemus. Siue enim secesin duo nomina totum id, sanationem ac præcautionem, siue in unum ambo colligas, sanationem appellans: non paruo argumento est, non omnes ab eiusmodi causa similiter affici, dispositio corporum quæ prohibita sunt corrippe epidemias ac pestilencibus morbis. Vnum enim primumque consiliu in omnibus commune est, ut corpus maxime uacet excrementis & ad traspiratum habile sit, secundum uero post hoc, ut exuperati causæ repugnes, quoad fieri potest. Quibus uero contraria horum insunt, ocyssime patiuntur, maximeque egrotant. Sed quoniam febrium pestilentium mentionem feci, ex putredine omnium ortum habentium, par est incumbentem animo ad hunc sermonem explicandum hoc loco scrutari de antiqua opinione, omnem febrem consistere ex humorum putredine dicente. Videntur enim ita sentire ij, qui ab Athenæo fluxerunt non obscuri quidem uiri in hac arte, præsertim in ea quæ est de febribus scientia: in quibus ego plurimum cum illis sentio, ueruntamen unum excipio diarias nominatas febres. Non enim mihi uidentur hæc subiecti putredinem humorum: sed qui ob æstum febricitat, ab ipso efficientis causæ calore alterari solet. Ob iram uero febricitat, & ei quidem ebullitionem quandam fieri sanguinis in corde necesse est, non tamen putredinem. Necnon per exercitationem, caliditatem ampliore præter naturam sine humorum putredine accendi, & quisquis cutem habuerit adstrictam, per quam acria excremeta euacuabantur, illis collectis febricitauit sine putredine humorum. Quinetiam febris ex bubone omnis, mala est, excepta ephemera, ut Hippocrates dixit: licet etiam bubo ipse inflammationum genere contineatur. Atque assentio in hoc sermoni putredinis, nam ob eam rem ex inflammatione febricitant, non quoniam admodum Erasistratus existimauit. Atamen nonnullæ sunt ex bubone febres in genere

nere diarium, quemadmodum alie quædam nunciant non faciles curatu morbos, ex inflammatione, aut ulcere, aut abscessu, aut altero quopiam tali in viscere affectu ortum habentes. Cæterum dissident febres ex bubone ab ijs quæ ex putredine humorum consistunt, quæ fit aut in aliquo viscere, aut in cauis ac maximis uasis: quoniam ubi febris ex bubone consistit, pars continua semper calefit, ac calor quidem vsque ad ipsum cordi distribuitur: cæterum putrida fuligo vsque ad ipsum minimè peruenit, sed ibi manet circumscripta in bubonis loco, per alterationem solam continuarum partium ad cor perueniente calore. Quo potissimum modo, etiam per æstum ac per exercitationem ex partibus primò calefactis, distributio ad ipsi principium vitale fit. Vbi autem putredo fuerit in visceribus atque in magnis uasis, veluti fumus, ex putrescètibz humoribus ad ipsos cordis sinus peruenit. Accidit igitur ut humores in bubone quidè oēs cunctim putrescant, siue vno die, siue duobus continenter: upote semper inuicè còuerfantes & inclusi vno loco: in visceribus autem conditi, & in magnis uasis, ut potè transfluentes semper, ac simul putrescèntes quos attigerint, tempore ampliori putridum accendunt calorè. Sed ut uno verbo dicatur, quæadmodum in exteris omnibus, quæcunque calefuit præter naturam à quauis causa, si nequeat putrescere id quod calefit, velut lapis, aut lignu, aut aliquod aliud tale, eò vsque perferuet calidum quoad refrixerit paulatim. Id autem quod putrescere potest, depascentem semper secundum continuitatem habet calorem. Quemadmodum interdum vidi in agro stercus pecudum simul & columborum ex parte quapiam ab ipso sole calefactum ita vehemèter, ut multa exurgeret exhalatio, instar fumi ascendens, uehemèter mordens atque afficiens, & si quis propinquasset, oculos & nares lædens. Porro stercus tangentibus erat ita calidum, ut deureret diutius impositas ipsi manus, aut pedes. Non tamen semper id symptoma durabat: sed sequenti die refrigerabatur quidem quantum stercoria ad summum feruorem pridè peruenierat: quod autem continuum ipsi erat, tunc succendebatur, quado primum stercus in summo feruoris uigore erat: illudq; ipsum (dum hoc inclinabat) rursus incalabat atque effruescebat, ac paulò post summum feruorem obtinebat, primo refrigerato: atque illud rursus inclinabat, dum id quod continuum erat, calorem concipiebat: & paulò post accendebatur quidè hoc & ad summum feruoris perueiebat, prius autem refrigerabatur. Erat autè hæc circuitio ferè tempus dici ac noctis: ita ut exemplum sit maximè conueniens febri quotidianæ. Si verò duobus diebus ac uocibus dicta circuitio fuisset, exemplum foret ita febris ter-

tianæ: & si tribus, quartanæ: & si quatuor, quintanæ, si modò febris vlla quintana est, ipse enim noudum perspicuè vidi, neq; eam circuitiorem, neq; aliquam aliam ultra quartanam. Sed de febribus repetentibus per circuitiorem, post dicetur. Putredo autem humorum quæ fit in uasis, similis putredini quæ in inflammationibus fit, & abscessibus, & alijs phymatis, duplex quidem genere est: ex permixtione autem duorum generum, alia tertia uaria specie existit. Si quidem & mixtionis modi, cum alterum genus maioris minorisq; ratione superet & superetur, facile numerari non possunt. sed ex duobus generibus alterum quidem fit superante uatua, alterum uerò euicid. Superante quidem, ut per inflammationes & phymatosos tumores omnes, pus: in humoribus autem venarum & artierum, id quod subfidet in vrina proportionè puri respondens. Atque hæc putredo non simpliciter putredo censetur, sed etiam habet aliquid concoctionis, manente euim adhuc còcoquendi facultate vasorum, putrescènt tunc humor ad talem alterationem deducitur. Porro alia est putredo concoquendi facultate adeò debili, ut nulla mutatio ad benignum putrescens excrementi efficiatur. Quod fit interdum illa extremè debilis: quamuis putrescens humor sit modicè prauus, interdum autem facultas ad extremam debilitatem minimè deducitur: sed humor extremè prauus existit. Huiusmodi excrementi putredo, neque consistentiā, neque colorem, neque odorem habet vnum: sed putrescens humor semper secundum substantiā permutatur ac uariatur. Altera verò putredo quæ & concoctionem esse diximus, in unam speciem puris semper mutatur, & colorem, & consistentiam, & odorem.

Quod pus optimum sit candidum & crassum & minimè fetidum, & quod optima vrina habeat sedimentu candidu, æquale ac minimè fetidū, & quibus indicijs febris diaria cognoscatur. Cap. VII.

VBt igitur natura ipsa omnino superet pus optimum gignitur, visu candidum ac crassum, & sibi simile vndique: læue autem tangenti, ac minimè fetidum. Quod si velut semiputridum fuerit, tertium genus in tali mutatione (quod paulò suprà diximus) consistit. Porro diximus tale genus maximè multiplex esse. Nam quod magis ac minus recipiat concoctionem, innumerabilis differentia est. Sæpe enim candidum effectum, aut fetidum est, aut tenue consistentiā: quandoque verò non candidum, sed liuidum apparet, atque in omnibus his magis & minus est infinitu. Cæteru quot in abscessibus putredinis differentie sunt, tot in febribus ex putredine accensis vinarum for-

max existunt. Optima enim quæ putrido humore ea virtute quæ continētibus valis infusa est, candidum, læue, æquale, ac minimè foetidum fedimentum habet: Pessima verò, maximè contraria huic est. Ea verò quæ media est, quò magis alteri earum propinquet, tantò melior aut deterior est. Sed de vinarum differentia libro de iudicationibus docuimus. Febres autem accensas ex putredine humorum, alias à diarijs esse existimare oportet. Atque harum agnitio nequaquam difficilis est: quamuis impossibilis quibusdam esse videatur, id quæ ipsa millies indicauimus, prima accessione sedata, lotum ac modicè cibatum ad solitas operationes redire precipientes: cui postea non febricitaturum, & ita accidit. Vnum igitur ac primum indicium febris diariæ, est ab aliqua causa prægressa inceptis recenti atque euidentibus: quam consueverunt omnes medici iuniores appellare causam procatarticam, id est, prægressam. Sed id quamuis inseparabile sit ab huiusmodi febribus, earum proprium minimè est: quoniam & aliæ nonnullæ incipiunt causa quadam euidenti prægressa. Inseparabile verò & proprium est, vrinæ coctio statim primo die: & ad hæc, pulsus in magnitudinem ac celeritatem insignem augmento, ita ut frequentia per exteriorem quietem minimè seruet proportionem. Magis præterea proprium, atque inseparabile earum indicium est, quò contractio minimè crescat in celeritatem: vel si crescat interdum id minimium est, ac cognitu difficile, & paulùm à pulsu naturali recedens. Quinetiam calor suauitatis proprium atque inseparabile est talium febrium. Inseparabile verò & æqualitas & ascensus liber tum in ealiditate, tum in pulsibus, non tamen proprium est. Etenim quibusdam alijs inest: quemadmodum & status clemētia, neque enim id proprium est, quamuis his potissimum inest. Ac melius quidem fuerit hæc quæ communia sunt, quòd per incrementum ac vigorem diarijs præcipue insint, inter propria reponere. Sit enim ita, quamuis non rei species, tamen optimum certissimùmque talium febrium proprium simul atque inseparabile indicium: quemadmodum inclinatio quæ cum sudore aut madore, aut penitus vapore quodam suauitatis, quam integritas perfecta excipiat. Atque his indicijs febres diariæ, promiscuè cognoscuntur. Sed de singulis feorulum secundum speciem agetur.

Quibus indicijs cognosci conueniat febrem putridam, ac de duritie pulsus nonnulla conueniat. Archigenem.
Cap. IX.

ALTERUM autem genus febrium, quòd ex aduersum diarijs diductum est, nullum commune omnium habet. Differentiæ autem primæ duæ existunt, non obscuris

speciebus definitæ: quædam enim ex eis putredine humorum accenduntur, aliæ verò partes ipsas animalis solidas occupant: atque appellant eas hecticas febres, vel quia stabiles sunt ac solutu difficiles, quemadmodum habitus, vel quia ipsum corporis habitum occupant. Ita namque solent nominare solidas partes ex aduersum diductas humoribus. Febres igitur humoribus accensæ cognoscuntur ad hunc modum. Primum igitur indicium, proprium quidem, sed minimè inseparabile est, quò nulla prægressa causa tales præcessit febres; neutri enim aliorum generum hoc inest: eo quòd omnia diaria ex causa prægressa consistat. Hectica autem quoties sine ea existat, nunquam ab initio præhendit. Quocirca quoties sine prægressa causa quis febricitare cæperit, causam huius esse in humoribus, sciendum est. Sed interdum causa quæpiam evidens prægressa, diariam febrem, quantum est in seipsa, committens, febrem ex humorum putredine excitauit, quoties effectum corpus ita se habet, id est, quoties impurum, excrementosumque est. Vbi enim excrementa per diariam febrem plus æquo calefacta fuerint, deinde initium putredinis inde susceperint, alterum febrium genus accendunt, priore sedato. Sed inter noscitur successio talis febris indicio proprio simul atque inseparabili: quòd febris diaria nequaquam desinat ad exquisitam integritatem. Accidit enim interdum, ut per consilium diuigorem diaria transeat in putridam: ac multò magis per inclinationem, quoties (ut paulò ante diximus) maxima tranquillitas febris abest, quæ adesse debet. Hæc sunt transitus indicia. At verò febrem ex rigore inceptisse, nequaquam prægresso æstu vel frigore forti (quale maximè patiuntur, qui per nunc faciunt iter, vel alio modo in vehemēti frigore diuersantur diutius) proprium est & hoc febrium putridarum, sed haudquaquam inseparabile. Neque enim omnibus ipsis, quemadmodum nec horror, inest. is enim non solum non inseparabilis est ab huiusmodi febribus, sed nec vllò pacto proprius est. Ceterum pulsus atque etiam calorem inæqualem esse, siue per initia accessionum, siue per incrementa, talium generi febrium proprium est, sed haudquaquam inseparabile (multæ enim etiam sine inæqualitate sensibili incipiunt, atque ad statum perueniunt.) Iam verò multò minus illud inseparabile est, quòd accessio multas habeat inuersiones: quod repetere accessionem appellamus. Quemadmodum quod pulsus arctior sit (ita verò dicunt, ubi incipiente accessione paruus admodum & inæqualis existat) neque id talium febrium inseparabile est: non tamen commune est alteri vlli generi febrium, sed harum proprium, quemadmodum ipsa inæqualitas, ubi alicuius symptomatis ratione non accidit.

dit. Szpe enim in ipso ore ventriculi collecto quodam prauo humore, ac mordaci vel frigido, paruus simul inæqualisque existit. Sed ubi frigidus humor sit, paruitas: ubi mordax, inæqualitas ipsa exuperat. Sed vomitibus, hæc ambo statim desinunt. Vbi verò ventriculus nihil eius modi patitur, prædictarum generis februm talis pulsus existit. At verò maximum indicium februm putridarum, est caloris qualitas. Nihil enim suaue, neque moderatum, neque diarijs si mile habet. Sed quemadmodum optimi ante nos medici dixerunt, mordax potius quodammodo est, ut offendat, mordeatq; tactum, veluti fumus oculos, ac nares. Verum inter initia accessionum (dum adhuc suffocatur calor, ac succenduntur intus excrementa) non statim immit tentibus manum dignoscitur: sed diutius immo rantibus prædictum caloris genus de profundo emergit. Ac (ut mihi videtur) quum tale ali quid vidisset Themison proprium atque insepara bile esse omnibus febribus existimauit. Sed de his suo loco rursus agetur. Prædictum autem genus caloris perungens (ut ita dixerim) aut erodens (velui medicamentum aliquod acre) impositam manum, putredinis humorum sobo les est, perspicue per incrementa accessionum, atque vigores februm apprens: non tamen statim per initia accessionum perspicue existit. Proprium præterea inseparabile est generi febrium ex humorum putredine instantium, velocitas contractionis pulsus, euidentior qui dem per incrementa, sed minime obscura per ipsos vigores, atque initia accessionum. Comi tatur autem has per initia, paruus simul ac velox pulsus: per vigorem autem, magnus simul ac velox. Nec secus frequentia ipsa per exteriorem quietem perspicua est in eiusmodi febribus, ne que diarijs, neque hectijs similis. Maxime pro prium præterea est talium februm, vrinæ cru ditas, atque obscura concoctio, proprium indi cium est februm ex humoribus consistentium. Neque enim cruda, neque obscurè concocta in febribus diarijs existit. Atque alterutra quidem earum seorsum dicta proprium est februm pu tridarum indicium: sed ambo simul dicta per ipsam enunciationis disunctionem, penitus inseparabilia sunt. Quoniam primæ vrinæ in tali februm genere, uel penitus cruda, vel obscurè concocta existunt. Magnum verò atque insigne indicium concoctionis in primis vrinis nunquam existit per huiusmodi febres, nisi à diarijs in has transeat: id quod paulò ante docuimus. Cæ terum ab his quæ diximus indicijs propo sita februm, id quoque existit, si per ipsum ac cessionis vigorem symptoma quoddam arden tis febris extiterit: quem admodum si quod epia le, ac lipyria, vel semitertianæ, vel typhodis, uel alterius talis febris symptoma fuerit: quæ pro

pria quidem sunt generis februm ex putredine humorum consistentium, non tamen insepara bilia, & ob eam rem, si quidem hæc minime ad fuerint, ex alijs indicium querendum: si uerò ad fuerint, non solum genus talium februm, sed & species una aliqua ex ipsis significatur. Quòd si inclinatio minime desinit ad integritatem, si ue per sudorem, sine etiam aliter fiat, alterum è duobus erit, aut indicium quoddam transeat in alic nam febrem, si superiora omnia diariæ fuerint indicia: sin nullum ex his fuerit, febrem quan dam ex humoribus consistentem statim ab ini tio præhendisse ostenditur. Vbi uerò pulsus pri ma die durus exiit, considerandum num con cretio quædam ex frigore, an siccitas, an tensio conuulsifica in corpore laborantis, an inflam matio quædam, an scirrhus sit: scientes quòd ex his tantummodò pulsus durus efficiatur. Nam Archigenis errores circa notionem, cogniti onemque duri pulsus, in opere de pulsibus abun dè docuimus, in quo versatus sit oportet, qui ad hæc legenda accedet: ac possimum in ea parte quæ de pulsuum dignotione agit. Etenim pulsuum ipsorum nomina ac significata ab eis omnia, omnemque numerum vuo uolumine indicauimus: quod quidem inscriptissimus de dif ferentia pulsuum. Sed quoniam modo vnum quenque conueniat dignoscere, alio uolumine diximus in quatuor libros distincto, quod in scriptissimus De dignotione pulsuum. Quemad modum alios deceps quatuor libros de cau sis pulsuum effecimus: & item quatuor ab ijs dictis de prænotione ex pulsibus: non solum uerbis, sed etiam re ipsa indicantes huius scien tiæ utilitatem. Et si quis nobiscum unà accessit ad ægros horum librorum speculationem re ipsa ostendentibus, cum cætera ei persuasa sunt, tum uerò etiam illud, non esse videlicet durum pulsuum aut proprium talium februm aut inse parabilem. Sed de hoc nunc non est dicendi lo cus: nam prædictis libris diximus, & alijs octo libris quibus expendimus librum de pulsibus Archigenis, abundè huiusmodi symptomata do cuimus hoc loco quod sit necessarium tantum modò indicabitur. Pulsus durus, neq; proprius est, neq; inseparabilis cuiuspiam generis februm, neque diariæ, neque putridæ, neque hecticæ. Sed hecticæ inest magna ex parte, atque interdum in alijs duobus generibus ob symptoma quoddam existit in diaria quidem, quoties febris affligat ob refrigerationem fortem, uel tensio quædam neruosa inest: atq; interdum efficitur ob æstum fortem, uel lassitudinem simul, uel inopiam ali menti, uel uigilias immo dicat, uel euacuati onem: quoties ob alimenti defectum hæc quo que constiterint. Per febres autem putridas pul sus quoq; durus habetur, quoties in viscere inflammationo fatiget, uel scirrhus: & ob sympto

ma aliquod coniunctum, nempe aut ueruosam aliquam tensionem, aut siccitatem, durus quoque sic pulsus euadit, uelut & ijs qui intempestiue frigida bibierunt, aut eadem lauerunt: uel fructus quosdam largiter comederunt. Sed pulsus purus nunquam efficitur per ipsam febrem, quia febris est: neque per ipsam diariam, neque per ipsam putridam, neque enim quoties ex inflammatione febris affligat, eodem modo febris ac pulsus puritatem comitatur: sed febris quidem sequitur puritatem humorum: durities autem tensionem ex repletionem vasorum. Nam (ut semel dicatur) durities tunicae arteriarum accedit, uel propter concretionem, uel tensionem, uel siccitatem. Concretionem igitur refrigeratio uehementer committit: tensionem uero inflammatione ac scirrhus, atque etiam neruorum proportionalis inflammationibus dispositio: siccitatem uero euacuationes diutinae, uel ob alui fluorem, uel leucitatem intestiuorum, uel difficultatem intestiuorum, uel uomitum longum, uel aliud istiusmodi, & fames diutina, atque ardentis febris diutina, & (ut in totum dicatur) quaecunque uehementer exsiccat ipsius animalis partes solidas, uelut & haec: de quibus uunc dicere fuerit tempestiuum, ab eorum generatione exoritur.

Quibus indicijs febris haecica cognoscatur, & quonam modo consumpto admodum humore cordis dispositio efficitur, quam Philippus nominat ex morbo senectam. Cap. X.

FEBRIS igitur haecica nomine efficitur duobus modis, magna ex parte ob febres ardentis, quae proterantur adeo, ut consumant spatio temporis humorem corporis cordis, uel etiam si adhuc multus permaneat. Illa igitur non solum haecica, sed etiam marasmodiam existit. Hae uero quae manente adhuc humore fit, corpus ipsum cordis praehendens, inde maxime accenditur: quemadmodum locernarum flamma ex ellychnio. Atque una quidem eius generatio est prodita. Reliqua autem est, quoties statim ab initio praehendat, primam generationem similem habens diariz ob morem, etiam, lassitudinem magnam cum uisione contrariam. Hanc igitur febrem sanare nequaquam difficile est: quae uero ex eis deuenit in marasmodium propter inscitiam eorum qui adhibiti sunt medicorum, eam sanare non solum non facile, sed etiam impossibile est, quoties plane iam confirmata fuerit, nec praeterea incipiat. Natura enim eius calida ac sicca existit, ac cor similiter afficitur, ut ellychnium in locerna, quoties plurimum crematum fuerit. Et enim ita crustum friabile fit, atque dissoluitur, perditurque continuata praeridit: ut neque

si affundas abunde oleum, quae rursus accendere flammam copiosam. Parua enim atque infirma flammula in ipso concutitur, ac semper minorefficitur, usquequo extinguitur. Atque exacte quidem marasmodis febris huiusmodi existit, nec eadem est cum affectu marcere. Hic enim in ijs efficitur qui consenuerunt sine febre, extincto in illis natuiuo calore (quod potissimum marcere uacua mors est, ac secundum naturam ex siccitate consistens) uelut & in ijs qui emacrescunt praeter naturam, genus illud efficitur, quod Philippus nominat ex morbo senectam. In quam multos nouimus non senes solum, sed etiam pueros incidisse. Febris autem marasmodis non solum sicca, sed & calida affectio est. Extinguitur autem per eam multo celerius calor in animali, atque tabescit totum corpus instar arboris in plenum arefactae, uel ob temporis longiuitudinem, uel flammam uicinatam, uel sortem atque immoderatum squalorem. Sed de tota marcoris affectione, seorsum diximus. Haec autem febris, cum duplex eius genus sit, ut ante diximus, iudicia deinceps explicabimus.

De febre haecica, & quod diaria sapienterò transiit in haecicam: cuius rei indicia multa existunt. Cap. XI.

FEBRIS igitur haecica cum marcere coincidens, promptissime ac facillime cognosci potest. Prius enim quam turgas pulsum atque calorem, oculos supra modum cauos videbis, quasi in fouea quadam conditis, ob totius humiditatis eorum substantiae consumptionem: ita, ut ossa quibus palpebrae annexae sunt, prominent. Quinetiam lippiudines in eis uidentur aridae, ac quaedam squalida dispositio, qualis maxime inest eis, qui per puluerem multum tota die in sole calido fecerunt iter. Flos ipse praeterea uiuidus coloris perijt, atque id toti faciei accidit, & immoderatus squalor habetur totius cutis circa faciem, maximeque circa frontem: ita, ut propter siccitatem, sicca atque intenta sit, non tamen quae palpebras ipsas multum attolleat, perinde affecti semper ut qui dormit reuertitur. Quinetiam conuenit magna ex parte, quemadmodum qui dormit aut. Est autem talis affectio nequaquam somnus, sed impotentia uigilandi. Carnes praeterea consumpserunt: sunt circa tempora, ita ut ea loca collapsa, cauaeque appareant. Nec quicquam aliud omnino quam ossa, ac cutis sunt: ita, ut si eos nodos perspicias, in ventre nullum superesse intestinum, nec ulla uiscera, atque hypochondria ipsa retracta esse ad thoracem admodum uideantur. Quod si libere illos tangere, cutis quidem perquam sicca existit: & ubi attollas apprehendens digitis, quasi corium quoddam stat. Pulsus autem gracilis, durus,

durus, debilis, ac frequens habetur. Calor autem in primo quidem occurſu debilis, ſed paulo poſt acer, atque erodens apparet: maximeque ubi taugendo diutius immeroris. Sed minime conuenit reliqua indicia commemorare in re tam perſpicua. Itaque ſatiſeſt, ut ad ipſum marcorem adhuc incipientem ueniamus. Marcor ergo incipit, quoties humor inſitus in vnoquoque corpore diſperſus per loca media paritum ſimilariū, ex quo membra primum a lunari, ſerè in ipſo corpore cordis nullus amplius ineſt. Quonſque enim aliquid ipſius ſeruatur, heſtica febris tantummodo eſt, nondum tamen maraſmodes. Vbi verò ſerè nihil inſuper huius humoris exiſtit, exquiſitus iam marcor conſiſtit. Difficilis ergo cuiuſlibet heſticae febris diſpoſitio eſt, quoties ipſius principij tempus præterierit. Definio autem principium, non dierum uel horarum numero i quemadmodum neque in cæteris morbis, ſed ipſa qualitate diſpoſitionis, etenim dum corpus ipſum cordis diſcedit ab ipſa temperie naturali, non ſtatim inſitus humor perit, neque facultas debilitatur: ſed in primis velut ebullitio quædam efficitur ipſius humoris quo tempore talis febris faciliſimè curatur: quippe quod ſacilitas nihil dum perpeſſa eſt. Deinceps autem conſumptio quædam ſit ob ebullitione, eaque ipſa amplius iam procedente, ipſa etiam corpora ſimilariā, quæ velut elementa cordis exiſtunt, ſicciora euadunt, minnſque alimentij ſentiunt: ac facultas debilis redditur tantum, quantum ſiccitas ac caliditas in eo exuperat. E quibus alterum ſufficiens erat, ut exuperans inſirmam redderet facultatem. Talis febris iam quodammodo medio genere ambigit, ac media eſt inſanabilis penitus illius maraſmodis, cuiusque quam paulò ante diximus, adhuc incipientem faciliſimè poſſe curari. Atque in ea perquam multa latitudo exiſtit, quoniam non parua affectionis ipſius permutatio maioris minoris que ratione eſt. Itaque quoties ab utraque febre diſcedit æqualiter, ab exquiſita ſcilicet maraſmode, eaque que nondum quippiam euſmodi habet, media quodammodo eſt, & ad curationem ambiguum habens utroque verſus momentum. Quæ autem maraſmodi propior eſt, iſa periculo propinquat: quemadmodum prior alteri propinquior, ſpem obtinet non parum ſanitatiſ. Sed tempus eſt ut ad earum indicia tranſeamus: & primum quidem illius quam poſſe facile curari docuimus, niſi in vulgarem quempiam medicum incidat. Eſt autem, ubi ſola conſiſtit, nequaquam difficilis cogniti: impleſa autem cuiſpiam putridæ, depræhenſu difficilis iam exiſtit ob permixtionem. Sed primam ſubiiciamus ipſam ſolam ex quadam cauſa prædicta conſiſtere, atque apparere in ea prima die cuncta indicia febris diariz. Simul igi-

tur cum eis apparebit ſtatim canſæ prægreſſæ genus, atque id indicabitur procedente oratione. Sed interrogando ægrotum ipſum licebit diſcas, ſi alijs in rebus non malè affectus, ex ira forti tantummodo, uel magiore, febricitare incepit. Quod ſi videantur hæc ita ſe habere, febrisque extendatur vſque in ſecundum diem, nequaquam definens ad integratam: ſed neque vehementior enadens, ſi ſqualidior quidem appareat, ſuſpicari heſticam fore talem debes. Quod ſi tertio die ſine cibo tranſmittere noluert ſuſpectas horas acceſſionis, quæ tertio quoque die præhendere ſolet, ac neque additio ulla facta ſit, neque minioſ inſignis: ſed primæ febris paræ reliquæ extendantur, permanceantque cum ſqualido corpore & calore, mitti quidem in primo occurſu manus apparente: moranti autem diutius acri, mordaci & ſqualido occurrente, talem febrem heſticam eſſe exiſtimare debes. At verò maximum tibi atque certiffimum indicium erit natura eius nutritio homine quando certiffimè uidetur tranſiiſſe omnes horas ſuſpectas. Statim enim à cibo poſt vnam horam vel alteram, omnibus tangentibus ægrotum, alterum incrementum febris ipſa habuille videbitur. Nec deent qui increpet tantam incrementum dantes cibum, & ipſo potiſſimum tempore acceſſionis, & dicat interdum ſiſſe expectandum, & tarda ſe acceſſionem. Sed res non ita ſe habet. Cuiſlibet heſticae febris proprium inſeparabile id eſt, ut ingeſto cibo calor accendatur, pulſusque in magnitudinem ac uelocitatem increſcat: ita ut æqualis eſſe acceſſio uideatur. Aequalis autem acceſſionem uocō, in qua nec horror exiſtit, nec frigus extremorum, neque ſomnus, neque pigrity inſignis, uel inæquiſitas quædam penitus, uel in calore, uel in pulſu, imò nec etiam paruitas, neque debilitas, neque aliud huiusmodi quicquam, ſed tantum alij cuiſpiam nutritio pulſu maior ſtatim ac uelocior redditur. Accidit autem interdum & in alijs quibuſdam febris incrementum æquales: & quod quidem ex ipſo eſt, uidebitur minime eſſe heſticae febris ſymptoma proprium inſeparabile. Sed non parum diſſert, ſi ad vniuerſam dictorum indiciorum collectionem reſpexeris. In omnibus enim alijs febris tales acceſſiones æquales exiſtunt, etiam citra alimentum ingeſtum. In heſtica autem penitus contrarium euenit, nullo enim tempore acceſſio præhendit, ſed una continua febris eſt, uelut ea quæ ſynochos, id eſt continua proprie nominatur. Sed hæc quidem quaſi ſtammam quauddam permulam occurrentem habet imponentibus nianum: præterea pulſus quoque velociſſimus, frequentiffimus, maximusque ei exiſtit. In febre autem heſtica, neque calor ſiſſiſſimus, occurrat, ac pulſus tantò minor, rarior, tardiorque

diorque est quam in synocho, id est, continua, quando calor ipse minor habetur.

De indicij communibus cuique hectica febre, & quomodo causam post ingestum cibum calorem ipsi augeri contingat. Cap. XII.

COMMUNE igitur cuiusvis hectice febris est, ut exigua sit atque æqualis semper, à primo initio vsque ad ultimum finem: Propriū autem eius quæ tabi affinis existit, hectica est: quoniam hectica febris sæpe numero sine licitate cõsistit, nequaquam transiens in marcorem, qualis etiam nunc multis in magna penuria contingit, febris igitur hectica discedit à synocho, id est, continua: quæ admodum dictum iam est. Ab alijs autem habentibus accessiones æquales, eo ipso maxime discedit, quod inæqualitatem quandam illis omnino habere post alimentū sub ipsam accessions præhensionem: hectica autem post alimentum velut accessio quædam æqualis contingat: quæ ut paulo ante docui, minime accessio habetur, sed imperitios circa, talia decipit ob caloris tum multitudinem, tum magnitudinem velocitatem, quæ pulsus. Talis autem febris sequenti die planius cognoscitur, si diligentius observaris, quædiu permaneat post cibum ipsa pulsus caloræque alteratio. Iuuenies enim tamdiu permanere omnium quæ manifeste apparent alterationem, donec distributio alimenti atque adiectio, squalorem cordis humefacit: et deinde rursus ad priusmodum redire statim, qui erat antequam sumeret alimentum. Si igitur alio tempore nutrias ipsum sequenti die, rursusque alio tempore sequenti die, inuenies ita fieri, ut dixi, augeri quidem calorem post cibum, pulsamque ipsam, ut dictum est, alterari. Constat enim illis id accidere, quod calci ac lapidi calefacto. Si enim eis affundas frigidissimam aquam, multo calidiores sentiuntur, tanquam calor squalidus in eis ab humida substantia nutriatur. Quæ autem causa sit ob quam ita eveniat, quæstio naturalis existit: sed quod ita efficiatur, cuius tentare volenti disceat licet. Vbi enim manibus sumas glebulam calcis, contemnes eius caliditatem, ac minime senties. Vbi verò depones ipsam humi, affundas illi aquam, perspicies statim admodum calefieri, atque adeo feruere ut lebetes, quoties in multa flamma versentur. Videbis præterea vaporem ab ea haud exiguum efferris, quod si audeas tangere, facile deuteris. Ad hunc igitur modum ad ipsum sensum, humidus calor non paulo habet vim evidentiorē quā siccus. Cæterum quod calor siccus existat per hecticam febrem cui succedit marcor, hinc discas licebit. Nemo statim ab initio præhensus est tali febre: qui corporis habitum habuerit

humidum: sed qui sicciore naturâ existit, maximeque ubi calidus quoque naturâ sit, & qui vitam delegit in labore, vigilijs, cura, ac victu tenui, is aliolet statim ab initio præhendi hectica febre ex ira, ac morore: ac multo magis, quoties æstas, & constitutio calida ac sicca, locusque eiusmodi fuerit. Principium autem eius terminatur, quoties eo tempore quo diacna per inclinationem mitiorem deducitur ad integritatem, à deo nihil huiusmodi ipsi accidit, ut sicciore per spiritū intendatur: tunc enim initio primū succedens diacna, hectica iam efficitur. Definitur præterea aliter eius incrementum atque perfectio generatio per accessionem tertii diei. Si enim (ut paulo ante diximus) eo die alia accessio minime præhendatur, neque æger sine febre existat, sed sicciore ipsi constanter intendatur, talis febris haud dubie iam hectica est, ac processu temporis marasmodi sine mora cadet, nisi recte curetur. Dehinc autem in abito eius in tabem, cum primum pulsus debilis simul ac durus est, contumque parvus ac frequens is necessarius est, non tamen propterea marasmodi existit, sed propter debilitatem ac duritiam. At verò debilitas accidit ob fortem cordis intemperiem: durities autem, ob siccitatem: quod si tales affectus præhendantur cor ipsum, marasmodi febre detineri animal tunc necesse est. In eandem præterea febrem incidunt ex acuta atque ardenti plerique eorum qui male curantur: maximeque quicumque ubi frigidam aquam bibere postulerent, adeo nihil eiusmodi biberunt, ut ne ullum aliud in frigidans remedium thoraci atque hypochondrijs adhibuerint. Quod si adeo nihil eiusmodi adhibuerunt, ut insuper cataplasmas ex melle plurimum usi sint, quæ nunc frequentius in usu sunt amplius in marcorem incurere his promptus est, siue solū febricitans, siue ex iecoris aut ventris inflammatione. Maxime enim his inflammationibus haud recte curatis succedit marcor: ita, ut quidam existimant non aliter posse fieri huiusmodi affectionem, nequaquam sciētes, quod neutrum horum, nec aliud quodcumque viscus, aut membrum neque marcorem, neque pepitum hectica ullam febrem committat, priusquam (ut diximus) cor ipsum afficiatur. Talis igitur affectio eo incipit, interdum ex seipso, ut ex ira ac morore fortis & longo: interdum ex febre ardenti: quandoque verò ex affectibus pulmonis ac thoracis, maximeque purulentis ac tabidis. Vt autem ex his, ita accidit ex ventre ac iecore: & ut summatim dicatur, quavis diutina inflammatione in parte principe simul cum siccitate totius animalis, maximeque cordis. Ego naque vidi inflammationi laxioris intestini diutius succedere marcorem, ac stomachi, ac vesicæ, ac renum: fuerunt autem nonnulli qui affecti erant difficultate

cultate intestinorum tali febre correpti, eum sci licet laborassent inflammatione intestinorum. Atque etiam leuitates intestinorum, & fluotes intestinorum diutinos, quoties statim ab initio, aut tempore procedente febris exigua incidit, marcor ipse subsequitur, & ut in summa dicatur, quoties præxiccitatum cordis ipsius corpus, febrilem calorem suscepit soluta difficilem.

Maximum indicium esse febris hectica, quoties arteria ipse sine qua corpora que circiter sunt, calidiores: & quod non oporteat solam circuitionem, sed ipsum febrium genus considerare. Cap. XIII.

MAXIMUM itaque signum febris hectice est, quoties arterie ipse sentiuntur calidiores quam corpora que circiter sunt quod per alias febres illis minimè accidit. Fit autem symptoma adhuc euidentius ubi laueris, aut alio quouis modo rarefeceris, ita ut humor quidam profusit, atque calor ipse perspiret. Calor enim moderatus in alijs partibus omnibus post talem perspirationem apparet in ipsis autem arterijs nequaquam minor est priore. Is uero quàm maximè ex quilitate sentitur per pulsû diastolas, qui minimè mutatur post dictam expirationem: sed similis penitus permanet. Sola ergo consistens hectica febris perspicua est, siue absolutò sermone hectica, siue etiâ marasmodè sit. Vbi uero cum alia quapiâ fuerit, difficultus iam cognoscitur quæmadmodum quæ uuper mulieri cuiuspiam accidit, cui non solum die, sed etiam nocte non obseurè siebat accessio. Latuit enim marasmodè febris omnes qui eam uisitabant, Medicos, existimantes oportere, neque principium præhensiuus sensibile esse hecticæ febris, neque incrementum, neque uigorem, tanquam minimè contingat hecticam febrem putridæ ali cui posse implicari: sed nobis statim primis diebus in hac muliere cognita est. Vtraque enim accessio quæ die ac nocte siebat, breues efficiebat partes accessions, ac sæpe cum madore quodâ, aut perspiratione vaporosa soluebat tam perspicuè, ut corpus ipsum bene temperatum tangentibus sentiretur. Indicia aut in arterijs paulò ante dicta semper extiterunt, nequaquam refrigeratis ipsis similitet alijs partibus, neque uelocitatem aut frequentiam motus amittentibus. Quæ ergo alio loco sæpenumero docuimus, etiâ nunc dicimus: non oportere solum circuitiones, atque proportionales accessionum considerare, sed multò prius ipsam speciem febris: ex eaq; cognoscere ipsam febrem, quæmadmodum ipsum hominem ex propria forma. Sic ipsi sæpe primâ die ad hunc modum speciem febris cognouimus, minimè expectantes tertianam, aut quartanam, aut quotidianam circuitionem. Sed de his secundo libro de iudicijs latius docuimus, atque eo ipso libro nihilominus diximus quomodo oporteat

diariz febris cognoscere differentias. Promissam autem (scio) me dicturum hoc loco de illis. Sed cum recordare pauca in eo libro desiderari, quo in plenum de omnibus præceptum esset, alla quidem huc transcribere superuacuum dixi, adiiciam uero eo tantummodò quæ intra modum sunt in eo prodita.

Quibus indicijs febres diariz a se huiusmodi discrepant: quoniam interdum propter æstum, quandoque ex frigore ipso febris diariz consistit. Cap. XIII.

FEBRICITANTIBUS igitur propter æstum, cutis magis ad habitum calidiorem & squallidior, quâ pulsus ad febrilem dispositionem mutatur: quocirca fitis minùs hostestatur ubi equalè habet caliditatem. Ac primo occurrit maior calor in ipsis uigere uidetur, contra quam in egrotantibus propter astrictiōem, in his enim increfcit, Caput præterea perurî maximè uidetur ijs, qui propter æstum febriant. Gaudentq; magis & iuuantur frigidis fomentis atque ipsorum oculi calidiores & rubicundiores, uidentur, cum siccitate, antequam line grauedine & defluxione febriant. Quibusdam enim propter æstum talia accidunt, ea putque ipsi red dunt non solum calidum, sed etiam plenum sanguine: ita ut omnes tunc admodum contentantur, quæ circa oculos & tempora & frontem & faciem totam habent. Quod autem pleni sunt non minimum indicium est, unde discernantur ab ijs qui ex humorum refrigerio febriant. Hi enim ubi caput malè afficitur, promptè præhenduntur grauedine & defluxione, & febris ipsa interdum symptoma est solius in capite dispositionis. Sed magna ex parte tunc magis febriant, cum corpus totum refrigeratû est, nec exultû. At uero cutis minùs calida refrigeratur, atque in tumore maiori corpus exilit, nec quicquam squalor circa faciem, qualis propter æstum febriantibus euenit line capitis repletionem. Sed magna ex parte caput solet talibus repleri ab æstu, nisi quis fuerit admodum purus, ac line excrementis: ijs enim tantummodò contingit calefcere caput line repletionem permanere. Verumtamen interdum line repletionem multus calor phendit ipsû totû exultû. Hæc igitur affectio perspicuè desidet ab ea quâ trigus excitauit. At quæ cum repletionem est, difficile distinguit: ut potè defluxionem inferens ac grauedinè, quæ et refrigeratis accidunt sed (ut diximus) squalor & magnus calor cutis, & quæcunq; alia paulò autè dixi, propria istorû existunt: de quibus in plenû libro de curandis uia & ratione dicitur, cum alijs omnibus diariz febris differentijs: quarum dagnotiones quia secundo libro de iudicijs peritrimus, nò èt hoc loco dicendæ sunt: sed hunc quidè librum hic finiemus, deinceps uero febrium ex humoribus accensarû omnes differentias indicabimus.

CL. GAL. PERGAMENI
DE DIFFERENTIIS FEBRIVM
LIBR. SECVNDVS,

LAVRENTIO LAVRENTIANO
FLORENTINO INTERPRETE.



De differentijs febrium ex humorum putredine infestantium: ubi refellit opinionem ponentium omnem febrem putridam fieri ex abundansia bilis. Cap. I.



EQUIVA vt de differentia febrium ex humorum putredine infestantium differamus: id prius de eis admonentes, minimè sufficere (ut quidam uoluerunt) ad generationem febrium augeri at-

que exuperare humorem biliosum, quem alij palidam, nonnulli flauam nominant bilem. Omnes enim aequati maxima sic afficerentur febre, quibus copia talis bilis in toto corpore continetur: sed baudquaquàm febricitant prius, quàm alia quedam causa concurrat, de qua paulò post agetur. At uerò absurdum est in quartana & quotidiana febre exquisita colligi: amarum bilem existimare, quèa dmodum in tertiana atque caulo. Etenim contra quàm in illis in quotidiana, & quartana febre, neque vomitus biliosus neque sudor, neque urina, neque deiectiones uidentur biliosæ: præterea nec quicquam aliud quod præcessit, aut simul ad eisdem, subscribit. Febres enim tertiana præ plurima consistit in corpore natura biliosa, & in ætate uigoris, quæ est omnium ætatum maximè biliosa, & æstiuo tempore maximè quo talis humor exuperat. Frigidum in regione calida & sicca temperamento & conditione ambientis aeris tali, & uita non ociosa ac desidii plurimum, sed in labore, cura, uigilijs, æstu, & uictu parco, atque calido & sicco. Quin & immoderatus usus medicamentorum caletacientium & exiccantium committit febrem tertianam. Quotidiana uerò e contrario penitus efficitur in natura pituitiosiore, ac tempore hyberno, & cōditiōne frigida & humida, senibus & pueris potius, in regione frigida & humida, & uita ociosa simul cum repletionem, maximèque quoties post cibum lauatur: ac multò magis, ubi ipse cibi pituitiosior natura existit. Sed neque uomunt tales biliosum humorem, neque deiciunt, neque sudant, quemadmodum in tertiana febre. Hæc enim ex flaua bile putrescente fieri solet: quotidiana uerò pituitiosum humorem sublequitur, quomodo quartana melancholicum. Sic namque natura corporis magis melancholica, & ætas inclinans, & autumnus tempus, necnon omnia his proportionalia in cibo potuque, & toto uictu, frigida & sicca temperamento, febrem gignunt quæ

tanam. Et ob eam rem præcedens eas rigor nequaquam similis est sed in tertiana quasi pungens ac vulnerans sensum, efficientem causam indicat: in quartana autem quasi refrigerans. Sed de forma rigoris libro de causis symptomatum diffinitum abundè iam est, ubi etiam de eiusdem generis febrium differentia est proditum: nempe ex eis intermittentes (ita appello eas, quæ ad integritatem sensibilem desinunt) ex humore moto ac in omnem corporis partem delato efficiente febrem, consistere: synochos uerò ex condito & contento in uenis, de quarum cognitione secundò libro de iudicijs docuimus.

Febrium intermittentium tres haberi differentias: quotidianam, tertianam, & quartanam, atque esse synochon, id est, continuentem, quam flaua bilis committat.
Cap. II.

FEBRIVM igitur intermittentium omnes differentie tres existunt: quotidiana, tertiana, & quartana. ex pituita putri, quotidiana: ex utraque bile, flaua quidem, tertiana: atra autem, quartana efficitur. Continuarum uerò quæ ex flaua bile consistunt duplex genus est: unum quidem earum quæ synochi, id est, continentes appellantur, quarum omne tempus una accessio est ab initio usque ad finem. Alterum, earum quæ communis, sed ambiguo genere continuæ dicuntur, & multis particularibus. circuitionibus continentur. Cæterum synochon differentia omnino tres existunt. Quædam enim earum ab initio usque ad finem æqualis persistit, quædam paulatim crescit, quædam paulatim decrescit. Ac nonnulli primam nominant homotonomam, & acmaisticam, id est, æqualiter affligentem ac uigentem: alteram anabaticam & epaemaisticam, id est, ascendentem atque inrescentem: tertiam uerò paracmaisticam, id est, inclinantem appellant. Synochon porro duæ differentie primæ existunt. Nam alie tertio quoque die tantummodò habent accessiones, alie die intermedio alteram inferunt accessionem. Atque hæc nullum nomen peculiare obtinent. Febrem autem tertio quoque die accedentem, ego quidem nomino tertianam fuisse: non tamen prohibeo, si libeat, aliter appellare, modò serues in rebus ipsis differentiam. Alia enim est natura, quoties desinunt ad integritatem, alia quoties ad inclinationem febrilem finiuntur, febres continuæ alternis diebus accessione habentes. Et ad hæc ubi in medio altera fuerit accessio, natura quædam diuersa est: sed nullam ex his semitertianam appello, non tamen prohibeo ita nominare volentes, si id unum mihi caueatur ab eis, ut nulli febri genus omittatur, sed unumquodque deinceps dicatur quèa dmodum ego nunc in hoc libro facere institui. Ex continuis. n. quæ in die medio accedunt, quædā

C in for-

in forma quotidianæ procedit, duas accessiones simillimas inuicem efficiens: quædam verò dissimiles habens duas accessiones, primæ quidem tertiam simillimam obtinet, secundæ verò quartam, in forma duarum tertianarum procedens: sed hæc ex bile potius illa singulis diebus similiter accedens, ex pituitoso humore consistit. Porro tertium aliud genus est febrium continuarum raro eueniens, quoties accessio in forma quartanæ circuitur procedit, nequaquam definies ad integritatem. Accidit autem, quædam modum febris tertio quoque die accedens, interdum duplex ac triplex: ita etiam hæc non solum duplex, sed etiam triplex. Sed hi febrium inplexus libro de typis commodius indicantur. Febrium autem simplicium ex humoribus instantium simplices differentiæ tot numero sunt, quot proximè docuimus. Ex earum autem premixtionem aliz quædam efficiuntur, de quibus deinceps dicam, si prius de simplicibus quod deest, adicero: ut quæcumque fuerit omnino simplex febris, vnam speciem quasi regulam quandam obtineat earum, quas proximè iudicabimus. Quæcumque verò degenerat aliquatenus, catenus ab ipsis febribus simplicibus abscedit.

Quoniam modo ex flaua bile delata in vniuersum corpus rigor existat: & ut ipsius tertiana accessio, quod longissimum sit, horas duodecim occupet,
Cap. III.

FEBRIS igitur excitata ex flaua bile delata per corpora sententia, præhendit cum rigore, atque caudæ est: & vomitu bilis, vel deiectione, uel sudore, uel quibuscumque horum, nec omnibus simul soluitur. Huius febris longitudo accessions quæ maxima sit, horarum est æquinoctialium duodecim: atque appellamus eam exquisitam tertianam, ex temperamento ægri bilioso, ac tempore, & regione, & conditione, & uisitu calido & sicco effectam. Sed omnia alia paulò autè docuimus, quæcumque conducunt ad eius generationem. Atque accessio breuior est magna ex parte, quam quæ antea dicta est longitudo, perquam multam maioris ac minoris obtineat differentiam: uel propter quantitatem & qualitatem ipsius bilis, uel propter ægri vires, uel propter præsentem tunc in ægro corpore dispositionem. Bilis enim copiosior, longiorem quam paucior efficit accessionem: tenuis, breuiorem quam crassa. Sic uerò & vires ualidiores, breuiorem: imbecilliores, longiorem. Et corporis dispositio raris quidem, breuiorem: densa uerò longiorem. At uerò tempus intermissionis in tali febre, ex pulsu indicium putredinis humoris penitus obscurum habet, sequenti die ac nocte post accessionem. Leuiter autem succensa egrè cognosci potest primis partibus posterioris diei: sed adhuc clarius

circa fines eiusdem diei aut noctis: atque adhuc clarius proxima die uel nocte, quæ præcedit scilicet diem aut noctem accessionis. Sanè in ea ipsa perspicuum iam est indicium: multoque magis, quoties accessio præhendat: ac multò magis, ubi ascendat ad ipsum consistendi vigorem. In eo uerò minus quam per incrementum, rursusquæ multò minus per inclinationem. Hanc febrem si libeat nominare exquisitam tertianam, nomine uteris antiquo: si minus, ac certè nobis dabis ita nominare gratia perspicuitatis doctrinæ.

Pituitam refrigerare partes extremas per initia accessionum, difficulterque accendi calorem minime purum, sed similem fumo quasi viridioribus accensis lignis. Cap. IIII.

ALIA porro est simplex ac exquisita febris ex pituita putri, quæ per membra sententia pellitur ab ipsa natura, consistens. Ea incipit ex frigore partium extremarum, atque horore potius, quam rigore: difficulter accenditur, longumque obtinet incrementum ad ipsum consistendi vigorem: quoniam humor ipse ex quo consistit, frigidus atque humidus est temperamento, ac glutinosus consistentia. Itaque difficulter accenditur, ac tardè mouetur sepe in ipsis meatibus hyrens. Ac premit quidem interdum, grauaturque uires. Inæqualem autem ac magis debilem efficit paruumque pulsum in principio ac primo incremento. Per febrem uerò biliosam existit inter initia accessionum unaqueque affectio ex dictis circa pulsum: sed ab illa quidè citò abeunt, tum alia, tum etiam inæqualitas, quæ magna ex parte nec cum talibus febribus accedit, nec tales febres contrahitur. Calor autem ipse non multò postquam destitit rigor, accenditur luculentus, quemadmodum ignis quidam planè purus, in quo nulla fumosa caligo inuehitur. Calorem uerò pituitosi humoris assimilabilis ignis fumoso lignorum uiridium accensorem. Euacuationes igitur in eo paucæ existunt, ac longitudo accessionis diuturnior: & tempus intermissionis non æquæ ac primum purum est, sed semper seruans in calore & pulsu, putredinis humoris indicium. At uerò & in hac febre circa principia, atque incrementa accessionum indicium putredinis est manifestissimum. Attamen & hæc ubi exquisita fuerit, uidetur multis habere puram intermissionem: & nos ipsi ita etiam non raro dicimus, quoties importuna sermonis curiositas uidetur. Accidit autem naturæ corporis, tempori, regioni, tempestati, studio, victui, & alijs omnibus pituitosis. Accedit uerò singulis diebus, quauis minus calida sit quam biliosa, quæ tertio quoque die fatigat. Sed constat hanc quidem quoniam & humorem habet accensum facilem, & propter semper ob tenuitatem quicquid eius teruelfactum est per accessionem, expurgatur) ad

ad integritatem quādam magis puram definire, & exiguum post accessionem veltigū putridi caloris relinquere: eam verò quæ ex pituita consistit, nec integrè purgari per inclinationes accessionum, nec exiguum, quod velut succendatur, relinquere. Inde ergo efficitur & intermissio potest deterior, & secundæ accessionis maturius principium.

De quartana quæ ex atra bile consistit, & quomodo fieri possit, ut rigor sine febre efficiatur. Cap. V.

AT verò tertium genus intermittētium febrium, quartana scilicet exquisita, quoties ex humore melancholico solo efficitur frigidò siccòq; temperie, paulatim quidem succenditur: quæ admodum sapis quidam, uel testa, uel os, uel aliud quoddam sic frigidum & siccū corpus. Vbi verò flamma quædam ex eo accensa est, nihil relinquit fumosum, neque femiustum post accessionem: & ob eam rem euacuationes plures ex tali humore quā puitoso, & intermissio planè pura esse videtur, eo quòd hic omne id humoris melancholici quod est accensum euacuat, atque discutitur: Et ob eam rem accidit illis rigor, qualis potissimum in forti frigore refrigeratis: non qualis interdum existit per æstum uel lassitudinem, uel medicamentum calidum, ac mordax viceri adhibuit. Ceterum necesse est hanc febrem antecessisse quicquid colligit atram bilem, ex vitæ genere, victu, cæli statu, tempore, regione, natura & ætate ægri melancholica. Accessio præterea huius febris longitudine temporis, tertianæ similis est: atque interdum accidit, ut sit longior, quamuis exquisita sit, quoniā ex humore frigidiore consistit. Causa autem similis est in his febribus & alijs omnibus quæ differentiam longitudinis efficit accessionum, quæ admodum paulò antè diximus in exquisita tertiana: in multitudine & qualitate humoris, & robore & infirmitate virium, & ad hæc ipsa ægri dispositione differentiam habente. Nam & alia omnia proportionem respondent ipsi quæ ex humore bilioso consistunt. Quocirca si humor melancholicus neque putrescat, neque uehementer feratur per corpora sentientia, nequaquam efficit melancholicam circuitione exquisitam. Sanè atque affecibus proportionem respondent ex lie-morbi diutini melancholici, corporisque totius colores fædi. Et erysipelatibus ac herpetibus qui ex flaua bile consistunt, cancri & phagedæne proportionem respondent. Sed neque ex his neque ex melancholicis affecibus necessariò febricitant, nisi prius humor melancholicus & biliosus putrescat. Natura enim semper nititur, suis viribus utens, assimilare partibus nutriendis quicquid fieri utile potest: excernere autem id quod minime illiusmodi est. Quòd si inter-

dum præ crassitie, uel copia, uel lentore excernenti, uel stipatione quadam meatuum, uel sua ipsius debilitate nequaquam possit excernere humorem vniuersum prauum, immorantem diutius in ipso corpore animalis putrescere necesse est. Nullus enim alius humor permanere qualis exiit ab initio, potest, nedum qui adeò uiciosus est ut ab ipsa natura cultum amplius suscipere non possit: sed aut concoctus apponitur atque assimilatur solidis animalis partibus, aut corumpitur atque putrescit. Ad hunc modum atque affecibus, quoties humor biliosus exuperans in corpore diutius immoratur, febris superuenit. Sæpe etiam dispositio in iecore & in splene attulit febrem, quoties aut inflammatio aliqua, aut obstructio committit prædictos affectus. Pari ratione nec ubi pituitosus humor exuperat, febris sequitur, nisi putrescat prius. Atque ob hunc quidem, quod ab antiquis existimatur esse impossibile, sæpenumero visum est: id autem est tunc febre rigor, qui nonnullis quidem semel accidit, nonnullis autem etiam per circuitum pluribus diebus, uel continuus ab initio vsq; ad finem, uel omnino ita mediocri, ut nequaquam esse videatur, quoties quiescerint, sed ubi moueantur tantummodò efficiat sensum: vel etiā maior, ut etiam sine motu infestet. Sed quoties talis humor spacio temporis putrescat, non rigent solidi: sed etiam febricitant. Et diuturna admodum & soluta difficilis febris in quotidianæ forma talis affectus sequitur.

De febre epiala qua simul febricitant ac rigent, ac de humore quem Praxagoras vitreum appellauit, & quoniam pituita genera sint. Cap. VI.

HOc genere continetur febris epiala propriè nominata, quoties simul febricitant ac rigent: & utrunque sentiunt, eodè tempore in quauis corporis parte. Sanè Archigenes existimat de nulla altera nomen epialon dici, quod de uia hac feberi. Sed constat Atticos quosdam viros rigorem ante febrem ita appellare. Enim uerò Praxagoras uidetur mihi appellare uitreum, humorem talem. Recentiores autem, & quibus Philippos est, erudum simpliciter, nullum adijcientes uocabulum ad exquisitam definitionem. Is profectò ex specie puitosi humoris est: ut qui admodum frigidus atque humidus sit. Quisquis enim humor frigidus simul & humidus fuerit, sub ipsam phlegmatis, id est, pituitæ cadix appellationem, si quis Hippocraticè & ex omnium consuetudine noui solum ueterum, sed etiam aliorum scriptorum nominare uoluerit. Prodicus enim libro de natura hominis præuè nominat, errans circa tale uocabulum ipsa de miranda etymologia adductus. Sed non est præsentis temporis ad talia deflectere orationem, cum

aliam dicimus illis disputatione. Ergo rursus ad institutum veniamus. Quisquis in corpore humor fuerit frigidus & humidus, ipsi hunc nominamus pituita: quæ si libet appellabitur scindapsum. Ad id sane nulla mihi vocabulorum est cura. At uero scias huius humoris plures esse differentias. Nam una quidem species eius est admodum frigida: ita ut maximos dolores adferat, cum in locum calidum impacta est. Et sæpenumero multos dolores eorum qui colici dicuntur, ex acri clysmate tali humore euacuato, statim sedatos intueri licet. Hic autem humor videtur similis aspectu vitro fuso. Altera uero species pituitæ est, quam excreantes sæpe expuunt quidam sensibilem obtinens dulcedinem. Constatq; eam uicquaqum posse esse omnino frigidam, si recordamur eorum quæ libro de simplicium medicamentorum viribus docuimus. Tertia præterea species alia pituitæ est, quæ ipsis expuentibus acida sentitur, ac minus quam vitrea, magis quam dulcis frigida est. quemadmodum altera salsa habetur, aut ob putrefactionem, aut ob permixtionem falsæ ferossæ humiditatis: ex qua feberricantes minime rigent, sed horrent tantummodo, præhendente accessione. Acida autem ac vitrea si moueatur, per corpora sententia permeans, infert rigor sine febre. Quod si qua putredo moderata illis adfuerit, epialam committit febrem. Sin magis putrefcat, rigor puenit: febris ipsa subsequitur, deiecto frigore ab ipsa multitudine caliditatis, ita ut nullo modo existat per incrementa & vires accessionum. At uero vitrea pituita fortitan acide qualitatis percipitur est: ita ut omnes eius differentiarum tres existant: acida, dulcis, salsa, atque ex pituita dulci putrescente rigor minime antecedit febrem. fortitan uero neque simpliciter, neque à simplici causa quis existimaret tales fieri febres. Siquidem quicquid pituitæ putrescit, accendit febrem: reliquum nondum putrescens, ex quo rigent non eiusdem est qualitatis, cum ea quæ putrescit. Si igitur ab hac quidem rigent, putrefacta uero febris efficitur, duplex semper causa erit. Licet uero hic dicere febrem ab altero quidem fieri causæ genere, rigorem autem ab alio: ut qui non sit, quod febris. Per febrem tamen tertianam flaua bilis & rigorem efficit, & febrem. Sed hæc logicæ magis sunt considerationis: nos ad institutum nostrum redeamus. Permixta pituita putrescente, ex qua fieri quotidianam docuimus, cum bilioso humore efficiente tertianam, composita duplexq; causa & dispositio fuerit. Alter nam humor unoquoque die, alter tertio quoque die committit accessionem: ita ut unus dies duas habeat accessiones: alter uero unam, cum tempora accessionis in eadem horas minime iungunt. Vbi enim incidant, una erit confusa, neque tertianæ, neque quotidianæ exactam speciem seruans. Et quoniam utraque febris duplex est, im-

plexus quatuor erunt. Unus, in quo tertiana permiscetur quotidianæ: secundus, in quo tertiana permiscetur continuæ quotidianæ: tertius, in quo permiscetur quotidiana tertianæ continuæ: quartus autem, in quo permiscetur quotidiana continua tertianæ continuæ.

Quot modis fieri cõueniat implexus febrium, ex quibus æger minime deducitur ad integritatem.

Cap. VII.

CAETERVM unicuiusque dictorum implexuum differentia duplex est. Interdum enim omnes accessiones eodem tempore simul inuadunt, quandoque diuersis temporibus accessiones præhendunt. Sed hi cognosci facili possunt, præterquam quod sæpe intermittens minime cognoscitur à parum exercitatis: quoniam ægri nunquam deducuntur ad integritatem, sed oportet speciem considerare accessionis, quemadmodum secundo libro de iudicio fati dictum iam est, & inde cognoscere, non ex ipsa circuituum proportionem. Snbiaciatur enim uenisse cuiquam circa horam primam, accessionem simul cum rigore, qui uideatur uulnerare carnem laborantis, deinde omnia alia tertianæ febris indicia usq; ad uigorem processisse: cum uomitu bilis simul cum sudore benigno inclinare, atq; esse iam diei horam nonam. Porro coniectare nos ex toto accessionis motu, circa undecimam horam sine febre fore ægrotum, ea scilicet integritate quam in circuitibus nominare solemus. Ita uero sperantibus statim subsistere indorem, aut defata solum, aut etiam iohorrescente cute. Deinde initium, atque incrementum, & ad hæc uigorem in genere continuæ febris pituitosæ sequi, duplicem profecto ita cognoscemus causam esse ac speciem febrium, mixta intermittente cum continua, quamuis nulla inueniatur intermissio. Ac sequenti quidem die speramus præhensuram accessionem hora nona, & si ut expectabamus res ipsa ueniat, penitus tertio die similiter sperabimus adhuc feberricante ægrotum, iterum præhensuram cum tertianæ febris accessionem hora prima. Quod si præueniat, aut cunctetur accessio, quam secunda die sperabamus fore hora nona, atque ea quam tertio die credebamus futuram prima hora: non etiam posthac sequentibus diebus, neque nonam horam, neque primam expectabimus, sed tantò prius aut posterius, quanto proportio primæ circuituonis accessionem præuenisse ab hora qua initio cepit, aut tardasse, indicauit. Utra uero earum defutura sit prius, tùm ex febris specie coniectandum est, tùm ex ipsa accessionis longitudine, & magnitudine, & more, & motu, & item circuituum repetitione, & anticipationem & tardationem, & adhuc iudicijs quæ postea appareat cruditis & concoctionis totius morbi, quorum

quorum in vrina maxima esse videntur. Ac de his omnibus libro de iudicijs satis dictum est. Quod si picuitiosa continua nequaquam ad nonam horam, sed quintam aut sextam excipit intermittentem biliosam, quæ prima hora incipit, adhuc difficultior cognitio est vulgo isti medicorum, quibus talis consideratio minimè curæ est, an scilicet sit vñ febrili genus quod infestat, an duo, & quodnam utrumque sit. Cæterum tamquam nihil horum cognoscentes, non solum nesciunt quonam modo oporteat curare eas quæ nequaquam cognoscuntur qualesnam sint, sed neque utrum secunda die suspectas habere conueniat vtrasque horas, quæ prima die accessiones attulerunt. Ego namque (scio) visus sum eis sæpenumero vaticinando potius quam præsentando, ut medici solent coniecisse initium accessionis.

Permiseri inuicem febres, scilicet tertianam exquisitam & quotidianam & quonam modo Agabianus errauerit circa semitertianam. Cap. VIII.

PER hanc igitur mixtionem (de qua nunc agimus) tertianæ cum ea quæ quotidie accedit, vidi interdum circa primam horam præhendere accessionem exquisitæ tertianæ, circa sextam autem existeret accessionem eius, quam recentiores medici propiè nominant *καθήμερον*, id est, quotidianam. Solent enim ita nonnulli uocare febrem, quæ singulis diebus accedit, nequaquam desinens ad integritatem. Ipse verò solutus sum talem nominare *αυγήμερον σωματι*, id est quotidianam continuam. nomen enim *καθήμερον*, nequaquam licet inuenire apud quemquam Græcorum scriptum, sed *αυγήμερον* appellat rem omnem quæ singulis diebus similiter fit, sed ut Plato dixit, continere oportet nomina eos quibus tantarum aequalium rerum proposita est consideratio. Appellatur igitur, gratia calor doctrinæ, ea quæ singulis diebus accedens definit ad integritatem, quotidiana simpliciter, nihil insuper addendo vel per orationem: ea uero quæ minimè desinit, quotidiana continua: ea licet tibi, si libeat, alteri adijcere, intermittens. Pari ratione dicendum, & de ea quæ tertio quoque die accedit. Altera enim differentia tertiana simpliciter, uel etiam intermittens tertiana habetur: altera tertiana continua est. Licet uerò & continuam tertianam nominare tertianam simpliciter, sine adiectione ulla: quæmodum nonnulli appellant. Sed enim non opus est fusius disputare de nominibus: sed redire ad institutum. Nam adolescens in quo dixi implexum existisse tertianæ cum quotidiana continua, prima quidem die mane incipit cum rigore tertianæ proprio febrili, alia omnia seruans exquisitæ tertianæ indicia usque ad sextam horam, subitoque vomitum biliosum, ac paruum sudorem, à quo statim contractus est

atque inhorruit homo: deinde rursus præhendente accessione, pulsus erat parvus & inæqualis: post usque ad horam undecimam, succensa adhuc paulatim, pleraque ipsius accessionis habebat propria: pauci uerò quæpiam ipsi quoque incrementi: deinde usque ad noctis horam quæ tam incrementum diligens erat, post in eadem magnitudine permanebat ad ipsum quidem summum, usque ad horam noctis sextam. Vnde iam perspicue uidebatur inclinare usque ad quartam horam in secundo die. In ea enim contrahebatur, atque ipsius accessionis indicia ostendebantur, partibus quidè ipsius extremis frigidioribus cuta dentibus, pulsus autem paruo: atque incresebat usque ad uesperam paulatim, neque horrorem quæpiam, nec inæqualitatem aliam efficiens: deinde rursus uigebat circa horam quartam sextam, ac sensibilibiter inclinare incipiebat circa sextam. Ac quod quidem tertio die hora circiter secunda oportebat eius expectare accessionem fore quotidianam, perspicuum erat: non tamen tertiana, an seruatura esset eandem horam, an non, perspicuum erat. Accessio igitur horifica incipit hora secunda, quæ citius quam pro accessione, in prima ac secunda die continuæ quæ cotidie increscens usque ad quintam horam, initium rursus alterum fecit post quintam horam, atque ei erant omnia symptomata similia ijs quæ secundæ die existerant. Deinde rursus incresece promptius usque ad octauam horam, rursus horruit in illa hora, ac paulo post accessio propè accesserat increscens: ita ut circa horam noctis quæ tam ad consistendi vigorem deduceretur. Equidnam aliud quam exquisitæ semitertianæ hæc accessio existit? Cùm due febres eadem hora inciperent, eo quod quæ singulis diebus repetebat, duabus horis præuenisset: tertiana uerò duabus horis tardasset. Quocirca nescitis dignoscere speciem febris perspicue uideri potuissent temperata ac permixta tertianæ, ac continuæ quæ cotidie symptomatica. Cùm enim tertiana cum rigore incipiat, quotidiana uerò sine rigore, permixta ex utrisque horrore statim inferebat, rem quidem minorem rigore, maiorem uerò frigore: ac tantò maiorem frigore, quantò minor rigore est. Quapropter æqualiter distans ab extremis utrisque horror in medio amborum collocatur, rigoris scilicet atque frigoris: id quod temperata inuicem extremis gottissimum fieri solet. Ergo non ab re nomen tali febrili semitertianam indiderunt. Temperata enim ex quotidiana continua ac tertiana intermittente, totius sue naturæ partem dimidiam utraq; prædictarum febrium habet. Ve igitur hemionus, id est, mulus est ac semideus dictus: eodem modo semitertianam. Mulus enim medietatem quidem equi conducentis ei ad generationem, medietatē uerò asini habens, ab altero eorum tantummodò dictus est.

& semideus, indicatur quidē participare Dei medietatem; quod autem homo sit altera ex parte, omittitur. Itidem semiteriana, medietatem alteram habet tertianam, medietatem alteram quotidianam continuam. Sed duplex modus generationis eius est, aut enim in vnum tempus duæ accessiones concurrent, ut paulò antè dixi, quia altera præuenit, altera cunctatur: aut ambæ statim ab initio inuicem temperantur. Ac quæ quidem ambabus in unum tempus coeuntibus sit, vnam solam habet accessionem naturæ ipsius semitertianæ: altera uerò, omnes ab initio morbi usque in finem, quæ maximè propriè semitertiana ab omnibus nominatur. Sed de hoc paulò post agemus, potissimum propter Agathinum & Archigenem. Adolescenti igitur quem nostra narratio supposuit, tertio die tali veniente accessione, propterea quod in unum tempus ambarum febrium accessiones incidissent, præueniente duabus horis quotidianæ ipsius accessione semper, tertiana autem cunctante semper duabus, accessio quarta die incipit, oriente sole speciem seruans exactam febris pituitosæ. Futurum autè ex proportionem erat, ut quinta ab ea accessio inciperet circa decimam horam noctis quoniam semper præueniebat horis duabus ab initio: tertia autem accessio febris biliosæ habitura principiū erat quinta die, hora quarta, ita ut medium interstitium initij duarum accessionum foret sex horarum, quod & factum est, circa decimam horam quartæ noctis incipiente accessione secundum speciem pituitosæ febris: atque ita procedente usque ad horam quartam diei, coeunte uerò cum biliosâ simul modico rigore, deinde rursus permixtâ speciem habente accessione secundum biliosæ simul ac pituitosæ speciem. At uerò subsequenti nocte circa octauam horam pituitosæ febris incipiens exquisita ac sola, totam obtinuit sequentem diem, quæ sexta fuit: tunc autem usque ad mediam noctem inclinans, inde rursus incipit eodem modo. Postea reliquam noctem medietatè, & tempus usque ad meridiem septimæ diei obtinens, iam quodammodo inclinauit. Sed tertiana ei successit cum rigore incipiens, quemadmodum solet incipere exquisita tertiana: atque alia omnia eodem modo exquisita afferens indicia, bilis vomitum effecit, & deiectionem biliosam, & urinam bonam, & quandam madorem crepusculo vespertino, indicans perspicuè ijs qui didigerunt cognoscere genera febrium, quæ remitteretur, atque inclinaret, & solueda esset post vnam, vel (cum tardissimè) alteram circuitionem. Etenim inclinatio facilitatem habuit mirabilem quandam, & qualè nulla ex prioribus, usque ad horam noctis quartam. In illa enim febris pituitosa singulis diebus accedens, horis autem duabus præueniens, incipit, atque occupans totam noctem, & totum sequentem diem, rursus incipit octaua nocte, secunda hora:

quam quidem noctem totam occupans inclinavit sequenti die nono. Accessio autem tertianæ erat futura in illa die circa octauam horam: quoniam duabus horis cunctabatur. Sed tunc circa horam nonam incipit, indicans adhuc eo sus inclinationem. Sole autem occidente coiuuit cum ea accessio pituitosa, anticipando inuadens, quæ admodum solita erat: & noctem occupans illam, & sequentem diem, rursus incipit decimo die, hora decima. Dein rursus undecima die hora octaua exactè permanens pituitosa: deinde circa horam noctis primâ, initium horricum tertianæ febris quatuor horis tardantis exitit. tunc autè sexta hora noctis venter deiecit biliosa, & quidam in toto corpore sudor exitit: & post hæc tota inclinatio prope integritatem deuenit, atque erat iam perspicuum tertianam delituisse integrè, pituitosam autem esse relicta solam iam & inclinantem. Has igitur ob res circa duodecimam diem, nec insuper accessio præuenit horis duabus, quemadmodum antea solita erat: sed septima hora incipit, deinde circa decimâ tertiam hanc quæ sexta: sed tardauit, ac septima hora incipit, ostendens insignem facilitatem atque inclinationem. Quartocimo autem die inclinatio multò melior exitit, atque accessio incipit hora nona, & in urina insignem concoctionis indicium apparuit, prænunciâs fore solutionem futuro decretorio, sed de hoc nunc non est sermo, nisi obiter. Quod autem sæpè numero permiscerentur diuersi generis febres medicorum vulgus latentes biliosæ scilicet pituitosis, itemque continuæ intermittentibus, præsertim pueri ægrotus abundè indicauit.

De differentia semitertiana. Cap. IX.

SED cum de his satis dixerimus, ad id quod paulò antè promissimus, rursus veniamus. Composita enim ex tertiana & quotidiana continua (quam vocamus semitertianam) uel habet flauam bilem exuperantem, proindeque flagbilis symptomata vehementia: uel hanc pauciorum, pituitam uerò copiosiorum, proindeque quotidianæ continuæ pathemata certiora: uel neutrum altero humore exuperantem, sed ambos æquales, quæ sanè exquisita semitertiana est, talis specie qualem Hippocrates indicauit, scribēs libro primo Epidemion ad hunc modum. Plerique in hunc modum afficiebantur. Febres horrida, continua, acuta, in totum minime intermittens. Modus autem semitertianæ erat, diem quidam uacuum habens leuiorem, altero autem grauius affligens, atque ad acutiorem dispositionem increfcescens. Horrificam autem dixi, non simpliciter febrem incipientem cum horrore (nā innumeris febribus id accidit, de quibus deinceps docebo) sed in qua bonâ partem accessionis horror occupat altera diutaxat die, in qua simul inuadunt tertiana

tiana ac quotidiana continua. Sequens enim dies quotidiana tautummodo odò habet. Quocirca prima dies magna ex parte permixtam ex utrifque febrem committit: fecunda autem continuam quotidianam. Interdum enim prima die incipere pituitosam, fecunda autem vtrunque contingit. Accessio igitur communis ex utrifque quoties æqualis fuerint humores, talis est, qualem paulò antè descripsimus semitertianam. Vbi uerò tertiana exuperat, febris magis horrida est, & aliquid uigoris in accessione assumit. Statim itaque calidior talis est atque ardentior, ac celerius peruenit ad consistendi vigorem: & item quandam bilis vomitum, vel deiectionem, uel madorem infert. Vbi uerò humor pituitosus exuperet frigus extremarum partium exuperat, & horror paruus est; & pulsus contractio fortior ac diuturnior est, ac lentè accessio incrementi, & multo post tempore viget: non tamen sitim efficit, neque ardorem, neque uomitus, neque deiectionem biliosam, uel madorem exurit. Atque huius mixtionis duarum febrium etiam Archigenes ipse in notitiis quandam deuenit, sed confusè & incertè, quemadmodum indicauimus septimo libro, quem contra ipsius commentarios de pulsibus effecimus. Existimat enim in semitertianam quandoque exuperare tertianam febrem, quandoque quotidianam: non tamen mixtionem æqualem earum quæ solæ semitertianam exquisitam committit, aut cognouit, aut indicauit, sed peritus omisit. Cùm enim æquales magnitudine sunt intermittens tertiana & quotidiana continua, initium accessionis cum horrore existit, id enim medium rigoris, per frictionisque existit, è quibus alterum tertiana, alterum quotidiana continua inest. Incrementum uerò post initium propter tertianam faciliè suscipit caliditatem, atque ad consistendi vigorem festinat: propter pituitosam autem tardum, quantum in ea est efficientem incrementum, inhibetur atque interruptitur. Atque est ueluti quedam pugna symptomatum, interdum incallescens ægro, quoties tertiana calor vehementius agens ad cutem humores effert, detinente autem interdum ac retrahente intro huius motum pituita, quæ ociosa ac frigida est ex natura, ac difficilè mouetur, & tardè transmutatur. At uerò in tali pugna, exuperante frigido humore, contractio efficitur, & horror ac frigus partium extremarum & cutis: ita ut altera accessio rursus incipere videatur. Quod si calidior exuperet, uniuersum calebit, & propè ad vigorem peruenisse uidentur. Dein paulò post exuperante pituitoso, ægri rursus contrahuntur, refrigerantur & horrent. Id quod minimè definit usque ad consistendi vigorem, qui maturius quàm pro pituitoso humore, tardius quàm pro bilioso existit: quoniam pituitosus detinet biliosi celeritatem, biliosus tamen tarditatem ac segnitiam pituitosi accelerat. Atque hu-

ijsmodi quidem exquisita semitertiana est, ex æquali temperamento duarum febrium & duorum humorum effecta. Ea uerò quæ minimè exquisita est, uel humorem biliosum, uel pituitosum obtinet ampliolem.

Semitertianam esse febrem continuam, nec unquam deduci ad integritatem: sed errasse Agathinum, vocantem semitertianam omnem febrem diuturniorem. Cap. X.

AT uerò fecunda implexio ac mixtio est duarum febrium tertianæ & quotidianæ, sublimilem efficiens accessionem prædictæ, sed differentem eam: quod hæc deducatur ad integritatem, & quod fecunda die, uel cum horrore uel rigore quotidiana sola effecta, incipiat. Quocirca talis febris non insuper semitertiana erit: siquidem semitertiana continua censetur. Si uerò in altero genere febrium eam annumeremus, non solum talis, sed etiam alia quedam febres nominabuntur semitertianæ. Ob eam rem mihi uidetur Agathinus omnes producias tertianas, appellare semitertianas. Sedenim cum de nominibus potius quàm de rebus tales questiones sunt, immorandum in eis minimè censeo. Nam alio libro seorsum de uocabulis medicinalibus dictum iam est: in quo id ostenditur ac definitur in plenum, quænam sint de rebus, & quænam de nominibus controuersia. Quocirca rursum ad res ipsas redeamus, semitertianam ab Hippocrate nominatam horridam & continuam, quam tertiana quotidiana continue permixta committit: intermittenti autem, minimè efficitur propterea quod febris ex utraque composita, necessariò & ipsa intermittens existit. Neque uerò ex duabus continuis, biliosa scilicet ac pituitosa, fieri potest semitertiana, neque enim mixtio horridam faciet febrem, neque multas ingeminationes habentem. Cùm enim omnis continua febris suapte ratione, eum exquisita est, neque habeat horrorem, neque rigorem: neque etiam febris ex eis composita, horrida erit. Oportet ergo si eadem futura sit horrida simul ac continua, generationem habere eam ex duabus febribus: altera quidem intermittente, altera autem continua. Et ob eam rem tertiana permixta quotidiana continuæ committit semitertianam: neque ambæ intermittentes, neque ambæ continue possunt committere talem febrem. Restat igitur una mixtio quæ ex quotidiana intermittente, ac biliosa continua constat, potest continuam simul atque horridam committere febrem. Restat igitur hæc contra quàm prima, habebit continuatatem quidem ex biliosa, horrorem autem ex pituitosa, atque ingeminationes ex pugna mutua, maximeque quoties humores ipsi fuerint æquales. Vincens uerò eorum alterutrum ex symptomatis agnitio

agnitio in prima mitione declarata est. Hæc omnia de quatuor mitionibus bilioſæ febris ac pituitofæ, magis propria sunt libro qui est de typis: sed hic neceſſario dicta sunt propter ſemiteritianam: cuius generationem Archigenes ad tertianam quotidianamque retulit: nequaquam videns ſe intermittentem efflicere febrem. Agathinus verò perſpicuè conſeſſus eſt eiſdem generis eſſe cum tertiana ſemiteritianam, diſſidentem tantummodò magnitudine acceſſionis. Si igitur omnes febrium differentiæ accuratè perſequuti, lapſi nominibus eſſent, fuiſſet id ſerendum. Sed cum neque ſimplicium, neque compoſitarum omnes ſcripſerint differentiæ, & ad hæc quaſdam alias ſuperſuſcitas adiecerint, nihil neque in præſenſionem, neque in curationem iuvantes, nos conati ſumus pro viribus diligenter excolere omnem typum, longo tempore, ex uſu ſimul ac ratione, utiles in eo differentiæ perueſtigantes. Simples ergo ad præſentem attinent librum: implexæ autem ex his, attineant ad librum de typis, cuius penitus ignarus non eris, ubi hunc diligenter evolueris. Ex ijs enim quæ diximus de febre pituitofa ac bilioſa innicem permixtis, licebit hæc ad atram bilem tranſferentes, de implexu cum utraque earum ac temperamēto coniungere: implexam nominantes, ubi diuerſis horis incipiant temperamentum, ubi initium eodem tempore ſit. Nec ſecus tres febres implicare ac temperare quis per ſe ipſe poterit ſumpta ratione de prædictis. Horum enim omnium initium, ſons & elementum eſt, diligenter internoscere cuiusque ſimplicium febrium ſpeciem. Neque enim magnus numerus earum eſt: ſed omnes tres exiſtunt, bilioſa, melancholica, ac pituitofa, quarum cuiusque duplex differentia eſt, intermittens & continua, ita ut omnes ſimplices differentiæ febrium ex humoribus putridis conſiſtentium ſex numero ſint. Quod ſi qua alia illis acceſſerit, in his particulatim differentia ex copia humoris, quantitate & qualitate putredinis, necnon modo motus, & parte in qua putreſcit, generationem habebit.

Quo paſſo erret Agathinus, appellans febrem omnem ſemiteritianam, cuius acceſſio plurimum producat. Cap. XI.

QVALE hoc ſit quod iam proponatur ex ijs febribus intermittentibus quæ tertio quoque die inſeſtant, cui quidem & acceſſionis tempus breue eſt, & initium cum rigore, & ſolutio cum ſudore ac nomitu bilis, uel etiā interna alio deijciente bilioſa: huic nomen inditum eſt exquisita tertiana: cui verò aliquid horum deſeſt, non am plius exquisita, ſed ſimpliciter tertiana vocatur. Quod ſi & intermittiſſionem maiorem habuerit, producta ſcilicet acceſſione, ter-

tianam hanc nominant productam: tameſſi hæc maioris minorisque ratione differentiam magnam obtineat. Ac licet hanc quidem abſoluto ſermone appellare productam, quæ cum quatuor & viginti horas acceſſionis occupauerit, reliquas ſine febre obtinet: hanc verò admodum productam, cum circiter triginta horas febris producit: & hanc præterea magis productam, cum ad ſex & triginta procedit: & hanc aliam plurimum cum ad quadraginta & eo amplius producat. Sed hæc omnia definire certi terminis non licet ob acrualem dubitationem. Neque verò neceſſe eſt talem nomen ſubtilitatem querere, cum liceat nobis etiam ſine ea indicare ijs qui adunt ei ligenter de vnoquoque ægro, & rectè curare, ac euentum morbi, præſentare. Subijciamus enim quempiam quindecim horis febricitare, eſſe autem ſine febre tribus & triginta, atque id deinceps ei accidere ex proportionem. Sanè cibandi tempus certa ſcientia ſumere licebit tum ex acceſſionis, tum intermittiſſionis tempore, & quicquid ex eo ſumi vtile poteſt ad præſenſionem & curationem, id quoque abundè ſuppetet, etiam ſi non quarta tertianam abſoluto ſermone oporteat nominare talem febrem, au cum quadam alia adiectione deſiniente ipſam differentiam. Quin & volens indicare alia ratione febrem egri quænam ſit, diligentius indicabit, acceſſionis & intermittiſſionis dicens longitudinem, quàm quærens nomen quod perſpicuè, ac deſinitè indicare idem queat. Hæc igitur optima enarratio, atque doctrina eſt. Secunda autem eſt quam paulò antè dixi, exquisitam quandam tertianam nominans, aliam verò ſimpliciter tertianam, mox aliam paulum productam, deinde aliam admodum, aliam autem magis, poſtremo plurimum aliam. Sed ex omnibus obſcuſiſſima ac peſſima eſt, quæ prima eſt prodita: ob quam recentiores medici quorundam inter ſe certant atque contendunt, ne id quidem cognoscentes ſe de nomine contendere. Sed de alijs quis fortalle minus mirabatur: de Agathino verò magis mirandum, liquidem productam quandam nominans quotidianam & quartanam, in tertiana minime ſeruat proportionem: ſed cuius amplius producta fuerit acceſſio hanc nominat ſemiteritianam. Sed de nominum ratione hæcenus, nam & ipſe plus quàm par eſt temporis in iſtis contro, prouide tempus eſt, ut ad conſiderationem aliarum rerum redeamus.

Quoniam modo ex ſanguine putreſcente febris accendatur bilioſa: & quod ſanguinis pars tenuior vertatur in ſilicem bilem, crauior in atram. Cap. XII.

SEQUENS eſt ut agitur conſideratio nihilò nutrior, utrum quemadmodum ob nranq; bilem ac putritiam ſunt genera quædam febrium, ita & ob ſanguinem putreſcentem eueniat

Febriſ

Febris enim diaria, eo tantummodo calefactio (ut diximus) haudquaquam putrefactio consistit. Per ipsam verò putrefactionem (necesse est enim interdu sanguinem putrescere) quærendum febrium ipsarum genus. Id autem inuentum iri par est, si prius inuenierimus quoniam modo sanguis putrescit. Constat enim Aristotelem recte dixisse, fieri putrefactionem ab aliena caliditate, intelligit autem alienam, externam, non nativam, nec vnicuique rei propriam. Hæc enim concoquere: aliena verò corrumpere solet, quod est putrefacere. Extrinsecus autem caliditas superuenit sanguini per æstum, ac pestilentem constitutionem, & ut summatim dicam, per omnes febres ex quacunque causa in generationem deducuntur. Quinetiam ubi in quapiam animalis parte sanguis copiosior collectus, supra vires eius fuerit, corrumpitur: maximèque quoties infarctus est ob crassitiem in parvis valis, aut impaetus ob copiam. Quemadmodum accidit in bubone & phymatis, & ut in summa dicam, in omni inflammatione. Nam in tali dispositione sanguis duplci ex causa corrumpitur: tum quia minimè diffilatur, tum quia à natura minimè vincitur. Quod autem quæ minimè diffilantur, putrescere soleant, in cunctis exteris corporibus inueniri licet, fructibus, seminibus, acque etiam vestibus: atque persuadere id quod dicimus, maximè potest pleuritis. Expuunt enim per eam alij spumofam, alij pallidam, alij rubram sanie, quæ nihil aliud est quàm humoris in inflammatione vincentis pars quæ non continetur, sed præ tenuitate foras refudat. Interdum etiam talis sanies nigra apparet, ac neque statim ab initio, sed processu temporis, præcedente magna ex parte pallido sputo, quod erat indicium fluxus bilis exuperantis: quemadmodum spumofum putitæ, rubrum sanguinis. Quocirca ratione non caret interdum putrescere sanguinem ipsum in locis inflammatione affectis, febremque ex eo simpliciorum esse quàm ex alijs humoribus. Proportionem autem accessionum tertianæ circuitionis potissimum sumit (ita enim fieri cernitur & in pleuritide quoties rubrum expuunt) ubi verò supra modum assatur, mutatur penitus. Pars enim tenuissima simul ac pinguis in pallidam bilem: crassior autem in atram vertitur, quemadmodum accidit in carbunculis. Et enim in his sanguis vehementer feruifacitus mutatur in humorem melancholicum. Ad hunc uerò modum inaudire oportet humorem melancholicum, tanquam nondum effectus sit æra bilis: sed in confinio quodam collocatus. Febres igitur consistunt pro specie humoris, in quem sanguis mutatur, tantummodo disidentis malignitate & elementia. Simpliciores enim sunt ex mutatione sanguinis: tum cætera: tum caloris lenitate. Est enim quàm maximè multis manus occurfus depræbendatur, prorsus tamen mitis est: quemad-

modum ia qui post balnea accidit. Copia enim caloris febrilis in ipsa cistiuu copia semper posita est: molestia verò, si ad moueas extrinsecus manum, in ipsa caliditatis acrimonia, idque erit tibi indicium maximum humoris committentis febrem: intelligo autem ipsius caloris qualitatem. Qui enim vaporosior est atque minùs molestus, sanguis est: qui molestus, erodensque & mordax, exbile consistit. Vbi verò in primo occurfu vaporosus potius quàm mordax sentitur, diutius autem immorantibus paulatim ei acrimonia accedit, eaque maximè inæqualia, ita ut per colum quoddam veleribrum transmitti videatur talem febrem ex pituita putrescente consilere sciendum est.

Multa morborum genera repetere per circuitionem, ut ophthalmiam, capitis dolorem, podagram, dolorem articulare. Cap. XIII.

CARTERVM consideranti mihi quærenti quæ causam ob quam febres ex alijs humoribus calorem habent æqualiter occurrentem: quæ verò ex pituita consistunt, dictam obtinent inæqualitatem: apparuit mihi potissimum causa esse lentor crassitiesque humoris, & dissolutionis difficultas. Huius enim, ut aliorum omnium, quicquid semper extenuatum est, per halitum digeritur: vix autem extenuatur, quicquid crassissimum: ac multò minùs, si frigidum natura sit. Quocirca neque torum nec æqualiter, sed quicquid putredo occupauerit, id solum in status vertitur, ac extenuatum foras fertur, ac perinde euenit ut in glutinosis crassisque humoribus externis dum elixantur. Existunt enim ex eis bullæ, quibus ruptis spiritus vniuersi educiunt, simul secum abducens humorem attenuatum. Vbi verò tenuis humor elixatur, neque bullæ efficiuntur, & qui ab eo attollitur vapor omnino similia ac conuini subijpi est, sed cum de his satis dictum sit, sequens est ut agamus de causa febrium synochorum. Mirum enim mihi esse videtur sæpe vsque ad quartum vel quintum, & interdum vsque ad septimum diem, unam fieri accessionem in eis ab initio vsque ad finem. Quanquam si quis consideret diligenter, magis mirum est quasdam febres repetere per circuitionem. Exemplum enim supradictum à nobis de stercore particulatim putrescente, non perinde potest accidere, cū in corpore animalis putrescentes humores cum his qui putredine uacant, facile misceri possint, ut potè cum ex omnibus confusus, conspiratioque in omnia existat. Quocirca minimè fieri potest ut putredo in una aliqua parte, alijs alia fiat, nisi inflammatio colligatur detineat incipientem putrescere humorem. Cum igitur ratio in contrarium cedat, difficiliorque sit inuenire causam febrium circuitione repetentium quàm synochorum,

rum, de utrisque nitemur differere, neque hic producentes sermonem, neque contradicentes erratis aliorum, sed (ut in omnibus ante fecimus) veritatem ipsam tantummodo persequentes, quatinus positis deprehendere errata aliorum. Incipendum igitur ab ijs quæ manifestissimè apparent, cuiusmodi sunt ophthalmiæ quædam, quarum hæc quidem singulis diebus, hæc autem tertio quoque die infestare cernuntur. Nec secus auri dolor & capitis, vel totius, vel dimidii, quem nominant hemicraniam. Nonnullis verò etiam podagra ac dolor articularis repetit per circulationem. Vt igitur in his omnibus videre licet venas ipsas in partibus quæ infestantur in tomorem auolli, & phlegmonem auferere, & dolores intendi, & fluxionem insignem foras procumbere: ita existimandum est in partibus iatensis, quæ minimè apparent leuari eadem proportionem. Verbi gratia per inflammationem pleuritides, ac peripneumonix intumescere quidem inter initia accessionum, discuti uerò ac subsidere per inclinationem. Sed quoniam modo id fiat fuisse inuenimus, si ea quæ de inflammationis generatione & rheumaticis affectionibus uocatis alibi demonstrata sunt, ad memoriam reuocauerimus. Si enim simul cum illis addecerò quæ conque propria huic sermoni sunt, præsentibus quæstionibus sufficient.

Quam ob causam fluxiones certis temporibus decumbunt, ex quod partes debiliores promptius suscipiant excrementa. Cap. XIII.

FLUXIONEM igitur decumbentem in oculos, omnes quidem concedunt ab ipso capite defluere, sed quænam causa sit ob quam præfinita circulatione sæpenuerò defluat, dicere minimè possunt: ut qui nequaquam commentati sint in facultatibus naturalibus, de quibus ipsi tribus libris perscripsimus, indicantes omnes quætenor esse, à quibus plantæ & animalia gubernantur. Vna ergo est quæ attrahit proprium alimentum, altera id ipsum detinet: tertia autem ab his alterat: quarta ab his aliena expellit. Alienum autem in omnibus rebus duplex est: alterum qualitate, alterum quantitate. Id uerò propter situm in ipsis partibus facultatum fortitudinem atque imbecillitatem colligitur. Nam si quidem partibus sint viribus, & motus deferentes excrementa se habuerint secundum naturam, partes ipsæ sanæ sunt: si uerò plus quàm alterari queat assumptum sit, excrementum omne externi à facultate expultrice pulsus necesse est. Quod si hæc imbecillis sit, eodem in loco manere recessit. Atque si multum sit, grauat eum ipsum, atque distendit, si acre fit erodit & mordet, quemadmodum si calidum sit, calefacit: si frigidum, frigefacit, atque hæc perspicua sunt in ijs quæ in ventre

habentur. Quidam nanque ingredientes plus alimenti, interdum vomere coguntur nauseabundi: interdum alui fluore corripuntur. Quod igitur hic per maxima spacia excrementa eructantia foras excrementum, id in alijs partibus animalis per tenues meatus non foras, sed ex alijs in alias transiit partes: expellentibus quidem fortioribus, suscipientibus uerò debiliores. Porro rursus expellitur ex his in alias, atque ex illis in alias defluit, quousque in debilissimas omnium decumbat. Id autem rursus recurrere inde in alias fortiores nequaquam possibile est. Atque ob eam rem per phlethoram ac uitium humorum partes omnium debilissimæ alijs inflammatione, alijs erysipellate, uel herpetibus, uel alia quapiam affectione prehendantur, aut habent affectionem quam rheumaticam nominant, de qua seorsum scripsimus. Quocirca minimè mirum uideri debet, cerebrum uel etiam totum interdum caput ubi collegit aliquod excrementum, in aliquam partem debiliorem expellere, aut in aures, aut oculos, aut tempora, aut labrum, aut dentes, aut genas, aut palaium, aut gingiuas, & gurgulionem, & tonsillas, & adenas ibi contentos: atque ubi nullum ex his fuerit imbecille, in thoracem, pulmonem, fauces, gulam, uentriculum, fluxionem transmittit. Quemadmodum ergo caput sæpenuerò prædictorum etique causa morbi est: ita inflammationis in iecore & liene, proximarum aliqua partium, aut etiam nichil, una longius positarum, uel plures quæ excrementa gi-gnunt, augent, transmittunt, & circulatione affligunt. Ac nihil mihi est his accidere afflicti similem excretioni excrementorum uentriculi. Quemadmodum igitur si quis uideret quidem quædam quotidie excrenuntur, ignoraret autē causam excretionis, miraretur ordinem: ita qui nescit neque generationis in capite excrementorum, neque excretionis causam, ignorat autē & quæmodum hæc foras decumbant, illa in aliquam aliā partem transluant: hæret atque miratur influxus proportionem. Pari autem modo, & qui ignorat quæ partes excrementum iocinori transmittunt, miratur proportionem excitatarum ex iecore febrium. At qui nouit decumbentem in uiscus fluxionem & primum phlegmones initium dedisse, & sequentis accessionis ipsam partē affectam autorem esse, mirari desinit.

Quoniam modo ex calore attrahuntur excrementa: & quod dolor omnis irriset fluxiones. Cap. XV.

CASTERVM duplex causa est huiusmodi influxus humorum, uia quam proximè indeaui, quoties ex alijs partibus in alias debiliores excrementa transmittuntur, altera uerò, quoties attrahuntur, de qua hoc loco agendum, initio sermonis petito ab ijs quæ omnibus prospici-

causa confecta que sunt. Si enim taphiam illinas cui-
piam, videbis paruo tempore partem huic esse ca-
lidiorē, atque in tumore non paruum attolli.
Nec secus si foueas partē quampiam iuxta ignē,
aut fortiter frices, aut vngas resina, aut pice mo-
dicē calida, deinde paulo pōst euellas vniuersum,
aut si etiam vngas partem quopiam medicamen-
to calido, videbis enim ex his omnibus ipsam at-
tollī in molem: quia calor ipse, ac ad se trahere,
vel suscipere solet fluxionem. Verū necesse
non est in præsens ita definire, id quod vile est
instituto iam habētes, etiam sine huiusmodi con-
templatione. Semper enim in partes vehemen-
tius calciscentes decumbere fluxio videtur: ubi
corpora plena sunt, atque abundanti excrementis,
admodum larga; ubi vacanti excrementis, pauci.
Decumbit præterea maxime & in dolentes. Sic
namque sæpe cui sumus digitus manus minima
acu punctus est, statim dolere, & paulo pōst par-
tes que circiter sunt inflammatione laborantē,
atque in molem maximam tolluntur. Quibus-
dam verò etiam bubones sub ipsis alis erumpunt,
ubi acceperint aliquid fluxionis rara & spongiosa
que ibi habentur corpora, quos Græci nomi-
nant adeas. Quibusdam autem accidit id in me-
dio brachio ubi insignis adneca parte extiterit.
Perspicue id quod dicimus videre licet, quoties
oleus aliquod exiguum sine inflammatione ac do-
lore prope vnguem fuerit. Si enim hoc contem-
natur, neque coeat, & ad cicatricem deducatur,
innata ipsi caro ab vngue pressa primum quidem
dolat, deinde totus digitus, aliquando verò & eo-
rum corpus, & interdum manus vel pes in maxi-
mam deducitur inflammationem. Ita igitur do-
lor attrahit in dolore affectas partes fluxionem,
non tamen causam huius hic dicere oportet. Ali-
bi enim contramodius est dicta, nec illius in præ-
sens indigemus. Videntur ergo iam causæ flu-
xionum ex ipsis partibus laborantibus fluxione
ortæ esse duplices. Vna ex calore qui in eis ac-
cenditur: altera ex dolore qui superuenit. Causæ
autem cur aut plus, aut minus, aut benignius, aut
deterius influat, est non in ipsis solum partibus la-
borantibus fluxione: sed cur benignius deteriusue
influat, in ipsis partibus mittentibus causa est: cur
autem plus minusue, in utrisque. Calor enim for-
tis ac dolor, plus debilius, minus attrahit. Eidem
corpora excrementis uacua exiguum quiddam
erabonibus mittunt: excrementosa autem ac ple-
thorica tantò plus mittunt, quanto ab ipso natu-
ræ habitu longius recesserint. Atque hæc quidem
fluxionum differentie sine debilitate partium flu-
xione laborantium existunt. Aliæ verò & ob ha-
rum debilitatem, ac fortitudinem mittentium ex-
crementa, efficiuntur. Omnis enim inflammatio
sine vulnere ac collisione præhensens partem,
excrementis quibusdam decumbentibus ex for-
tioribus in debiiora efficit. Tali autem inflam-

matio statim accendit febrem, quoties ob magni
rudinem, aut vicinitatem calor ex ea ad cor per-
uenit. Decumbentia igitur excrementa in omni
inflammatione putrescent propter causas prius
dictas. Nec similiter omnia putrescunt, eo quod
quædam sunt pituitosa, alia melancholica, non-
nulla biliosa. Ipsi autem putrescentibus accen-
ditur calor præter naturam in parte inflamma-
tione affecta: simul quidem calefaciens quæcum-
que primæ tangunt inflammatione obsessas par-
tes, deinde illis continuas, ex quibus rursus alie
ratione vicinitatis calefaciunt, rursusque alie ab il-
lis usque ad ipsum cor deferunt interdum calidi-
tatem. Sed quanam sit dispositio in parte in-
flammatione affecta, diximus in libro de intem-
perie inæquali: & item in libro de tumoribus præ-
ter naturam. Quod autem necesse sit contentum
in ea sanguinem putrescere sæpenumero, simul cum
materia quæ influxit, in hoc dicitur: *inflammatio*

*Colligit excrementa diuersis temporibus, quæ sæpe
numero ordinem minime seruent, atque esse quan-
doque breuem, quandoque longam affectionem.*
Cap. XVI.

EXCREMENTVM igitur quod decubuit ex
vna parte in aliam, interdum adeo multum
præuicquumque est, ut partis laborantis fluxio-
ne lædat vires: interdum adeo mite ac exiguum,
ut suscipiens corpus minime offendant. Si igitur
adeo debilitet vires ut exoluantur, nec præterea
eueiant ea que prius sinecebant, tunc sanguinem
putrescere necesse est duplici ratione: & quia hu-
mor minime euictus à calore proprio reliquum
habet in putredinem mutationem: & quia simul
cum excrementis putrescentibus putrescit. Sin
non tantum lædat vires ut exolantur penitus quie-
scant, semiprauus & tanquam semiputris, in tali
constitutione sanguis efficitur: vicinitate qui-
dem putrescentium excrementorum simul putre-
scens, persistens tamen in suis ipsius natura
quantum est in ratione facultatis ipsum cogitantis.
Vtunque autem se res habeat, accessus calor per
primam putredinem penitus acrior ac mordacior
est quam foret dum per naturam haberet, atque
tantum crescit, quantum natura ipsa excremen-
torum sufficit. Hæc enim talem habent propor-
tionem ad calorem ex eis accensum, qualem li-
gna ad ignem obtinent. Hæc tamen minime in
indefinitum tempus sufficiunt ad alterationem: sed
terminus alterationis ipsis est, humoris innati cō-
sumptio: nam eousque cremari queunt, dum in-
naturam habuerint humorem: atque eo consum-
pto cremari desinunt, ac reliquæ eorum nomi-
nantur cinis. Quinetiam putrescentium humo-
rum similiter calor permanet dum prorsus sint as-
sati, par est autem reliquiis humorum terrestres
exiguas esse nequaquam multas, quemadmodum
lignorum:

ignorum: propterea quòd in substantia eorum elementum humidum exuperat, non siccum. Simili modo si libeat coquere humorum externorum quempiam, ut oleum aut uinum, terrestre quidem eius qui minimū relinquitur, reliquum autem eorum extenuatum, in uaporem atque aerem discedet. Itaque tota substantia seruata eorum humorum ex putredine extenuatorum ab ipso calore in ambientem dispergitur per uigorem, inclinationemque febrium. Remanet autem iam excrementum omnino exiguum, uel nullum: In humoribus quidem crassioribus exiguum, in serioribus autem nullum. Quòd si nulla debilitas extiterit uirium partis inflammatione laborantis, nec rursus mittantur excrementa & morbus solutus est, & postea haud iterum febricitauerit homo, neque sequenti die, neque tertio quoque die, neque quarto quoque. Quòd si ob eandem causam mittantur excrementa ob quam ab initio parti mittebantur, aut si hæc quidem non amplius mittantur, sed permaneat uirium debilitas: denuò febricitare hominem necesse est. Subijciatur enim primum, facultas partis robusta, tempore uerò, interueniente eisdem in partibus quæ prius transmisserant, collecta esse excrementa paria quantitate & qualitate his quæ initio transmisserant. Hoc uerò accidit his in quibus dispositio mittentium, & attracti ad ipsas alimentum, quantitas & qualitas eadem permanet. Necesse enim est, æquale ac simile quòd ab eadem alteratur facultate, æqualia ac similia facere excrementa. Quinetiam tempus collectionis eorum necessariò æquale erit. Partes enim quæ aluntur quoad similem habuerint constitutionem ab eodem nutrita alimento, æqualia quantitate & similia qualitate, atque eodem temporis tractu colligent excrementa. Quinetiam eadem circuitione incitantur ad expellendam ea atque mittenda debilibus. Si quidem tunc primum expellendi facultas excitatur ad operationem suam, ubi grauius multitudine excrementorum, aut qualitate molestat. Sed de his omnibus in commentariis de nitibus naturalibus definitum iam est: in quibus exercitatum esse conuenit eum, qui quæ nunc dicuntur, sit cum demonstratione intellecturus: magno quidem præmio ipsi proposito ex tali contemplatione ad curandam uiam & rationem. Nam ut alia omnia omittam quæ sum dicturus in eo libro unius tantummodo faciam mentionem, quòd maxime quidem in promptu est, quòdque ipsi sæpenumero fecimus, ophthalmiz scilicet per circuitionem repetentis. Spero enim id non paruum incitamentum fore lectoribus ad eam quam hoc loco tradimus condiscendam doctrinam. Contra enim quàm ij qui se nominant ab oculorum curatione ophthalmicos, curauimus semper huiusmodi ophthalmiziam. Nam cum illi semper oculis negotium facerent, nos interdum

purgatione, interdum balneo, interdum meri positione (ut Hippocrates dicit) interdum sanguinis missione, interdum utrisque, uel clystere cum sanguinis missione uti sumus: atque interdum statim his adhibitis desistit, quandoque etiam abscipiti fuisset prospectum. Omnes enim qui ita curati sunt, aut omnino accessionem non habuerunt, aut semel solum: sed multò leuior quàm prius. Sed de curatorijs discretionibus ac de indicij, ne quaquàm est hoc loco agendum. Ceterum quòd accidat interdum totum caput aut minimè affectum, sed sanguine prauo atque excrementoso nutritum, colligere excrementa plura ac uitiosiora quàm ante, ita ut nequaquàm sit sufficiens naturalis effluxus ac perspiratus, sed cogatur natura expellere excrementum ad aliquam partem debiliorem, aut si humores secundum naturam se habeant, ipsum autem affectum sit, aut etiam ambo concurrant, colligi excrementa, atque decumbere in aliquam partem, præfens sermo demonstrare studet. Etenim quoad decumbens humor similis fuerit, & capitis dispositio eadem, eoque excrementa æquali colligeniur tempore similia & æqualia, & accessiones oculorum similes erunt. Simili modo & si non rotius capitis, ac certè unius alicuius in eo partis, aut meningum, aut cerebri ipsius fuerit aliqua dispositio, ita ut ex tali nutrimento colligat tantum taleque excrementum tanto tempore: deinde expellat excrementum id tunc primum cum ab eo insigniter molestat: accidit & tunc per circuitionem infestari uel oculos, uel aures, uel aliquid aliud tale, in quod debilius expulsum fuerit excrementum. Vt igitur in oculis, uel auribus, ac pedibus, & alijs multis partibus talibus perspicue uidetur fieri accessio per circuitionem, quemadmodum ostensum est: quid mirum in pleuritide, & peripneumonia, & phrenitide, & alijs omnibus quorum non leet inueniri inflammationes, similiter fluere excrementum? uel in alio ipsa parte instanti maiore obfessio affectu laborante peculiari ac proprio ad dictorum generationem, quàm quòd mittentibus excrementa eo tempore imbecillior est. Neque etiam illud mirum uideri debet, quod uen eodem tempore colligantur omnia excrementa. Quòd enim neque qui defertur ratione alimenti sanguis semper similis est, neque dispositio partium quæ aluntur eadem, idcirco aliud alij tempus satis est ad tanti excrementi collectionem. A quo primum natura partis molestat, cogiturque ueluti alienum à se id quòd molestat, expellere. Neque porò mirandum est, ipsarum accessionum longiudinem inæqualem esse. Cum enim neque genus, neque multitudo excrementorum una sit, neque similiter accendi in omnibus, neque discuti conuenit. Nam plura quidem & frigidiora, & glutinosa, & crassa, longiores committunt accessiones: pauciora autem & calidiora & tenuiora bre-

uiore:

morēs : conducente ad id non parum totius corporis constitutione eo tempore & virium robore. Corpus enim rarius breviores, quantum in se est, efficit accessiones: densius autem longiores. Ex robur quidem virium, breviores: debilitas autem, multo longiores. Facultas enim valida promptius à se expellit id quod est alienum: corporis autem raritas, minime detinet id quod effertur. Quocirca ita affectis cito evacuari excrementum necesse est: si etiam alia similia existant. Pari ratione quibus e contrario corpus afficitur, ijs necesse est esse longiorem excretionem excrementorum, debilitate expellente excrementa facilitate: detinente autem ea quæ effertur, angustia meatuum. Omnibus autem simul cōcurrentibus, aut brevissima aut longissima accessio fit. Longissima quidem, ac crassitatem, & multitudinem excrementi, ac virium imbecillitatem, meatuumque angustiam: brevisima autem, ac tenuitatem, & paucitatem excrementi, & robur virium, ac viarum amplitudinem.

Quam ob causam accessiones desinant ad integritatem.
Cap. XVII.

Simili modo nec quā ob causam accessiones quædam desinant ad integritatem, quædam verò nō, difficile est inuenire. Quoties enim prioris accessionis tempus adeo breue fuerit, ut priusquam secunda incipiat, iam prima delierit: medium principij secundæ, priorisquæ finis interuallum eorum sine febre existit. Sed ubi secunda prius incipiat, quā prior omnino solvatur, nihil harum medium relinquatur. Hoc igitur (ut diximus) fit, quum facultas partis excrementa recipiens sui similis esse pergit, hoc est, adhuc, ut antea, sanguinem qui in ipsa habetur, vincit. Quod si quando debilis efficiatur, idque cō causa sit cur non excrementa solum, sed ipse etiam sanguis corrumpatur ac putrescat, & febris accendatur: alterum inde quoque initium orietur circuitu repetentium accessionum. At si quidem prædictus adhuc seruetur calor, duplex erit genus febrium inter se implexarum. Si verò ille quidem desinat, dispositio verò suscipientis fluxionem permaneat, quæ demittente sunt dicta prius, de hac intelliges. Hæc enim pars efficiet in se quædam excrementa duplici ratione, quemadmodum & illa, sum quia prauus est sanguis, contentus in ea, tum quia facultas debilis est. Nec secus si ex quouis causa reddita sit interdum debilis partis dispositio: adeo ut onus ipsi potius quā alimentum sit sanguis adiectus. Corripetur enim: & si calidus fuerit, facile putrescet. Si verò subfrigidus ac pituitosus, non itatim quidem: sed processu temporis in quoque eandem suscipiet dispositionem. Quinetiam ubi nequeat cōcoquere

quælibet pars genita in se excrementa, ant expellere ad aliam, tale sibi ipsi initium febricitandi, quale ea quæ transmittit alteri, adfert. Cur autem nequeat alteri mittere excrementa, prima quidem causa est in viribus mittentis insipientis quæ: altera autem in viarum obstructione, quæ à glutinosis, crasis, & multis fieri solet humoribus. Nihil igitur nuri est, ysi etiā absque eo quod altera mittat alteri excrementum (quemadmodum caput oculis mittebat) ex excrementis in ipsa adhuc manentibus in eandem suscipienti aliena dispositionem deuenire. Quæ enim obstruunt naturales effluxus, processu temporis ea quoque putrescant necesse est: & causa sint oportet ob quam multitudo excrementorum in parte minime vacuetur, & ut solita erat diffusetur: putrescunt igitur ut illa ea quoque quæ postea colliguntur, & omnia simul accendunt statim in parte caliditate febrilem. Suprà autem indicauimus ubi accenditur quædam vel etiam augetur caliditas, in eam partem ab alijs sanguinem defluere. Itaque necesse est, ut tempore quo defluit, partes illæ refrigerentur sanguine destitutæ: pars autem affecta grauetur atque distendatur: & qui defluit, sanguis alteretur, propter duas causas, & quia putrescentibus iam excrementis permiscetur, & quia impactus minime diffatur. Quocirca succeditur instar lignorum humidiorum consensum in exiguum flammam coniectionum, atque id tempus omne initium accessionis appellatur. Ubi vero calor superat materiam, appellatur incrementum & ascensus, tale tempus. Atque eo tempore augetur calor tam multus, ut non solum deuras locum ipsum qui veluti causa quædam putredinis est, sed iam per continuitatem depascatur uniuersum corpus: & ubi ad summum peruenerunt feruorem qui accenduntur humores: appellatur uigor talis pars accessionis. Uniuersum uerò ignitum esse uidetur tunc ægroti corpus, calore in uniuerso animali æqualiter intenso: deinde si quidem humores tenues sint, ac facultas valida, & corpus rariū, pars plurima seruescitiorum humorum fusa in sudore uacuatur. Quod si crassit fuerint, ac expultrix facultas debilis, & uis angustæ, nihil quidem sensibile effluit: sed solum id quod ita extenuatum est ut in habitus tenuitatem fuerit naturam, appellatur autem id tempus inclinatio, quæ perspiratio quædam est humorum seruescitiorum. Sed ubi in parte dispositio permaneat necesse est alterum in ea gigni excrementum: cum quod rursus in eam attrahitur alimentum, non plane totum vincatur: Quod rursus (ut ante docuimus) & ab excrementis putridis in parte ipsa relictis, & ab ipsa propria prauitate, initium putredinis suscipit: & ubi admodum incaluerit, rursus decumbit in ipsam, ut prius dictus ex alijs animalis partibus sanguis, rursusque eodem modo, initium, incrementum, vigor

& inclinatio accessionis fit. Atque hoc certo am-
bitu tantisper fit, dum affectus in parte primum
gignunt excrementa seruiatur.

*Quamobrem febres interdum repetant per circuitio-
nem, interdum continua sint. Cap. XVIII.*

AT uero dispositio talia duplex est: altera
quidem partis debilitas, per quam gignū-
tur excrementa: altera uero ex ipsis quo-
tidie genitis collecta. Caue enim putes in uasis ex-
ternis in quibus elixa cibaria nidulenta euase-
runt, dispositionem quandam relinqui: in parti-
bus autem in quibus humores putrescunt, nullam
permanere. Quam sanè hæc affectio ægræ solu-
tur, quoties uniuersum corpus malis hum. oribus
abundet, ac plethoricum sit, multoque ægrius,
quoties in his fuerit angustia omnium meatuum
partis excrementa educuntur. quemadmodum &
sanatio sublequetur, si & meatus expurgentur, ut
partis meatus fluxiles sint, & vires roborentur, &
dispositio corrigatur: & uniuersum corpus ne-
que malis humoribus scateat, neque plethoricū
sit. Quamdiu autem hæc permanent, circuitio-
nem accessionum permanere necesse est: Simili-
ter accidit in mulieribus. In eis enim quoad simi-
lis causa & æqualis permaneat menstruum, ea-
dem eorum circuitio retinetur. Sed de his omni-
bus in libro de rheumaticis dispositionibus latius
docuimus: & nunc immorati diutius in confirman-
dis ijs quæ ante demonstrata sunt, minimè con-
uenit: neque præterire capita rerum in præsens
utilium. Maxime autem utile est cognoscere,
quod aliquæ partes alijs transmittunt fluxiones,
quemadmodum caput oculis: quædam uero ab
excrementis in se genitis initium febricitandi su-
scipiunt: & quod his omnibus commune excre-
mentorum putredo est. Proprium uero singulis,
huic quidem infarctio æ stipatio vasorum, aut
ex humore glutinoso, uel crasso, uel multo: alteri
uero angustia meatuum uel sensibilem, uel mi-
nimè sensibilem: alij autem quod omnia spacia
vacua in toto ipsius corpore sunt oppleta, & ab
his plenitudo ad vires: quemadmodum in libro
de plenitudine docuimus. Februm igitur circui-
tione repetentium haud scio an vlla generationis
causa omissa sit. Earum autem quæ ordine earent,
nonnullæ ob humoris mutationem, nonnullæ ob
rationis uictus errorem, ad eiusmodi constitutio-
nem deueniunt. Sanguis igitur putrescens maxi-
mè mutatur, quoniam (ut ante diximus) partim
flaua bilis, partim atra efficitur. Quantum igitur

humores in corpore ægro mutantur, tantum &
circuitiones accessionum. Quocirca minimè mi-
rum uideri debet, per tales mutationes ordinem
quoque mutari. Mutantur uero maxime, ubi qui
incepit putrescere, in aliqua parte alius existit,
alius autem ex alijs defluit, qui aut in illis solista-
lis habebatur, aut in toto animalis corpore exu-
perabat. Nec secus quæcunque ægri in uictus ra-
tione delinquant, hæc quoque nihil minus cor-
rumpunt circuitionis ordinem. Ut enim in sanis
præuus uictus morborum causa est: eodem modo
uel magis etiam in ægris, ex ijs quæ deliquerint,
accessiones inordinatæ existunt. Nec solum ad-
huc ægotantes, sed etiam quo tempore à mor-
bia se recolligunt, promptè ex quouis delicto læ-
duntur. Quocirca per omnem insignem læsionē
uel præuenire multum circuitiones cogunt, aut
diuersi generis à prioribus quasdam gignunt, à
quibus accessio-num ordo corrumpitur. Sæpe ue-
rò ob implexionem circuitionum incognitam
medicis, ægri uisi sunt pati inordinatas accessio-
nes. Sed tales ordinum permutationes reuera
non sunt: sed tantummodo uidentur. Quæcunque
autem reuera sunt, aut ob permutationem hu-
morum committētium febres, aut ob errorem in
uictus ratione efficiuntur. Reliquum porro syno-
chorum genus (quorum totum tempus una ac-
cessio est, aut semper equalis, aut decrescens, aut
increscens usque ad iudicium) ex tali causa fieri
solet, qualem omnium febrium Praxagoras sta-
tuit, humorū in caua uena putredinem esse existi-
mans. sed absolutior sermo ac uerior hoc modo
euadet. Quicunque circuitionibus quibusdam re-
petunt morbi, partim superneniunt dispositioni-
bus, uel mittentium, uel suscipientium, uel gi-
gnentium, uel trahentium excrementa, eo quo
paulo supra diximus modo. Qui uero sine circui-
tione saugant, in his nullus locus peculiaris affec-
tus est: sed humores in uenis & arterijs omni-
bus, maximeque qui in maximis & calidissimis
sunt, aut ob aliquam aliam causam, ut in diarijs,
aut etiam ob putredinem seruēfacti, accendunt
febrem nram continuam, ab initio usque ad finē
minimè intermittentem, eatenus durantem, ac
deurentem hominem, quoad gignentem eam hu-
mores sint consumpti, aut concocti, aut vitru-
que passi.

SECVNDI ET VLTIMI
LIBRI CALENT DE DIS-
ferentijs febrium
finit.

C. L. GALENI PERGAMENTI

DE FEBRIBVS CVRANDIS LIBRI QVINQVE,
QVI IN HIS, QVI DE METHODO MEDENDI

inferibuntur, sunt VIII. IX. X. XI. & XII.

THOMA LINACRO INTERPRETE

De Febribus curandis Lib. I.

Febris quando gignatur, eiusque prima differentia, & indicationes.

Cap. 1.



Vd n igitur ex calido, frigido, humido, & sic co, similiarum partium uatura coustet: quodque ipsæ simplices atque primæ partium secundum tales temperaturas inter se dissideant, alibi à nobis est traditum: quem

admodum etiam duo esse morborum genera quæ simplicibus ipsi partibus accidunt: alterum, quod compositis est etiam commune, & dicitur uitæ solutio: alterum peculiare ipsarum, quod in calidi, frigidi, humidi, & sic interperie consistit. Quarum sanè interperantiarum, quatuor diximus esse simplices: quatuor uero compositas. Simplices quidem, quæ secundum unam qualitatem à naturæ ordine aberrant: compositas uero, in quibus secundum oppositionem utranque ipsa uatura variatur. Febris autem, unus morborum est, quos secundum gignit: utique quem adeo immodice est auctus calor, ut & offendant hominem, & eius functiones lædat. Porro primam differentiam febrium, uia illa est, in qua causa adhuc adest febri creans: aut febri excita ta, iam desijt. Altera uero, qua egrè solubiles, à solutis facilibus febribus distinguuntur: illas hæc cas, hæc Græci febreticas uocant. At uero prima indicatio omnis febris, ueluti à morbo est, ablationem eius præscribens. Secunda autem, ueluti à tali est morbo, quæ certam quandam sublationem iudicat: uempie interperiem febrilem, quæ sit caloris excessus, per occursum refrigerantium tollendam esse. Omnis quippe excessus per contrarium excessum fauatur. Ergo si febris ipsa sit genita, causa autem, quæ eam excitauit, iam desijt, huc tantum sanandæ eius dirigetur consiliu, ut refrigeretur. Si uero in generatione adhuc febris est, causa quæ accendit illam, est submouenda. Si uero pars eius iam genita est, pars etiam uum gignitur, consulendum utrique fuerit: primum quidem submouendo, quæ eam accendit, causam: deinde extinguendo, quæ ab hac accensa est, febre.

Febris à constipatione meatuum producta curatio.
Cap. II.

EXcitare autem uel maxime febrem solet constipatio meatuum, in ijs corporibus, quibus quod transpirat, halituosum nō est, sed mordax, acre, & fuligini simile. His igitur corporibus saluberrima est ex aqua dulci tepèrata: lauatio: frictio quæ rarefaciat: & exercitationes mediocres, & uictus qui dulces efficiat succos. Aduersissima uero sunt lauatio frigida, & aluminosa, & lauationis abstinentia, & exercitatio acuta, & frictio, uel planè nulla, uel dura, & uictus mali succi, & uigilia, & ira, & tristitia, & cura, ystioque in sole, & fatigatio. Grauisimè autem peccare mihi uidentur, à carnificibusque nihil disserre, qui medici hominibus natura biliosis, tenuissimam per morbos rationem uictus iniungunt: eosque tridui inedia couficiunt. Quum mirum tales naturæ, ex longiori abstinentia cibi, accerrimis acutissimisque febribus corripiantur: à quibus promptus est in hecica transitus: atque ab his rursus in marasimum torridum: aut si os uentriculi est iniurijs obnoxium, in eum qui syncope inferit. Etenim in quorum temperie sicquam præualeat humidum, & calidum frigidum: his corporis habitus gracilis, hirsutus, & nigrior est: ac reliquis tribus in temperatij, quæ hac minus tali de sunt, tactu calidior aduertitur. Plurima quoque his flaua est bilis, uiridique ac deiectione biliosa, & pulsus magni, & forui leues & pauci, & animi impetus vehemens. Quare his tum refrigerationem, tum aquæ potiuem, atque adeo requiem & cibum largiorem congruere proficitur Hippocrates. Quum autem refrigeratio ipsa concilietur corporibus tum ex alijs quibusdam, tum noui minime ex ciborum exhibitione: conueniet utique, ubi corpus calidius sicciusque solito est redditum, frigidum humidumque: nutrimentum ei exhibere: sed quod nec medicamento sam ullâ sensu perceptibile facultatem obtineat: nec ipsam, quod utrit, plurimum: quemadmodum neque minus quod sit ex usu. Commodissimus itaque tali corpori

D 2 est

est pituita cremor ad unguem coctus, in quo nullum sit condimentum superfluum: utpote qui & refrigerare, & humectare, ac sine siti feruare hominem potest, cum eo quod nec halituosum, nec humidum, nec siccum detinet excrementum: quoniam nec astringendi, nec obstruendi, aliquam vim fortiat. Ac quod non astringat quidem, vel gustus ipse docet: cuius vnius id iudicare est proprium. Quod verò nec obstruat meatus, hinc licet etiam conijcere, quod non secus quam aphronium, sordes ceteris exstergat: vomituque à ventriculo medidorem pituitam eliciat, nihilo in scilicet quam multa: quæ sanè nec sitim resinguit, vt pituita: & in naturis biliosis bilem facit. Ac vt non sit imbrax & vehementer glutinosa, & crassa pituita ventriculo adhæreat, hanc radícula ex oxymelite, non multa, aut pituita detergere est habilis. Optimum itaque biliosis temperamenti nutrimentum est pituita. Proximum huic, alioque cui paululum aceti ad faciliorem distributionem adiectum fuerit. Tertium, quæ sine aceto liquida existit. Inieciisse verò huic, dum coquitur, aliquod porri, satius est. Nam quod tum anethi, tum salis aliquid necessarium habebit, neminem laet. Quin etiam panis in furno coctus, est vtilis cibis: sicuti etiam omnes pisces saxatiles: nec ipsi minus aselli. Proximè asellos sunt solea, torpedo, lupus, mulusque: post, mugil è pelago. Omnis autem piscis deterior est, qui propà lacum qui mari iungitur, aut magni fluminis ostium, pascit. Ex volatilibus optimi sunt perdices, ac montanae omnes auiculae. Ab his, galinacci, & phasiani, & colubæ iuuenes. Sed nec hæc tamè iutus claudenda: vti excrementosa sint omnia, quæ exercitatione careant. Excrementosa verò non minus sunt, ut lacustria, tum palustria omnia. Quo fit, vt ex ipsa etiam nullis canibus, optima sit montana. Ab his delincepti sunt hædi. In omnibus autem fugiendam vetula: tum recens ædita sunt. Illa namque duriora, concoctiueque difficiliora sunt: hæc immodicè humida, & excrementosa.

Febris à dispositione orta species, atque curatio: deinde de diariorum febrium in bilioso temperamento, tum communis omnium, tum cuiusque propria viciis ratio. Cap. III.

Igitur quibus acre aliquid quotidie transpirat (revertatur enim rursus ad institutum) ijs, si cutis eis conspiciatur, facillè corripuntur febri. Stipant verò ipsam, tum quæ astringunt omnia: tum quæ leuitia, crassitudine sua, in exiguis hærent meatibus. Aliquando etiam ipsius cutis immoderatum siccitas, exiguis meatibus denat. Qui ergo ex stipata cute febri laborant, ijs, inclinante prima accessione, ducendi omnes ad balneum sunt: tum pingui et molli fricandi: si quidem ex aliquo, quod astringit cutim, labo-

rent. Nā si ex siccitate, fricandi quidem & ipsi, sed parcius: lauandi autem vberius. Respicendum verò ad virtutis modum semper est. In huiusmodi auxilijs. Atque ita quidem, tristitia, vigiliae & cura, nec frictione, nec lauactione multa indigent. Sed omnibus qui ex eiusmodi occasione febricitant, oleum infundendum est tepidum largeque cui minime astringens vis insit: tum paululum fricandi, ex consuetudineque lauandi. Vltio verò, protinus ab initio, refrigerationem desyderat: tum crebriorem lauactionem: minime lauen aut oleum largum, aut frictionem crebram. Sint autem quæ refrigerent, & rosaceum, & omphacium, salis omnino expertia. Efficies hæc magis frigida, si ita vas, in quò continentur, in puteo suspendas, vt aquam tangat. Præterea, si defluxus frigida aque valè seclidat, magis humorem refrigerat: magisque adhuc, nix circumposita. Infundere autem oleum ipsum syncipiti, sublata in altum manu, per mediocrem lanæ modum, oportet. Hæc visque ad iucinationem faciens, in balneum duces. Si verò qui memorato est temperamento, ex frigore febricit, etiam ducendus ad balneum in remissione is est. Si autem cum grauedine & destillatione febricitet, prius quàm hæc sint concocta, lauandus non est. At qui ex vltione febricitant, ijs, vel quum hæc adint, lanari debent. Post lausuram verò, ijsdem quibus ante ma defacienda amborum capita sunt: eorum quidè qui ex vltione febricitant, refrigerantibus: qui ex frigore, calfacientibus. Cuiusmodi sunt vinum & nardium vnguentum. Porro qui ex vltione febricitant, ijs intendenda quæ ex refrigerantibus constat curatio est: ijs verò qui ex frigore, quæ consistit in calfacientibus remittenda fuerit. Omnium autem conditionum comprehensarum iu proposito temperamento, vbi febri diaria laborat, victus communis est ijs, qui & sit boni succi, & concoctu facilis, & qui in squamæ exiguis cutis meatibus hæreat. Sed ijs qui exusti sunt, cum eo quod refrigeret, & humectet. Pari modo ijs, quos ira male habuit. Iis verò qui refrigerati fuerunt, cum eo quod calfaciat modicè. Iis qui per vigilio, & tristitia, & nimia cura confecti sunt, victus esse debet humectans, atque somnum concilians. At eundem modum ijs qui defatigati sunt, magis nutriendum minus autem, ijs qui refrigerati. Reliquis, qui medius sit amborum. Vinum verò ipse, his omnibus exhibere solet, sed quod tum aspectu, tum viribus sit aequosum. Id enim ad omnia vtilius quam aqua est: utpote quod & concoctionem inuenit, & urinas ac sudores prouocet. Et enim constat Hippocratem, non in diarijs modo febribus, verum etiam in acutis, vinum porrigere. Cæterum natura calida, magis frigida potione iuuatur: neque in diaria febri, ijs quibus in nro fuit, ipse cum cunctando. Si quis verò non assueuit, huic per se

brim dare non inceptim: nisi pristina sanitate prius reddita.

Febbris ab obstructione multo succi, crassi, & glutinosi facta curatio. Cap. IIII.

Porro si propter obstructionē morata sit trās spiratio, si parua quidem ea sit, qui rectē dēferit, secundam fore accessionem verabit: sin momentanea, nō possis ita promittere. Quodd si & multi, & crassi, & glutinosi impacti sint succi quos huc excipit febri, fieri non potest, v̄ intra fines dīariorum consistat: quando ex necessitate, huic in mali succi naturis ea quæ ex putredine humorum accenditur, succedet. Nam in alijs salutem temperamenti, quæ in sequentiōis exponi, excitari ex tali causa potest, citra humorum putredinem, aliqua continentis febri species. Itaque nisi vitiosus succus transpiret penitus, necesse est v̄ putrescat: v̄ transpiret autem, valido auxilio est opus. Ac si quidem v̄ puer, vel senex sit, sanguinem detrāhere non licet. Inter has ætates, vbi robur ægro non deest, secunda vena est, vel si plei tudinis signa non adsint. Præstat enim vitiosus succi mai ore parte emissā, ad detegendas obstructions accedere: quum alioquin verendum sit, ne si obstructionibus liberandis, prius quā nauaueris, iudeas, ipsas multo magis impingas. at sol uunt quidem obstructions: quæ deteriores iam obtinent facultatem, seu foris admota cuti, seu intro in corpore accepta. Periculum v̄rō etiam est, ne quæ foras trahunt, unā eū ijs quæ obstruunt, etiā aliud quippiam atterant: & quæ ab interno sursum feruntur, aliquid secum ex ijs quæ in vasis continentur, rapiant. Quod ipsum si tenax & crassum sit, obstructionem planē, geminabit: hū aliter, multitudine certē sua, non parum omnino nocebit. Ne igitur hæc contingant, nēc li sissimum est in a nisse corpus. Discerneret autem magnitudo ob structionis ex ipsa magnitudine febri: ut quæ ex maiore obstructione, maior: ex minor, minor in ciderit: Vbi v̄rō modicē iam uacuaueris, haud multo post, aut nutrimentum aliquod, aut phar macum ex ijs quæ detergeat, exhibebis. Atque in alimētorum quidem ratione sunt prisa & mul sa in pharmacorum, oxymeli & quæcunque in co quere in malsa licet, cen cala mintham, hyssopum, origanum, serpillum, irim, & apium. Verūm hæc omnia iusto sunt calidiora, ideo quæ febres accen dunt, quæ ut nimum. Oxymeli v̄rō solum, nec febres accendit, & strenue deterget, sicut ea quæ glutinosi crassa quæ sunt, dissoluat, & mātus ob structos liberet. Inter mulsam & oxymeli mediū locum habet quod apomeli dicitur. Nec immeritō arbitror & saccharum inter hæc numerandū. Ex hoc uictu obseruabis quantum de febrili ca lore minuitur. Etenim si tertio die mane uideris minimum esse quod de febrī relinquitur, ac nec

putredinis humorum in pulsu nota subdit, neque in urina cruditas, suspecta: verō hora, qua pri mo die febri occupauit, extra meridiē sit, auda æt̄ hominem quā m̄ cœcissimē lauabis, longē ante sextam horam. Abundē tamen sit, & intra tertiam horam lauatiōnem compleris. Ad eundem mo dum & si decimam horam suspectam habueris, usq; ad septimam laues licet: quum t̄res, æquino ctiales horas quatuorū inter balneum accessio nis quæ tempus interponi abundē sit satis. Debet autem in balneo corpus prius unctum ac mode ratissimē frictum: mox detergetur extrinsecus abluque. Moderatissimē detergent tum erui, tum hordci, tum fabarum farina. Præterea mulsā quæ sit aquosa. Magis v̄rō quā hęc, iris, & panacis radix, & aristolochia, & mulsā quæ me diocri est mistura: ueluti etiā hæc magis, quæ meracissima est. Possunt autem vel hæc magis de tergere, tum spuma muretis, uirum ipsū, tum aphronitrum. Sapo etiam ex ijs est, quæ maximē detergere valent. Egressis balneo, præter aquā quæ parum apij incoctum in se habuerit, nihil est offerendum.

Febri diaria ex cruditate orta, ex desurgendi frequen tia, & a diarrhæa curatio, ventriculi quæ dolentia curatio. Cap. V. VI.

Iam v̄rō diariæ febres (de quibus tantū in præfati commentario agere est animus) in propo sitis corporum temperamenti, & pe numero etiam cruditatibus solent superuenire: Est autem pessima in elusumdi temperamētia cruditas illa, citissimē quæ febres accendit, in qua cibus in nidolentam & fumosam qualita tem corruptus puitur. Quando ea quæ in acidum uer sit ot: tota talibus naturis coningit, ita minus no cet. Nidolosa tamen cruditas, si alius labrica sit, minus est noxia. Sin alstringent, grauis existit. Fe bricitas etiam nonnull & ex ijs, quos diarrhæa ex cruditate malē habet. Quibus utique non mi nimē proritatnr febri ex defurgendi frequentia. Est autem eorum quibus clausa alui est, & quibus fluens, non eadem sanatio. Si igitur tan tū quæ corrupta fuisse, per diarrhæam nauata esse videantur, tum lauandum, tum nutrindum in remissione febri est: sed ijs quæ circa ventri culum sunt, prius consulo. Sin ita multa inanitiō aut prius facta sit, aut nunc etiam in homine daret, v̄ virtus iam sit defessa, satius est omīssa lāna tione cibare, sed consulo prius ijs quæ circa ven trem sunt. Consuletur ita laborantibus, si modō uacuatio amplius nō persequeretur, fomento ex oleo & absynthio. Quodd si quis morfus, aut doloris sensus in uentriculo adhuc super sit, amicitri peni culo post fomentum debet, qui vel calidus sit, & siccus: uel ex oleo in quo absynthium inco ctum fuit, uel ex vnguento nardino madens:

ualentem cruditate contraxerunt, aut perusti fuerunt, aut tale quippiam aliud perperſi. Tam uerò à cruditatibus nidorosis obſtructionibusque, nature calidæ & humidæ, quàm ſiccæ, præoptius læ deuntur. Itaque omnes diariæ febres accenduntur prompſiſſimè in iſtiusmodi temperamentis, id quæ ex qualibet earum cauſarum, quas in biliſiſ natura retulicurationemque perſimilem illis habent, ac in paucis omnino diſſidentem. Nam quàm hæ nature humidiores ſint, magis quàm illæ ſæmem & ſitim perferunt. Eſt igitur illis ex uſu balneum, quod cutim laxet, non autem quod corpus humectet. Quæcunque uerò de eiſuſmodi natura ſunt dicta, eadem & de acquiſito habitu dicta eſſe cenſendum.

Intemperantiarum omnium quantaſius magis obnoxia febribus. Cap. VIII.

QUam autem octo intemperies exiſtant in uniuerſum, opportuniſſima ad febres eſt calida & ſicca: ac niſi quis illam (ut dictum eſt) cibet,ocyſſimè in ea diaria febris in acutam mutatur. Propinqua huic eſt, quatenus ad febrem ſpectat, quæ ſit ad alia deterior, intemperies calida & humida. Tertia ab his intemperies eſt, ea ſimplex intemperantia, in qua tantum exuperat calidum. Huic proxima eſt ſimplex altera, in qua ſiccum humido præualeat. Ab hac deinceps media omniſium eſt, ſcilicet quæ mediocritatem in utraque oppoſitione tueretur. Quatuor quæ reliquæ ſunt intemperies, neque facile febribus, occaſione iam dictarum cauſarum, patenti neque diaria tentatæ, ſi inedia tollerent, in plurium dierum febres tranſeunt: immo aliquæ ſaltem earum, ubi citra corruptelam contraxerunt redundantiam humorum, utilitatē ex inedia ſentient, ac potiſſimum quæ frigida eſt, & humida. Ab hæc quæ humida eſt. Tercio loco quæ frigida: Quarto quæ ſimul frigida & ſicca.

In febre ex intemperie orta qua uictus ratio exigatur. Cap. IX.

IN eiſuſmodi ergo omniſibus temperamentis, temperamenti quidem ratione, uictus ratio varian da eſt. Nam ex eo quod eadem febrī febriſcitant, non diuerſam, ſed omnino eandem fortientur indicatio nem. Si quidem quod ſecundum naturam eſt, ſemper ſimilia poſtulat. Quod autem præter naturam, contraria. Quum nimirum quod ſe naturaliter habet, cuſtodire: quod præter naturam eſt, tollere expediat. Porro febris omnis præter naturam eſt: ideoque uictus rationem frigida & humidam exigit. Temperamenta uerò ipſa, aliis ſimilia, aliis contraria poſtulant. Quæ enim uitio carent, ſimilia perpetuo: quippe quæ ſeruare expediat. Quæ uitium habent, aliis ſimilia,

aliis contraria. Similia quidem, tū in aliis de quibus mox dicemus: tum in uiceribus omnibus. Contraria autem in eo uictu qui per ſanitatē adhibetur, dum corrigere eorū intemperantiam eſt animus: necnō ubi eiſuſmodi uitioſæ nature à longo tempore, cōtraria uictus rationi aſſueuerunt: gaudent enim nature conſuetis ſemper. Duplex itaque nobis in ijs qui ſani ſunt ſinus proponitur. Nēpe uel corpus ſanum in priſtina eiſus temperie tueri: uel hanc meliorem eſſicere. In ea tamen natura quæ haud dubiè in medio temperamento cōſiſtit, ab ipſa febrī contrariorum indicatione accepta, eatenus humidum frigidum, quæ adhibebimus uictum, quatenus ſiccus calidusque quàm antea iam redditum corpus appareat: Humidus igitur uictus (ut teſtatur etiam Hippocrates) ſebrientibus omnibus conuenit: maximè uerò pueris, & alijs qui ſic cibari aſſueuerunt. Etenim ſebrientibus, quatenus febriunt, ex ipſa contrariorum indicatione humidus uictus conducit: pueris ex ſimiliū. Nā quū etas ex ijs ſic quæ natura nobis inſunt, ſimile ſibi uictū poſtulat. Quæ uerò à conſuetudine indicatio ſumitur, ſic ſūpra eſt, ſicuti & quæ ab ætate. Quippe ſeruare quoque hanc iubet Hippocrates, perinde ac proprium ætatis temperamentum. Sed à regione etiam & anni tempore interdum indicationes ſumuntur. Cæterum à conſuetudine quidem, ſemper eſt indicatio ſimilium quoad ſcilicet ægrotant homines. At ab ætate, natura, regione, anni tempore, & ſtatu cœli, ubi temperata hæc ſunt, ſimilium ſemper prædiorum eſt indicatio: ſiue ualeant homines, ſiue etiam ægrotent. Contra ab intemperatis anni tempore, ſtatu cœli, & regione, cōtrariorum eſt indicatio. Verūm ab ætate & natura, non abſolute, ſed cum conſuetudine. Porro nihil in contrarijs indicationibus tam conuenit expendi, quàm magnitudinem eorum quæ ad indicationem conſerunt: quæ quidem duplex exiſtit: altera, quæ ex eorum dignitatibus ſpectatur: altera, quæ ex ipſorum proprijs ſubſtantijs. Quas ſanè ex collatione cum mediocri, & quod ſecundum naturam eſt, eſſe accipendas liquet. Omnibus igitur conſpirantibus in unum indicationibus, unam proſus uictus rationem conſtituemus. Diſſidentibus uerò inter ſe, quæ ualentiores & plures fuerint, eas præferemus, ita ut uictus ſpecies, quam hæ præſcribent, anteponamus: minimè tamen negligamus contrariam. Porro quæ à febrī ſumitur indicatio, ea reliquis, quando omnes contrarium eſſe faciendum dicant, numero quidem inferior eſt: magnitudine tamen quæ ex dignitate ſpectatur, utique ſuperior exiſtit: potiſſimum ſi longe à natura reſcaſit. Quippe duplex tūc ei magnitudo accedit: & quæ ex febris genere prouenit, quæ omnibus eſt communis: & quæ propria, ſiueque ipſius exiſtit. Sin uerò parua ſit febris, ſas eſt reliquas omnes coniunctas indicationes vnā cum ipſa conſerri.

brevis ualet, nisi id quod transpirat, & copiosum, & calidum sit, nec humorum putredo in omnes, quae inter inguina & alas interfunct, aequabiliter. ac cito portigi in frigidum habitu potest. Debet enim quae putrescunt, tum calida & humida esse, tum difficilem habere transpirationem. Eoque fit ut neque in frigida aetate, neque in frigido corporis temperamento, continens excietur febris: quemadmodum neque in gracilibus, uel qui raro sint corporis habitus, sed profus in temperamentis, corporibus, atque naturis contrariis. Proinde fit, ut qui ita febricitant, ijs & pulsus maximus sit, & equalis, & nehmens: atque neque consistens in ter molle & durum mediocriter. At celeritas atque frequentia pulsus, pro ipsius magnitudine febris. Haec itaque sunt anbarum febrium communia. Alteri tamen priuati sunt notae putredinis: non modo in lotio, sed in pulsu etiam, calorisque qualitate inuicunda.

Febrium continentium praesidium maximum est sanguinis missio. Cap. LIII.

QVarum sane febrium dignotionem & curationem ipsi tum ratione, tum experientia didicimus, qui statim ab adolescentia Philosophiae studio capti, primum nos ad astricolum: mox patris euidenti insomnio moniti, ad medicinae studium accedendum accessimus. Est porro continentium febrium praesidium maximum, si modo uires ualentes sint, sanguinis diminutio, uel usque ad deliquium animi. Primum namque in contrarium statum agitur corpus, celeritate ex animi defectu refrigeratum. Hoc tamen nihil inueniri possit neque ipsis agris, nec naturae quae animates gubernat, inuicundus, utilisque. Postmodum in corporibus ipsis necessitudo superuenit alui deiectionis: nonnunquam & uomitus bilis. Quas res statim a toto corpore maiores sunt dotes excipiunt. Etenim non sola sanguinis deiectione sic obita restitui olim ipse quendam adolescentem a dentissima laborantem synocho. Cui sane post duas a sanguinis missione horas paulum nutrimenti exhibui, permittique ut quiesceret. Lam uero eorum, qui ex sola obstructione febricitantes mihi uidere contigit, nemo in putredinis febrem incidit: qui sanguine prius detrahitur. Quem quidem ubi ualida uirtus subest, & aetas permittit, usque ad animi defectum (ut diximus) nutrire expedit. Vbi horum alterum haud satis respondet, tutius est, quantum satis nescimus, tantum principio detrabere quod defuit, iteratione supplere. Quo quidem praesidio omisso, in summum agri discrimen ueniunt: nisi eos ne uirum robur, ne sanguinis profluvium sanguinis, ne sudor copiosus, ex manifesta percipiente eripiat.

Synochi quando oriuntur, quae sit plenitudo secundum vires, quae secundum uasa. Cap. V.

Agimus itaque in praesentiarum de ijs febribus, quae ex sparis per obstructionem meatibus oriuntur. Quas, si sine putredine quidem consistant, ex diuturno esse genere dixi. Sin ijs putredo aliqua superueniat, ubi i omnibus venis ac praecipue magnis, eas constitit, synochas, siue continentes excitari febres: ubi in unica animalis parte, exacerbationes quae certo ambitu repetantur. Quibus igitur corpus ex succorum abundantia inhabile ad transpirationem iam redditum, tantum caloris congestis, ut inde iam febricitat, ijs tantum sanguinis detrahendum est, quantum vires tolerant. Alioqui certe verendum est, ne aut suffocentur, aut corripiantur syncope, nisi eos vel virum robur, vel plurimus sudor, vel largum sanguinis profluvium a morte liberet. Nec verò exillimes de plenitudine illa, quae comparatur ad vires, hunc a nobis sermone quippe quae nec sic obstruit venarum ora, ut refrigerationem prohibeat, nec tunicas earum distendit, nec ruborem, nec tumorem inuehit: verum de ea quae contineri a vasis vilita non valet: quaeque ob id ipsum solet praedicta symptomata inducere. Siquidem copia haec, dum bonitatem suam seruauit, ut pariter augeri cum virium robore est ualida, ita fit quando has grauat, nec de cetero augebitur, & bonitatem naturae amittit: quare tunc fieri nequit ut non putrescat. Ergo festinare ad sanguinem detrahendum oportet: quo ualorem naturae, ex transpirando, ventilandoque, naturalem temperiem seruans, humoribus, eo quo inter initia modo, dominetur: quando si ad intemperiem uersa laborabit, metuendum est ne hi putrescant. Excitatur autem intemperies in ea, ex febris calore. Optimum itaque est in huiusmodi febribus statim non numero dierum, sed vni virium robori attentum esse. Quoties non solum sexto, sed primoque, sed etiam sequentibus diebus sanguis mittendus est. Quod si aut alij medici, aut aeger, aut propinqui ipsius, non permittant ut feces, venam, ad frigidam exhibendam accedes, sed diligenter ante discernens, quantum nocuentum ex ea contingere possit. Quippe intemperies immodiceque exhibita, lentos & crassos humores attenuari, digerique prohibet. Imbecillas particulas corporis conuertit. Nonnullis illico spirandi difficultatem, eouulsionem, atque tremorem conciliat. Tum verò, quibuscunque in particula principe tumor aliquis & phlegmone, ordinatos, aut scirrhii genere constitit, ijs frigidam offerre non licet. Sed neque ijs quibus obstructio, putredinis humor non concoctionis incommodat. At si per continentes febres concoctionis humorum notas uideris, absque impedimentis expositis, audacter aegris frigidam quantum appetant, dabis: praecipue

possi tali potioni assueverint. Porro erysipelas verum consistens in aliquo viscere, non aliter, quàm frigida potu, sanabis. Sin verò mistum cū phlegmone sit, in hoc concoctionis expectandæ sunt notæ. Ceterum minus tuta ijs qui paucillum sanguinis, carnisque obinent, frigida potio est. Celeriter namque ad solidas animalis pervenit partes, nulli quod eius vim frangat, occurrens. Qua ratione etiam hæctica febris nec prorsus frigida, nec multam aquam desyderant. At concoctionum febriū maxima remedia hæc duo sunt, detractio sanguinis, & potio frigida. Verum illa nullo non tempore: modò vires sustineant: hæc, quum & in pulso & urinæ, concoctionis evidentes cernuntur notæ: febris autem est maxima. Est etiam habenda ratio in missione sanguinis, tam eorum quæ præcesserunt, quàm quæ consequentur ipsam. Nam si præcedat ciborum cruditas, tanto tempore differre venæ sectionem iubebis, quantum satisfacere tum ad eorum concoctionem, tum ut excrementa descendant, videbitur. Sin sequetur necessariò evacuatio quæpiam (ut exempli gratia, muliebri profusum) tantum illi relinquendum est, ex eo quod superfluum existit, quantum est per eam evacuandum. Sed nec neglegenda interim natura eius qui venit vacuandus: sicuti neque ætas, nec cæli status, sub quo & regno, & anni tempus comprehenditur. Sunt enim nonnulli ad extrahendos digerendosque succos, natura propensius: neque qui humidi & calidi existunt: quique raro sunt corporis textu. Adhæc, quibus os venteria aut amara bile redundat, aut imbecillum est, aut supra modum sensile. Pueri certè propter ætatem perpetuò. Cæli uerò status ubi calidus nimium & siccus est, corpus in ambientem resoluunt. Atque hi quidem scopi sunt, qui à sanguinis de tractione dehortantur. Eam autem postulant, unà cum affectu, cuius causa primùm requirebatur, habitus durus, densusque, quique digeritur uègre: tum ambiens humidus, frigidusque.

Methodus consistit in universalibus, exercitatio in particularibus. Cap. VI.

QUum autè in universalibus methodis, in particularibus exercitatio consistat, fieri non potest, ut sine multiplici in ægris singulatim exercitatione, quod ex usu sit facias: nec sine universalium cognitione, probè exercitatio procedat. Non licet siquidem ullius artis scientiam nancisci, nisi & methodum quandam habueris per universalia theorematà: & in particularibus te exemplis exercere.

Methodum habere oportet in universalibus, & exercitatio in particularibus. Cap. VII. VIII. VIII.

Vigitur reuertar ad methodum, equidem

virtutis considerationem ad curationem morborum sæpe maximè necessarià arbitror: sic, ut quæ circa ægrum administrantur, omnia fermè eius unius causa fiant: aliquando mediocriter necessariū: sic ut aliquid ex hac quoque, ad ea quæ faciendū sunt, consilij petatur: non tamè præcipua faciendū ratio huic omnis dirigatur. Possum rursus ostendere, virtutè ad eò exiguum ad inueniendā remedia cōferre, ut propter euliatatē et lætari: aliis uerò prætermitti, ac silentio præteriri: quasi profusus ex utiliter cōsiderandis nō sit ut in diarijs febribus, in quibus vires nullā providentiā requirunt utpote validæ. Verum quod in uirtute accidit, id in reliquis omnibus quæ aliquid faciendum indicant, usu venit.

Horum autem omnium aditum Hippocrates nobis ostendit, incultum tamen: quem methodo postea nos explanauimus: perinde, ut Traianus fecit, qui omnes Italiæ vias asperitate difficiles, refecit, instaurauitque.

Anima naturalis sedes est hepatis, irascibilis cor, rationalis cerebrum. vacuantis remedia virtutem exolunt. Cap. X.

VT nerò accuratius de ipsis viribus disserē, operè pretiū est scire, tribus diuersi generis facultatibus siue animis uniuersum animal gubernari. Quarum facè prima quæ stirpibus est communis, quamque uocant naturalem, atque etiam appetitricem, iecur pro fonte habet: per uenasque illinc sparsas in uniuersum corpus, id alit: Secunda autem est, quæ non modò ut stirpibus, aut pira præditis, sed etiam ut animalibus animas, est insita. Hæc in corde, fonte caloris insita, residens, ab ipso per arterias ab eodem ortas, in totum corpus disseminat: diciturque tum uitalis facultas, tum irascibilis anima. Tertia denique est anima rationalis, quæ in cerebro domicilium habens, uoluntarijs actionibus præsidet: per neruosque, ceterosque canales, toti corpori sensum & motum largitur. Has igitur facultates seruare, nihil planè est aliud, quàm uitam seruare. Si quidem quilibet earum amissa, necessum est, reliquas simul perire. Ac proinde in opere de sanitate tuenda huc omne consilium direximus. in hoc uerò, primum propositum est, morbi sublatio. Nam cuiusmodi in illo est sanitatis tuicio, eiusmodi in hoc est morbi sublatio. Quorum utriusque communis est ipsa uitæ custodia. Hoc tamen interest, quòd quæ secundæ ualitudinis tuendæ gratia geruntur, eadem statim uitam tuentur: quæ uerò affectiones præter naturam in morbis discutiunt, eas non omnino uirtutē custodiant. Quippe aliqua eiusmodi prædita sunt facultate, ut si immoderatè aut intempestiuè utare, uitam adimant: quod solent uacuationes immodicæ. Ergo quum uirtus tantopere necessaria sit, eam autem

ledant

Leuant omnia vacuanda remedia, si quis ipsis parum moderate viatur: utiq; aduersæ inter se faciendorum indicationes in talibus corporibus sunt, in quibus affectus, quo expugnetur, notabilem vacuationem desiderat: virtus autem hanc ferre non valet. Cæterum quemadmodum nihil quod sanitatem iuetur in valentibus vires corrumpit: sic in ægrois aliquando virtus succedit ijs, quæ veluti in perniciem eius administrantur: ut si euacuemus in plenitudine quæ est supra vires: aliquando ab ipsis dissoluitur. Etenim in synochis febribus exprecium stipitatione oris, quoniam valida plerumq; virtus est, citra periculum vacuatio adhibetur. In alijs verò quæ ex corruptela humorum gignuntur, existit maximè periculosa. Siquidem quod corruptum est, alienum à natura quum sit, id se auferendum dicat, vel vena incisa, vel purgatione. Horum autem præsidiorum neutrum feret imbecilla facultas, si quando eò corruptela coierit. Oportet igitur, ubi indicationes iia sibi aduersantur, paulatim quod vitiosum est, vacuare: paulatimq; quod salubre est, in eius locum reponere: quum curatio nem vitiosi succi Medici epicrasin nominant.

Sanguis dupliciter inuitis redditur, & quando utilis sit sanguinis misio. Cap. XI.

QUum igitur sectio venæ, sanguinis sit vacuatio: sanguis autem ipse utilis possessio uaturæ existit: sic utiq; oportet venæ sectionem fieri, ut quod inutile ex sanguine ipsi nature est, emittatur. Fit porro sanguis bifariam nature inutilis: uel quum propriam qualitatem ad unguem non seruat: nec amplius nutrire, sicut prius, potest: uel dum ita multitudine creuit, ut premat vires, aut distendat uasa, uel rumpat ea, uel obstruat. Atq; in his quidem misio sanguinis utilis est, ceu vacuantium præsidiorum unum: in alijs autem, ceu quod humorem uehementiorem impetu ad pariem diuersam reuocet, uel ad latera deriuat. Possunt autem semper valentes vires, quæ modo uacuationis eius respondeant. Quoties igitur uirtuti notabilis ex uacuantibus auxilijs noxa incidit, toties ipsa utile aliquid indicabit: quæ utiq; ut quum manifestè iuuabitur. Vbi uerò ex ijs quæ affectum submouent, nec commodum illi accedit ultimum, neq; incommodum, ibi ueluti inutilis prætermittitur.

Virtus quos modis sit seruanda. Cap. XII. XIII.

PORRO quicquid aliquam præstat indicationem, si natura id simplex sit, etiam quod indicatur, utiq; simplex erit. At si illud compositum sit, & hoc erit quoq; compositum. At sanè quædam custodienda sunt: quædam amotionem indicant. Virtus itaq; semper unam rem indicabit:

utiq; sui custodiam. Custodietur autem: primò quidem, si quod ex substantia ipsius uel inanitum uel alienatum est, correxerimus. Secundò uerò, si quæ ipsius substantiæ uacuare, alienareq; possunt prohiberimus. Aestimari autè debet interim, quod magnitudine, dignitate uel antecellit. Maxima igitur dignitas, uirum ipsarum est: quando uiuere ipsum nobis ex harum custodia constat: ut ipse quum uitam, aut ipsas esse vires, aut earum actiones, necesse sit. Virtus ergo omnium prima custodienda hominibus est. A uirù indicatione proxima existit, quæ ab affectibus, quocurare conamur, subministratur: postea deinceps reliquæ. Quicquid igitur indicationi, quam vires præbent, aduersatur, id secundi est loci. Quæ uerò cum ijs quæ cōducunt uiribus, in idem competunt, hæc utrumq; calculum referunt: & eorum quæ primæ sunt notæ, & eorum quæ secundæ. Quare citra conuersiam faciendā. Quæ uerò aduersantur, aliquando administranda prorsus non sunt: aliquando paulatim. Prima igitur indicatio omnium est, quæ à uirtute sumitur: non tamen sic prima, ut curationem nos doceat: quæ ex numero curatricium indicationum non sit, sed uitalium. Nam neq; ut ualeamus, neq; ut à morbis liberemur ab ea quicquàm primum desumimus, sed ut uiuamus: quàmuis ex accidenti interdum uirtutis roboratio ad affectus curationem conducatur.

Indicationes medicatrices unde sumuntur. morbi differentia. febri quæ conueniant. Cap. XIII.

AT uerò medicatrices indicationes à morbo ipso sumuntur, & à temperie corporis, & ab ambiente nos aere: qui causæ sine qua non, rationem obtinet: quum sine ipso nec tolli morbus, nec tæneri sanitas possit. In omni itaq; curatione aduerorum indicationes in his tribus ad summum consistunt. Reliquæ autem omnes ab his in partes diductis, oriuntur. Cæterum effectus ipse haud quaquàm in causas diduci est aptus, quemadmodum temperies atq; ambiens aer: sed tantummodo in differentias. Nam aut in similibus consistit partibus: aut in instrumentarijs. Ac in similibus quidem, uel simplex est in temperies, uel composita. In instrumentarijs, uir ca simplicium partium uel posituram, uel formam, uel numerum, uel magnitudinem, tum quæ horum sigillatim traditæ sunt differentiar, consistit. Porro affectuum qui simplices partes occupant, unus est in temperies calida. Quæ si in totum corpus diffusa sit, appellatur febris. Ideoq; omnis febris, quæ febris est, humectatio refrigeratioq; remedia sunt. Ac si sola quidem sit febris, ad refrigerandum humectandumq; ueluti ad finem, dirigeretur omne medentis consilium. Quare, materia inuenta, opportunitatem tempus ex quatuor

febris

febris temporibus sumes : quantitatem verò , ex conferendo cum naturali habitu morbum. Quippe, quantum is recessit à naturali habitu, tantum opus est ægrum refrigerare & humectare. Ambiens autem aer (cuius fugere commercium non licet) si contrariam morbo temperiem habeat, è prædiorum numero est unum: sin similem, vna est morbificarum causarum. Idcirco tunc inhibenda eius noxa est, scilicet reliquorum auxiliorum ha- miditate ac frigore intensia, adauctisq;. Ipse au- tem arte reddendus est talis, qualis ad profligan- dam febrem, aut aliam quampiam dispositione, desyderatur. Si igitur morbus siccus & calidus sit, humidiores frigidioresq; domos & eligemus, & preparabimus. Sicuti è diuerso, si frigidus, humi- dusq;, eas quæ calfaciant & siccant. Sunt itaq; de- ligendæ quæ ex seipsis eiusmodi sinr. Alioqui in- dustria nostra preparabimus ipsas, per ætatem quidem eas subterraneas molientes, & ad Septen- trionem cõuerfas: ac paupimenta ipsarum assidue humore aspergentes: tum vt ex citripo aliquo aura expiret, machinantes: flores præterea & ger- mina, quæ frigidæ humidæq; sinr facultatis, per aream disseminantes: per hyemem verò, contra- ria horum facientes: præferim vbi morbus sua- det: ubi non suadet: excessus tantum utriusq; rem- poris remittentes.

Indicatio curationis generalissima est contrarietas.
Cap. XV.

Poterunt rursus tres illæ indicationes prædi- ctæ ad duas tantum reduci: nempe ad mor- bum & sanitatem. Neq; enim aliud ipsa sana- tio est, quàm morbi in sanitatem translatio. Qui affectus contrarij quum sinr, necesse est per con- traria fiat eorum alterius in alterum transmuta- tio. Atq; ita rursus una erit sola curationum in- dicatio generalissima, uidelicet contrarietas. Cæ- terùm ad accuratam contrariorum administratio- nem, necessum est curandorum corporum prius & naturas & temperamenta cognoscere: quæ qui- dem tum ex ijs quæ in libris temperamentorum tradita sunt, noscuntur: tum ex ætate, & tota antea cõuicta, quæ nimirum in uictus & exercitij ratione consistit, præterea, in hac regione, & hoc anni tempore, & hoc cæli statu, cõuersione.

Consuetudo ad inuentionem remedium, & ad sanita- tem tuendam plurimum potest. Cap. XVI.

Ex ipso autem temperamento inuento, ad- ministrandorum indicatio suppeditabitur. Sed neq; paruum quid, negligendum è, ad remedium inuentionem consuetudo adfert: ueluti nec ad sanitatem tuendam: quum singulo-

rum corporum etiam naturam ostendat. Nos si- quidem uia rationeq; ab ea procedentes, inueni- mus ipsarum partium affectum: dein ex illo rur- sus peruenimus ad faciendorum indicationem. Consuetudo itaq; curationis rationem indicat, per corporis naturam intercedentem, quemad- modum ætas: quæ & ipsa temperamenti inter- uentu, præstat indicationem.

Corpora dissipata facilia, & difficilia sanguinis detrac- tionem prohibentia. Cap. XVII.

Aduertere autem oportet, corpora frigida & sicca, quæq; ex terrestri natura constant (cuiusmodi sũt mineralia) quàm æger- rimè solui. At quæ calida & humida sunt, eorum substantiam celestirimè dissipari in ambientè, quæ uerò in medio horum, ex diametro pugnantium, consistunt, ea corpora quo magis ad hæc, uel ad illa accesserint, eo uel aptiora ut dissipentur e- runt, uel consumaciã magis. In summa, citra cal- lorem nõ potest in halitum digeri corpus ullum, quandiu substantia eius coacta densataq; man- serit. Puerorum autem substantia, facillimè omnium digeritur, dissipaturq; propterea quòd est ut humidissima omnium, sic nulla fri- gidior. Quo minus uacantis prædij eget: quum ex se ipsa naturaliter abundè uacuetur. Fit autem protectio & propter calidam siccamq; regionem, & tempus æstiuum, & statum cæli impensè succum & calidum, notabilis per- cutini nactatio. Itaq; hæc de causa, qui sanguis uia detractionem desyderantis aut prorsus non se- cabimus ueuam, aur parum detrahimus. Erunt- que in hac detractione quoq; spectanda, natura ab initio, consuetudo, ætas, locus habitatiouis, anni tempus, cæli status, necnon is, quem cura- mus, affectus: aliæq; ratione, ante hunc, laboran- tis facultas. Quum uerò affectus sinr numerosi, cuiq; ipsorum sua est curationis per contraria in- dicatio. Quo circa, octo intemperamenta quum sinr, octo erunt etiam morborum, quibus simpli- cia corpora sunt obnoxia, particulares indica- tiones. Ultraq; hæc, una eius affectus, qui instrumen- talium communis est, diciturq; continui diuor- tium: cuius sanè est indicatio curatiouis, unio. Est igitur unum morbi genus, quod similes & simplices animalis uexat particulas: quam intem- periem uocant. Huius aliquæ differentie oriun- tur ubi corpora, nudis qualitatibus altera naturali quæ ubi accedente etiam humorum affluxu. Qua sanè dispositione utraq; uel afficitur una pars corporis, uel plureis, uel uniuersum corpus.

FINIS.

GALENI

GALENI PERGAMENI

DE FEBRIBUS CVRANDIS

Liber III.

Indicatio ipsa à febre, à febrili causa, & à facultate oritur. Cap. I.



Recō in diarijs febribus simplex quidam est in corpore præter naturā affectus: utpote causa quæ primum eas excitant, iam adēptis. In quibus verò causa quæ eas accendit adhuc manet, in ijs neq; affectus simplex, neq; sanatio est. Si quidem quod febris iam receptū in corpore est, id ea propria ipsius curādi indicatione discutere oportet: quod adhuc est futurum, id propulsare, ac ne fiat, vitare. Vetabitur autem, si quæ id excitat causa prorsus summotā sit. Itaq; in diarijs faciendorū indicationem maiimē ex ipsa febre capiemus. In reliquis verò, quæ accessionis suæ causam intus habent, prima indicatio ab ipsa sumetur causa. Quare si febrim quæ multos dies continuatur, re & ostendimus putredinē esse causam: hæc nimis sananda est prima. Sed nec interim extinguēdæ febris, quæ per eam iam accensa est, ratio non habenda. Ac si quidem id idem consueant, & quæ febrim extinguunt, & quæ oppugnant causam, in quod utraq; conspirent, quum vnum sit, sine cunctatione est agendum. Si febris, quæ iā accensa sit, sanatio, causam quæ hanc eacitauit, est auctura: aut quæ eusam submouent, febrim exasperantes, diligens habenda consideratio est de remediōrū specie. Etenim si intolerabilis ægro sit magnitudo febris, committendū nō est, ut per ea quibus causam adimimus, febrim augeamus. Sin ita mediocriter sit febris, ut quo tempore cōtra causam tantum pugnas, obruendæ interim vires egrotantis non sit, utiq; contemnendus is curatio nis modus non est. Non contemnendus autem nec ille est, qui contra id, cuius maius momentum est, instare iubet: nec tamen alterius omnino negligentem esse. Quum autem in examinandis ijs, ad hominis salutem non parum momenti facultas habere videatur, tria nimirum erunt, quæ in propolis iam ob putredinem febribus, agendum indicatione nobis prima largiantur. Febris videlicet. Eius effectrix causa. Præterea naturalis facultas. Cæterum priora duo sobmouenda sunt: tertium est custodiendum. Erit itaq; rursus & hic necesse, ut cum febrim, tum eius causam, cum facultate ipsa conferas. Mox si eadem ambo remedia requirant, ea prōptē eaequaris. Sin indicationes pugnant, vnam præferas, vel quæ à uicibus sumitur, vel quæ à causa, vel quæ à febre: sic ut quæ egeris sit ualentior, hæc magis sequaris: nec tamen cæteras negligas.

Diaria quando fiant diuturniores: affectus harum multiplex, ac differentia multiplex. Cap. II.

Nunc vero ad particularium præsidiorum differentias nos conuertamus: repetita tamen mentione diariarum: quum & ipsæ, inficitia medicorum, in plurium dierum febres aliquando degenerent: idq; vel earum effectrice causa abeunte: uel etiamnum persistente. Porro abijt effectrix causa, quoties ab ira, dolore, vigilia, cura, æstiuo sole, fatigatione, & bubone qui iam defuit, citra stipationem febris est excitata. Maoret, quoties vel ab externa causa, uel ab ipsa febre, stipatio aliqua est orta. Nam & frigiditas, & alstringentium usus, per mediam stipationem, semper febrim excitauit. Vltio præterea nonnunquam constipat corporis habitum. Iam ipsum febris principium, ubi cum horrore inualuit, stipationem subinde fecit. Quinetiā glutinosi, & crassi, aut etiam copiosi succi, ubi mediocriter obstruauerunt, diariam aliquando febrem accendunt. Dicuntur autem id genus febres omnes diariæ, quia solui vno die sunt apertæ computata cum hoc unā & nocte. Cæterum non est idem diarium omniū affectus. Sed ab aliquibus inseparabilis stipatio est: ab aliquibus minimē inseparabilis: sed uel ut plerumq; simul adest uel ambigua sorte: uel raro. Inseparabilis stipatio est ijs, qui ex aluminosa aqua, vel calcithode, vel tali quapiā alia, aut ea frigore, aut leui obstruēdiōe febricitant. Plurimū verò ijs adest, qui ex vltione febricitant. Ambigua sorte, ijs, qui ex fatigatione. Quicumq; verò, ea ira vel tristitia, uel vigilijs, uel pertinaci studio, uel cruditate, uel bubone febricitant, ijs raro adiuncta stipatio est. Atq; harū omniū febrī nulla (quod utiq; ex ipsa sit) ad secundā vsq; accessionē perdurat, sed intra quatuor & viginti horas omnino desinit: idq; cū sudore, uel madore, uel transpiratu quodā halituoso. Aut si quando earum aliquæ (quod tamen rarius contingit) longius trahunt, duz ijs accedunt causæ, quæ ipsas solui uetant. Earum una frigus est, quod uel ea ambiēte aere, uel ex vntione quapiā catarrhifecus admota proueniat. Altera egregia illa diartrosis est, ijs qui uidelicet hanc transire, medicorum inficitia coguntur. Multæ igitur apparent diariarum esse febrium differentie particulare. Vna, quando iam prorsus recessit ipsarum effectrix causa: ueluti vltio. Altera, quando hæc etiam adest: sicuti stipatio. Cuius duæ sunt differentie: nempe exiguiorum meatuum & dēstas, & obstruētiō: Sane dēstudo ipsa, aliās ex siccitate prouenit: aliās ea frigore, & coque uel simplici, uel cum alstringentia ui. Iam uerò obstruētiō ipsarum, alia est, quæ ex abundantia: alia quæ ex qualitate succorum, scilicet aut inter lentis, aut eras si sint, incidit. Præterea autem inter remedia, in ea quam copia facit, sanguinis missio: in ea, quæ ex humorum qualitate cōsistit, attenuantiū usus.

E Consiliū

Consilium verò sumptum à viribus, ur in diarijs sanè est exiguum, ita in ijs qui pluribus diebus ur gent, satis magni est momenti, eoq; maioris, quo hæ sunt longiores. Enim verò, ubi naturaliter vi res se habent, ne minimum quidem in diuturnis febribus usucurionum vsum morantur: vbi autem sunt infirmiores, pro magnitudine imbecillitatis, impedit vsus auxiliorũ vscuariũ. Rarius autè accidit, ut prorsus in primo, secundo die, vires imbecillè cernantur: id quod tamè interdù accidit, vel propter ægotantis malum corporis habitum, vel propter senium. Nonnullis etiam fatigatio, vbi tristitia, vigilixq; præcesserunt, & inedia per totum fecuta est diem, dein febris prius quàm homo cibaretur, circa vespæram occupavit & nox infomnis est acta, vires impensè resoluit.

De nutritione febricitantium. Cap. III.

Porro quibus temperies corporis ad siccum calidumq; conuersa, febrem accendit, ij interdum vel in prima inuasiõne accessionis, nutriendi sunt: ne dum ante illam. Eis autem solo ipse sobrietatem ex alica exhibere, iniectis in eam mali punici granis: qui cibus bilioso stomacho est optimus. Nam & roborat hunc, malum punicum: & alica, cum dulcissimè in eo citra corruptionem maneat, sensum concoquitur, idque nec aciescens, nec etiam innatans.

De horrore, ac de rigore tractatur. Cap. IIII.

Igitur mordens halitus, succosq; ubi per sensibilia corpora fertur, horrores & inæquales rotius corporis concussiones facit, in ijs, quibus cute stipata, quæ prius transpirabat, iam sunt decedente. Quæ quidem, si fuliginosa sunt, febres accedunt. Eiusmodi autè halitus, succosq; tũ multa & vehemens dimotio, rum vigilix, & ira, & dolor, & cura, augmentum proximè ab illis, unum illud per se interdum augere eos sufficit, utiq; si cibum quæ non sumpserit. Efficitur namq; corporis halitus in ijs naturis, quæ facillè amarum bilem gignunt, ex longa inedia biliosus. Concussio itaq; siue rigor succedet, propter eorum quæ feruntur excrementorum, tum multitudinem, tũ acrimoniam, tum impetus celeritatẽ, tum laborantis viriũ imbecillitatẽ. Horror verò fiet, vbi & qualitas eorũ, & impetus velocitas est remissa: tũ copia minor: ac pouissimum cum vires tristanti obstant. Quod si largius remittantur iam dicta, ne horror quidem continget sed vel quidam ceu ulcerosus sensus: vel tantũ inæqualitas. Porro quibus cum quæ uirtute existente imbecilla, squalidoq; ipsius corporis habitu, incipientis adhuc accessionis nidi adesse symptomata, ijs omnibus penitus ex vino diluto, & calente, mæurè exhibens, horrorem statim inhibui. Quæto verò hos citius cibaueris, tanto scilicet magis febrẽ prohibueris. Sin duæ ho-

re ab initio inæqualitatis interpositæ sint, nutriendi tunc quoq; modò adhuc daret horror: prædictis tamè, quod hi febricitabũt, exterũ innoxia scire, & cui cutis mador succederet: quo facto, iũ lauare, tũ nutrire debebis. Quod si horror præterierit, ac iam planè febricitent, id temporis nõ sum cibandi: sed decrescẽte iã accessione atq; interdũ in summo uigore, nutriendi sunt solutionis integritate nõ expectata. In nullo nĩq; squalido affectu comodè finitur accessio, prius qũ illi vel ex la-uacro, vel humido uictu, humectatio accesserit.

Inedia nocet calidis, qui à principio corripuntur hec-tica, quando versos nutriendi Cap. V.

Calidis iraq; & siccis naturis, siue à primo ortu sint tales, siue sint etiam acquisitæ, maxime inedia aduersatur, febrĩ paratissima causa. Inrer alia autem, calidus in summo, sic cusq; coeli status, is dicta temperaturam efficit. Hic autem status alio anni tẽpore, qũ æstare, planè incidere nequit: sicut nec humidissimus panger frigidissimusq; in alio qũ hyeme. Corpora itaq; calida & sicca, ex inedia facillè in febres ardentes incidunt: à quibus, nisi prius mors occupet, in hec-ticas transeunt: atq; ab his, in marasmos uel prorsus ab initio, ardentibus præteritis abeunt in hec-ticas. Maxime autem siccas, calidasq; dispositiones corporum, à principio febris hec-tica corripit id quod olim cuidam iuueni contigit, qui ex ira febricitauit. Cui quidẽ, quoties nutritus est, fontanæ planè gelidæ dedimus interim binos cyathos, interim ternos: quando frigidam simul mulrã sibi dari, qui ita sunt affecti, citra noxam non ferunt. Quo circa utilissimum fuerit, ubi febris ideam perpexeris, in prima statim occasione, minori cũ periculo, copiosiori frigida nũs corporibus ad ualidam siccitatem nondum perductis. Iã uerò quemadmodum in quibus febris accenditur propter mordentem acrimoniam excelsa, attenuatiq; à Sole, inedia, & laboribus, succi, maximum eius remedium est humidum nutrimentũ: sic è diuerso, ubi ob copiam, uel obstructionẽ, uel phlegmonem, uel humoris alicuius putredinem, febris est orta, maximo malo est cibus. Quæ hos quidẽ, nec in febris inclinatione, citra noxam nutrias, nedũ ipsa accessione inuadente: illos uerò, omni certè tempore, sed potissimum per inclinationẽ. In summa uerò, illa duo à primo statim die, sunt ubi in omni ægro spectanda, morbi summus uigor, & ægotantis uires: à quibus cibũ de consilia petas. Potest si trãsi summũ incrementũ sine omni cibo potest, in cibi abstinentia hominem ipsum seruabis. Si exiguum administratum requirit, abundè erit sola mulla. Quod si maius desyderat, quàm sit ex mulla, pistianz cremor satis erit. Atq; fas non est summum morbi incrementum aut tenui uictu, aut inedia transigere.

ei, id agendum, ut homo statim in prima accessione inclinatione nutriatur. Aliquis verò ipso rum, & quum inuasa adhuc est, & quum incipi, cibabis. Sunt porro hi sicco temperamento & calido, oportet: tū viribus necessarii imbecillis: quū fieri sequeat, ut abunde siccum, calidumq; corpus, si febricitet, viribus sit valenibus. Si autem eius modi febris & corpore, momentanei mem bri phlegmone sit coniuncta, omnino æger morietur: magisq; id certum est, si vel peripneumonia, vel pleuritis vel angina, vel ventriculi, vel icterici phlegmone infestet: In quibus sanè affectibus una salus est, virium robur. Nam quod ad phlegmonem quæ in ijs est partibus attinet, minime planè est cibandum. Quod ad virium infirmitatem, vix; sæpe. Ac proinde necessum est, aut resoluantur vases, aut phlegmone augetur.

Hæctica febris quando sit expectanda, ac vicijs ratio quas sit febricitantibus. Cap. VI.

QUoties igitur vel ex lassitudine, vel ira, vel pluribus crisi, vel uigilijs, vel tristitia, vel longa inedia, vel uniuerſis unà coëstibus, siccatus corpus est, ac febris inuasit, quæ & arida reddit cutem, & igneum calorem refert, uti que hunc talem timor est hæctica febris correptum in, potissimum in æstate, ac cæli statu sicco, calidoq;. Oportet autem, ac primum præſane cremore, & sorbitione ex alica nutritum, panemq; post oblato, aquæ frigide potione hominè cures. Quippe protinus exinguitur, ac cessat omnino febris: modò nec phlegmone aliqua ei sit adiuncta, nec putridus humor. Quamquam ego etiam uel si hæc aderant, ægrotorum non paucis aquam frigidam dedi, tutius esse ratus, phlegmonas in præſens augere, quam sinere hominem in hæctica febrem prolabi. Cæterum si magnum fore in commodum, uel humor putri, uel phlegmonas sit suspitio, à frigida quidem danda abstinebis: refrigerantibus autem remedijs, quæ foris applicantur, nteris: modo ea super os ventriculi, ant tota præcordia: modo super pectus imponens: ubi scilicet plurimum habuisse calor, maxime iudicabis. Balnea etiam, ijs qui siccato plurimū copore sunt, & citra humorū putredinem februnt, non incommoda existunt. At phlegmonas subſequitur febres, propter putredinem humorū, qui in ipsis impacti habentur. Possunt tamē, nec citra phlegmonem, in ipsis uasis aliqui humores putredine: id q; aut in una animalis particula, in sinibus ipsorum impacti: aut etiam in totis eorum capacitatibus, quæ inter bubones & alas sunt, comprehens. Vbi igitur citra putredinem squallenti corpori febricitare contigerit, caput totius curationis, in ijs remedijs quæ refrigerent, humectentq;, statuere oportet.

Remediorum refrigerantium, ac humectantium materia duplex & refrigeratio in febre est periculosa. Cap. VII.

PORRO duplex genere est harum rerum prima materia. Una, eorum quæ foris incidunt: altera, quæ inuis in corpus sumuntur. Extrinsecus corpori incidunt, tum aer ipse qui nos ambiit: tum pharma, quæcunq; humectandi refri gerandique vim obtinent: & tertium præter hæc, dulcis aquæ balneum. Intrò in corpus sumuntur, quæ eduntur, ac bibuntur, & inspiratus aer. Ab his generibus tentandum est propositis hoc loco febribus tum humiditate, tum refrigerationem comparare. Verùm refrigeratio, quoniam per efficacissimam qualitatem indocuit, & parui temporis est, & periculosa. Contra siccitatis, per ea quæ humectent, curatio, ut longi temporis est opus, ita minus est, quam refrigeratio, periculo exposita.

Febricitibus quales ades cōueniāt, quis aer. Cap. VIII.

SIGITUR temperatus sit aer, qualem se exhibet, tali eo est utendum, nihil amplius de eo nobis sollicitis. Sin nerò admodum calidus, uel sit admodum frigidus, pro calido inducendus arte contrarius est, subterraneis inuenitis domibus, quæ & frigidissimæ sunt, maximeq; per flauæ, & ad septentriona conuersæ: tum auris quibusdam suauibus opera nostra paratis: alijs ex euripis, in quos multi se aquarum fontes precipitent: alijs aqua frigida ex uasis in uasa transfusa: id quod etiam conciliat somnum: præterea domo astidue aqua, quæ profus frigida sit, aspersa: ac ros plurimis humi fusus, aut uitium capreolis, aut ruborum clauiculis, aut lèſiſci ramis, aut deniq; reliquarum, quæ refrigerent, stirpium aliquibus, turba quoque hominum ingredi prohibita: ut quæ domum similiter calfaciat. Ac sic quidem calidissimum aerem, qui scilicet in æstate calida & siccæ accidit, refrigerare est tentandum. Qui sanè si modicè frigidus sit, hoc esse conueniens oportet, nihil de eius temperie alterantes. Qui verò frigidissimus est, trique quatenus respirando attahitur, admittendus est, ut qui admodum calorem cordis refrigeret: non tamen quatenus extrinsecus ægrom contingit. Quippe densa; cognique cutim, putrilaginosorumque humorum effluuium, atque transpirationem cohibet. Siquidem per pulmonem, quod rarum est viscus, difficile non est, ut tum qualitas ipsius, tum etiam substantia, faciliè ad cor perueniat: per cutim verò, utpote densatam, fieri id nō potest. Cæterum ex frigida inspiratione maius sequitur commodum, quam incommodū ex cute densanda: præsertim cum operimentis hæc nobis calfacere liceat. Porro utendum maxime eiusmodi aere est in ijs hæcticijs, in quibus primū & afficitur, ipsum est conueniens ut si ventriculus primū affigeret.

tur, ipsi per comesta & bibita succurrendum esset. At iecinori ex inspirato aere nulla certe accedit utilitas: à comestis uerò & bibitis, minor planè quàm utriculo: aliqua tamè haud obscure aduenit. Communis autem omnium sanatio est, per ea quæ extrinsecus applicata refrigerant, & humectant. Atque ob hæc quidem viscera, magis ex parte hectica, marasmodiq; febres accidere contè plati sumus. Superueniunt tamen aliquando & pulmonum intemperantiæ calidæ & siccæ. Incidunt præterea & pectori, & mesenterio, & ieiuno, & colo: interim uerò, & uero, & renibus. In septo autem transuerso marasum non uidi: febrem hecticam uidi. Eiusmodi autem affectum & spirandi difficultas, & delirium excipere solet. Ex quibus magna ex parte prius moriuntur, quàm hectica sit prorsus perfecta. Est autem eorum agnitio facillima, tum ex pulsus duritia, tum ex eo quòd præcordia plurimò trahuntur sursum, tum ex difficultate respiratiouis, quæ illis est inæqualis, & variâ interdum admodum rara, magna quæ: utiq; quum delirij malum præcipuè dominatur. Frigidus itaq; aer tuuc vel maximè confert, quum quod primum afficitur, ipsum est corrigi confert & in reliquis febribus non parum: quandoquidem in his quoq; necesse est cor similem intemperiem recipiat.

Refrigerantia extrinsecus in febribus qualia esse debeant. Cap. VIII.

Plures etiam ubi ij sunt qui primùm patiuntur, plus cæteris omnibus acrem refrigerantem postulant. Porro ex medicamentis, quæ admodum extrinsecus in eiusmodi affectibus, refrigerandi humectandiq; uim possident, deligenda ea sunt, quæ uou modò citra astringentem refrigerent, sed etiam corporis substantia sunt tenui. Ac quæ quidem absolutissimè tenuium partium sit, substantiam exactè frigidam inuenisse, fortasse nò est. Dixi exactè, propter accutù. Quod quum omnium (quæ nouimus) potestate refrigerantium, planè tenuissimarum sit partium, admissam sibi aliquam habet caliditatem. Præterea corpora quæ contingit, siccat: quàmuis ad imaginationem sit humidum. Quo fit ut ad eos affectus, quos humectari & refrigerari expedit, solo eo nò utamur, sed tanto aquæ frigidæ admisso, ut possit bibi. Hoc autem medicamen quòd subdâ, humectauit & refrigerantiū omnium simplicissimum est, optimūq; ad erysipelata, & pudendorum phlegmonas inter initia, prius quàm depascens aliqua subindiceatur putredo. Olei rosacei ex omphacino oleo citra salè cōfecti. Vnctas ʒ. uel. 4. Ceræ albæ, & clotæ, unciam unam. Liquentur simul in uase duplici, ac fiat ceratum humidum, cui abundo refrigerato, miscetur panla uim in mortario tantum frigidissimæ aquæ, quæ

tum in se, dum cum ea mollior, accipere possit. Quòd si acceti quoque admodum tenuis & clari paululum adijcere uelis, utiq; magis adhuc tum refrigerans, tum humectans medicamentū efficias. Non debet autem medicamentum hoc esse visq; super ægrum corpus manere, dum manifestè incalcat: sed assidue subinde mutari. Aliud. Oxalidos, aut oxylapathi succus, cum exigua polenta mistus, excipiat duplicato & detricto penicula, aut linteo: affatumq; frigidum totum id admouetur. Quin etiam portulacæ, & semperuiui, & uiz immaturæ succus, similiter polente miscentur. Ad hæc, lens palustris, & uiridis tribuli, & polygoni, & lactuæ, & intybi succus, aliaq; refrigerantia, cum tenui polenta miscentur. Licet etiam absque polenta, uti integris herbis tunsis. Jam uerò quod episthema ex pinguius conficitur palmalis salutare medicamentum est. Porro coquere oportet harum carnem, omni membranoso exempto, aliàs ex solo claro aceto: aliàs aqua ipsi permista: atque hac, ubi tenera satis reddita est, tunsâ uti. Est uerò salutare medicamen ad talia, etiâ succus rosarum frigidus, uia cum polenta. Salutares similiter sunt & ipsæ rosæ contusæ. Præterea stipium quæ moderate astringunt, germinia trita. Ad quem modum uti aliquando licet herbis medicenter astringentibus: ut solano. Huiusmodi tamen refrigerantia omnia, illi tantum admouenda sunt parti, quæ primariò est affecta: non alijs quæ refrigerari non possulant. Ego namq; hominem scio, qui imposito præcordijs refrigerante medicamento, laborarit statim dyspnoea: sicuti alterum, qui tussierit proteritus.

Refrigerantium remedium nonnulla per se refrigerant, ut potio frigida: alia per accensum, ut balneum, de quo agitur. Cap. X.

Verum ex remedijs ipsis, nonnulla quidem per se, neque intercedente alio, refrigerare sunt nata: ut gratia exempli, frigide potio, necnon succus uiz immaturæ. Alia autem ex accidenti: ut sanguinis missio. quæ calidâ quando intemperiem sanat. Ad eandem modum & clystere, & purgatio & fomentum, & cataplasma: quæ uidelicet digerant, concoquantur. Utanque uerò facultatem in se comprehensam habet dulcis aquæ balneum temperatum: ut pote ex partibus uaria facultate præditis constans. Siquidem quâ primùm in id ægri ingrediuntur, in acre uersantur calido: postea in calidam aquam descendunt. Mox ab hac egressi, in frigidam. Postremò sudorem detergent. Potest autè prima eius pars materias per totum corpus, tunc calfacere, tum liquare: præterea, quæ inæqualia sunt, æquare: & cutim laxare: & multa, quæ sub hac ante detinebatur, euacare. Secunda eius pars, ubi quæ in siccis corporis affectu ea vitur, potè madoris tunc solidis parti-

bus

bus immittere. Tertia balnei pars potest, ubi quis frigida vitur, & totum corpus refrigerare, & cutim densare, & vires firmare. Quarta verò, corpus per sudore, citra refrigerationis noxam, vacuare. At ubi quis intempeltine laeatur, in horrores, cutisq; densitatem incidit. Est autem continens ipsius horrores causa, mordentium excrementorum, aut etiam crudorum humorum, conserit a humorum, citior motus. Proinde, quibus horum est abundantia, caro verò ac cutis densa, siue balneum sint ingressi, siue steterint in sole, siue quomodo modo gelati, vel perfricti, vel exercitati, vehementius dimoti fuerint, utiq; ipsi horrores incidit. Contra, quibus haec pauca sunt, & corporis habitus, ut remittitur, laxeturq; à balnei calore, promptus, ij non modò non horrent, sed etiam meliores redduntur, utpote excrementis per id vacuatis. Quorationalibus, neq; in primo inuasionis initio, nec in incremento quisquã agrotantem lauit. Quippe densata est hoc tempore, coarctataq; & cuius ipsa, & quae sub hac habetur carnea substantia. At in febris inclinatione vel incipiente, vel procedente, vel amplius progressa, sepe numero nos agrotos lauantes, non parum eis contulimus. Si quis igitur balneum ingressus, minimè inhorruit, sed laxata illi, nec non rarefacta est cutis, huic succedent planè excrementorum uacuat, equalis per uniuersum corpus calor, exiguorum meatuum rarefactio, reuolutorum laxatio, densitatorum fusio. Ac uacuat quidem excrementorum, omni febrì est utilis sima. Pari modo & rarefactio, & relaxatio. Fusio tamen, & calor, non item: sed calor omni febrì inimicus est. At fundi aequaliter, id solidis quidem animalis partibus non est alienum. Succia certè non perpetuò est utilis. Sed quoties in animalis uel phlegmone, uel affectus phlegmone similia constringit, uel vitium plenitudo, omnium inimicissimum. Nam phlegmone quidem, quum calfacti & liquati succi ad ipsas confluunt, augentur. Tunc uerò uasorum, impares plenitudini, quae iam ex liquatione est repleta spiritu, distenduntur, ac uires hoc nomine male habent. Ergo calidis illis, ficcissq; affectibus, effusio mordentium est salubris: liquoriq; eorum contingit citra periculum. Calfactio tamen noxa non caret. Atq; hae quidem ex prima balnei parte optimè administrata sumuntur. In secunda autem (quae lanacrum erat) ut febrilis corpora ex humectatione iuuantur, sic ex calore nihil illis commodè accedit. At in tertia, refrigerantur innoxie, quae fuerant excalescent, & vires firmanent. Si qua uerò & laxata, & iusto plus sunt remissa, ea in naturalem redeunt mediocritatem, id quod quarta balnei pars, quae decersio est, indicat. Quippe qui bus erit sunt omnia adhibita, ipse post frigida usum adhuc sudant, & omnia ipsi excrementa uacuantur. A balneis igitur (ut unam omnium ueluti sum

mam colligam) uacuatur quicquid in corpore uel sumidum, uel fuliginosum praefuit. Reducuntur ad naturalem symmetriam, eum caro ipsa, tum cutis: corrigitur solidarum partium ariditas: & calor non modò is qui ex lauacro aeternis, sed qui etiam praefuit, ex frigide usu exinguitur. Maximo butus rei documentum est, praefidii quod sentiant homines, ex huiusmodi balneo, ubi à se ueni sole exiccati, lauantur. Quippe quum accedant ad id, ritu stipulae aridi, egressi est frigida, illi co in naturalem habitum redeunt. Si itaq; certè febricitantium naturae haberemus notitiam, non dubitaremus eorum aliquos assidue in aquis frigidis citra balneum lauare. Quia uerò exacta nobis dispositio non est uentia, ac maxima ex errore impendit noxa, utiq; eiusmodi recusamus praefidia, potissimum in febribus hectica: quoad per has & pauci sanguinis, & nudum carnes, & experti adipis corpus est redditum. Etenim iuuuenis corpulentus, & aetatis tempore, ac in febris summo, iugore modò nulla uiscerum phlegmone subsudabit, si in frigida se coniecerit. Quòd si sit frigide lauatio alluctus, securè remedio utetur. Qui autem ex calida & sicca intemperie febricitat, hecticae potissimum qui iam marasmodi sunt ipsi ubi tale praefidii petunt, tamen non est in totam consilii aequè ut nec gracibus & imbecillis, qui aetate calida & sicca, longa uia peracta, refrigeratione indigent. Nam neq; huius est frigidis solij usus, nisi prius fuerint in balneo aequaliter excalescenti. Si quidem simile quiddam nobis uidetur accidere, quum in frigidum solium post balneum ingredimur, ei quod terro accidit, quum singitur. Etenim tum refrigeramur, tum roboramur: quemadmodum & illud, ubi calidens iam redditum frigide mergitur. Atq; huius causa ad imbecilla corpora inuoluta sunt balnea, quae ea praecalfaciunt, atq; ad frigidum solij praeparant. Non dissimile quiddam faciunt, & qui si ne balneo frigida utantur, eum scilicet se ab excitatione in eam salu dermittunt. Si quidem quod nobis balneum, id praestas illis exercitio: ut quae non calfaciat tantum, sed etiam insti caloris motu à profundo corpore exteriorum concitet, sit, ut & frigide impetu occurrat, & quo minus uiscerum aliquod feriat, aduehatur, atq; prohibeat. Neq; enim ipsam frigide substantiam, neq; eius quatenus omnino integram, usque ad uiscera pertingere est salubre. Immo sauius & tutius fuerit, solam qualitatem, eamq; reuocam calidorum occursum, descendere. Iam uerò qui hectica febricitantes ad balneum accedunt, nisi in frigidam sint dimissi, nihil iuuantur, contra q; alijs correpti febribus. Nam quum ipsi solidarum partium affectus candenti ferro sit similis, calcescisse donaxat eos, humectasseq; haudquaquã uidetur satis (sic enim allentum, incrementumq; praebuerimus febrì) sed opus est, ut morsus in frigidam, extinguamus calorem.

Quodd si ex violento ipso, subitoq; frigida nfu, male fuerint affecti, utpote in contrariam qualitatem mutati, hos licet in toto quod sequitur tempore, calfaciendo sanare: quum neq; par periculum sit in frigido affectu: nec in remedijs quæ illi adhibentur. Quum autem insanabilis solidarum partium summa siccitas sit, ad quam per heclicas febres via expeditissima patet, melius est, hominem in frigidam intemperiem transferre, ac cui curationem adhibeamus habere, quam tenentem rectè ad interitum sinere, desperatamque illi salutem facere. Ergo eos qui hectica febriunt, illico omni ratione refrigeremus, antequam progressi, in marasum perueniant. Nam quem iam occupavit marasmus, hunc neutiquam sanare tentaueris. Ipsum tamen in alterum transferre marasum, quem appellant ex morbo senium licebit: ac sic superficiem, non tantum plures dies, sed etiam menses, seruare. In cæteris autem febribus, quas vel phlegmone, vel putrescentes succi accenderunt, nihil offendes, etiam si in frigidam ægrum ipsum non merferis. At in hectica est, id quod remedium affert, calidæ solium noue, sed frigida. Quicunq; igitur hectica febre laborant, atq; ex ijs præcipue, qui iam marasmode tenentur, modò his nulla alia febris, vel ex solo putrescente humore, vel cù phlegmone, sit adiuncta, eos omnes audacter lauabis: sed prorsus citra omnem laborè: ne resoluantur vires. Sint ergo etres domus balnei: iu quarum primam, quæ satis esse calida debet, in lectulo cubans ducatur inibi que nudetur. Illinc autem valida sindone in secundam portari debet: quæ non tantum situ sit media, sed etiam temperiei ratio scilicet prima calidior, quanto est tertia frigidior. In ea itaq; oleo tepido super sindone perfundatur. Hoc facto, id tertiam ducatur domum: ubi nimirum est solium. in cuius quidem moretur aqua mediocriter idque sustentus sindone: nullaq; infusione aque, cuiusmodi in alijs uti solemus, adhibita: immo nec capiti eius quicquam infundi velim: quum sit satis id quoq; bis, tære vna cum toto corpore, in aqua mergi: demissa mediocriter deorsum sindone: ac rursus per quatuor iuvenes, qui eum portant, leuata. Mox hiue eductus, in frigidam semel totus tingatur: ne vel breuissimo quidem spatio illic moratus. Protinus verò alter paratà habens calentem sindonem, ipsi iniiciat. Deia æger suo in lectulo collocatus, primum spongia detergetur: de in mollibus lineis, quoad fieri potest, blandissime. Postea verò vinctus, amictusque vestibus, rursus super lectulo reducatur in aliquam aliam domū vicinam, ubi cibari cōsuevit: inibi que nutriatur.

Hecticorum uisus ratio. Cap. XI.

Porro humidum esse, ac frigidum, quod hectica

eis febribus sit conducturum, nemo nescit. Eiusmodi verò sunt tum cremor pituitæ, quum frigidus fumitur: tum alica, similiter pituitæ cremori condita: id uero est ex aqua, & exiguo porri, & anetho: tum sale, oleo, & aceto. Commodus præterea ijs qui sic laborant, est & exiguus in aqua frigida panis. Cæterum nullius horum, pura frigiditas esse debet, sicuti potionis. Quippe hæc maturæ tum incalescit, cum per corpus digeritur. Illa, quum phusculum temporis in ventriculo moreretur, ipsum fortassis refrigerant, si fuerint immodicè frigida. Vbi autem febris iam exacerbat, dandum quoq; asinum lac est, sed diligenter obseruato, ne in ventre coarctescat. Cauebitur autem id, si mel illi admisceas: aut salia, quo uescimur, exiguum. Abstineendum tamen in hecticis, quoad fieri poterit, à melle estiarq; iccirco etiam à mulsis. Quippe protinus in bilem conuertitur, & sicciores, acriorisq; caloris febres reddit. Dandus itaq; principio altissimi lactis est non plus cyathus: sed inducta in ipsum cubiculum asina: quo nullum tempus in terponatur: æger autem id protinus bibat. At uerò si corruptum in uentre lac fuerit, pulsus paruos atq; inæquales inuenies, quales accidunt in compressione ventriculi. Sin autem non sit corruptum, & maiores & ualentiores eos quam pro consuetudine inuenies. Quia ratione obseruata, licebit tum lactis, tum aliorum ciborum omnium modum sensim augere. Qui igitur iam marasmo uexantur, eos, sicuti dictum est, lauabis. Quos uerò hectica premit, nondum tamen marasmo tentantur, eos licet etiam laues, sine sindone sindone utpote uiribus adhuc ualentes. At qui ex his minus sunt ualentes, eos non citum est permittere in frigidam natationem descendere, sed foris ipsos porius perfundere: primo tepida: secundo frigida: qualis fontana est. Ac si quidem omnia curiosè administrantur, antequam sanandi: id eius quem marasmus cōsumit, spes est. Sin error uel in uuo committatur, is, reliqua subuertit omnia. Quippe quum exitialis horum effectus sit, ne leuissimum quidem errorem tolerat. Ac si quis talium est seruatus, huic carnosam tantum portionem marasmi iam occupauerat. Ipsis uerò solidis reficatis, fieri nequit, ut homo prorsus sanetur. Ex enim primum eiusmodi febris proprii partium humiditatem, ex qua nutriuntur, depascit. Hinc transit ad genus carnosum. Deinde solidas populatur particulas. Vocatur autem caro tantum ea quæ in musculo est. Nam quæ in uisceribus conspicuntur, non carnes, sed parèchymata nominantur. Porro singularum particularum substantiæ moles, ex tali maxime completa est natura, quæ & perire, & regnari possit. At uerò nec fibrosa, nec nervosa, membranosa uatura, tandem generationem habere cernitur: nec fas est eiusmodi singularum partium fibras, à febribus malignis liquari, perinde ac carnes: quando animal

animal ipsum, prius quam hæc profus sint exicata, interemerint. Sicut sunt & quas marasmodos febres vocant, vniuersæ ex earum genere quæ colligunt: sed in eo differunt, quod in his, quæ portio carnis colligatur, ea semper vaporis vice digeritur: in illis desit inuentem. Nam quemadmodum quo magis animal vel adipe, vel carne abundat, eo, quod ab ipsis carnibus, dum in craticulis torentur, desit, copiosius cernitur ad eundem modum in calidissimis febribus, si carnes humide ac molles, cum ad ipsa copia fuerint, ea secus liquere deprehendas. Sin ab ipsa adipe & carne sint, insensibiliter absorbuntur, & in febres marasmodos transeunt. Hæc præmonitum, colligantium febrium ipsidem methodis curam ages: tum ad frigidam exhibendam, quam primum propereans: tum ipsæ quæ refrigeret & humectent, nutriendas. Mulsam verò inimicissimam illis esse censebis.

GALENI PERGAMENI
De Febribus curandis. Liber III.

Curationis scopi sunt duo: affectus, & ægri temperies.
Cap. I.



MODUM igitur curandarum ephemerarum, in octavo huius operis commentario continetur, in nono: hecicarum denique in decimo, satis accuratè exposuimus. Nunc verò, quemadmodum quæ ex putrescentibus humoribus excitantur, methodo sunt sanandæ, aggredi est animus. Duo autem sunt scopi curationis in uniuersum: affectus nempe ipse: atque ægrotantis temperies. Affectus quippe, ex ijs quæ sibi contraria sunt, adhibenda esse remedia indicat. Laborantis verò temperies, simul cum ipso morbo, mensuram contrarietatis definit. Potest etiam ambiens nos aer (qui ex cœli statu, anni tempore, ac regionis natura suas mutationes fortitur) unam efficere indicationem: ac vel ægri tudinis causis, vel sanitatis, annumerari. Porro auxilium, quo ad morbos tollendos utimur, prima & vltima dicitur sanitatis causa: diuersa tamen rationibus. Dicitur quippe vltima tempore: quando quidem & natura, & ætas, & fortitudo, priores, secundum tempus, eo sanitatis exitui causæ. Prima verò est, quatenus id primò laborantis corpus tangit, alterat: eius affectum. Ars quidem artificum: & fortuna, non per se primum, sed per auxilia morbos profligant materię quæ interuentu operantur: quemadmodum per seipsam natura. Quæ nimirum tum ex spiritu, tum solidarum particularum (quæ ex semine genicali oriuntur) tum carnosarum substantia, constat. Quarum trium substantiarum singulæ propriam pro natura sua tum qualitatem, tum quantitatem habent. Ac qualitas quidem earum, ex

congrua temperie humidi, sicci, calidi, & frigidi efficitur. Quantitas verò solidarum partium, par semper manet: sed ipsæ quæ adhuc in augmentum, numero dumtaxat: qui vero absoluti iam sunt, etiam magnitudinem. Carnose verò substantiæ magnitudo variatur, etiam si iam non augeatur animans. Pari modo & substantia spiritus, propemodum quolibet momento tum maior, tum minor conspicitur. Ergo ad duos illos scopos prius traditos, etiam unica virtus addetur, iuxta earum trium substantiarum enumerationem: aut temperies per se distinguatur: quæ & ipsa rursus bitariam scinditur: nempe & in originale naturam, & in acquisitam dispositionem: sic nimirum quæ ex istis, & alijs quæ prius dicta sunt, propria quædam cuiusque remedium sit indicatio. Ex ætate etiam, ut ætate diuina, consuetudineque, remedium indicationes sumuntur.

Intemperies contraria per contrariam est curanda, & custodia per similia. Cap. II. III.

PROponatur igitur vobis intemperies quædam curanda. Ea utique, per contrarium in temperiem sanabitur. Ac quoniam vniuersi febrium generis intemperies, est calor: utique per frigiditatem curabitur. Quemadmodum autem ab affectu ad materiam prædiorum peruenimus, eodem etiam modo à singulis reliquorum generum primorum, ad eas est descendendum: eluti à virtute, quæ morbo, seu aduersariis opponitur, & cui omni ratione opitulari & subuenire est consilium. Quare virtus quidem ipsa erit unus ac primus scopus: alter autem, atque secundus, quod ab ea significatur: nempe custodia ipsius. Pari etiam ratione, morbus quidem dicitur esse primus scopus: secundus autem, sublatio ipsius. At verò custodia, similitudinem indicabit exhibitionem: sublatio, contrariorum. Quoniam verò vitium substantiarum ex spiritu, tum ex carnosa specie, tum solidis ipsis completur: ex ijs quæ similia sunt, moliri cuique suam custodiam oportet. Spiritui, ex respiratione, et transpiratione, & aapore qui ex sanguine attollitur. Solidorum verò generi, ex solido nutrimento. Carnoso generi, per eam naturam, quæ in medio humidorum ac solidorum corporum est. Porro cuiusque hominis modum ex conservandæ substantiæ modo inueniet: qualitatem verò, ex ipsius temperie. Quam autem horum cuiusque temperies, vel optima sit, vel aliquatenus vitiosa: quæ quidem optima est, semper seruari debet. Quæ verò omnino vitiosa non caret, hæc in sanis quidem, vel seruanda est: vel alteranda: in ægria verò seruanda. Quam autem diuersitas non parua sit, in partium animalis temperamento, propriam cuiusque mensuram, eorum quæ ipsi similia sunt, oportet accommodare. Nempe ei quæ terra est magis, eorum quæ ma-

gis sint terrae: & ei quæ humidior est, eorum quæ sunt humidiora: sic de cæteris constitutionibus. Hinc verò iam materiæ particulares omnes in cibis, potione, aere, & omnibus peragi solitis, inueniendæ sunt. Quòd si mutuo inter se pugnent aliquæ indicationes, perpendenda indicantium corporum tum magnitudo, tum dignitas est, efficiendumq; id, quòd tum maiores, tum digniores scopi admonent. Quorum dignitas quidem iudicanda est, vel viæ uel sanitatis respectu. Magnitudo autem est duplex: vel propriæ substantiæ ratione, vel declinationis à naturali habitu.

Synochos febris qua dicitur, & synochorum curatio.
Cap. IIII.

His igitur præmissis methodis, iam in febrium genere exercitemur, quòd ex putredine nascitur. Ac primum ab illa febre exordiamur, quæ ex putredine humorum in maximis vasis, vel in omnibus simul, computrescentium, oritur: quamq; necessum est synochon, hoc est continenter, existeret: Fieri autem nequit, ut talis febris sanetur, nisi inhibita prius ipsa putredo sit: quæ sanè inhiberi, causa manente, non potest. Quare submovenda ipsius causa est, si modo putredo ipsa prior: mox post ipsam, febris sanari debeat. Ostensum autem est, illa tantum putrescere corpora, quæ quum calida humidatq; natura sunt, neq; persitata, neq; uentilata, in calido humidatq; loco includuntur. Quòd si in motu sint, ventilenturq; ac persilentur, posse ea non putria, integraq; seruari: poris sumum quæcunque corpora sua ipsorum natura reguntur: ut animalium, stirpiumq;. Ea namq; ab initio congenitos secum motus habent, quibus superflua excernant. Nec minus etiam est demonstratum, quanta sit tum respirationis, tum pulsuum utilitas, ad persilatum, ventilationemq; corporis, atq; eius naturæ calorem tuendum. Itaq; si quid in eo manifestè putrescere debeat, dictas transpirationes esse impeditas oportet. Fieri autem non potest, ut illæ per uocem usque animal, nisi vel finibus vasorum stipatis, vel tota cute. Porro accidere in finibus vasorum stipatio potest, vel ex vehementi extrinsecus refrigeratione: vel ex succorū, qui extrorsum in ipsos confertim ruerint, crassitudine, multitudine, vel lenitate. Accidit hoc illis & ex ipsi exercitationibus, quæ in palestra, vel aliis obeuntur, & itinere laborioso: vel ambientis statu, quum ex rigore in æstum mutatus est subitò. Nonnullis verò feruentibus ex ira succi, ac foras si mul impetu ruentes, effecerunt dictas stipationes. Quisquis igitur propositam sanaturus est febrem, hic simul causam eius oportet adimere: si mul calorem qui in animali excitatus ab ea est, refrigeret. Ac quemadmodum quidem ille refrigerandus sit, prius est dictum. Causam verò adimi

oportebit, propria cuiusq; naturæ inuenta contraritate. Vtiq; si ex frigida causa stipatum, densumq; redditum corpus est, relaxato eo, omniq; ratione rarefacto. Sin ex obstructione ita est affectum, hac reclusa. Quod verò recludet, hie quoque ad contrarietatis indicationem attentus inuenies. Vbi namq; abundantia humorum est, hos vacuabis. Vbi crassi, glutinosiq; sunt, eos teues & fluxiles reddes.

Nutrimenti quantitas quemodo sit expendenda.
Cap. V.

Si plures causæ aliquando coibunt, omnibus per contraria occurret. In eiusmodi autem diætarum causarum complexu, cepisse à sanguinis missione conueniet: ac abundantia vacuata, tum ad extenuandos humores venire. Ab hoc ad remittenda quæ sunt constricta, & rarefacienda quæ sunt densata. Atq; hæc quidem à morbi affectu indicatiuè sumenda sunt. Quum autem ciborum atq; potionum, necnon spirituum decens quantitas, qualitasq; virtutem ipsam custodiat: ac modus quidem quantitatis ipsorum, à virtutis substantia inueniatur: qualitas verò, à temperie: nimirum æstimari debebit, quemadmodum vires quæ corpus regunt, se habeant. Quæ quidē si sint ualentes, auctæ uacuantibus præsidij uteris. Sin infirmiores sint redditæ, uacuaturia remedia cautè administrabis. Sed & nutrimenti modus hinc tibi desumendus est. Quippe quum vires legitimè robur suum habent, & morbi summus rigor breuè expectatur futurus, tenuissimo cibo uti licet. Vbi uerò infirmiores fuerint, non licet sine graui noxa. Sed adijcere ad nutrimentum tantum oportet, quantum est de robore uirium detractum. At nutrimenti qualitas, ex morbi affectu, nā cum solidorum corporum temperamento præseuti, sumenda est. Tempus autem nutrimenti, quod quidem ad reliquas febres pertinet, quæ ex putredine oriuntur, in progressu sermonis dicitur. Quæ uerò unicam tantum à principio ad finem usque accessiōnem habent, synochiq; dicuntur (de quibus impræsentiarum est sermo) in ijs tunc offerendus est cibus, dum ægri melius se habent: eoq; potissimum dici tempore, quo in sanitate prius cibari erant fueri. Est autem frigida quoque ijs propinanda, quum succi & iam concoquantur, & crassitudo eorum est extenuata.

Februm putridarum differentia. Cap. VI. VII.

CAETERUM iam operæpretium est explicare, quot sint febrium, quas putredo accendit, in uniuersum differentie. Dein, quænam sit ipsius generis earum cōmunis utilium auxiliiorum indicatio. Mox, quæ sit singularum cuiusq; propria. Quod igitur ad differentias pertinet,

net, prima sanè ex eo est quòd causæ ipsius putredinis vel adsunt, uel non adsunt, Secunda ex eo quòd per totum animal, aut eius partem aliquà diffusa putredo sit. Tertia, quatenus cum phlegmooc, aut citra hanc.

Putredo quid sit, & quomodo sit sananda. Cap. VIII.

ERgo ordiamur ab humorum putredine, quæ primum indicans in diuisione fuit. Cuius quidem natura, ad curationem erit inuentionis principiū. Porro natura putredinis est mutatio totius putrescentis corporis ad corruptelā, à calido externo. Non enim profectò à proprio calore corrumpitur quicquam: immo prorsus contra, quicquid in rebus subsistit, id augeatur, roboratur, sanum est, ac uiuit, dum proprio calore regitur, ueluti nimirum ipsa animalium corpora, quando seruat proprius eorum calor: in cordis quidem corpore, per respirationem: in reliquis omnibus partibus, tum per commoitationem quam habent cum corde, tum per aliam quandam respirationis speciem, quæ per totam agitur cutem, & transpiratio, per spirationē dicitur. His uerò læsis, unā etiam calor natiuus læditur. Alter uerò quidam alienus, ac præter naturam in corporibus excitatus, primum quidem ipsos succos propter humiditatem putrefacit, corrumpitque. Spatio uerò, tum adipem innadat, tum etiam carnem. Putredinem in corporibus ortā sanabimus, id quod iam corruptū est, omni ratione uacuantes: quod reliquum est moderatis motibus, & refrigerante per spiratū ad exactam symmetriam reducentes.

Putris humor quomodo sit uacuandus, & quæ medicamenta uacuantiā in febribus conueniant. Cap. VIII.

AC uacuationem quidem illius per urinam deiectiones, sudores, uomitusque moliamur, si putridus humor, ad os uentriculi aliquando sua sponte impetum faciat. Post hanc, dimotioes mediocres, unā cum ambientis bonæ tēperie adhibebimus. Causam uerò putredinis, si adhuc perseueret in corpore, per contraria tollemus. Itaque quoniam transpirationis prohibitio fuit occasio putredinis, hanc submouere oportet. Quia uerò ea (quemadmodū exposuimus) à uariis causis est orta, ipsarum singulis contraria medendi ratione occuremus. Sciendum tamen est, non easdem omnes partes uacuatioes, medicamentis requirere: quoniam & tempera mētis, & polituria, & forma, & omni denique constitutione, naturaque, inter se discedunt. Quoniam autem maior pars medicamentorum uacuantiū, febrem ipsam adaugeant, utpote facultate calida & sicca deligenda medico sunt, quæ citra calfactionem, siccationemque, ualentem, ipsas uacuatioes molian-

tur. Cuiusmodi sunt cremor ptisanæ, aqua malsa, oxymeli, apomeli, & apij radix, in aqua, quæ potui datur, incocta. Hæc autem ipsa uentri sunt quoque idonea. Qui si nihil reddat, iniicienda per clysterem malsa cum oleo est. Sanè totum corpus, prius quàm id uacuaris, rarefaciendū non est. Vbi uacuatum sit, utique, licebit id medicamentis, cui calor tepidus infuit, rarefacias: cuiusmodi est quòd ex chamæmelo conficitur. Hoc tēpore si uinum quoque, aquosum bibatur, id omnes uacuatioes promoueat. Idem faciat & temperatum dulcis aquæ lauacrum. Cæterum, ubi magnitudo febris obstat, sicuti in continentiis, nec uino est utendum, nec lauacro, nec ipsis quæ habitum rarefaciant, uocatioibus. Iam uerò id genus ardentissimis febribus, potus frigide coferretur: nisi subint putrescentes humores, par alium, urinas, uel sudores uacuandi. In uniuersum autem, dum plura simul coeunt symptomata, id quod maximum omnium est, aggregari oportetque: ei uel soli, uel magis quàm cæteris, subuenire. Porro ad corrigendos putrescentes humores, non tantum requiritur uires ipsius pulsus firmas: sicuti oec eius facultatis quæ uoluntariū motum largitur: sed multo magis ipsius concoctionis. Ergo si & uires cunctæ ualentes sint, & ardentissima febris, & concoctionis notæ planè euidenter, frigidam intrepidè propinabis. Quòd si etiam æger bonæ corporis habitudine sit, tum status cœli calidus, ac luscus, etiam si in frigidam nationem hūc demittas, haudquaquā lædetur. At si medioeris est febris, & uires non ualide, sed cum notis concoctionis, ipsis qui ita se habent, balneum prodest, & uini potio: tum uerò ex unctionibus ex quæ rarefaciunt: idque multo magis, quoniam ambiens est frigidus. Neque enim aut frigidam in balneo lotionem, aut frigidam potionem in eiusmodi cœli statu ferè expetunt, nisi tepidæ inspirationibus assidue refrigerati: quoniam si quando in frigidā ambiente uehementer nri agrotū contingat, exigua salutis eius habenda spes est. Si uerò oec concoctionis habeat signa, nec uires validas, seruari est planè non potest. Quo minus aut idem lauandū in balneo est, aut medicamentis ipsis quæ rarefaciant, ungendū, aut uinum illi dandum, frigidæ esse reſenda. In quo enim desperata omnino est salus, imprudentis consilij fuerit apud vulgum infamare præſidia, quæ multis fuisse saluti, febris igitur, prout febris est, aqua frigida est perpetuū remedium. Quòd uerò ad alia pertinet, non perpetuū. Veluti quum ex obstructione glutinosi & crassi humoris putredo nascitur. Ponatur autem cum hoc, & rednodantiam in toto esse corpore, ita ut uirtutem non imbecillam. In eiusmodi etenim complexioibus, quum multa præter naturam in corpore sint, quedam eorum præcedentes causæ erunt: ueluti redundantie cū glutinosi, & crassi humoribus. Horum namque uitio obstructio est

orta: quæ morbus instrumentalis est, eorum quæ obstructa sunt corporum. Hanc symptoma sequutum est, ipsa transpirationis cohibitio: quam rursus putredo humorum excipit, antecedens quædam ipsius febris causa.

Obstructiones sunt aperiendæ, sed non prius quàm plerumque vacuentur. Cap. X.

ERgo qui febrem curare vult, necesse est inhibeat putredinem. Ac sic duæ indicationes se exhibent: altera à febris altera à putredine. Atq; à febris rursus duæ: scilicet ut portio febris, quæ iam accensa est, percuretur: quæ verò etiamnum gignitur, inhibeatur. Aliæ autem duæ rursus à putredine erunt indicationes: ut & quod putredinis iam factum est, sanes: & quod in generatione adhuc est, sistas. Porro quod in generatione est, id perspiratio impedita facit. Ita ab hac rursus aliæ duæ indicationes nascentur: tum ut quod retentum est, vacuetur: tum quod retinendum est, prohibeatur. Prohibebitur sanè, si obstructioni medeamur. Cuius quoq; ipsius, quod iam occupavit, sanandum est: per ea quæ obstructa liberant, quod futurum est, propulsandum: per ea nimirum, quæ affluxum obstructivum succorum compescunt. Ergo quod ultimum in ipsa methodo resolutiva est inuentum, id primum omnium in curatione tibi est peragendum. Etenim si ijs auxilijs, quæ obstructiones eximant, uti, non vacuata prius abundantia, velimus, non modò nihil proficiemus, sed maiorem etiam redemus affectum. Ac si vacuata prius multitudine ad curandum obstructionem accedamus, medicamentis ijs vtemur, quæ circa calorem obstructiones expedire sunt apta. Vbi autem quæ obstructuunt deterfa, dissectaq; sunt, per aluum, urinas, atque sudorem, ea vacuare tentandum, idq; medicamentis quoad licet, minime calfacientibus. Hoc verò tempore, etiam vires roboratæ, quo & putredinem superent, & succos concoquant, studebimus. Quod autem febris ipsius iam accensum est, refrigerabimus. Itaq; in auxiliorum invenientium ordine, ultima est quæ ab hac sumitur indicatio, quævis alia ratione sit prima: quum à febre videlicet coeperit invenientium præsidium methodus.

Febris quando celerrime finiatur, & facultas multa. Cap. XI.

AC si nullum quidem interim vehemens symptoma incidat, prohibeatque quomni auxilia ab initio morbi ad finem ita procedant, celerrime febris finiatur. Sin tale quipiam incidit, quod totam ad se curationem revoceat, producat & curationis finis. Expendere autem oportet medicamentorum tum usum, tum

noxam. Quippe aqua multa, quatenus crassos succos extenuat, glutinosos deterget, atq; excretionem promouet, optimum in ijs synochis medicamen fuit, quos habitus coarctatior, & putredo excitavit. Quicquid verò calorem febris adauget, est noxia. Quare si hic immodicus sit, parcendum multæ est: vitandumq; cremore pituitæ. Quod si difficiles & consumaces iudicaveris esse obstructiones, etiam oxymelite. At hoc ipsum rursus, immodicè utare, & intestina radice, & tussim excitat, & nervosa lædit.

Contrariorū contraria esse remedia, contraria quæ dicantur & quæ non. Cap. XII.

PErpetuò autem dogma illud existit verum, contrariorū contraria esse remedia. Quamdoquidem fieri non potest, ut eorum quæ præter naturam sunt, quæquàm per aliam ullam remedium speciem curetur. Non tamen ex usu est semper omnibus quæ præter naturam sunt, moderis: sed quum sola per se subsistunt. Nam si cum alijs unà incidant, alijs sæpe est ante illa medicandum: sicuti in canis ulceribus, ubi ea simul cum phlegmone sunt coniuncta. Si quidem verum in his quoq; manet, quod per ea quæ carne implent, curantur. Ceterum si usi non licet prius quàm curaveris phlegmonem. Quæ itaq; præter naturam sunt, omnia ab ijs quæ ipsis sunt contraria, curantur. Quum autem eorum quæ præter naturam sunt duplex prima sit differentia, alijs per se subsistentibus: ut puta affectibus: alijs in generatione suam essentiam habentibus, ac umbræ ritu affectus concomitantibus: nempe symptomatis; utiq; sanatio quidem, affectui sublatio est. Hanc verò symptomatum amotio sequitur. Quare affectuum ipsorum, qui verè & primariò curantur, potissimum dicuntur esse contraria remedia: symptomatum autem, ex accidenti. At verò contraria dicuntur, quæ sub uno eodemq; genere, plurimum inter se dissident. Si autem in illo genere quod mediocriter est, hoc est mediū inter duo extrema, intellexeris, infinitam quandam contrariarum rerum multitudinem, quæ maioris minorisq; ratione, inter se dissident, ex eo innemur. Non enim in corporum modò qualitate, verum etiam in quantitate, eiusmodi contrarietatem invenias. Quam utiq; Aristoteles non contrarietatem, sed oppositionem nominat. Verum Hippocrati, omnia id genus contrariorū habent appellationem: sicuti etiam Platoni, qui ex contrarijs esse dicit generationes. Contemnere tamen nomina oportet: minimè autem scientiam rerum. Cuius non ignarus Hippocrates ait, Medicinis appositio est, & detractio: deficientium quidem appositio: redundantium autem detractio. Porro deficientium, redundantium: nonnulla quidem in quantitate: quædam autem in qualitate. In quantitate,

re, quom sanguis immo dicie est auctus: aut rursus minor redditus. In qualitate, quom vel calidus vel frigidus, vel crassius, vel tenuis, plus iusto, minus, est esse cœus.

Causarum genera præter naturam. Cap. XIII.

Verum ad medendi indicationes propositi nobis febrii generis reuertamur. Genera causarum quæ in nobis præter naturam oriuntur, sunt multitudo, crassitudo, & lentor humoris. Causa simul atq; symptoma est transpirabilis excrementi retentio. Simili modo causa præcedentium causarum quilibet propriū aliquid, poscens nimirum ablationem sui per opposita. Nempe multitudo ipsa, quæ ex eorum est numero, quæ sunt ad aliquid, in prædicamento quantitatis, uacuationem. Lentitudo verò & crassitudo, quæ sunt ad qualitatis affectu, incisionem & absterisionem. Obstructio autem, qui morbus instrumentalis est, reclusionem. At transpirabilis retentio, excretionem eorundem. Sicuti & humorum putredo, excretionem, refrigerationem, uentilationem, & concoctionem semiputredorum: quæ omnia illi ex aduerso respondent. Ipsius verò febris refrigeratio oppositio est. Singulæ itaque res semper unam indicationem exhibent. Ac si præter naturam ipsam iudicauis sit, semper indicabit contrarium: sicuti non contrarium, sed simile, si secundum naturam se habeat.

In febribus putridis quando, & quomodo mittendus est sanguis. Cap. XIII.

Igitur si vires eius qui ex putredine humorum febreciat, valentes sint, mittendus statim morbo incipiente est sanguis: si cruditas ventris non ad sit. Sin vires infirmæ sint, aut ætas deboretur, incidenda vena non est. Eiusmodi tamen febris in virtutem imbocillam non incidit. Quippe synochos bene habuit corporis, & calentis ætas est propria. At si in puerum incidat, qui quartum decimum annum hætenus non attingit, mitti illi sanguis non debet: propterea quod tætilis, quom præsertim calidi & humidi sunt plurimum corporis substantiæ quotidie defluat, ac digeratur. Ita quod ex incidenda vena molendum nobis fuerat, id ultro uobis reuerandi eorpotis natura præstat. Quod si corpus quartum decimum exccsserit annum, æstimandum est qualis eius natura sit: num gracilis, & spissa, & dura, & copiosi sanguinis, an contra. Atque ita in priori missionem sanguinis adhibebis: in secunda, nequaquam. Quin etiam modus uacuandis sanguinis ex iisdem sumetur indicationibus.

Si enim cui sanguis mittitur, rigida ætas sit natura: sed laxus, & mollis, & pinguis, & albus, & gracilibus venis: huc aut planè sanguinem non mittes: aut parum detrahes. Et omnino quidem non mittes æstiuo tempore, regione æstiuosa, & cœli statu calido & sicco. Parum detrahes in reliquis tum anni temporibus, tum regione, tum cœli statu. Iam uerò, si neq; obstructio, nec putredo subesset, sed sola redundauit succorum, protinus à missione sanguinis, pro naturæ suggestione homo se haberet. Verum quoniam nec obstructio, nec putredo per solam curari missionem sanguinis potest, reponi sanguinis aliquid ad spatium curationis debet: quo minus intempestiue nutrire necessitate ulla cogamur. Quantum namq; ad huiusmodi pertinet febrem, profusum utriusque non est. Signidem ostensum prius est, solum uirtutis respectum esse, qui nutrimento præbeat indicationem. At uero euacuationis ratione, nutrire oportet. Ita necessum est duorum alterum: aut febrem, si nutriti, augere: aut vires, si non nutriti, deicere. Satiū itaq; fuerit, aliquid sanguinis, quod propriū partibus animalis nutriendum sit, relinquant: ac ipse paucissimas sortitines, potionesq; calidæ contentus sit: quibus utiq; ceu medica mentis, potius quàm nutrimenti genus.

Visum instituens pars artis ex quibus constat.

Cap. XV.

Procedo quom æt ipsa tota sit magna, non leuissima eius pars, est scientia ordinandi uitæ. Quæ utiq; ex his maximè remedijs constituitur, cibo, potione, perfusione, cataplasmatibus, & clysteribus. Cæterum calfacere præcordia cataplasmatibus aut perfusionibus, non est perpetuum uitum: sed in ijs tantum ægris, quibus in toto corpore nullum erat superfluum. Cæteria omnibus extrema est periclitia. Nam sine redundantia uerauis sit, uel ad uas, uel luxta vires: siue etiam in una parte pluribus uel uitiosis excrementis habeantur omnia ad partem excalfactam trahuntur: inibiq; sepe phlegmonas excitant. Quare in eiusmodi morbis diuities potius quàm paupertas perperam solent curari. Nempe, & quod raro illis mittatur sanguis, uel si maximè tali cgeant auxilio: & quod medici, ut agere aliquid semper uideantur, de prescundendis præcordijs maximè sint solliciti, itaq; accidit, ut illo ipso tempore phlegmonæ incipiant diuicibus, quo iam pauperibus, morbus propemodum productus ad suum est. Saluberrimum igitur est in febribus uenâ incidere, non synochis modò, uerum etiam alijs omnibus, quas putrescens humor concitat: nobi præsertim neq; ætas, nec vires prohibent. Leuata enim quæ corpus non regit natura, exonerata q; eo quo ueluti sarcina premitur, haud ægrè quod reliquum

liquum est vincet: concoquens quod concoqui est habile: & excernens quod potest excerni. Porro ubi humor ad locum affectum confluit, remittere repellereq; hunc expedit: non ad ipsum trahere. At repellentia remedia, quæ certè astringendi vim obtinent, in principijs idonea suot duplici ratione. Ex quòd robor affectus particulis infertant (unde minus promptè affluxum excrementorum in se recipiunt) & quòd eorum quæ in ipsa recepta sunt, tenuissimum extrorsum exprimant. Quòd si tum fluxio humorum per ea remedia compescitur: tum densitas quæ in affecta particula relicta est, crassiora detinet: iam tempestiva relaxatio est, quo ea quæ retenta sunt, vacuet. Præcipuè autem astringentibus est vitendum, ubi in iecur aut ventriculū, superuacuum aliquid profluit, quando & è primordiis admodum hæ partes sunt: & ut munus suum obeant, vel in ipsis morbis, est necessarium: quom alimentum corpori uniuerso sufficiant. Quare ciborum concoctio, siue ea in iecinore, siue in ventriculo sit impropria, febres iutendit: ac succi uitio exacerbatur. Quo magis in omnia febrī, ciborum concoctionis prospicere magnopere oportet. Atque eius rei gratia, roboris quoque instrumentorum quibus perficitur, non leuis habenda est cura.

Concoctionis instrumenta consideranda sunt. Cap. XVI.

XVIII. De his quoque...
SI ergo vel minima sit suspicio iecur aut ventriculū labore, absinthii protinus oleo incoquemus, ac eas particulas perfundemus. Quum autem duplex in omni absinthii facultas sit, utiq; in pontico astringendi facultas non parua est. In reliquis omnibus amara quidem qualitas est vehementissima: astrictio verò, aut planè obscura, aut prorsus nulla sentitur. Proinde ponticum ad iecinoris & ventris phlegmonas eligi præstat. Est autem id tum folio, tum flore longè quàm cætera absinthia minore. Odor quoque huic non modo non insuauis, uerum etiam quid aromatiçi referens. Reliquis omnibus planè est sedus. Quare hæc fugere oportet: uti autem semper pontico. Etiam reliquorum medicamentorum, in quibus mista cum amaritudine astringendi vis est, aliquid in oleum coniungere, atque ad eundem modum uti, licet. Amara siquidem qualitas præit, uiamq; astringenti facit. Ac si quidem intendere astrictionem studeas, oleum ipsum etià astrigendi vim habeat: cuiusmodi est, quod Hispanum uocant, & quæcumq; cum oleæ frondibus præparantur. Sin leuiore uti astrictione placet, aliud olei genus præparabis, præcipuè quod tenuium sit partium: quod genus Sabinum est. Optimum tamen ubi astringere uehementius expedit, est istricum oleum. In penuria uerò absinthij ioter initia uel melinum, uel mastichinum, uel lentiscinum, satisfecerit. Quòd si exi-

gux febris sit, etià unguentum nardinum: quod utique ualentius ijs omnibus calfacit. Quare si aliorum copia non est, inualescente febre, rosaceum illi admiscebis. Sanè myrtini astrictio idonea non est: quum crassiorum sit partium, quàm ut uix descendere possit. Ad eundem uerò modum & cataplasma compositam vim obtineat, ex ea quæ tenuium sit partium, ac relaxet tum etiam, ex amara, astringenteq;. Superet autem in ijs, ubi scilicet tum reprimere, tum robur addere, studeamus, quod astringat. Vbi temere ac digerere, amarum ubi euocare, quæ ex relaxantibus tenuium maximè sint partium. Si quidè quæ crassæ substantiæ sunt, ea pus mouentibus sunt accommoda. Cataplasmate autem quod sequitur sumus nos scilicet usi, contra iecinoris phlegmonem. Recip. Olei in quo absinthium decoctum fuerit, & cydoniorum decocti, sing. vnc. 3. myrobalanorum & rad. iercos, sing. drach. 2. Cere quod sit satis. Fiat emplastrum puluerizatum, iuxta artis præcepta. Coquitur & in uino aultero cydonium: ex ipsiusq; carne aliquid eiusmodi cataplasmatibus inditur ubi uidelicet & quod confluit copiosum est, & particula ipsa infirmior. Tunc siquidem astringentem vim in augemus. At uerò nec colo laborante, nec reliquorum intestinorum quouis, nec musculis qui in præcordijs habentur, aut ipso peritono, miscenda astringentia sunt. Sed nec quum nescia malè habet, uterus uel modò nihili ultra ad locum fluxus, nec sanguinis redundantia, nec excrementorum copia, in toto sit corpore. Porro renet & pectus in media prædictorum conditione constituit: quantum scilicet à uentriculi iecinorisq; solitudine absint, tantum reliquis antecellentia. Si quidem in uentriculo iecinoreq; resoluti robur perniciosissimum est: minimè in illis periculosum. In his uerò est quidem periculosum, non tamen perinde ac in illis: nisi pus educere ex pectore, aut pulmone, aliquando sit opus. At in liene curando, si uel æger ex ijs sit, qui atræ bilis excrementum naturaliter congerant: uel etiam eo tempore succus is in eorum dundet, necesse est reliquis astringentia permiscere: quo uisceris robur custodias. Ita enim & excrementa ad se trahet: & quum corpus expurgarit, ipse rursus per uentriculū excernet. Sin atræ bilis sit omnino excrementum nullum, aut prorsus astrigendum nō est, aut parciſimè. Ad hæc, si in quouis phlegmone obfessa particula, calor tumorem superet, agendum, ut sensum per ea quæ tepentè calorem obtinent, digeratur: quod genus est tū lini semen: tum chameæmolum. Quibus adijci vel hordei uel fabarum farina debet: quippe quorum neutrum exalfacit. Sæpe uerò & aromelate ad eiusmodi phlegmonas utimur: cui quæ aliquid admiscemus. Ad lienem uerò etiam areti aliquando aliquid. Si uerò laborantibus phlegmone partis calor non multum à natura recesserit

recesserit: tumor autē ipse fuerit notabilis, digere re haud timide sine aqua debetis: etiam foenigræcia aliquid supradictis immiscens. Si ueluti scirrhosa duritie phlegmone sit, propter humoris quæ continet uel crassitudinem, uel lentorē, tum aceti aliquid, tū amara medicamenta, simul immiscenda enabis: potissimum in liene. Etenim viscus hoc, propterea quod ab icinore crassum humorem trahit, eiusmodi humoris occasione plerumque laborat. Quo magis cataplasmata quæ ex oxymelite, & ablinthio, & cappari fiunt, illi sunt idonea. Cæteri nec eorū qui ex patrescente humore febriunt, quenq̃ ipse lauabo; nec relaxantibus cataplasmatibus, prius q̃ superuacua purgarem, utar. His nactuatis, nō solum audacter laue, sed etiā cataplasmatibus ntarin alijs quidē mēbris, ijs quæ relaxant: in icinore uerō ac nentriculo, additis etiam quæ astringant mediocriter.

Parcius autē ad pectus, q̃ ad ea, utendū astringentibus est. Quādo talia humores qui phlegmone excitant, in pulmones & cor nonnunq̃ cōprimunt. Ac cibis potius horum firmitudini est consulendum. Neq; enim sicuti in icinore & uentriculo phlegmone laborantibus, ita hic tenuissimum nictu est utendum. Ac longē quidē magis in pulmonis phlegmone abstinendum ab astringentibus est. Quando in eo ipsi quoq; relaxantibus admiscēndum aliquid acri quodāmodo, & euidēter calfacientiū est. Quippe foras trahere, potius q̃ reprimere, in eo debemus. Itaq; etiā cucurbitula, in ijs qui sic laborant, si prius sint uacuati, applicabitur. Si uerō ab aditū suæcorū adsit, nō magis ex pulmone in pectus aliquid excrementi trāferet, quam ex toto corpore attrahet in utrunq;.

Eadem ratione, neq; in cerebri & eius mēbrarum phlegmonis, cucurbitulis in morbi initio utemur: uerum nbi nec influat adhuc quicq̃, & totū corpus prius est uacuatum. At reprimentibus in his quoq; inter initia utendū. Sed quū per cranium ossa mediā occupātia regionē, in altum descendere reprimentiū uim cupimus, eorū quæ preire, ac deducere ea possunt, aliquid reprimētibus admiscebimus. Ea sunt, quorū substantia ex tenuibus partibus cōstat. Sanē aceti nō modo tenuiū partiū est, sed etiā non mediocriter reprimēdi uim obinet. Quo profectō rationabilis in principijs affectuum ipso nitimur, profecto admiscētes. Proecedente uerō tempore, etiam spondylii & serpili, aliquid miscētes: quo scilicet tempore transire ad ea quæ concoquar, ac digerant, conuenit. Sanē ad eum modum & castoreo utimur: quum tamen ipso in alijs phlegmonis minimē utamur, quāuis etiam in summa inclinatione consistant. Est namque calidius id, quā ut phlegmonis sit idoneū.

Fluxiles reddantur meatus, qui ad emissionem excrementorum sunt destinati. Cap. XIX. & XX.

Soleo autem ipse singularum particularum

meatus, qui ijs ad excrementorum emissionem sunt destinati, fluxiles reddere. Intestino, uentriculo, nescientio, & icinoris concauis, intestinum rectum. Renibus, uelicæ, icinoris gibbis, uenæ cauz, arteriæ magnæ, & omnibus, quæ in lumbis habentur, eum qui uelicæ inferuit. Pulmonibus & pectori, arteriam asperam, atque fauces. Cerebro & eius innolucris, eum qui per palatum & nares descendit. Paratur fluxibilitas ijs quidem quæ per sedem externi debent, multa, & cibis ijs qui nentē liquant, & pharmacis, quæ modicē proritare possunt. Ad nentriculum uerō, iecur, & lienē, si quando phlegmone sint nexata, nec multa ipsa est uilis, quopiam illico in bilem transit, ac uiscerum phlegmonas auget. Excrementa autem, ut cum urina excernantur, diureticis promouebis: quemadmodum quæ in pectore, & pulmone hærent, ijs quæ tusum excitant, euacuabis.

Porro balneum in remissione febris administratum, corpore iam mediocriter transpirante, non exiguum commodum affert, omnia ex eo tam fuliginosa excrementa, tum humida educens. Curandum tamen est primò, ut citra horrorem administretur. Secundò, ut nullum primè nō ex uiscus sit imbecillum. Tertiò deniq; ne multo crudis humoris in primis uenis contineatur. Horror siquidem & auget, & gignit febrem. Pariter uerò imbecillitas, per balneum liquatos humores multo facilius alliciunt: & quod succi liquidit, & quod uix dilatat. At crudorum humorum copia in totum corpus digeritur. Horum si nihil obstat, ex balneis duo hæc ægro compendia accedenti: & quod redundante humorum uacuabitur aliquid, & quod multum transpirabit caloris febrilis. At uerò quum paricula, quam obstructio, aut pntredo, aut phlegmone obfidit, febris ipsius ueluti focus sit, si ei propter calorem sua sponte trahenti, alia quæpiam occasio extrinsecus, ex ijs quæ potestate excalfaciunt, accesserit, necesse est affectum intendi. Si quis autem prius toto uacuato corpore, relaxantibus curet, nbi scilicet maxima febris non adest, utique prodesse aliquando potest. Quo tempore etiam lauare citra noxam licet. Cauendum tamē à frigido solio ijs est, quando & crudi & putrescentes succi, minus apti sic ad exhalandum redduntur. Itaq; in progressu morbi, nbi & absumpta iam superuacua sunt, & tum cruda, tum putrescentia concocta, & cataplasmatibus relaxantibus, & balneis sine periculo utare. Porro aptissimū in febribus quæ intermittunt & repetunt, tempus est quum exhalare febrilis calor iam coeperit. Statim siquidem corpus ad nntimentum præparant: huius quoq; opportuno tempore ex duplici coniectato respectu: nēpe in primo præcedenti accessione uigore, & futuræ principio. Ad hæc nāq; spectantes, operam dabimus, ut quāuis lon-

gisimè ab utroq; nutriamus. Vtrum si febris ipsa
ut cōtineas, cōstat eam breui finendā. Si igitur ul-
tra septimū neutiq; progressura videatur, pro-
fus continendus si cibo æger est, si uirtutem non
desuturam cōspiciamus. Sin ad nonum, aut undeci-
mum, aut quartumdecimum, usq; progressura ui-
deatur, aut etiam finienda septimo, ceterum æger
uires infirmiores habere, quàm ut in tantum tem-
pus sufficiat: necessum erit nutrire, ac deligere id,
quod minus sit noxium. Etenim ubi uel icter, uel
ventriculi phlegmone prehendi, perniciosissi-
mum est ante accessionē cibare. Vbi hæc abest,
quibus infirma est uirtus, ut illisimum. Porro sum-
mum uigorem febrilis accessionis expendas, an
circa magnitudinē febrilis calor sit leues, squal-
lensq;: an citra siccitatem urens. Priorem nanq;
humectate uictu quāprimum madesecere opor-
tet. In secundo, dum plurimum sese calor remit-
tat, manere. In principij uerò accessionis more
æstimabis, an corporis extrema refrigeret, & ma-
gnam sanguinis reuocationem ad interna cor-
poris faciat: an omnino corpus nō premat. Qui-
pe secundum hoc, seu facile manuetum, contem-
nes. In priore distinguas oportet. Nam si absq;
uisceris phlegmone, aut succorum redundan-
tia motus ad interiora in accessionibus pollet,
nihil offendes paulo ante cibans. Sin uel phle-
gmone, uel redundancia sublit, cauenda est ante
accessionem cibatio, seu res maximè noxia.

GALENI PERGAMENI DE FEBR. CURAND.

Liber V.

Symptomata febrilis inciduntia, et curatio. C. I. II



VAS cum symptomata consi-
stunt febres, non sunt ad febriliū
genus ullum, aut species aut dis-
tinctionē distincta. Porro grauior
symptomata, & quæ raren-
ter febrientibus incidunt, primæ

differentiæ sunt tres. Aut. n. in lēione actionē cō-
sistunt: aut in retentorū uacuatorumq; immodico
excessu: aut in corporū ipsorū affectu. Ex quibus
duæ quidē differentiæ priores, si cōtristent, ad se-
totam curationem cōuertunt, affectumq; desere
re cogunt. Tertia uerò, alterius quidē, quem cura-
re oportet, affectus, est signum: nullam tamē seor-
sum curationem exigit: utpote cum affectu, un-
de nascitur, unā cessans. Nullum autē symptomata
qua symptomata est, nec curationis rationem in-
dicat, nec primū immutat: licet ex accidenti inter-
dum id faciat ubi scilicet causæ locum sortitur.
Porro eorū omnium, ubi ueluti causæ curatio-
nem immutat, non caput est, ipsa læsio, siue uir-
tutis sit, siue dispositionis. Lēdunt autē uires uigi-
lia, dolor, atq; uacuatō immodica. Affectui uerò
eadem, non utiq; semper, ceterum magna ex
parte, nocent: ac potissimū quum fuerint immo-

dica. Qua de causa, quādoq; cogimur prius sub-
mouere symptoma, q̄ morbū, mutato uidelicet
instituto. Ergo si labāt uires, non tñ uehementer
sint resolutæ, sed adhuc resistūt, ad symptoma tñ
sumus attenti, atq; id quāprimum tollere matu-
ramus. Sin iā resolutæ uehementer sint uires, non
modo symptoma sedare, sed illas ēē firmare con-
temdimus. Vbi uerò uirium roboris fiducia est,
ad eō nunquam contra symptoma pugnamus, ut
(quod prorsus contrariū est) per ea nōnunquam
præsidia, quæ dolores afferunt, morbos ipsos cure-
mus: ueluti profectō dysenteriz ipsi morcūtibus
maximè medicamentis, tum potissimū medemur
quum utiq; est grauisfima. Est aut duplex medi-
cis contra dolorē instandi ratio. Altera, quæ deli-
cij cubantium subscribitur: altera, ex artis ratio-
ne. Quippe si licet ægrū doloribus obnitenēē ua-
lentibus remedijs uno die persanari, qui tota cu-
ratione neglecta dolori tñ intentus est, non ex ar-
tis ratione, sed in gratiā egrotantis id facit. At si
ex dolore uires soluantur, atq; ex eo impēdit pe-
riculū, mitigari dolor, & roborari uires debebūt
quo & morbo resistere, & curationis spatio suffi-
cere ualeant. Estu igit, terminus in egrotantibus,
quē non transibit is, qui ex arte generose contra
morbū pugnat, ut tutō medicetur. Et uerō qui do-
lorē mitigat, ut uires custodiat. Porro dolorē mi-
tigant, quæ ex papaueris succo, uel alteri semine,
uel radice mandragoræ, uel deniq; styrace cōstāt.
Ceterū si fas sit, ijs remedijs quæ morbū sanent,
utendo, qd̄ optatum efficeret cauendum ab id ge-
nus soporiferis medicamentis est. Sin uerò ex ui-
gilijs & uiribus resoluendis, eger ad mortis disci-
mentenda, tñ profectō ipsi tēpeptiue utare nō
ignarus. s. corporis habitū nonnihil ex eis læden-
dū diligendū tñ potius lēione ipsam, q̄ mortem.
Hac nimirū persuasione ipse quoq;, tametsi om-
niū maximè ab usu grauitate sopientiū abhorrens
(q̄ rebellē ualentemq; in corpore frigiditate re-
linquant) aliquñ tñ ea & colicis exhibeo, & ijs qui
uel oculorū, uel auriū, uel aliarū partiū uehemen-
tissimo dolore cruciantur. Interim uerò, & quum
eger ex tenoi destillatione, uigilijs, & uehementi
tusu urgetur, paucillum eiusmodi medicamēti
offerat: faciliē noxā eius, si quis semel sit usus, spa-
tio emendatū iri ratus. Oia tñ id genus magis fa-
lubria sunt, si post annū à compositione sumant:
ueluti quod ad Philonē refert: Quod ad dolores
stuefaciendo sedādo, nō minus est celebre.
Id uerò ēē si duorum, triumq; aut quatuor anno-
rū sit, mālto sanē fuerit præstantius: sed neq; iou-
tile tñ sequētibz annis, ad decimū usq;. Ergo si
cui cauedus est, quoad fieri pōt, eiusmodi medi-
camētōrū usus ita si necessitas urgeat, nec admo-
dū recitā sunt offerenda, q̄ frigida q̄ in his sunt,
paleantes uires adhuc habēat, nec ita antiqua, ut
ipse nostrā frustetur: sed tandū dimittenda sunt,
quoad uiolentia refrigerantiū, ab eorū quæ calfa-
ciunt

ciunt ui mitigetur. Et talium quidem medicamentorum ulus, eorum qui aduersus symptoma pugnant, est proprius: potissimum ubi ex frigida causa dolor est excitatus. Obsunt. u. talia plurimū toti affectui, curatioq; cōtūmacē eū reddūt.

At sanguinis missio, quæ scilicet vires nō deicit, symptoma spectantis medici opus non est, sed etis qui totum affectum adimere studet. Ad eundem modū & balneum, & purgatio, & fomēta calida, & vini portio. Quæ omnia, dum affectus sanant, vni cum ipsis, etiam dolores sedant. Eodem modo & nutrimentū exhibitum, vbi sicco & squalente morbo os ventriculi afficitur, dum affectum ipsum sanat, hominem prehendi syncope prohibet.

Ventriculi os offensus in febrī quō sit curandus. Cap. III

Porro qui ex copia crudorum humorum, vni cum os ventriculi offensione, febricitant, ij neque missionem sanguinis, neque purgationem tolerant: quum tamen uacuationem desiderant. Quare eis uacuatio per friccionem solam administratur. Ergo liuete mediocriter asperis statim in ipsis auspicijs morbi fricandi sunt, à cruribus superne deorsum. Debet enim radi ab his cutis, quum simul & calsciri per eam, & digri corpus postulet. Deiu tota brachia, simili modo ab humeris superne deorsum. Vbi verò artus omnes abundē calere iam videbuntur, & metus fuerit ne quis ea multitudine friccionis, contusa iam carne, superueniat lassitudinis sensus, oleo relaxante uteris: quod genus est Sabinum. Ab astringente verò abstinebis, cuiusmodi Hispanū existit. Hyems verò si fuerit, nihil deterius sit, si ad digerentium aliquod transieris, quale licyonum est, aut etiam chamæmelium. Vbi igitur oleo membra ipsa abundē fricueris, oleum est de tergendum, atq; ad spinam dorū transendum: quam totam pariter fricare, primum quidem sio ea friccionē: post oleo, expedit. Ab hac rursus ad crura te conferes: & ab his ad brachia: denuoque dein ad spinam: sic totum diem agens, in domo lucida, & temperata. Sanē mulla, in qua coctum hyssopum fuerit, his est aptissima. Qua sola primis tribus diebus utentur. Ipse verò eo tantum tempore dictam intermittere friccionem, qua somnus hominem occupauerit. Ad quem etiam aliciendum, & frictio vberior facit. Cæterum somnus vberior his minimē est salutaris: quum nec crudos succos digeri sinat: & uiscera reddat grauiora. Sed si quis alius affectus sit, qui somnum & vigilias modicas postulet, hic profecto in his est. Quippe somnus concoquit. Vigiliæ digerūt. Quorum utroque est opus ijs qui ex multitudine crudorū succorum egrotant. Ac si pulsus his paruus admodū, infirmusq; sit, aut etiam supra hæc vehementer inæqualis, extremum periculum indicat: nec quicquam, præter iam dicta, molien-

dom est. Sin verò mediocriter sit robustus, nihil quæ intercitus uideatur, si sua quidē sponte alius cōmodē non deiciat, solucunda est, mulla iniecta. Quod si maior iusto superfluorū impetus ad aluū extetur, principio quidem percoquere mullam amplius oportet. Ea namq; sicut minus aluū subducit, ita magis nutrit. Post hæc, si superuacua largius descendat, ne sic quidem sistenda: sed exhibendus pro aqua mulla pitifana cremor est. Si uerò fluere pergāt, alicæ forbiti one ægrum nutries. Si pulsus interim ad imbecillitatem, uel inæqualitatem, uel paruiter mutentur, panem imbutū diluto uino porrigere conuenit: utiq; si nec uentri culus, nec icur laborēt phlegmone. Quādo si hac infestentur, corpore crudis succis referto, saue deplorata est, pulsibus sic immutatis. Minimē autem utendum cataplasmatibus aut perfusionibus est, prius q̃ superuacua magna ex parte partim uacuata sint, partim cōcocta. Interimq; sola mulla, in qua coctum hyssopū sit, usq; ad septimum diem utantur. Si quidem longissimam sic affecti cibi abstinentiam fuerint: corpore scilicet ex crudis ipsis, quos cōtinet, succis coueouendis alto. Verum si alius impense fluat, uel eger mullam fastidiat, ad pitifanæ cremorem est transendum. Sin hoc quoq; auerfetur, alicæ ad eundem quo pitifana modum ei præparabitur. Neq; enim eis qui sic sint affecti acetum in cōmodum est. Immo sicubi crudos affatim succos esse anima duerteris, oxymeli assidue pro mulla dabis: si quidem æstas sit, & æger frigide affuerit, frigidum: sin hyems autem, omnibus calidum. Maximē uerò pulsus paruus, tardus, & rarus, frigidos subesse succos ostendit. Sanē propositis aduersissimis sunt tum balneum, tum aer ambiens: quoties uel nimium calidus est, uel frigidus. Itaq; ut lauandi hi nō sunt, sic, & reclinandi in domo sunt: æstate quidem, quæ frigeat: hyeme, quæ ealeat. Læduntur namq; non parum ab utroque excessu. Atq; hæc quidem agenda sunt tibi, vbi à primo diæ curationem susceperis. Si autē ad eos quos iam præmit syncope accitus fueris, si ea quæ reult loca phlegmone uacent, panē exhibebis nō multū, eumq; ex uino alio quo, quod celerē in corpus digestionē adiuuet: statimq; ad friccionis ueuies, quas ut diximus ad ministrabis. Ac si quidē celi status sit uehemēter calidus, cū frigida uinū dabis: cū calida aut mediocriter, si tēperatis. Quæ tū secundo & tertio dabitur potio, omnino calidā exhibendā curabis: ut quæ succorum crudorū concoctionē adiuuet. At quibus ex flaua bili, quæ os ventriculi infestet, syncope incidit, ijs frigida exhibenda potio est.

Syncope laborantibus quale uinum sit exhibendum, ac uinorum genera quæ sint. Cap. IIII.

Vinum tū quod & calidū natura sit, & deductionē in corpus promoueat, oibus quibus syncope male habet, offerre cōuenit. Con-

stat autem ex viâ, et diligenda esse, quæ & sapor colore sunt, & substantia tenui, & ætate vetera. Talia nimirum & boni odoris continuo fuerint. Quinetiam si paululû ubi mista sunt, gustes, senties calorem per totum corpus transiit. Cæterum amara præ uetustate uina ne sunt, præsertim quæ ijs exhibebis, quibus stomachus flaua bile urgeatur. Commodissima igitur his uina sunt, quæ quum naturaliter sint austera, sensilè iam altrigendi vim, propter uetustatē nō amplius exhibēt: calorē tñ admodū euidentē habent. Huius igitur generis uinorū optima sunt, Surētīnū, Signinum, Sabinū, Tiburtinū, & Marsum: oīa quidē Italica, alstringētiaq; Quibus tamē ex crudis humoribus syncopes periculum imminet, sanè Faleriū tāto iam memoratis præstat, quanto tum melioris est succi, tū etiā calidiûs: utpote quod & uelocius illis digeretur per corpus: & crudis succis cōcoquēdīs auxilio erit. In summa uerò, quibus ex abundantia crudorū humorū syncope incidit, ijs crassa uina, ceu noxia: aquosa, ceu parā efficacia, fugiēda sunt. Deligenda autē eorū sunt media, quæq; flaua existant, & calida. Neq; enim inuenias ex albo uinorum genere calidum nllum: quando etiā austera, & mediocriter alba, quum inueterauerint, quodāmodo fuluio ta redduntur. Quotquot autē in ipsis calidissima sunt, omnia profectō sunt flaua. Reliquorū uini generū, austera quæ medio criter alba, crassaq; sunt, certē nullū ad digestiōnem in corpus est idoneum. Si tamen abundē in ueterarint, nec aliorum copia sit, uti illis licebit, quod stomachum toborent. Cæterum uina quæ calfasciunt immodicē, ijs offerenda non sunt, qui bus caput est imbecillum, faciliq; ab id genus uini repletur. Porro uina quæ odora, fuluq; sunt, quantum ex ipsorum est natura, omnia caput grauant. Eoq; tum Falerium, tum Tmolites, tū Lesbīū, infirmo capiti noxia sunt. At uina austera uentriculum roborant, caputq; inter omnia uina minimē tentant: digestiōnem tamen in corpore nō promouent: quo magis fugiēda tibi in syncope præhensis sunt, non secus quā aqua. In penuria uerò uini quod cōmodum utriq; syncopæ sit, ei inquam quæ ex multitudine crudi succi oritur, & ei quæ ex bile incidit, coactus uti uino, utēris aquosis, magisq; si antiqua fuerint. Talia namque, tametsi non ualent exalfaciant, facili tamen deducuntur in corpus. Quo nomine uinas præter cætera omnia promouent. A quibus secundum locum obtinent, quæcunq; fuluorū maximè sunt tennia: quæ etiam ad syncopas præcipue sunt deligenda.

Synopsis & uinum lapsus quomodo cognoscatur & curatur. Cap. V.

Est autem syncope præceptis uinum lapsus. Quam autem essentia uinum, quibus regitur corpus, tum la spiritū, tum in solidorū

corporum temperamento consistat, hæc nobis, & ubi integra sunt, seruari: & ubi corrupta sunt, ad integrū reuocari omnino debent. At uerò substantia spiritus, ipsaq; solida corpora, sic nobis sunt custodienda in morbis, ut tum qualitate, tum quantitate, quoad fieri licet, se naturaliter habeant. Curandū itaq; est, ut quæ substantiæ portio ab eis defluit, hanc præpositionem sarciamus: quod in ipsis uerò altera scilicet, in debita tempetem pet contrariam alterationē restituamus. Si igitur tum uacuatio, tū alteratio sensum, paulatimq; sunt, etiam correctio utriusq; sensum adinistrabitur: quod minus ad artem sanitatis tuæ dæ pertinet. Sin confertim & semel, ac magna aliquando uacuatio, nel etiam adiectio incidat, sic sanè & efficietur morbus, & medendi methodum ad eorum sanationem desyderabimus. Porro animi malis spiritus, a cerebro, ueluti a fonte, nascitur. Qui partim ex inspiratio, partim ex eo quod teriocularis plexus suppediat, irrigatur, aliturq;: At uitalis spiritus continetur in corde, & artens: nutriturq; tum ex aere inspirato, tū ex sanguine hali tuofo. Quod si naturalis quoq; aliquis spiritus sit, utiq; continebitur in in iccinore & uenis. Vtrum igitur lapsus, qui quidem solidorum corporum substantiæ resoluit succedit, in longissimis morbis subinde incidit: animante ex frequentia atrophia extenuato: prætere in colloquationibus febribus. Qui uerò ex substantiæ temperie mutata prouenit, is, uel ubi immodicē ipsa fuerint calfacta, frigefacta, madefacta, nel exiccata, uel horum aliquibus copulatis affecta, prouenit. At alteratio spiritus, tum ex uitiosis oritur succis, tum ex ambientis aetis malicia: prætere a uenentis facultatibus, aut animalium quæ uirus eiecit, necne. Ipsius uerò essentia spiritus corruptio (quæ tū ob animi affectus, cuiusmodi sunt timor subitus, uehemensq; nec non meror, ira, curæ, atq; summa uoluptas, tum ob ingentem dolorem: prætere ob plures morioes, uigiliæq; obq; immodicam ipsius tenuitatem, & continetium cum uasorum raritudinem, atq; adeo ante hec omnia, ob respiratū prohibitum, & nutrimentū defectum incidit) diligentius corrigi postulat. Sciendum autē est, in omnibus perturbatōnibus, ipsam per se ipsam moueri animam: quæ nimirum in alijs actus functionibus mouet etiam & ipsa corpus. Ob idq; resoluitur eius robor, utroq; motuum suorum generum, si modum excedant. Ergo nec rarefaciendum immodicē agrotantis est corpus, si spiritum retineri in ipso studeas: sed nec quæ in eo sunt, per comesta & bibita ualenter extenuanda. Est etiam ad uinum robur uendendum, ciborum atq; potionum habenda ratio, ut sint tum quantitate modici, tum qualitate exquisiti. Ac prætere quæ in inspiram, debet esse ne optime temperatus, scilicet ab omni corruptela & inquinamento alienissimus:

Curandum

Curandum similiter est, ut ipsa corpora solida, in quibus uel maxime consistere uinum substantia videtur, sint sano temperamento. Quippe ad conferuandum uirtutis robur, & syncopalem accessionem prohibenda, singulare praedidium est temperamenti enstodia: ante omnia quidem, triua principiorum: mox vero reliquarum partium, quacumque in consuetum affectum, principia secum ex facili trahunt. Cuiusmodi est os ventri cili, quod propter exquisitum sensum, accersit syncopas. At uero si humores crudi uires sua copia premant, ac propter multitudinem simul & crassitudinem exiguae animalis meatus obstruant, is affectus multis nominibus exitialis est, ac syncope opportunus reddit. Quippe succi crudi nutritio prius quod sit, cōcōti, nequeat. Quod si nec obstruant, nec onerent, syncopem ij certe non inferunt, sed deliquia animi. Siquidem resoluuntur aegrotantes huiusmodi, nisi frequētius nutriantur. Sane autem nutriendi hi extenuantibus, calfacientibusque: idque non copiose, nec semel. Medica menta similiter sint extenuantia, calfacientiaque, sed moderatē. His & aquosum uinum idoneū ab initio est, nisi tamen vehementer febriuerint. Et enim qui laborant ex huiusmodi succis, hoc quotidie accessiones exercent, precipueque ad uesperam, noctūque.

Virium lapsus ex tenuissimis succis curatio. Cap. VI.

Qui uero tenuissimis succis uirgetur syncope, diuersa iam dictis ratione curanda sunt. Illos namque paulatim & assidue uacuamus. At qui sic se habent, hos paulatim & assidue nutriemus. Quod si uiribus imbecillis, aliquod his uiscus phlegmone obfessum sit, eorum salus est deplorata. Quando nec ipsos licet assidue nutrire, sed tātum in remissionibus: & seruati non possunt, si non nutrantur. Non solum autem extenuatis ad eum modum spiritus & sanguine solēt saepe uires resoluī, sed etiam facultate expultrice per uniuersum corpus mole inmoderatius concitata: id quod ad acciderē maxime solet, ob retentis imbecillitatē. Ergo nutrire, quicquid horū incidit, est necesse, sicuti etiā corporis summa densare: non secus quā priorum ra refacere. Frigidum itaque ijs aerē astringētūque comparabimus. Vngendi praeterea sunt alitricioris uinguētis. Tū cibi ijs dandi, qui non admodū promptē diffusiūt. Cuiusmodi sunt panis, sorbitio ex alica, fructus austeri, & qui non faciliē corrumpantur, ouorum uirelli (quandoquidem albū aegre concoquitur) gallinaceorum, qui lacte alti sint, testiculi, ac denique suillum cerebrum, diligenter assum, uel in alio iure legitime elixū, porro & anetho iniectis. In summa, omni ratione agendum, ut & succorū materiam crassiorem reddas, & cutem denses, & exhalationē non inhibeas. Vinum uero ipsū aque-

sum, necessarium inter initia est, sumptum post cibos. Quod si ex sententia nobis omnia responderint, etiā carni ijs aliquid nutrimenti post alia dabimus: potissimum post quartum diem: succis qui febrem excitauerunt, iam ad concoctionem uenientibus. In omnibus autem eiusmodi curatio nibus, si iam ad ius syncopae, omnis sollicitudo medētis ad symptoma uertetur. Sin expectetur, ut triūl que curā habebit, & ut symptoma nō incidat, & ut paulatim discutiatur morbus: quē celerius discuteremus, si nullus symptomatis subesset metus. Quippe qui multitudine crudi succi grauatur, hunc si modō iustam semel uacuationē ferre posset, nec metus aliquis syncopes impederet, semel, arbitror, uacuationem explicaremus à morbo. Eū uero, cuius spiritus & succi faciliē exhalant, si ante accessionem cibare non cogermur, longiorem illi morbum certē non redderemus.

Syncope quibus succedere causis, & doloribus causis quas sint. Cap. VII.

Sunt & aliae quing: occasiones quibus succedunt syncopae: nempe dolor uehemens, uigiliz: immodica uenteris inanitio, motus in delirantibus ac denique principiorum intemperantia, uel nuda, uel cum humorū affluxu. Si igitur causam ipsam unde excitatur dolor, adimere possis, ita utique: contra symptoma non pugnaueris, sed curaueris aegritudinem. At si qua occasione prohibitus, affectui submouendo intentum esse non licet uehementiā mitigabis doloris. Dolent porro tantum particulae sensibiles, idque uel ob continuitatis diuortium, uel ob aliquam alterationem, non sensum, sed consuetum & uolentem factam. Quippe uidentur corpora, non solum quū in non naturalem habitum consuetum aguntur, tristem mutationem sentire, sed etiam in ipso ad naturalem statum suum reditu, nisi is sensum fiat, torqueri. ac ex alterantibus quidem dolore afficiunt, omnia uehementer calfacientia, atque refrigerantia. Ipsum autem solutionem continui, necesse est, uel ruptionem, uel contusionem, uel erosionem existere. At ruptione ex distentione quadam contusio ex grauante aliquo, erosio ex mordente prouenit qualitate. Ergo quoniam nihil extrinsecus sit, quod uel distendat, uel grauet, uel erodat, sed ea seipsos horum aliquod corpus sentiat, neminem latere potest, distentionem ab aliqua intrinsecus substantia, quae multitudine sua corpus se continens distendat, aut inmodica siccitate, prouenire: contusionem, ex eo quod aliquod corpus occurfarit extrinsecus, quod uel durum, uel magnū, uel grane, uel simul ambo extitit: erosionem uero, ex succo aliquo, cui mordens uirtus inest. Qui quidem si sit in uicinis intestinorum imbutus, cōmodissimē huius picra expurgatur. Quod si aliquam exulcerationem

tionem pepererit, nutriendus certe æger est calente alica, sed iniectis mali punici granis. Potus autem illi offerendus est mali punici cremor.

Dysenteria curatio. Cap. VIII.

Porrò si sanguinis abundantia sit quod distendit, protinus sanguis mittendus est modò vires ægri non sint infirmæ. Sed si is vel sanguinis missionem timeat, uel viribus sit imbecillissimus, tum reuellendus in diuersum est sanguis: tum per propinqua deriuandus. Quòd si his peractis dolor etiam persistat, patet profectò in ægrotaute particula impactum esse quod contristat. Patet verò non minus, & quòd curatio ipsa per digesta medicamenta molienda sit. Similiter etiã curantur dolores à flatulento spiritu orti: magis tamen ij extenuantia remedia desiderant. Si moles aliqua grauando, contundendoque dolorem excitet, molli ipsi est medeum. Sin mordens humor, aduersissima huic sunt, quæ extenuant, & calfaciunt. Postulat namq; huius generis affectus, ut ea quæ contristant vacuentur, aut alterentur, aut medicamentis torporem inferentibus retundantur. Ea quippe minus hos affectus lædunt, quàm alios, qui à crassius glutinosissq; humoribus proficiuntur. Huiusmodi tamen succos, uel uehemens non comitatur, nisi aliquis eis halitus spiritus copuletur: qui ex ijs corporibus quibus continetur, erumpere prorsus non possit. Nã sic, grauissimi solent excitari dolores. Etenim quum tunice intestinorum sint duplices, si in medio ipsarum spatio frigidus ac viscidus humor collectus sit, à calore liquatus, in flatulentum mutatur spiritum: qui crassius frigidusq; quò sit, acerbissimos dolores inducit. Ac ad tempus qui dem, post bibitum medicam stupe faciens, prorsus indolentes redduntur ægri: ceterum affectus ijs uarijs modis sit maior. Nam & intestinorum tunice medicamentorum frigiditate densiores, minusq; flatui transmittendo habiles, redduntur: & humor ipse tum crassior, tum ad motum ineptior euadit. Quare id genus dolores omnes, per ea quæ incidunt, & coneoquant: præterea flatus discutiant, desiccantq; citra ualentem calfacitionem, curandi sunt. A nullo autem in eiusmodi succis tam est metuendum, quàm à calore qui & eos liquet, & in flatum vertat, sed non ualeat dissecare, porro agrestis quidam, allio comesto, uiuòque ad uesperam meraciori bibiro, à dolore colico fuit liberatus: neq; id iniuria. Allium siquidem flatum discentit, ac minimè suum infert. Quam ob rem ipse allium theriacem agrestium appello: estq; commodissimum ijs omnibus, qui regionem frigidam incolunt. Quos igitur ex supradicta causa uehemens intestinorum dolorci tra febrem exercet, ijs & alliu esse licet, & theriacem bibere. At si cum febre unà talis dolor aliqua

do incidat, principio quidem, si id ferunt, fomentum siccum ex milio adhibendum est. Si ab hoc non quiescant, semen aliquod, quod flatum distinet, in oleo quod tenuium sit partium, coquere, mox per linteam, quo purum sit, oleum colare, dein asferis, aut gallinaceum seum, nec salsum, nec admodum uetus, in ipso oleo liquare, & per sedē infundere, oportet. At si neq; ex hoc remittatur dolores, secundò rursum injiciendū est idē, adiecta etiã castorei & papaueris succi, utriusque fabæ noui amplius magnitudine. Olei uerò hemina modus esto. Excipitur & lanula ex hoc medicamento aliquid: quæ appensa forti silo, quampenitissimè in rectum intestinum inferi debet: quo utiq; & quum libet, id facile recipiatur, & euidentem utilitatem cõferat. Similiter & oculorum, & aurium dolores, qui ab iisdem causis in febre excitantur, sedare conueniet fomento ex milio. Sed infundimus etiam auribus medicamentū id quod ex castoreo & papaueris succo cõficiuntur, sapa liquidum. Quod sanè auri instillatum, oculorum etiam, ac dentium dolores leuit. Sapa uerò, si cataplasma imponi aliquando res ipsa suadeat, papauerum capitibus in aqua coctis, ac squigreci, uel bordei, uel lini seminis farina aque immisita, cataplasma conficiat. Porro collyria ex opio confecta, uehementissimos oculorum dolores laxant: utendumq; his est, quum maxima ne cessitat urget. Nã tamen imbecilliores ex frigiditate in reliqua uita ipsas reddant particulas, occurrunt tamen præfenti discrimini: ac postea frigiditatem ab opio relictam, licet nobis corrigere, tum oleis calidis, tum etiam collyrijs. Nempe auribus oleum id quod solum castoreum recipit, instillamus: oculis uerò, ex cinnamomo collyrium. Qui à solo spiritu flatuoso cruciantur, illi eo cucurbitula ad mota, tum à dolore liberi, tum omnino sani redduntur: in quacumq; corporis parte dolor sit excitatus. Quibus uerò non spiritus modò flatuosus, sed etiam humor quispian, unde is oritur, uentris dolorem excitat, ijs illico ad tps dolor sedatur: reddit tñ uel iu sequenti nocte, uel postridie, uel et tertio die similis dolor. Quare iu his primùm doloris accessio est curanda: ad mota scilicet cucurbitula. Postea uacuuus humor, infuso per sedem aliquo medicamento calfaciente simul & attenuante. Ego uerò oleo quopiam tenuis substantiæ uti assueui, rutam in eo præcoquens. Quo iniecto, nonnulli ægri paulo post excernunt humorem uitreum: atq; ex hoc protinus simul & à dolore, & ab affectu liberantur. Si dolor ex tenui acricq; excitee humore, qui conuulsiones uehementes etiam inducere solet, si quidem in uentriculo talis humor consistat, uomitu expellendus est, aqua tepida propinata: sin autem in intestinis, inijcere per sedem oportet aliquod medicamen, quod blandè eluere, de tergereq; eiusmodi humorem possit. Commodif

simus

simus itaq; ad id fuerit cremor pituitae. Cibi vero exhibendi his sunt, qui & boni sunt succi, nec facile corrumpantur. Qui ob siccitatem vehementem distenduntur, & discruciantur, si curari ij de beant, hamestatione desiderant. Ceterum si affectus is, sit febris occasione contractus, percuratum est difficilius, vel potius curationem non recipit. Quippe conuulsiones quae ex plenitudine nervi sarum partiu, vel ex humore mordente, vel denique ex ingenti frigore oriuntur, curari possunt. Quae vero ex nervosarum particularu ariditate proueniunt, nullus certe ijs ad sanitatem est locus.

F I N I S

GALENI PERGAMENI

DE FEBRIBUS CYRANDIS LIBER,
qui primus est in his, qui de arte
curatiua ad Glauconem in-
scribuntur. Cap. I.



NON communem tantu omnium hominum naturam medicum cognoscere oportet, sed etiam vniuscuiusque propriam. Non tamen propriam singulorum naturam, aequae atque communem, possibile est scribere. Quum igitur ad recte medendum plurimum conferre temporis occasio, & quantitas auxiliorum, videatur, haec autem propria in vnoquoque; aegro se contemplanda obijciant, nec quicquam propriu possit sermone explicari: ob id nimirum quod commune est, scribere cogimur, quamuis id sit usu secundum. Etenim quantum quisque; a naturali recessit habitu, ad tantam morbus magnitudinem peruenit. Distantiam vero recessus, facile deprehendet is, qui naturale vniuscuiusque; aegri statim exquisitè cognouerit. Quod quidem quum nobis non liceat, confugimus ad coeas notiones: in quibus artifex plus aliquid, quam incertè, assequitur. Porro qui omnia quae secundum naturam & praeter naturam sunt, diuisione artificiosa complexus fuerit, atque ab ijs omnibus, quae sufficienter diuisa erunt, indicationes sumperit, solus is, quantum humanis permittitur viribus, minimè errabit medendo. Atque illos quidem quorum habebit notitiam, melius curabit, quam ceteros. Ignotos vero, proximè illis, quoad fieri poterit ad sanitatem perducet. Si quis enim primum distinxerit differentiam aetatum: postea ei quae secundum temperaturas, potentias, colores, calores, habitudines, pulsuum motus, assuetudines, industrias, animique; mores habetur: atque his quoque; adiunxerit maris foeminaeque; discrimen, expenditque; regionum, temporum, atque; adeo ambientis aeris temperies, hic ad propriam laborantis naturam agnoscendam proximè accedet. Nunc vero de his solum aegrotis dicere proposui mus, quorum natura, ante quam morbum contra-

herent, nobis erat exquisitè perspecta. Cum quibus tamen & reliqui omnes intelligentur, qui nobis erant ignoti.

De febribus ephemeris.

Cap. II.

Primò igitur de ephemeris febribus, utpote simplicissimis differamus: quae nimirum ob lassitudinem, ebrietatem, iram, excandescen-
tiam, mororem, atque; alias vehementes animi fluctuationes excitantur. Ex quarum genere sunt, quae ab inguinum inflammationibus trahunt ortum, praeter quam si absque; ulcere fiant manifeste. Tunc siquidem & suspectae sunt, minimeque; mites apparent. Vigiliae plerumque; induxerunt simplicem febrem: sicuti frige factio, & exustio quandoque;. Atque; haec omnes febres soluantur facillimè, in hunc modum. Oportet enim ipsos confestim duce-
re ad balnea: deinde; ad consueta victus rationem. Nam qui triduanum terminum absque; cibo expectant, saepius acriores febres efficiunt. Quis igitur ad aegrum accedet, primum à maximis quae circa ipsum sunt, est consideratio inchoanda: de inde & ab alijs: adeo ut nec minimu quicquam omittas. Nam ut magis aut minus ei quae sit ex maximis indicationibus credamus, ex aliorum sit adiunctione. Maxima quidem in omnibus febribus signa in pulsibus, atque; urinis consistunt. His vero addere oportet, quaecunque; alia circa faciem scribit Hippocratea: accubitus quoque; & respirationem: item ea quae ab ore excernuntur, atque; alui sedimina: & si quid aliud accidere circa aliquam corporis partem, aut operationem nideris. Quae omnia coeas sunt omnibus febribus. Postquam itaque; ex pulsibus atque; urinis febris naturam perceperis, quum pulsus nullum inflama-
tionis signu habuerit, neque; omnino inaequalitas in aliqua arteriae compulsionem se ostenderit, aut si hoc adfuerit, omnino sit imbecille: vinum autem, aut prorsus similes ijs quae secundum naturam se habent, aut non multum à naturali statu recesserint: tunc sanè & ad omnia illa, quae nuper à nobis exposita sunt, accedere oportet: & quum ueluti chorus quidam omnia concinne loquuntur, tunc certè fidere oportet, ac, si libeat, inter-rogare, nunquid aliqua manifesta antecesserit causa. Siquid enim huiusmodi aeger fateatur, expectata prima febris solutione, statim oportet lauare: quum tunc certior sit tibi facta cognitio, ex ipso solutionis modo. Nam arteriarum motus in hoc in totu assimilatur ei, qui in sanis deprehenditur: quum in nulla alia febre ad naturalem habitum reuertatur. Iam vero plurimis ephemerarum humidi quidam vapores, & quibusdam etiam sudores utiles cospiciuntur, accessione cessante. Quo tempore etiam urinae multo meliores, quam circa febris initia, videbuntur: & si capitis aut alterius dolor, simul inuaserit, neque; hic amplius perulset.

perſiſtet. Agrotantis quoq; in tolerando facilitas, magnū & ipſa ſignum, febris ſuauitatem tibi indicabit. Et ſi dum lauantur, nec horror aliquis inſolitus moleſtauerit, nec alia triſtitia adſuerit, poſt balneumq; & deinceps benè ſe habere perſeueret, tunc ne uereciter offerre cibum, & uinum: adhibito tamen pro tempore modo. Communiter autē omnibus de reutis ephemera, urinz ruſſe excernuntur. Adiungitur verò his qui propter triſtitiam febricitant, acritudo potius quàm abū dantia calor: quemadmodum ē diuerſo ijs, qui propter furorem. Sed & extenuatio corporis in ijs quoque triſtitia aut cura vexatur, conſpectior exiſtit: oculorum præterea cavitās, & quædam inconfueta decoloratio. Hæc quidem ſunt & ijs qui quouis modo aliter cogitarunt, communia. Maximè itaq; ex oculis diſtinguere oportet. Nā ex his etiam in ſanis auium mores conſpicere poſſumus. At eos qui diu uigilarunt, arguit quædam palloris forma, faciaq; ſubrumens, nec non ipſe oculorū motus, quo uix palpebras, humore quodam imbutas, attollere poſſunt. At qui triſtantur, aut cogitationibus detinentur, ijs exiccantur palpebræ. Cavitās eſt commune acci dens omni bus, morori, uigilijs, cogitationibus, non tamen furori. In hoc enim, nec oculorum cavitās, nec manifeſtus pallor: & plus calor atq; celerius ex imo prorumpit: nec pulſum magnitudo deſtruitur, quemadmodum in uigilijs, triſtitia, & cogitationibus. Eorum etiam qui ex laſtitudine in febrem incidunt, cutis eſt ſiccior, quàm in ali qua alia ephemera. Quæ autem ex denſata cute accidunt febres (denſatur enim aut ex frigore, aut ex aliqua qualitate aſtringente) hæc quidem ſolæ inter omnes febres, paſſio aſtri cta exiſtunt: ac uel ſolo tactu noſcuntur: tum ob denſitatem cutis, tum ob differentiam calor, qui mitis quidē in primo tactu ſentitur, acris autem, ſi pluſculum tardemus. Non tamen & his urinz ſunt ruſſæ: neq; moles corporis concidit: neq; oculi redduntur aut caui, aut aridi: ſicuti nec pulſus minores, quemadmodum in mororibus, curis, uigilijs, aut exercitijs immoderatis.

De febribus ex inflammationibus inguinum. Cap. III.

Febres quæ ex inguinum inflammatione ſiūt, pulſus habent maximos, ueloces, atq; frequentes: plurimūq; illis calor ineſt: ac poſt quàm febris conſtiterit, ſtatim ex profundo quædam emergit humiditas, calida quidē, ſed mitis. Atq; in totum faciem rubicunda illis, & magis tumens, urinzq; ſubalbidæ. Communis autem omnibus huiusmodi febribus eſt pulſus æqualitas. Curare igitur omnes quidem oportet balneis. Cæterum qui ex cutis denſitate, aut inguinis inflammatione febricitat, ſi in acre balnei immorari iuſſeris, haudquaquam nocebis. Reliquos om

nes quàm citiſſimè oportet ab acre ſemouere. Si uerò diutius in aqua immorati uoluerint, permittere. Oleo autem multo, & tepido, & manibus mollibus perfricare quamplurimū, ſed eos præſertim, qui ex labore febricitant. Secundo autem loco, qui meatus habent aſtri ctos: at tertio, qui inguinum patiuntur inflammationem: quos mitis ſæpius lauare expedit. Cibum autem concoctum facilem aſſumere qui ex labore febricitant, poſſunt multoties & non æquè tamen, qui ex denſitate cutis, aut inguinis inflammatione laborant: quorum etiam utriſq; tenuis uictus eſt uſus. Sed & uinum potare quantum poſſunt continere, ſibi permittendi, quibus labor febris occaſio exiſtit. Menſuræ autem ratio, ex uiribus & ætate ſumitur ægrotanti: nec non ex naturali temperie, cōſuetudine, anni tempore, & regione, alijsq; id genus. Qui uerò ex inguinū inflammatione febricitant, accendi ſunt & uini potu, donec inflammatione ſoluantur. At, qui cutis foramina habent aſtri cta, aut refrigerati ſunt, ſi quidem nimium hoc affectu laborent, hæc plenum corpus habeant, non ſunt & uini potu prohibendi. Qui autē ſupra modū refrigerati ſunt, aut plenius corpore, prohibere uile eſt. Ruſus, qui ex uigilijs, aut aliquo animi affectu februnt, poſtquam balneaueris, cibo humido ac boni ſucci reſicere oportet: uinum uerò omnibus ijs qui uigiliam paſſi ſunt, intrepidè offerre, niſi capitis dolore premantur, aut pulſum uenarum in temporibus ſentiant. Sed & ijs qui ex ira aut morore aliquo, aut cogitatione febricitant, uinū eſt exhibendum: ſicuti & illis, qui furore perciti fuerunt, quando omnino perturbatio fuerit refrigerata: nam prius ſanè uſus uini erit periculofus. Tentare autem oportet ſemper adſerre contrarium: id quod infeſtat: labori quidem, quietem: uigilijs ſomnū: iræ, furori, & triſtitie, ſermonibus, actionibus, poſtea culis, enarrationibus, animi iucunditatem. Sic qui ex cogitatione laborat, omnino rationatione ca omittat. Et qui ex inguinum inflammatione febricitat, eius curationi intendat: ac multo prius uiceris, unde originem habuit. Atq; hætenus de ephemerarum indicijs, remedijsq;. Reliquæ uerò febres, nonnullæ ex inflammationibus: nonnullæ ex humoribus accenduntur. Et quæ ex inflammationibus ſiunt, ſunt ueluti ſymptomata quædam partium inflammatarū.

De febribus putridis.

Cap. IIII.

AT quæ ex humorum putredine accenduntur febres, hæc & dicuntur putridæ, & ſunt non morborū ſymptomata, ſed ipſæ morbi. Ex his uerò nonnullæ quidem abſq; accidentibus accidunt, & mitiſſimæ ſunt: nonnullæ item, cum accidentibus urgent. Earum igitur, quæ accidentibus carent, paucæ quidem ad exactam ſui cogni-

cognitionem, diem quartum desiderant.

De signis febrim intermittentium, Cap. V.

QUæ igitur cum rigore inuadunt, non ab re ea eorum esse numero iudicabis, quæ per circuitus instant. Tertianæ enim atque quartanæ, in totum cum rigore accessiones faciunt. Sed tertianæ quidem in primo insultu cū nimio sæpe rigore incipiunt; quartanam autem nō vidimus cum vehemēti rigore incipientem, sed procedente tempore magnitudo ei superuenit, præter id, quod nec statim ab initio hæc febris ut plurimum solet inuadere, sed alijs quæ antecefferint, subsequi. Quartana itaq; solet errabundis febris superuenire. Quotidiana verò, raro accidit absq; læsione oris ventriculi. Rursus quartana ex male affecto splēne gignitur: ut tertiana ex affectu iecinoris. Quæ verò cum valido rigore incipit, magis febris tertiana, quàm aliqua aliarum febrium fore speratur. Quod si reliqua etiam signa attestentur, hanc dubio procul in prima statim die tertianam esse cognosces. Etenim calor multus & acris a deesse debet: pulsus autem magni, calidi, vehementes, veloces, atq; frequentes, omnisq; inæqualitatis, præter quàm febrilis, expertes. Rigor porro, veluti si à re aliqua acuta, plus quàm frigida, corpus perpungeretur: quum ij qui quartanam aut quotidianam intermittentem patiuntur, potius frigidum rigorem percipiunt. Tempus autem anni æstium: sicuti & locus, & præsens status calidus. Sit autem & ægro tantis natura calidior, & biliosior, & ætas adolescentis: & exercitationes potius quàm ociositas antecesserint: magisq; deustio, quàm frigefactio, & parcitas cibi, potius quàm crapulæ. Vigilæ quoq; mæiores, atq; labores, & intensæ cogitationes, ad eundem affectum perducunt. Quod si multos alios eodem tempore laborantes cōgesserit tertianis corripì febris, hoc quoq; maximū aliquid, præter ea quæ nuper diximus, signum erit. Si igitur hæc omnia adfuerint indicia, aut saltem quæ maxima sunt, & si ita quoq; vehemēs adiungatur, uomitusq; bilis, aut sudor, uel utraque superuenerint, tunc nulla dubitatio relinquatur. Quod si inter hæc à febris quærit homo, hac inquam quæ ex suo motu est omnibus nota, propria uerò febrium inæqualitas, in arteriarum motu relinquatur, tunc firmiter poscitis esse tertianam febrem ostendere, ac si tertio iam die accessiōem fecisse vidisses.

De signis quartana, Cap. VI.

Dum rigent qui quartana tenentur, pulsus habent satis tardos & rarios. Quum autem consistit febris, atq; etiam augetur, necesse quidem est, ut veloces fiant, atq; frequentes.

Seruatur tamen & tunc propria ipsius tarditas, raritasq; si addiam uolocitatem atq; frequentiam in accessiōibus medicetis. Iam quæ omnibus cōmunis est febris, in uno pulsu inæqualitatem, in hac manifestissimè licet cōprehendere. Multo namq; uelocius principium, sinemq; motus inuenies, quàm medium. Præterea estum, & deustio nem, & quandam ueluti frivorem, qualis in tertianis uidetur in quartanis haudquaquam inuenies. Sed & egrotantis natura inspicuenda est, an atra in ea bilis abundet: & tempus quoq; anni, an sit autumnus; & p̄sens status, an inæqualis. Sic uerò & loci natura, & morborum peragantur vulgariter, & an licet intumuerit, febrisq; antecesserit inordinata, & ætas sc̄nior quàm cōsistentium: & an cum sudore febris definant. In his uerò bilis fluxus uomitus minimè expectandus est: quemadmodum nec in quodiāms intermittētibus. Hoc etenim tertianarū est proprium signum. At quæ febris cessauerit, si adhuc uestigium febris remanserit, pulsusq; ijs, qui secundum naturam, rariores atq; tardiores fuerint, quartana proculdubio erit huiusmodi febris.

De signis quotidiana intermittens, Cap. VII.

QUotidianæ intermittētis calorem humidiorē cū quadam acrimonia esse oportet: non quum primum manus admouetur, occurrētē, sed per moram. Nam quadam fumosa caliditas cum multo uapore commista perspirare nidebitur. Sed & his longè minores sunt pulsus pulsibus quartanarum, quàm istarum pulsus pulsibus tertianarum. Rursus verò tanto rariores sunt in quōdianis intermittētibus pulsus, his qui in tertianis, quanto illis pulsus quartanarum. At tarditas in utrisq; eodem modo se habet. Minus uerò siticulosa hæc febris est: tantumq; eam quartana excedit, quantum istam tertiana. Humidissimum etiam totum corpus in his febris est, & uomitus pituitosi. Quæcunq; autem excernuntur per uentrem, frigidiora, humidiora, crudiora, & pituitosiora existant. Et quidem ætatibus, naturis, anniq; statibus & temperaturis humidioribus hæc febris accidunt. Nā adolescentem biliosa & sicca temperatura, nunquam uidi quotidiana corripì febre. Pueri autem, præsertim minores natū, & ex adultis pituitosi, & habitudinis crassæ, atq; ocio plurimum dediti, necnon crapulis, ebrietatibus, balneis acidijs, post cibum præsertim, utentes, facillè à quōdianis capiuntur. Loca etiam humidiora, atq; ex anni temporibus hybernū, ex statibusq; humidiores, hæc præcipue conciliant febre. Quod si populariter etiam grassetur, hoc quoq; non parum ad eam dignoscendam conducit. Non tamen harum febriū declinationes, quemadmodum tertianarum & quartanarum, sudoribus terminantur. Quare de

sus est abstinendum. Verum ubi concoqui is coeperit, dandum est ab initio tenue, aquaticum, atque paucum. Vbi verò iam prope est, ut morbus solvatur, amplius est offerendum. Cibi autem quicunque humectant, atque refrigerant, omnes utiles sunt exquisitis tertianis. Ceterum quædam in ipsius sit tanta, ut bene concoqui possint. Ex oleibus quidem, atriplex, blitum, lappathum, malua, lactuca, & cucurbita. Ex alijs verò, petisane succus, sorbitio ex alica, ex piscibusque; saxatiles. Ex volatilibus denique ea, quæ mollihus constant carnisbus. Quæ autem talia non sunt, eorum alia i testiculi quoque; gallorum, & suum pedes, & cerebra. Paruum verò si etiam dederis carnes assas, nihil uocabis. Sed & oua ad forbendum sunt offerenda: & præsertim vitelli corum: nam hi facilius quam pars alba coquuntur. Ex fructibus autem illos tantum degustet, qui non sunt omnino difficiles cocti. Oportet abstinere à melle, sinapi, salitis & acris omnibus sicuti & à vini satis uetustis & calidis.

De cura tertiana nobis.

Cap. X.

In ijs verò quæ non à deo exquisitæ sunt, prouidendum est, ne morbus augeatur: neque agrotantes vires corrumpant, quæ laborare longiori tempore debet. Quare operæpretium est scire, ad quantum magnitudinem morbus ipse sit peruen-turus: & quantæ sint ipsius ægri vires ut ad ea inspicies quæ maius auxilium postulant, inedia quidem, in valentioribus utaris uiribus, & morbo concoctu difficili: largiori autem cibo, ubi vires sunt infirmiores; nec morbus admodum ad concoctionem contumax. Iam verò in tertianis non exquisitis, nec statim circa initia balneare expedit: sed quum primum coctionis signa apparuerint. Nec cibum quotidie offerre expedit, sed alternis diebus. Quies verò, & calfactio circa præcordia iuuat, & forbitiones quæ concoquuntur facili, & clysteria non admodum mollia. Quòd si sanguinem mittere oporteat, neque hoc quoque omittendum est. Sed ab initio statim, tantum sanguinis detrahendum est, quantum præsens status exigat. Sit autem totius victus ratio, non quæ humectet, atque refrigeret uniuersum corpus: sed quæ aliquem modum etiam assumat, ad calfactum, iudicandumque. Plurimum igitur eos iuuat petisane succus pipere adiecto. Ad hæc hyssopum, uel origanum, uel spicam nardi multis infundens, & decoquens, ad bibendum propina, & quæcumque alia prouocantia urinam, exceptis illis, quæ præter modum calfaciunt, exiccantque. Maxime uerò post diem septimam danda eis ingiter est absynthij coma. Et quidem oxymel potione plurimos iuuat: & aliquid ex ijs quæ mollior ventrem subducunt. Vomitus etiam post cibum, ad eò his quibus hæc febris perdurauerit, utilis est, ut mul-

tos sciam solis uomitibus statim fuisse curatos.

De cura quartanarum.

Cap. XI.

Quartanas ab initio mediocriter, ac leniter tractare oportet, nullum forte medicamentum, aut euacuationem exhibentes: nisi forte sanguis vehementer superabundans appareat. Ceterum si uena iuecta, is qui fluat, niger & crassus uideatur (qualis in ijs præcipue uisitur, qui liene laborat) audacius mittendus est. At si flauus, aut tenuis cernatur, subito supprimendus. Veni verò secare oportet, uel anteriorem, uel mediam, quæ est in sinistro cubito. Victu deinceps instituire sine flatibus, ac optimum: neutrumque; emolli-re, ijs quæ usitata sunt, expedit. Quod si hæc nihil proficiant clysteribus utendum est, à principio quidem mollihus: postmodum uerò acrioribus. Accendi sunt autem à suis carnisbus, ab omnibusque edulij, quæ tenacia sunt, & tardum habent exitum, quæque cum refrigerant, tum siccant corpus. Vino uerò utendum est albo, tenui, & medio-criter calido, & volatilibus quæ boni sunt faciei, nec in paludibus degunt. Pisces sunt adhibendi, qui facili coquantur, ac molles carnisbus, nihil quæ tenax habentes. Utendum est autem salsamentis, & sinapi: ac certia dicbus medicamen dia-trion pepereon, uel diopolicum est assumendum. Quod si quotidie piper tantum cum aqua biberent, recte etiam facerent. A frictionibus autem, ambulationibus, æque balneis, non sunt penitus prohibendi. Quanquam si omnino possent à balneo abstinere, solia contenti frictionibus, inde plurimum iuuarent. Iam si quartana ipsa sit breuis, nec admodum uiolenta, nihil nocuerit, si diebus interiectis ad consueta exercitia se traaserant. Hæc igitur ab initio, & usque ad statum sunt peragenda. In statu autem subtilior uictus ratio adhibenda est, quàm ante, uel post. Statim uerò æger continendus in quiete est: ac uisceribus prouidendum ugentis & cataplasmaris, quæ molli-re & laxare possunt. Deinde medicamentis utendum, quæ ciendi urinam uim habeant. Vbi uerò coctionis signa apparuerint, tunc sanè purgare oportet ijs quæ humores atroa inaniant, non semel tantum, sed sæpius, si uideatur necesse. Utendum autem & uomitibus statim à cibo: & si nihil prohibuerit, elleborum album est exhibendum: primum quidem, permixtum radiculis: quòd si nihil profecerit, ipsum per se. Ceterum qui neque uentrem euomere, ij uehemētius per uisceris purgentur ac postmodum offeratur eis in potu, medicamen confectum ex uiperis: necnou quod succum cyrenaicum recipit. Quicunque uerò ab initio aliquid ex hisse medicamentis exhibuerunt, aut omnino ante statum, quartanam quæ erat simplex, dupplicem reddiderunt, aut omnino maiorem, atque difficiliorem: ex duplici autem triplicem, aut omnino

omnino ambas difficiliiores.

Decura quotidiana. Cap. XII.

Quotidianam autem quum volueris cura re, oxymelitic vitor post primos dies: & illis quæ probè possunt vrinam ciere: vni versumq; totius uictus caput sit ad incidendum efficacious. Circa statum verò, de ventriculo est habenda sollicitudo, ac de ipsius ore præsertim. Deinceps tubendum est, ut post radículas & cibos assumptos vomant. His etiam quæ pituitam subducunt, utendum.

De cura febrium continuarum, quæ carent accidentibus. Cap. XIII.

In continuis autem febribus, quibus non vltra septimum futurus status est, si vires validæ sint, & ætas consentiat, admodum exquisitus & tenuis victus est instituendus. In quibus verò uel status totius morbi longius abest à seprimo, vel vires robustæ non fuerint, uberiori cibo ægri sunt rescicendi: quemadmodum prope statum tenuiori. Quum autem iam adest status, tenuissimum victû seruare oportet: deinde rursus semper uberiorem. Sanguinem verò mittere oportet, & ob morbi magnitudinem. Quibus autem rubor multo intensior, quàm pro naturæ ordine, & maior, quàm pro consuetudine, totius corporis moles, venæque eminentes, extensæque fuerint, ijs etiam est auferendus, nisi vires, aut ætas, aut aliquid commemoratorum, prohibuerit. Quod verò humidus uictus in febribus acutis omnibus iuuat, rectè iam dictum est. Cre morem igitur ptisanæ, ijs quibus non æscie, exhibere oportet: & mellicratum quibus non bile scit: & sorbitiones ex alica: & panem ex aqua. Porro in febribus præter modum calidis, vrentibusq; quum primû coctionis signa apparuerint, eûe audacter aquam frigidâ propinabis. Modus verò in quantitate seruetur, quæ admodû tempus anni, regio, ætas, natura, consuetudoq; exigunt.

De curatione febrium cum accidentibus. Cap. XIII.

Quæ febres cum accidentibus vrgent, non æquè simplicem exigunt curationem. Sed pro viribus metiendû est, quanta sit ipsa febris, quantumq; ex accidentibus imminet periculum: atq; ad id quod uehementius fuerit, & difficilius, intendendum: non posthabita omnino etiam alterius cura. Etenim ubi simul cû ipsa febre sentitur circa os nentriculi anxietas, morsus, & imbecillitas, prius sanè nacuandi humores non sunt, quàm os ipsum ventris corroboretur: etiam si cruditate aut cacochymia æger ipse laboret. Sed nec si fuerit febris cum ventris profluio,

alia est opus enacuatione. Verùm hæc sola sufficit, quanuis non sit pro ratione ipsius plenitudinis. Iam verò si quis simul & distentione neruorum laborauerit, & sanguinis egerit missione, neq; huic tantum semel mittere oportet, quantum exigit morbus, sed aliquid etiam accidenti est linquendû, cuius causa sæpe sudores eueniunt, & nigilix molestant, & vires ægri debilitantur. Ita etiam si uehementius uigilix, aut dolor intensus ægrotum cruciant, cauendæ sunt subitæ enacuationes, ac multæ. Ipsa præterea ambientis aeris temperies, loco accidenti cuiusdam habenda est, dum exquisitè calida & sicca fuerit: qualis est tempore medio inter eanas & arcturi ortum. Si etiam nalde frigida fuerit, tunc quoq; sanguinè mittere formidandum. Ob hæc etiam ne que in locis admodum calidis, aut frigidis, sanguinè mittere audeamus. Quod si regioni tēporis status cōsentiat, etiā omnino abstinemus: si uerò non consentiat, euacuumus quidem, sed multo minus, q̄ si neutrum prohiberet. Tolerantia etiā ægri, ceu quoddam accidens, expendenda uenit: nec secus ipsa temperata. Nam quicumq; calidi & siccit natura sunt, hi omnes facili ab integris euacuationibus offenduntur. Consuetudo quoque non parui momēti est, quum ad omnia alia, tum præcipue ad euacuationis indicationem. Quidam enim nunquàm prius fuere uacuat, & multis cibis sunt usi. Nonnulli contra, nec multis cibis sunt vsi, & euacuationibus assueuerunt. Hos igitur intercipidè euacuare oportet, si reliqua etiam consentiant: alios uerò, ne si reliqua omnia id suascerint. Eodem pariter modo & corporis habitus considerandus. Nam qui densa & solida carne constant, non offenduntur facili. Quare non oportet uereri ipsos uacuare ex toto, si quidem & alia id inbet. At qui mollem, & tenellâ, & disfluentem carnem sortiuntur, ij mirum in modum sunt ad patiendum habiles. Quare uel si reliqua omnia sanguinem esse mittendum suasceant, non tamen id facere audendum est, sed vtondum alijs euacuationibus moderatè. Eodem modo & in ijs qui supra modum crassi aut macilentisunt, ab incidenda uena superledendum. His etiam & ætas annumeranda est, ueluti quoddam symptoma, quod prohibendi integram euacuationem uim habet. Neq; enim pueri, neq; seniores hanc sine noxa tolerant. Hosce igitur omnes, si dispositiones horrentur, non semel nec ex toto, sed paulatim oportet uacuare, inedijs moderatis, frictionibus, clysteribus mollibus, perfusionibus, atq; balneis. Quod si duo contraria symptomata, aut morbi, coeât, aduersus id quod magis urgeat instandum: nec interrim alterum negligendum. Eas uerò quæ habentur ex accidentibus & morbis indicationes, non simpliciter, sed secundû causam à qua singula sunt, considerare oportet.

quæ duo nomina de unica re dicuntur, cuius plures existunt causæ. Siquidem non solum per varios affectus corporis, sed etiam in vehementissimis perturbationibus animi, nonnulli exoluti fuerunt: præcipueq; senes, & natura imbecilli. Et enim plures eorû tristiati, aut lætati, aut ita animo defecerunt. Qui autem magis robusti sunt corpore, ex immodictis euacuationibus idem patiuntur. Iam verò si abscellus quispium rumpatur, vires vehementer lædunt, ætiam præcipue, quum materia simul tota ad ventriculum, vel ipsius os, aut thoracem di fluxerit. Quoddâ quando etiam non abscessus scætes, totû simul emittere pus voluerimus, animi defectû subsequi est necessariû. Nec verò laborantibus aqua inter cût, tota simul humiditas (quis ea præter naturam sit) potest sine noxa uacuari: sed tunc quoq; necessum est, hominem deficere animo. Ex dolorum etiam vehementia, similiter dissolutiones accidunt. Quinetiâ nervus percussus, & musculi caput, & maligna in articulis ulcera, & immoderata quoddâ frigiditas, aut caliditas, vitalisq; roboris exolutio, præterea insignis cruditas, obstructioq; aut inflammatio aliquis præcipue partis, aut os uentriculi malè affectû, aut improbæ euacuationes, aut deniq; alia multa, de quibus postea dicemus, inferre possunt defectum animi. Quarum sanè causarû singulæ propriâ curationem desiderât. Porro eos qui ex cholera, & alui profluvio, & alijs tû largè, tû vno impetu factis euacuationibus dissoluantur, frigida spargere oportet, & nares comprehendere, & os uentriculi perfricare, tubereq; ut vomant, stomachû irritando digito vel penæ immisione, ac deniq; alligare pedes & manus. Oportet autem ne nus fieri, plures quidè, ac fortiores, circa manus, quâdo per inferiorè partem sunt euacuationes. Nâ si uacuatio per superiora fiat plures ac vehementiores ligaturæ cruribus admoliendæ sunt. Si tû quoq; aliquè parti fluxionè patienti expedit in venire, in aduersum tendentè, sed moderatè. Nâ si nimium tendatur, atq; ex hoc fatigetur, nihilominus irritatur, q̃ si inclinaret ad eûdè. In uniuersum aut, aut ad cõia mēbris patietibus in aduersum trahere oportet: taut ad ea in quibz est fluxionis origo. Atq; ideo vehementes euacuationes quæ ex matricibus fiunt, cucurbitulæ iuxta mammas apposuit, istam sedant. Quæ verò ex naribus, hepatis, ac splenis secūdū narē patientē. Quod si ex ambabus naribus simul plurimus sanguis effluat, utriq; ulceri applicandæ sunt. Vinum etiam aqua frigida temperatū, curat eas, quæ ex magnis sunt euacuationibus, dissolutiones: ac tunc p̃ferunt, q̃ si humores fluât ad uentriculum. Cæterû si aliquod viscus sit inflammatû, aut caput doleat vehementius, aut aliqua alienatio animi affuerit, aut febris ardens in morbo crudo: magna & penè insaniabilis ex potu vini, huiuscemodi affectibus documenta proueniunt. Iâ uerò, qui frigidû potare

nō sunt afflicti, aut manifestè ex ipso læduntur, quique natura sunt frigidiore, & qui i extrema sunt senectute, & loco degunt natura frigidiore, & i per hyberno, cauere à potione frigida debent. At qui contrario modo se habent, ijs tunc repide illi offerre licet. Sit aut uinû, in fluxionibus quæ ad uentriculû fiunt, calidum simul & tenue, quale Lembiû, in sanguinis uerò fluxibus, crassû, & nigru, & acetum. Ipsi aut locis imponere oportet, ueluti uentriculo, matrici, stomacho, & thoraci, quæ corroborandi uim habent: capiti aut & fronti, præter hæc illa èt quæ refrigerant. Er quibus uel in superficiei, uel in uariis, uena aliqua discrupia est, medicamen a liquod, ex ijs sanguinem suppressere possunt, est imponendum. Porro balneæ in fluxionibus ad uentriculum quidem apertissimæ sunt: at sanguinis fluxum acriter irritant. Et quicunq; ob sudoris copiam animi defectû patiuntur, his etiâ plurimû nocent: ut quas potius altringere oportet, atq; refrigerare. His etiam uinum frigidum exhibendum est: ac nihil omnino calidum. Sed nec etiam aris ipsorum ligare oportet, neq; cogere ad uomitum, neq; ullo modo mouere. At uentos refrigerantibus a ditû præparare: aerem quoq; domus alterare frigida & acida qualitate, myrtorû frondibus, & uitium capreolis, ac rosis pauimentum consterment. Nihil uerò horû confert, ubi fluxiones ad uentriculum fiunt. At qui exoluantur ob plenitudinem, eorum artus q̃ plurimû perfricare oportet, calfacere, ac deligare. A uiuo uerò & cibis sunt abstinenti, & i balneis, si febriant. Sufficit autem, si eis dederimus mellierat potû, in quo ebullierit thymus, uel criganum, uel pulegium, uel hyssopus. Cõuenit quoq; oxymel. Quæ ex matrice laborant, atq; exoluantur, non aliter sunt curandæ, excepto oxymelite. Fricare autem ac deligare magis earum crura oportet, quàm manus. At quibus uterus aut suisum, aut ad latus reuellitur, inguinibus & coxis cucurbitulis applicamus: & naribus quidem, ea quæ foetidisimum habent odorem: matricibus autem odorata, & ea quæ laxare, calfacereq; p̃nt, medicamentis a offeremus. Si uerò ob imbecillitatem uentriculi, animi sequatur deliquiû, ea quæ roborandi uim habent oportet emplastra adhibere, quales est quod sit ex palmulis, uino, farina hordei, eroco, aloë, & mastiche. Madefacere aut ijs quæ constant ex absinthio, oleo melino, & masticino: nec non nardo, uino, & cenanthe. Quoddâ exuratur, miscere ex refrigerantibus aliquod conuenit, ueluti cucurbitæ, lactucæ, porulacæ, solani, intybi, atque uuar acerbæ succum. Aqua etiam frigida plerunq; iuuat malè affectû stomacho, si tempestiue, hoc est in declinatione, exhibeatur. Alioqui plurimum obest. Atq; his qui os uentriculi imbecillum habent, uinum calidum exhibere oportet, si nihil prohibeat. Plurimum uerò innat eos qui sic laborant, èt frigidû extremorû. Quod

fi ex ijs remedijs nihil melius se habuerint, eos quidem qui adusti sunt, quamprimum ad balnea ducere oportet. Qui vero aliquid frigoris sentiunt, medicamen diatrion peppercon, ipsūq; plerum solum, atq; etiam absynthium bibant. At qui extiosis humoribus os ventricoli nordicaenibus exoluuntur, hos post aqua calida, aut hydrolei potum, sac vomere. Vacuatis humoribus, paricem lesam oportet modis omnibus roborare; partim ijs que ad mouēt extrinsecus: partim absynthij positione. Ceterum si humores adhuc in ventre consistant, nimis sanē astringere, sed tantum concalsacere oportet. Vbi vero multa piliuita in ore ventriculi accruata fuerint, fouere quidem plurimum oleo, in quo ebullierit absynthium: postea mellicratum exhibere, in quo hyssopum, uel quid simile infusum fuerit: item oxymeli, & piper, & diatrion peppercon, & diospoliicon ne dicam. Victus ratio in summa, incidendi vim habeat. Quæ uero ex nimia frigiditate eueniunt exsolutiones, eodem modo curandæ sunt, quo balui, omnimodo calefacientibus. Vinum igitur eis exhibere oportet, calida temperantia ac cibos qui calfaciendi naturam habent: scilicet fricacis, & calfacere ad ignem simul. Quæ ex calore nimio accidunt deliquia animi, ijs quæ refrigerandi & roborandi uim habent, curantur. Statim igitur ipsos corroborabis, si aqua frigida sparseris, & stibellaueris, & os uentriculi perficaueris, & agitaues, uiuod; & cibo refeceris. At qui ob inflammationis magnitudinē, aut uehemētis febris malignitatem, animi defectū patiūtur, & in principijs accessionum refrigerantur, ijs artus fricare fortiter, & calfacere, eruatq; ac manus alligare, & uigilias, cibiq; & potus omnimodam abstinentiam præcipere oportet. Optimum uero in his quid suuū sit, præcognoscere. Eos etiam qui ex siccitate in principijs accessionum, defectum animi sunt incursum, optimum est præuldere. Nam si duabus aut tribus horis ante accessione exhibitio cibo, coneoctu facili, manus ac pedes constringi iusseris, non inieburunt. Quod si magnam imminere periculū suspicatus fueris, uinū in alicam eliquam infusum, dare anticipabis: aut panem quoq; ex alica. At si mediocriter expectatur defectus animi, parcendum est uino: sed sufficit runc mala punica, aut pira, cibis ipsis miscere. Ijs qui præter expectationem in periculum inciderunt, uinum calidum, & panis est exhibendus parumq; aliquid cum eo alicæ calidæ. Qui ob præcipui membri obstructionem linquuntur animo, ijs oxymel dare oportet, atq; ex hyssopo, origano, pulegio, & melle potum: cibosq; incidenti naturam habentes. Sed nec desieris fuerit artus perficere, deligareq;. Prodest etiam hisce potibus uti, qui urinam ciendi uim habent: ueluti qui anethum, sceniculum, apium, petroselinum, ammi, dancum, & spicam nardi recipiunt. Quæ

ubi manifestè iunetur, iam uino albo, & tenui, nec admodum antiquo, est utendum. Fiant uero & in huiuscemodi dispositionibus, quum uehementes fuerint, pulsus inæquales, interdictæque. Qui ex abscessus disruptione, aut sectione exoluuntur, aut ex superflua aqua inier cutim inanitione, ij quidem confestim optimis odoribus sunt fouendi. Paulo autem post, sorbitionibus concoctis facilibus, sunt reficiendi. Si uero ob tristitiam, aut gaudium, aut timorem, aut irā, aut terrorem exolui uideantur, odoribus, & narium apprehensionibus reuocandi sunt, cogendi que ad uomitum. Eodem pariter modo, qui ex uulneribus, aut purgationibus, aut doloribus qui in articulis, neruis, & musculorum chordis eueniunt, exoluuntur, reuocandi statim ab eo affectu sunt: postmodū uero, conueniens passioni cura afferenda. Defectus animi qui ex intestini laxioris doloribus, aut ilei, aut similibus cruciatibus sunt, ex patientiū locorum calefactione, frictioneque extremorum curantur. At, quæ ex propria imbecillitate uirium, quæ regunt corpus, eueniunt exolutiones, ex in temperie uidelicet ortæ, partium à quibus uires proficiuntur, contrarijs intemperaturis curandæ sunt. Virtus ergo uitalis, quæ ex corde nascitur, ex pulsu imbecillitate cognoscitur. At quæ ex hepate oritur, & naturalis dicitur, ex sanguineis egestionibus, ab initio aquosis atq; tenuibus: postmodum uero crassis, admodum facis. Quæ ex cerebro originem ducit, quam animalem appellant, ex motuum uoluntariorum imbecillitate deprehenditur.

De cura capitis à uarijs occasionibus laesi. Cap. XV.

Igitur symptomatum causæ, congruam curationem ostendunt. Veluti si quis doleat caput, simulq; fastidiat cibos, ex fameq; sentiat mordicationem, iubendus est, ut euomat: nā uel bilem uomet, uel pituitam, uel utrumq;. Porro qui cum grauitate dolores capitis sunt, multitudine indicant. Qui autem cum mordicatione, uaporis humoris acritudinem. Cum pulsu uero, inflammationem. At cum tensione, si quidem sine grauitate ac pulsu, spiritus flatulenti & crudi multitudine. Si uero cum pulsu, inflammatione corporis membranosi. At si adde grauitatem, multitudo intra membranas contenta significatur. Quā igitur omnia distinxeris, causam ex qua horum singula sunt, considerare oportebit. Veluti si multitudo uaporis atque humoris contineatur, aduerrere oportet, nunquid ob magnitudinem febrium humores diffusi, ac ueluti effluuantes, ad caput ascenderint: aut propter eius partis imbecillitatem aut totius corporis pleuritudinē. Hanc enim totius corporis euacuationibus haud difficulter curabis. Eam uero quæ ex partis imbecillitate contingit, parim quidem in contrarium trahendo per totum corpus: partim

partim ipsi capiti remedia adhibendo. Atque in co-
itarium quidem trahes, clysteribus acerbis, nea-
bus, frictioibus plurimis infernarum partium,
& si expediat, sanguinis aliquantula detractio.
Partem autē sanabis eo tempore quo ad uniuersum
corpus retrahis, ijs vtens asperginibus, quae
à capite uim repellendi habent: ac dein euacuati-
onibus: postremo denique corroborantibus. Repel-
lit autem oleum quod immaturum dicitur, ac-
tum oxyrhodinum, tum rosaceum, & quaecumque
ea capitibus papaueris, & teneris oliuae germi-
nibus, & hederæ corymbis, menthaque; uiridi, & si-
symbro sunt. Vtendum uero ipsis, in multitu-
dine crudiori & frigidiore, tepidis in calidiori
autem & biliosiori, frigidis. Euacuat etiam, dis-
solutique oleum calidum, ipsum per sese: & magis
si antiquum fuerit, & sycionium, aut anethum ter
uescendum in ipso fuerit. Quod si spondylium, uel
serpillum, uel pilegi comam, uel calamintum,
uel mentham, uel silymbrij, intus decoxeris, ita
etiam crassiores succos uacuaueris. Hæc uero ip-
sa uirum etiam a liquidum membro imbecillo adij-
ciunt. Quod si etiam ex usu uideatur, per nares at-
que palatum expurgatio molienda est, stemuta-
mentumque excitandum. Si ad balnea hominem
dueris, siccis sindonibus caput est perfrican-
dum, salque, & nitrum, & synapi, sine oleo impo-
nendum. Hæc itaque sunt ea particula imbecillita-
te, doloris capitis medicinæ. At quando ea ma-
gnitudine febris accidit, & medicamenta adhibe-
re conuenit, frigida qualitates ac vires, & quæ ex
hydrele & oxyrhodino, & papaueris capitulis
perfusiones constant, expeditur. In dolore au-
tem capitis, qui sanguinis fluxum, aut vomitum
decretorium significat, remedia inuestiganda non
sunt æquum non accideris, sed talis dolor bo-
num existat signum. Si quidem ubi natura excre-
tionem aliquam, ac præcipue vomitum, aut san-
guinis per nares fluxum molitur, bonum insep-
arabile indicium est eapitis dolor. Considerandæ
igitur ad cognoscendam crism, primùm quidem
sunt febrium species, an calida sint, atque uirescentes:
nam hæc per excretionem iudicari consueuerunt:
quæ admodum quæ moliores sunt, ac ueluti fumi-
gantes, diu durant, & sæpius in abscessus contem-
dunt. Secundo loco, an morbus sit salutaris. Nam
quis obsecro bonam crism in morbo pernicio-
so expectaueris? Tertiò ad hæc totius morbi tem-
pus considerandum. Nam si principij uel augmen-
ti ad sit signum, minimè autem status, nec conco-
ctionis signa in urinis, uel sputis, uel alui excre-

mentis cernantur, non est quod bonam speres cri-
sim. Porro difficilia tolerantia antecedere om-
nem crism solet. Quæ quidem si in die accidat,
crisis sequetur noctu. Si autē noctu, in die. Si igitur
tale aliquid uideas considerandum est, quomodo
sit ægritudinis dies. Etenim septimus dies, etiam
ea paruo naturæ apparatu, ad crism per excretio-
nem mouetur. Sextus uero, magno apparatu in-
diger: & sæpe neque ulla in eo sit crisis, nec sine
periculo, nec fideliter accidit. Ergo si dolor ca-
pitis statim ab initio non inuasit, licet quoddam
ipsius morbi symptoma, sed in ipsa ante crism
perturbatione: dein si collum etiam aliquid con-
dolescat, & præcordia retracta sint, aut repente
superuenierit difficilis respiratio, pulsusque in tu-
morem subito elati, non reciderint in paruitate,
neque debiles fuerint, statim crisis per sanguinis
fluxum è naribus, expectanda est. Si uero non
modò non deciderint, sed etiam in altum autol-
lantur, & uehementiam assumpserint, faciem is-
ægroantis inspicere oportet. Nam si quod in ea
membrum palpet, aut nare quæ sunt in tem-
poribus pulsant, aut malum, uel nasus, uel oculus
rubidior sit factus, magis etiam talis crisis est ex-
pectanda. Quod si etiam inniti illachryment, uel
imagentur se splendores cernere, ac nares ip-
sas scalpant, tunc non iam fluxum, sed iam fluxum
tem conspicies sanguinem. Nec uero ex his per-
terrearis, si hominem desipientem, aut resili-
entem uideris. Nam hæc humorum repentium
ad partes supernas indicia sunt. Præterea si ægro-
tus sit adolecens, aut aliquo natura calidus, aut
multo sanguine abundans, magis adhuc de hoc
sperandum erit. Quod si sæpius etiam antea illi
sanguis è naribus fluere est uisus, hoc uel solum
sufficit suauis sanguinis spem confirmare. Si ue-
rò & tempus anni æstas sit, uel calidus cæli sta-
tus, & si plures eo tempore crism ex sanguinis
fluxu habuerint, ægrique corpus plenum extiterit,
& consuetæ excretiones retentæ, hæc inquam
omnia spem uehementius augebunt. Has itaque &
alias excretiones omnes prænoscere licet, si hæc
duo tantum explorauerimus, & inde naturæ mo-
tus agatur, & in quam partem. Si quidem quæ de-
ficiunt a diuiniuimus, & quæ immoderate ferun-
tur, coercuimus, si ista nouerimus. Veluti con-
festum sanguinis fluxus ex splene magnæ cucurbi-
tæ sinistris præcordijs superpositæ, faciliè retra-
hunt. At qui ab hepate proficiscitur, dextris. Qui
ab alijs membris, eadem ratione.

P A V L I A E G I N E T A E

D E F E B R I B V S

L I B E R

Interprete Ioanne Guinterio.

De febribus diarijs dignoscendis curandisq; Cap. I.



DIARIAS febres, urinarum in primo die concoctio calorisq; suauitas seu propriæ ipsarum & inseparabiles notæ testantur. Verum à prima febrium solutione, certiozem habetur et earum cognitio nem. Quippe arteriarum in hac motus ei qui in secunda ualitudine fuit, ex toto responderet, cum nulla ex alijs febribus in naturalem statum reuertatur. iam vero quod facile morbum fert æger, maximum & id indicium est. Opportuni sunt, id genus febribus, in quo rum corpore quod transpirat, halitusu suum non est, sed mordax & acre fumo fuliginis non absimile. Hi autem sunt calidi & siccæ temperamento breuiter bilioli, quos *πυρρὰς* Græci vocant, qui igitur ob similitudinem febricitarum, pinguiter si mol ac molliter fricandi sunt, in balneumq; duccendi. Quibus siccitas febrem intulit, fricandi hi quidem minus, sed lauandi sunt liberalius. Quos curæ, morores, vigilæ, & ira exerceant lauare quidem non subinde oportet, uerum oleo copiosiore tepido, cui mini ma astringens uis insit, tum paululum fricare, tum ex consuetudine lauare cõuenit. Ab insolato uestio, protinus ab initio refrigerationem desiderant, tum crebriore lauatiõnem: minime uero aut oleum largum, aut crebram fricationem. Sint autem quæ refrigeret & rosaceum & omphacinum, quod nihil in se salis habeat: ea de uero simplici uoluntate superfundere oportet: & ubi febris inclinauerit, in balneum æger ducendus est. Siquis ex frigoris iniuria febre concipit, etiam in remissione lauandus est. At si cū grauedine & desillatione febriat, priusquam hæc concoquantur, lauatiõnem non committetur. Porro qui æstus iniurijs patuerit, ij, vel cum hæc adsuput, commode lauatur. Post lauacrum iterum caput perfundendum est: eorum quidē qui ex uestio ne febricitarunt, refrigerantibus: qui autem ex frigore, calefacientibus medicoriter, cuiusmodi irinum est, & nardinum unguetum. Verum in quibus meatuum constipatio febrem excitat, his conuenit ex aqua dulci, & temperata lauatio, tum frictio, quæ rarefaciat, & exercitationes modicæ, uisq; dulcibus procreandis succis idoneis. At cui propter inediam febri cõtracta fuerit, ei opus est

statim, ubi prima accessio remiserit, in balneum perducere, & repente oleo largissime perfunditur, tum molli manu percipari, lente in calidi solij aqua immorari. Simul atq; exierit, ac sese recollegerit, denuo balneum ingredi, postea aquam calidam potare, mox pituitam cremorem, deinde lactucam assumere, & aliquid piscium eorum qui molli sunt carne, ex albo iure. Omnium uero communis esto uictus species, quæ, & boni sit succi, & concoctus facili, & quæ nusquam exiguis cutis meatibus inhæreat. Vinum propinetur & asperctum, & uiribus aquosum. Oportet autem in primo febrium insultu nonnunquam primæ accessionis horum aliqua mutare, in quibus corporis intemperies ad calidius, siccisq; transiens, febres accendit. Qui ex inguinum inflammatione febrem conceperant, ne medicum quidem interrogant quid sit faciendum, sed ulecri, quod in inguinibus, excitatum est, prospicientes, lauant, ubi accessio declinauerit. Cæterum à uino ipsi sunt arcendi, priusquam inflammationes inguinum fuerint solutæ, & tenuiore uictu enutriendi.

De putridarum febrium agnitione. Cap. II.

Putridæ febres dignoscuntur his notis: nulla ipsas exterior causa præcedit: neq; à rigore incipiunt, neq; æstu, neq; frigore uehementi quod & ipsum est peculiare febrium putridarum indicium, sicut & pulsuum depressio. Nominat sic, cum incipiente accessione perexiguos quidē ipsos & inæquales obtinentur qui singulariter illiusmodi febribus sint peculiare. iam & caloris qualitas maxima putridarum febrium nota est, qui fuliginosus adeo existit, ut manum erodat. Similiter ad ipsas proprie spectat æstus urinarum cruditas, & obscura concoctio. Magnum uero & notabile concoctionis indicium, in primis urinis nunquam eiusmodi febres representant.

Curatio febrium putridarum. Cap. III.

Si uires sint validæ ei qui ex putredine febricitat, sanguinem dimittes protinus, modo eruditæ uentriculum non infestat. At si uires imbecillæ, aut ætas prohibeat, sanguinem non detrahes, à cuius uacuatione putrida per urinas aluum & sudores expurgare conuenit. Sin autem spore sua nonnunquā impetum ad os uentriculi capessant, etiam per uomitum: alioqui non oportet

ter

ect ea præter naturam irritare: verû deliqui materia debent, quæ sine calefaciendo siccandol; ualenter, prædictas uacuationes moliri possunt, ueluti præstant cremor, aqua mulsæ, oxymeli, & apomeli, apijq; radix in aqua potabili iuncta. Cum alius nihil deiecit, ex aqua mulsæ cum oleo clystere ducenda est. uerum totum corpus rarefacere prius non expedit, q̃ uacuarum fuerit: ubi uacua ueris, rarefacias utique licet, oleo tepide calido, quale est, quod ex chamæmelo conficitur. in hoc tempore uinum aquosum potui datum, ueris facit promouet uacuatione: eiusdem facultatis est temperatum dulcis aque lauacrum. Quod si uero febris magnitudo obstiterit, neque uino utendum, neque lauacro, neque unctionibus rarefaciendi uirtute præditis, sed aqua frigida his in febribus commode bibitur, nisi quid & hæc prohibeat. Ergo si quidem & uires robustæ omnes fuerint, & febris ardentissima, & concoctionis signa plane euidentia, frigidam cum fiducia exhibebis. Præterea si bona corporis habitudine sit eger, tum status colli calidus ac succus, etiam si in frigidam natationem hunc dimittas, haudquaquam lædetur: sin autem mediocriter existat febris, & uires inualide, sed cum notis concoctionis, ijs qui ita se habent balneum prodest, & uini potio. Tu uero ex unctionibus eæ quæ rarefaciunt.

De tertianarum agnitione. Cap. IIII.

Tertianæ febris cum sit flauæ bilis commotæ soboles, proxius ab initio rigore, hoc est totius corporis concussione non haud exigua infert. hoc discrimine à quartanæ rigore uariatur, quod pungeret uideatur & cutem conuulseret. In quartana autem, accessio in insultus uehementem perfractionem habet. Quotidianas nequaquam rigor præcedit: sed membra solum perfrigescent. Ceterum tertiana etiam exactum pulsu ordinem obtinet. Sicut uero uehementi in statu affligit, & hominem perurit, ac paulo post consistit, calorq; æquabiliter per omnes corporis partes diffunditur, nibiloq; magis pectus quam extrema caleunt. Et si manum iuicis, primo quidem cõtacta, calor copiosus & acris occurrit, ueluti est uaporem quodam erumpens, sed paulo post à manu remanente uincitur. Vbi potione æger fuerit recreatus, statim copia uaporis calidi per eum emergit, sudorem nuntia. Bilis uomitio superuenit, aut alius soluitur, perque uisus biliosa redditur. præterea ad integritatem tertiana definit, ubi accessio nis tempus, horarum non plurium duodecim expedierit. Febris igitur quæ intra duodecim horas terminatur, exactam tertianam nominamus: quæ uero diuturniorem accessio nem habnerit, illam simplici uocabulo tertianam nuntiamus. quæcumque aut longissime productam accessio nem seruauerit, exi-

guum uero interuallum, hanc rursus exactam tertianam dicimus.

Curatio tertiana.

Cap. V.

Exquisitam tertianam, ut quam flaua bilis procreet, humectare oportet ac refrigerare. & sane quod in uentriculû confluit, uomitionibus, quod ad inferiora uergit, alui deiectionibus, elicere. Item per urinas & sudores uacuare id ipsum conuenit. Aluus itaque mollior clysterijs euocatur: urina potionibus, in quibus apij & anethum maduerunt. simulatq; coctionis signa deprehenderis, magna iam confidentia etiam abstinere dederis. Balnea uero ex aqua calida potulenta conueniunt: quibus neq; nitrum, neque sal, neque sinapi adijci, sed oleo quam maxime calido infuso ægrum oportet in aquam descendere. At qui balucei admodum gaudent, eos etiam si bis die laueris, haud peccabis. Vbi uero concoctionis notas perceperis, tunc, uel si sæpius laueris, nihil offeudes. Poterit uinum prinquâ morbus conuocatur, ex toto circuncidendum est. simulatq; concoctionis inieperis, tenuis, aquosum modici, primo die exhibendum. Cibi humectantes, refrigerantes, quæ utiliter assununtur. A melle abstinendû, sinapi, falsis & acris omnibus. uinis autem admodum uetustis, & natura calidis. Ceterû nihil miri est, si in hominibus primum exercitis, inodiâq; expertis, tunc autem ordine eo uero otiosus cibo, quæ usui plenior, bilis maxima ex parte mixta, quæ reperiatur. Cuius rei gratia complures tertianæ, aut eitra totius corporis concussio nem, sunt aut per exigua ipsi in oboritur, unde etiam inaduersionem propriam desiderant. Neq; enim balneum, neque cibis aliquis liberalior tertianis spurjijs autem concoctionem conuenit: quoniam ne panis quidem mica, oia, & consimilia.

Curatio tertiana notæ

Cap. VI.

Lauare in tertianis spurjijs per initia salubre non est, sed quâdo iam concoctionis notæ apparent: neque cibum quotidie exhibere, sed alternis diebus abunde est. Quies autem, & præcordiorum foras ipsis conducitur, rum forbitiones concoctu faciles, & clysteres aluo inditi non admodum molles. Atq; si sanguinem detrahere opus est, neque hoc omittere oportet. Tota uero uictus ratio erit, nō quæ refrigeret uniuersum corpus, humectetq; uerum etiam modus aliquis qui magis incidat, ac calefaciat, adhibeatur. Maxime uero conduxerit ipsis præstant cremor pipere iniecto, uel hyssopum quoque nonnunquam, neloriganum, nel spica nardi, quæ mulsæ admista, incoctaq; potui exhibetur, & alia, quæ urinae cient sunt, præterquam ea, quæ uehementer calefaciunt, excitantq;. Maxime uero abstinij, coma

post septimum diem continue porrigitur. Iam & oxymel eptum, multis fuit auxilio. ad hæc uonnulla ex his quæ mollior uentre subducunt. Porro uomitus secundum cibum, ijs quibus hæc febris in uetustatem incidit, utilisissimus est.

Quartanarum cognitio. Cap. VII.

Quartana inuadit multa cū perfrictione, ut quæ ex frigido humore, atra bile originem trahat. Calorem uero seruo remq; febrilem tertiaræ modo uon obteit, imo nec bilis uomitus eam eomitatur. Adhæc si urinae tennes, albæ, & dilutæ fuerint, quartana erit febris. Eximia uero ipsius nota est, pulsus exiguus, & rarus. Cæterum in autumno potissimum incipit erraticis superueniens febribus, ac nonnunquam in forma eius potissimū subsistit quæ quarto die reuertitur: aliquando etiam plurium dierum intervallo, iuxta quosdā circuitus accessionē habet.

Curatio quartanarum Cap. VIII.

Quartana laborantes leniter tractādi sunt, neq; medicamento ullo forti sollicitandi, neq; uacuatione, nisi forte sanguis uehementer exuperare uideatur, cum uenam dissecare conuenit. Victus eis offeratur optimus, quinō iusset, & uenter his quibus uti consuevit, emolliari debet. Quod si hæc nihil proficiant, clysteribus per initia mollioribus, deinde acutioribus utendum est. A suilla carne prohibeatur ægri, atq; ab omnibus cibis qui glutinosi, ad exitum tardi sunt, tum qui refrigerant corpus humectantq;. Vinum uile est tenue, album & modice calidum. Item falsa & sinapi ex usu sunt, tum triuo assumptum medicamentum diatriou pipereon, id est, quod triplici constat pipere, uel quod diospoliticon appellant. Iam & piper solum recte ex aqua quoti die sumitur. In morbi statu uictus egro tenuissimus præcipietur, statim uero etiam ut diu quiescat, inuigendum est, tum uisceribus prospiciendum per ea quæ emolliunt, relaxantq;. Insecutis diebus medicamenta conferunt, quæ urinam ciunt. atq; si cōcoctionis noxæ apparuerint, cum fiducia tunc quoque ijs uti expedit, quæ ateros humores auuant, idq; non semel duntaxat, uerumetiam sæpius. Porro secundum ualidam purgationem, & medicamentum quod uiperis constat, exhibetur, & alia quæ ad eiusmodi febres commendantur, inter quæ est & uobis familiare, omnium probatissimum, quod succum cyrenæicum recipit.

Quotidiana cognitio. Cap. IX.

Quotidiana huiusmodi aquam cum rigore primo statim die inuadit, sed temporis spa-

tio perfrictio magis quam rigor oritur. Aegre uero incalescit, & diurnum habet incrementum, uon tamen adurit ægros, neq; multum, & crebro spirare compellit, ac ueluti flammam ex ore elidere, uel frigidam bibere. pituitosi autem uomitus hic accidunt, & quæ aluum uacuantur, frigidiora, crudiora, dilutiora, & pituitosiora cernuntur: totū corpus erudit humoribus reduat: sudores minime primis diebus erumpunt, neque ad integritatem ueniunt, cutis ægrotantibus albi eat, urinae uel tennes sunt & exalbida, uel crassa, turbida & rubra.

Curatio quotidiana. Cap. X.

Quotidianam curantes, oxymelite primis diebus utimur, tum ijs quæ urinam probe eliciunt, ac uniuersa uictus species incisoria esto, circa statum uero uentris habenda est ratio, præsertim ipsius orificij, deinde ægri iubendum est, ut à radícula, & cibis assumptis uon mant. Idem utantur ijs quæ pituitam subducunt, idq; tam diu, quam febris cessauerit.

De hepialo febris et rigore, quæ nullo calore possunt uinciri. Cap. XI.

Si uitrea pituita, quæ omnium aliarum frigidissima est, uondum putrefacta toto in corpore exundauerit inuexpugnabilis, & qui nullo euincit calore possunt, rigores sine febre circitæ. In febribus enim quæ humoris initio accenduntur putrefactio maxime febrilem calorem suscitatur. At si toto hæc pituita putruerit, quod tamen raro fit ob immensam putrefactionem quotidiana febris causa redditur. Quando uero non tota æqualiter, sed ex dimidio ipsius putrida fuerit, aut aliquæ ipsius partes, nonnullæ uero non putruerint. Hepialum febrem hæc facit: in qua simul & rigor & febris caliditas est. Particulæ qui dem humoris eius necdum putredinem experire, omnibus uenis, uel etiam reliquo corpori cōmunicatæ & sparæ rigore creant i putrefactæ uero febrem accendunt. Dicta est autem Hepialos per translationem à fale: dico autem mari, quod à principio tranquillum apparet, cum turbatur difficillimum euadit. Vel ab Hepios, quop est molliter & alexinin, quod signat calefacere, quasi dicas, quoniam blande & leniter calefacit. Atq; hæc febris cum ex quotidianarum genere existat, utpote ex pituita uasens. illarū curationi subijciuntur specialia, nisi quod tauro commemorata quotidiana calidioribus magisq; incidentibus præsidij indiget, quanto etiam pituita frigidior illa existat. Hepiali uero rigor multo magis calefacientia requirit. Itaque medicamentū ex triplici confectum pipere: ex calaminthe, præterea & quod liquore cyrenæico constat, his sunt accommodata

moda. Item ex castoreo, similibusq; preparata re media conueniunt. Latius autem diffusiusq; explicatam curationem horum reperies in capite 45. de perfrictione. Insuper Lypyriæ & Tiphodes quæq; præter commemoratas febres dicuntur, cum sint ex relatarum numero, etiam curationes, tum in illis expositas, tum exponendas postulat.

De febris continens. Cap. XII.

Continentes finitimæ sunt, singulis intermittentibus; tertianæ quidem exactæ ardeat, quæ causos dicitur: quotidianæ, ea quæ singulis diebus accessiorem habet, non autem ad integritatem definit. Sic etiam quartanæ ea quæ quarto die accedit. Exactus namq; causos, cum omnes alias ex quibus tertianæ notas seruet, hoc solo discrimine uariet, quod non cum totius corporis cōcussione, sicut appellatur, inuadat, neq; ad integritatem ueniat. Qui singulis diebus accessiorem obinet causos, omnes similiter exactis quotidianis notas præ se fert, quod autem ad integritatem non peruenit, hac re à quotidiana specie consimili differt: ea ratione & quæ quarto quoq; die accessiorem habet, uerum ad integritatem non cessat, finitima est quartanæ. Contingens itaq; febris est, quæ non ante ad integritatem terminatur, quam ex toto fuerit soluta, etsi inclinatio aliqua sensibilis appareat. Quæ autem nulla accedit, quæ sensibus queat percipi, hæc quoque ex ardentium genere habetur, sed acrimonia ab ipsis uariet.

Agutis febrium continens, & curatio. Cap. XIII.

Continentium febrium origo ex sanguine est, qui nunc effervescent, tantum nunc putrefactus obstruitur. Quapropter accessus ipso ad nesci finem una est. Indicia uero sunt, pullus maximus, uementes, citati erebri, æqua bilis, non mordaces. Urinæ non multum adeo à sanis recedunt. Cratio est, sanguinis quousq; deficiat anima, dimissio. Qui si non fuerit detrahitus, febricitantes in summum ueniunt discrimen. At si quid per nesci sectionem nauare prohibeant, alijs uti remedijs oportet, quæ meatu recludunt, copiam materię nauant, & febrium seruo rem leniunt. Cum autem euidenter humorum concoctionis notas in ipsis nideris, neq; in principio particula inflammatio quædam, aut tumor cedematis specie representat, aut schirrus fuerit, neq; particula aliqua temperamento adeo frigido, ut in hanc noxam procubat, cū fiducia frigidā propinato: maxime si æger eius potioni assueuerit.

Ardenium agutis. Cap. XIII.

Ardentibus hæc superueniunt, arida lingua,

crassa & nigra, uentriculi rosio, deiectiones palidæ, siccis uehementis, uigilia, nonnunquam etiam delirium.

Ardenium curatio.

Cap. XV.

Horum alterutrum fieri necessarium est, si perfecte morbus solui debet: aut biliosos excerni humores, aut eosdem extingui. Exceruntur itaq; per sudores, uomitiones, & imbuuntur. Extinguuntur autem frigidæ potu: quo nos ardentissimas febres, causos appellant, ex toto curauimus. Sustinere eos qui his cruciantur, nõ aqua sola conuenit: neq; mulla duntaxat, uerum diluta mulla exhibita. Nam qui huiusmodi uisus consueuerunt. Sustinere eos qui his cruciantur, nõ aqua sola conuenit: neq; mulla duntaxat, uerum diluta mulla exhibita. Nam qui huiusmodi uisus consueuerunt. Sustinere eos qui his cruciantur, nõ aqua sola conuenit: neq; mulla duntaxat, uerum diluta mulla exhibita. Nam qui huiusmodi uisus consueuerunt.

Febrium quibus ex effectu erysipelat uenerunt origo est curatio & agutis. Cap. XVI.

Febres quæ ex effectu uiscerum erysipelat re ferent procreantur, his notis agnoscentur: interna feruent immodice, dolor urget uehementer, præterea sitis ex cruciat, & æstus immoderatus. Summatim ex indicijs acerrimæ bilis cum pauco sanguine putrescentis deprehendens. Hunc in modum curabitur: A balneo in totum abstine re decet. Aqua frigida per morbi statum uehemens, hoc est frigidissima utendum est: per initia nõ item. Extrinsecus uero refrigerantia imponuntur. Etsi nihil hæc promoueat, etiam intus sumere cogentur. Maxime ipsi conueniunt iactura, & quæ parem his facultatem obtinent, à foria & ipse lactuca succus idoneus est, adeoq; intybi & semperuiui, & reliqua refrigerandi uirtute prædita. sed præstantissimo partem plurimam nititur. Nam humorem refrigerantis aluius expressum pilæ cum portulaca iniicimus, deinde contusum exprimimus. cum usus exigit, modico polenta mixto & in aqua frigida merso, partem refrigeramus. Linteum uero duplicatum in ea intinctum extrinsecus, aut ubi calor sentitur, præcordijs ob tendimus, nõ diu adhærere sinentes, uerum aliud frigidum eius loco applicantes. Iam nero & oleum omphacinum medicamini nonnunquam miscemus.

Hellicarum febrium agutis. Cap. XVII.

Hellica febris non in humoribus, & spiritu solam, sed iam partibus etiam solidis consistit. Hæc dolorem nescit, & qui ea detinentur,

nequa quam febricitare se existimant: neque enim calorem percipiunt, cum universis ipsis partibus æqualiter sint excoactæ. Duplex hæcitarum febrium species est, prima ardentibus magna ex parte supervenit, quæ prorogantur adeo ut tempore corporis ipsius cordis madorem assumat, vel etiam si copiosius adhuc subsistat: alia manente etiamnum humiditate cordis corpus expandens, inde potissimum accenditur. Vnam sane ipsius generationem prodidimus, reliqua est, eû scilicet ab initio invadit, primam originem diariis stimulis, ex merore, ira, lassitudine maiore, vana cum exultatione sortita. Hæc igitur non difficulter cedit remedijs. Quæ vero ex ipsis in marcorem qui Græcis dicitur *παραπλησι* devenit, omnem respuit curationem. Atque hæc sanè cognita est facillima: oculi siquidem præter modum copiosi testantur, & læmæ ipsi inhaerentes aridæ, tam dispositio quædam squalida, vividi ipsorum corporis flos emarcuit, frons sicca est & intëta. Quin etiam conjuunt plurimum, hac occupati, quem admodum dormientes, verum affectio, somnus non est, sed vigilandi impotentia: tempora collapsa sunt, & quid enim aliud præter ossa & cutem solam habent? Nam si denudatum ventrem inspexeris, neque intestinum, neque viscus ullum superesse tibi videbitur: præcordia sursum conuolvuntur, & cutis ipsi extrema ressecata est, pulsus gracilis, creber & durus. Caliditas autem primo occurrit languida, paulo post acris & æodem eruptit, quo usque, igitur humiditas aliquid reliquum est, hæc ita solum febris dicitur. Cum vero periclitatur, ne nihil superius humoris superstit, absque iam mæcor constituitur.

Hæcitarum febrium curatio Cap. XLII.

Hæc ita febre laborantes, statim ab initio nutrirî desiderant, humorum rodecium gratia. Maximum vero remedium huius est, victus humectans. Convenit igitur quàm maxime pitane cremoris halicæque sorbitionibus, & pane præterea adiecto ægrum nutritum, moderato frigida potu curare, si neque inflammatio quædam, neque humorum putrefactio subest. At si magnam inde offensam fore coniecturaveris, frigida abstinere oportet, extrinsecus autem impositis, quæ refrigerant auxilijs, uti. Balnea vero hoc morbo obnoxij, quolibet tempore sunt idonea.

De semitertianis. Cap. XIX.

Quandoquidem tertiana cum rigore, quotidiana vero citra illum invadit: quæ ambaram mixtura constat, horrorem inducit, qui minor quidem res est rigore, maior autem perfiritione. Quapropter cum horror æquali ab utrisque extremis intervallo, medium amborum

rigoris nimirum & frigoris occupet, quod comperat is inuicem extremis accidit, non abs re nomen huiusmodi febris semitertianæ indiderunt. Porro duplici modo generatur: vel enim dux acceSSIONES in idem tempus concurrunt, vel statim ab initio ambæ invicem iunguntur. Quando igitur tertiana præpollat, magis horrida febris efficitur, & rigoris etiam nonnihil per accessionem assumit. Potius autem talis calidior est & ardentior, tum vomitionem quandam bilis, aut dejectionem, aut madorem adferre. Quando altera pituitosa febrat, perfiritiones quidem summæ exerceant, pauci vero horrores: neque tamen litis, neque ardor in his affligit. Cum pares magnitudine sunt tertiana intermittens, & quotidiana continua, infusus quidem accessionis cum horrore accidit. At cum ex pituita proveniens febris præcelluerit, submisiones pulsus sunt, & horrores. Si vero calidior prævaleat subito incallescunt. Talis sane est exacta semitertiana, ex æquivalente duarum febrium, puta tertianæ intermittentis & quotidianæ continuæ temperatura proficiens. Non exquisita vero vel bilem largiorem, vel pituita causatur, quæ iam magis etiâ curationi renouitur, cum paucis humoribus copiosis excellens artissimè auxilio expeditur possit. Si autem pituita sit superior, præsidij maxime utemur quæ in quotidiana exposuimus. Sin autem flava bilis, quæ in tertiana comprehensa sanè, in totum si quod, urget incumbentes, sed ita, ne alterum prius negligamus.

De Morbis publice grassantibus. Cap. XX.

Publice grassantes communesque morbos nominamus, qui multis simul obveniunt, quorum aut generatio, sic etiam causa communis est. Cibi igitur communes prævi, illiusmodi morbos pariunt. Item communes aquæ vitæque potio, nimis laboriosa vitæ ratio, labores quibus quisque assueverat omitti, inedia, repletio, idque dum famæ grassant, aut fecundus annonæ proventus est. Item regionum natura, communes subinde morbos intulerunt, quæ nonnunquam palæstres aliquando barathrum vicinum habentes vapores exiciosis præuimque exhalant. Hæc igitur continue acciderent confluxerunt. Aer vero nos ambiens, temperamenta corporum commutat, vel calidior impendio, vel frigidior, vel humidior euadens: si quidem in alias causis neque omnes simul incidimus, neque eis toto die immoramur. At quoniam aer qui omnibus circumfusos est, & per inspirationem attrahitur, ut animalium corpora pro temperamenti ipsius immutationibus afficiatur, necesse est. Qui igitur hæc intelligit, non solum morbos ex unoquoque aeris statu futuros præfagiet, sed etiam ne fiant prohibebit, contrarium immoderatis circumstui aeris temperaturis viciis indicens.

Itaq; corpora morbo alicui ex propria intemperie vicina, hæc à simili circumdantis nos aeris temperamento deprehenduntur. Quæ contrariam cælo temperiem obtinent, præter quod nullam offensam experiuntur, etiam meliora sunt, dum repugnans aeris immoderato temperamenti immoderationem punit. ac qui hoc nouit, secundâ ualuedinem tuebitur, contraria corporibus inducens, nunc refrigerantia scilicet, nunc calida: aqua quidem super infusa refrigerans, itidem otio, ciborum inedia, & potu largiore calefaciens autê, operimento, laboribus, cibo liberaliore, & interdum parciore. Præterea pyre incendio haud mediocriter aerem ad calidum & siccinm mutantis, si tunc humidus fuerit, quo modo Acronem a eragantium facitasse ferunt.

De pestilentia ex commentarijs Rusti. Cap. XXI.

Pestilentie gravisima quæq; superueniunt; aihq; i hac sicut in alijs morbis singulis de finitum. Etenim delirium accidit, & bilis no initio, præcordia intenduntur, labores afficiunt, sudores largi erumpunt, extrema algent, alui pro fluxu urgent biliola, tenuia & statulenta, nrimz cernuntur dilutæ, tenues, biliolæ, nigræ, mala habent subsidientia, quæ superinnatant, pessima, na res sanguinem destillant, pectus ardet, lingua torrida est, fisticulosa tristitia oboritur, torquent uigiliæ, cõuulsiones uiolenter, aliaq; multa praua. At si quis pestẽ uenturam prænosceret ex malignorum anni temporum, & itæ studiosior ad sanita tem hand conducentium animaduersione, aliorumq; animalium præcedente interitu, his apud se consideratis, & illud præterea perpendito cuiusmodi sit præsens anni tempus, qualisq; uniuersus annus. Inde siquidem qualis uictus ratio esse debeat, optime deprehendes: utpote cum anni tempus, si quidem rite ortum est, ex sicco humidum nunc euaserit, necessum est uictus ratione desiccare, ut humor superfluus absorbeat. Cæterum uetris habenda est ratio. Quibus superior nentriculus pituitam continet, uomitionibus sollicitare, quibus sanguis impundauerit, secare uenam oportet. Item per urinas, & ex toto corpore facta purgatio, aliaq; hoc in casu sunt utiles. Quod si etiã ager ardore æstuet, & flammam usque ad pectus pertineat, haud abs re fuerit refrigeria pectori applicare, & potionem frigidam offerre, idq; nõ paulatim, nam magis hoc pacto incendit, uerum uniuersum ut flammam extinguat. In quibus autem ardor inter ora occupat, summa uero in alge scum, cutis in superficie frigida percipitur, præcordia contenduntur, uentres syntexim patitur, aut uomitu, aut infra reiectiones sunt, uigiliæ urgent, mens desipit, lingua est aspera, hi calefaciens requirunt remedia, ut calor per totum corpus distrabatur, ac si alio quopiam modo ab interpra

foras poterit elici. Iam uero & hæc potio utiliter præsumitur: Aloea partes duæ, guttæ ammoniaci partes duæ, myrrhæ para una. Hæcin uino odorato contrita instat dimidiz cyathi exhibentur, nimirum quotidie. Haud noui, inquit Rufus, qui post hunc potum pestem non superauerit. Hæc quidem Rufus memoriz prodidit. Galenus autem tradit ad pestilentia præteredines, bolum armeniacum salubriter potari. Simili felicitate etiã Theriacem ex uiperis magnam prodesse. Etenim in pestilentia quæ Romanam internecino morbi genere depopulata est, omnes quos nullum ex his medicamentis adiuuit, interijisse scriptum reliquit.

De his qui ex redundantia crudorum humorum syncope periclitantur. Cap. XXII.

Nonnulli febricitare incipiunt, ubi magnâ crudorum humorum copiâ ore uentriculi simul offenso, nel ex cruditatibus, uel alia quapiam occasione congesse sunt. His & præcordia inflantur, & oæ nentriculi uastior mole, quàm pro naturæ modo cernitur ad hæc color ipsis ad albidius, aquosiusq; quâ naturaliter esse debet, & eorum speciem quos aqua inter cutem male habet, magis est mutatus. quibusdam ad nigrius luidiusq; nulli talium sanguis mitti sine maximo dispendio solet, et si uacuationem desigerent. Verum nec sanguinis dimissionem, nec purgationem sustinent, utpote quos etiam sine his syncope subito adoriatur. Ratio igitur mendum tali bus est quàm frictione molimur. Incipere uero per initia statim morbi oportet, ac primum à superiore crurum parte deorsum, idq; lentius non admodum mollibus, sed modice affusis. Deinde tota brachia ab humeris usq; & superiore parte deorsum simili modo sunt fricanda. Vbi uero artus omnes abunde calidi uidentur, & metus est, ne quis ex ampla frictione lassitudinis sensus superueniat, oleo relaxante uteris, quale est Sabinum: ab alstringente uero abstinebis, cuiusmodi Hispanum est, Histricumq; . et quod unâ cum germinibus uel ex olina adhuc immatura conficitur. per hyemem uero digerentium usus erit, quod genus est Sicyonium & chamæmelinû. Cui iam artus plurimum perfriueris, postea oleum detergetur, inde ad spinam dorsii transitus est: hæc uero tota perfriabitur similiter, ab hac rursus ad crura te conferet. & hinc ad brachia. exinde rursus ad spinam: ita toto die facies. Porro multa, in quâ coctum hyssopum fuit, his est apertissima cauendumq; ne uel cibum, uel forbitionem, uel aquam exhibeas, uel omnino liberaliter bibere sis, nisi multam tribus primis diebus duxas, tuis ipse manibus, quas dixi partes ordine perfriçans. Sin pilulis robore mediocri sit, ac magnitudine, considera quæ ad aluum spectant, ac si sua sponte

sponte commode non deiciat, cum fiducia aliquid in aluū ab inferioribus partibus infundes. Quod si maior iusto creterementorum impetus ad aluū citetur, principio quidem percoquere nullam amplius oportebit: minus enim ea subducit, magis nutrit: cruda uero minus nutrit, magis subducit. At si plenius superuacua descendant, ne sic quidem sistenda aluus, sed exhibendus pro aqua mulla pituitas cetero est. Si uero fluere pergant, clonidri sorbitione nutries. Si ex pulsus imbecillitate vires quoque: collapsas didicerimus, panem extuino diluto exhibere conueniet. utique si nec uenter, nec iecur inflammatione laboret: quando si hac infestentur iam e corpore crudis succis refero, nulla plane medicina periculo subtrahit. Atqui si quandoque erasi abunde linmores deprehendantur, oxymeli pro mulla continue exhibebitur. Ergo siestas sit, & eger frigidæ potioni affuetus, frigidum huic oxymeli dabis: sin hyems sit, calidum omnibus. Sane balneū his est adnerisissimum, tum aer ambiens vel nimium calidus vel frigidus. Porro ijs quos syncope iam premit, si partes modo commemoratæ inflammatione uacent, panis exhibebitur modicus, isque ex nino quod celerem in corpus digestionem adiuvet, statimque ad frictionem ueniundum est, quæ pro tradito quoque iam modo administrabitur: verum quibus ex flaua bili, quæ os uentriculi infestet, syncope inedit ijs frigida offerenda potio est, uinum tamen tenue, rubens & netus.

De his qui ob præsentes humores syncope opprimuntur.
Cap. XXIII.

Qui tenuium humorum uicio syncope premuntur, diuersam à supradictis curandi rationem desiderant, ut quos dignoscendi notæ illis contrariæ testentur. Nutrire hos oportet paulatim & continue. porro ad exitum spectare existimandi sunt, si uel iecur ipsorum, uel uentriculum inflammatio obfedit, uiribus iam languentibus. In eiusmodi affectibus emortua illa species in facie celeriter apparet. Sane nutrire quicquid horum inciderit, est necesse: sicut etiam corporis summa densare, non secus quam prius rarefacere, & frigidum ipsi aerem accersire. Vngendi sunt præterea astrictionis unguentis, tum cibi ijs dandi, qui non admodum prompte dissuant, non aqua mulla, non pituitas eremor, sed panis & sorbitio ex chondro, & fugaces fructus austeri, qui non facile corrumpantur, tum ipsi per se, tum uero & cum pane. Vinū ijs aquosum necessariū inter initia est, sumptū post cibū.

De reliquis occasionibus quibus syncope succedunt.
Cap. XXIII.

Reliquis occasionibus, quæ synopas concitant, quæque sunt numero: dolor uehementis, ui-

gilis, immodica uentris inanitio, ac in ijs qui aliena loquuntur, aliquaodo motus. Sed & quintæ, si placet, addas, nempe principiorū intemperiem. Celerissime igitur eor affectum in perniciem præcipitatur, mox cerebrum, deinde breui iecur.

De dolore.

Cap. XXV.

Itaque dolor, qui stuporem inducit ex frigida oritur dispositione. Pulsatilis labor magnæ inflammationis comes est. Sin autem tanquam ab aculeo impacto, aut ueluti à cerebro forari putet, crassi intestini species doloris est: pulsatilis, circa membranas constituitur: pertundens uehementissimis non heterocranij solum, sed cephalis quoque accidit. Interim hic à parte primario affecta, cæu à radice subito in uicinas perferretur. Porro distendentes utrinque neruorum dolores sunt, cum & laborant, & ad utraque extrema tendunt: minime uero in latitudine porrecti neque ui dolores percipiunt, membrana uero, sub cuius porrecte tensus, stupescientesque dolores inducit, quæ inter carnem hærescit, tanquam dilaniantem cruciatum exciuit: multæ siquidem & inæqualiter in hærescunt, & ipsam carnem amplectuntur. Quæ uero membranz ossibus circūdantur, profundæ sunt, ipsorumque osium tanquam dolentium imaginem repræsentant. Quando igitur nulla extrinsecus doloris occasio fieri appareat, præcedens uictus ratio uenit inspicienda, fuerit oec præter consuetudinem otiosa, aut eibus hominibus sit largioribus, ijsque ex ualenti materia uel solita excretio sit retenta. Nam si his aliquid, uel omnia quoque appareant, doloris causa est repletio: ac quamcunque homo uacuari debet. Sic enim licetibi maxima cum securitate ijs uti tenedij, quæ fluxiones dolentibus particulis incumbentes repellant. Si igitur sanguinis sit copia, quod distendit, ueluti in inflammatione oriri solet, protinus si vires patiuntur, sanguis dimittendus est. Sed si æger sanguinis missione timeat, uel imbecillis sit uiribus, tum auertendus in diuersum sanguis est, tum per magnam ueniam patienti particula propiinquā deriuanda. Vbi uero uiciolus humor duntaxat affligit, purgatus est. Si utaque coeant, ambabus utere uacuatioribus, sanguine prius emisso. Quod si his peractis dolor etiam remanet, coasat profecto in ægotante particula impactum esse quod afflicto. Patet uero non minus & curationem ipsam per digereotia medicamenta esse molendam. Pariratione & qui ex flatuoso spiritu dolores contrahuntur, curabimus: sed simul in his potius tum extenuantibus cibis tum potione, tum per sedē iniectionibus, tum cataplasmatibus auxiliantes, tum irrationibus atque fomentis ambiens ipsum corpus rarefacientes. Sin moles aliqua grauidando, contundendoque dolorem excitet, moli eadem

dem est medendum. Sin rodens humor est qui affligit, aduersissima huic sunt quæ extenuant & calefaciant. Anethum oleo incoctum, dolorem lenit, & somniferum est: & uiride sicco magis.

Si corpus tabe consumatur. Cap. XXVI.

QUum perueniret aliquid non ex esculentis poculentisq; , verum ex ipsius corporis substantia excernitur humore in alui ipsam confluentem qui quidem fluxu bili continue per uomitum, & infra erumpenti consimilis est, odoris autem sordiditate, tum quod deiectus fluuior & crassitie glutinosus, interim oleosus appareat, ab ipsa differt, tunc nimirum caro pinguis & recens coacta ab ardenti febre resoluitur, & eliquescit. Malo inueterante, nonnihil etiam ex ipsis solidis partibus absumitur. In hac perniciosissima febris frigida potio utilis est, quæ ex terra frigidissima petitur. Huiusmodi quoque esse conuenit cataplasmata, & epithemata, quæ refrigerant, ihoraci & præcordijs imposita. Item cibis refrigerantes recte offeruntur.

De uigilijs in febribus. Cap. XXVII.

AT uero eorum, qui immodicis torquentur uigilijs, crura & manus uincire, quo tempore somnum capere solent, iubemus & excitari, nonnunquam palpebras aperire, uel conuincere compellimus, donec abunde fatigentur. Inde subito uincula soluimus lucernamq; tollimus, & altam esse quietem inuigimus. si nihilo minus uigiliæ perpetuo uigent, ubi accessio remiserit, frons nigri papaueris caput decocto, illuitur, naribusq; offertur papaueris albi cortex torrefactus detrususq; , & mandragoræ radicis leuigatæ tantundem cum uino. Item rosacei malagmate facies illinitur, serpilliq; cum meli loto in passo decocto. Hoc etiam in accessionibus est utendum. uel tria papaueris capita excipientes pane cum rosaceo uel eiufmodi cerato illinimus. Cibus quodammodo sit plenior, exquisitiorq; . Adiciatur autem forbitionibus caput papaueris albi feminis cochleariæ trium instar, oleribus comiscetur papaueris nigri, si quid est folia fuerint uiridia, quantum tribus digitis potest comprehendi: sin minus, tria quatuorue papaueris capita sicca, simul incocta deligantur. Si ne sic quidem somnus accesserit, papaueris lachryma, aut succo mandragoræ circumlinentur. Iam elegit ex papaueris capitibus compositum, & præsertim ex decocto, menfura cochleari, uel unius, uel dimidij potum, somnum frequenter accersit. In quibus autem caput non est repletum, & uigiliæ insistant utere in declinationibus etiam tali suffitu, folij amomi, costi, arnabo, singulorum uncia, carpopalsami libra, styracis, amomi,

ammoniaci, bdellij scythici, mandragoræ radicis, lachrymæ papaueris, singulorum drachmis quatuor. Ex lignis cupressi accensis suffitio.

Curatio soporis nexij, quæ catapboræ Grecis dicitur. Cap. XXVIII.

FRONS posca, cui lactis aliquid sit adiectum, abstergitur, & summa ualide ligamentis excipiuntur. naribus admoventur quæ incisoriæ facultatem obtinent. In remissionibus etiam cucurbitulæ ualenter dorso, & spinæ defiguntur. Si morbus his non cedit remedijs, etiam quæ sternutamenta exciunt, obijciuntur. Ciborum materia sit quæ incidat diuidatq; , ueluti in præceptis de sanitate tuenda est comprehensum.

Curatio doloris capitis in febribus. Cap. XXIX.

SI capitis dolor in febribus affligit, post conuenientem febris uacuationem in accessionum declinationibus, caput inungi debet, primum communi oleo crudo, uel rosaceo, cui etiam aceti pauxillum sit admixtum: si æstas sit, & febris ardens, frigido: sin hyems neque febris ardens, calido, aut tepido. Incoquatur nonnunquam oleo & serpilli polygonijq; succus, per æstatem etiam papaueris capita, uel ipsum papauer: quemadmodum hyeme peucedani momentum. Quod si uero dolor in fronte perseueret, sinciputq; pilis careat, hoc quoq; oblinendum est neteri polenta & polygonio: uel pane similiter & rosæ, uel modica myrto, uel serpillo. Quosdam & pulegium applicatum magis leuauit. Nonnullis etiam cum ignis sensus incit, psyllium polenta temperatum profuit, uel ipsum per se in uiscum codione redactum, & continue mutatum. Item coriannum similiter cum polenta, & aloë cum aceto illinitur myrrhæq; , & ammoniacum pari modo, necnon crocomagma. Pulsatiles dolores tuia, menthaq; cum pane distat, rosaceo quoque superaddito. Atqui si dolor commemoratis auxilijs non eliditur, primum caput ad entem ad tendere oportet. deinde pinguioribus asperginibus totum ipsum foveri mox cucurbitulæ occipitio aglutinari, & summæ partes deligari debent, permulceriq; . Iam uero iudines recte affiguntur. Cæterum si defluxio quædam à capite, uel grauedo oborta capitis dolore suscitauerit, ijs utendum est auxilijs, quæ aduersus hæc suo loco perscrubentur. Sin autem à stomachi regionibus uapores sursum tendentes caput offenderint, etiam horum ratio habenda est, ueluti præceptum à nobis est.

Quomodo stomachi curâ habere conueniat. Cap. XXX.

SI stomachus imbecillius fuerit, corroborantibus oblinetur, quod genus palmulæ sunt, uinum, farinæ, crocus, masticæ, & aloë. asperguntque

que debet medicamentis ex absinthio, melino, masticino, nardo, & uino confectis. At si ardorem experiat, miscendum aliquod ex refrigerantibus, puta cucurbitæ succus, lactuca, portulacæ, solani, fereos, & vix immaturæ. Sin autem inflammation quædam in uisceribus appareat, etiam relaxantia quædam adiungenda sunt: aspersioni bus, oleum chamæmelinum, cyprinum, adipis gallinæ, aut anseris, bdellium, uel ammoniacum, & similia: cataplasmatibus autem apij semen, fœnugræcum, althææ, chamæmelorum flos & ut uno uerbo expediam, compositam habeant facultatem, tum relaxantem subcilium partium amaræque, tam astringentem.

De immodico frigore in febribus & rigore. Cap. XXXI

Rigori, qui crissatione obuenit, remedia occurrere non oportet: nec uehementiam eius dissoluere. Quod ex sudore frigus prouenit, prompte remittitur, ac nihil adfert molestiæ. In solo autem rigore, aut algore, ex frigidissima copiosaque potissimum pituita nato, primū quidē artus plurimis in locis constringendi sunt, mox oleo delinendi chamæmelino aut cyprino, aut trino. Sin autem maiore auxilio tibi opus sit, etiam piper oleo admisceris, uel cachry, uel adar cen, uel castoreum molliterque totum corpus in fricabis. Porro ne facile oleosum istud præsidium defluat, haud fuerit absurdum & ceræ momentum colligefacere. At si per hæc rigor non possit excalferi, ualentioribus quoque ex his factis acopis necnon dropacibus & sinapismis uti consilium est, aliaque fomenta rite admolari. Item æcriora ex ijs quæ admoventur naribus, commo de faciori, calaminthe, pulegium & hyssopum. Potui dabitur ante accessiōem mulsæ. in qua piper, & ruta sit incocta. ad hæc liquoris cyrenaici cocto melleformati instar mihi duabus horis ante accessiōem præstabis. Similiter & liquoris sylphij. Ad hæc quod in quartanis ex liquo re cyrenaico componitur, multis fuit auxilio. Iam uero in oleum largius, quod incaluerit nonnulli descendentes, rigores pertinacissimos absterse runt, ut Archigenea memoriæ prodidit. Galenus autem ante accessiōem, cutem abortano infricā dum præcipit, uel calamintha arida, uel cunilę tū folijs tum floribus, uel costo, uel pyrethro, utro que horum cum oleo, unde fieri, ut uel nequaquā, uel certe minus rigeant.

De sudoribus. Cap. XXXII.

Sudores, quibus morbus soluitur, excipere oportet, quandiu satis uaciatum fuerit, adiutaresq; futuri medicis, & quiete. quamobrem non abstergendus est: nam alius quoque alimē elicit, & calido elythere in aluum dato, & sorbi-

tione, & somno. At sudores in remissionibus morborum erumpentes, simile ijs qui morbum finiunt, æquales appellant, ad ministerium capiunt. Itaque præidia quibus sudores euocantur, libro superiore capite quadragesimo octauo abunde sunt comprehensa. Cum enim sudores largius eruperint, abstergendum, leuandoq; opera menta refrigerare cōuenit. Etenim lassam supra modum exidentem, ut in syncope frequenter ægros perduxerint. Leui ueste madidaq; debent esse cōtecti, fenestris patentibus, ut perfrigus aeris frigidior accedat. his somnus adiungatur, & euentilatio. Insuper myrtus nigra in pollinem coacta, corpori inspergatur. Similiter galla, picca cortex, electum & polenta cum uino astringente, particulis sudores recipientibus imponantur, factaq; posca per spongiam aspergatur. Archigeneas etiam calcem non restinctam, & flocces uini combustas, tum in his, tum in rigore, quem mollia euincit calor, assumit. Ambu liquidē, inquir, per totum calidos sicce scūt. Media uero corporis loca delinenda succo arneglossæ, uel coriani, uel portulacæ, uel brasicæ præcipit, ut cōstricta, sudores repriment. Idem præstat reprimendo creta cimolia aqua dissoluta, dorso per somnum, & thoraci subiecta. Totum uero corpus rosoreo perungitur, uel melino, uel myricæ, uel lentiscino, uel ceratis quæ ex his coniunt. Nam magis sunt his idoneæ reuociones, quæ laentes meatus obstruendo, humoris exitum prohibeant. Patet autem omnibus modis cibus quoque sicciō his conuenit, & uina mediocriter astringentia. Cæterum largiore potu, & præsertim humidiori, tum crebris iniectionibus abstineant. Si autem fieri potest, gestatione corpus agendum, in frigidiore ædificio, ut summæ his partes quā maxime refrigerant. Qui porro per elisum sudores fiunt, (hi autem uel ob dolores excitantur, uel conuulsionēs) & retentione, sicutq; extremorum, & refrigerio per panniculos laneos accerti to, leuiter curantur.

De tussis in febribus. Cap. XXXIII.

Tussis in febribus, præsertim cum rigore obuenientibus occurrere conuenit. Nam tussis intentione, febri quæ inclinabat erigitur recolligiturq; Aduersus hanc formulæ medicamenti ex mille eocto coactaq; hypoglotia uocant, offeruntur. Linguae autem supposita, unde nomen habent, elique scunt: & quod spirandi impedit facillitatem, discutiunt: tempus ipsarum est in accessiōum statu, & spatio quod paulum accessiōem præcedit. datur etiam hydromeli discotum. Quibus autem de neruo genere metus non est, temporis processu exhibebis cum fidutia & oxymeli. In minus, hyssopi decoctum, quod etiam rigentibus auxiliatur. Item castoreū cum

eum febris ardens non est, neruoso quoque generi commissetur. Adhuc eclegma ex picæ fructu, nucis pinis, iride, semine lini, amygdalis amaris, & urticae semine plurima uero ex parte cibis quoque hæc simul adiunguntur. Ac resina quoque & terebinthina in ouo exhibetur. Extrinsecus autem thoraci, & locis arteriarum uicinis, lana sulfure infecta imponatur, ac pingue, oleum uic rutaceum esto, uel irinum, uel anethum. Præterea deligatura ualida in locum exacte porrecta, tussim cohibet: dico autem per medias partes extremasque. Non ratione caret, & apoplegmatismis tussis gratia uti, utroque herbarum pituitarum genere, & sylvæstri, & satiuo comanducato. uel cum mastiche summa debent infricari, contrahantur, & ligaturis intercipi. deinde rursus soluta est retractio. At si propter febris acrimoniam tussis concitatur, utendum est gargarizationibus ex aqua tepida, necnon frigida subinde profuit, & ex posca, & palmularum decocto, uel rosarum, uel dulcis radicula. Visceribus autem, uel etiam cordi ipsi iniiciuntur quæ modice refrigerant.

De sternutamento. Cap. XXXIIII.

Sternutamenta dum febribus incidunt, subinde molestant. Etenim caput replent, & uirtutem arguunt. Nonnullis sanguinem quoque eliciunt, & alia huiusmodi inferunt incommoda. Quare aduersus ipso remedijs pugnandum est. Cohibet itaque sternutamentum inuadens, nasi perfricatio, frontis & oculorum apertio, studiosa palati frictio, ructus, illum intentio, capitis in altum eleuatio, inclinatioque ad latus, summorum musculorum contractio, maxillæ musculorum perunctio, calentia olei in aures infusio, ligamentum calidum mento impositum. Caueri debet repentina ex somno excitatio, fumus, poluis, acrior odoratus piperis, castorei, sinapis, mentæ, suauissimas malorum, & farinæ odor. obtundunt enim sternutamenti elisum, & spongiz ex mari inanes. Vbi uero cupiditas ster nutandi oborta fuerit: non autem sternutamentum erumpat, labij quies idonea est. tum acriorum odorum experientia, & animi remissio.

De cibi fastidio. Cap. XXXV.

Quibus uiciosis humoribus fastidium procreant, ij cibis & poculentis sollicitandi sunt, qui huiusmodi succos uel per uongitiones, uel per alium excernere solent, uel contemperat, meliores reddent, quorum materiam libro superiore, qui totius operis primus est, comprehendimus. At si ob uirtutis imbecillitatem, cibum respuant, quoniam omnis facultas ex particula intertemperie infirmatur: conuenit intertemperamenti speciem, contrarijs medicari. Plura de fa-

stidio, in stomachi uitij, libro tertio pertractabimus. In febricitantibus autem, statim per initia cibi cupiditas, ijs quæ odorem mouent, recuperanda est. Potissimum uero polenta in aquam mersa, uel poscam, uel dilutam uini potionem, uel cuiusdam odorati, & fructuum fugatiui qui astringant decoctum, item perunctione blanda, & moderata totius corporis frictione, eliditur cibi fastidium, ac contractatione tum frontis collutione, aquæ sorbitione modicæ. Cæterum stomachus digito immisso turbatus, ad cibum assumendum quodammodo sollicitatur, idque potissimum bilioso quodam humore, aut acido sursum educto. Secundum primos dies, cataplasmatibus quoque à foris stomachus ad cibum cõuer titur, ex palmulis, malis, cænauthæ, absinthio, & aloë confectis. Cibi autem præparentur plures simplicesque: & frumentiaci. Insuper alterius generis uarietatem quandam sortiti, qui tamen non ab ipsa abhorrent, qui in febribus dantur, in quibus & fructus fugaces conueniunt, qui non ex facili accedunt, neque nimium dulces sunt, sed maturi, neque ad facietatem exhibendi, uerum quantum ad aliorum ciborum cupiditatem excitandam sufficit. Præterea autem sint reficiendis familiarissimi, qui tamen corripere ægro, tum adhortari queant. Porro febribus solutis, si inuicem recreatione perdetur fastidium, etiam silarum cum oxymelice coctum, lactuca, oliuæ halmades, capparis, salsamentum, bulbi & quæ quid ad bonitatem stomachi facit, accommodentur. Nec non & illud ipsum in memoriam reducat, quibus cibis per sanitatem maxime usus fuit. ietn ambulationes, gestationes, clamores, dropacismi, frictiones & exercitio adhibeantur. Præterea absinthij succi portio, uel aloës, aceti que seillæis instar mistri absorptum, in id uehementer efficax est.

De grandifame, quæ Græci bulimos dicunt. Cap. XXXVI.

Suero in grandem famem, quam bulimon appellant Græci (dico autem cum minus quam par est, cibos corpora sensuunt) fastidium inclinauerit, hæc reficiemus, tum alui, quæ naribus admoventur, sullisij, carnis assis, & hœdinis. In summa omnibus, quæ nidorosum odorem representant. Acrimonia sanè febrium lenita, & extremæ partes deligari ipsique excitari debent, maxillas pungendo & crines, uel auriculas uellendo. refectis, panis ex diluta uini potione, uel aliud quippiam distribui facile exhibetur.

De canino appetitu. Cap. XXXVII.

Et si hoc symptoma febribus non adeo superueniat, sed nonnunquam secundum ipsas,

H præfer-

præsertim gratia cognationis, quam cum fastidio contraxit, nil tamen fuerit mali, etiam de immodico appetitu, quò ambo naturæ modum excedant, sermonem instituire. Quoniam igitur à pituita potissimè acida constituitur affectus, iis utendum est, quæ hanc incidant repurgantq; . Talia autem sunt maxime, dulcia, falsa, & alioquin abstergentia calida. Vinum igitur ipsis rectè datur copiosum, ex eorum numero quæ impense calefaciunt, cuiusmodi habentur colore uermicula, aut rubra, astrictionis expertia. Verum dulciora potius propinantur, uel non sitientibus. At cum optime habuerint, primum ipsis pinguis, mox alia omnia ex oleo largiore præparata, quibus nihil austerum, aut astringens sit adiectum, offeruntur. Hæc etenim, licet à uersus ipsam eausam manifeste non pugnent, at tamen impotentè ad cibos animi impetum dissolunt. Horum autem penuria consistentiam pituitæ stomacho inhaerentis absunt, minuitq; . Iam salsamenta ipsis commode exhibentur, ab his uina commemorata liberaliter assumpta prosunt, quod ubi longiori tēpore fecerint, caninus appetitus finitur.

De siti. Cap. XXXVIII.

Sitim admodum longam fieri existimabis ex siccitate, aut caliditate, particularum per quas humor ex ore in uentriculum deferitur. & siccitatis quidem remedium est somnus, caliditatis autem nigilix. Nonnulli uero sitibondi ex uino ciborumq; caliditate fiunt, quibus medetur frigida potio. Prauas autem qualitates desiderant, quemadmodum & cibos, præpollenti humorum nitio respondentes. Ceterum siti pressio inextinguibili, unde etiam mortem oppetierunt, noui qui uiperas dispandas aliquando uorassent. Item qui uino veteri sese inebriassent, item nauigantes, qui ob aquæ potabilis defectum, matinam bibere ausi, interiierunt. Verum sitim in febribus placare solet, fons capitis ex oleo frigidissimo, uel rosaceo, uniuersum superaccommo datus. Optime facit ad sitim nigra lactucæ semen commandatum, item glycyrriza appellata, adhæc cucumeris semen in ore retentum. Datur etiam ad sitim hoc catapodium. cucumeris domestici drachmæ octo, tragacanthi drachmæ quatuor: tragacanthum soluitur ouorum crudorum retentum albumine. & cum fuerit dissolutum cōtritumq; , cucumeris semini prius leuigato adiungitur. Postq; emolieris, pilulæ formantur, in unbraq; siccantur, ex his una sub lingua tenenda exhibetur: humor paulatim salina solutus deglutitur. Iam dilutum malorum cydoniorum, uel pirorum, uel mespilorum, uel panpinorum uitis, uel mali granati succus sorbitioni datur.

De lingua scabritie. Cap. XXXIX.

Humectanda est lingua scabrities, lini seminis decoctio ægris in os dato melius autem facit myxa cum lini semine incocta, ac digito in hunc succum demerso lingua infricata, aqua puriore abluatur. nel sponsa abstergitur. deinde rosaceo illinitur, iam ipsum rosaceo melle temperatum, in id ualde efficax est, & portulacæ succus in ore retentus. Item rhuoboniorum mulsæ admistum bene facit. insuper Damascena, & myscion (hoc autem est myxa) ore retenta & lingua, circundata. His adde etiam lactucæ cauliculus. Archigenes autem tradit etiã salem indicum, colore quidem & substantia communi similem, gustu autem mellitum, lenticulæ instar, uel plurimum ad fabæ magnitudinem deuoratum, uehementer posse humectare. Ceterum in latus decumbere prodest, nam supinus cubitus exiccat: item os connuere. hiatus enim madorem absunt. Steruamēta porro accersita, lingua quouis alio plenius humectant.

De nausea. Cap. XL.

Cum sine cibo assumpto nauseabundus exger efficitur, cuius licet, arbitror ratiocinari prauos humores nentriculum obidere. Nonnulli uero turbantur, sed nihil euomūt, humore ipsis tunicis imbutis. Pituitosos itaque succos concoquere oportet, seruando ægrum in quiete, inedia, & somno. tenuiores uomitus ejicit, qui nonnunquam ex tristitia tremore, uel mulsæ excitatur. glutinosi humores & crassi, attenuantia desiderant; quod genus est oxymel, & similia. Humiditate autem praua tunicis impacta, picra ex aloe utilis est. uerum quæ astringunt, haud mediocrem noxam conciliant, quemadmodum rursus, cum humiditas multa citra malitiam inest; astringentia quidem q̃ utilissima sunt: medicamentum uero ex aloe in marcem perducit. Cum uero frigiditas humori adest, astringentibus misceri etiam debent calefacientia. Nota est frigida affectus, quod neque sitim, neque ardorem eo dectenti experiantur.

De bilis uomitione. Cap. XLI.

Bilem uomentibus cataplasma applicandum est ex palmulis, malicorio, galla uino incoctis, uel posca, pane simul contrito: Item acacia, hypocistis, balsustium, & rhu cataplasma ti adiungantur. Præter hæc cucurbitula admota magnifice auxiliatur, cum largiore flamma cibum uero frequenter paulatim dabimus. In his autem qui atram bilem uomunt, & inflationes stomachi experiantur, sponsia aceto quàm arer

rino calente madidas imponito, vel hedera folia uino incocta illinito.

De singultibus. Cap. XLII.

Singultus oritur uel ex repletione, uel inanitione, uel succis acrioribus stomachum erodentibus, quibus per uomitionē redditus, cessat. Periq; uero medicamentum diatiron pepperon assumens, si statim uinū superbiberint, singultuunt. Quod aut nonnulli et cibo intus corrupto singultu infestentur, cuiuslibet notū est, iā non pauci rigore correpti singultuunt. Vomitus itaq; ijs qui ex repletione, aut rosione stomachi singultu cruciantur, mederi abunde comperimus: calida uero, ijs qui ob perfictionem. At quum ab humorum repletione, singultus originem habuerit, uiolētia indiget euacuatione, quā sternutamentū praestat, ob inanitionē creati singultus, sternutamentū nō finiuntur; datur aut singultuētibus ruta cum nino, uel nitrum in mulla, uel fesele, uel ducū, uel cymintū, uel gingerber, uel calamintha, uel pardus gallica. Hæc sanē singultus ex ciborū corruptione, aut frigore, aut repletionē contracti, auxilia sunt. qui autem ex frigidorum uiscosorumq; humorum copia singultū experiuntur, ea storeum tribus obolis potui fument ex posca, idē auti impostum unā cū oleo ueteri sieyonio adiunat. Insuper acetum scillites, uel oxymeli potum conuenit. denique spiritus retentio, praesens est remedium.

De alui in febribus astricta, & citia. Cap. XLIII.

Quæ arcescentem aluum protrahunt, libro priore quantum res exegerit comprehendimus, quoq; iam uerbis eadem quoque liquida febribus incidit, in praesentiarum mentionem ipsius facere oportet. Multi enim non febris ratione, sed ob hoc solum accidens in perniciem praecipitari sunt. Principio igitur excipiemus quæ agerantur, nullū remediū occurrentes à corruptione & cruditate emanantibus. Sin autem euacuatio modum excedat, solubenda aluus est, & si quidem acriora effectum boni facere esse, & alioquin crassioris conuenit, quæ assumuntur. huiusmodi existunt ex chondro, & pilula sorbitiones. balnea his postq; morbus ematuruerit sunt idonea. Cum uero pituitosiora & fluida erumpunt, contra siccores calidioresq; cibi erum, quos minus febres permittant. Huius generis habentur, quæ ex penicillio & elefacientibus consistunt: Balnea hi prohibendi si nihil aliud compulerit. Porro ubi coactiora facules infirmatur, astringentibus tunc cibis, tum remedijs utendum est. cibis sanē in quibus maximè mabum granatum, aut poma, aut pira, aut melleilla sunt iniecta, uel etiam bisulphia, & uino tenui udo rato astringente remē-

dijis autem, cataplasmatibus, nimirum ex polenta, palmulis, abinthio, rosas, myrtis, & consimili materia. Ceterum considerandum uenit, quibus potissimum particulis cataplasmata debeant imponi, dico autem stomacho, aut imo uentri: non nunquam & circa lumbos applicamus. Cruentitas autem excretionis reprimunt ex thure confecta, desiccantq; uel pollem polentæ, uel farina, uel thus, uel manna uino macerata, uel posca. Porro acriorem humiditatem etiam iniectione per aluum, edulcare competit, nunc ipsa aqua, nunc pitæaz cremore, uel chondri, uel oryza, uel tragi, idq; non semel, uerum sæpius. Postea uero adiunguntur etiam rosæ sicæ, uel myrti, nonnunquam & galli, & ouum simul cum rosaceo uino quæ tenui astringenti, uel rosarum decoctio inditum: uel sedi quoque appositum excernendo cupiditatis retundit. Cum frequētia desidendi est appetitus, agatium sedi accommodatum ex calidis spissamentis immitatur.

De sanguinis distillatione, & eiusdem ex naribus profusio. Cap. XLIIII.

Quoniam distillatio totius corporis, aut capitis redundantiam inui, per extusio-nem, uel densitatem eueniens: largiatur autem excretio habilis est laxare & minuere copiam: ratioq; est inde ipsam moliri, unde natura proclinauerit. his ego consideratis ausus sum in quartanarum distillationibus scalpello, ut mos est, narium uasa conuulterare, oportet autem non erigno fluore contentum esse, sed pro uiribus detrachere. Spontanea in febribus per nares sanguinis profusio, si n crisi hant, excipere conuenit. Sin autem sanguis immodice erumpat, sistere conandum est. Primum itaq; extremæ partes ualide deligabuntur, æger sublimi capite figuratur. Videtur etiam præputij deligatura sanguinis peculiariter ex naribus profusioa cohibere. æger non expurget narium foramina, neq; irriter, uerum sanguinem coactescere sinat. nassus spongia, quæ in posca maduerit refrigerat, ac obturamen ex linimento naribus profluentibus demittatur, medicamentum quodam ex eis quæ sanguinem comprimunt, inuncto: horum materiam, & reliquam locorum affectorum curationem libro subsequenti uerbosius persequemur.

De anima deficiat. Cap. XLV.

Qui ex cholera, alui profusio, alijsq; multis, & uariis factis euacuationibus, resoluuntur, ijs aqua frigida aspergiatur, & nares comprehenduntur, or uentriculi infricatur nomis præcipitur, stomachus turbatur, uel digitis immittitur, uel pinis: præterea plurius uinculis ualide deligari debet. Cum per limas pat-

tículas uacuationes fiunt, manus: cum per superiores crura. Cæterum sanguinē fundēbus prospicienda est figura sine dolore sublimis, & cucurbitula defigetur, quæ particulas retrahat contrario uacuationem experiuntibus modo. Curat etiam unum aqua temperatum resolutiones ex subituis uacuationibus ortas nisi niserum inflammatiō, aut uehemens capitis dolor, aut attonitus aliquis affectus, aut febris ardens, in crudo morbo prohibeat in his siquidem magna unum adfert incommoda. Et si æstas fuerit, calidiq; temperamenti æger, ac frigida assueuerit, frigida exhibebitur, sin contraria euenierint, calida. At si ex sudoris copia animæ deficiunt, cutis dēfanda est, quomamodū à nobis prius est dictum. Tū ut frigidus aliquis perflatus accedat, prospiciendū est. Porro in uentriculum defluxionibus nihil horū cōuenit, præterquā ipsi uentriculo stomachoq; corroborantia admouere, & affectus in balneum ducere. Hoc siquidem illiusmodi fluoris est ac commodatis limū, uerum sanguinis profluuiū, & sudores uehementer proritat. Qui ob plenitudinem animo destituuntur, uino ciboq; abstinent. item balneis, si febricitent. Potio autē mulsa datur, in qua uel thymus, uel origanū, uel pulegiū, uel hyssopum sit incoctum. Propitiū uero ijs est & oxymel. At si propter humores uitiosos in stomacho cōtentos anima defecerit, iubēdi sunt uomere ab hydrele, o digitis, aut pinnis in os demissis. Sin autem uomere nequeant, oleum q̄ laudatissimum ipsis propinabitur, hoc enim & aluo ex inferioribus partibus iusum, subinde uacuat. Iam uero abstinthi ipsis auxiliatur. Porro si propter stomachi imbecillitatem diuoluatur, ijs uti expedit quæ firmando ipsi sunt: ueluti ante in capite de eodem comprehensum est, summaq; perfricare oportet. Existi in sole ad balneū ducitur, qui perfraxerunt, medicamen diatriæ pipereon,

iplumq; piper assumāt. Qui uero ob caliditatem largiorem, æstumū, aut lentā in balneo moram, animo deficiunt, curantur frigida aspersa, acri perspirato, stomachi frictione, uini cibiq; usu. Sin autem propter inflammationis magnitudinem, aut febris malignitatem in accessionibus animus deliquerit, perfrigeantq; artus, fricare balset iubeto, fouere & deligare. Ad hæc uigilias inedia q̄ precipito. Ea uerō & ante accessione facienda sunt. Quibus ob siccitatem anima deficiat, duas tribusq; horis ante accessionem, cibis offerretur, uel chondri cremor, uel panis ex aqua simul cum mali granati nucleis, aut pomis, aut pins. Si autem magni periculi metus sit, etiam unum dabitur. item ijs qui subito animam perdunt, his remedijs succurrendum est. ac ubiq; causam considerare conuenit, propter quam animæ defectus accidat, atq; contra hanc pugnandum est. Nō nunquam uero & symptomatis maior habenda est sollicitudo, nempe cum periculum, uel etiam mortem minatur.

Quomodo ulcus circa os sacrum promouens curetur.
Cap. XLVI.

ET hic affectus, febribus potissimum lentis, ex diuturno decubitu superuenit. Cum itaque sacri ossis regio inepit rubescere, circulum ex lana iusta magnitudinis, parti subijcimus, postea rosaceum, uel myrteum ceratum, quod argenti spumam, aut cerusam habeat, super accommodabimus. Inflammatione autē oborta, cataplasma ex pane uel solano, uel polygono, uel arnoglossio, uel tenera brasica applicatur. Si ulcus serpat, lēticula tū malicioia illinatur.

FINIS.

ALEXANDRI TRALLIANI LIBER DE FEBRIBUS.

IO. GVINTERIO ANDERNACO

Interprete.

De Febribus

Cap. I.



Vm postulaneris à me charissime Cosma, ut curationes, quas in diuersis morbis frequenter sum exptus tibi exponerem, non grauate obtineras, ut qui fatear iure me gratiam utrisque, & tibi, & patri tuo pro beniuolentiā, quam subinde mi-

hi benigne præstitiste, debere. Hic enim proptinus ab initio non in arduo modo operibus, sed etiam in uniuersis uite negotijs commodus mihi fuit administrari tu uero cum apud Barbaros, ne utiquam me propter casus euentusq; rerum quos nos urserunt negligendum censuisti. Quare etiam senex in posterū uobis morē gero, & cum nō amplius

plus labore ferre possim, libris hinc describendū, & experimentis, quæ longo vsu, atq; exercitatione in hominū morbis à me sunt comperta, in cōmentariis redigenda p̄uavi. Obiectabit autem non paucissimos, qui hæc citra inuidiam inspicere viderint, accurata ista docendi ratio, breuitatq; simul & perspicuitas dictionis. Scdus enim quod tū licuit, uerbus uti communibus, magisq; perspicuis, ut etiā vulgaribus liber esset dictione ipsa facili & explicatus. Esordium itaque de Diariz febribus sumemus, diuinissimi Galeni doctrinam pro uiribus hic quoque imitantes.

Quod sane Febres essentia, substantiaq; & natura nihil aliud sūt, q̄ tum cordis tum arteriarū caliditate naturali contrariis, à prestantisimīs medicorum, Galeno potissimum, & Hippocrati est demonstratum. Quare huc Erasistrati opinione ad ducere, Aesclepiadique, & aliorum medicorum chorū, superuacaneū existimauimus. Quod autem rationi consentit, febriū à corde potius quam ab alia corporis nostri particula proficisci, multis licet argumētis colligere. Si quidē febris natui caloris est mutatio, natuius autē calor in corde existit, cōstat etiam febriū in corde sedē habere. At quoniam febris est nō solus absolute calor naturali contrarius, sed in materia quadā subsistit, materia uero triplex genere in nobis habetur, manifestū est, q̄ febris quoque in tribus cōsistere matrijs cognoscitur, in spiritibus nempe, humoribus & solidis particulis. Stigiter spiritus immutatus fuerit, febriū parit ex illo proueniētē, quā Greci Ephemerā, nos Diariz appellamus: in autem humoribus, eā quæ putredini fertur accepta: si uero particule solide, Hæticā efficiunt. Dicamus itaque de vnaquaq; quid sit, & quomodo species eius dignosci optimeque possit curari. Exponemus autem primum Diariz, utpote omnium simplicissimam, quæ q̄ simul uniuersis magna ex parte hominibus superuenire consueuerit.

Diariz nota.

Febres Diariz eum ex spiritibus habent originem, nihil stabile, neque firmum continent, sed uti celeriter generantur, ita etiam soluantur. unde & Diariz uocare sunt, ad unum usq; diem, aut paulo diutius interdum durantes. Notari uero ipsæ hoc pacto debent, ex tactu, urinis, & præterea etiam pulsibus. Ex tactu enim caloris copia nobis innotescit, cum is sola quantitate increuerit, ut spectare licet etiam calorem, qui in balneo excitatur. Ex urinis autem quoniam his per initia morbi manifestas concoctionis notas representant, quod in nulla aliarum febriū inesse solet. Ac pulsus harum celerem arteriæ & eleuaram diastolē tardiorē uero systolē obtinent. Nam refrigerium magis quam recrementorum expurgationem requirunt. Nam eiufmodi febres statim quoque habent xquabiliorem, & declinationem, quæ

in purum intervallum, perfectamque integritatem desinat. Habentur autem aliz quoque nomī febriū, quæ ob spiritus constituuntur, uerum hæc quoq; abunde speciem febris declarare uobis, & alijs à febribus possunt fecernere.

Diariz curatio.

Diariz febres cum communem habeant generationem quantum ad ipsas attinet, communem quoque curationem recipiunt. At quoniam non una earum causa, sed plures, & uariæ esse solent, de his dicendum arbitror. Etenim lassitudo, frigus, repletio, inedia, uigilia, ciborum in uentre corruptio, ulcera & omnes (ut ita dicam) antecedentes causæ, hæc eo febres produciunt. Quandoquidem igitur non una febris Diariz efficiens causa existit, sed plures, conueniē etiam, ut nos non paucas quasdam curationes, sed cum plures unicuique speciei conuenientes exponamus,

De his qui ex lassitudine febriunt.

Qui ob lassitudinem febriunt, plerumque medicos non expectant, sed statim ubi febriū declinasse senserint, ad balneum proficiscuntur, tanquam à natura quadam edocti optimū præcipuumq; remedium esse designatis lauari. Hoc autē pleriq; etiam medicorum inconsiderate faciunt: & nulla ratione habita ad lauacra transiunt, unde interim non paucos insigniter offendant. Si namque corpus recrementis uacuum, neque plethoricum, aut uitiosis obnoxium succis inuentum fuerit, maxime iuuantur, nec alterius indigent curationis. Quibus autem corpus omnibus ex quo succis scatur, plethoricum appellatur, & uitiosis infestatur, quod cacochymum dicitur, putrediniq; est opportunum, ut hinc non modo spiritus, sed humores quoque antea incaluerint, uice uersa plurimum offendantur, & in febres putridas prompte incidunt, præsertim si uictu uili sunt minus curioso. Ne igitur idem nobis quod illis accidat, primum notas earum perscipo oportet. Nōnullæ igitur earū sunt exquisitæ, nonnullæ uero nō exquisitæ, cū sint, in putridas probabuntur. Ita nanque & lauare, & nutrire probe & non lauare rarius bona ratione poterimus.

Curatio eorum qui ex lassitudine febriunt.

Quoniam ex lassitudine febriunt, diligenter plane humectandi sunt, & refrigerandi, sed cōmode balneis temperatis, uictu, & unctionibus, quæ nullam discutiendi uim obtinent. Nam in his omnia facere oportet, quæ humiditatē potius augere, quā ex corpore auferre possūt. Quare neq; corpus multū perfricare, neq; tepida ex solo oleo unctione, sed ex hydreleo magis uti oportet. Quippe id liberalius, quā ipsum oleū p se humectat, & pe-

nictus in corpus ab aqua transmittitur refrigerat
que articulos exalfectos & feridos ex nimio la
bore affectos. Quo circa neq; vngere in aere cali
do neque perficere conuenit, sudoribus enim
manantibus ne humectare quidem prorsus un
ctio poterit, ut quæ cum eis à corpore decidat.
Prælati autem meo iudicio multa tepida sudore
chere & ægrotantē in exteriorem domum egres
sum strigilli abstergere atque ita hydrelæo perun
gere, deinde exiguo spacio interposito intrare ip
sum, & in calens aquæ solum descendere ita ut
neque integram omnino horam in aere perseue
ret, sed tantum transire videatur. Sic enim hume
ctabitur, & metus dū non erit, ne perustus incen
susque ab aere, aliā rursus febrem acquirat. Hæc
faciendi ratio omnibus ex lassitudine febrī
eitantibus conducit, præsertim ijs qui calidiore
sunt temperamento. Ignoro igitur, cur Diuini
simus Galenus oleo quidē tepido duntaxat vsus
fuerit, aquam vero ei miscere uitari licet: enini
& frigidam ei aquam, præterea etiam tepidam
admiscere. In summa, ut cuiusq; temperamentū
est, calorisque & siccitatis ex lassitudine ortæ ex
cessus, ita quoque unctio utendum erit. Quod
si vero iterum rursus lauare ægroa uolueris, eo
demque modo perungere, & in calida solum de
mittere, & in eo, aliquandiu immorari ualde qui
dem ipsos hac ratione iuuabis, ut reuersi à balneo
lassitudinis omninoq; intemperiei prorsus obliui
scantur. Atque hac ratione etiam in ijs utendum
erit, qui ex uigilijs febricitant, item qui ex mæ
stia, ut in illis quæ morbo se recolligunt. Re
stat nunc, ut de his sermone instituiamus, quibus
cruditas superueniens febri Diariam excitauit.

De his qui ex cruditate febricitant.

Cruditas ex caliditate, magis autem ex frigida
intemperie generatur. Notatur facile ex ructu
nidoroso quidem in his, quibus caliditas crudita
eemduxit, acido uero, quibus frigiditas illam
peperit. At non solum ructus, sed etiani alie om
nes noxæ attendendæ sunt ætas inquam, tempera
mentum, studia uitæ, & reliqua totius iustus ra
tio. Neq; enim si ructus est nidorosus, calidam
iam quoque cruditatem esse prorsus suspicabi
mur. Interdum enim ex ingestorum etiam quali
tate fuit excitata, uel cum ægri ipsi nidorolum,
aut melleū quid in cibo antea assumperit. Quin
nec acidus ructus omnino suspitionē nobis præ
bet, ut frigidam intemperiem dicamus, quippe
etiam acidus eibus, & acerbis frequenter efficitur,
ut ructus acidus appareret, interim uero calidi
tas quoque, nam acidus ructus nō solum ex frigi
ditate, sed calida etiam intemperie generatur, sic
rique non potest, ut eiusmodi cesset ructus, nisi
quis refrigerare & humectante uictu usus fuerit.
Conuenit igitur cruditati ex omnibus iam eom

memoratis internoscere, atq; ubi sic disertez fue
rini, firmam earum curationem aggredi.

De ciborum corruptione ex caliditate, & nidoroso ru
ctu proueniente.

Qui sane ex caliditate ciborum corruptionē
nidorosamque eruditatem sustinuerunt, eaq; de
causa in febri Diariam inciderunt, ijs non cale
facientes cibi, aut potus adhiberi debent. Et si
enim exiguo tempore mitigari, lenitq; uidebun
tur, statibus qui infestabant, dissipatis, postea
tamen occasionem præbent, ut febris Diaria ma
gis incendatur. Interim uero, ut etiam febris, quæ
ex humorum putredine oriri solet, rursus suble
quatur. Ne igitur hæc ueniant, congrua uictus ra
tio præscribi, & curatio quæ è contrario repu
gnet, adhibenda est. Quippe fieri nequit, ut affe
ctus qui infestat, ex toto conquelescat, & ueluti
radicatus excindatur, ubi causa quæ ipsum efficit
bat, prius non fuerit sublata. Quare si ubi cibis,
qui ad nidorosam eruditatem inclinauerit, sus
pendere adhuc in uentriculo uideatur, tūe potio
nī aqua calida potissimum est sumenda. Hæc nan
que partem humorum eluere, abstergere, & ad in
feriorem uentrem propellere, partem uero ut in
corpus etiam distribuatur, præparare, & præterea
spiritum iam siccum, insensumq; temperare, &
lenire, meatuque lauiore effluere potest. Haud
nouī, an quæ hoc præstantius remedium ijs qui
ex calida intemperie eruditatem laborant, eoq;
in Diariam febri inciderunt, excogetare possit.
Quod si uero cibi corrupti non in uentriculo hæ
re tibi uideantur, sed per alium egegi, rursus
hic non solum non impediri, sed etiam adiuuari
debet, quo ea quæ corrupta sunt, per uentrem
potius queant externi, sin autem immoderatus
per alium ferantur, rodantq; intestinum, etiam
hic ad balneum ægros ducere conuenit, & uen
tris iecorisque regionem potissimum uino meli
no perungere, & pane ex aqua calida nutrire. Por
ro misceatur in eam & apij & coniaridri radix, ue
rum apium nō multum in ea esternefcatur, sed pro
tinus, anteqm in calida ualde maceretur, aut ora
tur. Si uero caliditas, aut inflammatio quæpiam
uentriculum obfederit, neq; radix apij, sed conia
ridri tantū immitti debet: uel ossa panis calide ite
rum, aut terreo inuncta eū per se exhibentur. At
si uenier copiosius profluere, ut deinceps uires
debilitentur, etiam omphacomelei, aut hydrome
lum, aut hydrososatum dabitur. Sin autem nulla
inflammatio uentriculi os obfidere uideatur, uni
Cnidij, aut Sabini quod exiguum habeat a stri
ctionem, momentum propinari ipsi debet. Sin
uires nullam noxam experire fuerint, caue ne ui
num permittas, præcipue calidiore temperamen
to præditis. Si namq; nidorosa cruditas ex calore
acciderit, constat magis eam in calidioribus au
am

Etiam iri, si uino uti uoluerimus. Ac mirari mihi subit, quomodo diuissimus Galenus in opere de incedendis morbis calefactionibus remedijs usus appareat. Nam antidotum quoddam à triplici pipere Græci diatrion pepereon appellant, & illud quod ex malis cotoneis paratur, exhiberi ipsi permittit, extrinsecus autem rursus uentriculo purpuram nardino, ablinthio, & mastiche imbutam, applicare. Atque hæc calida imponere iubet, ne uentriculi robur dissoluatur. Ego uero ea neuiquam calidiorē affectu presais cōuenire arbitror. Atque hæc nequaquam dico contradicendi studio, sed quod ita mihi ueritas habere uideatur, quam semper cuius præponendam censet. Si enim nidorosus ructus, & cruditas à caliditate prouenerit, copueniebat, uti arbitror, contrarijs hanc remedijs moderate utentes, ita medicari. Sin autem à calidioribus pinguiusq; cibi orta fuerit, etiam sic uisus contrarius, qui modice refrigerare possit, iniungi debebat. In summa didicimus, omnia quæ naturam excesserint, contrarijs curari oportere, & ructuum oleum, & si quæ alia est calida iniectio, adhibere dissuadeo. atq; hoc canendum est, in quibus corruptio & febris ex calida intemperie sunt subsecutæ.

De his qui ex cruditate febriunt humore magis acido proueniente.

Hactenus de his, qui ob nidorosum ructum febricitarunt egimus, nunc autem dicamus etiam de illis, qui ex frigida intemperie in cruditatem inciderunt. Acida cruditas non adeo celriter febrem solet accendere. si uero etiam febrem excitare contigerit, perpende, & disquire, nam quando quæ etiam calida intemperies acidum ructuū procrearit, sit enim interdum, uria non solū ea frigore, sed etiam ex caliditate frequenter oboriatur. Idem siquidem in externis quoq; uidemus. Accidit enim in calidis pariter, & frigidis admodū domicilijs, ut uinū nonnunq; in acidum cōuertatur. Similiter uinū in fermentum quoq; idē spectare licet, hoc etenim in calidioribus retentum domicilijs, in acorem mutatur, idem uero experitur, ubi à gelido aere fuerit refrigeratum. Quare unum idemq; accidit à contrarijs causis generatur. Attendere igitur oportet signa, tum presentia, tum quæ præcesserunt, ut ex omnibus possis cognoscere, quæ tandem sit causa, calida ne, an frigida, atq; ita ad euacuationem uenire. Quare si acidus ructus ex aliditate prouenerit, refrigerantibus, & potu, & cibo uti conuenit, præcipue his, qui resistere possunt, & non facile corrumpi. Quapropter neq; eremore pitane, neq; halicæ ipsi exhibendū, facile enim corrumpuntur, & in stomacho supernantant, suspendunturq; unde etiam accidit, ut ipsis magis accessit. Itaq; pisces, qui dura carne sunt præditi, his expediunt, & gal-

linæ ex decocto, aut simplici iure paratæ, adhæc Isicia similiter dura, cuiusmodi sunt, quæ ex buccino, & glauco, orphoq; pisce possimum conficiuntur. Nec mireris quod hæc dicam, qui nam quæ ex calida intemperie acotes experientur, os etiam si pedem bubulum exhibeas, nō offendas; immo aduuiabis quoque. Ego sane noui quendā cui longo tempore acorem experiretur, his me cibis perianastit, præterea etiam ostrea non cocta, & duracina exhibui, omniq; alimento quod refrigeraret, ægre corrumperecur mutareturq; sum usus.

De aciditullu, qui ex frigida intemperie nascitur.

Quod si acidus ructus nō à calidiorē, sed frigidiore intemperie originem traxerit, tunc potius uiscosus calefaciens, & antidota conueniunt, cuiusmodi sunt tum quod ex malis cotoneis cōficiuntur, tum quod à triplici pipere Diatrion pepereon nominatur, adhæc fomentum ex nardino. Quæ igitur diuissimū Galenus in nidoroso ructu fieri præcepit, ea ego omnia ijs potius, qui ex frigida intemperie cruditatem sunt experti, conuenire, & non aliter habere posse arbitror.

De febribus diarijs, quæ ex obstructione generantur.

Febris Diaria ex uiscosis etiam crassiq; humoribus nascitur, dum nimirum excrementa propter meatus oclusos nō peripirant, fiuntq; aciora. Aduertere igitur animū hic, & internoscere oportet, sola ne copia, an crassities sola, & humorum lentor obstructionem effecerit. Si enim copia pepererit, ante omnia sane per sanguinis missionem vacuatio tentanda est, deinde sic particularibus utendum præsidijs, quæ laxare, discutere, vel extenuare possunt. Nam si vacuatione ommissa laxantibus quispiam, aut discutientibus uti uoluerit, malorum magnorum auiore sit, quippe obstructionem multo adhuc maiorem reddet, discutientibus ante concoctionem, aut euacuationem vsus remedijs. Quod si non copia, sed uiscosi crassiq; humores obstructionē procrearint, sanguis mutendus non est, sed decoctis potius quibusdam utendum, quæ extenuare possunt, ita ut non calefaciant, nec inspergere oportet, quæ uulgares medici temere audiunt, ut scerpillum, aut calaminthem, aut hyssopum, aut origanum, aut rutam, his adhibere, ignari quod multo magis offendant, quā iuuent ægros. Et si enim materiā attenuare nonnihil uideantur, alia tamen ratione offendunt, dum febres reddunt aciores. Quare illa potius querere conabimur, quæ abstergere & attenuare citra caliditatem nouimus. Hoc autem in numero habetur osymeli, quod & generose abstergit, & febres non exaciat. At qui nec hoc in omnibus uerum existit. In quibus enim occasio-

aem morbi crassa recrementa præbent, quæ & obstructionem excitantur, & febrem accenderint Diariam, à calore, aut siccitate crassitatem & lèto rem consecuta, quemadmodum id in rebus plus quo coctis, aut assatis nimium fieri cernimus, in his ozymeli exhibendum quoq; non est, neq; uero in quibus siccus est temperamentum, aut morborum quidam, aut lassitudines, aut ira, aut sollicitudo, aut negligæ præcesserunt. Essi enim talia non admodum calefaciant, tamen siccando materiam adhuc magis crassam faciunt, quam, ut arbitrantur, attenuent. Quæ enim à siccitate coacta fuerint, & crassiora quam prius euaserint, nunquam eiusmodi siccitas aliquod medicamentum attenuare potest. Ego liquidum in huiusmodi temperamentis subinde spectauimus, quod oxyveli eluipiam propinatum, pro eo quod urinas prouocare deberet, retentionem potius, & obstructionem materię pepererit, ut hinc etiam febres magis fuerint auctæ. Verum cum uulgare, isti causam ignorent, ad alia eam referunt. Quapropter illis tantum exhiberi debet oxyveli, in quibus cruda crassaq; & frigida recrementa hærent, ad hæc qui pituitoso & frigido sunt temperamento, in quibus etiam cruditates, repletiones, & ociosa potius uita præcesserint. In his namq; ipsis idoneum casit, & si quid uiscosum in hæret, & crassum, à frigidis cibis, aut potionibus collectum. Ex omnibus autè alijs quæ medici ipsi in balneo, ad extergendam cutem, ut saponem, mel, & aphoniurū præcipiunt, hæc magis attenuare, & meatus obstructos liberare possunt. Veruntamen in calidioribus temperamentis non solum ab oxy-melite, sed alijs quoq; decoctis, quæ siccare, aut calefacere possunt, abstinendum censeo. Victu autem utendum humido magis, & tēperato qui nihil siccum, & acre in se habeat. Quare pituitosa, & foris & intus est eis aquissima, ut quæ præterquam quod humectet, etiam absterforium non nihil, & attenuatorium obtineat. Admiscetur autem ei apometitis paululum, nam id quoque absterforium quippiam citra ullum calorem possidet. Iam pisces hæc cōueniunt, quippe alimentum inde proueniens, & probe concoquitur, & nequaquam meatibus in hæret, adhæc gallinarum cohortalium alæ, & lactucarum caules, intybi, & troxyma. Hæc igitur nictus ratione illi susteaudi sunt, in quibus recrementa terrestria magis, & crassiora quam fuerint, à calore facta censueris. Sin autem nihil tale fuerit, pituitosiora uero ea tibi appareant, quæ obstructionem excitant, tūc confidenti animo etiam decoctum apij, anisi, adianthi, & oxyveli non modo simplicius, sed etiam compositum propinato. Nā in frigidioribus tēperamentis, & in quibus materia pituitosa est, & humidior, in his id quod à diuinissimo Galeno dictum, necis sumum existit, nempe quod oxyvelum tum obstergit generat, tum febres non

exacuit, in naturis autem biliosis moribus, & magis melancholicis rarissime exhibendum. Porro quod in uinibus iam magis debilitatis nullus eo uti debeat, id quoq; ijs constare arbitror, qui Hippocratis scripta didicerunt, & experientia quoq; percreperunt, quod uim etiam radendi intestina obtineat. Multas siquidem notas, & incommoditates ea continet. Ac diligenter is, qui uelut aut oxyveli, aut herbarum decoctum, aut a lud quoddam infusurium curationis gratia exhibere, tum facultatem eius quod propinatur, tū quantitatem, tum qualitatem, tum ordinem, tum ne temere, & indistincte in omnibus utatur remedijs, diligenter cognoscere debet. Hoc enim ad præstansuam quemq; medicum pertinet, ut omnia perquirat, curioseq; examinet, & præidia considerare distincteq; admoueat.

De febribus ex putredine creatis.

Cap. II.

Q Vòd omnes febres continentes ex materia quæ eas incendit, intra uasa subsistente, & putrescente generantur, omnibus in confesso est. Atq; idcirco etiam continuationem habent, neq; rigorem mouent, qui in exterminacutem feratur, sensibilibq; particulas rodatur, ut in his quæ intermittunt, fieri solet, unde in consuetibus, si inquit, rigor superueniat, bonum est indicium. Atq; hoc in ardentibus, quas Causos graeci appellant, etiam uidere licet. Docuit autè nos id quoq; Diuinissimus Hippocrates, ubi ait, si qui ardente febri laborat, rigor superueniat, morbi solutio expectanda est. Porro sunt nonnulli, qui etiā febres intermittentes intra uasa consistere, quæadmodum & continentes arbitrentur, ac nihil prorsus loci, sed quantitatis & qualitatis ratione differre. Etenim in cōtinuis, & multam, & crassam esse materiam existimare cōuenit, atq; ideo neq; ex ea uasa emitti posse, intermittitium uero tenuiorem, & ut in cutimam cutem efferatur, magis idoneam. Porro huiusmodi etiam intermittibus accidit, & materia extra uasa putrescit, urina quoq; restantur. Quippe materiam ipsam, quæ iam dudum computruerit, representant. At quæ hinc sanè integra morbi tempora coniectura deprehendimus, quando sc. concoctionis initium morbus habet, quando incrementum, & statim. Alij uero non de loco solum in quo constituntur & generatione quam febres habent, dissentunt, sed etiam de materia ipsa, unde procreantur. Nonnulli etenim in uniuersum febres ex bile incendi dixerunt, eum febri res quæpiam calida sit, & sicca, talis autè bilis quoq; exilar ad generandos huiusmodi affectus accommodata. Alij uero iporum nō bilem, sed pituitam causantur, eo quod hæc rursus ad putrescendum obcurandumq; non parum est idonea, eum humida sit & crassa. Iam hoc quoq; nobis indicat ipsum pitui

re vocabulum, quod Phlegma Græce dicitur, à verbo Phlegm, quod est inflammaré. Nam Phlegma eo quod inflammet ipsum & calefaciat dictum est, atq; hoc sane palam est absurdum. Cæterum de humore melancholico nonnulli opinati sunt, nunquam ipsum febrem incidere, eo quod frigidus ipse sit natura, & siccus, nihilq; habeat humidum, aut calidum, unde putredines generentur. Nihil itaq; mirum est, quosdam putare melancholicum humorem neutiquam plane putredine recipere. Non desunt, qui in uniuersum febrem nunquam à putredine fieri pronunciant. Nam humores in uenis exardescere, non putrefieri dicunt. Si namq; hoc esset, inquit, cur tandem non etiam lumbrici, aus alie quædam bestie in uasis, si putrefactio est, igni cernuntur, quemadmodum in ventre & alijs particulis? Quinetiâ in exterius omnibus hoc spectare licet, quod quæ putrefcunt, uariarum rerum species generare solent, quarum nulla unquam per uenas externi uisa est. Dicendum igitur est putrefcere, & incendi, ut uidere id licet in pice & bitumine, aut arundinibus, aut chartis alijsq; multis fieri, quæ promptè ab igni afficiuntur, incendunturq;. Sic igitur nonnulli etiam scintillam modicam nacta, magnam & immensam flammam excitant, ut non solum uicina, sed etiam omnia longius sita combusserint. Tale quid etiam in nobis, inquit, accidit. Incipit enim spiritus inflammaré, atque exardescere, non enim iam computrefcere, ipsum quoq; dicendum est, quia nisi spiritus hunc etiam & refrigerantia, quæ ipsum contemperate & mitigare possint consequatur, etiam uicina depascitur. Atq; ex his ipsis ille nimirum primus est, qui ad hoc magis idoneus inueniri poterit. Non solum autem de putrescenda in uasis materia, ut opinor, dissentiunt, sed etiam de putrefactionis modo. Alij siquidem ipsam ex calido & humido, nimirum humiditate fieri dixerunt, ad vetera, & putrefacta ligna respicientes. Sic enim res habere uidentur, ac puto utrosque uera dicere, fieriq; nonnunquam etiam putredinem ex siccitate, magis autem adustione. Nonnulli uero medicorum nullam prorsus in uenis putredinem fieri, sed magis in uentre existimant. Eius autem rei fidem faciunt tum ex uermibus, quæ in eo generantur, tum excrementis subditijs, quæ & malum odorem, & ad putredinem nihilominus inclinationem repræsentant: indicant hoc quoq; uomitus, inquit, qui crebro tam perfecte febres exciderunt, ut æger non amplius malam accessione sit expertus. Jam alios rursus à febri liberatos ex una & sola sorbitione, uel iniectione compescisse, uerum non ex his modis, sed alijs quoque multis accurate uidere licet, quod ueter etiam febrium ex putredine ortarum causa existat, fors autem aliarum quoq; fons, & origo ipse proprie exiit.

Nota febris ex putredine.

In primis sane scire conuenit, febres quæ ex putredine oriuntur, non solum à præcedente causa, sed etiam ex Diariorum febrium degeneratione originem habere. Cognoscere autem febrium degenerationem ex tribus hisce notis potissimum, prima sane est quod febris Diarig quæ præcessit, non in purum desinat intervallo: secundaq; status non fiat ad tolerandum facilis: tertia quod status non desinat madore, aut subdore. Hæc sunt indicia manifestissima, quod febris Diaria in putridam transierit. At in qualem febrem speciem degeneratura sit, hac ratione, & coniectura colligere, & internoscere oportet. Si namq; pallidus æger fuerit uigilijs torqueatur, curis afficiatur, & attente floreat, scito bilem totam Tertianam excelsisse febrem. Sin autem albus, & uita ociosus existat Quotidianam esse putato, quemadmodum etiâ si plumbei coloris, quartanam. Atq; hæc sane notæ sunt febrium Diariorum, quæ in putridas degenerantur. Cæterum uero etiam generatim comitatur eas id, quod nulli aliarum febrium adest, ut rigor, aut horror, aut frigus superueniat, præcipue intermittebantur. Nam in continentibus nihil horum euenit, uerum etiam si contingat, aut horror, aut rigor, in Semiterianis tale incidit. Ad hæc inæqualis pulsuum motus, & caliditas has potissimum sequitur, & quod multas duplicaciones, quas Græci Anadiplofes uocant, præcipue efficiat, imiteturq; columbarum stercus, quod secundum putredinis successione, ignem accendit, ac rursus conquisit, tam rodens qualitas & ipsa maximum febrium ex putredine ortum indicium existit. Apparet etiam in Hæcicis quoq;, sed in alto magis deliuescit, ex putredine uero ortis febribus rodens qualitas per extremas partes maxime percipitur, in supermaxima & certissima nota est, etiam pulsuum systole elatio, & urinarum cruditas, nâ in Diarijs semper concoctæ apparent. Tantum etiam de febribus ex putredine internoscendis dictum sit.

De curatione febrium continentium.

Continentes febres solent diligentia curari debent, subitòq; id faciendum, quo internitio dictauerit, siue sanguinis missionem, siue purgationem requirat. Maximum enim incommodum est, cum in omnibus morbis, tum uero in continentibus dilatio. Nam febres uehementiores redduntur, dum putredo augebit, & uires imbecilliores fiunt, ut quæ febrium magnitudinem non amplius ferre possint, neq; præterea magnorum prædiorum aliquod ad curationem admittere queant.

Internotio.

Qui igitur sanguinis missione indigent, eos hoc

hoc pacto internoscere tibi licet, urinas habent rubras, turbatas, & putridas, multumq; acres, ocu-
los biliosos, & rubros, totum corpus graue, ue-
nas latiores, & earum torulos quam antea, tum-
idiores. Cæterum etiam causæ quæ præcesse-
runt, humorem redundantem tibi indicabunt,
præcipue uicūs ratio. Nā ægri calidioribus ma-
gna parte cibis, potibus, uino liberaliore & ma-
gis uetusto, carnibus pinguibus usi depræhendū
t. Multi uero ex inedia, aut ira in continentes
febres, quæ ob putredinem nascuntur, inciderūt,
alij ob sanguinis uenarum in ano extantium, hæ-
morrhoidas Græci appellant, retentionem, alij ue-
ro ob sanguinis copiam potius hæc habent indi-
cia, nonnulli ex bile superflua pallidi sunt magis,
& nigiores. Quando autem humores etiam plus
æquo adusti fuerint, tunc ipsis urina adhuc ma-
gis pallida, & subinde nigrior apparet, & deie-
ctiones similiter acres, & biliosæ. Hoc igitur mo-
do humores qui redundant qualesq; sunt, cognos-
cere oportet.

Curatio.

Itaq; febres ex putredine, & sanguinis abundan-
tia ortæ, nenæ sectione curari debent, non tam-
en minus etiam his, quia bile infestetur, san-
guinem detrahes, siquidem turgens, ad purgatio-
nem idoneus, crassior, & copia tibi peccare uidea-
tur. Nam perspiratu discutere materiam intus la-
titantem, & putrescentem conducit, quippe mi-
nor efficitur, nec permitrendum ut ea propter
copiam, & crassitiæ meatibus infarciatur, & pu-
treseat. Quod si nenæ sectionem non possis ob
uires ægri imbecilliores, aut quod is sanguinem
dimittere metueris, adhibere, tunc magis ad ui-
cūs rationem, quæ refrigerare possit, & hume-
ctare, nec non attenuare, & diffundere. adeo cla-
re calorem queat, respicere. Postquam uero hoc
feceris, & materia multo minor, & concoctionis
notas habere uideatur, tunc auidacter aquam fœ-
gidam exhibeto.

De frigida potu.

Atq; id facies potissimum, si æger aquam bi-
bere confueuerit, adhæc si nec inflammatio, aut
scierosus tumor, aut latus, quod œdema dici-
tur, particulam quandam possideat. Si enim ex
his aliquod apparuerit, aquæ potio uitanda est.

De inflammatione Erysipelacea.

Quod si inflammatio feruens, & Erysipela-
cea fuerit tunc frigida potum exhibere, ne tenta-
ueris. Prædicto autem id quod futurum sit, nē-
pe quod feruor febris extingueret quidem neces-
sario, ipsa uero tota non prorsus discutietur, sed
temperate aliquo procedente febris reliquæ ad-

huc superstites, tuto & particulatim dissoluen-
tur. Ego sane noni aquam me frigidam alicui de-
disse, qui Erysipelate infestaretur, ardentiq; &
continua febris laboraret, ac uehementiam febris
ex ea restinxit, eripuiq; periculis, dum fere ex in-
tempestiuis cataplasmatibus, & inunctionibus inte-
rissi, ut medici semper in omnibus solent adhi-
bere.

Nota inflammationis Erysipelacea.

Sciendum est eos, qui ardenti febris laborant
ob Erysipelacem inflammationem magis quam
alios sitire, uestimenta à corpore proijcere. Eui-
dentiùs autem hoc est indicium, quod etiam ter-
tio quoq; die accessionem ualidiorem experien-
tur, & recrementum per aluū biliosū, & sanici simi-
lia excernant. At qui in pulmone inflammatio-
nem Erysipelacem sentiunt, non adeo uehemen-
ter sitiunt, sed frequentem magnamq; respiratio-
nem ædunt, genas habent rubentes, linguam sca-
bram & delirant: frigidumq; aerem magis appe-
tunt, magisq; ab eo quam frigida potu iuuantur,
quam ipsi potius, qui in alia parte inflammationē
habent Erysipelacem, offerre conuenit, illis au-
tem, quorum pulmonem hæc exerceat, frigidum
aerem, ut à quo etiam iuuentur, ad spirandum
magis procurato.

De causa, hoc est, ardente febris, falsa. Cap. III.

SCire hoc quoq; oportet, duas esse Causas spe-
cies, unam lane veram, & exquisitam, quæ
omnia commemorata habeat, sitim uehemen-
tem, deiectiones biliosas, linguam scabram, &
nigrescentem: falsa autem, & ipsa quoq; sitim ad-
fert, sed non adeo uehementem, & intensam, ne-
que, linguæ nigrorem, neq; excrementum per
aluū excernit biliosum, sed magis corrupta,
neq; amaritudo in gustu ex pituitoso humore sal-
soq; potius superante percipitur, unde etiam pen-
culosa magis est, quam febris germana. Quæ pro-
pter causas reris exquisitas, cum à fluxu excitata
turbata, aquæ frigida potio magis conuenit, alia
quæ omnia, quæ refrigerare etiam extrinsecus fa-
cultate, & actu possunt. Quibus autem ex pitui-
ta origo est, his frigida potio caluberi non debet,
ac nulla quæ actu refrigerant, uerum illa potius,
quæ mitem calorem, tepidumq; sortita sunt, cuius-
modi existunt superflusiones etiam solæ, quæ ex
lini semine parantur, subinde uero etiam quæ ex
ordeacea fatina & quæ incocta, cui chamæmelū,
& melilotum adiecta fuerint, conficiuntur: Nam
lintei lanci iuri herbarum, quæ diximus decoctio-
rum, intincti magis conueniunt. At clarum est,
quod etiam oleum quoddam, cuiusmodi est cha-
mæmelinum, rosaceum, & omphacinum, deco-
cto recte accommodatum. Intellegendum autem
est huiusmodi fomenta non solum salis, sed etiam
germanis

germanis causis cōducere, falsitamen amplius. Quæ enim & facultate, & actū refringerant, ea germanis potius competere, cuiusmodi sunt etiā *Lexipyræta*, quæ ex rosaceo parantur, quibus adiectus quoque sit succus herbarum refrigerantium, coryledonis, oxalidis, lactucæ, atriplicis, portulacæ, plâtuginis, & altari-cōplurium. Cum igitur differentia ipsarum notaueris, & materiem, unde accenduntur, ita etiā intelligito, quatenus refrigerare, & quomodo id quod corrumpitur, expurgare debeat.

Ad stomachi ardore astutem.

Quibus stomachus ardore æstuat, probe facies aqua frigida cum rosaceo subacta, & extrinsecus imposita, aut sesamum aqua maceratum, deinde cum rosaceo diligenter læuigatum. Item ceratū rosaceum bene facit, cui admixtus sit portulacæ, & uux acerbæ succus per portione. Sin autem totum quoque corpus cerato inducto humectaueris, ualde commodabis.

Quomodo febres ex sanguineo humore prouenientes notari debeant.

Febres, quæ ex sanguinei humoris putredine accenduntur, inde cognoscas, quod mitis statim calor ad primum manus tactum percipitur, qui nihil abeat rodens, & aere, quale in febribus, quæ ex fluxa bile plus satis adusta excitantur, deprehenditur. Apparet etenim in febribus etiā ex pituita potescente creatis statim per initia calorem mitis, tum vaporosus. Sin autem quis manū diutius admoueat, paulo post rodens caliditas tibi occurrit, veluti per eolum quoddam, aut cribrum sursum emergens. Vbi igitur febres ex sanguine oriuntur internoueri, statim per initia, ut dictum est, uenam secato; eos autem qui ex bile febricitant purgato potius, si materia tibi ad excretionem procliuis uideatur, & febres quæ inuadit, uehemens non fuerit. Noui autem me etiā acuta laborantem febri purgasse, verum huiusmodi multa diligentem; notationē, & animaduersionem requirunt, & medicum, qui animo fueris confidenti. Abunde uero est, etiam sanguine duntaxat mittere, eo quod tutius efficaciusque sit remedium, & refrigerante ac humectante uictu, atque huiusmodi unctionibus in posterum uti.

De uictus ratione.

In omnibus sane pituitæ cremor idoneus existit, sed in germanis quidem, & perurētibus Causis, quæ sit uehementi cruciant, etiā refrigerantum cremorem concedere oportet, accerata similiter parare ex aqua frigida, rosaceo, & refrigerantibus, in falsis autem, nequaquam, uerum suffi-

ciunt omnia tepida, & temperata, & nullum ex ijs quæ uehementer refrigerare possunt, habentia, porro lactucæ caules refrigeratas, oua, similiter quæ intybum agrestem, & domesticum, & cucurbitas ijs qui perardenti febri laborant, omnia exhibere conducit. oxymeli uero his dari profusum non debet, nec multiplicia ac varij generis omni no decocta, ut quæ grauiter febricitantibus omnia sint inimica. Porro si multis ægrum uigilijs conficiari acciderit, tunc ei antidotum, quod à papaueris capitibus Dia codyon Græcis appellantur, offerendum est. Quippe ubi deuoratum fuerit, somnum inducit, & febrium uehementiam ardoremque obrundit. Quod si uero etiā falsis Causis ob uigilijs, aut mentis alienationē ægro molestiam, dare ipsum cogaris, cum mome to apomelitici ei admixto, exhibeto. Sic namque tuendum non est, ne medicamentum frigiditate materiam reddat crassiorē. Ac rhodomeli & hydrorofatum aque mistum, ac rofatum ipsum per se refrigeratum, ijs potissimum qui iccoris ardorem sentiebant, me exhibuisse noui.

De balneo.

Lauandi sunt, qui feruida & perardenti febri laborant, in domo potissimum, ubi solum habetur tepente aqua plenum, ut totum ægri corpus uideatque; ab aqua operiatur. Non autem adiunges ei aliis præterea: neque omnino ipsam commouebis, ut quæ uires digerat, & conuellat. Quare neque imbecillis admodum uiribus præditus in solio lazare conuenit, quod apud Romanos in solio demittere, dicitur, illi uero in id descendit, quorum uires dissolutioni & degestioni, quæ ex tepida prouenit, obfistere ac tolerare possunt. Tanrum de causis, & continentibus febribus dictum sit, potaque hæc abunde sufficere. Si enim ex particulantibus quippiam prætermisum fuerit, ex his quæ generatim membratimque dicta sunt, reliquum ipse tibi inuenire poteris.

De Syncope quæ in febribus accidit.

Virium ruine quas Græci synopas appellant, subito in ægris oriuntur, aut ex crudorum humorum præferim os uentriculi grauantium copia, aut ex biliosis nimiumque tenuibus, & qui facile dissipantur, humoribus, interdum uero etiā, dum ad os uentriculi confluunt, ut hac quoque de causa uires conuelli prostruarique cōtingat. Quoniam igitur uirium ruinæ non una ex causa, sed tum ex crudis, tum ex tenuibus biliosisque humoribus oboriuntur, uidendum est quomodo horum differentie discerni, notarique debeant. Nisi enim discrimina internoueris, heri non potest, ut remedia ad unamquamque causam recte accommodes.

Nota febrium in quibus humorum crudorum copia syncopen inducit.

Qui sane ob crudorum humorum copiam in syncopen incidunt, primum sane faciem habent tumidiorem, pallidioremq; os ventriculi totum quæ ventrem flatibus distenti, adhuc pulsus exiguus, rarus, & tardus, insuper ructus sustinent acidos, habitumq; pituitosorem repræsentant. Iam ea quæ præcederunt clarius ubi humorem superant indicantur. Nam cruditates tunc cōtinuè plurimum præcedunt, ocia, intempestiva balnea, leguminum fructuumq; fugacium, & carniū repletio, uniuersæ crassioris sinister usus hoc igitur modo, qui ex crudorum humorū abundantia syncopen experiuntur, internosci debent.

Nota eorum, qui ob biliosos tenuesque humores Syncope consiliantur.

Qui ob biliosos tenuesque humores Syncope laborant, hac ratione internosci possunt. Primū sane facies ipsorum squalida est, & sicca, pulsus exigui, inæquales, & inordinati apparebunt, deic quo autem biliosa est, uigilæ magis quā in alijs vergent, sitisq; affligit. Iam ex alijs quoque multis notis discerni possunt, præsertim vero ijs quæ præcederunt. Solitudines enim, & tristitia, cibul quæ modicus ijs qui ex uitiolis, & acribus assumptis, hos præcedere magna parte consuevit. Sic igitur ipsi internosci debent.

Curatio eorum, qui Syncope periclitantur.

Curandi sunt, qui ex crudorum humorum copia in Syncopen incidunt, tenui uictu, atque omnibus quæ extenuare possunt. Salubre igitur est, quanto ad copiam attinet, uacuationem per se etiam uenā moliri, eamque rursus iterare, immo non permittit, ut humores crudi rursus in corpore redudent. Metus enim est, ne vires prostratæ humorem crudum nequeant concoquere, & distribuere. Satiū igitur arbitror, ut uacuationē potius uitemus. Sin autē humorusq; adeo supera uerit, ut periculū sit ne vires suffocentur, non absurdum est tunc ex copia modicum subtrahere, & grauatas ipsas leuare. Videmus enim plerumque id etiam in igne euenire. Quippe cum is prope modum à uiridibus lignis extingueretur, sub inde paucis ademptis rursus illuxit, & ijs quæ ipsum suffocabant, superior euasit. Quapropter si vires robustæ, & copia quæ offendit, admodum ampla fuerit, in eum modum est agendum. Sin autem imbecillæ fuerint, & cruditas multa sublit, frictionibus incumbendum, atq; ijs quæ sensim extenuare, ac discutere, crudosque humores, & incoctos possunt concoquere. Tale vero est chamæmelum, ut quod rarefaciat, dissipet, & causas

morbi concoquat. At frictionem incipere conuenit à erubris deorsum deinde ad totam spinā, & brachia transeundum est: postea rursus à brachijs ad inferiores partes & pedes, idq; frequentius faciendum est, ita ut uirum ratio habeatur. Cum enim nonnulli sæpe immoderatam magis frictionem adhibuissent, vires subito digestæ, dissolutæq; fuerunt. Ego ita quendam ex inficitia fricantium in syncopen prolapsum conspexi, iussu ferat enim ille continue integrum diem & noctem ipsum perfricari, & à cibo omni ad quintum usq; diem abstinere, deinde cum impie hoc ipse faceret, æger qui non potuit trunq; tum de fatigationem, tum inediā in alios quinque dies tolerare, Syncope interijt. Conueniebat enim meo iudicio, cum qui tam immoderata frictione, & acerbis oleis in usum adhibitis tantam eruditatem discutiendum putabat, non prorsus à cibo ægrum continere adeo, neq; rursus nimium eo grauare, sed ab immoderata frictione dissuadere. Nam ubi fames, laborandum non est, sicut inter omnia hoc quoque prudens ille senex pronuntiavit. Haud noui, quid etiam Diuinitus Galeo in mentem uenerit, quod ita faciendum esse præcipiat. Frictionibus autem immoderatis utendum, oleumq; scyconium inducendum, ac inediā imperet. Nam hyssopum ipsū una eū modico melle bibere præcipit, nihilq; aliud ad septimum usq; diem assumere. Qui dicitur Dij immortalis vires adeo ualidas esse cogitare poterit, qui si mul omnia, & inediā, & frictionem pariter ferre queat. Mihi sane melius uideretur, & moderatius perfricare, & rursus nutrire ad vires respiciendo, cremore pitæ, aut halicæ cum osymelite, & pane in uinum tincto, ubi vires admodum imbecillæ appareant. Nam utrumque faciendum, ut interim sane ex copia humorum non nihil per frictionem dissipemus, deinde rursus eam modum alimentum, quod cōcoqui facile, & in partes corporis distribui possit, substituamus, tum vires conseruari, tum crudi humores probe concoqui poterunt.

De uino.

Vinum dare febri quidem causa non oportet, uerum ob crudorem materiam superantem, eorum quæ sensim extenuare, & calefacere possunt, usus existit. Nihil itaque absurdum est tenue, quod quæ in corpus facile distribuitur, & nullam manifestam a frictionem, aut dulcedinem obtinet, exhibere, ætate uero non nimium recens, neq; uetustas esto, neque colore nigrum, sed potius subrubens, & album, & substantia tenue. Copiosius enim, ut quam primum in uenas, totamq; corpus distribuatur, præsertim tum vires & collapsæ, & in periculo interitus constitutas recreare scilicet animus.

De Balneo.

Qui ex humorum cruditate syncope laborant, non sunt, opinor, ad balneum cito ducendi. Nam materia cum crassior sit, & copiosa, nondumque extenuata, eoq; discuti nequeat, inde magni meatibus infarciatur, & febris augebit. Vbi igitur humores extenuati fuerint, & concoctio iam appareat, ita tandem lautate ægros, & cibo leuiter calefaciente nutrire oportet, ut pote porro probe cocto cum apomelite, & piscibus si fieri potest, scarrilibus, lin minus fluuiatilibus, quos Greci Anadromus appellant, ex oxymelite, & gallinarum cohortalium alis. Postquam vires ex his auctæ fuerint, citra noxæ deinceps cibi offerri possunt, quæ ualentioribus sint ad nutriendum materia.

Curatio eorum, qui ob tenuium humorum partem Syncope conflantur.

Qui ex subtiliorum humorum putredine in Syncope incidunt, eos constet contrario modo curandos esse uisum, qui humores crassos reddat, & ægre in partes digeratur. Cremor igitur haliq; istis conuenit, & panis hydrosofato, aut omphaco meliori intinctus, iræ gallorum testiculicium, ineybus lactuca, astaci, pectinas, buccina, erinauceus, amphratur, mala, malum punicum, pira. Atque hæc non una uice, sed particulatim, & ex interuallis offerre conuenit, ut etiam id quod ratione alimenti datur, non grauet in Syncope uires, sed potius augeat.

De Pino.

Vinum his aquosum dari debet, quale est Cnidium, aut Sareptinum, aut generosum Sabinum: non si ætat nimis uetustum, sed aquosum a deo, neque merum bibatur. Quin & unctio adhibeatur, quæ nullam habeat uim contri laxandæ, aut rarefaciendæ efficacem, sed è contrario densandæ, & corroborandæ: cuiusmodi est etiam oleum melinum. Puluerum nero eiusmodi usus esto, qualis rosarum flosipæque rosæ, si inspergantur, existit, præcipue quando etiam sudores copiosius erumpunt, & æger in Syncope incidit, ad summam imbecillitatem perueniens.

De animi defectione.

Quoniam uero antiquæ quoque defectiones Synopæ inducentes ægris contingunt, uiresq; repente deiciuntur, consentaneum est ut de his quoque generalius disceptemus, deinde ita, quæ etiam nobis tempus intelligenda obtulit, apponemus ijs quæ Diuulsum Galeo sunt prodita. Ipsa igitur defectionis animi res una est, causæ uero ipsius multæ, & unaquæque ipsius species propriam obinet. At de omnibus nunc scribere non licet, affectus autem qui simul comitantur, seorsum curari non possunt. Tantum igitur in præsentī libro de eis dicemus, quomodo quis accessio nibus subito incidentibus queat resistere.

De his qui ob subitas uacuationes animo deficiunt.

Qui igitur ob Cholera, intestinoꝝum lauita

tem, & alias subitas uacuationes animo deficiunt, ijs aquam frigidam aspergere oportet, stans comprehendere, os uentriculi perficere, & stomachum ad uomitionem turbare, aut digitis, aut pennis indixis, imo & manus & crura ligare conuenit, & deligatur plures uehementioresq; esse debent, in superioribus quidem partibus, si deorsum uerget euacuatio: in imis autem, si sursum erumpat. Cæterum uinum aqua frigida dilutum Synopia medetur, quæ ob uacuationes uno impetu factas & uirium dissolutiones eueniunt, maxime cum defluxiones in uentriculum decubuerint: sed inspicendum est, numquid uinum prohibeat. Balneæ fluxionibus quidem in uentriculum idoneæ sunt, uerum sanguinis fluorem uehementer irriant: adhuc eis qui ob copiam sudorum animo deficiunt, atq; hi ratione maxime contraria curantur. Cutis horum refrigeranda, astringenda, non laxanda est, ac uinū his potissimum frigidū exhiberi, nihilq; prorsus calidum offerri debet, imo neq; ligare imos artus, neq; uomitū cogere oportet, sed uetorum ingressus ad eos potius moliri conuenit, ac domus æreæ ad refrigerantem & astringentem qualitatem conuerti, myrtiq; & uitiū capreolis, & rosas pauimentum insternere. Horum nullo ueris, ubi fluxiones in mentem tendunt, nam fluxio augefcit quantum cutis densata fuerit. Qui igitur ob uacuationes dissoluantur, ijs hoc pacto statim succurrendum est.

De his qui ex copia humorum animo deficiunt.

Quibus ex copia animus deficit, non similiter tractari debent, uerum artus in illis quamplurimum perficere, calefacere, deligare conuenit, uino autē, ciboque, & balneis, si febricirent, abstinere. Satis est eis etiā nullam potui dare in quæthymum, aut origanum, aut pulegium, aut hyssopum decoctum sit: coducit etiam oxymeli.

De his, quæ ex utero animi defectionem experiuntur.

Et quæ utero dissoluantur pari modo præterquam oxymelite curandæ sunt. Ac crura potius quam brachia eorum deligare, ac fricare oportet. Quemadmodum enim quibus sanguis ex utero immoderate profluit, eorum mamillis cucurbitulis deligere solemus, ita quibus urerus sursum, & ad latus attractus est, inguinibus scemimbisque admovebimus, naribus, ea quæ fetidissimum odorem mouent. Vteris autem odoratis, & quæ laxare possunt, ac calefacere.

De his, qui ob imbecillam stomachum animi defectionem experiuntur.

Quod si stomachus imbecillis fuerit, atq; id eo animus deficiat, obduci quidem debet ijs, quæ ferborandi uim habent, cuiusmodi parantur ex palmulis, uino, farinis, croco, aloë, ac mastiche foueri, autem oleo abstinere, melino, mastichino, & cardino.

Si ardor stomachum infestet.

Si ardor stomachum caerect, refrigerantium aliquid mileret, debet ut fucus cucurbitæ, lactu-
ce, portulacæ, solani, cichonij, & uuar acetosæ qui
dem nõ astringit solum, sed etiam confirmat. Iã
aqua frigida tempestine ijs data, quibus stomach-
us ardore geluat, frequenter profuit. Sin autem
intempestiue exhibeatur, ualde nocet: atque id-
circo potius quando dari debeat, accurate inter-
noscendum est. Vinum autem calidum imbecilli
stomacho si nihil aliud obstat, recte exhibetur.
Iam extremorum frictio tales quoque insigniter
adiuuat, quod si ea his melius habuerint, si ardo-
rem quidem in stomacho sentiant, ad balneum
celerime ducendi: qui vero frigiditatem aliquam
percipiunt, his medicamentum diatrion peperoni,
ipsumque piper solum, & abanthium propinari
debet: qui ex vitiosis humoribus, ventriculi os ro-
dentibus animi defectionem sustinent, his aqua
calente, & hydrelæzo dato vomitus præcipitur. Sin
autem æger difficulter vomat, ipsas stomachi re-
giones, pedes, & manus prius oportet fomentis
calefacere. Sin vomere nequeat, digiti, aut penni
in os inditis ad id prouocandi sunt. Sine hic qui-
dem potuerint, rursus eis oleum calidum quam
copiosissimum exhibere conuenit. Solet autem
frequenter hydrelæzum non ad vomitum incita-
re, sed ventrem emollire, id quæ non exiguum
præsentibus ægris præsidium offert. Quare si æ-
ger non sponte ad vomitum proclius est, arte
is sollicitari debet: maxime autem rebus quoque
appositis id præstare conandum est. At si uacatio
ea his prouenerit, abanthij turionibus decoctis
mulla potiriue dari, in sequenti tempore uinum
quoque debet, & particulæ uariis modis tum eate-
nis Epithematis, tum abanthij potione roborari,
non tamè id per initia facere præcipio, sed postea
cum uenter fuerit purgatus. Vbi uero humores in
eo continentur, neuiquam eum astringere, sed
fomentis tantum calefacere, ut antea compræhen-
sum est, oportet.

Si ob pituitam animus deficiat.

Vbi pituita frigida, copiosaque in stomacho
collecta fuerit, is oleo, in quo abanthij turiones
decocti sunt, liberaliter fouendus est: deinde uero
mel, piper, & antidotum, quod Diospolites, ac
uniuersa uictus ratio incisoria adhibeatur.

Si ob frigiditatem animi defectio eueniat.

Qui ob uarias perfrictiones animi deficiunt
eos similiter, ac grandi fame infestatos curabis,
nempe ut omni modo eos calefacias, tum uino
calida diluto, tum cibis calidi excitando effici-
bus exhibitis. Adhuc perfricare eos, & lignem
calefacere expediat.

Si ob caliditatem animus deficiat.

Defectiones animi ob caliditatem a pliorè
prouenientes, refrigerantibus, & ijs quæ roborare
possunt, curare oportet. Lucidius autem hæc ijs

potissimum, qui in aere soffocati, & balneis diu-
tius sunt immorati. Roborabis igitur ipsos si quæ
primum aquam frigidam potioni exhibeas, refri-
geria uentilando eacitès, & in aerem ducas: os
uentriculi perfrices, uomituumque prurites: dein-
de uero & uinum, & cibos offeras.

*Si ob igneas inflammationes animus
deficit.*

Qui ob inflammationis magnitudinem, & fe-
brium malitiam animo deficiunt, cum in accessio-
nibus perfrigescunt eorum artus ualenter perfri-
care, & calefacere, crura & brachia deligare opor-
tet: uigilare indici ægris, omnisque cibis & potio
circumcidi debet. Optimius autem in his est præ-
noscere, quando futura sit accessio, ut hoc ipsum
antequam illa innadat, effugere possis. At qui ex
siccitate, & inedia in Syncope per accessionem
initia concidunt, optimè est ijs antea prospicere.
Si enim hñris duabus, aut tribus ante accessionem
cibo dato pedes & manus epnitineri iusseris, non
interibunt. oportet autem cibos esse, qui facile &
concoqui, & in corpus distribui possint. Si uero
etiam uehementis aliquod periculum subesse con-
sideraueris, uinum mox exhibebis, maxime quod
chondro incocto superfuderis: si panem quoque
in chondri uicem offeras, idem ualet. Quod si
mediocri Syncope expectetur, nequiuimò dari
debet, uerum abunde, tunc est malum punicum,
aut pirum, aut malum, aut aliud quoddam pomum
astringens cito miscere. Et si ob hæc accessionem
moderate ferant, cum uersus cibum offeri, non
necesse est pomis uti. Hæc quidem agenda sunt,
si id quod futurum est, præueneris. Illi autem
qui repente in periculum incidunt, uinum exhibe-
bis, panemque calidum & cum eo chondri ualde
exiguum. Si enim copiosius cibos etiam conco-
ctu difficiliore ita affectis dare uelis, non modò
in Syncope incideris, sed etiam suffocabuntur.

*Si ob nobilis particula obstructionem ani-
mus deficiat.*

Quibus ea insignis particula obstructione ani-
mos deficiat, ozymeli propinatur, & qui ex hyssop-
o, origano, pulegio, & melle tum potus, tum ci-
bi coniunguntur, exhiberi debent: imò etiam artus
& fricare & deligare uincit. Iam prodest quoque
cientibus urinam uti, cuiusmodi sunt ea quæ ex
anetho, feniculo, apio, spica nardi, daucò, & am-
parantur. Ex quibus cum manifestum tam com-
modum apparuerit, uino etiam utendum adest, re-
mui, & non ualde uetusto.

Obstructionis nota.

Deprehendes huiusmodi obstructiones cum ex
alijs pulsuum inequalitatibus, tum nero ex ijs ma-
xime, quæ ex magnitudine, paruitate, uehementia,
& obstructione cernuntur, deprehendunturque,
concurso, ut uocant plethorico, non præsentè.
Sunt autem pulsus in ea; qui etiam ob magnas
huiusmodi affectiones intermittentes redduntur.

Cum animus ob sectionem abcessus, aut rupturam deficit.

Quibus propter rupturam abcessus, aut sectionem uacuationemque, uno impetu facta animi defectio orta fuerit, hos quamprimum odoratus recreare oportet: paulo autem post forbitionibus concoctis facilibus alere.

Si ob gaudium aut merorem & similia: item si ob dolum animus deficit.

Qui uero ex trilitia, aut gaudio, aut metu, aut attoniti in animi defectione inciderint, eos postquam odoratus admotis, naribusque comprehensus restituerimus, ad uomitus cogemus. Pari modo, qui ex vulneribus, ac doloribus articularum, neruorum, & musculorum tendinum deficiunt, quamprimum recreare oportet: postea affectus quoque curationem aggredi.

Si ob Ilium, aut Colum animus deficit.

In Colicis affectibus, aut Ileosis, aut aliquo eorum, qui adeo magnos cruciatus inducunt, committentes animi defectiones, si affectus particulae foveantur, conualescent.

Si ob uirium imbecillitatem animus deficit.

Sin autem ex propria facultatis quae corpus regit, imbecillitate animae defectio contingat, quae interperie illarum partium comitatur, unde uires decempe originem, contrariis curabitur, calefaciendo quidem frigiditas, refrigerando autem calidas: atque in alijs simili ratione. Facultas igitur quae uitalis dicitur, ex corde proficiscitur, quae ex obscuris pulsibus cognosci demonstratum est: quae autem ex iocore provenit, euentis defectionibus, quae per initia quidem aquosae & tenues, postea uero amurcae instar crassae sunt. At quae ex cerebro trahit originem, quam nonnulli singulari uocabulo animalem nuncupant, ex uoluntarij motus imbecillitate cognoscitur.

De febre Hectica. Cap. IIII.

Cum immodicus seruator humiditati subtili, quae solidis particulis inest, superuenit, non tamen haec dissipata fuerit, uerum salua adhuc in eis perseueret, semperque serueat, & nullam declinationem habeat, tunc huius febris speciem Hecticam nominant.

De Marasmo ex Hectica.

Quod si humiditas substantialis in nobis consumatur, huiusmodi febris à marcore Graecis ab solute Marasmodis appellatur. Sin autem in totum consumpta fuerit, aut torrefacta, tunc Marasmus constituitur: unde Hectica quidem non adeo diffilem curationem recipit, torrida autem ac marcida

nullam. Ne igitur difficilibus curata tanquam facilibus per ignorantiam manum admoveamus, & sperato successu frustremur, neque rursus curata facilia, cum deplorata uitemus, unaqueque ipsarum species ab altera diligenter nobis esse discernenda, ut haec singulae etiam optime internosci queant.

Quomodo Diaria ab Hectica discerni queat, & notari.

Hectica febris quemadmodum Diaria frequenter etiam ipsae praecedente causa nascuntur, & non semper à febrium aut putredinem ortarum transitu. Ad scire licet caloris qualitate in Hecticis quidem acrem, & siccam esse, in Diarijs autem mitissimam, atque celestiter tactui occurrit, & quodammodo imprimitur. Iam ex urinis quoque has licet facile discernere: nisi si perfecta concoctio per initia tibi appareat, tunc Diaria febris esse putator: cum autem eibus quidam sumitur, nulla autem concoctio appareat, Hecticam suspicari oportet, quae etiam ex pulsibus notatur. Nam in Diarijs magni sunt, & celeres, in Hecticis autem exigui, & obscuri, cum sint uirium imbecillitatem portendunt. Iam numeris horarum inuicem discernuntur: nam horis decem praeteritis si febris non coqueuerit, Hecticam fore potius existimandum est.

Quomodo Hectica à putridis discerni debeat.

Quod si febris interuallum prorsus nullum habeat, adhuc neque obscurior, aut uementior fiat, neque adeo ualida, Hecticam esse hanc putato. Nam in putridis & incrementum, & imminutio accidit, augmentum quidem in statu, imminutio autem in declinationibus.

Quomodo continens ab Hectica discernatur.

Esti uero Continentes hac ratione similes Hecticis uideantur, quod & ipsae neque augmentum, nec imminutionem recipiunt, attamen calor qualitatis, & pulsibus ab illis discernuntur, siquidem Continentium calor non est sicus, & acris quemadmodum in Hecticis, sed etiam in summa cute magis apparet. Ac in Continentibus pulsus sane magni, & celeres existunt, in Hecticis autem & exigui, & obscuri. Hoc sane modo Hecticas ab omnibus ex putredine ortis discernere poteris.

Nota Hecticarum maxima.

Maxima uero nota est Hecticarum, quod à cibo caloris incrementum fieri uideatur. non est autem in incrementum, sed caliditatis in alto calitate occultat; argumentum. Quippe in his tale fieri contingit, quale in calore. Etenim ut igitur in hac caliditas ab injecta aqua deprahenditur, sic etiam in Hecticis cibis, assumptum calorem in alio delitescens foras euocat.

Nota Hæctica in Marasmoden febrem transeuntis.

Marasmoden febri ab Hæctica profectæ signa etiâ ex ipsa sola ægri facile omnibus manifestissima existunt. Primum. n. color uiuus ac sanguineus, quæ Græci chæas, anthos hoc est floræ coloris appellant, non amplius in eis seruat, sed nigror quodammodo, exaridus, & ab immodica febriū caliditate squalidus apparet. cutis uero frōtis ualide distenditur, & palpebræ grauantur, ceu in ipsa quæ dormitiunt, non autē in somnis, sed potius imbecillitas musculorum, qui palpebras sursum attrahere solent, unde etiâ pituitas crassas, quas iemas uocant græci, aridas ob naturalis facultatē impotentiā in oculis habet: præcordia intenta sunt, non autē quod ipsa uere sint intēta, sed quia membranæ, & nerui tēsiōne quidam ob siccitatem sustinuerint. Nā tali de causa imaginatio quædam nobis oriur, ut præcordia & inflammari, & distenta esse putemus. Ac pulsus in eius modi duri sunt, & cuiuslibet ex causis, & frequenter propter usus necessitatē, obsecuti ob imbecillitatem: graces, quia in latum extendi nequeunt. At quid opus est talia signa commemorare, cum hæc adeo euidenter Marasmodē febrem repræsentare nobis possint. Cum igitur moderatiores sint per initia, ualentiores autē ubi radices in egerint, etiā id quod nondum est per id quod iam est, Marasmodum fieri significat. Postquam omnium iam Hæcticarum notas exposuerimus, ad curatio nem modo digrediemur.

Curatio febris Hæctica.

Hæcticam si probe curare cogit, uisū utero qui humectet, & refrigeret, eo quod etiā non aliunde occasionem accepit, quā ex humiditate, quæ solidas ipsas partes in primis nutrit potest. indigentia. Verū quia refrigerantia diuersam sortiuntur facultatem, etenim alia plus; alia minus sunt efficacia, sciendū est, quibuslibet aqua, & aliud quoddam refrigerans, & quibus quidem magis, quibus aut minus dari debeat, item quibus nullo modo offerre oporteat, ad hoc tempus, quo exhiberi conuenientiam quos sane tum intus, tum foris refrigerare, quos uero solummodo extrinsecus oporteat. Cum. n. ita nos omnia distinxerimus, & curatio Hæcticarū quamuis sit operosa, tū facilis, tum prompta ad sanationem efficitur.

Quibus frigida dari debeat.

Siquidem igitur æger primario in Hæcticam febrem incidit, atq; non ex æutorum morborū transitu originem traxerit, cum fiducia tremorē pristinæ potionis offerro, & panem in aquam tinctum, lactucasq; ac omni cibo uitior. Post cibū aquam frigidam, quantum uelit, potui dari: cauere enim hic febris insultus & metuere nō oportet. Neque enim remissionem, aut accessiones,

quemadmodum in febribus ex putredine oris inuicere licet. Ita sane agendū est si quando ipsa febris Hæctica per se ac primario, fuerit; ægriq; uires imbecillæ, & non alia febris ex putredine creata, ei sit admixta.

Quibus frigidam dare non oporteat.

Prepende rursum, num quandoque febris Hæctica inflammatione magna præcordia infestante, aut putredine quadam in uenis apparente, aut crudionibus humoribus excitata fuerit. Fieri nāque potest, ut Hæctica sit febris, & ut quædam ex putredine prouenientis ipsam adulterauerit. Si igitur tale quid fuerit aqua dari nō debet, & præsertim, si nulla concoctio in urinis appareat, neque inflammatio feruens, & magnitudine insignis: præterea si uires ægri sint imbecillæ.

Quando frigida exhibetur, etiā inflammatione infestante.

Sin autem inflammatio teruens admodū fuerit biliosa, Erysiplacea, frigida recte exhibetur. Ego sane noui me cuidam tali affectu laboranti, æstuantiq; ardore frigida exhibita plurimū profuisse, ita tamen ut prædixim ægrum paulo diutius morbo consistitum, quod etiā in accidit. rar dius enim uires recolligebat. euaserat autem ut non cum febris esset audita, Hæctica in Marasmodem incidere. Hac autem ratione, etiā si quæ ex putredine ortarum admixta fuerit & præcipue ex ardentium genere, frigida potui exhiberi debet: neq; uero simpliciter in his dabitur, sed cum bonæ concoctionis notæ in urinis iam apparuerint, tunc offerre conducit.

De Hæctis febribus, quæ ex alijs in eas transeuntibus mutatisq; generantur.

Quod si Hæctica ex acutis morbis in eam commutatis oboriatur, magna. n. ex parte Marasmodis Hæctica succedunt, ubi ardente febris non recte curantur frigida potui interdicitur, præsertim immoderato. Nā corpore is antea extenuato, imbecilliq; simul, & exarni reddito, tum propter tēpus, quo illa excepta est, tum propter ardentium febrium intemperiem, necesse est dupliciter comitari uoxam, aut ualidam uirium deiectionem interitumq; aut refrigerato corde, caloremq; natiuo protinus abolito Marasmodi semio per similem, quem nectio ex morbo senium vocabant, subleui. Hoc enim & frigidum & siccum existit quod nequaquam febri induci. Quare neque refrigerantia hic Marasmodi, sed potius hu mectantia simul & calefacientia, requirit.

Quomodo ex extremis remedijs succurrendū hīs sit quibus frigida dare non possumus.

Cataplasma igitur, somētis, cetratisq; refrigerantibus

rantibus in oībus quidē febribus recte utimur, in quibus aque potio dari nequit, aut ob uirū imbecillitatē, aut ob corpus plus ē quo extenuatur; carnibusq; destitutū. Inspecto autem, num etiā Hectica marasmodi iam excitata ex affecta particula primario duxerit originem. Etenim ex inflammatione iecoris, ventris, mesariz, renū, & colit, adhuc ob diuturnas uteri, pectoris, pulmonis, septi transuerſi, & aliarum partium inflammationes provenire solet. Quare inspicendū ē, si animadvertendumq; quā in particula febriū Marasmodē subsequi cōtingerit, eiq; potius remedia ad refrigerandū humectandūq; efficacia adhibebimus, ut ipsum ueluti ignis fomité extinguas. Multa igitur sunt in id efficacia, sed nullum ita ut ce ratum rosaceum. Quippe solidas partes refrigerare, & humectare potest, ac tueri ne humiditas quę modica in eis adhuc superest, prorūs intēreat, in hunc autem modum conficitur. Cere quā drans, rosacei sextans. Cera semel, aut bis lauratur deinde ubi in aqua frigida soluta fuerit, rosaceo sic adijcto, sed ex hoc seruato instat uncia paulo probe aut minus. Et cū ceratū lento igne probe solutum fuerit, finito ipsum refrigerare, deinde ex cerato portionem acceptā in pila subigito, interm relicti rosacei, interim aque frigide momentū in pilā conijciēs, donec totum rosacū infusum primum fuerit, ac cerato probe mixtū esse cōspexeris. Quod si etiam ouorum albumina adijcere uolueris, præstantius adhuc erit remediū. Pari modo si cremorē prisanæ adiunxeris, melius adhuc efficiēs. Oportet autem linimentum crebrius mutare, nec permittere, ut medicamentū diutius corpori adhærescat, neque multum incalescat. Quippe uiora imbecillius redditur. Ceratū hoc ad multū est utilissimū, nec eo temere uti oportet. Ego sane hoc frequenter usus incipientes Hecticas et discussit, ne adauctæ Marasmodi febriū inferre potuerint. Oportet autē in his quoque usui istius insistere, & non tam deſectare, sed etiam crebrius adhibere, alias ut ceratū indueſces, alias liquidius reddeas, hydrosorſato copiose diluendo. Ita namq; hoc præſidio instat uicinis uti licebit, cum omni in corpore, tum præcipue in cōsumptis, & extenuatis. ac nō modo semel in die, sed etiam bis ita præſertim in uisceribus uti conſuit. Quoniam autem iterum illinēmus, ratio est, ut etiam secunda uice uinctum abſtergāmus:

De fomentis.

Fomentis utendū ex succo lactuæ, uix immature, porulacę, solani, & vmbilici ueneris. Præſtat autē succos etiā refrigeratos, & præſertim nunc superaccommotare. Quod si nobilis quædam particula inflammatione teneatur, succos non per se ac separatim, uerum oleo omphacipo admixto, aut chamæmelino, aut etiam rosaceo, aut simplicibus inducere conſumimus. At pectori remedia nō nimis refrigerantia admoueri debēt

nisi multus seruo, aut inflammatio in eo spectata fuerit. Verum ne sic quidem linimenta diutius inhæreſe sinemus, eo quod plerofq; ab immobilitate ipsorum refrigeratione haud mediocrem non solum respiratiois, sed etiam uocis noxam expertos nouimus.

De domo in qua ager decumbet.

Non solum autem refrigerari, quæ extrinsecus admoventur, sed etiā aeris mutandi ad frigidius artificio auxiliari tenēbimus. Si igitur æſtus fuerit, in subterranea domo ager decumbet, & paumentum aqua frigida copiose conſpergetur, ut aer hinc frigidior euadat iā aqua ex alijs uasis in alia decidat: nā mediocritas huius strepitus ē somnium prouocat: præſtat adhuc, si aerem ita immutet, ut non modo refrigerare corpus, sed etiam cor roborare possit. id quod fiet, si passimētis inspicia refrigerantium aliquod, aut rosam, aut semperuiuum, aut rubum, aut lentiscentiories, aut uiris capreolos, aut simile quoddam, tum ad refrigerandum tum ad robur inducendum efficac. Huiusmodi sane aer omnibus quidem Hecticis conducit, maxime uero, quibus pulmo & cor igneum ardorem primario senſerit. Etenim à cibo & potu refrigerante, non tantū iuuantur, quāntum à frigidi aeris inspiratur: cōtra maius à cibo sentiūt commodum, quā ab æreſe iecur, & uēter, uat alia quæpiā particula fuerit affecta. Ita sane ubi æſtus fuerit, aerem ad frigidum mutari oportet: ubi hyems calidior parandus non est: quocunq; n. frigidus fuerit, nihil ipſos offendit. Reliquū uero corpus solum modo moderate cooperiri oportet, pluribus turgentis incalescat, & æger ideo nūm defecationem aliquam sustineat.

De Balneo.

Ex balneum ijs conducit, quī Hectica febris laborant, quæ per se fuerit, & nō cū aliqua ex humorum putredine proueniētiū coniuncta inueniatur. Tunc n. offenduntur, & nequaquā iuuantur, præſertim si crudis adhuc humoribus lauare quis ipſos uoluerit: neq; minus leduntur, si inflammatione nobiles particulæ obſident, & modo dice id facere tentaueris. Sciendum autē, nō modo Hectica febris laborantibus, sed & frigidis sic cūq; intemperiebus & senſio ex morbo balneum conferre. Habēt enim balnea hoc quoq; admiratione dignum, qd & calidas & frigidās intemperies iuuare poſſunt. In ſummā, si quis diuerſos illos lauandi modos nouerit, is meo iudicio etiam omnem intemperiem mutare in contrariū poterit. Esto igitur temperatus aer, uicinis, & solis, eluere autem oleū conuenit, ac ſtatim cum æger in exteriorē domus partem ingreſſus fuerit corpus perungi, uerum diutius in ære morari non debet, oleum autem uisceribus potius superfundi. Egreſſus æger in frigida ſolium, quod non aqua frigidam, sed lactis more tepentem habeat

I 3 perungatur

perungatur, circumdatus autem operimentis, nō admodū diu in eis immoretur cū uestē iam in duet, rursus totū corpus ungatur. Valde. n. hoc iu uare ipsos potest, quoniam humiditatem quæ à balneo accedit, diu retinere oportet, & non line- re, ut prompte ex corpore desluat. Egressus æger ex balneo, aut cremore pīfana, aut halicę, aut lac assumat: sin autem lūis virgeat, etiam cum ad huc operimentis inuoluitus est, non recuses, aut lac, aut aliud quoddam alimentum exhibere. Etenim tuuc potius in uniuersum corpus distri- buitur, cum attrahitur.

De lalle.

Lac igitur omnibus Hecticis, præsertim in Ma- rasmo desinentibus, si quid aliud, idoneum est. Quapropter etiam ijs ualde conueniens est, qui vires habent imbecilles, neque alimentum pos- sunt attrahere: & hoc solum in corpus distribui, trahi quē nō parum accommodate potest. Itaque lac muliebri primum locum obtinet, secundum uero asinum. Verum quoniam æger nonnulli hoc assumunt, capillum ipsis dandum est, quod modicum fere existit, & magis potest nutrire. Con- stat autem etiam curā animalis habendam esse, ut nutriatur domi ordeo, myrti, lentisci, & quer- cus folijs. ita enim lac non amplius corrumpitur. Nam huius sollicitudo habenda est, ut ne He- cticorum aluus subducatur præcipue eorum, qui ex frequenti Syncope, & diuturna vacatione alui in Marasmodum febrem inciderunt. Quam- obrem quibus uenter imbecillis, & facile subdu- citur, in his etiam lac bis coquere, uel etiam flu- uiales lapillos in id coniungere oportet. Reddūt autem igne candentes, ut serosum à lacte perip- sos dissoluatur. Atqui lac solum nolint assumere etiam cum pīfana, aut halica, aut chitidio ipsum decoctum exhibeto: adhuc cū itrio, hoc est libō suminali, & similagine similiter bis coctum offer- to: præterea magis adhuc illis lac exhiberi debet, quibus etiam uenter copiosiora, & biliosiora deij- cere uidetur. Procedente autem tempore, ubi fe- bres mitigatę fuerint, & vires aliquomodo in- stauratę, mollissimum, & recentem caseum ex eo coagulatum dare ipsis non alienum est. Quan- tenus enim vires augeri cernimus, eatenus nos quoque cibis adiicimus.

De uino

Vinum ijs qui frigidam siccamque intempe- riem in solidis particulis habent, & Marasmo ex morbo, ut uocant, detinetur, exhibere necesse est, ut quos calefacere simul, & humectare oporteat, quę omnia uinum moderatum prestare ipsis po- test. Qui uero cum febris marcescunt, præsertim qui macie torrentur, ijs uinum dare cautio est: ut quod eis, si quid aliud maxime aduersetur.

Si ex syncope marasmus obtrigerit. Cap. V.

Q Vi ex Syncope Marasmo contabescunt, ijs quantum sane ad vires collapsas, & per- frictionem frequenter comitante attin- net, uinum offerri debet. Quoniam uero etiam caliditas naturę contraria, febrisq; præterea eis adest, & perfrictio quidem interdū conuiescit, rursus autem febris superuenit, ac summatim cū periculum sit, ne alias aliter æger intereat, nunc à perfrictione, nūc à febris, necesse est tum demum ad urgentem causam respicere, ac nonnunquam uinum tempestiue præcipere, nonnunquam ue- ro rursus id dissuadere.

De testiculis gallorum.

Testiculos gallorum, quos Græci Otchis & Parastatas appellant, dare his oportet. Perpetuo enim omnibus Hectica laborantibus commodi existunt, cum abunde nutrire, & vires augere pos- sint, ubi probe concocti fuerint. Quapropter id alimentum semper exhibendum est, ubi vires non- dum ad extremum collapsę fuerint. Quod enim præsidium deinceps esse potest, si vires alimen- tum non coquant, superentque? Quippe nequa quam cibis vires augebit, sed natura, quę omne alimentum & concoquere, & mutare, & corpori apponere consuevit.

De fructibus pomaceis.

Fructus pomaceus, qui Opora græcis dicitur, quia sane humectat, ideo Hecticis cibis est ac- commodatus. Quoniam uero omnes propemo- dum non solum humectare, sed etiam refrigera- re solent, idcirco rursus dicendum non est, uni- uersum omni Hectico conuenire. Illis enim qui calida & sicca intemperie laborant, & omnibus qui Marasmo contabescunt, & torrentur, cōgrue frigida & humida victus ratio adhibetur, maxi- me peponum medulla, & cucumerum: item ma- la, duracina, & cerasia his sunt idonea. Qui autē frigida intemperie detinentur, & in senum ex morbo inciderunt, ijs inutilia. Reliqui uero po- macei fructus, qui nou adeo refrigerant, sed po- tius calefaciunt, & humectant modice, exhibere nou est absurdum: uempe ruam maturam, valde dulcem, præsertim quę passā est, ac malum valde dulce, & sicum admodum maturum. Nam hæc probe concocta prope modum nihil nocet. Si igitur uenter nihil nos impediatur, plus iusto excernes cum fiducia cibos commemoratos exhibeto. Si nanq; tale quippiam fuerit, & aluus magis quam conuenit profluere uideatur, his quidem abstine- dum in præsentia, dandum aut punicum modico astringens aut pirū, aut malum eiusdē qualitatē, præsertim ante alium cibum, nam si à cibo sumā- tur, aluum subducunt. Ac cibi qui stomacho po- tius, & cordi corroborando sunt utiles, Marasmo

ex Syncope contabescantibus, & omnibus Heſticis dari debent. Si bi quoq; ſiti, & uehementi febrilaborare uideantur, etiam ipſis fruſtus pomacei refrigerantes opportune offeruntur. Breuiter omnia ad id quod magis urget, accomodari debent. Hanc enim rationem animaduersioneſque obſeruans, nunquam aliquem offendas neq; ſi pomaceum fruſtum, aut alium quempiam cibum exhibeas. Nam omnia quantitate, qualitate, tempore, ordine, & utendi modo, aut bene, aut male adminiſtrantur.

De tabe qua Marafmus graec dicitur.

Sitabes quæ græci uocant Marafmum reuera humiditatis quæ in ſolidis partibus ſubſiſtit, abſolutus exiſtit entericus, nullâ medicinam recipit. Propter hoc igitur nonnulli medicorum merito decepti in diſcernoſendo, putarunt ſe uerum Marafmum curaſſe. Etenim fieri poteſt, ut tenuitas carnis maciesq; & ueluti colligatio earum reſarciatur, primariam uero humiditatem, & quæ ſolida ipſa nutrire poteſt, proſuſ abſumptæ perditamque non licet reſtituere. Sic enim ſenium quoq; ſanari nequit, ut quod naturalis ſit tabes. Quemadmodum igitur ſenium nulla medicina tolli poteſt, ſic neq; ea quæ reuera tabes. Attamē propter humanum benignumq; artis auxiliū contere cum morbis oportet, & non cendeploraſſe omnino relinquere. Interdum .n. ubi quis naturam dextram naſtus fuerit, & tabes incipiat, nondumq; ſolidas partes tot ruerit, ſperatum ſueceſſum conſequi poterit. Sin autem minus, quantum magis æger affectus eſt, tâto minus agendum. Nam deſperatis malôq; utôis manus admoueri non debet.

De tertiana. Cap. VI.

Tertiana quidem facilis curatu eſt: eum autem à medicis illis, qui nulla ratione, & uirtutibus, male tractatur, non diſſicilis modum curatu, ſed etiam inſanabilis interdum redditur. Conſtat igitur cibum humidantē refrigeratēq; in omnibus eſſe præſcribendum, cum Tertiana mixtione pura, & germana exiſtit, & à ſolo bile excitatur. Itaq; piſanæ et ceteror ſuper omnia utiliſ ipſis cenſetur: atq; hoc uſu nonnulli uſq; ad Crifm, hoc eſt morbi ſolutionem, optime ſuperſtites uitæ manſerunt. Sin autem minus oblectentur piſana, etiam auenæ cremor ipſis dabitur: ac lactuæ, aut intybi cauilibus utendum. Quod ſi febris non fuerit uehementis, et quædam notę concoctionis appareat, etiam gallinarum alę, & piſci culus moli carne præditus concedi poteſt. Vrinę in his prouocari debent, maxime apij radices, & adianthi diſculo. Nam anethi decoctum & ſi urinas mouere prope poſſit, uitare tamen ipſum ma-

gis oportet in germanis Tertianis, & in quibus callidus ſiccioſq; tēperamentum habetur, præterea ſi græci ſollicitudine, & uigilijs cruciantur. Nā in his omnibus offenſa maior, quam utilitas prouenire ſolet. Abſinthij etiam decoctum maxime uitandum eſt, quando calidum, & ſiccum ægri temperamentum habent. Noui autem ego nonnullos etiam paticularum colligationem expertos, quod immoderatius illud aſumpſiſſet, & nō uitaeſſent. Contigit enim quorundam ſane partes ſolidas ſicciores depræbendi, quorundam uero bilem, & ferueſcentem, non quantitate, ſed qualitate potius offendere: alium autem igneam intemperiem, aut inflammationem in ore uentri culi ſentire. In his itaq; omnibus talia uitanda ſunt & tepida liberaliori magis ante cibum utendum. Nihil autem minus etiam in alio tempore potio exhibenda, quippe hæc humectat, feruorem refrigerat, meatuſq; laxat. Quare ex his omnibus accidit, hanc quidem partem bilis per uentrem excerni, aliam uero per urinas, quæ antea detinebatur, & propter caliditatis feruorem, & propter nēmiam decoctorum aduſtionem non potuit expurgari. Miror autem quomodo Gale nus qui artem legitime, ſi quis etiam aliorū medicorum exerceat, adeo indiſtincte ſcripſerit, ut dicat exquiliſ Tertiana correptis abſinthij dilutum à ſeptimo die propinandum eſſe. Ego uero falſis Tertianis potius dedi, mixto ei oxy melitia momento. Sic enim pituitæ miſcellam, & citra noxam magis extenuat, & leuiter puegat, ut non uſus uentat origani, aut hyſſopi, aut calaminthæ, aut pulegij. Quæ omnia acriora ſunt & cum periculo, crebroq; febrem iam magis accendunt. Hęc igitur uniuerſa uitare magis oportet, & tunc audacter offerre, quando pituita bilem longe ſuperauerit, & temperamentum ægri frigidius fuerit, uitæq; ocioſa præceſſerit, & alia omnia, quæ humorem frigidiotem ſuperantem efficiunt. Sin autem humor, qui abundat, contrariuſ horum fuerit, tum bis abſtinendum eſt, utendum uero illis potius quæ extenuant, & acceſſiones uehementiores fieri non cogunt.

De pomaceis fruſtibus.

Pomaceos fruſtus, quos oporan Græci appellari diximus, exquiliſ Tertianis paſſiſſime eſiheri conuenit, nempe uiam dulcem, perſica eolæa, & non cocta, peponumq; medullam: præſertim autem ſi etiā ægri ſiti uententur. Ego ſane noui, me frequenter ægros, ne amplius acceſſione febris inſeſtarentur, impediuiſſe, cum peponas probe refrigeratas hora ante incuſum morbi aſumere iuſſiſſem, & ruſus aquam tēperatam copioſam, & quantam potuerint, peponi ſuperbere præcepſiſſem. Secutus itaque eſt non multo poſt aquam epotam aliquibus ſane ſudor, alijs copioſa bilis per aluum. Offendi autem ego ple-

rosque Romæ medicos, qui oe omeo quidem peponom taquam bilem procreantium proferre audebat. Quum itaq; ego cuidam aliquando, & sitienti uehementer, & æstu flagranti, defatigatoque iniunxissem, ut peponem assumeret, qui dam præsens medicus exclamauit, homo cur ægrum magis uis occidere? an oō didicisti, quod pepoo bilem producat, lege Galeum de alimen- tis, ubi dicat maifesto, pepooem comestū Cho- lericos efficere. Laboraui igitur ego non parum, ut ijs persuaderē, qui intellectū, assequi poterant, Galeum oon dicere hic ipso pepones bilē crea- re, sed Cholerae efficere. Cholerae autem uo- cabant stomachi subuersioem cum uomitu, & perturbatioe oetris: ac Cholericos, quibus hæc acciduot. Nam pepoo reuera habet aliud stoma- cho contrarium, quare etiam copiosior come- stus uomitus, ventris perturbationem, & præ- terea perfrictionem, ac totius corporis coouul- siones excitat. Ac melopepoo oihl horum face- re censetur: oon eoim habet adeo, quod stoma- cho aduersetur: imo neque pepon modice come- stus: Proinde Tertianæ febri detentis cum fiducia dari debet: nec non his qui Causo & calida iotē- perie laborant, siue io renibus, siue in icore, uel io stomacho, uel capite. Nihil enim eiusmodi in temperiebus aduersari potest, debellare, & uio- cere, ut pepon, aut qui dicitur melopepoo. Quo- modo enim ea quæ refrigerant, & humectant bi- lem parere possint, non uideo: ubi autem pepo- num facultas tibi deest, etiam cauliculi lactuca- rum refrigerati, & cucurbitæ, item cucumerum medulla, persica coctionem oon experta, sed in uaporem suspensa, & ab eo solo cocta, & elutiq; coadita substitui possunt, eisq; & similibus sem- per uti licet. Iam io oleribus, & pomaceis fructi- bus etiam omnibus deligere oportet, quæ refri- gerare queant, & humectare, cōuenienter ea pro- uisusiusque temperamento, & morbi magni- tudine accommodatores.

De balneo.

Balneum, ut maximum præsidium, ipsis præ- bendum, maxime calido & sicco temperamento prædictis, & qui crebris uti lauaris consueuerunt: nec concoctioe omnio expectanda est, sed ubi siccitas urget, etiam aote concoctionem lauare conuenit. Modus autem lauandi talis esto. Post- quam æger in temperatam aerem ingressus fue- rit, modice sudarit, & tepidas aquas acceperit, ita oleo non simplici perungatur. Quid enim cor- pos bile exardescens, humectare, aut refrigerare probe præterquam aqua potest? præstat igitur aquam tepidam admiscere, sic .n. refrigerare, & humectare magis, & in altum corporis peoctrare percipitur. Vnctio autem adhibetur oon io do- mo, quæ calidum aerem habet, sed in exteriorē eius partem reuerso, quam etiam à molliendo

malactiæ appellant: deinde post illusionem hy- drelzi, aut hydrochamæ meli. Nam si bilis multa & præcipue crassior sit, non alienum est in uicē olei commuoi etiam chamæmelino uti, quod vim discutiedio multo habet amplioren, sed nō diu æger in aere immorabitur, verum celeritimo transito tantum usus in tepidum calentis aque solum defecdet, io eoq; diutius subsistet. Egres- sus autem ex domo calida, monendus, ut io aqua frigida immoretur: & si bene habuerit, etiam ieiuniū indices, indumentis uero iam sumptis, ut aque tepide quantum uelit, paruo spacio inter- posito, bibere hortandus est. Nam à potioe su- dores copiosos effundi uidebis: interim uero etiam bilem per oomitum reijci, ut æger quam- primum ex ijs quæ superueniebant, morbo fue- rit liberatus. Reuerfus autem in domum, si pepo- noo adfuerit, aut alimentum quod diximus su- mat, aut lactucarum cauliculos, aut cucurbitas, aut cucumeres, aut prisanam. Cæterum aquam tepidam non modo semel, sed etiam bis & frequē- ter dare expedit, & nihil metuere. In hoc oonq; morbo aqua tepida maximam esse præsidium. Tē- tabimur autē io declioatione potius exhibere, & ante accessionem: ioterim uero etiam io accē- sione. Noui siquidem a cēssioibus subtrahi de- bere, ut Diuiniſsimus Hippocrates inquit, ac ue- rum est, quaatum ad hoc attinet, etiam cum oi- hil urget. Frequenter enim cogimur propter cau- sam urgentem, non tepidam modo aquam, sed etiam cibum in ipsa accēssioe offerre. Io illis au- tem hoc ageodum est, qui in moderatū stoma- chi habitum, & uirium imbecillitatem habent, at io sultus magnitudinem ferre oqueat, sed Syo- copem mioetur. Nooi igitur ego in his qoi im- moderate rodūtur, tepidam me aquam propinaſ- se, deinde uomitu oborto, & bile copiosissima excreta, istorum beneficio accēssionem cooque- uisse. Vt autem illa aucta fuerant, ita etiam alia decreſcebāt, & aqua temperata, & bile euacuata.

Quomodo tertiana discernatur, germana ac nera ne sit, an falsa.

Tertianas illas germanas esse censendum est, quibus omoia quæ cognata dicuntur, eoſense- rint, ætas dico, regio, consuetudo, temperamen- tum, studia, & victus ratio. Potest aotem senex quoq; Tertianā infestari, quæ omoem Tertianæ germanæ speciem, omoemq; modum conseruet. Ego sane meis oculis hæc in ſene quodam con- ſpexi, qui ſlauam bilē uomeret, ſimiliterque per alium excrementum, uehementer febricitare: ar- que idcirco accēssio cum oalido rigore cum io- uadebat, ac declioatio multis ſudoribus acce- dabat, detioebatur autem accēssione horis fere de- cem, aut duodecim. Huius alij ſane familiares, eo quod ſenex eſſet, decoctum exhibere præci- piabāt, ac omnia illa facere quæ falſis Tertianis, ut

ut aiunt, idonea existunt: fereq; interijisset æger decoctis ex hyssopo, origano, & pulegio assumptis, nisi quis subito ex periculo ipsum subtraxisset, iubens eum etiam pepones assumere, & lactucae, & pistanam, quæ nihil curiosum habent, opere rosum quæ, ac omnem alium uictum, qui humectaret, ac refrigeraret, ut in Tertianâ exposita, non deceptum mæto, quod senex esset, sed potius toto temperamento. Habuerat enim iam inde ab initio igneam intemperiem, quam alij propemodum omnes postea, ad amissim conseruabunt. Quare naturam ægri, & causas præcedentes maxime attendere oportet: nihil autem minus, imo etiam omnium maxime febris speciem. Ego autem neq; Tertianarum salutarum uictus rationem in omnibus ut ueram, & utilem commendo, quâ Galenus in libris ad Glauconem philosophum præcipere uidetur, iniucius omnino pistanz piper, aut origanum, aut hyssopum. Ex enim huiusmodi præcipiis; periculosa sunt, & febres uehementiores accendunt, idq; magis adhuc, si temperamentum corporis calidius inueniatur, & pituita mitior quam bilis, & quæ non adeo calefacientia requirit. Quippe satis erat, in his uti, & non multis valde refrigerantibus, & his quæ sensum extenuare circa calorem possunt, qualis est radix apij expurgata, ut non particeps sit radicularum: item pistana similiter, interim adiunctum habes apium, aut anisum, aut comam porri, aut mellis, & acetii momentum. Quod si non admodum in sincera, ac falsa Tertianâ fuerit, nullus horum usus est, nerum abunde est sola pistana per se uti, & id quod biliosum est, contemperare: quod pituitosum, dissoluere, non autem siccantibus cōpingere, ac cogere: quemadmodum ij qui piper, & hyssopum præcipiunt, faciunt, eo quod illa uideantur extenuare. Oportet autem diligenter animum aduertere cum qui humectante uictu usus sit, ut cum humores ab illos dissolutos uiderit, statim euacuandis eis extrahendisq; incubat, medicamentum exhibito, quod non magnam calefaciendi uim obtineat. Eius autem generis multa sunt, & quæ ex oxymelite simplicius parantur, & quæ ex succo rosarum modico, agarico, & scamoniz lachryma. Quando igitur humores cōpendiose subducendi sunt? Nimirum cum diffundiam eos, & turgere tandem conspexeris, ut Diuinissimus Hippocrates scriptum reliquit.

Quomodo humores diffundi, dissoluiq; & etiam ad excretionem incitari cognoscatur.

Materiam subiectam temperato, aut humectante uictu dissolui inde cognoscere, quod cum per initia esset immobilis, nunc aliquo modo agitari incipiat, atq; alias in alium locum descendere: interim ad os nentericuli, & intestina: interim etiam ad articulos, aut cutem. Peritum igitur animaduertere hunc humorum motum, & obser-

uare diligenter oportet, & dare aliquid, quod eos subducatur, antequam oberrantes noxam intulerint, in partem aliquam nobiliorē decumbentes. Verum vulgares medici nihil horum norunt, ut qui motiones humorum discernere non laborant, unde sit, ut contraria faciant. Postquam igitur hæc uiderint statim ad ea prorumpunt quæ siccare humores, & crassos facere possunt, atq; huiusmodi quidem astrictoria medicamenta, similesq; uictum præcipiunt, unde accidit, ut humores inde crassiores redditi neq; purgantibus facili cedant medicamentis, neque obediunt. Conuenit igitur, ut qui humores dissolutos nouerit, non modo se melē exhibeat, quæ per aluum subducere possint, sed etiam rursus humectante uictu usi, & dissoluentes, si quæ sicce & crasse reliquæ subsint, iterum leuiter expurgēt. Ita enim humoribus modice subactis, etiam solus uictus morbum in totum euenire, mutare, & ad bonum statum deducere poterit, ut nulla alia medicina indigeat. Quod si opus erit, licebit etiam epithematis simplicioribus uti, & persufusionibus, & cum concoctio apparere incipit, & longe antequam accessio expectetur, ita nanq; etiam tum efficaciora, tum magna ex parte accessiones expectatas discutiunt. Quoniam autem purgantibus utendum est, ut ea prompte, & compendiose inuenias, bonum esse duxi, etiam cōpositionem ipsorum hic apponere: in hunc modum habet.

Rhodomeli purgans.

Rosarum succi sextarij duo: mellis sextarius: scammoniz torrefactæ uncia. Omnia simul coquantur. Summus medicamenti modus est cochlearia quatuor: medietas tria: minor duo. Hoc non solum Tertianarijs propinari debet, sed ijs etiam, qui lippitudine, & alio quodam modo ex bile, & calida intemperie ægrotant.

Aliud Rhodomeli purgans.

Rosarum succi sextarius: scammoniz uncia, agarici drach. piperis drach. dux: mellis unc. sex. Ad ignem lentum coquantur, & ubi in crassitie coierint, adijcito scammoniam, agaricum, & piper: ac utitor. Datur in stat cochlearium quinq; aut sex. Hoc solis cōuenit qui falsa Tertianâ detinentur. Habet enim nonnihil, quod etiam pituitâ subducatur, cum agaricum, & piper receperit. Noui autem purgasse me etiam medicamento, quod corticem mali citrij reciperet, & eo quod ex malis cotoneis paratur, & horū penuria sola usum scammonia. Quod enim ipsa non modo bilem, sed etiam pituitam potius euacuat, manifestum est, si quis temperato, & humectante uictu usus, pituitam diffundat, uacuat hanc quoq; scammonia: nec indigebit ijs, quæ agaricum, aut euenbitam syluestrem recipiunt. Quare etiam si quis recto uictu usus falsam Tertianam scammonia purgare

frequenter, nam rſus eorū liberalior noxius eſt. Verum laborandū eſt, vt humores ad cōcoctiōnem perueniant, neq; in vetuſtate vcnire ſinendi, ſed purgandi. Cum enim in corpore diutius inſidet, magis adhuc ab omnibus præſidijs quæ calefaciūt vidēturq; extenuare, craſſi ſunt, vt nō ſimplicius ne medicamētis quidem ad purgandū effluaciſſimis prompte cedāt, cū difficileſ ipli ad motū & terreſtrem magis ab iſtis euaserint. Noueris at hāc ad purgationē eſſe opportunitatē temporis, & cōmoditatē. Frequenter. n. vrinarum notæ à præſumpto victu, & tēperata potione mutantur, atque tunc huiusmodi vrinas incoctas eſſe, ab ijs qnī id non nouerūt, cenſeri videmus. At qnia frequēter accidit materiā in totū corpus diſfundi, & alias aliter, aut per ſudores, aut uomitū, aut uētre diſpari: ideo urinx etiā ſedimenti expertes uulgo apparent. Satiſ igitur eſt cōſiderare, & diſcernere, quādo potius materiā extenuari, diſſundī, ad excretionē incitari, & ex loco in locū trāſire incipit, atq; ita demū purgare oportebit, nō ſolis urinis animū adhibentes. Nō autē conuenit inueteratā curationē moliri, ſed per uices, & in terualla. Ita nanq; accōmodari debet morbis, qui ex craſſioribus humoribus generantur ac ſenſim extenuare, & laxius purgare materiæ copiam oportet, donec ſatis habere uidebitur. Nam ſi æger aſſumat medicamētū, quod copioſius purget, magnā corpori intemperiem conciliat, & potius nocet, quam iuuat, magiſq; in ijs adhuc, qui calidiorē temperi mēto, & bilioſiore præditi ſunt.

Quando ſaliſ vitæ in quotidianis febribus.

Qui iecur, aut os uentriculi habent refrigeratum, & acidam pituitam nouunt, tenenturq; quotidiana, his etiam calidioribus cibis, ſi uolēs, uti nō alienum eſt. Humidus enim & frigidus ſtomachus inuierſa extenuantia citra noxam tolerat. Auſus igitur ego quandoq; ſum in quodā, qui quotidie febris accēſionem experiretur, & pituitam uomeret, ſaliſ nti, & cibo, qui Græcis Encathara dicitur: item hydrogar, porri decocti iure, & nō aquoſo, æm iſſicce conualuit, ita tamē, ut & ori uentriculū, linguēq; epithematiſq; ei ex iriſſicco applicatiz, & totius corporis tēperaturā proſpexerim. non alienum eſt hæc quōque in Quotidianis tentare, æ pituitæ quæſita eſt, & quæritatem obſeruare, atq; ita conuenientem uniuicū quē uictum præſcriberet. Quemadmodum enim nō una pituitæ eſt ſpecies, ita neq; unū uictus rationem eſſe oportet, ſed uniuicū ſpeciei idoneā. Ac in omni medicina idem præſtandum eſt, & id quod uniuicū ſalubre eſt querendum. n. t. autē iſ qui medicamēta quærit, promptē ea poſſit inuenire, & nō aliunde cūm Antidoti, tum purgationis colligere cogatur, expoſui hic diſcrimina, adiuncta eūſ diſtinctione, qualia in quibus uſurpare potius oporteat.

De fomentis & cataplaſmatis.

Fomentis autem, & cataplaſmatis per initia ſtatim uti ſeſtinandum non eſt, neq; cum copia humorum in toto corpore ſuperat. Metus. n. eſt ne dum uiſcera nimium inealeſcunt, laxanturq; cōfluxus quidam ad partes affectas decumbat, & adacta illuc inflammatione, præterquam quod, nihil proficimus, magis etiā offendamus. Quod iſ quoque faciunt, qui priuſquam totum corpus recrementis fuerit liberatum, cataplaſmatis, & ſuperſuſionibus nti non uentur. Ego itaq; noni etiam inflammationes, quæ non erant, ob præcipuam iſporū ſum ſuperuenire. Ne igitur officina, laborandū eſt copia iam imminuta, & cum iam concoctio quidam in urinis apparere incipit, caleſcencia, aut laxantia ſi uſus requiratur, uſeribus inducere. Fugito autem fomenta, aut cataplaſmata, quæ laxare tamen, & quæ repellere poſſint, mixtam nero conſeſtionem iſporum parato. Et ſi quidem uſcera inſirmiora, & deſluſionibus opportuna uideantur, ægerq; ſatiſ diat, aſtringentium, & roborantium uires intendere oportet, ſin autem inflammatione, aut dolore uentur, laxantia potius. Summatim utrūque, medicamētum laxantiſtum repellentiſ, uires pro cauſa urgete, & intendere, & remittere conuenit.

De ſtomachi imbecillit, & mediocriter inflammatione laborantiſ fomento.

Ad quinas uini partes miſceo opbaciū quaternas, chamæmeli binas, & maſtiche momentum. Quod ſi inflammatio ſeruens appareat, etiam ſi gleuicenis, aut nardinum adieceris, nihil nocet, ſed plurimum quoque iuuabit. Sin autem os uentriculi non inſirmum æger habere, aut cibum nō ſatiſ ſuſcipere uideatur, loco uini decoctum fomentum admiſceas, glandemq; unguentariam, & ſcannugineam prius in illo decoquendum. curato. Hanc quoq; animaduersionem in cataplaſmatis ſeruare ratio eſt, n. mixta in iſtis ſit curatio, & utrobique ſane anethum, aut cyprinum, aut nardinum cataplaſmati ſemper adijciatur. At ſi a coris, aut frigiditatis in ſtomacho ſenſus eſt, etiam in decocto in quo illa parantur, nardum Gallicū, abſinthium & anethum adiungere eis oportet. Cum ſalſum humorem uomunt ægri temperamento calidi, ſolm quoque chamæmelinum oleum adijcere ſemper, & maſtiche momentum inſpergere condici. At tempus cataplaſmatum eſto hora, ante accēſionem, abſq; plurimo potu, & impoſita non diu inharreſcant. Quippe omnia, ſiue fomentum, ſiue cataplaſmata fuerint, etiam ſi maxime ea quæ ex medicamētis omnibus, quæ robur adſerre poſſint, apparare potuerit tamen ſi diurnis corpori incumbant, niriū reſolutionis, & imbecillitatem efficiunt. Tantum de fomentis, & cataplaſmatis dictum ſit. Si enim particularium quoque nonnihil prætermiſſum ſit, id ratione

ratione quis adinuenire poterit, si omnia consideret, & animum ad id quod conducit intendat.

De purgatione.

Materia iam attenuata diffusaq; oxymelite, & alijs quæ in cibis extenuare solent, & decoctis, & cataplasmatibus adhibitis, tunc demum, ad purgandum eam venito, valde enim à vacationibus adiuvantur. Non oportet autem vniuersi ipsos purgare, sed per vices, & simplicioribus: hinc demum aliquanto valentioribus. Cum enim materia sit crassa, liuidæ facile ijs cedit, quæ vniuersam celeremq; vacationem præstant. Agarici igitur scrupulos tres aut quatuor ex melle exhibeto: in teram etiam plus, aut minus pro ægrotantis viri ratione, & humoris qui superat, quantitate. Quippe pituitam educit, nec morbum inueterari sinit.

Aliud. Et granum Cnidium, si post concoctionem datur, diutius mis Quotidianis medetur. Adhæc catapotia quibus ego semper, & in Quartanis & alijs affectibus vti soleo, benefaciunt in resperam data. Habes ipsorum descriptionem alibi quoq; proditam: hæc autem recipit. Aloes vnciam, cucurbitæ syluestris vncias duas, scammoniz vnciam: bdelli vnciam: gummi vnciam: nitri Alexandrini semunciam: in alio exemplari habetur sciscum. Succo brasicæ excipito, datoq; eis ex scrupulis quatuor, aut quinque: nihil metuens, aut rursuouem, aut nimiam purgationem: vacuât sine omni molestia non modo pituitam, sed etiam humorem melancholicum, eo quæ circuitus quatuor finiunt. Dato hæc catapotia, granorum instar figurata, in quibus multa cruditas, erapula, & vita ociosa præcescit, temperamentumque est pituitosius, & quod nihil siccum, aut acre obtrinet. Nam in eiusmodi tuto datur: & qui hæc assumunt, valde adiuvantur.

*Aliud quod citra molestiam sumitur, à sale dictum
Gracis Halasium, admodum
efficax.*

Gingiberis, petroselinum Macedonici, epithymi, laferis, cumini, apij seminis, ligustici, singulorum vncie quatuor: scammoniz vncie tres, & semis: salis communis, & torrefacti vncie quatuor.

*Aliud rescriptura Halasium habet
præstantius.*

Gingiberis semuncia: petrosellini Macedonici, epithymi, laferis, apij seminis, ameos, cumini, ligustici, piperis, singulorum drachmæ duæ: salis torrefacti vncie duæ, semis: scammoniz sciscia, scrupuli sex. Dato vespere in febrium intervallis, quando cunque velint. At si aliu emoliri velis dato cochleate vnum: sin autem plus purgare cogites, duos: ac in robustioribus viris scrupulos septem exhibeto: in pueris & mulieribus grauidis, & in summa sin imbecillioribus tribus, vel quatuor scrupulis vacationem moliaris. Ita sine omni molestia, & periculo offerentur, Licet etiam cum

pane date, & ex posca, & oleribus. Attamen præstat in morbis, qui per circuitus reuertuntur, cum pituita cremore ipsum præbere. Tantum etiam de purgationibus dictum sit.

De antidotis ad Quotidianas.

Syracis calauitis, iridis illyricæ, myrrhæ, singulorum drachmæ quatuor: opopouacis, piperis, galbani, opij singulæ drachmæ. Hæc trita omnia in unitatem cogito admiscens eis mellis quod sufficit, ac dato fabæ ægyptiæ instar ante accessionem in lecto decumbenti perunctoque ex oleo, & pipere granis decem: iuxta uero appositæ sint prunæ. Hoc somnum, & sudores excitat, leuatq; præcipue, eos qui multa cruditate scatent.

Aliud.

Agarici, gentianæ, singulæ drachmæ dantur cum mulla ante accessionem. Hoc medicoriter extenuat, meatus infractos aperit, & materiam per aluum, & vrinas moderate ducit.

Aliud.

Decoctum chamedrys ijs quos Quotidianas febris circuitus affligit, potioni dato. Vrinæ multas ducit, & leuat. aptum ergo illis, qui non valde febriunt, neque temperamento calido sunt, & sicco.

*Antidotum ad quotidianas, facit etiam
ad quartanas.*

Opij, oppopouacis, castorei, seminis dauci singulorum drach. quatuor: xugatis paulum mellis adijceto, viris obulato res, pueris duos exhibeto. Vtitor autem hoc tanquam admixtibili ex multis hora ante accessionem, & præferim quos non falsa pituita urget, nec bene, calidum siccumque temperamentum ineit.

De unctione.

Unctione utemur ita, ut ad horrosi febrisque magnitudinem, & ægri vires respiciamus. Si namque multa perfrictione, & horrore infestant, febris non adeo tibi uehementis appareat, neque vires imbecillæ, sed robustæ, magis utitur ualidis unctionibus, quæ externam cutem calefacere, ad ruborem perducere, & extenuare possunt. Si contra, neque vires valide, neque frigus multum, ac febres uehementes fieri videntur, tunc ijs utendum erit, quæ cutem modice extenuant, & rarefaciunt. Dicamus igitur de unctionum differentijs, hoc ipsum præterea distinguentes, quæ nam ualentiora, quæ uero imbecilliora existant.

Vncio valida.

Pyrethro, pipere, & nitro pari portione cum pulegij momento, in unitatem coctis, & ex oleo contritis, summas corporis partes, & spinam perungito. Sin autem frigus etiam in ea percipitur, mirifica est unctio, & ualde proficit, uehementem perfrictione, morbi quæ uehementem expertis.

Alia medicor.

Piperis grana tria, & micam thuris in leuorem trita ex oleo illinito.

Alia.

Alia.

Nitro ex oleo trito fumus ægri partes, spinamq; , tum in balneo, tum extra illud perficari iubetur. mouet enim sudores, & iuuat.

Alia valde bona, & multis experientis comprobata.

Arthemisij Crocodiliadis, adipis Crocodili stuitatilis, singulorū vnciæ sex: olei sesartius. Coctis ex oleo ægri & præsertim eius spinæ ante accessio nē vngito, ac miraberis efficaciam. Nō abs re est et odoratū quid admiscere, eo quod unctio ingrati sit odoris, & cōtraria quadā ratione operetur.

Alia in quibus febres vehementes vrgent, & frigus moderatum apparet efficax.

Spumę lebeti in balocis effervescētū oleū admisceo, dū visci crassitudo fiat, vngitoq; corpus, antequā febris inuadat. Idem naturaliter prestat.

Naturalia, quæ corpori alligari solent.

Lapis Ac ties cum ad alia plurima, tum ad rigores, qui per circuitus reuertantur, & præsertim ad quotidianas facit, sic corpori alligetur.

Aliud quod appendi solet, multis experientis de me probatum.

In folium oleæ ex comuni atramento inserto, Ca, RoI, A. Capito autem folium oleæ ante solis exitum, & collo suspendito.

Aliud naturale ad Quotidianas.

Animisculum quod desidet, & texit, ut mscas vneatur, bene facit, si linteolo illigatur, & sinistro brachio appendatur.

De Quartana. Cap. VIII.

Quartana febris non una est species, sed multiplices, & diuersæ existunt. Etenim alia ex flaua bile nimium adusta, alia ex seculento sanguine nascitur, non solum autem materia, sed etiam loco in quo constituuntur, inuicem differunt: hæc enim in uasis, illa in liene potius subsistit. Quoniā igitur diuersæ sunt species, curationis quoq; modos diuersos, & non unum, sicut nūlgares arbitrantur, esse oportet. Nanq; ab humore melancholico creatur, merito calefacientibus humectantibusq; innatur. Quæ uero ex nimia bilis adustione prouenit, humectantibus, & refrigerantibus, ut peponibus, uua, ostreis, pisciculis, aqua, & breuiter temperata, & refrigerante uictus ratione, ac balneis tepidis tractari debet. Mihi itaq; frequenter inbit mirari, quomodo Diuinisimus Galenus in omnibus nō alium quendam uictum, quam qui calefacere ipsos & siccare possit, præcipere uideatur. Præbet enim ipsis antidotum Diatrion pepperon, & quod Diospolites dicitur item liqnotem Cyrenaicū, & Theriacam: & in cibo, salsamentum & piper. hoc autem potissimum quotidie bibere insit. In nūuersum præcipit abstinere ijs, quæ refrigerant & humectant eo quod humor, inquit, morbum efficiēs frigidus existat. Verum est humor melancholicus calefacientia desideret non tamen necessario etiam siccanibus indiget, si quidem frigidus est & siccus,

calefacientibus, & humectantibus opus habebit. At non uidetur etiam humectantiū aliquot pro sua uelle præscribere, sed è contrario omnia quæ siccant assantq; nimium, & humorem crassiores potius reddunt. Nam quæ nidentur magia extenuare, cum sint etiam paulo calidiora, quam ut medicriter extenuet, postea tectiores magis, & multo quam prius crassiores efficiunt, dum humiditatem quæ in eis subsistit, exuunt, insuuntq; ut natura ideo recrementa lentius excoquat. Didicimus enim concoctiones omnemq; nitæ originē calido fieri, & humido, id quod etiā in externis uidere licet. Nam fructus & singule stirpes à pluuijs, & solis calore producantur, & præterea omnia quæ præter naturam existunt, cōtraria ad curationem requiruntur: quæ secundum naturam, sunt similia potius. Quare hoc est præstantissimū medici officium, ut calidum quidem refrigeret, siccum autem humectet, frigidum calefaciat, & humidum siccet. In summa, ut ea quæ sunt uicia ac affectus, contrariisq; usu euineat, ac omnia quæ res postulat curiosè persequatur, omniq; arte & ratione, tanquam in bello decertans, ægrum conferuet. Si quidam igitur accidat ægrum & sicciorē quoq; uti uictu, uel quod appetat, uel etiam quod ita laborans siccantia medicamenta aut cibis requirat, nempe hydrogrum, uel conditum, non eiusmodi aliquid præsidium, consulo & tunc, ubi semel, aut bis eo fuerit usus, ac corpus modice incalecat, rursus statim ad uictum per initia institutum, qui leniter humectare, & calefacere possit, reuertit. Ita enim neque ea quæ calefaciunt, assumpta multum adeo nocere poterunt: & præterea humor qui natura ad mouendum difficilis, & siccior erat facilius solui poterit, ut ipse remissus post dissolutionem, & quodammodo excerni incitatus à medicamentis, quæ benigne euacuat, citra noxam paulatim subtrahi queat. Etenim sic agendum est in crassioribus siccioribusque humoribus, ac humectare ipsos, & dissoluere cōuenit: nec diutius dissolutionem eorum expectanda est, sed protinus ad purgationē ipsorum properandū: & si adhuc res postulat, rursus humectando, tū balneis, tū uictu ita subducere expedit.

Quartana, quæ ex nimia flaua bilis adustione exciatur.

Quod si quartana non tibi à siccis, frigidoq; humore, sed potius bilioso, & plus faris adusto excitari uideat, tūc potius refrigerare potentibus uti oportet: si quidē eger et natra calidus simul & siccus, etate uigēs, & frigide potiones assuetus appareat, adhuc si anni tps sit æstiuū iinterim uero si et cūrig, nigilij, tristitia, ira, & acris medicamentorū usus præcellerit. Neq; nō oīa biliosa, & ex adustione nimia quartanā generare possint. In his igit nō peccaueris, si potionibus, et cibis frigidis utaris, ut peponibus, si tps dederit, duracinis, inrybis & lactura, breuiter nō offēdes, si oīa agas q in germana tertiana tētaueris. Nulla enim alia rōe humor q à

K caliditate

caliditate, & siccitate inspissatus fuerit, euinci potest, nisi quædam refrigerantia humectantiq; adsumpseris, quemadmodum etiam quæ à frigiditate inspissata sunt, à calefacientibus. Hæc igitur, vt diximus, vniuersa calefacientiâ, et si extenuare videantur, tamen inspissant prætere. Quare in his offensa non sunt vt quæ eiusmodi humorem crassum reddant magis quam extenuent, præsertim quæ vehemētius calefacere, & inspissare prædicantur. Quare neq; in quartana cataplasmas, aut superfusionibus, somentisq; vt studebimus. Quippe vñctio sola quæ ex copiosiore hydrelæo paratur, frequentius à balneo, & cibis temperatis adhibita calorem abunde contemperare, ac lenire potest, & si quæ in icore durities est, hanc quoque laxare. Sin autem res postulauerit, ipso quoque solo potius vt oportet, vt etiam chamæmeli decocto in quo ablinthij thuriones, palmulæ piogues, & melliloti deferbuerint. Noui me in quartana etiam frequenter epithematis vsum, tempore quidē opportuno, vt in tertiana ante accessionem, ex farina ordeii, lini semine, & decocto chamæmeli, ac multū profecisse, vt eger vō amplius accessione expertus, fuerit: præsertim autem in quartana, quæ ex nimia bilis adustione concitata erat, ac in pueris temperamento calidioribus, in quibus inflammatio quæpiam præcordia excutit, talia probari videntur. At si quis etiam in frigida quartana, (sic enim appellanda est, quæ ex frigido, & sicco humore melancholico excitatur,) superfusione item calidiorē autē accessione vtatur, hic item maximum adiuuentum sentiet, vt etiam subito febris conquiescat, quamuis molestam accessiōnem ægrum experiri contigerit. Satiū autem est, si quis etiam toto antea vacuato corpore superfusionibus, omniq; alio particulari præsidio vtatur. Qui enim toto corpore adhuc sordido, ac impuro, vel cataplasmata inducere, vel perfundere aggrediuntur, hi insignium malorum auctores fiūt. Cæterum quartanas ex adusta bile consistentes purgare decet, corpus prius humectando pleniorē cibo, & quiete: quæ vero ob humorem melancholicum procreatur, humectare quidem eas oportet, (sic enim humor ille existit,) ob terrestrem vero eius partem, & frigidam, tum calefacere, tum extenuare conuenit. Purgationem autē non per febris initia, sed cum concoctio iam appareat, moliri, debemus. Ita porro etiam si ægrum sanguinis vacuationem requirere censes, vt ex quo humor melancholicus procreetur, in statu, cum humor quoque à natura cōcoqui solet, tentare eam cōuenit. Tunc enim leuata natura reliquis materiæ euincit, id quod tibi concoctio in vrinis apparens indicat, ad medicamentum purgans, nempe, quod ex Rhodomelitel conficitur, bilem, & humores nimium adustos sine molestia purgans hoc præstare debet: habet autem in hunc modum.

Purgatio ex Rhodomelite.

Succi rosarū sextarij duo mellis, sextarius: scāmonie torrefactæ vncia. Omnia simul coquuntur, danturq; ad summum cholelearia duo, vel minus. At si humor biliosus nō admodum calidus, & siccus, sed crassior, ac pituitoso humore adulteratus esse videatur, paulū agarici prædicto Rhodomeliti adijciendū erit: atq; in eū modum hic quoque leniter purgari debet. Vt autē prompte cōponas medicamentū, paresq; subscrībam eius quoque mixturā, quæ ita habet. Rosarū succi libra: scammonie vncia: agarici vncie quatuor, piperis scrupuli duo mellis vncie sex. Ad ignē lentum hæc coquito, ac vbi in crassitiem coierint, adijcito scāmonis mī & piper, atq; vitior. Nam sine omni adeo molestia vacuar, præterquam quod non multū calefaciat.

Purgatio quæ ex malis cotoneis paratur.

Mala cotonea octo impleto scammonia, cōsius modus sit vncia, & extrinsecus ea sermētō oblinito atq; sic affanda dato: vbi affata probe fuerint, adijcto mel probe leuigatū ac vitior pro vrinum ratione, in febribus quæ à bile excitātur & in ijs, qui generosam purgationē ferre nequeunt: atq; in pueris magis, & mulieribus, nā citra omne prorsus molestiā purgat, sin ipsum efficacius reddere volas, in istum modū parato. Scammonie vnciā: petroselinæ Macedonici vnciā, piperis albi vnciā: agarici semunciam, succi cotoneorū vncias sex, succi citrinorū vncias tres, mellis libram. Dato instar vnciæ. Succi melle coquito, atq; ita pulueres leuigatos inpergito, ac in pinide recondepro cū fiducia. Est enim præsidium in multos vsus acōmodatum, vt quod non solū bilem, sed etiam pituitā & humorem melancholicū repurgare probe possit. Atq; idcirco quartanas quoque: talis exhibere licet, in illis autē magis, quorū stomachus affectus neq; concoquere bene, neq; appetere cibū potest nec nō ijs qui quoridianis infestantur. Hac de causâ varijs in mixturis ad omnia præparare cōducit.

De vomitu.

Vomitus omnibus vtilissimus est, præsertim ijs qui humores crassos in ore vētriculi continent. Nō crassitie extenuat, & vt cōcoquatur, celeriusq; discutiatur, efficit. Optimū autē tempus ad vomitum est accessione incipiente: quoniam etiam tunc humores, cum materiæ mouentur, & illi in stomachum consiliūt, illūq; rodunt, nauseam excitāt. Dato eis nullam non nimis aquosam: ita vanaq; proclius ad excretionem prorūpent, qui autem valde lenti, sunt, & difficulter auelli possunt, ægrius excrentur, ac penitus præcipue austerinis videntur. Si enim ex lēcis humoribus aliquid sursum educum fuerit, statim etiam accessio minuetur, tum spacio temporis, tum humore ac cōsuetudine. Ego enim nonni me hoc modo inueteratas quartanas discussisse, vt nonnulli ipsarum superata iam deteriore parte conquiescerint.

De falsamentis.

Salsamentis autē in illis nimirum, qui ab humore melancholico excitantur, & in quibus stomachus visiosis humoribus scatet, aut multa lienem vrget obstructio, vtendum est. Maxime hic commendatur etiam Encathera dicta, & quæ Alexandrinorum Buridia sunt, Menomenia, & Membridia. Oportet autem eam, qui horum aliquod assumit, aliquandiu sitim tolerare, & nullā potionem ingerere, vt efficere quid possint, & vim suam corpori imprimere: deinde vbi ita viribus destituitur æger, vt sitim ferre nequeat, tunc vinum Ascalonites, aut Gaaites dilutum quantumlibet, propinare licet. Ego itaque noui quendam ex his qui Quartana ex terrestri & frigido humore laboraret, ita huius victus rationis vsu liberatum, vt etiam per alium humorem superatē excreuerit. Erat autem id quod excreuerat adeo valde nigrum, vt nonnullis medicorum metū incuteret, non modo ob colorem, sed etiam propter copiam euacuatā. Verū quod eger paulo post morbum facilius ferre inceperit, & quod lien, qui antea maximus erat, paruus euaserit, effecit, vt omnes bene sperarent, & nihil amplius metuerent. Sciendum vero est, quod eibi enumerati, & quicquid abstergere, & extenuare medicriter potest etiam cum concoctio incipit apparere, humidioribus tēperamentis, frigidioribus, & bene habetis dari debet. Etenim humores tū magis & repurgantibus, & extenuantibus proptē obediunt. Qui enim per initia, cum materia planē efflet incocta, extenuantibus vel purgantibus vsi sunt, hi præterquam quod nihil eorum quæ superabant, in corpore vacuare potuerint, etiam sicciores crassioresq; humores effecerūt. Si itaque talis sit Quartana, quæ à frigido, & terrestri humore concitetur, ita agere oportet. Sin autem à bilioso humore, exulto, & in cinerem redacto prouenerit, omnia contraria, quæ humectare, aut refrigerare possunt, tentare conuenit: balneum dulcis aquæ adhibere, & cibos tēperatos. In summa quoad modum diuersas habent species, ita quoque differentem ipsarum victum præscribere oportet.

De antidotis.

Nonnulli veteres Quartanarijs, etiam antidota dederunt ac multas variatq; descriptiones ab ipsis proditas inuenire licet. Quin & Diuinisissimus Galenus ea memorat quæ prodidit, sed nulla videtur vsus distinctione: unde pleriq; cum eis quæ titulo ipsa promittebant persuasi, deinde non exquirit discretione exhibuissent, maximè offensionis & periculorum auctores extiterūt. Miror sane, cur antidotum ex liquore Cyrenaico paratum omnibus connexisse dixerit, iubeatq; frequenter eo uti, atqui nō videtur res sic se habere. Neq; enim citra offensionem quis ipsum hominibus calido, siccō, & bilioso temperamento præditis, &

in Quartanā ex nimia adustione prolapsis, bibendum dederit. Attamen nec ea quæ ex sulphure uiuo, & pipere confecta sunt neq; Theriace antidotum dari debet. Hęc. n. n. uersa istis aduersantur. Quare præstat eis, si fieri potest, nullum antidotum exhibere, uerum sufficit, uictu potius refrigerante, & contēperante, nec non ijs quæ superflua repurgant frequentius uti. Sin autem antidoto interim uti cogaris, illa potius in Quartanis ex adustione nimia ortis propinanda putes, quæ constant ex opio, cicuta, & alterco, item quæ urinum prouocare possunt, ita ut non ualde calefaciant, idq; in eis præcipue, quos uigilia, & suis comitatur. Nam somnus ante accessionem obneptiens frequenter impediuit, ne accessio in totum obotiretur, aut effecit, ut moderatior esse feret. Porro ut antidota à me dicta facile inueniantur, necessariū duxi compositiones exponere maxime illorum, quorum etiam antea in Quartanis, quæ ab humore Melancholico excitantur, multam habui experientiam.

Antidotum ad quartanas, quæ ex humore melancholico confluunt.

Castorei, papaueris, mirrhę, piperis albi, liquois Cyrenaici, singulorum drachmæ quatuor. Liquirem læuigatum & aqua maceratum reliquis adjecto, singitoq; catapotia, & dato ante accessionē ieiuno, aut cenant ex aqua. Præstat si egrū ipsum etiam perungas, nempe oleo calido, quod nitrum admixtum habeat.

Aliud etiam ad quotidianas efficit.

Opoponacis, opij, castorei, alterei seminis, singulorum drachmæ quatuor. Læuigatis paulum mellis admisceto, datoq; adultis quidē dimidiz drachmæ instar, pueris aut hora antequam inuadat accessio obulos duos.

Aliud ad Quartanam.

Liquoris Cyrenaici, piperis, mirrhę, rutę folia, singulorum drachmæ quatuor. Detritis, probeq; mixtis ante accessionem ex oxymelle utitor.

Antidotum Acriston.

Facit ad multos interiores affectus, præcipue uero ad Quartanas. Croci uncia, opij uncie septem, galbani uncie septem, casia uncie tres: si racis uncie septem, myrrhę uncie quatuor, castorei uncie septem, costi uncie tres, piperis uncie quatuor, spicę nardi uncie septē, mellis despumati, quod sufficit. Datur fabæ ægyptię instar ex malsa ante accessionem.

Antidotum quod & ipsum mirifice ad Quartanas ualet.

Styracis exquisiti drachmæ quatuor, myrrhę drachmę duę, opoponacis drachmæ quatuor, iridis scilquid drachma, piperis drachmæ sex, galbani drachma, lachrymæ papaueris drachma. Datur subę ægyptię instar melle exceptum hore ante quam accessio inuadat.

Pastillus infignis admodum ad Quartanas.

Opij veteris, ruxę foliorũ, singulorum drachmę dug: croci drachma, alterci foliorũ drachmę dug. Contusa increta, læuigatąq; in pastillos redigito, qui singuli scrupulos duos pędeant. Ac dato horis duabus ante accessionem ex posca, pro ægri virium ratione.

Pastillus alius benefaciens admodum

Quartanis.

Piperis albi, seminis dauci Cretici pares portiones. Contusas incretasq; ante accessionem ex multa aqua calida cochlearij mensura dato. Hoc pterosq; cũ simplicius sit, adinuit quartanarios.

Pastillus alius præstantissimus, ut nullus alius,

succurrens turasq; cellerrime elicit enim

sudores, atque ita morbo diuturno

ægrum liberat.

Opij drachma, piperis longi, castorei, singulę Mulso conformantur. Dato singulis obolum ex oaymelite lotis, & in lecto repositis. Hoc multos sudores euocat, & magna ea parte bis, aut ter potum liberat. Hæ omnes validę sunt antidotorum vires, ad calefaciendum, & attenuandum efficaces. Quare etiam Quartanis potius, vt diximus, conueniunt, quę à melancholico, & terrestri humore excitantur adulteranturq; à pituita, non autem continue, sed per longa intervalla exhiberi debēt. Nam liberalior eorũ vsus humores multo adhuc sicciores, crassioresq; efficit. Tantius autem dantur, cum concoctio iam apparuerit, & vires sint robustę, ac ægri multum ad hoc inclinationem habent, qui & à nobis medicamenta fumere consueverunt, & nos pharmaca sibi offerre compellunt. Sunt enim nonnulli non modo barbari, sed etiam alij pleriq; opinione ac ratione aliena præditi, vt etiam secari vtiq; præ omni medicina malint, ac eos qui hæc faciunt, scire aliquid arbitrantur, innitantq; studiose in edes suas, & præstantiores hosce medicos censent, quam qui uisum præscribunt. Si igitur nostrum aliquis dare quid eis cogatur, qui calido siccisq; tẽperamẽto sũt, & ex nimia flaue bilis aduisione Quartanę expe-riuntur, illa offerret antidota, quę uim non adeo acrem, & calidam possident, sed quantum licet, ac uacant, & si fieri poterit, refrigeratĩa potius, & ad somnum inducendum, sensimq; attenuandum efficacĩa obtinet, qualis est etiam Xenocratis pastillus, cum ad alia pleraque utilis, tum uero enimic, & ad Quartanas, & ad Tertianas. descriptio ipsius in hunc modum habet.

Pastillus ad Quartanarios ex nimia flaue bilis aduisione.

• Seminis papaueris hortensis, lachrymę papaueris, singulorum scrupuli duo: alterci albi, succi

dolcis radiculę singulorum scrupuli sex: styracis, anisi, singulorum scrupuli quatuor: croci, castorei corticis ni andragorę, singulorum scrupuli tres. Arida contusa, increta q; succo, sapa nel passo Cretico ueteri excipito, ac utitor cum fiducia in his præcipue, quos uigilia comitatur, aluus profuit, os uentriculi fluxione laborat, & dolor Colu-
lum exercet.

Aliud simplicius.

Decoctum scopiuri herbę mariscę prope omnibus auxiliatur, si ante accessionẽ bibatur. Iuuat enim non modo ratione naturali, sed etiam quia materiam per aluum & uomitus educit.

De lapide armeniaco.

Lapis qui Armeniacus dic itur, siue lętus, siue illozus offeratur, quatuor siliquarum pondere mirabiliter ad omne Quartanę speciem ualet. Nam humorem melancholicum ut nullum aliud præsidium euacuat: sed lotus quidem aqua per inferiora magis purgat: illozus autem per uomitiones citra calorem, non quemadmodum abi. Si uero nonnulli lapidis potionem odio habuerint in catapotia redigito, his medicamentis ei adieciis. Aloes scrupuli quatuor: epythimi scrupuli tres: agarici scrupulus: lapidis Armeniaci scrupulus: gariophylli grana quinq;: scammonię scrupuli quinq;. Excipio succo Citrij, aut Croco melo, aut Rhodomelo, aut Rhodomelite. Dantur scrupuli duo. Profigiunt etiam catapotia ex epythymo absque scammonia, habent autem in hunc modũ. Abinthij succi drachmę quatuor: me dulle cucurbitę syluestris drachmę: aloes drachmę dux, mastiches drachmę tres: epythimi drachmę dux. Datur noctũ catapotia. Benefaciunt etiam ad niendaces Quartanas, quę paulum quousque pituitę habent admixtum.

Aliud antidotum mirificum ad multa efficacissime uero Quartanis.

Vetustum capitis dolorẽ finit, vertiginosũq; affectum, comitiales accessiones, & uigilias sopitis insaniam quę Mania dicitur, sed at magnos oculorũ dolores lenit: fluxionẽ doloręq; denitum di sentit: spicadĩ difficultatem, omnemq; asthmatis causam abigit, tussũ uetustę, peripneumonię, & pleuritidi medetur, cum siccę, tum humidę: omne à pulmone humiditatis uitium dissipat, spũta tenuia mitigat, & ednstroni parationem ex hydromelite potum efficit. Sin autem quis sanguinem spuerit, ex oxymelite, aut posca, aut polygonij succo, aut plantaginis drachmarum duarum instat dato, pro ægri uiribus ponderi paulum quiddam adijciens, aut detrahens. Ceterum hoc antidotum stomachi est præsidium. Nam ex humiditate cibosq; imbecillẽ quẽ astringit, & firmat, scibosque ob uomitiones

non continentem roborat, & omnes uentriculi inflationes per ructus discutit, & punctuq; iecoris dolores mitigat, & Arquis morbia auxiliatur. Nam unamquamq; partem ad priorem naturam reuocat, & atrabilis morbum, quæ Melancholia dicitur, diuturnum, & turbulentum, nigiliasq; leuati lenis grauitatem subtrahit, & faciei colorem relinquit, pituitam bilem per intestina detrahit, caliditatem intestini partem suggerit, distributionis meatu aperit, urinas segregat, & ueluti renes inuadit, atque ita ex cisternæ arenas tum sanguinis grumos ad uesicam propellit, renibus ac uesicæ medetur, urinae difficultatem reprimat. Omnibus porro prædictis affectibus potu assumptum opitulatur. In ileosis autem morbis, & Cæliaci hæc potio ueluti uiam preparat, inueteratum sterces subducit, ueluti tamq; inflammationem resolvit, tormina lenit, distentionem uasorum remittit, & quietem inducit, non ueterini modo, sed somno concilians. Qui igitur per os id assumere nequeat: his iniecio per aluum cum scæniæ græci succo, & dolore liberat. Iam plurimū auxiliari potest uteri, ut aiunt, calamitibus. Quippe dolores quoque ex partu solatur, & uigilias molestissimas imminuit, elationem distentionemq; uteri molit, morbosam purgationem reficit, recreatq; & angustos uasorum meatus dilatat, sanguinis in utero profusum acutius, magisq; subitum non modo potu restringit, sed etiam uino calente in ipsam infusum sistit, item notus abscessio, & heruorum conuulsio de potu mitigat. Vimur eo in Articulis, & Podagricis, ac plurimum id opitulatur ægris compertum est. Maxime uero inuenias medicamentum uim istam in uirulentis, non modo si per os exhibeatur, seruire, sed etiam si locis oblatris illinatur, proficere, ac in uehementibus periculis utroq; modo antidoto utendum est. Itaq; non solum in continuis febribus, ardētibusq; & colliquantibus, quæ synecticæ græcis dicuntur ex aqua, uel mulla sumuntur, ac maxima cyclus eius promittit. Datur ægis drachma instar hora una, aut duabus ante accessiōnem in Quartanis autē copiosiore utor medicamento, eo quod diuturnius malum inhaereat, & ægre rescit possit. Qui medicamentum hoc domantis, incomparabile ipsum esse asseruabat. Hæc est ipsius copiosio. Myrræ scrupuli septē, Sæzæardi scrupuli tres, croci, scrupuli quindecim, castorei scrupuli quatuor, opij scrupuli octodecim, amomi scrupuli quatuor, anisi, scrupuli decē, per os felini Macedonici scrupuli quindecim, apij seminis scrupuli duodecim, iunci quatrati floris scrupuli nouem, casæ Aegiptiæ scrupuli quatuor, pipæcis albi scrupuli quatuor, pipæris nigri scrupuli quindecim, sysonis Syriaci scrupuli duodecim, styracis scrupuli sex, seselidos scrupuli quatuor, Hedichoi seci, quod magna dicitur, scrupuli quinque, mellis de sumati quod sa-

tis est. Styracem dilatatam melle soluita, arida super inspergēs. Opus uero ex sapa macerato, do nec mellis fiat spissitudo, atq; sic reliquis adijcto.

De balneis.

Sciendum est, balneis quoq; sic utendum esse, ad unamquamq; speciem respiciendo, calidioribus quidem in ijs, quæ ex humore melancholico excitantur, temperatis autem potius in illis, quæ ob nimiam humoris biliosi adulationem proeunt; adhuc exercitijs similiter, & frictione, sed minus in calidioribus.

De uisione.

Præterea unctio interdum quidem adhibenda est ex oleo epyrino, aut gleuicino in frigidioribus Chamaemelino autem, uel oleo dulci, aut hydrelyzo, in calidioribus. In summa pro uaria hois specie, diuersa quoq; curatio adhibeatur. Frictio nē tā, ut maximū præsidium, si quid aliud adhibere conuenit, nūc copiosiorē, nunc pauciorē. Satis igitur sunt, & dicta iam remedia, & uniuersa uictus ratio, si quis oīno perseveraret uti uelē diuturnæ Quartanæ medebitur. Quoniam uero nonnulli negligentes inueniunt, ne morbus diutius moreretur, & multis corripiantur accessiōibus, omnibus desiderant uti, & naturalibus simul, & his quæ alligantur, necessariū duxi propter huiusmodi hæc quoq; exponere, si quid a nobis ex longō tēporis usu, & experientia cognosci potuerit.

Medicamentum.

Medicamentum, quod appendi solet ad quartanas, sæpe a nobis multis experimentis comprobatum. Scabazur Quartanios curat, oportet autem ipsum uiuum extrinsecus fuluo lineoleo firmiter alligatū, collo suspendere. dicunt autem hoc ipsū prestare, si ita appēdatur. Est hoc quoq; uerum, usu multo compertū. Lacertam uiridem appendito, item ex unguibus ægri tum manuum, tum pedum exiguū præcisum, sicut facere solent, quibus, ungues præcidūtur, rufo panniculo injicere, & in eo firmiter illigatū ita appendito, ac rursus appendam ipsam soluere unde etiam capia fuerit. Referunt quoq; si quis ex gena hirci pilos acceptos ægro adalliget, mirabiliter Quartanæ posse mederi. Omnium uero naturalium medicorum testimonij confirmatum est sanguinem qui primus a uirgine fuerit excretus, naturaliter Quartanæ aduerari, similiter etiam corrupti sanguinem efficere, si quis ipsum ægro ad brachiale dextræ manus, aut ad eiusdem brachium alligat. Noui ego quendam, qui hac ratione utens Quartanam curauit: dabat mulieri parienti pallium ægotantis ferendum quod ille interius ferebat, illotū, & iam perspirabile postea a partu pallium recipiens, ægro ferendum rursus præbebat. Ac Quartana non amplius in posterum assillere, mirabiliter contarietate quadam, & ratione arcana deprehendebatur.

Ex libris Actij de Erysipelaceis viscerum affectibus.

Erysipaceus affectus nonnunquam viscerum alicui oboritur, qui febrem ardentem, & hæcticam inferat, & si quidem Erysipelas ventriculum obfideat, hinc febris incenditur, quam Lepryan Græci nominant, sin autem iecur infellet, Typhnde; si pulmonē exerceat, Gynodē. Huiusmodi vero febris primum refrigerantibus, & humectantibus, tum cibis, tum potibus, & ijs quæ exterius imponuntur indiget. Quoniam igitur hætica febris alteri morbo non est cōmixta, balneum requirit, quemadmodū etiam alij omnes calores, & siccitates. Quod si Erysipaceus affectus viscera urgeat, abstinendum quidem balneo in totum, frigida autem in morbi vigore strenue videndum est. Ita nominare consuevimus, cum vna vice & frigidissimam, & multam dederimus, verum antestatum frigida non vicimur, nisi ab ægro, qui & frigidæ potioni assueuerit, et sitim ferre nequeat, coacti fuerimus. Extrinsecus igitur imponi debent, quæ refrigerant, & si nihil proficiunt, tunc etiam frigidam potionem dare, aut potius cibos refrigerantes oportet. Maxime omnium conueniunt teneræ, & dulces lactuæ. eluantur autem liberaliore aqua frigida, optime qui dem ita sum-

ptæ proficiunt. Quoniam vero iniucunditatem ipsarum, si ita sumantur, gratiore nonnunquam reddere coacti sumus, aceto copiosiori aquæ frigidæ mixto, intingere illas permittimus. Acerū autē sit tale, quod ab omni vitiosa qualitate prorsus recesserit. Extrinsecus etiam ipsæ lactuæ succus accommodari potest: imo & semperuiui, & serici, similiterq; refrigerantii. Præstantissimum quoque est, quo nos vtimur, ex oliui acerbis, & rhoe. Humorem enim ipsorū expressum in palam cum portulaca viridi conficimus: deinde contusum exprimimus: & comiecto in vas liquare, & orificio exacte obturato, vas in aquam frigidam mittimus: præstaret autem si vas etiam niue obduceretur. In vsu misceimus farinæ ordei tenuissimæ: deinde inaceratum, vt liquidius sit, linteoduplici illinimus, imponimusq; præcordijs, ita vt nobis sinamus inhaerere, sed postquam tepidum euaserit, hoc quidem tollepēs, alterum imponamus, idq; perpetuo consequēter facientes, donec æger altas corporis partes quodammodo refrigerari senserit, & liti minus erucietur. Miscemus autem nonnunquam etiam oleū omphacinum, & rosaceum, vbi Erysipelas inflammatorium præcordia torserit. Atque hæc sanē de febrium curatione abunde dicta esse arbitramur.

DE FEBRIBVS
AETII LIBER.

Febrim diuisio, & de diarijs febribus. Cap. I.



EX morbis ob intemperie oriētibus unus est & febris ipsa, calore præternaturali ad tantam immodestiam euecta, vt angat hominem, & actionem lædat. Differentie huius caloris maioris ac minoris ratione distinguitur, & intra subiectum siue materiam: aut ipsum cordis corpus calore occupante, aut humores, aut æream essentiam. Incipit igitur hæc præternaturalis caliditas, aliā ex alio de predictis, & nisi soluta fuerit, progressu temporis similiter reliqua duo genera afficit. Et si quidem in spiritibus permanserit hic calor, diariā febrem efficit. Si vero humores occuparit, febrem putridam incēdit. Si vero ipsum cordis corpus iniuria affecerit, hæcticam ac habitualement febrem facit. Nam aliqui febricitantes facile solubilem affectum habent, velut calefactū sole lignum. Aliqui

vero ægre solubilem, velut accensum ab igne lignum vt etiam fumum edat. Quidam vero planē exuruntur, velut lignum ad carbonis naturā adactum. Tria igitur sunt genera, diariæ, putridæ & hæticæ. Primum itaque de diarijs tractabimus. Fiant hæc febres, velut dictum est, citra humorum putrefactionem, solo spiritu seruicfacto, & propterea diariæ appellantur. Nam ubi lori sunt egri in prima huius febris declinatione, & cibum boni succi ac humectum. acceperint, non amplius secundo febricitant. Propriū autem & inseparabile signum diariarū febrium est vrinarum coctio in prima die & caloris incunditas. Verum post exacerbationem sedatam, certiores habebis cognitionem. Nam arteriarum motus, per omnia assimilatur motui sanorū quod nulli alij febri adest. Et ipsa bona ægri tolerantia maximum liberationis signum est. Et urinæ multo meliores post exacerbationem quam in febris principio tibi apparebunt. Et si ipsis dum lauantur, neque horror aliquis insuetus acciderit, neq; alia aliqua iniucunditas, & post balneum consequetur

quenter bona tolerantia manferit, confidenter nutrire potes ipsum, & vinum exhibere intepide bibendum, quantum in praesens moderatum est. Facile vero à talibus febribus capiuntur hi in quibus defluxiones corporis non uaporosae, sed aere quid ac fumosum habent. Quare si quando suppressus fuerit coaceruatus in ipsis calor, febri lis efficitur. Auspicantes uero ac externae lacescentes harum febrium cause sunt, lassitudines, frigiditates, uigiliae, curae, tristitia, iracundia, rigor, ardor ac exustio cutis ut difficulter transpirationem admittat.

De diarijs ex lassitudine febribus.

Cap. II.

Qui ex lassitudine febricitant, cutem sicciorē quā qui ex alia quādam diaria febre laborant, habent. Et hoc maxime contingit his, qui simul frigefacti sunt ex multa lassitudine, ut etiam post febris uigorem permāneat ipsi siccitas. Et pulsus his parui sunt. Qui uero non nimium fatigati sunt, his humiditates quaedam, aut uapor calidus eā profundo efficitur. Magni autem sunt & his pulsus. Oportet autem ipsos statim post exacerbationis declinationem, in balneum ducere. Et accurate simul se molliet modico oleo dulci repido perfrictos, aquarum dulcium lanacris lauare. Sed neque si in aere balnei ipsos morari iusseris, quae quam laeseris, propter frigiditatem. Postea quietis studiū prodest.

De febribus ex uigilijs, & ira & tristitia, aut ira.

Cap. III.

Eos qui ex uigilijs febricitant, distinguit etiam coloris species. Est enim subnigra. Sed & oculorū motus manifesti sunt: vix enim attollunt supercilia. Et cavi sunt ipsi oculi, immo etiam siccī. Pulsus autem densiores sūt omnibus ob uigilias, curam, ac tristitiam febrientibus. Qui uero ex ira febricitant, his neque cavitates oculorum adest, neque color ille. Et calor his est amplior, & uelut ex profundo emergens. Ex magni sūt his pulsus. Omnes igitur relati, neque frictionibus neque balneis multis opus habent. Sed multi olei perfrictione omnino nō adstringentur. Atque ubi parum defricti sunt, pro more lauentur.

De febribus ex ardore.

Cap. IIII.

Febrientes ex ardore statim ab uetulo perfrictionibus, sanare oportet, & balneis pluribus dulcissimarum ac temperatissimarum aquarum. Oleum autem modicum adhibendū est, & omnino non affricandum. Sint autem quae adhibentur ex ipsi frigefacientia, omphacinum & rosaceum ex ipso praeparatum sine sale. Facere

autem haec possumus frigida, ut in quo continentur suspenses in puteum ut aquam contingat. Sed adhuc magis salicis aqua frigida, oleum rigefacit, & magis adhuc nix forinsecus uasi circumposita. Persuadendum est autem incipit ex oleo sic frigefacto, lana moderate excepto, ita ut manum in sublimē leuemus, & hoc indolenter faciamus, usque ad febris declinationem: atque ita in balneum dulcium ac temperatarum aquarum decamus, accedens solo aeris balnei per transitum concessio.

De febribus ex frigore.

Cap. V.

Si quis frigefactus febricitauit, suppressis uidelicet fumosis transpirationibus, quae per cutem sunt, & hic in balneum ducendus est in febris declinatione. Caput autem calefaciendū est & ante balneum, & post balneum, in declinatione, ex unguento amaricino aut uardino.

De febribus ex grauidine ac destillatione.

Cap. VI.

Qui ob grauidinem febricitant lauare non oportet priusquam ea concoquantur, si ex frigida aut cruditate destillatio facta est. Caput autem humectandum est icino unguento aut amaricino aut uardino. Si uero ex ardore facta est destillatio capite calefacto, & in star cucurbitae attrahite materiam ex locis subiectis hunc statim in balneum dulcium ac temperatarum aquarum ducere oportet, & in frigidam immergere, & sub salientem locare: In balneis autem frigefacientibus caput humectare. Sunt autem ea moderata, propter balneum.

De febribus ex cutis densitate.

Cap. VII.

Densatur cutis aut ex frigore, aut acerbis qualitate ipsi praeter adueritiam allapsa. Quale accidit etiam his qui in aluminosa aqua lanantur. Ardensissima est his cutis, ut etiam tactu cognoscatur. Immo & calor motus, laevis quidem iuxta primam manus admotionem apparet, aeris efficitur, si diutius actus perseveret. Vinum autem nō uelut alijs suffragantur. Quare non accusamus in his quod alimentum non sentiant, unde corporis moles curabitur. Neque uero oculi caui ac siccī fiunt. Verum sunt quibus humidiores & prominentiores esse uidentur naturalibus eo quod non contingit transpiratio in ipsis, sed materiae magis intus concluduntur. Vnde neque pulsus parui sunt uelut in tristitia, aut cura, aut uigilijs, & ualde immoderatis exercitijs. Curare porro eos oportet aquarū dulcissimarū ac temperatissimarū balneis, post exacerbationis declinationem, & praecipere ipsi ut aliquā diu in balnei aere morerentur, aquandēque oleum

oleum dulce tepidū, & fricatio mollis ac moderata adhibenda. Tenus autem victus præscribendus est, & vinum dandum tenue & album.

De febribus ex fame. Cap. VIII.

Si ob famē fiat febris, ex acerbatione declinante in balneū ducatur, & plurimo oleo tepido dulcissimo perfusi læuissime friciantur, & plurimum tempore in calido solio morētur. Egressi deinde ac viribus reſecti rursus in balneum ducantur, & in calidum solum locentur. Postea egressis post balneiurbationem sedatam, danda est aqua calida potanda, deinde pituitus succus, aliquando etiam pisces petrosi in iure albo parati.

Diata communis omnium diariorum febrium. Cap. VIII.

Diata in febribus diariis omnibus cōmune scopū habet, ut sit ex eduljis boni succi & quæ nō noceant, & nusquam circa mētus deinentur, his quidem qui ex ardore aut ira febriūt, quæ simul frigefaciunt ac hinc etiam frigefactis vero, minus alentia & moderate calefacientia. His autem qui vigilauerunt, aut tristes fuerunt, aut vix vexati, humidus & somnificus cibus congruus est. Fatigati autem plurimum & maxime nutriendi. At in quibus intemperatura corporis calidior ac fieri facta est, eos oportet aliquando circa primum exacerbationis impetum nutrire. Vinum autem dandum est omnibus qui ex diaria febre laborant, aquosum, tenue ac album, quod & concoctionem adiuvet, & vrinæ ac sudores propellat. Si vero qui vigilauerunt, aut tristes fuerunt aut curis vexati, magis in tepide vinum datur. Sed & fatigatis nimum, dandum est quantum superare possunt. Iratis autem priusquam ab affe-
ctu omnino liberati fuerint, minime tutum est vinum dare.

De febribus ex inguinum inflammatione. Cap. X.

Siquidem citra laesentem externā causam in guinis glandularū inflammatio fiat, multitudine sanguinis plerumque in uniuerso corpore indicat. Nam & calor in his amplior est quam in prædictis, & facies rubicunda ac tumida apparet. Oportet igitur celerrime venam secare priusquam materia in inflammato putrescat, ac febrem putridam accendat, post venæ sectionem utendum est tenui dicta, usque ad perfectam liberationem. At inflammationem inguini, ante venæ sectionem adstringentia ac repellentia imponenda sunt post venam sectam, laxantia ac moderate discutientia. Ceterum quibus propter offensionem digitorū pedit, aut aliud quid tale, inguinis inflammatio

facta est, & ea de causa febris diaria conſequuta, tales ne interrogat quidem Medicum quid facere oporteat: sed ulceri ex quo inguinis inflammatio facta est prospicientes, laudatur circa exacerbationis declinationem. Prohibendū autem est vinum omnibus ex inguinis inflammatione febrientibus, donec inflammatio fuerit soluta. Et victus ratiō tenuis ipsi conſtituenda est.

De diariis febribus ex cruditate obortis. Cap. XI.

In corporibus ex malis humoribus vitiatia cruditates necites citius sunt febrem accedunt. Minus autem sit malum, si quod cruditate alua infra erumpat. Non paruum autem malum est, si furia suppressa. Febriunt autem aliqui etiam in quibus profluuium ventris ob cruditatem sit. Si quidem igitur sola corrupta euacuata esse appa-
ruerint: laudandi sunt ac nutriendi in febris declinatione. Si vero plus iusto euacuatio fiat, melius est nutrire citra balneū prospiciendo ventris. Cura vero ventris dupliciter fiat. Si enim non amplius seruat ipsa alua, absinthium modicum aqua macerans coquito cum oleo in duplici uasculo, & ex hoc loco circa ventrem humectato. Deinde lapsum lanæ purpureæ oleo imbutum ventri imponitur. Si vero debilis est os ventris, mastichen cum unguito nardino ad stringentia in crassitudine redige, & purpuræ ex eo imbutam impone. Sint autem ea quæ imponuntur ad faciem calida: tepida enim robur ventris exoluunt. At si adhuc seruat alua, melius est optimū melle uti pro nardino, cum modico vino. Commodum est adhuc & mastichinum. Si vero etiam uenier exuratur post euacuationē, melino similiter utaris, aut cerato ex ipsa parato. Nutriendi porro sunt adhuc fluente aluo, ex polenta & panibus paucissimum acetum habentibus, quos hinc xylopes Græci uocant. Inſpergenda est autem polenta succo malorum puniceorum aut pisorum, aut malorum, præsertim cotoneorum. Vel in ipso eorum decoctum, aut myrtorū. Si vero fluxus cessarit, alica detur, & gallorū testis, & pisces petrosi in iure albo parati, & fructus adstringentes. Si vero inappetentes fuerint, ut auerſentur cibos, ex concoctione medicamentorum ex malorum cotoneorum succo ac melle cōposita, cochlearium unū, aut duo danda sunt. Si autem nō afferit id quod ex succo cōpositum est, detur id quod ex carnibus cotoneorum paratur, cui nihil omnino pipere additum est, aut ualde exiguum quiddam. Si uero suppressatur alua in his qui ob cruditatem ex diaria febre febriunt, si quidem cibi adhuc in ventre continentur, plurima tepida pota, digitis aut penni irosiatis, per uomitum rubebimus id quod moleſtum est rejicere deinde præcordia fouere, & quietem agere. Si uero cibi iam descen-
derunt

ad intestina, reclinatis ipsis ita ut partes circa caput & stomachum solum pergentes habeant, foueatur uenter, & somnus concilietur. Post somnū autem glandula subdetur, ad superfluitates quæ descendunt educendas, aut per mitiorem elytre rem, quale est fursurū decoctum, euacuatio fiat. Dixit sit tenuissima, quæ plurimam exterioriam uim in se habet. Quod si inflatio accesserit, incoquere oportet in oleo cuminū, aut rutā, & infundere per sedem. Euacuata uero aluo, statim nutrimur. Si uero etiam citra molestiam dormierint, post tridie lauentur, adhibentes uentri unguentum natidinū cum modico uino. Et post balneum similiter tenui uictu utantur. Si uero etiam tertia dies febrem aliquam induxerit, neque sic timendum est, sed similiter lauandum, ac moderate nutriendū. Date autem oportet talibus ante cibum aliquod concoctotium, oxyporum à cita penetratione appellatum medicamentū, & præsertim quod ex cotonea malis sit cochlearij mensura.

Curatio diariorum febrium multarum dierum, quarum aliqua ex mutatione diariorum generantur, ob causis obturationem.
Cap. XII.

QUædam febres propter obturationē uasorum circa cutem hunt, ex diariorum mutatione, quoniam non potest curatæ fuerint statim ab initio. Contingit hoc maxime in corporibus uiciosis humoribus præditis quā multum fuerint voraces. Nam in talibus circa primam ac secundam diem aliquanisper, non est in pulsu putredinis signum, sicut neque in urinis, cruditatibus dum enim prolongatur quidem declinatio, & non amplius iuxta proportionem remittit, suspecta est affectio: si enim non transpirauerint perfecte, necesse est putrefactos esse nitidos humores. Si quidem igitur puer aut senex fuerit ægrotans, uenam secare non expedit. In medijs autem ætatibus, et obore presente, ægrotans uena secetur, si sanè etiam plenitudinis signa affuerint in corpore. Detrahendum est autem pro uiribus, & obturationis magnitudine: maior enim febris ob uehementiores obturationes incidit. Minor autem ob minores. Euacuata uero multitudine, & rarefactis meatibus, humores ac fuliginosæ superfluitates transpirantes pauciores fieri poterunt. Periculosum enim est aperire potentibus obstructione uti ante euacuationem. Quæ enim nimis exterioriam habent, exhibita dum exhalant simul attrahunt quid ex crassis ac viscosis humoribus in nasus, & dupliciter in angustis meatibus obturationes. Si uero etiam extrinsecus cuti admoneantur exterioria, periculum est de attrahant etiam aliud quid ad meatus obstrictos. Quo igitur secure & intrinsecus exhalatio, & extrinsecus attractio cōtingat, milisimū

est euacuare pro uiribus corpus: post euacuationem uero non longa facta dilatione, aliqua exterioria edulia aut pharmaca dare. Eduliorum quidem loco psisanam & aquam malsam, pro pharmacis autem, acetum nullum ex solo aceto ac melle paratum. Quæ enim in aceto mullis coquantur alijs, uelut calamintha, & similia calida, febres accendunt, uelut etiam uinum. At post tertiam diem, neque putredinis humorum signo in pulsibus præsentem, neque in urinis cruditatem, & ubi hora suspecta in qua febris accessit in prima die transiit, confidenter iam hominem lauare oportet. Si uero etiam circa decimam horam suspectus tibi fuerit paroxysmus siue exacerbatio, lauare oportet ante horam sextam. In balneo uero corpore præcalcfactio illinire oportet oleo dulci tepido, & modetatis eo confricare, postea depurgare & ablueri forinsecus corpus. Eligenda ad hoc quædam moderatæ extergētia, qualis est hordaceæ farina & sabacea. Deinde immittere in solū calidæ temperate, deinde etiam in frigidam. Si neco circa decimā horam, ut ita demus, turbatio quædam suspecta sit, nihil exhibendum est præter aquam cui incocta est hyssopus & parum apij. Deinde si nihil mali intulerit hora, nutrantur. Si uero etiam quid attulerit, oīo modetāt apparere. Quare & lauare poteris post tridie ac nutrire. At ubi magna facta est obturatio, necesse est ratio potrefactio cōtingat. Unde curatio in putredinosa febre referenda, etiam his congrua est.

De febribus continetibus siue synochis.
Cap. XIII.

CONTINENS febris nominatur, cuius ab initio usque ad finem una est exacerbatio, nullam alterius exacerbationis principij significationem faciens. Corporibus bono habitu præditis, & multo sanguine repletis, & ætate calida peculiaris est continens febris. Conflatur enim ob calidi sanguinis copiam nondum putrefacti, & eo quod non transpirat, feruore solum caliditatem excitantis: quemadmodum nouum uinum solet in dolijs: tempus autem talium febrium maxime uernum est. Sunt autem differtentiz febres continentes tres, nam aut equalis permanet magnitudo ab initio usque ad solutionem, aut ad ditamentum facit, aut detractionem: hoc autem cōtingit potius maiores, aut minores sunt transpirationes, ex eo quod densior aut rarior est habitus corporis affectu. Est autem multa copia quæ in talibus affligit, & feruorem sanguinis ebullientem consequenter febris accendit, aliquando uero etiam crassitudo. Scopus igitur curationis in ipsis est euacuare copiam, & extinguere calorem præternaturalem, & crassitudinem secare, siquidem affuerit: Deinde ueterem bonam temperaturam debilitatis partibus reparare.

De uena

De uenæ sectione. Cap. XLII.

SI ualidæ sunt uires, & ætas permittit, & nihil aliud fortiter resistit, sanguinis tantum auferre oportet, quantum uires tolerant. Præstat autem si uires adsint, usque ad animi deliquium ducere. Quibus uero non sic uena secunda est, hi ad extremum periculum deueniunt, ut aut suffocentur, aut animo linguantur, nisi uirium robur, aut larga sanguinis erupcio, aut multus sudor, ex manifesta pernicië ipsos eripiat. Nam multitudo in his non amplius a uenis contineri potens, obturat ac distendit corporis molem, & propterea ipsum aliquando dirumpit, & uasa maxime in naribus aperit. Ea gratia festinare oportet ad sanguinis detractionem, quantum uires ferunt: quo uasorum natura ex transpiratione ac uentilatione, naturale temperamentum cõseruans, iuxta morem ab initio humoribus dominetur. Verum animaduertendum est & ad ipsius uenæ sectionis scopos. Præcedente enim ciborum cruditate, eousq; uenæ sectionem differre conuenit donec tibi satis esse uidebitur concoctio ipsorum in uentre peracta, itemq; secus superfluitatem in intestinis. Si uero suspectam habes post uenæ sectionem, aliam fore sanguinis euacuationem, uelut muliebrem purgationem, aut hæmorrhoidum in sede fluxum, relinquere oportet in uenæ sectione tantum sanguinis quantum per alios locos, euacuandum putas. Quare siue menses fuerint moti, siue hæmorrhoids aperta, totum negotium nature permittito. Si uero non tantum quantum oportebat euacuatum fuerit, tunc uenam secato, quo ex utriusque compositis perficiatur quod cõuenit. Aptus est ad uenæ sectionem habitus corporis durus, multi sanguinis, densus, & ægre transpirans. Status aeris humidior. Resistit uenæ sectioni puerilis ac senilis ætas, temperamentum calidum, ac siccum ualde, & tempus ac regio consimilis, & qui natura humidior sunt, & præsertim cum caliditate, & qui raro habitu præditi sunt, insuper quibus os uentris aut amara bili ualde uexatur, aut de bile est, aut ultra instu subtile sensu præditi: hi enim omne facile transpirant, & in uenæ sectione animi deliquijs corripuntur, ex quibus ægre reuocari possunt. Similiter autem etiam si triginta annorum fuerit is cui uena secanda est uerum humidus & mollis, & pinguis ac albus corpore, & paruas uenas habuerit: huic aut omni non uenam secabis, aut parum detrahes: omnino quidē non estatis tempore & in reliquis eiusdem ordinis: parum uero, alijs temporibus ac reliquis constitutionibus. Proinde aliqui in animi deliquium collapsi in ipsis medicorum manibus, non sunt reuocati, quare si quis euacuasset citra uirum dissolutionem, non perisissent. Aliqui uero per omnem deinceps uitam, totum corporis temperamentum frigidius habuerunt, propter im-

modicam euacuationem, ut quidam in malo corpore ac habitu uitā degerint: quidam uero ex hoc ipso pernicioso morbo correpti sunt, ab aqua inter cutē, & erectæ cervicis inspiratione, hepatisq; ac ventris debilitate, & semifyderatione, opem igitur est quemadmodum nos semper facere uidisti non dierum numero animum aduertere, neq; soli multitudini, sed uirium robori, in omnibus quidem, uerū in continentibus febribus, si enim uires conferuentur, non solum sexta ac septima, sed etiā sequētib; diebus uenam secabis.

De frigida aqua exhibitione. Cap. XLIII.

SI aliquando coactus fueris curare egroctum, qui nō solum antea uenę secandę auxilium omisit, sed etiam nunc aut propter timiditatem egroti, aut cognatorum, sanguinem detrahere prohibearis: ad frigidę exhibitionē deueniendum est exacta præscriptione facta, quantum ex ipsa fieri possit detrimentum. Nam si hoc paruum vel omnino nullum futurum est danda est in potu frigida sincera quantum æger eius uoluerit. Tunc autem danda est frigida, quum in urinis uideris concoctionis signa. Neque autem in priuicipio, neq; in augmento danda est frigida: sed in ipso vigore totius morbi, ac particularis exacerbationis. Opportuno enim tēpore data frigida, corroborat solidarum partium naturam. Corroborata uero natura præattenuatos humores aggredditur, ut bonos quidem detineat, inutilis uero eijciat, aut per ventrem, aut per uomitus, aut sudores. Si uero frigida potus fuerit æger tempore sanitatis, ualde confidenter frigidam dato ipsa experientia doctus, omnia uiscera frigide familiaritate sustinet. Si enim omnino aliqua pars adeo frigida esset, ut ab ipsa sederetur, sanitatis izaque tempore euadens detrimentū ostendisset. Quum autem nulla pars in sanitate laxa sit, ne in febre quidem laxi poterit, quum maximum propugnaculum habeat in profundo ardentis caloris multitudinem. Quapropter his qui modicum sanguinem, & minimum carnis habent frigida potus periculosior est. Cito. n. ad solidas animalis partes penetrat carnis nudatas. Quapropter etiam habituales febres, neq; sincera, neq; multa frigida opus habent. Tenuia enim sunt in ipsis & modici sanguinis corpora. Vnde quum magni detrimenti timor immincat in ineptis, à frigida exhibitione abstinere, & uti alijs auxilijs, quæ obturationes referant, & multitudinem euacuant, & feruorem febris mitigant. At uero detrimenta ex intempestiuo frigida potu ortenti hæc sunt. Viscosos ac crassos humores attenuari ac transpirare frigida impedit. Quare siue inflammatio fuerit in aliquo viscere, siue ignis facer, siue indurata, siue mollis ac laxa affectio, frigida potus ad huius sanationē nihil cõfert: sed euestigio quidem non modicam

affert

affert lebitatem, eo quod febrem iam factam extinguit. Manente autem intus causa, quum ex frigida densatam fuerit corpus, aliam febrem accedit priore grauiorem. Atque hæc quidè detrimenti species contemni poterat. Verum plerique debilia habentes uiscera, citius ac facilius à frigida exhibitione læduntur. Quibusdam enim stomachus siue gula adeo fortiter affectus est, ut perdidit actionem & uix potuerit deglutire: Alijs uenter læsus est, ut uix concuquere potuerit: Alijs hepatis, ut ex hoc in aquam inter cutem inciderint. Alijs colum, aut pulmo, aut renes & uesica, aut aliud quid à frigida læsum, debile ad propriam actionem factum est. Quidam ipsorum statim erant ceruicis spiratione, aut alto sopore, aut lethargo, aut aurium abscessu, aut consulsionibus, aut tremoribus, aut siderationibus corripuntur. Et ut in summa dicam: Omne neruorum genus & caput ipsi affligitur. Noui quod formidine tibi induxerim per ea quæ retuli, ad frigida exhibitionem: Verum uidisti me sæpe ipsa opportune usum esse, & in quibus dare oportet. Et semper utilitatem assequutum esse, citra ægri læsionem.

Dieta in febribus continendis. Cap. XV.

Quibus uena secta est, his ego post duas uenas sectas horas, semper do modicum pituitæ succum, & iubeo quiescere. Et postquam ex somnis surrexerint, rursus similiter pituitæ succum exhibeo, & in hoc perseuero usque ad tertiam diem. Quarta ferè semper in balneum duco. Tales enim opportune uena secta uiribus roboratis, & ad animi deliquium euacuati, necessarius sequitur non longe postea nentris secessus, at tenuatis nidelicet humoribus, & leuatis ac corroboratis uiribus. Aliquando uero etiam bilis uomitur. Ad quæ statim est humiditates per totum corpus aut sudores succedunt. Quare confidetur hos bene lauato quarta die. At uero tempus exhibendi cibi in febribus continendis, tum his quæ iam relatæ sunt, tum his quæ postea referentur, quæ sanè unam solum ab initio usque, ad finem exacerbationem habent est bona ægri tolerantia & consuetudo. Tunc enim ipsi cibi dandi sunt, quando tolerantissimi sibi ipsi esse uidentur. Et illo præsertim tempore dici, in quo etiam prius uitam accipiendi cibi habuerant: maxime enim toleranter pertulerint cibos isto tempore acceptos. Robustis igitur uiribus, & dum uigor morbi breui expectatur, tenuissimo uictu uti licet. Vbi uero uires egre sunt, non licet tenui uictu uti, citra magnum detrimentum. Quare alimentis tantum apponendum est, quantum roboris uiribus detractum est.

Vniuersalis doctrina de febribus putridis. Cap. XVI.

Transpirationis angustia ac impedimentum meatuum obscurorum totius corporis ob-

rationem facit, per quos fumosæ & fuliginosæ superfluitates quotidie transpirant. At obturationis affectio quum parua fuerit, & probe tractata, diutina febre efficit. Quum autem siue propter magnitudinem, siue imperitiam Medicorum consuetum diarium tempus exceßerit, aut continet, aut aliam quandam ob humorum putrefactionem accendit febrem. At uero transpiratio multiformiter impeditur, & dum densatur meatus propter siccitatem, aut adstrictionem cutis, & dum obturantur propter multitudine & crassitudinem ac viscositatem humorum. Dum itaque quotidie fumosarum ac fuliginosarum superfluitatum transpiratio impeditur, naturalis in nobis calor affligitur. Alius uero præter naturam corporibus accedens, primum humores propter humiditatem putrefacit ac corrumpit. Progressu uero temporis etiam pinguedinem ac carnem, & ipsa solida corpora inuadit. Est autem putrefactio essentie putrefactis corporis ad corruptionem transmutatio, à calore præter naturam fiens. Putrefactes igitur humores, aut intra uasa arctati, continuas, & nunquam intermittentes usque ad perfectam morbi solutionem febres efficiunt: aut per totum corpus delati, & extra uasa, elapsi, quandam febrem per circuitum accedentem, & interualla habentem accendunt, uelut tertianam, quartanam, quotidianam, aut aliam consimilem. Causa uero cur non excidant extra uasa humores in febribus continuis, est aut multitudo, aut crassitudo, aut viscositas ipsorum. Quemadmodum igitur dum inanimata corpora putrescunt, primum abijcimus ex ipsis quæ iam putruerunt, deinde reliquum in aere frigido suspendimus, & præspirationes perfrigerantes molimur. Eodem modo sanabimus in humanis corporibus putrefactionem, quod quidem iam corruptum est omni modo euacuantes. Reliquum uero gestationibus moderatis & transpirationibus perfrigerantibus, ad exactam ac naturalem proportionem reducentes. Proinde ubi prius de non intermittentibus febribus tractauerimus, mentionem faciemus deinceps & reliquarum.

De febribus putridis. Cap. XVII.

Quoniam in omnibus uasis, & præsertim maximis, circa alas ac inguina, ac consimilibus, sanguis calidior æqualiter redundans putrui, febrem putridam continentem efficit. Plerumque uero in corporibus multi sanguinis ac carnosis, & denso habitu præditis, & superfluitatibus calidis refertis hæc generatur. Proinde his iam febrientibus pulsus maximus & æqualis ac uehemens est, & qui compagne arteriæ neque durior, neque mollior habet. Ad tantam uero uelocitatem ac densitatem nitit, ad quantam magnitudinem ipsa febris uenit. Atque hæc quidè ambabus

ribus quidem conveniunt atriplex, blitum, malua, lactuca, & cucurbita. Ex reliquis autem prius succus, & forbitiones ex alica, & pisces petrosi, & ex vulcuribus quæ mollem carnem habent. Ex alijs alas, & gallorum testes, & suillos pedes, ac cerebella, & parvorum porcellorum extremas partes dare convenit. Sorbendi sunt etiam ovorum vitelli, & fructus gustandi non ægre concoctiles. Abstinendum vero ab omnibus dulcibus & acerbis, & salis, nidorosisq; ac virosis edulij ac potibus. Et à veteribus ac natura calidis vinis.

Tertiana spuria curatio. Cap. XXIII.

IN non exquisitis tertianis, neque lavare statim ab initio bonum est, sed quando iam appa-
verint signa concoctionis, neque quodammodo nutrire, sed satis est alterius. Quies autem & calefactio præcordiorum ipsis conducit & forbitiones concoctu faciliores. Infusa item inferni ventris non valde molli. Et si sanguinis detractione opus habuerint, neq; hæc relinquatur, sed statim ab initio distinctione facta, velut in Sermone de venæ sectione dictum est, moderatus sanguis auferatur, quantum in præsens satis est. Totus vero dixit status non refrigerans & humectans sit in totis, velut in tertianis exquisitis, sed etiam quid de incisorio ac calefactorio modo assumat: minimi-
rum velut crassiore bile subiecta, & non valde calidior. Maxime vero contulerit ipsis pistanz succos, iniectione pipere & hyssopo aut origano. Sed & nardi spicam cum aqua mulla, coctam bibendam dato. Et alia quoq; quæ vrinam cient, præterquam extreme calefactionis ac siccantis. Maxime quoque abstinere morasidue dandus est post septimam diem. Sed & acetum mulsam multis profuit potum. Et aliquod lene purgatorium, bona concoctione in vrinis apparente. At vero vomitus ab accepto cibo, vsq; adeo commodus est his qui in hac febre perseverant: ut multos noverim statim perfectæ hberatos ex huius usu.

De hemitritæ, hoc est, semitertianæ.

Cap. XXIII.

Febri semitertiana appellata, sit pituita putrefacta ad putrefactum amaræ bilis humorem ammixta, & est ex duabus febribus composita, quotidiana enim cum circumfræctione irrumpente, tertiana vero cum rigore, febris ex ambabus mixta, horrorem inducit, & de rigore quidem minus, plus autem de frigefactione, id quod extremitatibus permixtis contingit. Itaq; neque absonum nomen huic febrimposuerunt, qui hemitritam dixerunt. Duplex est autem modus generationis eius. Aut duabus exacerbationis uno tempore coincidentibus: Aut statim ab initio vtriusq; inter se permixtis. Quum igitur

tertiana prædominator horridior febris sit, & iuxta accessionem etiam aliquid rigoris affumit. Statimvero talis etiam alidior est & estusior, & quendam bilis vomitum, aut egestionem, aut sudorem inducit. Vbi vero altera pituitosior febris prævalet; prædominatur quidem frigiditas extremitatum, verum modici sunt horrores: & non sunt sticticlosi, neque estusosi. At vbi æquales magnitudo fuerint, & tertiana interpolata, & quotidiana continua, inuasio quidem exacerbationis cum horrore contingit. Et quum pituitosa febris dominatur, contractiones sunt ac horrores. Quom autem billosa febris prævaluerit, accensum incallescunt. Atque hæc quidem est semitertiana exquisita, ex tertiana intermittente & quotidiana continua composita, ambarum febrium temperatura equali existente. Cæterum semitertiana non exquisita, aut biliosum humorem habet, aut pituitosum. Quum igitur ex vtriusq; reliquis humoribus semitertiana febris conflatur, etiam curationem mixtam esse convenit. Quare ex his quæ de tertiana relata sunt, & ex his quæ de quotidiana dicuntur, curationem componere oportet.

Quartana exquisita dinotio. Cap. XXIV.

Quartana exquisita omnem ætatem invadit, præcipue tamen inclinatur. Hippocrates autem in libro de septenario, vigoris ætatem dixit. Idem asserere videtur, eandem hominem non bis quartanam febrem incidere. Verba eius sunt. Primum quidem quartana febris idem homo bis neq; capitur, neq; unquam capta est, neq; de cætero corripitur, si semel sanus fiat, & hoc propterea: Iuxta propriam visum suam hominis naturam, & ætatem vigoris contingit. Necessarium enim est vigentem hominis naturam in hoc tempore quartana febre corripi. Præterito autem vigore exolutam esse à quartana, & ab invasione. At vero naturæ corporum magis atterabilis hanc febrem perferunt, & ex temporibus Autumno, & præterito vbi ipse seipso fuerit frigidior acficior, & inæqualis. Edulia item ac potiones, & totas vitæ victus siccus & frigidus tempore exaltens, quartanarum febrium signum est: Et licens aucti. Hæc autem febris non statim à prima die omnino irruit cum rigore. Sed aliquando ex alijs in hanc sit transmutatio, ex his quæ erroneæ ac inordinate vocatur. Verum in progressu rigor accedit, & cum aufertur etiam rigor augetur. Sensus autem egrotis contingit, non velut purgator & stimulator cutis, velut in tertianis contingit, sed & perfrigeratur vehementer, & velut frangitur vsq; ad ossa. Proinde audire est egros dicentes, quod ossa lassitudine tenentur, & carne confringi imaginatur. Pulsus porro sunt parvi, obscuri, ac tardi & rari in principijs accessionis, velut à nulla alia esse

stione, Eténim iuxta inuasiones quartanarum arteria tibi ligata esse videbitur, & intorsum retrahi ac prohiberi à regressu. Quare etiam si iuuenis fuerit æger, tamen senilis extreme ætatis motum arterie imitatur. Si enim egrotantis naturalem pulsus noueris, aut in principio exacerbationis alterius morbi affueris, nihil aliud expectaueris quo minus pronuncies, irruentem à principio febrem quartanam esse adeo immensa quedam mutatio pulsus ad rarietatem ac tarditatem fit. Vrinæ uero his in principio quidē albæ ac tenuæ & aquosæ, nimirum propter materiem crassitudinem percolatæ. Progrediente uero morbo, pro ratione coloratiores fiunt, & subsidentiam habent crassam. Sequitur autem sudorum copia circa exacerbationis declinationem. Ex Rusto. Quartanæ igitur à plene initium fumens, diuturniores sunt. Fiunt autem manifestæ ex colore, & cruditatibus, & quod uenter non facile eggerit, & ex splenis tumore, & quod ad sinistram magis se recitent. Est autem periculum ne progressu, temporis etiam in aquam inter cutem incidaot. At uero propter hepar inflammatum quartanarum, coloris sunt albicantis, & toto corpore tumidi, & urinæ his sunt ualde rubræ, sandaracham referentes. Et ad contactum tumor dextri præcordij occurrit. Et hi etiam magis difficulter spirant quam splenici, & subruescunt, & postremum in hydropem inuitabilem delabuntur.

Quartana curatio. Cap. XXV L.

IN principio igitur moderate ac leniter tractandi qui ex quartana febris laborant, ita ut neque medicamentum aliquod forte adhibeamus, neque euacuationem, nisi sanx sanguina ualde abundare uideatur. Tunc enim moderate sanguinē auferre oportet. Et si diducta uena sanguis fluens niger ac crassus fuerit, confidenter euacua: Talis autem in splenis maxime reperitur. Vbi uero sanx ac tenuis apparuerit, statim cohibe. Secunda est autem uena, aut interna, aut media, in sinistro cubito, si splenicus fuerit humor: Aut in dextro, si circa hepar fuerit affectio. Dieta uero sit statu expectanda, & bona. Venter autē mollior quantum eius fieri potest, per consuetos cibos. Si uero hi nihil profecerint, infusus per clysterem utendum est, primum quidem mollioribus, postea acerbis. Prohibendi sunt carnea porcinæ, & omnes uiscosæ ac tardæ transitus. Item frigida ac humida & dulcia omnia. Vino utendum est pauco, albo, & tenui, ac moderate calido, potius uero autem montanis. Et piscibus mollis carnis, ac facili concocionis, & nihil uiscosum habentibus. Utendum est etiam salsamentis ac sinapi. Et per dies aliquod accipiendum est pharmaceutum ex tribus piperis generibus, & diosporiticū appellatum. Et si piperis solum tritum quotidie

acceperint, recte utique secerint. A frictionibus aut & dcambulationibus & alijs confectis, non peccatur arceamur. A balneo uero abstineat frictionibus coequent, quæ ualde profunt. Et si brevis fuerit ac non ualde uolentia quartana: non malum fuerit in intermedijs diebus consueta exercitia coniungere, Atq; hæc quidē in principio ac augmento facienda sūt. In uigore uero morbi tenuiore uictu utendum est, & iubendi sunt egri diu quiescere, & uisceribus prospiciendum est, & adhibitis somnitiis ac cataplasmatibus mollire ac laxare potestibus, & status dissolueret. Talia uero sunt, farina ordeacea, & semen liniis, cumini, chamæpitiis, & ruta, in aqua mulla cocta. Oleū quoq; à somnito cataplasmati miscendum est. Oportet aut primū olei totū per paucos dies irrigare, atque ita cataplasmati uti, in die uidelicet adhibitis, si æger ferat. Epithematis autē utendum est polyarchio, & eo quod ex styrace paratur, & similibus. Consequenter autē etiam urinam cieniibus utendū est. Et aqua mulla in potu exhibenda, in qua cocta est ruta & anethū. Quod si concoctionis morbi signa euidenter apparuerint, cōsidēdū est statim pharmacis humores nigros euacuantibus, & non semel, sed sepius, si opus fuerit. Conuenit autem Epithymum quartanis potum, & Veratrū nigrū maxime prodest, eo quod citra molestiā euacuat ea quæ molestant. Et uinum dulce in uacuum colocythidis calicē infusum. Omnibus tamen miscendum est apium, aut anisum, aut dauci semen, iucunditatis gratia. Asidue ēt betæ ac ostræorum decoctum bibant. Conueniunt his quoq; aloedaria Oribasij quæ sic habebat. Aloes drach. x. spicæ nardi, asani, massiches, croci, xylobalsami, singulorum drach. vj. casia drach. xij. epithymi drach. xvj. veratri nigri exempta medulla drach. viij. forma pilulas magnitudine erui quæ pulegij decocto, & exhibe pro urinibus. Possunt & cum melle coctæ pilulæ formari. Ego uero etiam ueratrū internū adieci. Utendum est & vomitibus à cibo, & à raphanisi nihil impedierit. Pleriq; enim ipsi assidue vli: partim perfecte à morbo liberati sunt, partim facile pertulerunt. Nam vna cū hoc quod euacuant ea quæ stomachum infestant, etiam facilius concoquūt tales. Vbi uero nihil iam prohibet, etiam albū ueratrū dandū est, primum quidem raphanis infusū uelut in Sermone de purgatorijs dictū est, postea uero etiā ipsum per se. Quæ uero vomere nō possunt his uicemmetus inferne purgatis dandū est medicamentū ex viperis, theriaça appellatū, & reliqua quæ ad tales febres laudantur. Inter quæ est & familiare illud nobis oīum probatissimū, quod recipit succi cyrenaci, & piperis, & myrrhæ troglodyricæ, & foliorū rutæ viridiū, singulorū equal. partes. Singula seorsim liquis sume truntur, & ruta cū melle trita excipiuntur, suntque pilulæ, de quibus aliquibus obolus unus alijs duo exhibetur. Aliud Asclepiadæ, hoc etiam somnium

omnium facit, quo etiam ipse utor piperis longi, myrrhæ troglodyticæ, succi papaneris, castorei, singulorum pares portiones efforma & utere, obolum unum aut dimidium exhibens cum aceto mulso duabus horis ante accessionem. Aliud ad quæ tamam facit & ad arthriticos: hoc in quartanis dato przlotis duabus horis ante accessionem drachmæ unius pondere cum aceto mulso. Arthriticia uero cum aqua mulsa. Bituminis anciz una myrrhæ troglodyticæ drach. duæ, folijs mēthæ uiridisbus lenissime tritis excipe, ac utere uelut prædictum est. Cæterum qui in principijs talium pharmacorum aliquod exhibuerunt, aut omniuo ante vigorem, hi sæpe simplicem quartanam duplicem fecerunt, aut omnino duas difficiiores ac maiores effecerunt. Noni ego quendam medicum qui ausus fuit è tribus quartanis corepto dare theriacā ante morbi nigore. Deinde auctis omnibus accidentibus quum febris continua successisset hominem peremit. Archigenis. Quartana febre laborantis, inquit Archigenes, trifolij bitumē olearis semis drach. una in tribus aqz mulsæ cyathis, exhibere solet. Minusce etiam ipsis prodest bitumen ipsius iudaici tritum potum cum nino diluto drachmæ poudere. Verò pharmacum minime molestum, & sæpe successum sortitum expertus sum ego hoc, maxime in quibus splenes tument, & hydrops initium capit. Hædetæ corymbiferæ folia quinq; cum myrrhæ troglodyticæ magnitudine fabæ trita, in aqz mulsæ dulcioris hæmina exhibetur. Sed & castorium potum rigores mitigat, & morbosam carnem consumit, & concoctionibus in uenis opitatur, & segniciem admodum eximit. Rufi. Absinthij cremor humores uentrem infestantes deterget, & concoctioni auxiliatur. Vnde neque saluam colligunt qui absinthium bibūt. Mitigat etiam inflammationes hæpatis ac splenis, & vrinæ impellit, & menses muliebres. At si eger aduetus fuerit, & habitus uentris euacuatione gaudeat & mordaces humores secedant, lac recens multum alinum aut equinum, quibnsdā dedi, quos magis purgare uolui. Alij nero caprinū propter familiaritatem & parabilitatem. Exhibui autem ab initio heminas tres, & progressus sum usq; ad sex. Deinde intermisso urso circuiu, similiter à tribus heminis incepi, & addita quotidie hemina, ad sex progressus sum, & postea detracta quotidie hemina una rursus per duos circuitus quicui. Ex simul morbus dissoluebatur, & corpus nutriebatur. Oportet autem animal boni succi esse, cuius lac exhibemus. Si necro alicui non accessit neq; nidorosum sit neque per uentrem erumpit, etiam in suspecta die, sorbinois loco moderate dandum est, multo tempore aut accessionem, & bucellæ panis modicæ superingerendæ. At uero morbo in uigore constituto,

apparente manifestissima concoctione, nullum scire læso, adfectus tempore sanitatis, etiam aqua frigidam exhibui duarum heminarum mensuræ, instante iam prope inuasiōe, & reuera à multis rigorem prohibui, non parum sæpe etiam febribus exemptis. Melius est autem etiam sorinfecus calefacere corpus cyprino aut scyonio, ante exacerbationes quidem, ut ne rigeant, sedatis autem exacerbationibus, ut ne ab extra allabētibus perfrigerentur. Dioscorides porò dicit prodesse his qui quartana tenentur febre, hæc in potu accepta etiam ante accessionem. Plantaginis radices quatuor, sicce tritz in uino bibuntur. Verbenacæ rectæ quartus à terra geniculus tritus cum uino potatur. In tertiana uero tertius radices, item libano tidis drach. in uino exhibetur. Quod si oleo illineris totum corpus, extremitates autem ex uigento aliquo ad rigores delinatio inuixeris, & ægrum contentum quiescere sineris, non expectetur rigor.

Quotidiana febris dinotio.

Cap. XXVII.

Quotidiana febris in pituitosisoribus naturis consistit, & tempore hyemis, & in humidioribus ac frigidioribus constitutionibus. Et senes quoque magis infestati pueros, propter edacitatem, & præsertim eoa qui in humidis ac frigidis regionibus degunt, & uitam ociosam agunt cum repletionē, atq; hoc magis ubi post cibos assidue balneis nrantur, & adhuc multo magis ubi ipsi eibi natura sunt pituitosiores, & inordinatus est ipsorum usus. Hæc igitur febris neque cum rigore irruit statim in prima die, sed temporis progressu, non rigore, sed circumfrige factio ægre concalescentis ipsis accedit. In pulsibus autem manifesta ordinis confusio, & inæqualitas adest, tempore irruptionis exacerbationis præsertim, & uelocitatem ac uolentiam motus ipsis non adest. Non autem exurit febris hæc ægros, neque densam respirationem facit, neque crebras efflaciones, neque frigida expectentiam excitat. Sed hæc febres minime siticulosæ sunt. Vomant autem pituitosa. Et quæ per uentrem inferna ipsis euacuantur, frigidiora, pallidiora, crudiora, & aquosiora omnino sunt. Exudant autem nequaquam in primis diebus, neque ad putrefactam febrem quietem deueniunt. Albus est ipsorum color. Vrinæ albæ & tenues in primis diebus minguntur: postea nero crassæ ac contrahæ. Hic humor quotidie exacerbatur, definit autem in quietem febris non integram, uniuersum tempus faciens horarum plerumque octo & decem. Quapropter etiam amphemerina febris à græcis uocatur, de ambabus enim participat, die ac nocte.

Quotidiana febris curatio. Cap. XXVIII.

IN quotidiana febris curatione aceto mulso utitur in primis diebus, & his quæ urinas probe impellere possunt. Extota dictæ forma secandi uim habet. Circa uigor uero uentri prospicere oportet, & præsertim ori ipsius: Et postea uocare a cibis, & raphanis, & purgatorijs pituitam euacuantibus uti. Reliquam dietam ad communes scopos respectu facto comperies, ut scilicet attenuate diætæ, & pharmacis incisorijs ac attenuantibus utaris.

De Epialis febribus. Cap. XXVIII.

PRædicti generis, pituitosi inquam, est & febris quæ priuatum à leni afflictione Epiala appellatur, quum simul & febricitant & rigent, & utrunque percipiunt eodem tempore in omni corporis parte. Pituita enim acida, & nitrea appellata, citra febrem quidem, rigorem inducit. Si uero putredo aliqua moderata ipsis accedat, febrem epialâ efficit. Si uero amplius putrescat, præcedit quidem rigor, sequitur autem febris, exuperata frigiditate à multitudine caloris, ut omnino non appareat iuxta augmenta & uigores exacerbationum. Fortassis aut & pituita uitrea acidam qualitatem habet. Curatio porro consimilis est his qui quotidiana febre laborant, incisorio curationis modo amplius aucto.

Communia auxilia febrium per circuitum repetentium Dioscoridis.
Cap. XXX.

IN cõi ad omnem circuitum ac rigores utiliter exhibetur ea quæ sudores mouere possunt, & sunt hæc. Semenismyrnij drach.i. datur potanda ex uino duabus horis ante accessiõnem. Item aristolochiæ drach.i. & iridis drach.2. & calaminthæ decoctum cû castorij drach.i. in quartanis & quotidianis. Chamædrys itê decoctû assidue potatû, quartanam, & quotidianam soluere solet. Carui quoque semen, ferula semen, uerbasci radix, aut fœcus cum uino. Aliud, quod ad omnem circuitum, & maxime ad quartanas datur duabus horis ante accessiõnem. Facit & ad calculosos, ac dyntericos, & stomachicos. Est etiam anxiosa ac desperatis, & lippientibus commodum. Semen hyoscyami albi, seminis apij, seminis amisi, sty racis, singulorum drach. quatuor, croci drach. decem, opij drach. tres, castorij drach. duas, myrrhæ drach. duas cum aqua ad sabbæ ægyptiæ magnitudinem formato, & cû duobus aquare cyathis exhibetur. Aliud ad omnem circuitum Aphrodæ. Semen hyoscyami, myrrhæ troglodyticæ, opij, sty racis, singulorû drach. una, croci, zingibris, aloes, singulorum drach. decem, & ebulo tres, & exipe

melle, & exhibe nucis ponticæ magnitudine, cum aquare cyathistres præillitis extemitibus ac cruribus, & sine ut dormiat. Ego uero etiam castorij drachm. unâ dieci, & mirrice uim suam declarat. Vtere etiam confidenter antidoto pzonis, & ea quæ ex sulphure constat. Miram enim efficaciam habent aduersus omnem circuitum præsertim quartanas ac quotidianas febres. Cæterum quæ tria cum oleo illinuntur, profunt omnibus qui per circuitû exacerbantur, cum rigore, fouent enim corpus, & sudores mouent. Sunt autem hæc. Chamæmeli flos tritus, & in pastillos efformatus, ac in umbra siccatus, & usus expetente cum oleo eritis ac illitur. Semen uicicis cû oleo, semen libanotis, flos salis, nitrum, spuma nitri, bacce lauri pyretum, smyrnij semen, hypericû, calamintha, canchryon, castorû, conyza, costus, granum cni-dium, cum nitro oleo & aceto, oleum amygdalinum, cyprinum, irinum, gleucinum, chamædrys, staphis agrestis. A sclepiadæ unguentum ad accessiones cum rigore. Hoc sæpe tertianas depulsi inquit: spumæ nitri drach. ij. myrrhæ drach. duas, piperis grana uiginti, ceræ drach. quatuor olei cyprini, aut irini, aut gleucini, aut amygdalini sexuncie, liquefacta aridis ammiscantur. Vfus est hora ante accessiõnem. Magis autem confricandi sunt pedes, unde horrores initium sumere uidentur. Aliud ad tertianas. Grani cni-dij, spumæ nitri, piperis, æquales portiones excipe irino, & ad strigementum crassitudinê redige, & utere extremitates leniter confricans. Hoc medicamentum sudores ciet, & per duos aut tres circuitus sanitatê reducit. Aliud, ad quartanas, tertianas, & reliquos circuitus. Myrrhæ diach. octo, calis drach. decem piperis drach. duodecim staphidis agrestis drach. tres, nitri drach. iiii. ceræ sexuncem. Cyprini aut alterius talis lib. j. Myrrham uino dilue, & staphidem reliqua coniunde ac cribra, & cû myrrha tere, ac cerato affuso excipe. Vfus autem tempore pharmacû cum pari cyprini portione illine.

*De ignis sacri circa viscera affectionibus.**Cap. XXXI.*

Funt aliquando ignis sacri affectiones circa aliqua viscera, febrê ardentê ac habituale indinentes. Et si quidem circa uentrem fuerit ignis sacer, erysipelas græcis appellatur, febrê ex his ac censam lypiriã nominant. Si uero circa hepã, urentem siue fumosam. Si circa pulmonem, algidam. Talis aut febris frigefacitibus ac humectantibus opns habet & dulcis ac poribus, & his quæ extrinsecus imponuntur. Quis igitur febris habitualis aliû morbum ammixtû non habet balneo indiget, quemadmodum etiam alie oēs caliditates ac siccitates. Si uero affectio fuerit circa viscera ignis sacri, à balneo quidem abstinere oportet in totû. frigida uero in uigore morbi utendum est contritiola, sic aut appellare solemus quû semel frigidissimam

disiſſimam & multam damus. Ante uigorem autem frigida non eſt danda, niſi ab ægroto cogamur, cui mos ſit frigidam bibere, & qui ſitum non ſeruat. At forinſecus imponenda ſunt frigeſcencia: & ſi nihil profecerint, tunc etiam frigida potus exhibeatur, aut edulia potius frigeſcencia. conueniunt autem maxime lactuca humidæ ac dulces, pura frigida elioiz. Atque ſic quidem acceptæ optimæ ſunt. Si uero opus fuerit aliquando ad preces ægrorum, in ſuaſitatem ipſarum miſcere, acetum multæ aquæ frigida ammiſtum, ad inunctum concedemus. Sit autem acetum, exacte ſeparatum ab omni uiuoſa qualitate. Forinſecus autem etiam ipſe lactucæ ſuccus aptus eſt. Immo etiam ſemperuiui, & intybi, portulacæ, atriplicis, ſolaniq; ac plantaginis, cum pane ſiceo trito, & modico bono roſaceo, & his quæ ſimiliter reſiccant. Optimum uero eſt id quod nos utimur, iuxta uuarum acerba rurſus tempus: eſpreſſum enim ipſa rurſus liquorem, in mortarium conſicimus, cum portulacis uiridibus tundimus, & utrumque liquorem in uas mittimus oſculumque eius diligenter obturamus, atque ſic uas in aquam immittimus. Melius autem eſt etiam niue uas obnuere. Vſus autem tempore polentam tenuiſſimam ammiſceo, & poſtea ſubigo ut liquidius euadat medicamentum, idque duplici linteo inſarctum præcordijs impono: non immorari ſino, ſed ubi tepidum factum fuerit tollo, ac alterum impono. Atque hoc ſemper conſequenter facio, donec æger ſentiat profunditatem quodam modo perfrigeratam, & à ſui liberetur. Ammiſcemus autem aliquando etiam oleum omphacinû aut roſaceum, ubi circa præcordia fuerit ignis ſacer, inflammationis naturam habens. Vidi mulierem ſupinam decubentem in terra & uoce deſtitutâ, habentemque pulſum formicantem, unâ cum manuum ac pedum perfrigeratione. Putabam autem calidam eſſe affectionem. Nam ſimul cum relatis peſſimis ſignis, denſiorem uidebâ reſpirationem factam. Hoc autem ſignum eſt magni doloris, ac calidi morbi: præcordia ex thoracis partibus exiſtētis. Dixit autem quidam ex aſſaneſibus ſe audiſſe mulierem dicere, quod arderet eius ſtomachus, & frigide potionis magnâ cupiditatem haberet. Quapropter etiâ in pauiſſimo iacet, inquit, uenans frigiditatem. Itaque conſiliuſ dedit ipſi per cochleariû aquâ frigidam, iterû atque iterû immittens ipſam ori eius uiolenter. Videbam autem labia ipſius placi de aquâ intus arrehere. Et ratiocinatû ipſam ex petere frigida potum, propter inſitam uentri ſeruidam affectionem, rurſus amplius exhibui. Poſt hoc autem oculis quoque annuere incepit, indicans ſic me facere debere. Accepta itaque confectione ex papaueris capitibus conſtante, diacodiou appellata, partem de ea cum uino enidio & aqua frigida, per cochlearium ori inſudi. Et ex hoc nimirum paulo poſt ſenſum loqui cepit. Qua

re rurſus amplius de hac potione dedi, uino emmeleo pro enidio accepto, cû modica aqua. Ori item uentris ſemperuiuum & lactucam, cum pane trito & roſaceo impoſui. Frigida autem hæc adhuc propter affectionis caliditatem, & tempus æſtatis, donec frigiditatem abunde ſentiret.

De colliquatione Philagrij. Cap. XXXII.

Colliquatio noſatur quum excernitur quid peruentrem, non ex comellus aut coucoctis, ſed ex humoribus ex toto corpore in ipſum conſluentibus, quod ſimile quidem eſt bili quæ aſiudæ per uomium reijitur, ac per uentrē ſecedit. Differt autem ab ipſa ſecoris graucolentia, & quod egeſtio ſuluior apparet, & craſſitudinem habet ſtrigmēticiam, aliquando etiam oleoſam, aut adipoliam. Colliquatio autem appellatur hic morbus: quoniam recens compacta eſſentia pinguedinis ac carnis ab ardeſtiſſima ſebre diſſoluitur ac colliqueſcit. Et ubi iam diuturnum eſt malum, etiam ipſarum ſolidarum partiû eſſentia ex parte eliquatur. Quapropter grauiſſima ueniunt eſt hæc febris. Satis autem clarum eſt extinctioris medelis utimur, ita ut ualde frigida aquam potandam exhibeamus, & cataplaſmata & epithemata frigeſcencia thoraci ac præcordijs imponamus. Et cibos humectantes ac frigeſcientes demus. Dictum eſt autem de his in tractatione de febribus ardentibus. Dicitur item conſequenter in ſequenti capite.

De febribus quæ in calidis ac ſiccis temperaturis ſunt, circa inflammationem ac purſationem. Cap. XXXIII.

Quicquid, temperatura biliſi, & habitu grauciles & natura aridi, & ſtomachum ſubuli ſenſu præditum habentes, & qui facile in bilem eſſe uelſcit: hi ubi famem aut uigilias pertrulerunt, aut nimium deſaſati ſunt, & præſertim in profectione ac æſtuo ſole, aut triſtitia affecti ſunt, aut grauibz curis preſſi, prompte ab horribilibz ac febribz corripuntur. Nam habitus in biliſiſ naturis, ob famem ac omnia relata, facile in bilem eſſe uelſcit. Et primum quidem inæqualitate in percipiunt, poſtea etiam horrorem. Et ſi quidem in motibus perſeuerarint, aut cibum non acceperint, ſtatiim febricitant. Mordaces enim humores ac vapores per ſenſitiua corpora delati, horrores ac rigores generant. Et propterea horrente ac deſaſa cute, uelut quæ ex natura in hia aridior eſt, cohibentur fuliginofæ, ac fumoſæ ſuſperſuitates, antea trāſpirare ſolita, & ſic febre accendunt, niſi talis cibum accipiendo uelut dixi præuerterit. Oſtendi autem tibi aliquos qui ſic febricitauerunt, & maxime qui ex longo morbo ſe colligebant. Ex quibus uni in foro obuiam factus horro-

horrore incipiente, introducto ipsi in officinam quandam panem ex uino diluto exhibui, & euersio horrore sedauit, & febrem prohibui. Alio uero in suas domos abire festinantes, in principio horrore, aut paulo post nutriu. Et in summa, quibus adhuc sunt principij exacerbationum accidencia in talibus temperaturis, his omnibus panem ex uino diluto cito exhibui, & horrorem statim sedauit, & febrem prohibui. Quanto enim citius ipsos nutriet, tanto magis febrem impedit. Si uero aliquando paulo tardius ipsos nutriu, febribus quidem facta non est. Calor autem modicus ipsis decedet, ut si diutius moreris nutrire, tali caliditate excalescet, ambiguum ut sit an febrem appellare ipsam oporteat. Si uero due horum post horrore initium facta fuerint, manent adhuc horrore etiam tunc nutrire oportet. Verum prædicere quod febricitabunt si febre non molesta, ad quam exodationes consequuntur. Et hoc factum, & laudare oportet, & rursus nutrire. At postquam sedatus est horror, incipit quæ febris cum contractione, non amplius nutriendi sunt illo tempore. Declinante uero exacerbatione statim alantur, & ne expectetur donec febris integre quiescat. Deur etiam potus aqua calida in uigore amplior. In omnibus enim squalentibus affectionibus non cessant exacerbationes, priusquam aut balneis, aut alimentis humectantibus rigentur. Quosdam uero etiam declinatione incipient: Alios autem uigore exacerbationis instante nutrio. Fames enim in his temperaturis, maxime febricitantibus, non simpliciter nocua est, sed si quid aliud perniciosum. Aut enim ex fame in ardentos febres incidunt, ex quibus si non morte præueni fuerint, in habituales delabuntur, & ex his rursus in tabem. Aut statim ab initio habitualis febris ipsis coincidit. Proinde à principio sic nutrire oportet eos qui talem temperaturam habent. Quum uero aut ex lassitudinibus, aut ira, aut curis pluribus, aut uigiliis, aut tristitia, aut ex omnibus simul commissa, corpore uehementer resiccato, febris inuasit, squalidam quidem habens cutem, ardentem autem caliditatem, timor profecto est talem hominem habituali febre corripiendum esse, & præsertim in æstate, & sicca ac calida constitutione. Opus igitur habent tales humectantibus ac refrigerantibus eduljis ac potibus. Qui enim temperatura calidi ac siccus sunt, hi etiam necessario uires debiles habent. Non enim fieri potest, ut corpus calidum ac siccum, ubi febricitet uires ualidas habeat. Cõuenit igitur quàm celerrime per piscinæ succum, aut sorbitiones ex aliqua nutrire, & paululum panis insuper exhibere, atque sic per frigida potum ægrum curare. Extinguitur enim statim ac sedatur febris perfecte, si non inflammatio aliqua ipsi adest, neque humorum putrefactio. Si tamen magnum detrimentum futurum coniectaris, exhibitionem eius inhibe, & per ea quæ extrinsecus

corpori adueniunt ac adhibentur, curationem molire. Forinsecus autem adueniunt, aer nos ambiens, & quæcumque humectare ac refrigerare solent medicamenta. Et ad hæc aquarum dulcium balnea. Si itaque ambiens nos aer temperatus fuerit, utendum est eo uelut habet, nihil amplius moliedo. Si uero aut multum calidus est aut frigidus, calido quidem uice uersa excogitadæ sunt subterranæ domus, frigidaque, ac quæ uentis perstantur ad septentrionem conuersæ. Auras quoque, ipsis qualdam proprias excogitabimus. Aliquando ex Eurypii in quos plures aquæ salientes se præcipitant. Aliquando aqua frigida ex uasis in uasa transfluente. Hæc uero statim etiam somnum conciliant. Respergenda est etiam domus asidue frigida, aqua pura. Et rosæ multæ, aut uitium pampini, aut myrtus per terram sternantur: Aut aliæ quædam plantæ refrigerantia. Arcenda est ab ingressu hominum copia. Nam & hoc domum calefacit. Si uero frigidissimus est aer, uelut in hyeme maxime, per tegumenta corpus foueat. Frigida enim densat ac restringit cutem, & humorum qui intus aduruntur defluxiones transpirare prohibet. Maiorem enim ex frigida inspiratione utilitatem fore uolendum est, quam ea est quæ ex cutis perfrigeratione contingit. Similiter autem & in his quæ forinsecus imponuntur, eligenda sunt refrigerantia citra fortem adstrictionem, densationemque ipsius cutis. Et non solum quæ refrigerant, sed etiam quæ compage corporis fuerint partium tenuium, quantum eius reperire est in refrigerantibus aut citra ammixtionem alterius uehementis qualitatis. Est autem simplicissimum medicamentum ex humectantibus ac perfrigerantibus, quo & ad ignem sacrum utor, & ad pudendorum inflammationem in principio. Ceram albidissimam in duplici uase liquato, & in aqua frigidam diffundito, ac manibus emollito diu eam eluens. Deinde similiter ipsam liquaram, in aliam aquam diffundito, & rursus tertio idem facito. Ad hanc autem ceram sic lotam, rosaceum ex optimo oleo omphacino preparatum addeco, ut sit quidem ceræ unc. ꝑ. rosacæ uero trient. Hæc similiter in duplici uase liquato, & ab igne ablata, moueto, donec aliquantulum frigeant. Postea in mortarium infunde, & pistillo fortiter, aqua potabili ac frigidissima paulatim instillata quantum satis est, & tandem sic illi puram aquam habente excipe, & aquam quotidie permuta. Hoc pharmacum tenui linteo inductum impone, non super totum pectus, uelut quidam faciunt, neque super tota præcordia, sed illo maxime loco in quo multæ caliditatis sensus percipitur. Permutetur autem pharmacum semper priusquam manifeste caleat. Aliud epithema optimum. Rumicis acuti succus posleta tenui ammixta, duplicato linteo detricto excipiat, & frigidus imponatur. Facit & portulacæ succus, & semper

peruili, cum vix acerbæ fuceo & polenta, Item tribuli viridis succus, & polygona, ac seridis, & laqueæ cum polenta. Sed & ipsa horum folia trita imposita. Bonum pharmacum etiam hoc est: Palmarum pinguum carnem exenipis membranæ, cum posca moratoriæ ad flacciditatem usque coctam, & cum tenuissima polenta tritam imponere. Si uero aridus hoc uidebitur, ex prædicto ce-rato parum, aut roseæ optimi minimum quiddam ammiscere. Bonum etiam pharmacum est rosarum succus cum tenui polenta. Et ipsæ rosæ tritæ impositæ. Et hæc quidem assumimus multum frigidificare uolentes. Si uero moderate hoc facere uoluerimus, non modica est copia emplastro-rum leniter perfringeret potentium. Ego enim noui, imposito aliquando frigido medicamento præcordijs, hominem euestigio difficulter spirasse: alium autem statim rursuuisse. Et paulo post amborum accidens quicquid, frigido pharmaco sublato. Balnea porro dulciæ ac calidarum æqua-lem, aut potius temperatarum, utilissima sunt omnibus, siccam ac calidam temperaturam habentibus. Laudari autem sunt quemadmodum hæc-ici, in secunda balnei domo, corpore, ex aqua & oleo calido perfuso, & ipsis statim in temperata aquæ solui locatis. Deinde etiam in frigida so-lum. In frigida tamen moram diutius trahere non oportet. Si uero inflammatio alicuius uisceris ac cedat, balneum reculare oportet. Illud tamen nosse expedit, quod si quando inflammatio prin-cipalis partis in talibus febribus ac corporibus co-inciderit, omnino morietur. Et præsertim si pul-monis, aut membranz costas succingentis, aut uentris, aut hepatis inflamatio fuerit. Nam quan-tum ad inflammationes harum partium attinet, minime nutrire oportet. Quantum uero ad uicij debilitatem, sæpe nutrire oportet. Quare neces-sarium est, ut aut dum non nutrimus, vires exol-uamus: aut dum nutrimus, inflammationes au-gemus.

De febribus hæcticæ ac tabidæ. Cap. XXXIII.

Hæctica, hoc est, habitualis nominatur fe-bris, quum ad tantam immolessiam vene-rit caliditas præter naturam, ut in habitu sit ipsius solidæ essentiz similis corporis cordis. Et propterea ægre solubilem habet structuram. Primum igitur calor præternaturalis cliquet, & resiccat, ac consumit essentiam in partibus uelut ex humore concretam, qualis est pinguedo, & ca-ro: Deinde uero propriam humiditatem consu-mit, ex qua corpora nutriuntur. Quæ sane circumsusa est ac instar roris dispersa, circa omnes ani-malis partes. Hioc autem transiit ad carnosum ge-nus, quod fibris & membranosis partibus solido-rum corporum insitum est, quod sanè disciden-tes coqui tollunt, fibras uero abiciunt. Exactum

autem eius complementum in hoc est, si ipsa soli-da similium partium essentia siccior facta est, quando & tabida febris uocatur. Duplex est au-tem genus hæcticarum febrium. Quædam enim ex ipsis post febres ardentibus plerumque sunt, aut absque adeo in longum extentas, ut temporis pro-gressu humore corporis cordis consumperint. Aut manente adhuc humiditate sientes, & cordis corpus occupantes, hinc incenduntur: quemad-modum lucernatum flammæ ex funiculo, super-stite adhuc in lucernis oleo. Et hæc quidem una est ipsarum generatio. Altera uero quum ab in-uitio statim irruerint, primam generationem dia-ris similem facientes, ob tristitiam, & iram, & lassitudinem amplio-rem simul cum ardore sa-ciam. Has igitur non difficile est curare. Eas ue-ro quæ in eadem procedunt, sanare impossibile est. Natura enim ipsarum calida est & sicca, simi-le quidam patiente corde, quale quid patitur funi-culus in lucernis: ubi plurimum fuerit exitus. Qui enim exitus & consumitur, ut nequis læ-gum oleum affundens, iuculentam flammam exci-tare possis. Proinde parua hæc & infirma flammæ circumiacere uisum, semper amplius minor eua-dens, donec fuerit extincta. Facilis autem cogol-tu est hæc febris. Priusquam enim contingeret pul-sus ac caliditate, oculos inmodice cauos uide-bis, uelut in focis quibusdam siccis, & gramas in ipsis reperies siccis, & squallidam quandam af-fec-tionem, qualis his fieri solet per totum diem in sole æstiuo multo puluerem percurrunt. Penite autem & ipsorum coloris uita sua flos. Et cutis citra fronsiem sicca est ac circummensa. Et plerumque palpebris auctant, uelut somno grauati. Est autem hæc affectio non somnus, sed impotentia uigilan-di. Et tempora sunt collapsa, ut loci caui appa-reant. Et quid aliud quam ossa & cutis sunt in to-tum, ut etiam si denudatum consideraueris uen-trem neque aliquod intestinum, neque uiscus ali-quod saluum esse posses, & præcordia uehement-ter retracta esse ad thoracem, & rurem totam siccam ac obaridam, & siccitatem digitorum appre-hensam, uelut corium quoddam productur. Febris itaq; tractæ tabidæ incurabilis est uelut dixi. Tan-bescit enim in ipsis totum corpus, inflatur, arboris extreme ærefactæ, aut ob flammæ uicinas, aut ob uehementem ac immodicam siccitatem. Atq; hæc est quam senectam ex morbo uocant. Tela enim corpus sit in his qui secundum naturam ad extre-mam senectam perueniunt citra febrem, paulatim extincto in ipsis insito calore. Verum eorum qui secundum naturam consueuerunt, mors sine molestia contingit, ob frigiditatem ac siccitatem imminens. Tabida uero febris non solum sicca, sed calida affectio est. Hæc igitur uelut dixi incurabilis est. Illud porro omnibus febribus hæcti-cis commune est ut debiles sint & æquales sem-per, à prima die usque ad extremam respirationem.

Maximum

DE FEBRIBVS,

ARABVM MEDICORVM, ET IVDÆORVM,

Tomus Secundus.

AVICENNAE DE FEBRIBVS

TRACTATVS QVATVOR.

Tractatus Primus de Febre ephimera.

De diffinitione Febris, & generibus febrium. Cap. 1.



FEBRIS est calor extraneus accensus in corde, & procedens ab eo mediantibus spiritu & sanguine per arterias & venas in totum corpus. inflammatur in eo inflammatione, quæ nocet operationibus naturalibus: non sicut caliditas in re & laboris: cum non ulcimitur: uel cum non peruenit ad hoc ut sit accensa, & noceat operationibus. Et sunt quidam huminum qui diuidunt febres in duas diffinitiones: primas scilicet in febrem ægitudinem, & in febrem accedens: & ponunt febres apostematam de genere febris accedentis. Et intentione quidem sermonis eorum est hæc, quod febris ægitudinalis est illa inter quam, & causam quæ non est ægritudo, non est medium, sicut febris putredinis: putredo enim est causa eius absque medio: & non est putredo in seipsa ægritudo: immo est causa ægitudinis. Febris vero apostematæ est accedens apostemati existens, dum est apostema, sequens ipsum: & apostema est ægritudo in seipso. Et contradicenti quidem inest ut dicat: quoniam si propterea quod febris apostematis sequitur caliditatem eius, & sequitur uel cõcomitatur dolorem ipsius, uidetur ut sit febris accedens, tunc oportet ut sit plurimum febrium ephimerarum accedens: & si ipsa sequitur putredinem, quæ est in apostemate, tunc apostema non est causa eius prima, unde est apostema: immo quantum ad putredinem, quæ est in ipso: causa igitur eius quæ est essentialis, est putredo, & apostema non est causa eius nisi per accedens. Et dicimus quod si non significauerint per febrem accedens, hoc: immo non intellexerunt per eam, nisi quod ipsa

sequitur apostema inuentum, per inuentionem apostematis: similiter est dispositio febrium putredinis per comparisonem ad putredinem. Verum occupatio in huiusmodi contradictionibus est illud, quod non confert in scientia medicinæ aliquid: & facit medicum procedere ex arte sua ad inquisitiones, quæ fortasse impediunt ipsum ab arte sua: procedamus ergo secundum id quod consuetum est. Dicamus ergo propterea quod febres apostematæ, & oppilationum sunt febres accedentes, & aliæ febres sunt ægitudines, tunc conueniens est ut dicamus, Quoniam propterea quod omnia quæ sunt in corpore hominis sunt tria genera, scilicet membra continentia illud, quod est in eis de humiditatibus, & spiritibus, quorum comparatio est comparatio parietum balnei: Et humiditas contenta, & eius comparatio est comparatio aquæ balnei: Et spiritus animalis, & uisus, & naturalis, & uapores sparsi, & comparatio eorum est comparatio aeris balnei. Et accensum cum caliditate extranea inflammatione prima est illud quod quando ipsum extinguitur in frigidatur quod ei uicinatur: & quando intrigidatur illud quod est uicinum ei, non oportet ut ipsum extingatur: immo possibile est ut remaneat, & redeat, & calefaciat illud quod ei uicinum est, existens unum istorum trium generum extra, quæ non inueniuntur in homine generis corporeum. Et si accendatur febris in membris radicalibus accensione primæ sicut accenditur adustio: uerbi gratia: in parietibus balnei, aut in foveæ ferrarij, aut in olla coci, tunc illud genus febrium nominatur febris hætica. Et si accendatur febris accensione prima in humoribus: deinde accendatur ex eis in membris sicut accidit: ut effundatur aqua calida in balneo, & igniantur uel calefiant parietes eius, causa ipsius: aut ius cali-

M dum

Cognitio horarum vniuersalium agnitudinis, & proprie status. Cap. IIII.

Cognitio horarum agnitudinis vniuersalium quandoq; est ex specie agnitudinis: nam ipsiusmodi hec, & epilepsia, & apoplexia, & squinantia sunt ex acutus valde. Et tertiana pura, & casus de acutus non valde. Ex quartana, & paralysis de macronosis. Et quandoq; ex motu agnitudinis: nam si paroxysmi sunt breues, significat quod status est propinquus sicut tertiana pura, tempus enim paroxysmorum eius est ex tribus horis vsq; ad quatuordecim horas: & si sint prolixius, significat qd materia est grossa, & status longinquus: sicut in tertiana non pura. Et si non fuerint illi paroxysmi, immo materia eius fuerit acuta sicut synochi, tunc agnitus erit acutus: Et si fuerit materia eius grossa frigida, aut declinans ad grossitudinem, tunc agnitus erit non acutus. Et quandoq; ex forma seu figura, quonia ipsa extenuetur vel tumescit fiat velociter, & contabescant facies & hypocondria, tunc agnitus erit acutus, & si remanserint cu dispositione sua, tunc agnitus non erit illius acuitatis. Et quandoq; est ex virtute agri cui velociter aduenit debilitas: quare est agnitus acutus: aut non apparet illud, & est agnitus non acutus. Et quandoq; est ex aetate, & tempore, nam in tempore calido, & grate calida festinat status egriodinum: & in teporibus frigidis, & aetatibus frigidis tardatur status agnitudinum: & similiter est dispositio regionum. Et ex pulsu, nam si est velox, frequens magnus, tunc agnitus est ad acuitatem declinans: & si non, tunc non est acutus. Et ex rigore, nam si est prolixi spacijs, tunc agnitus est declinans ad prolixitatem: & si est brevis spatia, tunc agnitus ad acuitatem tendit. Et quando nullo modo est rigor, tunc ipsa est ex breviori genere ipsius. Et cognoscuntur horae agnitudinis quandoq; ex parte horarum paroxysmorum, nam si fuerint procedentes secundum antecessionem superfluentem, ad illum qui antecessit superfluitate tendente ad additionem tunc agnitus erit in augmento: quoniam de agnitudinibus sunt, quae currunt vsq; ad finem horarum suarum secundum additionem, & sunt quodq; de genere tertianae, & de genere quotidianae & cum iam steterint post antecessionem, & reuerterint superfluitates, tunc sine dubio erit agnitus in statu. Et seruans horam vnam est longi spatij: & si postponuntur, tunc agnitus est in declinatione. Et similiter cognoscitur dispositio horarum ex augmento accidentium febris, & statione eorum, & declinatione ipsorum, & ex additione paroxysmorum eius in longitudine, & breuiatione ipsorum: & fortasse diuersificantur & non assimilantur. Et quandoq; cognoscuntur ex dispositione euacuationum: nam cum accidit in paroxysmo aliquo sudor, aut ventris fluxus, & paroxysmus secundus qui est post ipsum, est in

similitudine vehementiae primi, & fortitudine eius, aut supra ipsam, tunc euacuatio eius est propter multitudinem, non propter fortitudinem, & agnitus iudicatur longa. Et quandoq; cognoscuntur ex parte digestionis secundum quod diuersus, & contrarij digestionis. Verbi gratia quod apparet sputum cum digestionem aliqua, aut vrina in qua est nubes aliqua, tunc est principium augmenti: deinde quandoq; multipliciter illud, & apparet, aut contrarium eius, tunc est status: & iterum quando apparet digestio, aut contrarium eius velociter ex sputo, aut nube, tunc scias quod status est propinquus: & si tardatur, tunc scias, quod status est longinquus. Cognitio autem horarum particularium sic accipitur: nam hora principij paroxysmi est hora in qua coarctatur pulsus, & tu iam fecisti intentionem eius: & plures hic color extremitatum, & infrigidantur extremitates, & proprie extremitates auris, & nasi, vsq; ad horam in qua sentitur sparsio caliditatis. Et quandoq; associatur principio alteratio coloris, & pigritia, & angustia, & iardias motuum, & profunditas somni, & mollificatio palpebrarum, & grauitas sermonis, & horripilatio inter spatulas, & in dorso, & fortasse accidit in eo rigor fortis, & quandoq; accidit cursus saliu, & saltus temporum, & tinnitus aurium, & sternutatio, & tensio membrorum corporis. Et vehementius quidem debiliatur virtus propter debilitatem quae est in principio, aut statu. Et hora augmenij medietas prima est hora, in qua pulsus incipit apparere, & magnificari, & velox fieri, & spargitur calor in toto corpore secundum aequalitatem, & medietas eius altera est hora, in qua non cessat haec caliditas sparsa cum aequalitate augmentari. Et hora status est hora in qua remanent caliditas sparsa cum aequalitate, & accidentia cum dispositione sua, & pulsus sit maior quam vnquam, & sit vehementius velox, & frequens. Et hora derelinationis est hora in qua incipit diminui, & incipit pulsus temperari, & equatur. Deinde illa tertia qua incipit corpus sudare, & perducit ad eradicationem. Et multo rari quidem accidit apud mortem dispositio, quae est sicut declinatio, & est quasi eger euaserit: & non oportet vt tu occuperis in hoc, immo cognoscas dispositionem pulsus, & an magnificetur, & fortis fiat. Et si tibi videtur, pone tibi exemplum de tertiana. Attende ergo qd in tertiana in pluribus dispositionibus incipit horripilatio: deinde frigus, & rigor, postea sedatur rigor, & minoratur frigus, & incipit calefactio: postea aequatur calefactio, deinde additur: postea statim deinde incipit minui vsque quo eradiceatur. Et scias qd tempus agnitudinis prolongatur, aut propter multitudinem materici, aut propter grossitatem eius, aut propter frigus eius. Et quandoq; adiunxit ad illud tempus frigidum, & regio frigida, & aetas frigida, & debilitas caloris innati, & spissitudo seu densitas cutis.

sermo vniuersalis de febribus ephimeris. Cap. V.

CAUSÆ omnium specierum febris ephimerę sunt causę primitiuę calefaciētes essentia liter, & calefaciētes per accidens de summa occurrentium, & assumptorum. sicut in cibo, & in potu & passionum corporearum, & animalium, & ex doloribus, & apostematibus extrinsecis, & quandoque quardam ex eis sunt ex oppilationibus, quarum causa non est primitiua, & non perueniunt causę earum cum vehementia sua ad hoc, vt pertranseat illud quod inflamat spiritum: nam si pertranseat illud, faciunt cadere in hecticam: aut in speciem febrium humorū quam dicemus. Causę enim primitiuę plerumq; mouent antecedentes: quod si mouerint eas ad putredinem, erunt febres putredinis. Et sunt quidā hominum qui existimant, quod febris ephimera non sit nisi ex labore spiritus, & corporis, & illud est error. Et istę quidem febres secundum plurimum recedunt in die vno, & raro pertranseunt tertium diem. Nam si pertranseant illam quantitatem, existimatur de esse earū, quod ipse permittatur. Et intentio quidem permutacionis est, quod accensio caliditatis pertranseat spiritum: aut ad corpus, aut humorē. Licet sint de hominibus qui dicant, qd ipsa quandoque remanet sex diebus, & consumitur integra consumptione: cui nō esset similis, si permutaretur ad genus aliud. Et hæc quidem febris est facilis curacionis, & difficilis cognitionis: & similiter principiu hecticę. Et homines quidem velociter cadentes in febres ephimeras, & qui vehementius læduntur ab eis, si erretur in eis, sunt illi in quibus calor & siccitas sunt magis vincentes: quoniam perueniunt velociter ad hecticam, & tertianam. Deinde illi in quibus calor & humiditas vincunt, quoniam perueniunt velociter ad febrem putredinis. Deinde illi in quibus calor est plus. Deinde illi in quibus est plus siccitas. Et cum illi qui habent complexionem siccam & calidam, accidit fames, & associantur ei vigilie, & labor animalis, & labor corporeus, festinat ad ipsum febris ephimera cū horripilatione quadam. Quod si non succurratur, & cibetur statim, festinabit ad ipsum febris putredinis.

Signa propria febrium ephimerarum, distinguuntur eas ab alijs. Cap. VI.

DE proprietatibus earum est, quod ipse non sunt a causis a necedentibus: neq; incipiūt cum coarctatione, & est qd ipse nō incipiūt secundum plurimum cū rigore, & frigore extrematarum, & profundatione caliditatis, & declinatione ad pigritiam, & somnum, & submersiōnem pulsus, & diuersitatem eius, & paruitatem ipsius. Immo fortasse accidit in principio earum similitudo frigoris, & horripilationis, & pūctio:

cuius causa est vapor chymicali, & remouetur velociter: & accidit, sed raro rigor propter multitudinem vaporum lædentium lacerans propter punctiōem suam plurimam superfluam. Et est eius inflammatio non mordiciatua aspera, immo bona, sicut caliditas corporis laborantis, & ebrij. Et cū est vrina in primo die digesta, & pulsus bonus, tūc iudica quod est febris ephimera: & illud ideo, quoniam vrina non alteratur in ea in quantum ipsa est ephimera, & est sedimē eius digestum, nō decliue ad colorem humoris, & est quandoque nobis eius pendens, & quandoq; est natans boni coloris, & quandoq; accidit vt non equeatur color eius, cū eius subtilitas est equaliter nō alteratur color eius, nisi propter id qd associantur ei de causa alterationis vrinę: quoniam non sit illis febris ephimera ex eo qd dicimus in ephimera ex labore, & similibus ei. Et pulsus est decliuis ad spiritum dūc, & fortitudinē, & magnitudinē nisi in ea que est a passionibus debilitantibus, & nisi fuerit in stomacho humor mordiciatius, aut frigidus, aut causa alia de his, que parificiant pulsū pter febrē. Et raro quidē diuersificatur: si vero diuersificetur, erit ei ordinam si diuersificetur illud, tūc erit propter causam aliam antecedentem febrem, aut associantur ei, sicut est labor vehemens, aut mordicatio vehemens in visceribus, & similia his. Et quandoq; accidit vt inducitur pulsus propter frigus vehemens, & in ipsius infrigidans, aut propter caliditatem solis vehementem exicantem: aut propter vehementem laborem exicantem, aut famem, aut angustias, aut vigilias, aut euacuationes: Et quandoq; festinat in eo dilatorio, & tardatur restrictio: & nō festinat plusquā naturalis nisi raro, & cum velocitate panice, quoniam necessitas euentationis in eo est vehementior, quā necessitas educendi vaporem corrupti: vapor namq; in eo nō est corruptus cōparatione sui ad equalem immo est calefactus cōparatione sui ad eum. Et cū ambiguus sit tibi pulsus, & restrictio ipsius, tunc scias ex anhelitu: Et pulsus quidem reddit post eradicationem eius ad consuetudinē eius naturalē in illo corpore, & hoc est signum boni. Et scias penitus, qd quonies vrina & pulsus sunt boni, significat qd febris est ephimera: & quando non sunt boni, non oportet vt nō sit ephimera, multoties enim est in ea vrina tincta, & pulsus diuersus, & debilis, & paruus. Et de illis, que significant qd ipsa est febris ephimera, est vt sit principiu eius facile, & leue: & sit augmentū eius nō addens supra duas horas, & neq; associetur statim accidētia vehemētia. Et in febre putrida est cōtrariū, & vt nō accidat in ea accidētia praua: & nō sit in ea ausus caloris vehemens, & minorentur cū ea dolores. qd sicū ea dolor fuerit capitis, aut doloralis nō sit fixus inseparabilis post eradicationē eius: & hoc quidē significat qd ipsa est ephimera. Et plurimum

rimum quidem eradicationis eius sit per sudorem, & humorositatem similem sudori naturali, non humoroso: & non sit vehemens superfluitas iterum in quantitate sua: immo appropinquat sudori naturali in quantitate sua sicut est proximus ei in qualitate sua. Si enim nideris sudorem plurimum, tunc febris erit non ephimera. Et de eis de quibus febris ephimera experitur, est ut in gradatior balneum habens eam: cumq; mōra fecerit euenire in eo quasi horripilationem non consuetam, scitur quod febris est febris putredinis: & egrediatur habens eam ex balneo illico: & si nihil alteratur ad dispositione sua tunc febris est ephimera.

Permutatio febris ephimeræ. Cap. VII.

Cum expeditur febrem ephimeram patiens cibetur, & errat medicus super eam, & non cibatur, ipsum: permutatur febris in corporibus cholericis ad hēcticam & incensiuam, & in corporibus carnosiss ad synocham, quæ est absq; putredine: & fortasse permutatur ad illam, quæ est cum putredine. Et similiter quando necessariū est adiutorium in aperiendo poros, & rarificando corpus, & non fit, fit inflammatio in humoribus retentis in corpore inflammatione qua fit calēfactio cum fortitudo, & sit putrefactio.

Signa permutationis febris ephimeræ ad febres alias. Cap. VIII.

Significatio illius est, quod ipsa declinat absque sudore, aut humorositate: aut est in sudore absq; mundificatione per sudorem: & est declinatio longa difficilis, & absque mundificatione pulsus. Immo remanet in pulsu ali-quid, & remanet dolor capitis si fuerit: & hoc autem significat permutationē ad febrem putrefactionis humoris aut ad sanguineam & si causæ fuerint vehemente, aut prolongetur mora eius, permutabitur ad hēcticam. Quod si ad hēcticā permutetur, videbis tactum arteriarum calidum valde: & videbis febrem similem, uel fixam, & in omnibus membris aditum calēfactio super repletionem: & in tempore acceptionis cibi: aut videbis pulsum seruatæ æqualitatem cum duritie, & paruitate. Et videbis signa reliqua, quæ diximus de signis hēcticæ. Et quando permutatur ad genus febrium sanguinis: quod nominatur synocha absq; putredine, videbis additionem, & repletionem caliditatis: & inflammationem faciei. Et quandoq; permutatur ad febres putredinis, apparent horripilatio, & diuersitas pulsus, & paruitas, & coarctatio: & est caliditas mordacitatis sicca, & nehermentia accidentium. In urina autem fortasse remanet digestio rei præ-

cedentis, & in pluribus nō apparet in ea digestio.

Curationes febris ephimeræ secundum modum vniuersalem. Cap. IX.

In omnibus speciebus febris ephimeræ oportet, ut afferatur super corpora patientium eas, ea quæ nutriant eos nutrimento bono cum velocitate digestionis: quoniam febricitans est æger: & æger est læsus, & læsus non digerit aut tæde digerit. At quibusdam eorum conceditur quicquid esse seu delictum in ea: sicut patienti febrem ex labore, & angustia, & fame, & illis in quorum corporibus cholera plurima est. Et qui conquiritur se pati horripilationem in principio, deglutiat cibum infusum in aqua, & uino ut sit magis penetrans: & isti quidem cibantur etiam in principio febris. Et quibusdam prohibetur quicquid sen delictum in ea, & innuitur eis ut fiat subtilis regio regimini sicut in patiente febrem ex oppilatione, & soliditate, & ex apostemate. Et melius quidem est ut postponatur cibus usq; ad declinationem, nisi in illis quos exceperimus. Et aqua frigida quidem oportet ut non prohibeatur in principio rei, quoniam virtus est fortis: quare non timetur debilitas eius: & est melior cura in infrigidando spiritus. uerum si fuerit illic debilitas in visceribus, & febris iam extēditur, seu prolongatur, aut fuerit febris ex oppilatione, tunc melius est ut de ea non multum sumatur. Et conceditur eis balneum cum eorum paroxysmus cōsumitur in febribus ephimeris propter intentiones de quibus est humectatio. & de eis est pro uocatio sordida, & rarificatio pororum, & de eis est infrigidatio in secunda dispositione: & prohibetur ubi timetur casus putredinis. Et nō oportet ut euitur balneum nisi habens eam ex oppilatione, quandoq; enim balneum generat ægritudinem putridam: & similiter paties eam est fatigata nauseatiua, nisi in fine rei, & cum dilatatur porus, & descendit nauseatiua satietas: illis enim oportet ut balneet. Et habens catarrhū nō balneetur, nisi sit adustus. Et omnes habentes febres ephimeras oportet, ut non prolongent moram in ære balnei, immo in aqua eius quantum uolunt, nisi habentes eam ex soliditate, & ex spissitudine: eis enim conuenit, ut prolongent moram in ære balnei donec fudent. Inunctio autem si fuerit effundendo, aut liniendo tantum, oppilat poros. Et in curatione omnis febris ephimeræ, quæ est ab oppilatione extrinseca, aut intrinseca, fricatio aperit poros habentis eam, deinde si obuiat humiditati plurimæ, resoluit eam, & si obuiat humiditati paræ, exiccatur corpus. Euaacuatione autem non indiget aliquis eorum nisi habens oppilationem repletionalem, & habens nauseatiuum satietatem. & qui habent febrem ephimeram ex soliditate, cuius corpus est repletum.

DE febris ephimera sunt, quæ omnino comparantur ad dispositiones animales. Et de eis sunt quæ comparantur ad dispositiones corporeas. Et de eis sunt, quæ proportionantur ad res quæ eueiunt deforis. Et de comparatis ad dispositiones animales est illa, quæ fit ex angustia, & illa quæ fit ex tristitia, & illa quæ fit ex existimatione, & cogitatione, & ira, & vigilijs, & somno, & tranquillitate, & timore, & gaudio. Et de proportionatis ad dispositiones corporeas sunt illæ quæ comparantur ad res, quæ sunt actiones & motus: & de eis sunt, quæ comparantur ad non actiones & motus, & ad contraria eorum. Et comparatæ ad res, quæ sunt motus, & contraria eorum est illa, quæ fit ex labore: & illa, quæ ex tranquillitate, & illa, quæ fit ex euacuatione: & de eis est febris ephimera ex dolore: & de eis est febris ephimera, quæ est cum syncope, & de eis est illa, quæ fit ex fame, & de eis est illa, quæ fit ex siti. Et de comparatis ad ea, quæ non sunt actiones, est illa, quæ fit ex oppilatione: & de eis est illa, quæ fit ex nauseatione satietate: & de eis est illa, quæ fit ex apostemate: & de eis est illa, quæ fit ex asperitate uel siccitate cutis. Comparatæ autem, ad res, quæ accidunt deforis sunt, sicut illa, quæ fit ex adustione solis, & sicut quæ fit ex condensatione cutis facta ex frigore, & facta ex ablutione cum aquis stypticis. dicam itaque unamquamque earum cum curatione sua.

De febre ephimera ex angustia, & signis eius. Cap. XI.

Quandoque accidit ex motu spiritus ad interiora, & concultatione eius in eis propter superfluitatem angustia febris spiritus. Cuius signa sunt igitur vrinæ, & acuitas eius: ita ut habens eam sentiat acuitatem ipsius, propter dominium siccitatis in ea: & est motus oculi ad clausiorem declinans: & est oculus submersus propter resolutionem cum quiete. & poris, & facies est tendens ad citrinum tamen propter profunditatem caliditatis. Et pulsus est ad debilitatem, & paruitatem de cluui: & forte declinat ad duritiem.

De cura. Cap. XII.

Oportet ut habens eam multiplicet introitum tinx, & ponat plurimum suæ intentionis in balneatione cum aqua balnei absque acre eius, & multiplicet eam inunctionem cum oleo post illud. oleum enim est magis iuuu tiuum ei quam balneum. Et utatur lactibilibus, & odoriferis frigidis. Et ponat super pectus suum epithemata infrigidantia ex mucilagimbus, &

succis, & aquis boni odoris, &umat in potu vinum plurimum commissionis: est enim bonum medicamen ei.

De febre ephimera ex ira. Cap. XIII.

Quandoque accidit ex multitudinem tristitiæ propter rem quæ sita motus laboriosus, spiritum calefaciens, faciens cadere in febrem: cuius signa sunt familia signis raris, quæ est ex angustia: nisi quia motus oculi cum profunditate sua, propter resolutionem est ad partem extrinsecam: & pulsus non est demissus depressus: immo est in eo elevatio aliqua cum debilitate: si ipsa debilitas fuerit cum eo. Et cura eius est sicut cura eius, quæ est ex angustia.

De febre ephimera ex cogitatione. Cap. XIII.

Quandoque accidit ex multitudinem cogitationis in rebus, febris similis illi, quæ est ex angustia, & tristitia, nisi quia motus oculi est æqualis, non ad clausiorem, neque ad exitum declinans, & est declinans ad profunditatem: & pulsus est diuersus in elevatione & depressione: & plurimum quidem est æqualis: Et facies est ad citrinatam declinans. Et cura eius est cura illius, quæ est ex tristitia.

De febre ephimera ex ira. Cap. XV.

Quandoque accidit propter superfluitatem motus spiritus ad exteriora in dispositione iræ, calefactio superflua accendit in spiritu. Cuius signa sunt rubedo faciei, nisi permisceatur ei timor, quoniam citrinat: & inflatio faciei similis ei, quæ inflatur in dormitione: Est suus oculi rubei tendentes exterius propter vehementiam motus spiritus ad exteriora. Et quandoque accidit quibusdam eorum tremor, propter motum humoris: aut propter debilitatem naturarum: Et est aqua rubra, beui tamen propter acuitatem suam. Et quandoque est cum ea aliquotulum claritatis. Et pulsus est grossus, plenus, & uultus, frequens.

De cura. Cap. XVI.

Fac eos quiescere, & fac ut occupentur laticantibus, & narrationibus, & vocibus bonis & ludis mirabilibus: & fac eos ingredi balneum in aqua tepida, non plurimi caloris: & iungantur plurimum cum aliquo oleo pluri mo. illud enim est magis conueniens eis, quam aqua calida. Et cibentur eis, quæ infrigidant, & humectant: Et prohibeantur a uino omnino, non enim est eis via ad ipsum.

De febre ephimera ex vigilijs. Cap. XVII.

Q Vandoq; etiam accidit ex vigilijs febris ephimera: cuius signa sunt, antecessio vigiliarum, & grauitas palpebrarum, & fortasse non aperit eas, & profundatio oculi propter resolutionem, & inflatio palpebrarum propter corruptionem cibi, & multitudinem vaporis. Et conturbatio vrinæ propter priuationem digestionis. Et debilitas pulsus: Excitritas faciei propter malitiā digestionis: Et inflatio eius propter rumefactionem factam ex malitia digestionis, sed non est cum rubedine, sicut in illa quæ est ex ira.

De curatione. Cap. XVII.

C Vratio autem eius est nciari, & quiescere, & docuere, & embrocare caput eum eis, quæ infrigidant, & humectant: & balneum humidum, & cibi bonorum chymorum: & inunctiones humectantes. Et vinum est ex rebus thargis conferentibus eis: & fumant in potu ipsum sine timore, nisi fuerit dolor capitis.

De febre ephimera ex somno & quiete. Cap. XIX.

A Spiritu quandoque resoluntur vapores calidi per vigilias, & motus. Cum ergo prolongatur somnus, & tranquillitas, & non resoluntur: accidit ex eis calefactio spiritus & febris eius. Cuius signa sunt ista, significat enim eam antecessio somni, & tranquillitas plurima, & proprie, quæ non est in consuetudine, & cadit contrarium consuetudinis, & significat ipsam repletio vaporosa pulsus.

De curatione eius. Cap. XX.

C Vratio eius est sudatio in aere balnei, & ablutio æqualis cum aqua calida, & paucitas cibi, & declinatio eius ad id quod infrigidat, & humectat ipsum, & exercitium temperatum, & non oportet vt bibat vinum.

De febre ephimera ex gaudio. Cap. XXI.

Q Vandoq; accidit ex gaudio febris, signum illa quæ sit ex ira. Cuius signa sunt propria signis eius, quæ est ex ira, nisi quia forma oculi est forma gaudentis, non forma irascentis. Et est frequentia in pulsu minor. Et cura eius est proxima curationi eius, quæ est ex ira.

De febre ephimera ex timore. Cap. XXII.

Q Vandoq; accidit ex timore febris secundæ semina, quæ accidit ex angustia. Proportio

nanti timoris ad angustiam, est proportio itæ, ad gaudium, ex hoc; quod motus, timoris est ad interiora, & ira ad exteriora, & sic subitot, & aliorum modorum sic graduum. Cuius signa sunt proxima signis eius, quæ sit ex angustia: nisi quia diuersitas in pulsu est vehementior: & forma oculi eius est forma terri. Curatio eius est proxima curationi eius, quæ sit ex angustia: & oportet ut securetur à timore: & veniatur ad eum cum nuntijs gaudere facientibus: & vinum conferat eis.

De febre ephimera ex labore. Cap. XXIII.

L Abor quandoq; peruenit ad summum in calefaciendo spiritum, ita ut fiat febris notens operationibus, & est plurimi nocturni, & grauitatis ipsius super vitalem, & animalem. Signa sunt antecessio laboris, & additio calefactionis inunctionum super alia: & sensatio lassitudinis: & societas corporis. Et quandoq; accidit in fine eius humectatio, si fuerit labor temperatus, & non fuerit calor exsiccans, aut frigus prohibens sudorem. Si autē labor fuerit superfluum, minoratur humectatio, & sudor: & quandoque sequitur ipsum tusus sicca propter communitionem pulmonis: & fit pulsus eius parvus debilis: & quandoq; declinat ad duritiem: & vrinæ est citrina, acuta propter motum, & subtilis propter resolutionem.

De cura. Cap. XXIII.

C Vratio eorum est tranquillitas, & balneatio in vina: & inunctio cum fricatione leui super iuncturas: & acceptio cibi boni chymis, humectantis, secundum quantitatē quā digeratur, de genere carniū pullorum, & hœdi, & pisium petrosorum. Et quoniam virtutes eorum sunt debiles, tunc non oportet vt confidant de se, posse digerere, quod digerebāt in dispositione sanitatis: immo minus illi. Et propter hoc ebentur eis, quorum pauca cum nutrit plurimum, sicut ea quæ diximus: & sicut vitellinorum forbilibium, & testiculi gallinæ sunt eis boni. Quidam tamen existimauerunt quod non oportet vt patientium lassitudinem regimen plus subtile licet quam aliorum: sed illud non est rectum. Et oportet vt sumant de fructibus humidis. Et simant in potu vinum plurimum commissionis, si fuerint assueti aut iuleb, & aliud, si non fuerint consueti. Et oportet vt eorum inunctio sit plurima, quam inunctio aliorum cum oleo aliquo vt humectentur eorum membra, & iuncturæ exsiccant: & iterum vt mollesceat illud quod accidit eis de tensione. Et oleum vini est de oleis melioribus eis. Et oportet vt communiceat inunctio eorum corpori: & propriè capiti, & collo, & spondylis dorsis,

dorsis, & iuncturis omnibus: & proprie post balneationem. Et oportet vt mollificetur strata eorum, & aromatizentur indumenta eorum, & sedilia eorum: & si indigent iteratione balnei propter reliquias, iterentur omnia quae scripta sunt in capitulo suo.

De febre ephimera ex evacuatione.
Cap. XXV.

Q Vandoque accidit ex commotione humorum post ventris solutionem motus spirituum superflui, & inflammans in ipso febrem propter multitudinem lasitudinis, quae sequitur ipsam. Et quandoque faciunt eam medicinae solutivae, propter res quod ea lesant. Et quandoque sequitur phlebotomiam, propter ea quod redire facit humiditatem vaporum: & sanguinitatem earum ad furiositatem cholericam.

Curatio. Cap. XXVL

O Portet vt subtilietur vel ingenietur in retinendo naturam per ea quae sunt ordinata in capitulis suis: & vt tibiur egee cum eo, quod confortat plus secundum quantitatem qua digeratur, de eis quae infrigidat & humectant & sint in eo pontica, styptica: & ponantur super stomachum emplastra, & embroci confortantia calefacta, non tepesfacta. Nam omne tepidum est mollificativum, & resolvit virtutem. Et de hac summa est sana infusa in oleo nardino, aut oleo frigidior eo, aromatizato: & exprimaturo adeo, donec separentur ab ea partes olei. Et ponantur super cor, & hepar ea, quae infrigidant.

De febre ephimera ex dolore. Cap. XXVII.

D Olor quandoque calefacit spiritum adeo, donec inflammetur febris. Signa. Dolor in capite, aut oculo, aut aure, aut dente, aut iuncturis, aut extremitatibus, aut colica, aut haemorrhoidibus, aut alijs de doloribus furunculorum.

De cura eius quae fit ex dolore.
Cap. XXVIII.

R Egatur dolore cum eo quod oportet in capitulo suo, deinde curetur cura eius, quae fit ex labore. Quod si timeatur ex potu vini motus doloris, non detur in potu.

De febre ephimera ex syncopi. Cap. XIX.

Q Vandoque accidit ei, cui superuenit syncopis propter agitationem motus spirituum calefactio, quae convertitur in fe-

bre: & quandoque remanent de ea post ablationem timoris in syncopi reliquiae. Signa. Vicinitas syncopis, & casus virtutis absque signis februm aliarum, quae non sunt ex febris ephimeris. Et pulsus in ea est diversarum dispositionum. Quandoque enim eadit, & destruitur, quando vincit frigus: Et quandoque fit velox, & apparet, cum dominatur caliditas: & simulatur pulsus patientium extenuationem exiectionum, in durtie cum dispositione pulsus vermicularis.

Curatio. Cap. XXX.

C Vra eius est cura syncopis, & dare cibos velocis digestionis, boni chymi, de illis quos seiniisti: & si indigneris vt des in potu vinum, fac: & non cures de febre. Cum ergo liberatur ex syncopi, & remanet febris, similis ei, quae est cum extenuatione, curetur eum eo quod est in eanone de infrigidatione, & humedatione.

De febre ephimera ex fame. Cap. XXXI.

Q Vandoque accidunt vapores in corpore quando non inveniunt, nutrimentum, & generant febrem: Et eius pulsus est debilis, parvus, & quandoque declinat ad durtiē. Curatio. Cibatio quidem in febre est sicut ex sorbitionibus factis ex Kist hordei cum oleribus, & post illas cum cibis bonis confortantibus: Ex balneis, & effundatur super caput eius aqua plurima tepida: & sedeat in ea, & humectetur corpus eius cum eis, quae sunt sicut oleum violae, & rosae, & cucurbitinum.

De febre ephimera ex siti. Cap. XXXII.

H Aec proxima est ei quae est ex fame: & est dignior vt accidat propter defectum aquae cum qua sedatur caliditas fortis in vaporibus. Curatio. Est dare in potu aquam frigidam, & aquas fructuum frigidorum, & proprie granatorum. Et humectare corpus cum tina, & si possibile est ei balneatio cum aqua frigida, faciat.

De febre ephimera ex oppilatione.
Cap. XXXIII.

O ppilationes sunt in poris cutis, propter siccitatem eius, & paucitatem abluitionis, & multitudinem pulveris, & propter frigiditatem. Et propter abluitionem cum aquis frigidis stypticis. Et propter adustionem solis. Et quandoque fit in villis venarum, & in ramis earum, & orificijs ipsarum, & cursibus seu vijs earum. Et cum dicitur febris ephimera ex oppilationē, non innuitur nisi ad hanc speciem. Nam accidit vt minoretur resolutio, & multiplicetur reple-

repletio, & coarctatio, & priuatur respiratio, & aggregetur vapor plurimus, calidus, & non resoluatur, & tunc eueniat caliditas superflua, & dum perseverauerit eius inflammatio in subtiliori exorporibus, quod est spiritus, erit febris ephemerica. Quod si inflammatur in sanguine, est species famosa sinochæ, quam dicemus: & est illa, quæ est de summa febrium humorum, & non est propter putredinem, immo est propter inflammationem, & ebullitionem. Quod si perducatur illud ad putredinem, quam facit opilatio & priuatio respirationis, permuatatur ad febres putredinis. Et huiusmodi quidem oppilatio, aut sit ex multitudine humorum, & sanguinis, aut ex grossitudine eorum, aut ex viscositate eorum: aut propter casum rei de causâ opilationis in instrumento, non in meatu sicut frigus costringens, aut apostema coarctans, aut nascentia rei: aut aliud de illis quarum te oportet rememorari. Et hæc quidæ febris de febribus ephemeris parum permuatatur ad hecticam: quoniam corpus in ea est plurimè materiæ. Et in hac febre iterum est sitis, & inflammatio, & adhærentia caliditatis: & urina media inter igneam, & fuscâ. Et hæc febris est difficilis ad cognoscendum, cuius similitudo est proxima similitudini febrium humorum. Et hæc febris quandoque remanet usque ad diem tertium, & in eo quod est post ipsum, si sunt opilationes plurimæ fortes. Et non sunt opilationes cum inspiratione cutis satisfactæ: deorsum: & si sunt opilationes paucæ, scilicet eius eradicatio, si non fuerit error. Et hæc febris inter febres ephemeræ, quandoque accidit, & redit propter fixationem oppilationis, quæ est causa quare hunc ei sicut paroxysmi. Et hæc quidem febris multo tunc permuatatur ad frigus, & horripilationem, & significat quod ipsa sit putrida. Et cum illa quæ est ex opilatione facit accidere dolorem in latere sinistro post phlebotomiam lateris dextri non est excusatio iterationis phlebotomiz: præcipue cum sedatur febris, & perseverat dolor. Signa. Quando accidit febris ephemeræ non à causa primitiva, & est longe declinationis, tunc existima, quod ipsa est ex opilatione, & proprie quædo declinat siue euacuatione torrida. Et verificant existimationem suam signa repletionis, in corporibus plurimi sanguinis, & generatibus eûs aut grossorum humorum, viscosorum. Et differentia quidem inter ea ambo est, quoniam si opilationes in eis sunt propter grossitudinem humorum, & viscositatem eorum, significant ea si gna nota eis, & non est illic inflatio corporis, & rubedo, & tensio; & ad summum non sunt illic signa multitudinis. Et in illis in quibus causa est repletio, sunt signa repletionis ex rubedine faciei, & exuberatione vcnarum, & inflatione, & tensione, & alia apparentia. Et si superfluum oppilationes, pulsus est parvus; & si non superfluit,

non oportet ut minoretur pulsus. Cura. Cum causa est multitudo humorum & repletio, tunc oportet ut in principio propere ad phlebotomiam, & euacuationem. Et ut phlebotomes cum cumiam non febricit, tunc est melius. Et quando febricit, si non fuerit necessitas, tunc statio est magis conueniens: phlebotomia enim facit humores currere, & præmisceat inter eos. Si autem non fuerit excusatio, tunc non oportet ut postponatur, & tardetur phlebotomia, & euacuatio. Deinde fiat occupatio in eius quæ aperiant oppilationes, & mundificent meatus. Et non propere aut euacuationem ad mundificandos meatus, & apertionem. Illud enim fortasse sit causa ad auerendum humores subito ad quosdam meatus, & inuisandum in eis: illud est res in quas sunt errores plurimi: & fortasse addit in oppilationibus, si fuerint grossi, & proprie si meatus in creatione sua fuerint stricti. Verum phlebotomia iterum, & euacuatio quandoque educunt superfluitates fumosas, facientes coarctatione sua hanc febrem, & prohibent, ut permuatetur ad putredinem & proprie cum ad ultimum facis eam pervenire, & facis approximare syncopi. Et si non sentis multitudinem humorum, immo sentis oppilationes, & quod ipsæ sunt accidentes à grossitudine eorum, & viscositate ipsorum: tunc fortasse non indiges phlebotomia superflua, & euacuatione superflua: immo indiges à pertione. Et apertio quidem est cum abstergentibus ex medicinis, & cibis. Et propterea quod egritudo est febris, non est possibile ut redeas in aperiendo ad abstergentia calidissima ad illa quæ sunt inter syrupum acetosum parum, usque ad illum qui est cum seminis, & aqua conditur usque ad aquam fœniculi. Et cibus sit ille in quo est ablutio: & non in quo est viscositas, sicut Kist hordei. Et zuccharum cum hoc quod ipsum est propinquum cibo, est in ipso apertio, & absterfio: non est ergo malum si misceatur cum Kist hordei. Demum oportet ut cõsideres cum euacuaueris, si necessaria fuerit euacuatio eius, & facta fuerit apertio sicut cum eis quæ diximus, an minuat febris, & deficiat, & an, si paroxysmos habuerit, frangatur, & debilitetur paroxysmus eius secundus à primo. Et considera urinam: & si inuenis eam non priuatam digestionem: & in pulsu, & si inuenis eum non significare putredinem, procede secundum hoc regimen. Et intermitte egrum in die tertio post paroxysmum in balneum, hora mollificationis paroxysmi expectati, si fuerit febris, usque ad quinque horas. Et inunge eum: & frica ipsum cum rebus in quibus est absterfio æqualis, sicut quod est inter farinam fabarum usque ad farinam orobi, & farinam radicum lilij, & aristolochiæ mollit eum aliquantulo mellis & aque. Quod si fueris ausus uti fortiori hoc, tunc utere spuma baurac. Et si enisimas quod balneum altera

terat naturā eius in aliquo, & facit accidere quasi horripilationem, non moretur in eo ictu oculi: oppilationes enim istæ non sunt de genere earum, quas aperit balneum. Cum ergo egreditur de balneo, nō oportet ut approximet cibo, neq; uino, nisi post securitatem ex paroxysmo. Si autem exigit dispositio ut cibetur aliquantulum, & non tolerat: detur in potu id in quo est apertio, sicut aqua hordei subtilis, plurimæ aque, pauci hordei, plurimæ decoctionis, decocta cum apio. Quod si paroxysmus non iteratur ei, tunc balnea cum secundo, si desiderauerit illud, & ciba ipsum. Et si fuerit paroxysmus diminutus à paroxysmo primo, & urina fuerit bona, tunc con fide in ueritate curationis, & paucitate oppilationis: & cura eum post eradicationem eius, sicut curasti, & ciba ipsum. Et si uenerit paroxysmus sicut fuit, aut fortior illo, & urina non fuerit sicut oportet, tunc agritudo est tendens ad putredinem: & curatio eius est curatio putredinis.

De febre ephimera ex nauseatiua satietate, & repletione. Cap. XXXIII.

QVandoq; accidunt ex nauseatiua satietate uapores mali, ex quibus accenditur caliditas, & inflammantur spiritus, quare accidit febris & proprie in corporibus cholericis: & in illis qui non habent amplos poros. Nā plurimum superfluitatum eorum uaporat uapores famosas: & minoratur in eis eructatio acida. Et de illis qui sunt uehementius dispositi ad illam, sunt illi qui incipiunt post nauseatiuam satietatem uti exercitio, & motu, & ire sub sole, & balneatione postquam accidit eis hoc: multi plicantur enim in eis uapores fumosi: & proprie quando habuerint in corporibus suis dolorem & mordicationem, & proprie in uisceribus eorum. De materia uero eructationis acetosæ, & in habentibus eam, raro contingit ut generetur febris. Si autem generetur erit debilis: immo nō generatur. Et existimamus febrem generatam cum eructatione acetosa esse propter causam aliam à satietate nauseatiua. Et isti quidem cum eorum soluantur natura, iuantur ualde, & remouetur febris eorum propter expulsionem superfluitatus inersis fluxu fumosæ. Et diuersificatur quidem curatio eius, cuius retinetur natura ex illis, & cuius soluitur. Et si natura illius, qui febricit ex nauseatiua satietate, leniatur duabus ascellationibus, aut tribus, deinde phlebotomeatur, fortis fit super eam fluxus ventris: & fortasse fiet fluxus hepaticus, quem significabunt pulsus cordis, & uigredo linguæ. Et simulantur accidentia febris ephimeræ ex repletione accidentibus febris conclusæ: rubent enim oculi, & facies ualde, & fit inflammatio uehemens, & magnificatur pulsus, & fit uelox: & rubet urina,

Amplius cum plus remanet, non excedit tres dies. Et scias, quod febris ephimera ex nauseatiua satietate quandoq; uenit cum periodicis quatuor, aut septem, & cum hoc est febris ephimera, uerum pulsus eius est sanus. Signa eius sunt alteratio eructationis ad acetositatē, aut fumositatem. Cum ergo alteratur eructatio ad sanitatem, indicat sanitatem. Et urina quidem istorum est priuata digestionē aquosa. Et quando causa nauseatiue satietatis est uigilia, est in facie, & faucibus eorum inflatio: & in palpebris eorum est grauitas.

De cura. Cap. XXXV.

PAtiens hanc nauseatiuam satietatem non euacuatur quin aut sit natura eius non soluta, aut sit soluta. Quod si natura eius fuerit non soluta, tunc convenientius est ut soluas eam. Et si fuerit aliquid cibi, aut facis, aut grauitatis remanens in stomacho, tunc oportebit ue facias uomere ipsum, deinde solue eum. Et considera ubi inuenit grauitatē, & considera tūc, an sit rectius euacuare illud cō clysteribus, & suppositorijs, aut cum aliquo, q̄ bibit de super ut soluat, aut deponat, aut digerat. Et significat illud, q̄ rectius est de hoc dispositio eructationis fortasse. n. necessarii erit, si fuerit cibus stans de super, & sit difficilis uomitus, ut non aspi ciatur ad febrem, sed administretur diapede reo, ut precipiteur, & descendat cum digestionē; aut administretur, quod est debilius eo: & administrentur embrocæ, & emplastrum digestiua cognita in capitulo digestionis: & solutiua cognita in capitulo solutionis. Cum ergo descendit, tunc aut egreditur per seipsum, aut inuabitur cum supposito. Et toleretur fames super eum tamdiu, donec non remaneat hesitatio in destructione satietatis nauseatiuæ: deindeumat cibū leuem, uelocis digestionis, boni chymi, & festinatio ad famem, & ad somnum, est ex eis quæ sunt sufficiens curatio uel sufficiens adiutorium in al leuatione repletionis. Quod si natura fuerit soluta, considera aut res, quæ euacuatur, sit illud quod est corruptum. Et si fuerit illud, non retineatur donec totum euacuetur usq; ad postremum eius. Et expecta declinationem paroxysmi, & fac ingredi ipsum tunc balneum, & ciba ipsum, nisi fuerit illic superfluum destruens uirtutem: tunc enim non facias ipsum ingredi balneum, immo ciba ipsum, & conforta stomachū eius cum rebus, quas scies, & quarum quædam scripæ sunt in capitulis de solutione ventris: & de illis est lana infusa in oleo, in quo est uirtus absinthij, aut etiam in oleo nardino postquam fuerit expressa, & separata fuerit ab ea maxima pars olei. Et si perseverat solutio, & inuenis id, quod egreditur, absq; genere eius, quod corruptum

ptum est, admixtura oleū de cydonijs bonum, recens secundum hunc modum, & oleum de ma-
stice: & noueū iterum in oleo nardino contra-
rietis eis. Et fortasse admixtrabimus cerataria,
& proprie quando non suffert dispositio strictu-
ram eorum super ventres eorum. Et quandoque
indigemus emplastris fortioribus hoc, de empla-
stris prædictis in cholirica passione. Et da eis in
potu aquas fructuum, si desiderat eas: & da ei
ad comedendum illud cuius alleuiatur nutrimen-
tum, & facilis sit digestio, sicut testiculi galli
& pisces atradradi, & præmitte super illud aliquid
de fructibus, & succis, & robis stypticis. Et si ab-
scinditur de appetitu aliquid admoue ipsum cum
eis, quæ scilicet, & proprie cum eis, quæ sunt ex
cydonijs. Et cum expeditis fueris: non est ma-
lum, ne administras ei electuarium forte de illis,
quæ digerunt, & confortant stomachum, & ape-
riunt oppilationes: & illud postea ablationem fe-
bris, & accidentium. Et iter quidem ad phlebo-
tomiam est, ut non fiat in ea, donec declinet: tūc
enim fiat: & illud quod prius datur in potu, est
aqua hordei. Et cibus sit sicut ille, qui sit de agre-
sta cum cucurbita, & amygdalis paucis. Et infrig-
idetur locus eius, & odoramentum eius, & tro-
chisci de camphora in quibus non ponitur reu-
barbarum.

De febre ephimera ex apostemate. Cap. XXXVI.

Febres sequentes apostemata interiora sunt
putridæ. Et quandoque associantur eis hæc
ca: & non sunt de numero febrium ephime-
rarū. Apostemata uero extrinseca, sicut sunt
furunculi, & exitura, vel bubones, quæ eueniunt
in ea, & proprie apostemata magna, quæ sunt
in membris glandulosis, & in carnibus, quæ vo-
cantur molles, sicut illa, quæ sunt in inguini-
bus à superflicitatibus hepatis, & in ascellis à
superfluitatibus cordis, & sub aure à superfliui-
tatibus cerebri, quandoque sequuntur febres, &
non euacuantur quin aut sit illud, quod perme-
nit ex eis ad cor donec igneat ipsum calefactio
sola, aut cum putredine: quod si fuerit calefac-
tio sola: tunc erit de genere febrium ephime-
rarum. Et si fuerit calefactio cum putredine,
tunc erit de genere febrium apostematum intrin-
secorum. Et plurimum, quod accidit de istis fe-
bribus sequentibus apostemata sequentia cau-
sas primitiua ex viceribus, & scabies, & dolori-
bus, & percussioneibus, & calibus, ad quæ expel-
luntur materię, & retinentur in uis: apud car-
nes molles, est de genere febrium ephimerę. Et plu-
rimum, quod accidit de istis febribus sequenti-
bus apostemata, quorum causę sunt anteceden-
tes, sicut repletiones & oppilationes præteritę:
sunt putridę, & secundum plurimum febres sunt
radices, & apostemata sunt sequentia, licet quan-

dōq; accidat è contrario. Et Hippo. nominauit
has febres, malignas, quę ex eis sunt ephimerę,
& quę non sunt ephimerę. Et febres quidem se-
quentes ea secundum plurimum sunt ephimerę,
& si non sunt ephimerę sunt malę. Et plurimum
quidam harum sequuntur apostemata sanguineę
& quandoque: accidunt sequentes erysipilam, &
similia ei. Signa earum sunt ea, quę diximus de
antecessione apostematum ante eas. Et facies
est inflata & rubea, augmentata in his duobus
super dispositionem, sanitatis. Et non est calidi-
tas vehementer mordicans, quamuis sit multitu-
do eius in eis: quoniam huiusmodi apostemata
sunt sanguineę, nisi sint febres sequentes erysipi-
lam: & tūc istis febribus succedit humectatio nel
roritas refudans à corpore, & est pulsus in eis
uelox, magnus, frequens propter repletionē &
caliditatē. Et est urina aquosa alba propter cur-
sum materierum ad apostemata, & ulcera. Cura,
Oportet ne antecessio fiat in ea cum phleboto-
mia, & fluxu uentris. Et curetur apostema cum
eo, quod oportet in capitulo suo. Et subtilietur
regimen: & non bibat unum omnino: & non
cibetur, nisi post declinationem completam. Et
necessaria sunt extinguentia, & infrigidantia hu-
mectantia: & emplastra infrigidata cum niue su-
per membrum infirmum apostemosum ita ut
non noceant apostemati, neq; faciant ipsum cru-
dum: immo infrigidetur uia inter ipsum, & cor,
infrigidatione penetrante in profundum.

De febre ephimera ex siccitate vel asperitate.

Cap. XXXVII.

Hæc febris iterum sequitur priuationem
resolutionis propter oppilationes non
profundas. Et plures quidem hominū
cum dimittūt consuetudines suas balneandi, fe-
briunt. Et plures eorum sunt illi, in quorum cor-
poribus generatur uapor cholericus, propter cō-
plexionem corporum eorum, & ciborum ipso-
rum, & aquarum ipsarum, malarum, & propter
dispositiones eorum accidentes ex nigilijs & la-
bore. Curatio eius est extinctio, & administratio
balnei, & sudare in eo post declinationem.
Et fricari cum eis, quæ sunt sicut furfur, & farina
fabarum, & amygdalarum amararum, & semen
melonis, & aliquid de alafnan, & baurac. Et
sit cibus plures extinguens, & humectans: & omnū
eius sit purissime commitionis. Et iterum balneū
multoties.

Febris ephimera ex calore. Cap. XXXVIII.

Quandoque accidit ex calore aeris, & calo-
re balnei, & similium, febres ephimerę,
Et plurimum illius non accidit nisi ex
vehementia caloris Solis. Et est prima suspensio
cius

eius cum spiritu animali: cum primū, quod eo læditur, sit caput: calefacit enim aer eius, & peruenit ad cor, & sit febris: deinde spargitur in totum corpus. Et quandoq; sit eius suspensio cum eorde propter caliditatem anhelitus: & quando custoditur caput à calore. Sed illa, quæ ex Sole accidit, plurimum imprimit in cerebro & capite: & propter illud, qui non est mundus, impletur caput eius. Et illa, quæ non fit ex Sole, sed fit ex diebus canicularibus, & ex balneatione, & ex alijs, impressionem facit in cor. Signa sunt causa eueniens ex uehementia inflammationis capitis in parte solari cerebri. Et fortasse est eum gravitate, & repletione, si non fuerit corpus mundum. Et magnitudo anhelitus in parte cordiali. Et illud, quod apparet de corpore uehementis caliditatis calidius interiore eius. Et de illis quibus scitur, illud est quod sitis eius est minor siti illius, cuius caliditas, est illa caliditas, & est in hac habitudine contraria uel diuersa ei, quæ est ex densitate. Curatio. Est necessarium ut incipiat in curatione eius cum eo, quod infrigidat ex embrocis super caput, & pectus: & ex oleis frigidis, & proprie oleo rosæ. Infrigidato super niuē, quod fundatur super caput, & pectus ex loco longinquo. Et detur in potu aqua frigida & quæ current cursu eius: & sine cessatione eius fiat illud usque quo declinet febris. Cumq; auferatur ingreditur tinam & non curetur de catarrho, si fuerit cum eo, & balnea eum cum aqua tepida: & non permittas aerem eius calefacere ipsum: & non timeas ex effusione aquæ calidæ super caput eius: quoniam ipsa humectat, & resoluit febre: & necessitas ad balneandū plus est, quàm necessitas ad frictionem. Cum ergo egreditur: inunge uehementer caput eius cum oleis frigidis, sicut est oleum rosaceum, & de uenefare.

De febre ephimera, quæ accidit ex soliditate uel condensatione cutis causata à frigore.
Cap. XXXIX.

Q Vandoq; accidit ex frigore, & balneatione cum aquis frigidis, ut condensentur pori extrinseci: & coarctentur uapores sumosi, secundum quod dictum est in illa, quæ sit ex siccitate uel asperitate cutis: quare accidit febris, & multoties perducit ad putridam. Et non perducit ad illam febrem, nisi quando vapor præcoctus est acutus, non suauis. suauis enim non generat eam. Signa eius sunt causæ: & corpus in ea in primis cum tangitur, non est uehementius aliditatis. Cumq; figit ut manus, sentitur calor eleuari. Et pulsus non est in paruitate, in qua est in illa, quæ sit ex angustia, tristitia, & fame, quoniam non est illie resolutio: sed est uelox propter necessitatem. Si attrahendi aeris nisi sit frigida uehementia: & fortasse declinat ad duritiem

Et oculus non est profusus, immo quandoq; est inflatus propter uaporem coarctatum. Et uirina quandoq; est alba, quoniam caliditas est præfocata: & quandoq; est tincta, quoniam caliditas, quæ resolebatur ex poris expellitur ad uirinam. Curatio. Cooperantur in febre, donec sudent: cum ergo declinant, ingrediantur balneum, & balneentur eum aqua ad caliditatem declinui, & cum aere calido: & embrocantur super ipsos aquæ in quibus decocta sunt, sicut amaracum, & anethum, & silybrium. Et fricetur cum eis, quæ diximus, quæ absterguunt poros, & mollescent eos. Et postponatur in eis inunctio usquequo sudent, & fricentur, & balneentur eū aqua calida ualde. Et oportet ut antecedit balneatio cum aqua, balneatio ei auri: deinde inungatur cum aliquo ex oleis dilatantribus poros. Et fundatur super capita eorum sicut oleum de anetho, & Keiri, & de chamæmilla. Et cibentur eis leuibz, & aromatizentur. Et sumant in potu uinum album, subtile, comistum: & est melius eis, quàm aqua propter id, quod est in eo de sudatione, & prouocatione. Et inunctio eum oleo aliquo patientibus ex labore, est magis iuuatiua, quàm patientibus ex soliditate.

De febre ephimera ex soliditate uel condensatione cutis causata ex aquis stypticis.
Cap. XL.

Q Vandoq; accidit illis, qui balneantur in aquis stypticentem facientibus sicut super quam uincit uirtus aluminis, aut draganthi, ut uehementi fiat spissitudo pororum extrinsecorum, quare coarctantur eorum uapores: & accidit eis, quod diximus aliquoties: & multoties quidem perducit ad putredinem.

Designis. Cap. XL.

Significant eam causæ, & quod significatur de asperitate cutis, quasi ipsa exsiccata sit præparata præparatione, qua præparantur coria: & sicut si tangatur cutis infusa in aqua draganthi: & est dispositio in additione caliditatis post tempus ex tactu manus sicut in alijs de illis, quæ accidunt ex oppilatione pororum. Et pulsus est debiliior, & minor, & uehementioris uelocitatis. Et uirina est uehementius alba, & tenuis, sicut uirina mulieris: & non est in corporibus eorū detumitio uel extenuatio, neq; in oculis eorum profundatio. Cura. Oportet, ut curetur cum propinquitate curationis eorum, qui sunt autem eos: ueruntamen eis non datur in potu uinum, nisi post fiduciam uehementiæ ampliatu uis pororum, nisi sit condensatio paru: fortasse enim tunc aperit eam uinum. Et oportet ut subtilisatio regiminis ipsorum sit maior: & mora

morae eorum in aere balnei, & balneatione eorum cum aqua calida maior. Et oportet ut tardetur immutatio eorum plus.

De febre ephemerâ ex vino. Cap. 42.

Q Vandoque accidit ex vino febris ephemerâ, & cura eorum est cura ebrietatis. Et fortasse indigent solutione cum aqua fructuum, & similibus, & phlebotomia, & vomitu, & proprie quâdo persequatur dolor capitis eorum. Et oportet ut ingrediatur balneum post declinationem,

De febre ephemerâ ex cibis calidis. Cap. 43.

Cibi calidi faciunt febrem ephemerâ: & sicut illa, quæ est ex Sole secundum plurimum, est cerebralis, & in spiritu animali: & illa, quæ fit ex balneo est cordialis, & in spiritu vitali similiter illa, quæ fit ex cibo est hepatica, & in spiritu naturali.

De cura. Cap. 44.

Eius curatio est provocatio cum infrigidantibus notis: & solutio naturæ est melior cum siccis, & tamarindis. Et rectificare hepatis cum eis, quæ sunt aqua edulcorata, & oleum, & syrupus acetosus: & emplastra infrigidantia ex sandalis, & camphora, & aqua rosæ, & oleo, & succo eius, & ex succis olerum infrigidantia actum. Et extinctio cum cibis frigidis, & humidis.

Principium sermonis de febribus putridis & completam sermonis est in febribus sanguinis, & cholericis.

TRACTATUS II.

Sermo universalis de febribus putridis. Cap. 1.



PUTREDO accidit aut propter cibum malum, cum est preparatus ut putrescat illud, quod generatur ab eo propter malitiam suæ substantiæ. Aut propterea, quod non lociter recipit corruptionem, quævis sit bonæ substantiæ, sicut lac. Aut quoniam est aquosus, nutritivum mali, removens sanguinem a substantia sua vel grossitie sua sicut illud, quod generatur a fructibus humidis valde. Aut quæ est ex illis, quæ non convertuntur ad sanguinem bonum: imò remanet humor malus frigidus, quæ abhorret calorem innatum, & putrefacit ipsum extraneum sicut ille, qui generatur a cucumere, & citrulo, & piris, & similibus. Aut per malitiam artificij eius, aut horum ipsius. Aut ordinis eius secundum quod scis. Aut per oppilationem prohibentem respirationem, & evocationem, per coactionem corporis mali cum non potest digestionem facere bonam. Et sunt iterum virtutes de illis, quæ non faciunt in cibo aut humore aliquid, quare dimittuntur.

tunt cum crudum. Et hinc quidem complexio aut generat humorem malum, aut corrumpit id quod generat per abbreviationem suam in digestionem, & quia movet eum motu pigro. Et istæ causæ sunt iuvantes in generatione oppilationis generantis putredinem. Aut propter dispositiones extrinsecas ex aeribus malis, sicut est aer pestilentius, & aer lacunarum, & locorum insulorum in quibus madefiunt res ut linum & aspaltrum. Et quæ aggregat de eis numerus rerum plurimus. Et plurimum causarum putredinis humorum est oppilatio. Et oppilatio quidem aut est propter multitudinem humoris, aut grossitudinem suam, aut viscositatem sui. Et easque multitudinis humorum, & viscositatis, & grossitiei humorum sunt notæ. Et generatio oppilationis est nota. Ergo quæ fecerint oppilationem, accidit putredo propter evocationis privationem, & proprie cum fuerint succedentes ei motus in non sua hora super repletionem, & nauseatiam satietatem. Et balneationes similiter aut statim sub Sole aut sumere calcifacientia super repletionem: & dimissio cautelæ observationis digestionis in stomacho, & hepate, & succurrendi defectui si acciderint cum calefactione ipsorum amborum cum iuvamentis sen epithematibus, & fomentationibus, & vaporantionibus. Et putredo quidem quæ est cõis corpori totius: & quæ est in membro propter debilitatem suam: aut propter vehementiam caliditatis suæ extraneæ, & suæ acuitatis, aut doloris eius. Et humor recipiens putredinem, aut est cholera cuius natura est ut illud quod ab ea vaporat sit vapor fumosus subtilis acutus aut sanguinis cuius natura est ut evaporat ab eo vapor subtilis: Aut phlegma cuius natura est ut illud quod evaporat ab eo, sit vapor spissus. Aut melancholia cuius natura est ut illud quod evaporat ab ea, sit vapor fumosus, spissus, pulverulentus. Et putredo quidem cholera facit tertianam, & quæ currunt cursu eius. Et putredo sanguinis facit cõclusam. Et putredo phlegmatis secundum plurimum, facit quotidianam: & quæ currunt cursu eius. Et putredo melancholice facit quartanam: & quæ currunt cursu eius. Et sanguinis locus est intra venas, quare putredo eius est intra venas. Cholera autem & phlegma, & melancholia quæque putrescunt intra venas: & quæque extra venas: & quæ putrescunt extra venas, si non est causa alia, neque est putredo in apostemate intrinseco, quod det cordi putredinem cõtinuam, faciunt periodos quas diximus unicuique humor accidere & eradici quævis phlegmatica non eradicetur, quin ibi sint reliquæ occultæ. Et quæ putrescunt intra venas faciunt ad hærentiam febri: & non eradicatur neque est proxima ei, quæ eradicatur: imò est assidua, inseparabilis: sed ei est vehementia per quam cognoscitur parosysmus, qui est ei. Et quæ putredo est intrinseca cõis super venas omnes aut super plurimum earum, quæ vicinatur cordi, tunc non sunt forsitan additiones, & diminutiones apparentes.

tes. Cum autē est secundum contrariū eius apparent alterationes manifestę. Et febris putredinis quidē extrinsece non eradicatur, & reddit nisi qm̄ materiei, quę putrefit superuenit putredo in tpe paroxysmi: & finiuntur eius humiditates ex quib; pendebat caliditas, & resoluuntur & egrediuntur ex corpore: qm̄ non sunt retentę in uenis, ita ut prohibeat eas illud a cōplemento resolutionis: & remanet cinereitas eius, & ipsius tēritas, quę nō sunt uehiculum febris, & caliditatis: sicut uidetur de dispositione cumulorum stercoreum paulatim paulatim putrescentiū donec fiat cinis totū deinde non remanet caliditas. Et qm̄ non remanet in humore adusto per putredinem caliditas, destruitur febris, quousq; aggregetur uice alia ad locum putredinis. Et iam remanserunt in ea reliquę caliditatis ex putredine prima, quamuis non remaneat materia: aut propter inuentionem causę primę putredinis in materia primā, & inflātur in materia secūda secundum semē putrefactionis. Res ergo putredinis periodice procedit secūdam inuentionem caliditatis deficientis, putrefaciens & resoluens, & faciens cinerem, & perueniētis ad nīcīnū aliud, donec abscondat terminū, & finiat materiam, & non inueniat nīcīnū aliud & remaneant reliquę febris expectantes materiam aliam, quę effundatur ad locum eius. Cū aut putredo est intra uenas: tunc accidit ut sit resolutio cōpleta difficilis: & q̄ procedat putredo propter continuitatē cuiusdam rei, quę est in uenis cum quadā alia, & putrefit oīs res, quę uicina est ei: deinde procedat ad uicinum aliud. Et iterum illud, quod comprehensum est in uenis, est nehemētoris peruenitionis ad cor. Et istę quidem febres quibus sunt paroxysmi eradicationis, & teporis, qm̄q; dimittunt ordinē suū propter diuersitatem materierum in multitudine, & paucitate, & grossitudine, & tenuitate: & propter diuersitatem in eis in genere, qm̄ permutantur quędam materię, & fiunt de genere materiei alterius, quę diuersificatur ab eis in specie, non in multitudine & paucitate, & tenuitate, & grossitie tantum. Et qm̄q; sit ex malitia regiminis egri: aut propter debilitatem eius: aut propter multitudinē sensus eius. Et paroxysmi quidē qui eradicantur, incipiunt secundum plurimū cum horripilatione, aut frigore, aut rigore, & resoluuntur per sudorem. Et nō incipiunt cum frigore aut horripilatione secundum plurimū, nisi aut propter frigus humoris, aut acuitatem eius: quare humorem mordicat laceros: aut propter profundationem caliditatis ad inferiora cūmis uersus materiam: aut propter debilitatem uirtutis: aut propter frigus aeris, sicut contingit tempore hyemis. Et illud quod fit ex mordicatione caliditatis, est dignū ut proportionetur ad horripilationē, quā ad frigus. Et plurimum, quod accidit de eo, est ut sit sicut pūctio acumi in omni membro. Verum resolutio materiei cū sudore est, qm̄ caliditas pu-

trificans resoluū humiditatem, & remanet cinereitas: cum ergo sit illa humiditas non obfesa in uenis, facilis sit expulsio eius per sudorē in poris. Paroxysmi autē febris inseparabilis, quę tepescit, & non eradicatur, non incipiunt cum frigore, nisi propter debilitatem nīrtutis: aut propter profundationē caloris innati, quare infrigidantur extremitates: & illud est signū malum. Et in quibuscūq; febribus componuntur frigus, & horripilatio, qm̄ materia, quę putrefit, est cōposita ex frigido, & mordicatione. Et qm̄q; componuntur quędā febres putredinis tali cōpositione, quę sicut in forma inseparabiles: & illud est uerbi gratia, quādo incipit humor putrefieri in loco, & cū superuenierit ei putredo, incipit humor de genere eius, aut non de genere eius putrefieri: tunc obuiat paroxysmus secundus tpe eradicationis paroxysmi primi, deinde cōtinuatur res ita. Et quādoq; cōponuntur febres putredinis modis alijs cōpositionis, quos distinguā in capitulis suis. Et paroxysmi quidem febriū prolongantur quandoq;, & quandoq; abbreviuntur: & prologatio eorum est aut propter grossitudinē materię aut uiscositatē eius, aut multitudinē eius: aut ipsius quietem: aut propter debilitatem uirtutis, aut propter debilitatē sensus: aut propter spissitudinem pororum: quare non resoluuntur humoris & eorum abbreviatio est propter contrariā corū. Et paroxysmi iterum festinant, & tardantur: & tarditas eorum est, aut propterea, quia eorum materia est pauca, aut tardi motus ad mineram putredinis propter grossitiem suam, & hoc quidem est sicut materia quantā. Et uelocitas eorū est, qm̄ ipsa est multa, sicut phlegma, nisi sit uitrum, qm̄ paroxysmi eius quandoq; tardantur: aut subilis sicut cholera. Et deteriores quidem febres sunt inseparabiles in quibus putredo est intra uenas. Deinde illę, quę eradicantur, in quibus est putredo in toto corpore, aut in partibus cordis. Et parum quidem accidit senibus febriū ualde accensarum propter frigus complexionis eorū, & paucitatem carnis ipsorum. Pulsus uero dispositiones diuersificantur in febribus putredinis, secundum diuersitatem earum in generibus suis, & secundum diuersitatem speciei unius earum in behemētia, & debilitate: & in fortitudine accidentium, & debilitate eorum. Et quandoq; accidit ei dormies, aut propter apostema calidum uehementis extensionis: aut propter apostema calidū in mēbro neroso aut propter apostema dorū: aut propter nehemētiā siccitatis: aut cū dominat frigus in principijs. Et qm̄q; sit lenis p̄p̄ materiam lenem phlegmaticam, & sanguineam, & propterea, q̄ apostema est in mēbro leni, sicut illud, q̄ est in hepate, & peripneumonia, & lethargia: aut propter humoresitatē cū expectatur quē uult p̄ secedere. Et pulsus quidē in principio paroxysmorū sit debilis coarctatus propter aduentū uirtutis supermateria, & occupationē eius in mundando & euendo.

Sermo vniuersalis de signis febrium putredinis. Cap. 3.

Significant febres putredinis aduentus causarum antecedentium eas: & proprie quando non est in eis causa primitiua. Et pulsus, & anhelitus restrictio est uelox, quoniam necessitas est ad mundificandū uehementi ualde. Et est caliditas mordicatio non suauis, sicut est caliditas ephimeræ febris. Et plurimū quidem febrium putredinis antecedit almeliletu, & almeliletu quidē est dispositio, cut admisceatur caliditas, non perueniens ad hoc ut sit febris: & associatur ei lassitudo, & fractio membrorum, & pigritia, & alices, & salus, & commotio somni, & uigilia, & restrictio anhelitus, & tensio uenarum, & hypochondriorū, & dolor capitis, & pulsatio capitis. Cum ergo prolongatur facit cadere in febres putredinis: aut facit accidere debilitatem, & citrinitatem coloris. Et quandoque associantur almeliletu antecedenti febres, multitudo superfluitatis, & mucus, & nauſea, & urina plurima, & egestio plurima putrida, & grauitas capitis, & tebeo. Et accidit frequentia in pulſu non à causa extrinſeca, ex labore, aut ira, aut alijs. Cum ergo acciderit in eo coarctatio, tunc iam uenit paroxysmus, & coarctatio quidē est submersio pulsus, & paruitas diuersa in qua accidunt pulsationes magnæ, fortes, & non est uelocitas eius fortis. Sed diuersitas in principio, & in augmento est ex proprietatibus significantibus febrem putridam, quamuis non appareat in tertiana plurima apparitione propter leuitatem materiei. Et de signis quidem quod febris sit putrida, est euacuatio periodi primi sudoris, & humectationis. Ephimera enim est & contrario illius dum non permutatur ad putredinem, licet sit in principio febris tertianæ propter lenitatem eius prædictam, & quod augmentum eius est permistum, non proportionatum, non simile. Et prolixitas augmenti iterum significat, quod ipsa est putrida. Et additio pulsus in magnitudine secundum processionem significat augmentum. Amplius aut est interpollata incipiens cum rigore, aut horripilatione, & dimittens secundum plurimum cum sudore & humoresitate & procedens periodice cum paroxysmis suis. Aut est inseparabilis cum tempore aut sine tempore, non similis ephimeræ, in urina, & pulſu, & complemento mundificationis, & quiete accidentium. Et cum plurimis quidem putridarum sunt accidentia plurima ex frictu, & dolore capitis, & nigredine lingue, & proprie apud statum: & multiplicatur inquietudo ex angustia, & agitatione uehementi, quam facit pugna materiei & uiruitis: quandoque, & eleuatur materia, & quandoque confurgit uirtus. Et pulsus propter illud quodque tendit ad magnitudinem, & fortitudinem: & quāq; ad paruitatem, & debilitatem, & coarctationem. Durities aut sit quidodque, & non oportet semper

ut sit nisi sit cum febre aſa durum, in quocunque membro sit: aut aſa in membro duro quamuis non sit durum: aut iam acciderit potus aquæ frigidæ: aut aliquid aliud de illis, quæ indurant pulſum de illis, quæ dicuntur in libro pulſuum. Diuerſitas autem in principio, & augmento est ex proprietatibus febrium putridæ: & est de ſignificationibus eius fortibus, & quamuis non appareat in tertiana plurimum, propter leuitatem materiei. Et dum non sit pulſus fortis & non sit uelox uelocitate prædicta, tunc febris adhuc est ephimera: & non permutatur ad putredinem. Et est urina in principio indigeſta, aut parum digeſta: & fortasse est acuta. Et ſcias, quod à febribus acutis raro sit euasio nisi cum contractione membri. Et quando remanserit febris post quietem apostematis in pleureſi, & ſimilibus, tunc ſcias, quod de materia remanſit aliquid, & quod materia iam declinauit ad locum ubi apparet dolor.

De signis febris continuæ. Cap. 3.

In continua est diuerſitas pulsus, quæ est secundum febrem, apparet ualde: & est in plurimo eius non habens ordinem, neque pondus. Et perſeuerat febris, & non ſeparatur post uiginti quatuor horas. Et non associatur ei, quod diximus de dispositionibus interpollatæ ſcilicet de antecessione rigoris, & alij. Et de illis, quæ ſignificant eam est eius aſiduitas, & uehementia diuerſitatis dispositionis eius apud augmentum: minuitur enim quandoque, & augetur vice alia.

De rebus in quibus differant febres putredinis, & in quibus committuntur. Cap. 4.

Febres quæ est propter putredinem eholeræ, motus est tertianus, ſive sit motus principij paroxysmi, aut principij uehementiæ: nisi ſpecies eius, quæ dicitur aduſta, cuius motus est occultus ualde: & est ſicut inseparabilis conſuſa. Et tertiana quidem pura est acuta propter ſubtilitatem materiei: & eius caliditas est magna, mordicatio propter fortitudinem eholeræ: ſed est ſalutiſera: propterea, quod cholera est leuis ſuper naturam, & quoniam ipſa facit quietem. Tertiana uero non pura est longior ſpatij, quā pura. Et pura quidem raro pertranſit ſeptem periodos, niſi ab errore. Continua quandoque conſumitur in hebdomada. Et illa, quæ est ex putredine ſanguinis, est continua, inseparabilis: & eius calor est plurimus, communis, cum lenitate, non cum mordicatione eholeræ: & quandoque peruenit ad ſtatum in quatuor diebus. Phlegmatica uero periodicans omni die, est lenis caliditatis per

comparationem ad cholericam : & est longa propter viscositatem materiei, & frigus eius, & multitudinem eius : & est magni timoris, quoniam habet paruum spatium eradicationis & temporis, & quoniam ipsa associatur corruptioni & debilitati in ore sto machi à qua non excusatur : & illud est de illis, quæ attrahunt accidentia mala ex syncopi, & pulsu cordis, & casu appetitus. Et quæ de ea est inseparabilis, est res magis similis hectice, si non esset lenitas pulsus : quamuis quandoque fiat durus etiam. Et quantum est minus pura, est minoris, & breuioris paroxysmi nisi declinet cum paruitate suæ puritatis ad melancholiam. Quartana autem est non acuta propter frigus materiei, longa propter illud : & fortasse extēditur, quæ de ea pura est anno uno : & non pura est breuioris spatij : verum in ea non est timor, quoniam quietem facit in spatio longo : & quoniam ipsa non est talis acuitatis, quæ ipsam sequatur accidentia vehementia. Et quartana quidem, & tertiana assidua, & interpolata consumuntur per vomitum, & solutionem ventris, aut sudorem, aut prouocationem vrinæ. Adustius autem consumuntur per huiusmodi, & fluxum sanguinis narium. Et scias, quod principium prolongatur in tertiana, & status in conclusa, & declinatio in incensua, seu adustua, & status & declinatio in quotidiana : quamuis raro inueniatur quartana continua, & quotidiana integræ eradicationis. Et febres quæ do non curantur, secundum quod oportet, & proprie apostemose, conuertuntur ad arefactionem : & proprie in febribus acutis, in quibus oportet ut patientes eas, cibentur : & non cibantur propter intentionem ut perueniat natura super materiam : aut oportet ut detur in potu aqua frigida, & non datur in potu propter intentionem ut non fiat cruda, & non succurritur cum extinctione alia. Quoniam si fuerit intentio quam dicturi sumus in cibatione, & dando in potu aquam frigidam, fortior duarum intentionum prædictarum, præmittatur super eas ambas, & dimittatur observatio illarum duarum.

De significationibus accidentium febrium. Cap. 5.

Scias, quod acceptio significationum febrium est ex regimine antecedente, & quomodo fuit. Et ex dispositionibus & accidentibus presentibus ex eis, quæ dicemus, & ex regionibus, & temporibus, & ex ætate, & complexionē, & ex pulsu, & vrina, & vomitu, & egestionē, & fluxu sanguinis narium, & ex dispositione febris in rigore, & sudore, & qualitate caliditatis, & ex paroxysmis, & ex dispositione appetitus, & sitis, & ex dispositione anhelitus, & ex coniunctis sicut dolore capitis, & vigilijs, & alienatione, & inquietudine, & alijs. Febribus enim adsunt accidentia ex quibus significantur dispositiones earum : de quibus sunt accidentia significantia magnitudinem earum, & ipsarum puritatem, sicut qualitas caliditatis, &

quantitas ipsius. Et de ea est, quæ est mordicativa vehementer a principio quæ inceptit, vel inuadit usque ad finem suum. Et de ea est, quæ mordicat in primis, deinde minuitur propter resolutionem materiei, & lenitur. Et de eis sunt, quæ non mordicant. Et de eis sunt quarum caliditas est humida. Et de eis quarum caliditas est sicca. Et sunt accidentia, quæ significant genus earum, sicut accidentia propria cum tertiana, sicut principium paroxysmi cum punctione, & horripilatione, & mordicatione caliditatis in eo. Et accidentia significantia malitiam earum, sicut inquietudo, & alienatio, & vigilie. Et accidentia significantia digestionem, & indigestionem sunt sicut illud, quod dicemus de dispositionibus vrinæ. Et accidentia, quæ significant crism, quæ dicemus. Et accidentia significantia fospitationem aut contrarium eius : & dicemus omnia illa. Et forme infunt iudicia plurima, sicut ille cuius conueritur color ad plumbeitatem ex albedine, & viriditate : & significat frigiditatem humorum, & paucitatem caloris innati : aut conuertitur ad tebegi, & inflationem sicut accidit ei cuius febris causa est satietas naufragia : & sicut velocitas detumescionis vel extenuationis faciei, & tornatilitatis eius, & tenuitas nasi, & significant aut vehementiam caliditatis, aut subtilitatem humoris, aut velocitatem resolutionis eorum propter amplitudinem pororum. Et motus in seipsis, & exitus eorum a consuetudine, aut casus eorum habent significationes & res alias de illis quas dicemus. Et accidentium febrium quedam sunt quorum hora est hora status, sicut alienatio, & commissio mentis, propter inflammationem capitis. Et de illis sunt quorum hora est principium, sicut horripilatio, & frigus, & sicut profunditas somni, quæ consequitur plurimum principiorum febrium, propter debilitatem cerebri, & de declinationem caliditatis ad interiora ubi est materia : & multitudinem vaporum eleuatorum propter commotionem incipientem in corpore, usquequo resoluit eos inflammatio : & adiuvat illud frigus cerebri in seipso & frigus humoris, qui vult putrescere, & calefit. Et res ex quibus scitur dispositio febris, & ex qua specie sit, sunt dispositio febris in acuitate sua, & sua lenitate : & dispositio febris in hoc, quod ipsa accidit à causis primarijs, aut antecedentibus secundum conditionem prædictam. Et dispositio febris in adhaerentia uel continuitate sua : & eradicatione : & tempore suo : & dispositio febris in inceptioe sua cum rigore : & frigore, & horripilatione, aut eius contrario, & in quo tempore fuerit illud, quod ex eo fuit. Et dispositio febris in dimissione sua cum sudore plurimo, aut paucio. Aut dispositio præterita regiminis, & ætas, & forma, & tempus, & ars, & dispositio pulsus, & vrinæ.

Sermo de rigore, & frigore, & horripilatione, & fractione. Cap. 6.

Horripilatio est dispositio in qua inuenitur corpus diuersitatem in frigore, & punctione in cute, & lacertis: & antecedit eam pigritia, & fractio, & quasi fractio est species eius. Frigus autem est vt sentitur in membris suis, & dorso lacertorum suorum frigus purum. Rigor vero est, vt non possit continere membra sua ex commotione, & tremore eueniente in eis, & motibus involuntariis: & fortasse est frigus forte, & non fit rigor fortis, sicut in febribus phlegmaticis, & quartana. Et de causis uehementiæ rigoris est uehementia virtutis expulsiuæ in lacertis: & propter illud quanto est causa rigoris mordacior, est rigor uehementiori: & sang. submergitur cum rigore ad interiora. Et scias, quod humor frigidus est quietus, quem iam confluxit membrum in quo est: & quiescit passio eius ab eo, quare non sentit frigus eius. Cum ergo mouetur, & spargitur sparsione plurima, aut pauca propter aliquam causam, propter caliditatem separantem, aut aliud, patitur ab eo membrum, quod erat non occurrentis ei: & sentit frigus eius propter causam complexionis diuersæ: & tu quidem sciuisi hoc in radicibus vniuersalibus scientiæ medicinæ. Et multoties quidem accidit à phlegmate vitreo sparso in corpore rigor, non perducens ad febrem. Et quandoque sunt ei periodi: & non est fortitudo eius fortitudo rigoris perducens ad febrem. Et materia, quæ facit lassitudinem per paucitatem suam, facit rigorem per suam multitudinem antequam putrescat: nam si non putrescit, non perducit ad febrem. Et quandoque accidit frigus, & rigor propter submersionem caloris in corpore causa cibi, & quæ sunt ei similia. Et rigor, & frigus antecedunt febres, quoniam humor crudus effunditur ad lacertos in primis, & nocet frigore suo per comparisonem ad lacertos: deinde cum incipit putrescere, incipit calefieri. Et quandoque antecedit rigor febres propter mordicationem humoris, & fortitudinem virtutis expulsiuæ, quæ est in lacertis, sicut excutitur homo ex effusione aquæ calidæ ualde super cutem, & proprie cum est fassa. Et fortasse hinc nocumentum eius, quod mordicat causa vt refugiat calor innatus ad interiora, & dominetur frigui: quare fit cum mordicatione caloris frigus, quasi frigus ambiens extrinsece, & mordicatio calidi sit apud panniculos interiores. Et quandoque accidit rigor: propterea, quia refugit calor ad interiora, sicut fit in apostematibus intussecis. Et quandoque significat rigor, & horripilatio sanitatem in febribus inseparabilibus, quoniam significat quod materia expellitur ex uenis, & egreditur. Verum quando non est cum digestionem, & in hora critica, & non sequitur eam leuitas, est significatio, & expulsiu illius quæ in uenis non est: quoniam virtus est uiuacens: immo quoniam materia multa expellitur propter multitudinem

suâ. Et de rigore est, qui significat mortem sicut ille, qui sequitur debilitatē virtutis & casum caloris in nat & siccitatem. Horripilatio uero fit ex causis paucioribus causa rigoris. Et commotio animæ, & periodi indicat periodum. Et senum quidem febres sunt sepultæ. Et quandoque est causa in longitudine febris grossitudo in uisceribus, quare relupinetur febricis, & extendat pedes suos, & tangat uiscera sua. Et quando denigratur lingua lebricis cum alieuiatione febris, tunc febris eius est sepulta. Et quadoque associatur febri paralyticis, & ergo curetur febris in primis. Et de eis quæ conueniunt illis, est syrupus acetosus permistus cum gele niabin, & s qua ciceris cum oleo, si tolerat febris. Et ratio capitis ex eis, quæ inspissant cutem eius, quare reuertuntur vapores, & fit fortis febris.

De intentione ad curationes vniuersales febrium putredinis. Cap. 7.

Scias quod intentio in medicatio hæc febres quæ adque vertitur ad partem febres, quare est necessarium ut infrigat, & humectent. Et quadoque ad partem materici, ubi necesse est ut digeratur: aut necesse est ut euacuetur. Et digestio quidē in grossa est æquatio eius cum subtiliatione. In subtili est æquatio eius cum ingrossatione. Et quadoque: contraria sunt illa, quæ requirit febris de infrigitatione, & illud quod requirit humor de digestionem, & euacuationem, & resolutionem. Quadoque nec est digestum, & euacuationem calidum: immo est secundum plurimum ita, & tunc oportet ut obseruetur magis in uisita de unā duarū rerū. Et fortasse contrarium est illud, quod conuenit febri de infrigitatione cum eis, quæ sunt sicut batesch indi, & reliqua uisita, ei quod conuenit materici de minoratone, quare prohibet illud dare ea in potu, nisi ubi non est materia. Et omnino sollicitudo sit ut postponatur aqua aluache. I. fructuū recentiu usque ad hebdomadam: & sit comestores aqua hordei. Et omnes fructus nocet febricitatibus cum ebullitione sua, & corruptione sua in stomacho. Et multoties quidē inuenitur res, quæ digerit, & subtiliat, & infrigat cum euacuatione sicut syrupus acetosus. Et scias, quod febris quando quæ est ita uehementia, & acuitas, quod non licet uti regimine cause, immo indiget infrigitatione ultima: & proprie cum non inuenis virtutē fortem, ne sistentē, tolerant. Quod si inuenis eam resistentem, tolerantē, absconde causam, & regere humore, & absconde cibum: & non infrigides infrigitationem, quæ prohibeat resolutionem. Quod si inuenis virtutē deficientem, sis occupatus in æquatione complexionem contrariam ei, quare infrigida eam, & uiuifica uirtutem cum cibo. Cumque uirtus fortificata fuerit per uiuificationem suam, & uincit contrarium suum, redi ad causam. Et cum tu infrigidas de istis febribus, tunc non infrigides cum eo in quo sunt stypticis, & inspissat sicut sunt trochisci infrigidantes, nisi post digestionem, & euacua-

tionem. Et scias, quod cura febris putridæ est diuersa à curatione febris hæcticæ. Curatio. n. hæcticæ est contenta super cōtrarietatem ægritudinis: & curatio febris putridæ non est contenta super contrarietatem ægritudinis tantum, immo super ipsam & super abscessionem causæ eius: quamuis ipsa non sit similis vel cunformis ægritudini. Et cibus quidē est amica virtuti ex parte viuificationis eius, & inimica virtuti ex parte q̃ ipsa est amica inimico eius, & est materia: quare est adiuuans vtrique; earum, quia obrem indiges in regimine eius canonice: & nos singulare capitulum ei, si Deus voluerit, faciemus. Et scias, quod non est tibi possibile curare febrē, nisi cognoueris eam. Quod si ignoraueris, tunc subtilia regimen: & prouide ne occurrat paroxysmo, nisi ventrem habeat vacuū. Et non moueas in die paroxysmi aliquod quantū possibile est tibi, neq; cures febrē. Et oportet ut obserues in omnibus illis dispositionem virtutis, Quod si fuerit fortis, & fuerit illud, quod vincit sanguis, aut cum humore, qui vincit, sanguis, tunc phlebotomia est magis conueniens, & proprie cū vrina est rubra, grossa, non citrina ignea, ex qua ti meatur apud phlebotomiam victoria cholæræ, & accutis eius. Deinde fac sequi phlebotomiam solutionem ṽtris subtilem, proprie si fuerit illic scititas, cum eis quæ sunt sicut aqua hordei, & alisra cost parum, & aqua hordei & syrupus acetosus. Et si natura non fuerit lenis adde in eo, quod est si cut siracost, quod sit sicut syrupus viol. Et sit finis intentus lenificatio, non fluxus ventris, & non solutio laboriosa. Et magis dilectum est apud me ad ministratio clysteriorum secundum quantitatem vel mensuram qua indiget in virtute. Et de clysteribus communis iuuamenti leuibus est clystere factum ex oleo viol. & succo foliorum siclæ, & vitello oui, & zuccaro ru. & baurac. Cum ergo lenieris hac lenificatione fortasse in statu indigebis eo debiliore quam illud quo indigisti in principio. Et illud est quod natura est obediens. Deinde fac ipsum sequi ea, quæ vrinā prouocent: sicut syrupus acetosus decoctus cum radice apij, & similibus. Deinde fac ipsum sudare, & aperi porositates eius cum illis in quibus non sit calor fortis, sicut cum inunctione ex oleo chamæmelino, & fricatione cum vino albo, & cum aqua dulci tepida. Et si febris fuerit acuta valde non conceditur aliquid ex ṽnctionibus & embrocationibus. Quod si inuenis humorem in primis declinare ad stomachum, fac vomere cum eis in quibus non sit diuersitas consuetudini: immo cum eis, quæ sunt sicut syrupus acetosus cum aqua calida, cum natura mouet humorem ad vomitum: & non diuersifices eam, si fuerit declinatio ad intestina, & senserit infirmus rugitum, & descensum fecis, tunc adhibe, quod soluat ventrem. Et prohibe eū à somno in principiis februm: proprie quādo est horripilatio, aut frigus, & rigor, quoniam prolon-

gatur super eū frigus, & rigor: ipse namq; adiuuat materias, si fuerint commotæ ad quædam viscera, & prohibet digestionem humorum: apud declinationem vero est iuuatiuus valde: & fortasse non nocet apud statum. Et non prohibeas ei aquā frigidam, nisi fuerit humor, qui est in eo, crudus, & grossus: tunc, n. prohibet digestionem. Et scias, q̃ quando phlebotomia iuat, deinde ṽtris via mala, vel regimine malo & non est corpus mundificatum, indicat recidiuam. Humor autē eholericus digestio est, vt cōuersus à sua subtilitate fiat spissus: & aqua quidem frigida facit illud, nisi sit stomachus, aut hepar debile, aut frigidum: aut sit in visceribus apostema: aut sit in neruis eius dolor: aut sit complexio eius pauci sanguinis: aut caliditas eius innata debilis, quare debilitatur post potum aquæ frigidæ. Aut sit non consuetus potare aquam frigidam sicut illi, qui sunt de regione calida: isti. n. spasmanter velociter, & associantur eis singultus: & extenuatus est de hac summa. Vbi autem materia calida, aut grossa iam digesta est, & corpus est carnosum, & caliditas innata exuberans, & virtus est fortis, & viscera sana, & non frigida eorum complexio radicalis, & non insueta aquæ frigida, immo assueti aqua frigida valde, tunc aqua frigida est melior reui multieties, n. adiuuat ad expellendum materias eūq; solutione naturæ, aut per vomitum, aut per vrinam, aut per sudorem, aut per omnia illa: quare sit statim, ut saluetur. Et quādoque dat in potu medicus de aqua frigida infirmo quantitatem plurimā adeo, donec color eius fiat viridis, & tremat, quæ sit saltem perueniens usque ad hemiuanam, & dimidiā. Et fortasse conueritur febris ad phlegmaticam: & fortasse confortatur natura, & expellit materiam cum sudore, & vrina, & fluxu ṽneris, & est sanitas. Et quādoque iterum sunt quædam prohibentia, deinde timetur malitia caliditatis, & sitis, & exstimator, q̃ peruenitur per eam ad ariditatem, vel extenuationem, non prohibeas aquā frigidam, nā additio apostematis & cruditatibus eius fortasse melior est, quā extenuatio. Et syrupus quidem acetosus quādoque etiam sedat sitim, & incidit, & soluit: & nocumētum ipsius apostemati non est plurimum, sicut nocumētum aquæ: & non est ei vis aggregandi materiam, & inspissandi eam. Et similiter iuleb plurimæ comestioniis. Et cum non licet bibere aquam frigidam, & si audax super eam, timetur q̃ faciat accidere constrictionem pororum: quare sit causa febris alterius propter aduentum oppilationis alterius: & fortasse erit uehementior prima. Et quādo obuiat membro debili, corruptit operationē eius: & multoties facit deglutionem difficilem, & facit difficultatem anhelitus: & facit accidere tremorem, & spasmodum, & debilitatem velicæ, aut renis, aut colon. Et ille quem plurimum oportet ex eis prohibere à potu aquæ frigidæ, est cui nocet in sanitate

nitate sua: Immo cum rideris figuram fortem, & musculos grossos & complexionem calidam licam, & euacuaueris, tunc quandoque concedes infusionem fieri in aqua frigida, & apud declinationem & apparitionem signorum digestionis, & euacuationem humorum, non est malum vt administretur balneum; & potus vini subtilis commisti, & inunctio cum oleis resoluentibus. Et cum administraveris canones prædictos in principio euentus febris, tunc oportet post illud vt tu occuperis in digestionem, & euacuationem, quæ non est secundum seorsitam minorationis & desiccationis; & iam diximus eam: immo secundum semitam abscessionis causæ. Et non euacues materiam indigestam in calido, aut frigido nisi propter necessitatem: fortasse enim multiplicatur euacuatio alterius humoris non præparati cum digestionem vt euacuetur. Et fortasse permiscetur cum ea malignum cum bono: propterea, quod mouetur malignum cum bono absque digestionem sua. Et tu non auscultes virum, qui existimabat, quod intentio in digerendo est subtiliare, & humor calidus est subtilis, quare non est necesse ut subtilietur: Res enim non est sicut dixit, immo intentio in digerendo est æquare substantiam materiei, ita vt hæc præparata ad expulsiorem facilem, & subtile imbibitum, & grossum fixum, & viscosum adherens: totum illud non est præparatum ad expulsiorem facilem: immo est necessarium ut inspissetur subtile parumper, & subtilietur spissum parumper, & meidatur viscosum. Et si uir ille non audiuit in sermone antiquorum de digestionem aliquid ex genere eius, quod diximus, & considerasset dispositionem digestionis humorum per spiritum expulsiorem, scilicet quis qui de eis subtilis est, indiget ut inspissetur: & qui de eis spissus est, indiget ut subtilietur, necessariū fuisse ut sciuisset hoc per illud. Et quare est, quod non considerauit in seipso, & non dixit, quare est, quod urinx in febribus acutis non habent in principiis earum sedimen, deinde sunt habentes sedimen, & an sedimen laudabile est aliquid aliud ab humore faciente ægritudinem, qui iam digestus est, & quare non expellitur in principiis ægritudinis, si est subtilitas vltimæ, quod intenditur in digestionem: & necessarium esset tunc, quod sit in principio febrium sang. & cholæræ sedimen laudabile. Si autem natura non est possibile expellere illam superfluitatem, nisi post horam, in qua fit præparatio ad expellendum in urina, tunc similiter oportet vt sciat, quod arti euacuare humorem ante illam horam in qua apparet digestio in urina, est prohibuit, difficile, laboriosum. Et fortasse mouet, & non operatur vltimo: & fortasse miscet malignum cum bono. Et esset melius homini huic, ut bene opinaretur de illis, qui fuerunt sicut Gal. & Hippo. in eis, quæ scriperunt de hoc, aut considerasset optima considerationem, postea redisset ad contradiccionem:

nem: quia contradicens primoribus cum veritate est excusatus. Verum melius esset ei ut bene considerasset prius. Et opinor, quod huic viro accideret experimenta, quæ profuerunt in hoc capitulo, & acqueuit in eis. Et huiusmodi quidem experimentis, quæ non sunt secundum canones, accidit eis, ut nec unum valeat, seu iuuat, aut accidit eis ut neq; unum frustretur operatione sua iuuatiua, & hoc est conueniens. Cum autem materia est plosma, mobilis, permutable de membro ad membrum, & existimas, quod non est spacium in digestionem eius, aut fortasse accidit ex ea apostema sirsen, aut aliud ab eo. Et si dimittatur, facit eadere in timore ante tempus, in quo cadit digestio eius: & illud est longius, quam tempus in quo cadit, vel expectatur digestio æqualis, proculdubio tunc est necessaria euacuatio eius: timor enim in hoc est minor, quam timor in illa: & cum hoc natura mouetur ad expellendam eam, propter multitudinem sui inouementis: cum ergo adiuuatur natura, conuenit ei adiutorium vltimum: quare non est excusatio eius. Et scias, qd phlebotomia quando est interitio sanguinis non est ex genere eius, in quo expectatur digestio, expectationem, quæ est in solutius: & non expectatur digestio nisi in humoribus alijs. Et cum postponitur phlebotomia à principio ægritudinis, tunc non phlebotomes in statu eius, cum non sit ei intentio, & fortasse inter sit propter aduentum debilitatis uirtutis. Et similiter si times uictoriam humoris, & magis necessaria cautella est euacuatio, & si non est digestus non moueas nisi in principio: apud statum vero non moueas aliquid, donec vincat natura, & digeratur: & si ipsa non mouet, moue tu motu simili, vel conuenienti motui eius, uel ad partem ad quam ipsa moueri & si ipsa mouet, aut mouit, tunc dimitte eam & operationem eius. Et hoc est illud, quod nominauit Hippo. furiositatem, ubi dixit: oportet vt administretur medicina solutius postquam digeritur ægritudo. In principio autem ægritudinis non oportet ut administretur illud, nisi ægritudo sit furiosa. Et talis est ista euacuatio necessaria, quæ non est in hora sua, sicut cibatio necessaria, quæ non est in hora sua. Et proportio istius euacuationis ad prohibendam acuitatem materię, est sicut proportio illius cibationis ad prohibendum uirtutem à casu suo. Cum ergo exeres euacuationem, tunc considera horam interpolationis, aut horam ipsius teporis, aut frigidiorum horam, quæ est in die: & non euacues per fluxum ventris in die periodi. Neque phlebotomes. Et non agas cum euacuatione artis contra partem euacuatiouis naturæ. Et non moueas humorem cum eo, quod facit statim dispositionem motus periodi. Et omnino caueatur à regimine grosso in hora periodi, ita ut non detur 10 potu aqua hordei zucarum, neque iuleb, ut non frangat periodum cum con-

Uisione meatum; quoniam est timor; immo adiuua nisi superfluat, quoniam medicus adiutor est natura, non impediens eam. Et oportet ut scias, quod multoties indigetur medicina forti debili, sed eius fortitudo est hoc, quod soluit humorem grossum, viscosum: & ipsius quidem debilitas est ex hoc, quod facit ascellare semel aut bis. Et non euacuatur plurimum simul, ita ut non cadat virtus. Et consilium quidem meum in phlebotomia est, ut dimittatur quantum possibile est. Si autem non est possibile, tunc multiplicatio numeri est melior multiplicatione quantitatis: oportet enim ut non euacuatur sanguis multus subito, quoniam euacuatur multum de eo cuius non est necessaria euacuatio. Et non erit in sanguine uel ex sanguine resistens seu quod resistit euacuationibus quibus forsalle indigetur: & debilitatur virtus ut resistendo in crisiibus expectatis. Et scias, quod quando aggregantur dolor capitis, & febris: tunc curatio febris est dignior. Et scias, quod dolor capitis quandoque facit redire febrem declinatam, ad augmentum. quare oportet ut sedetur. Et cum infans lactens febricitat, tunc oportet ut rectificetur lac matris eius. Et quando urina icterici in febre fuerit eruda, significat apostema: quare est curatio dare in potu aquam hordei, aut syrupum acetosum. Cum ergo quiescit febris, intentio sit ad apostema. Et quando fuerit cum febre colica, dum non aperitur uia, non exhibeatur in potu aqua hordei, immo ius galli, & lenifica cum clysteri, & multiplicata uisusitate eius: deinde detur in potu aqua hordei, si necesse fuerit. De solutiuis uero est portio facta ex tamarindis, & tereniabin, & siracosi. Et quandoque ponitur in ea aqua iulebe, & quandoque ponitur in ea casias. Et forsalle projicitur desuper scammonia. Et forsalle datur in potu scammonia sola in iulebe. Et forsalle est necessarium administrare ea quae sunt sicut aloe, quando materia est grossa. Et melius quidem est ut ablatur, & nutriatur cum aqua endiuiae, & aqua solatri deinde fiant ex eo pilulae. Mirobalanos uero eietrimos quidam administrauerunt, & dum inuenitur ab eis uia alia. i. administratio aliarum medicinarum, fiat: quoniam ipsi colstrigunt poros, post solutionem ventris, & exasperant viscera. quod si fuerint necessarii, tunc administrantur post digestionem in tegram. Et aqua duorum granatorum est maxime iuuamenti praecipue expressa cum pulpis amborum in quibusdam horis. Et ex solutiuis est illud, quod fit ex uiolis, & scammonia: ita ut de uiolis sit quantitas aurea. de scammonia usque ad Kirat id est & quandoque ponitur in eis parum mentae. Et quandoque fit ex infrigidantibus extinguentibus medicina, in qua ponitur scammonia, sicut pilulae huiusmodi. Recip. coriandri, spodij, rosarum ana drach. 5. camphorae tologii. scammoniae duodecima pars drach. j. usque ad sextam partem eius: & detur in potu eis. Aliud. Recip. siracosi.

drach. v. tereniabin eiam drach. v. succi pomorum de feni, succi cydoniorum partes aequales, succi coriandri humidis sextam partem vnius, aggrega succos, & submerge in eis siracosi, & tereniabin, & inspilletur cum eis, donec existimetur, quod sint inspissata, deinde fume camphorae pondus sextae drach. i. & medietatis sextae, scammoniae danich. i. & eleuetur medicina ab igne, & pulueriza desuper camphoram, & scammoniam. Et consuetur ne resoluatur cum uapore, deinde dimittatur donec coaguletur per se cum facilitate: & dosis eius sit ad drach. ii. usque ad. ii. & 3. Et est possibile ut fiat ex tereniabin, & siracosi, & zuccaro tabarzet natifi. formae, quae sunt sicut penidiae, & ponitur in ea scammonia, & camphora secundum quantitatem, quae eadat in una portione eius, uidelicet camphorae usque ad tologii. i. & scammoniae usque ad sextam drach. i. quare sit tunc delectabile animae non horribile. Et febricitans quidem in estate febre acuta non ingreditur domum frigidam ventosam proprie quando sudat, ut non conuertatur materia in resolutionem suam. Et trochisci quidem non sunt conuenientes principis harum febrium, nisi post digestionem, & euacuationem. Et trochisci quidem sunt magis conuenientes ei cuius febris est adhaerens in suo stomacho, quasi ipsa sit haecica. Et dimissor consuetudinis in regimine suo, sentit quandoque febre: & non est tantum nocuumentum, quoniam causa eius est dimissio consuetudinis in regimine.

De cibatione febricitantium in generali. Cap. 8.

Scias quod conueniēiores cibi febricitantibus sunt cibi humidi: & proprie ei cuius complexio est humida ex infantibus, & grauis: uel ociose uiuentibus: conueniunt enim ex hoc, quod assimilantur complexioni, & ex hoc, quod sunt contrarij ægitudine. Cumque accidet febris, & natura est sicca, non cibis penitus dum non egreditur perfecte sals. Et oportet ut occurrant eis paroxysmi periodici, & paroxysmi exacerbationis uentibus ipsorum uacuis: in quibus non sit cibum omnino: nam si cibati fuerint, in illa hora occupabitur natura in digerendo: & dimittit digerere, & expellere: & confirmabitur ægritudo, & prolongabitur. Et propter illud oportet ut postponant cibationem usque ad declinationem: & in eo quod est post ipsam. Et si accidat forte ut hora de elinationis sit hora consuetudinis in cibo, tunc est melius quam esse potest. Et scias, quod de cibatione & regimine est, quod est subtile ualde, & de grossum ualde, & de eo quod est inter illa: & est pars eius declinans ad subtile plus: & pars eius declinat ad spissum plus. Ex subtile ultimum in subtilitate, est prohibitio cibi. Et grossum ualde, est administratio ciborum sanorum hominum. Est illud quod sequitur latus subtile & est ex eis, quae sunt

sunt media est, ut sit contentus in cibo succo granatorum, & iuleb subtili valde: & post ipsum aqua bordei subtili: & post ipsam aqua hordei grossa: & oleibus frigidis, & humidis sicut atriplices, & spinachia, & bliti, & similia: & postea Kisch hordei sicut est, & est medium. Et illi, qui sequuntur latus grossi, sunt sicut gallinæ, & extremitates. Et subtiliores eis sunt sicut alchubugi, & pulli, galliculi, & subtiliores eis sunt alæ: pullorum & alceingi, & ova forbilis pauca subtilia, & pisces parui. Et subtilius eis est. Kisch hordei sicut est. Et subtilius eo est panis similis solutus in aqua bene frigida solutione bona subtili. Grossi autem est cibus fortior. Et Kisch quidem hordei est bonus cibus: ipsum enim aggregat ad glutinationem, & digestionem suam, & lenitatem, & planitiem, & lubricitatem, & absterionem, & humectationem, & contrarietatem febris, & sedationem sitis, & uelocitatem penetrationis, & abluionem: & non est in eo stypticitas: quia propter non residet, neque figitur in poris, & meatibus, quamuis sint contracti, & non est in ea adhaerentia cum incedit per meri, & fortasse abstergit illud, quod est sicut phlegma. Et quando bona sit eius decoctio non inflat omnino. Et antiqui quidem vbi sunt ubi necessaria est subtilitatio regiminis subtilioris, quam regimen cum Kisch hordei & aqua eius, aqua mellis plurimæ aquæ: quoniam nutrimentum eius est paruum: & quod ipsa facit penetrare aquam: & eius humectatio, & absterio, & eius aperio, & prouocatio eius est multa, & caliditas eius est contracta. Et ipsa proculdubio quandoque addit in uirtute additionem quādam, quamuis sit parua. Et sequitur eam syrupus acetosus de melle, sed est grossior, & nutritior: & fortioris incisionis, & absterionis: & non est in eo de calcificatione, & de nouimento viscerum calidorum, quod est in melle, sed in hoc loco mel canne, quod est zucrarum & proprie mundificatum, est melius melle apis: licet eius absterio sit minor absterione mellis: & similiter syrupus acetosus de zucaror sed contentari in syrupo acetoso quandoque faciet incorrere rursus in intestinorum, & hoc quidem timorofum est in agitudinebus acutis. Et nos popemus aquæ hordei potationem, & syrupi acetosi, sermonem singularem. Et subtilitacionem quidem regiminis agri significat natura materiei agitudinis: & applicatio uel permanentia naturæ, in digerendo ipsam, & resoluendo, & euacuando eam. Et dignior horarum ad subtilitacionem est status: hic enim est uelocitas occupationis naturæ in pugna materiei. Et non oportet ut ab ea recedens occupetur re alia, & proprie apud crissim: ante nero illud, pugna nondum est confirmata. Et de illis, quæ significant, & faciunt pertinere ad subtilitacionem, est ut si sit necessitas phlebotomizæ, aut solutionis ventris, aut cly-

steris, aut sedationis doloris, tunc oportet ut des operam ad expediendam uel complendam illam necessitatem: deinde ciba si necessarius est cibus, nisi sit prohibens aliud. Et ingrossationem quidem regiminis significat uel requirit uirtus. Et dignior horarum ad ingrossandum est hora, in qua uirtus non est ualde occupata in materia: & est principium agitudinis. Et oportet ut succoratur nouimento illius ingrossationis cum sparsione: quoniam est leuius super uirtutem iterum. Et citas quidem propter suam resolutionem indiget additione cibationis & separatione eius: nam uirtus non sufficit ad digerendum illud, quod multum est semel. Et quoniam resolutione in ea est per sparsionem: tunc oportet ut cibus sit per sparsionem. Et an hyeme est res de contrario, quoniam propter paruitatem resolutionis eius, non facit indigere cibo multo. Amplius si multum dederit cibus uice una, uirtus erit tolerans ipsum, & fortis in se expediendo ab eo uice una. Et autumnum quidem est tempus malum: & propter hoc oportet & subtilitatur in eo inter conseruationem uirtutis, & inter dominium materiz, & partem paulatim in eo est melius: & prorsus partire cum debilitate uirtutis est melius agro. Et scias, quod si non esset illud, quod pertinet uirtuti, esset magis necessariū, ut subtiliaretur cibus ultima subtilitacione, sed uirtus non suffert illud, & deficit: & cum deficit, non ualet curatio. Curans enim sicut sciuit, est uirtus, non medicus: quoniam medicus est minister faciens permanere instrumenta ad uirtutem. Et cum intellexeris hoc, tunc oportebit ut consideres, nam si agritudo fuerit ualde acuta, & illud est ut sit status eius propinquus, & existimaueris quod uirtus non deficit in hoc tempore, quod est inter principium eius usque ad statum eius, alleuiabis occupationem super uirtutem, & incitabis eam super materiam: & non facias eam occupari in cibo spisso, immo subtilia regimen etiam cum dimissione cibi omnino, & proprie in die crisis. Et si uideris agritudinem acutam non ualde, immo acutam absolute, tunc oportebit ut subtilies regimen non in ultimo nisi apud statum, in die crisis proprie: nisi propter causam maximam. Et si uideris agritudinem chronicam, aut propinquam chronicam, non subtilies regimen: uirtus enim non saluabitur usque ad statum cum subtilitacione regiminis. Verum est tibi necessarium cum hoc in omnibus speciebus ut sit principium tui regiminis grossius, & postremum tui regiminis proueniens ad statum, subtilius: & gradatim procedas in eo, quod est inter illa, ita ut uirtus sit conseruata usque prope statum: tunc enim intende super materiam, & non sis occupatus in alio. Et quando scis, quod uirtus est fortis, tunc fortasse necessarium facit dispositio ut sis contentus iuleb & similibus: & si non plus, saltem

saltem hebdomada una, & proprie in febris apollematum. Quod si timueris debilitatem, sis contentus aqua hordei. Et cum ambigua sit tibi dispositio in egritudine, & non cognoscis eam, tunc ut declines ad subtiliationem est melius, quam ut declines ad additionem, te obseruante uirtutem, & tolerantiam. Et illius quidem, qui existimauit, quod cibatio, & confortatio in febre acuta est melior, quoniam non est intentio in digestionem, & in porcellam tua est euacuatio cum uolueris ut faciat id natura, aut non faciat, errorem iam te scire feci: immo quando times casum uirtutis, tunc cibatio est melior. Et de corporibus sunt corpora cholericum, quae requirunt regimen diuersum ab illo, quod diximus: & proprie quando sunt assueta comestioni plurimae: ipsi enim cum non cibantur etiam in ipso principio febris, immo in hora, quae est praeior ea, & est hora status, non vacuae sunt dispositiones eorum à duabus rebus: quoniam cum ipsi sint debilius uirtutum, superuenit ei syncopis, & moriuntur in proximo: & si sunt fortium uirtutum, cadunt in extenuationem, & apparent super eos signa ariditatis ex subtiliatione nasi, & profundatione oculorum: & quod tempora sunt depressa, & fortasse superuenit eis syncopis ante illud, propter illud, quod effunditur ad stomachos eorum de cholera mordicativa. Et sunt de hominibus quidam, qui sunt exuberantis carnis, sed eum absconditur ab eis cibis, debilitantur, & extenuationem incurrunt: quare non tolerant prohibitionem cibi. Et omnis quies calor innatus fortis est ualde, aut plurimus, aut calor innatus est ualde debilis, paucus non potest dimittere cibum. Et de his sunt quibus accidit dolor, & laesio in stomacho, & dolor capitis propter communitatem, & isti sunt de hoc genere. Et istis fortasse sufficit aqua hordei: & fortasse egent ut misceant succum granatorum, & similia illi, ut confortetur os stomachi. Et quandoque est nobis necessarium, ut faciamus eos vomere cum facilitate, ante cibum. Et in plurimis istorum cum debilitantur, aut fortasse superuenit eis syncopis, causa non est uehementia debilitatis: immo effusio cholerae ad os stomachi: cum ergo sumunt in potu syrupum acetosum permixtum cum aqua calida multa, aut uinum permixtum cum aqua multa, euomunt in uomitu humores cholericos, & uirtus eorum fit fortis: cumque cibantur aliquo rebus styptico, sedantur. Et senes quidem, & debiles, & infantes sunt de genere eorum, qui non tolerant famem. Primi uero senes sunt uehementis tolerantiae famis: & sequuntur eos iuuenes: & proprie habentes solida membra, amplas uenas in aere frigido. Et multoties quidem errat medicus in huiusmodi aegrotis secundum alium modum: quoniam ipse prohibet eis cibum in principio rei, & quando appropinquat status & sciuerit,

quod cadit uirtus, cibatur in illa hora necessario: iam ergo errauerat duobus modis: & si ipse cibaret eos in principio, esset error ille, & ignorantia infra hunc errorem. Et accidit istis agris ut accedant eis catarrhi crudi, & cholerici, & uigiliae & inquietudo propter priuationem digestionis: & in quieti sunt, & modo quiescunt & modo mouentur & coardant materiam uirtutes eorum, & multiplicantur ipsorum vapores, quare audiunt id, quod non est, & tremunt, & ciantur uel saluunt, & permutantur in laesio, & imaginantur, quod non est, & ictigant labia eorum inferiora propter dolorem oris stomachi, & contristantur animae eorum propter grauitatem materiei.

Canon in dando in potu aquam hordei, & syrupum acetosum. Cap. 9.

Aqua hordei quaedam est in qua non est de corpore hordei, nisi quod est sicut uirtus, & forma: & non est ei introitus in curatione, aut fiducia in iuuamento: nisi quando est completæ decoctionis. Et quæ de ea est melior, est ut sit aqua quantitas sacraia 20. & hordei sacraia 1. & sit iam reducta prope nel circa ad duas quintas: & assumatur illud, quod de ea rubrum est, & subtile. Hoc enim est subtile, cuius nutrimentum est minus: & cuius humectatio est maior, & ablutio eius, & extractio superfluitatū ab ea, & digestio facta ab ipsa est multa, & infrigidatio eius est equalis. Et de ea est in qua est aliquid de corpore hordei, & farina eius. Et magis dilectum mihi in huiusmodi est ut non sit plurimum decocta: immo secundum mensuram, quæ auferat inflationem, & non perueniat ad hoc, ut faciat ipsam viscosam uehementer. Et huiusmodi quidem est pluris nutrimenti, & minoris ablationis, & digestionis: & accidit ei multoties ut accret in stomacho frigido in substantia sua: id est in natura sua, & si sit in eo calor extraneus multus ex capitulo malitiae complexionis. Et aqua quidem hordei quandoque est decocta ex hordeo ipso sicut est: & quandoque est excorticatum. Et melior quidem syrupum acetosum apud me est ille in quo ponitur zuccarum in uase, deinde funditur super ipsum acetum forte, quod sit de uino, tantæ quantitatatis ne cleuetur super dorsum zuccari: immo dimittat ipsum discolloperum, deinde ponantur sub uase carbonem quieti. non multæ caliditatis, aut cinis calidus donec liqueat zuccarum in aceto sine ebullitione, deinde colligitur spuma, & dimittitur una hora non cum multo calore, donec misceatur zuccarum cum aceto, deinde funditur super ipsum aquæ quantitas duorum digitorum, & bullit usque ad ipsitudinem. Et aggregare syrupum acetosum, & aquam hordei simul, est illauidabile: quoniam corrumpit aquam hordei secundum plurimum.

Et

Es non oportet ut detur in potu aqua hordei, cum siccitas naturæ adeat: immo ante ipsam fiat clystere. Quod si acetet in stomacho, detur in potu, quod de ea est magis subtiliter. Quod si acetat, coquatur cum ea radix apij, & eius simile. Si uero acetat iterum: tunc necessarium est ut miscetur aliquid piperis cum ea, proprie quando materia non est uehementis subtilitatis, & caliditatis. Et quando multiplicatur eius inflatio: tunc miscetur cum ea ad calefactos parum acetuiui. Verum cum syrupus acetosus in potu datur in mane incidit humores, & præparat ad expulsionem. Et ut consequenter post duas horas ad aquam alkisch hordei subtilem prædictam, ut abluat, quod incidit, & abstergetur, & extrahat ipsum per sudorem & prouocationem. Et non est nocuentum si detur in potu syrupus acetosus apud cenam, cum iam separatus est cibus a stomacho. Et quandoque est necessarium ut præmittatur iuleb ante aquam hordei, ut addat in humectatione: & illud est, cum uides siccitatem dominantem super corpus, & linguam. Et quandoque est necessarium ut præmittatur ante ipsam ad liniendum naturam aliquid de tamarindis ante illud: per duas horas.

De curationibus febrium acutarum. Cap. 10.

QUOD dictum est de regimine lenificationis, & prouocationis, & sudationis, & digestionis: deinde euacuationis cum medicina post illud: & quod dictum est de cibatione post ipsum rest illud, quod oportet te rememorare hic. A modi extinctionis uehementiæ caliditatis, sunt cum infrigidatione aeris. Et cum infrigidatione cibi. Et cum epithematibus, & emplastris. Et cum medicinis. Et cum retentione eorum, quæ sunt sicut mucilago psyllij, & mucilago granorum cydonij, & succus portulacæ, & succus liquiritiæ in ore, ut sedetur sitis: nam assiduare gutturi patientis ægritudinem acutam aliquid ut remaneat guttur humidum & non exsiccat, in curis eorum est inuatiuum ualde. Et quandoque iuantur per administrationem clysteris facti ex fuce melonia indi, & cucumeris, & cucurbitæ, & portulacæ cum oleo rosaceo, & cum aliquantulo camphoræ, inuamento maximo. Et oportet ut sit aer infrigidatus quantum possibile est: & eius infrigidatio est per prohibitionem alia hæpe. multitudine hominum, & per suspensionem flabellorum multorum: & per positionem niui plurimæ. Et si domus est proximi temporis ex quo limba fuerit lato libero, & proprie illo in quo ponitur loco paleæ, cotum papyri: tunc est melius. Et quandoque præparantur in ea manationes ut fontium, & rotationes, & currit in ea aqua dulcis. Aut stratus est super fontem seu lacunam coopertam cum reï factio ex chordis uel cum cannis uel uir-

gulis præparatis in modum ætis. Et si stratus super quem dormiunt ex tabari inflato, & his similibus: & reliquum stratus sit ex remiatibus salicij, & cydoniorum, & myrti aspersi aqua rosacea, & folijs pomorum, & uiolis, & nenufariis, & rosis. Et puniuntur quandoque tabachii. vasa lata, magna, in quibus sunt odorifera ex frustis fructuum boni odoris frigidorum uel ex fructibus boni odoris frigidis, sicut malorum & cydoniorum & speciebus pirorum boni odoris aspersi aqua rosacea, & nenufariis & salicibus, super quæ sunt puluerizata sandali, & rosæ, & camphora, & super quæ iam distillatum est parum uini odoriferi, tunc est illud, quod est ultimum. Hoc ergo est regimen aeris. Regimen autem cibi iam sciuistis: & si uoluntas ad est ut cum infrigidatione sit lenificatio, tunc detur aqua cucurbitæ, & aqua melonis indi proprie: & aqua alcheta & alcheted, & lactuca cum aceto, est ultima. Et quod conueniens est ad sedandum sitim eorum, est foca factum ex pane similæ gum aqua casei accepta est dog post tollationem uehementem. Et si adeat uoluntas ut cum infrigidatione sit retentio, tunc detur succus granati murei & acetosi, & aqua acresce, & aqua mori de semi. & aqua acetositas limonis non salis: & aqua acetositas citri, & quæ sunt his similia: & aqua cereculi, & est berberis. Epithemata uero, & emplastra sint ex succis nutis: & proprie aqua rosaceæ, aut succo rosarum recentium cum sandalis, & camphora, & aqua coriandri, & endiuie, commixtis est plurimæ infrigidationis: & mucilago psyllij cum aceto, & aqua rosacea est huius generis. Et embrocate heparum infrigidantibus est res maxima, & magis iuuans: nam cum æquatur est in eo maior pars rectificationis, & fortasse rectificatur. Et quando illic est catarrhus, & tussis, aut in capite eius est grauitas, aut tæsis, significat multitudinem uaporum, quare oportet ne fundatur super caput aqua, aut acetum: immo occupetur cum inclinatione capitis super uapores aquæ, secundum quod dispositio facit illud necessarium. Si uero non fuerit catarrhus, neque aliquid eorum, quæ diximus, tunc administra de embrocis, & epithematibus, quæ uis. Et nocibilior embrocum huius dispositione repletionis capitis, est multio lactis super caput: fortasse enim facit accidere apostema in capite, & perditionem. Et magis salus, horarum euacuationis capitis cum repletionem eius, est ut sit uapor cholericus, non humidus: immo in huiusmodi hora fortasse non nocet applicatio lactis: immo confert. Et cognoscitur ex dispositione somni, & uigiliis, & humiditate superiorum partium narium, & earum siccitate: cum ergo uideris somnum, aut profunditatem somni, aut humiditatem superiorum partium narium, tunc caue embrocationem, & inunctionem: & si de in attrahendo materiam ad inferiora, & contra uideris rubedinem in naso, & facie uehementem.

tunc

tunc non erit malum ne facias currere sanguinem ea naribus. Et infrigida hepar cum emplastris: & cum infrigidas, caue ne occurras cum infrigidatione uehementi, hora sudoris, & resolutionis: im mo oportet ut consideres illud: tortasse enim fit causa in longatione agritudinis: licet quandoque fit longitudo egritudinis saluioi, quàm ipsius acuitas. Et oportet ut caueas in febribus acutis casum rasuræ intestinorum: quoniam addit in debilitate uirtutis, & terretur natura à receptione superfluitatum ad intestina, & ab expulsiōe earum ab eis nisi cogant & dominentur superfluitates, & quandoque redeunt superfluitates ad superiora, & ledunt hypochondria, & inflant ea, & ledunt caput. Et quandoque est in syrupo de papauere iouamentum mirabile in inspissando materiam subtilem: propter digestionem eius, & in faciendū somnum.

Rememoratio accidentium, qua difficilia sunt in febribus acutis. Cap. 11.

Loquamur itaque in primis de accidentibus, quæ uehementia sunt in febribus, & de curatione eorum: & festinemus ad distinguendum febres acutas. Et hæc quidem accidentia sunt sicut rigor, & frigus, & horripilatio: & sicut sudor plurimus: & sicut fluxus sanguinis narium superfluus: & sicut uomitus laboriosus: & fluxus uentris debilitans: & sicut sitis, quæ non toleratur: & sicut profunditas somni plurima: & sicut uigilatio insepabilis: & sicut asperitas linguæ, & siccitas seu exsiccatio oris: & sicut stertuatio continua, seu uehemens & dolor capitis prauus: & tussis frequens: & sicut casus appetitus, & bolismus: & sicut appetitus caninus & frigus uehemens & singultus.

De regimine rigoris, et horripilationis cum superfluis. Cap. 12.

Quod est de hoc sequens sudorem, restituitur uelociter, & non indiget regimine. Et eretico non oportet ut cōtrarium fiat per remotionem: & non est de illis, quæ debilitant, & quæ faciunt aliud: & quandoque sedantur cum ligatione extremitatum, & frictione facili, & cum calefactione cooperturæ: & cum unctione de oleo de anetho, & de chamæmilla si indigetur eo. In forti autem quando perseverat, siue sit in febribus, siue sit in alijs, oportet ut ligentur extremitates in locis plurimis, & unctionio fiat cum oleo chamæmilino, & radicis lilij. Et sunt de hominibus, qui confortant illud cum eis, quæ sunt sicut cardamomum, & castoreum, & ruta, & scedra, & calamethum, & baurach, & piper, & pyrethrum. Et quandoque concedit illud administrationem linimenti ex sinapi, & assa fetida. Et quandoque

decoquantur medicinæ istæ in aqua, deinde coquitur in ea aliquod oleum. Ex aqua cruce fortis est in hoc capitulo per se sola, aut cū oleo aliquo, quod decoquitur cum ea. Et similiter decoctio ozimi, & aqua eius.

Confectio olei boni.

Sumantur anethum siccum, & myrrha, & ruta, & calamethum, & piper, & pyrethrum, & coquantur in uino decoctione ultima, deinde decoquantur colatum in tanto quantum est medietas eius de oleo sisamino, usquequo consumatur aqua, & remaneat oleum, & administretur in uingendo. Et de oleis fortibus in eis, in tali qualis est rigor quod tanq, est oleum de costo, & oleum de scedra, & oleum de abrotano, & oleum de lilio, & oleum de myrrha: & ponantur in vnc. i. olei, pondus, drach. 3. piperis, & scedra, drach. i. pyrethri tritorum. Et administretur absinthium decoctum in oleo aliquo: aut oleum oliu in quo decoctum est apium. Et introitus in oleo calido est iuuatius valde. Et fortasse necessarij sunt potiones. Et multoties sedatur cum potu aquæ calidæ multæ caliditatis, & cum inclinatione super uaporem eius. Et quando non sedatur per id, si materia est grossa, decoquantur in aqua anisum, & calamethum, & semen apij, & mastix, & eruca, & anethum, & similia. Et euaporetur cū aqua in qua decocta sunt ea, quæ sunt sicut scedra, & abrotanum, & calamethum, & anethum, & squinanthum, & ruta, & sanfucus, & costus, & semina calida. Et omnes medicinæ fortis prouocationis sedant rigorem. Et de medicinis sedantibus rigorem maximum in quartana, & similibus sibi, est ut bibatur de costo iureus. i. cū aqua calida, & de agarico quantum de ipso in aqua calida. Et in agarico est iuuamentum, & quandoque ponitur cum eo parum opij, quoniam facit dormire, & facit sudare, & prohibet uehementiam rigoris, & alia. Et iterum ireos quantitas aure. i. in aqua calida. Et iterum abel uel iuniperi pondus aure. i. cum aqua calida. Et iterum apium montanum pondus aure. i. cum aqua calida. Et de cōpositis est theriaca diatessaron, & theriaca hazare & diacyminum, & diacalamethum, & diaspercon, & syrupus de melle in quo feruent sicut alia, & ruta, & pyrethrum, & piper. Pilule expertæ, quod dantur in potu ante rigorem per horam unam, infirmo quiescente super lectum suum, & aere ciua calefacto cum igne, aut cooperto: quoniam temperant ipsum, aut prohibent ipsum: quarum confectio. Recipe storacis, myrrhæ, opij, opoponaci piperis omnium ana partem, i. conficiantur cum butyro, & sit dosis eius quantitas fabæ. Et iterum lumentur opoponaci, castorei, danci, alij, pyrethri, opij ana partes æquales, fiat sicut primo fit. Descriptio bona. Recip. opoponaci, ferapini, aniiden, & cymini, carmeni, & semini apij, & piperis ana aut. i. s. semini hyosquiami albi, croci, aristolochiæ, castorei, euphorbij, myrrhæ, amicos, zinzib.

zinzib. omnium ana pondus terzæ drachj. semi-
nat haemel, pyrethri omnium ana aurei. confician-
tur cum melle, & dosis eius sit auellana cum aqua
calida valde. Et sotalle est necessarium in eo, ut
detur in potu vinum calefactum, & cibi calefacti.
Et solutio ventris cum eis, quæ sunt, sicut hiera, &
diacydonitæ, & diaphisici immo quando est ri-
gor parvus, & proprie sine febre, dentur in potu
pulvis fortidis, quoniam ipsæ sunt sanitas eju.

Regimen sudoris superflui in febribus.

Cap. 13.

Oportet ne sudor criticus quantum possibile
restringatur. Cum autem euenit neces-
sitas, & petranit terminum, tunc oportet
ut eueatur, & infrigidetur locus. Si autem non
iuuat, tunc super instrumentum positus, quo pueri
veliuens solent in æte consueui, commoueat
in loco frigido. Et non oportet ut occupetur in
exuendo illud, quod rorando egreditur faciendo
exuccationem post exuccationem; nam illud est
causa ad illud pronotandum, & multiplicandum, &
fortasse trahit synsopim. Nam eius absterio ad-
dit in ipsum, & eius diuisione restringit ipsum. Et
oportet ut inungat eum cum oleo ros. fori, & oleo
myrtino, aut cum oleo de kales, & cum oleo de
balaustini aut fiat oleum cum aquis in quibus de-
coquantur cydonia pontica, & mala pœnica, &
rosæ & balaustie & similia, & collectur & decoqua-
tur in ea oleum, secundum quod sciuisti, & quandoque
puluerizantur de super granis myrti contusa, & ba-
laustie, & karabe contritum, sicut pulvis, qui ap-
paret in radio solis & similia, quoniam restringit.
Et quandoque restringit acetum misum aqua, &
succus agrella, & decoctio balaustiarum, & deco-
ctio gallari, & decoctio myrti, & succus kales est
mirabilis, & aqua sempervirens. Et cum res sit vehem-
ens, liniatur cum mellelaginibus frigidis, & cum gi-
mæ, & proprie cum ponantur in huiusmodi sanda-
li & ephora, & proprie quando fricatur seu asper-
gitur cum his duobus, & eueniatur. Et quando ve-
hemens sit res, oportet ut ponatur nix super extre-
ma, & sola sint in ea extrinsecus aut balneetur cum
aqua frigida, si sufficit eam.

Regimen fluxus sanguinis narium superflui. Cap. 14.

Oportet ut non properetur ad prohibendum
quæ, qui ereticus est, quantum possibile
est. Cum autem est necesse prohibere fluxum
sanguinis narium in febribus acutis, tunc liga ex-
trema, & pone ventosas super latus, quod sequitur
narem vel vicinatur nari ex qua est fluxus sangui-
nis narium. Deinde consequenter adhibe infrigi-
dationem illius loci & si possibile erit tibi ut in-
frigidet, & restringatur per illud, tunc non ponas

ventosas de super. Et distilla in usum aliquas di-
stillationes prædictas in capitulo fluxus sanguinis
narium, & cum non est prohibens aliquid in-
frigidat caput cum infrigidantibus prædictis eo, ut
quandoque aduenit patiens tibus quantam fluxus
sanguinis narium: quare oportet ut iuuet eum facies
tibus fluere sanguinem ex narium scitis in ipso
est sanatio quantæ. Si vero superfluius acci-
merimus, faciemus sicut illud, quod fecimus.

Regimen vomitus, qui accidit eis. Cap. 15.

Recius iterum non abscindatur nisi apud
necessitatem: & secundum plurimum ab-
scinditur vomitus ipsorum et. nasea ipso-
rum in cia per vomitum, et per adiutorium eius
quo. extrahitur humor noxius sicut est syrupus
acetosus simplex et aqua calida. Et quandoque est
necessarium ut fortificetur: quare ponatur loco
syrupi acetosi ponit syrupus acetosus cum semibus.
Et si humor est imbibitus, et grossus, tunc oportet
ut fiat solutio dando in potu, quod est sicut aloë
et hiera. Et quando non est imbibitus, fortasse rôt
fert hiera et aloë. Et si est imbibitus, non grossus
mundat ipsum syrupus acetosus cum aqua calida
deinde aqua ipsum post illud aqua granatorum,
quæ bibatur. Quod si euomerit eam, bibat ipsam
vice alia, donec quietetur & quiescat. Et si multum
syrupus de menta cum granis granatorum. Et for-
tasse sedat ipsum infrigidatio stomachi. Et non
oportet ut approximet rebus pomiciis, et de pa-
tibus nominum cum pomiciatæ suæ, et acetositate
sua styptica ille, qui habet humorem imbibitum,
quis est malum, et addit imbibitioni: sed non im-
bibitum, quandoque facient eum deijcere dorsum,
quomodo sit grossus: et quandoque iudicant vir-
tutem stomachi ad expellendum eum per superio-
ra. Et quando asiduauerit uomitus de cholera, et
non fuerit de genere imbibitus, tunc utere styptica
et proprie emplastris iuuantibus factis ex corti-
cibus granatorum, et gallie, et his similibus cum
uino permisto, aut aceto permisto. Et ad uomitus
quidem cholerae uigra superfluum submergatur
spongia in aceto, et ponatur super stomachum.
Quod si necessarium fuerit aliquid fortius, admi-
nistra medicinas prædictas in capitulo retentionis
uomitibus.

Regimen fluxus ventris, qui accidit eis. Cap. 16.

Iam singulariter in capitulo fluxus uentris loca
uifumus in hac intentione: ergo redeamus ad
illud. Et de illis, quæ conseruant ex uia ciborum
sunt almes torrefacti, et lentes torrefactæ, et co-
rindrum, quodcumque horum duorum fuerit,
elixerit, et fundatur aqua ab eo, et proprie quado
sit acetosum cum granis granatorum, quoniam
est bonum.

Regimen sitis eorum superflua. Cap. 17

Oportet vt inungatur caput cum oleo frigidando valde, & fundatur super ipsum, & ponatur super caput si non fuerit, & prohibeatur, & cū aquis in frigidantibus, & retentione mucilaginis semel cydoniorū permixta cum oleo ros. vltimo: in bonitate in ore aut infusiois prunorū, & medullarū alcheta & alcheted, & cucurbitæ, & seminis lactuæ uigræ, & radicū liquiritiæ, & pilularum descriptarū in antidotario ad scitis. Et de illis, quæ masticantur & suguntur sunt tamarindi. Et sitis quidē quādoq; fit ex siccitate & absconditā somnus: & quādoq; fit ex calore, & absconditā eam vigiliz.

De profunditate somni qua accidit eis. Cap. 18

Oportet vt remoueātur à profunditate somni cū fabulis, & his similibus per voces. Et ligentur membra eorum inferiora ligatione dolorosa, postquā non fuerit, quod prohibeat. Et supponatur collyriū subtile si natura fuerit restricta, & in hora quietis, aut in hora teporis in assidua, & inseparabili ventosetur, quod est inter ambas spatulas, & spondyles.

De grauitate capitum eorum. Cap. 19

Oportet vt alienetur ab eis emulsio lactis super capita eorum: aut effusio olei super ea aut embroca: aut caput purgiū immo sunt cōtēti vaporationibus factis cū embrocis ex chamemilla, & sicut in eis violæ, & furfur, & his similia

De vigilia superflua vel non naturali habentium febres, & aliorum. Cap. 20.

Natribus attrahere oleū de papauere cū oleo de semine lactuæ, & oleo uenufarino, & oleo de cucurbita, & adherere aliquid de stupefacientibus famosis super tēpora, & incuruare caput super vapores humectantes: & odorare uenufar, & poma mādragoræ, & alia heseis aspersum ex longinquo, & embrocæ humectantes, & res quas scis. Et similiter si nō fuerit, quod prohibeat, detur in potu syrupus papaueris, & de loch eius. Deinde multiplicet inter manus eius cādele: & eleuetur voces cum fabulis, & ligentur cū inlitis extremitates eius ligatione dolorosa parum, cum nascit. i. cū ligamenti seu nodis velociter solubilibus. Deinde præcipiatur ei vt dormiat, & claudat oculos: cumq; dormit parū, extinguantur candele & cessent voces, & soluitur nascit. i. ligamēta velociter solubilia, quoniam dormiet. Et cū inuenit leuitatē, & quietē ex paroxysmo, aut vehemētia, assidue ablutionē faciei cum aqua in qua decoctū est papauer nigrum cū aliquātulo mandragoræ, &

radice eius. Et cū est illic humor baurachius, coferat aqua in qua cocta sunt sisymbriū, & melilotum, & alhacuen, & papauer, ablundo faciem, & incuruando super vaporem eius.

De dolore ventris qui accidit eis. Cap. 21

Fit ex effusione cholerae ad stomachū: & si accidit in principio periodi eius, detur in potu parum syrupi de malis cum syrupo acetoso.

De asperitate lingue eorum, & eius viscositate.

Capit. 22.

In essentia quidē viscositatis fricetur cū chaizā aut cū virgulis salicis cū oleo amygdalino, & zuecaro tabarzet, donec mundetur, aut cū spōgia & pauco sale, & ol. ros. In hoc. n. est alienatio multa infirmi. Et post illud, cum eius asperitas est nō propter viscositatē, immo à siccitate, oportet vt teneantur ore suo sebesten, aut nucleos prunorū, aut salem, qui asportatur de Iudæia: etiam est in colore salis & dulcedine mellis: & sumat de eo, secundum quod dixit Archigenes quantitatē tabaci vnius. Et grana cydoniorum sunt ex eis, quæ humectant linguam, & prohibent exsiccationem eius, & oportet vt non sient ore aperto plurimum neque respuantur dormiens, nam hæc duo exsiccant linguam.

De sternutatione assidua que accidit eis

Capit. 23.

Quādoq; magnificatur nocumentum sternutationis aridius cum eis: ladiæ nanque eos, & replet capita eorum, & debilitat eorum virtutes: & fortasse facit fluxum sanguinis narium. Quare oportet, vt fricetur eorum frōs, & oculi, & nāsus, & aperiantur ora eorum, & fricentur eorum palata cum vehementia, & tendantur vel fricentur eorum extrema: & fundantur in aures eorum olea tepida ad caliditatem praeper de cliuia: & humectentur lacerti eorum, & ipsorum mandibulæ: & ponantur super eorum ceruicibus puluinaria calefacta, & non excitentur à somno eorum subito: & prohibeantur à puluete, & à fumo; & omni in cuius odore est acuitas: & olasciant sauih, & luti alnahagi & spongiam marinā.

De dolore capitis, qui accidit eis. Cap. 24.

Liga extremitates eorum, & proprie coxas, & cum inlita liga, & frica pedes eorum: & supponantur eis collyria trahentia materiam ad inferiora: & confortata capita eorum cum infundantibus notis. Et si non fuerit, quod prohibeat ex catarrho, aut tussi, embrocetur capita ipsorum cum

tum decoctione rosarum, & violarum, & hordei, aut foliorum salicis, & his similibus, & similiter oleo ros. & oleo de salicibus. Et quando non excusat hoc, tunc permisce embrocis infrigidentes cum lenicinis, sicut chamæmilla, & stopefactiuis, sicut est papauer. Et non mulgeas lac nisi cum remouetur febris. Si autem virtus fuerit fortis, mulgeas lac caprinum: & si fuerit debilis, mulgeas lac muliebre. Et caue lac apud repletionem humidâ corporalem facientem subet: & similiter caue oia humectantia. Et tu non administres humectantia nisi ubi est vapor fumosus, & caput siccum, & patum somni. Et quando multiplicatur repletio in capite ex vapore humido, trahere eum ad inferiora cum collyrijs & clysteribus, & stringe membra inferiora, ita quod testiculos.

De tusi eorum. Cap. 25.

T Vasis plurimum accidit eis ex calore, aut siccitate: quare oportet ut teneant in oribus suis pilulas bichicis, aut loch de papauere facta cum medullis fructuum frigidis, & amylo; & his similibus. Et videntur ceratarijs infrigidantibus factis ex oleo ros. & ex mucilagine psyllij, & succo portulacæ, & alijs.

De destructione appetitus eorum. Cap. 26.

Q Vandoq; est causa eius humor in ore stomachi, quod scitur ex eo, quod dictum est de destructione appetitus, & euacuatur per vomitum, aut solutione venter. Et multoties iuuantur cum intromissione digitorum in gutture, & commotione stomachi: & proprie quâdo vomitus expellit cholicam rem, aut acetosam. Et quandoq; est ex vehementia debilitatis, quare curetur complexio, quæ facit eam cum eo, quod scitur. Et oportet ut approximes eis odores bonos excitantes appetitum, sicut odor sauiæ infusus cum aqua, aut cum aqua, & aceto: Et detur eis electuarium proportionale febricitantibus, & parum vini, & decoctionem fructuum ponticorû, boni odoris: & lambant aliquid de aceto gelatine piscium, aut hendi, & his similibus. Et ponantur super stomachum post dies primos emplastra facta ex fructibus: Et sint in eis absinthium & aloë, secundum quod scis: & inunctio eius cum oleis bonis est iuuatua.

De bolismo eorum. Cap. 27.

O Portet ut curentur cum odoramentis, & unto alnahagi aut luto armeno madefactis cum aceto: & odorem almosofat, & panem mundum calidum, & carne affatas, & stringe eorum extremitates. Et extende aures eorum, & ca pillos ipsorum. Et conforta eorum cerebra cum

embrocis infrigidentibus, & humectantibus: plurimum namq; bolismi eorum est propter destructionem sensus oris stomachi propter causam communiantem ramis, qui adueniunt cum sensu: & est corpus exigens vel requirens cibum, verum sensus non exquirat ipsum.

De nigredine lingua eorum. Cap. 28.

O Portet ut non dimittatur super linguam nigredo, immo fricetur cum eo, quod scis: & si non, eleuabuntur ad caput vapores maligni, & facient cadere in sinsem.

De appetitu eorum camino. Cap. 29.

C Vrantur cum vinctuosis frigidis, & dulcibus.

De syncopi quæ aridit eis. Cap. 30.

Q Vandoq; accidit eis syncopis in principio febrium propter effusionem choleæ ad os stomachi eorum: quare oportet ut detur eis ante paroxysmum, aut apud paroxysmum frustum panis de similitudine aqua granati, & aqua acrestis. Et scias, quod quando aggregantur syncopis, & febris, tunc syncopis est dignior curatione: & si indiget cibo, cû detur parû panis permisti vel madefacti cû drac. 3. vini ætqui: & si nō, syrupi malorû antiqui, cuius resoluta est superfluitas. Et phlebotomia quidē multoties addit in syncopi. Et clystere leue est magis conueniens. Et vomitus est iuuatius eis. Et cōstrictio crurû, & ponere manus, & pedes in aqua calida. Et cû euadunt, tûc de sollicitudine est ut cibetur sauiæ hoc dei infrigido, in quo sint grana granatorum.

De constrictione anhelitus eorum. Cap. 31.

C onstrictio anhelitus accidit eis, aut propter spasmum & siccitatem, quæ accidit eis in lacertis anhelitus: aut propter materiam præfocatiua descendente ad guttur eorum: aut propter debilitatem, quæ dominatur nervis venientibus ad membra anhelitus. Et prima quidē coratur cum vnguente vel emplastris humectantibus. Et secunda cum eis, quæ prohibent strangulationem. Et tertia cum æquatione complexionis in cerebro, & inunctione colli cum eis, quæ infrigideant & humectant: & super stomachum iterum, ex eis, quæ sunt sicut rasura cucurbitæ, & portulacæ, & sandali cum oleo ros. & similibus ei.

De vehementi choreæ, i. angustia vel inquietudine eorum. Cap. 32.

Q Vando multiplicatur choreæ, i. angustia vel inquietudo causa oris stomachi, & aduentu humoris mordacissimi in eo, tunc infrigida stomachos eorum cum eis, quæ seis de cibis: & enectetur seu respirent aerē & iaceant, seu & dormiant in loco proximo, motibus aq; str.

to extremitatibus, & ramis frigidis, & odoriferis frigidis, & nensare, & rosis, & asperitionibus frigidis factis ex fructibus odoriferis, frigidis, & sandalis. Et multoties quidem conferunt in eorum angustia vel inquietudine clystera frigida, facta ex aqua cucurbitæ, & cistuli, & succo portulacæ, & semperuiuz cum oleo rosato.

Difficultas deglutendi, qua accidit eis. Cap. 33.

Difficultas deglutendi cum accidit eis, & febris fuerit sanguinea vel cōclusa, tunc phlebotomia fiat & extrahatur sanguis paulatim, & cibetur cum aceto & lactuicis, si appetitus in eis fuerit aliquantulum excitatus, & si nō, contenti sint aqua hordei, & alienent, quæ subito occurrunt. & si fuerit cum eo stypticis naturæ, tunc suppositoria, & clystera sunt meliora plurimum quàm solutiuum desuper.

Frigus extremitatum quod accidit eis. Cap. 34.

Multoties profundatur calor eorum, & infriquantur eorum extrema, & euaporare facit calor submersus ad caput. Ponantur ergo extremitates in aqua calida, & non bibant aquam frigidam.

Sermo vniuersalis de febre cholerica. Cap. 35.

Febres cholericæ tres sunt: tertiana cōtinua, & tertiana periodica, & caupon. Et tertiana quidē periodica aut est pura, & sit à cholera pura: aut nō pura, & sit cū putredine cholere grossæ substantiæ propter cōmitionem cholere cum phlegmate cōmitione cōplexionali unita: & per hoc diuersificatur ab hemitritæ, cū hemitritæ faciant duæ materiæ separatae: & hanc faciat materia vna, quæ in seipsa est permixta, cū cuius calore permisceatur aliquantulum frigoris, quod grauatur suā putredinē, & suam resolutionem, & suā digestionem: & propter illud quidē fiunt in hemitritæ duo paroxysmi: & tertianæ non puræ paroxysmus vnus. Et hæc quidē non pura quandoque prolongatur tempore longo & circiter medietate anni. Et quādoque perducit ad trehel. i. tumefactionem membrorum similē cachexiæ, & magnitudinem splenis. Caupon vero seu incensua est de genere continuæ: nisi quod ei associantur excrementa & repores sui non sensati: & accidentia eius sunt vehementia. Et causa est acuitas materiei, & multitudo: cum eius casus sit circa cor, & in venis oris stomachi, aut in partibus hepatis propriis: & ad summum in membris nobilibus vicinis cordi. In tertiana vero cholera est in carne, & ad partes cutis: & in continuā est sparsa in venis corporis, quæ elongantur à corde. Et vehementia quidē sitis, & angustia, & inquietudo, & vigilia, &

alienatio, & nausea, & amaritudo oris, & bothor labiorum, & scissio eorum, & dolor capitis multiplicatur in febribus cholericis. Et est natura in pluribus earum ad siccitatem declinans: quoniam materiei motus est ad superiora, aut ad illud quod apparet de corpore & cute.

De tertiana absolute, & nominatur tritana.

Cap. 36.

Paroxysmus tertianæ incipit in primis cum horripilatione, vt punctura acus, deinde infriquant, & incipit facere rigorem difficilem valde difficiliorem reliquis rigoribus, non frigidum aut cum paucio frigore. Et nō est frigus eius nisi propter profundationem caloris ad interiora versus materiam eius, & inuenit sicut puncturas acuum. Et hic quidē rigor cum vehementia sua est velocis sedationis, & calefactionis, & tu iam sciuisti causam huius rigoris. Et fit rigor eius in diebus primis fortior, & vehementior: & in quartana e contrario. Et iterum rigor incipit cum fortitudine, deinde linquit paulatim, & minuitur velociter, & in quartana e contrario. Et sudor multiplicatur in tertiana, cum dimittit. Et fit vrina in ea rubra tendens ad igneam, in qua nō est multa grossitudo. Aut est non pura, & fit vrina eius cruda aut grossa. Et tertianæ caliditas est saluior caliditate cauponidis: & quanto prolixius manet tangit corpus, non additur inflammatio: immo quandoque minuitur inflammatio eius: & in cauponide additur inflammatio. Et accidentia, quæ accidunt eis in tertiana sunt vigilie sine grauitate in capite, nisi in quibusdam non puris, & sitis, & furor, & ira, & odia locutionis. Et est pulsus eius acutus, velox per comparisonem ad reliquas febres: & non est æqualis constrictionis, & dilatationis, quoniam humor debilitat eū, vel coarctat eum, & additur ei diuersitas apud statum. Et diuersitas in ea est infra illam, quæ est in alijs febribus humoralibus. & minor ea, quæ est in alijs cum duritie eius: & est pulsus fortior in ea: immo non est diuersitas in ea secundum plurimum, nisi diuersitas febris appropriata existens infra alias vel minor alijs. Et in principio quidē est necessarium, vt coarctetur pulsus vsque ad horam dilatationis febris: postea cōfortatur, & fit velox, & frequens. Et eius diuersitas nō est cum illa superfluitate. Et quandoque significant ipsam ætatem, & consuetudinem, & regionem, & aetatem, & formam, & tempus, & multitudo euentus tertianæ in illa hora. Cū ergo componuntur duæ tertianæ, sunt paroxysmi euenientes omni die: qui ergo considerat tertianam per paroxysmum, errat in ea, immo oportet ut attendantur significationes alie & paroxysmi confirmant eas. Et patientibus quidē tertianam accidunt vigilie, & amor solitudinis: & multoties sentiunt ebullitionem apud hepar.

Differentia inter tertianam puram, & non puram. Cap. 37.

Pura est subtilis, levis, cuius paroxysmus consumitur à quatuor horis usque ad duodecim horas: & non addit super eas multum. Et si addit additionem multà: tunc est non pura. Et est secundum plurimum perueniens ad septem horas. Et calefit in ea corpus uelociter: Et uidet caliditatem procedere ex corpore, & extremitates adhuc sunt frigide. Et similiter pura non addit cum non accidit error supra. 7. periodos. Et quandoque consumitur propter subtilitatem suæ materie in paroxysmo uno, in quo accidit uomitus: aut uentris solutio mundificans. Ex apparet digestio in urina in primo die: aut in tertio, aut in quarto, aut in septimo. Si autem addit super septem periodos additionem plurimam, tunc est de genere non puræ. Et similiter si prolongatur spatium sui rigoris: & sit additio suorum paroxysmorum. Et antecellio eorum adinuicem secundum ordinem seruantes proportionem similes: & in non pura est illud diuersum non ordinatum. Et similiter quando aliusmanner paroxysmi secundum terminum unum: & similiter reliqua signa prolongationis febris etiam sunt de illa quæ scis. Et cum uidet principium cum rigore, secundum quod determinauimus, & statum cum sudore exuberante, tunc non dubites, quousque ipsa sit pura. Et in pura quidem est, cum eam habens bibit aquam, procedit in corpore uapor humidus quasi ipse uelit sudare, & quandoque sudat. Et cum non pura inuenitur grauitas plurima in capite, & extensio: & prolongatur paroxysmus ita ut perueniat ad viginti quatuor horas: aut triginta horas usque ad horam suam: & tepescit donec complentur 48. hor. & per quantitatem additionis paroxysmi super 12. horas, est eius elongatio à puritate. Et in tertiana quidè non pura tardatur apparatus digestiouis: & non apparet in forma de sulfatio, neque extenuatio: & fortasse uò eradicatur cum sudore copioso. Et fortasse non incipit cum rigore, foris, & non est caliditas cum illa fortitudine, neque est augmentum eius æquale: immo est quasi ipsum addatur, deinde procedit, & minuitur. Et accidentia signa minorantur in ea.

Tertiana continua. Cap. 38.

Cognoscitur per uehementiū paroxysmorum tertianæ: & per uehementiū accidentiū tertianæ. Et apud G. quidem cum sang. putrescit, sit de hoc genere: & de eo fiet sermo post.

Cura tertiana pura. Cap. 39.

Oportet ut rememoreris illud quod dedimus tibi de radicibus in curatione febris, de solutione uentris, & cibo, & in oibus ca-

pitulis: & fabrica super illud. Et tu quidè uon auscultes sermonem eius, qui concedit in principio solutia fortia: & myrobalaños, & his similia, nisi cum conditione & qualitate quam diximus. Imò oportet ut properes in primis, & lenias lenitate quadà cum eis, quæ diximus illic: sicut sunt tamarindi quātitate 40. dra. qui infundantur in aqua calida in nocte, & colentur, & proiciatur de super sira-eost, aut tereniabin, aut aqua duorū granatorum: & sicut decoctio luble cum tereniabin & cum cibib. enucleatis, aut infusio prunorum cum tereniabin, aut siracost, aut syrup. viol. & uiolæ conditæ. Et fortasse facit mucilago psyllij cum quibusdam syrupis, sicut est syrup. prunorum, lubricitatem, & lenificationē, aut cum decoctione lētiū cum luble. Aut clystere lenia sicut est clystere cum decoctione althææ, & iuiubæ, & sebesten & radice liquiritæ, & oleo uiol. & succo siclæ, & baurac, secundum modū quem scis. Et illud quæ necessitas agit ad ipsā. Rectū nūq; est ne in potu detur quod est sicut aqua hord. neque ei simile, neque cibum, nisi natura iā lenificata. Et si nentis solutio in principio in febre tertiana pura, minoris sit malitix, q̄ eius simile in alijs: licet sit eius malitia magna. Et quæ est possibile, ut nō phlebotomes usq; ad tres periodos, fac. Et similiter quæ times qd sit ægritudo furiosa, & facis illud, erit illud qd accidit de errore, si accidit, minus q̄ aliud. Et oportet ut uò moueas in die paroxysmi aliquid, nisi propter necessitatem, & non cibem nisi apud conditiones prædictas: & ut prouoces urinam cum emulsione seminum. Et oportet ut superueniat ei paroxysmus dum est samelicus, & non est in stomacho eius aliquid, immo oportet ut sumat in potu syrupum acetosum omni mane: & post duas horas aquam hordei in die, in qua non est paroxysmus. Et syrupus quidem acetosus post paroxysmum est conueniens, & similiter pouere pedes in aqua tepida ad attrahendum residuum caloris. Et ego magis diligo ut sit in syrupo acetoso, proprie in poltremis, emulsio seminum frigidorum diureticorum aut ante paroxysmum per tres horas, aut quatuor: & detur in potu iterum post paroxysmum, aqua hordei. Et quando necessaria est subtilitatio regiminis, detur in potu sicut aqua granatorum, & aqua melonis indi, & his similia. Et gradatim fiat eius regimen secundum modum prædictum. Et quoties appropinquat status, subleietur. Et in diebus primis cibetur cum sisch hordei, & pane comminuto cum aqua frigida aut pane sicut est aut emulsione panis in ea, & cum eo quod sit exalme, & lentibus. Et quando cibus acetat in stomacho, uon detur in potu aqua hordei, quæ non est ualde subtilis: & si necessarium fuerit dare ipsum in potu, confortetur parum cum decoctione radicis apj. Si autē stomachus fuerit frigidior illo, & febris non magna, & uon pura, ponatur parū pipetis secundū consiliū Hippo. Quod si signa

significauerint quòd crisis est propinqua, tunc sufficiat ei aqua hordei, & aqua granatorum, & syrupus acetosus. Et fructus quidem qui diliguntur eis, sunt granata dulcia & muza, & pruna matura, melon uero indus est res maximi iuuamenti, cum hoc quòd ipse soluit, & pronocat, & frangit uehementiam caloris, & facit sudare, & fortasse non nocent aldestembuiat parui: & ex oleribus cucurbita, & alcheta & alcheted: & lactuca. Et scias quòd intentio in eo quo cibantur patientes tertianam, aut est humectatio sicut datur eis in fine de extremitatibus alchayugi, & de testiculis gallo- rum: & cerebellis hædorum, quibus non est nau- sea, & uitellis ouorum. Aut est in frigidatio, & humectatio simul sicut in xixf hordei. Et non ni- times in in frigidatione multa, & proprie in prin- cipio, nisi inuenias inflammationem uehemētem, aut timeas conuersionem eius ad causonidem aut ad continuam. Quod si consequatur crisis, & uide- ris digestionem in utina, & est se dimen lauda- bile quod cognouisti, tunc si excusati, bene est: & si non, cura tunc cum eo quò iuuatur natura ex prouocatione urinae, aut solutione ventris, aut vo- mitu, aut fluxu sang. narium. Et non agas contra ipsam in hoc. Quod si non inuenis declinationem manifestam, tunc euacua cum solutione uen- tris. Nam de illo est scammonex sexta drach. i. in inlebe: aut decoctio myrobalanorum cum sa- marindis, & tereniabin, & passulis, & radicibus, & cælis fistula, secundum quod sciuiti. Et tibi inest ut confortes eas cum fumoterra, & sene, & scam- monca. Et de illis quæ conueniunt eis sunt stochi- fici de spodio solutui. Et de illis est medica- men solnitium istius descriptionis. Recip. my- robalanorum citrinorum enucleatorum pondus drach. 4. zuccari tabaræ pondus, drach. 20. scam- monex pondus sextæ, drach. i. bibatur cum aqua frigida: & post illud curentur cum prouocatione. Et si fuerint illic caliditas superflua, & inflamma- tio maxima, cum iam euacuaueris cum, non erit ei malum dare in potu aliquid de extinguentibus fortibus: & fortasse conferunt ei emplastra ex eis. Bal- neo uero oportet ne approximet nisi post diges- tionem. Post digestionem autem, & apud de- clinationem est ipsum melior curatio eis, & pro- prie consueti: quamuis error in intromittendo eos in balneo ante digestionem saluior sit quàm suum simile cum alijs. Et oportet ut sit balneum eorum temperatum, boni aeris, qui sit humidus, in quo sudent cum facilitate: ita ut non inflammen- tur eorum corda, & inungantur cum oleo viol. & ros. conquassato cum aqua, & non prolongent in eo moram, immo egrediantur uelociter: nam ite- ratio est eis conuenientior: quàm stationis pro- longatio: & si apud exitum infundantur in aqua tepida, stent in ea secundum quantitatem declina- tionis. Deinde cum egrediuntur, tunc conuenit

eis ut bibant vinum album, subtile multa commi- stione permixtum, & cooperiantur in locis suis: sudabunt enim sudore uehementi: & siquid residu- dum fuerit digeretur. Et post illud cibentur ci- bis in frigidantibus, & humectantibus, & oleribus quæ sunt illius modi. Et non timeas post decli- nationem potare eos unum plurimum commi- stum. Vinum enim habens caliditatem contra- ctam per commistionem confert quantitati rema- nenti ex eo, in resoluendo illud cuius necessitas est resolutio: & succurrit aquæ penetranti cum for- titudine sua, & permissione eius quod est in eo de calefactione pauca: quare in frigidat uehementer, & humectat. Et si fuerint illic accidentia sitis, & dolor capitis, & uigiliarum, & aliorum iam tibi præterijt eorum cura. Et quando post crism remanet aliquid caloris inseparabilis, tunc sibi super- est ut administres syrupum acetosum cum succis diureticis: aut in quo decocta sunt semina, & ra- dices diureticæ. Et scias quòd cura tertianæ con- tinuæ, est cura tertianæ interpolatæ: sed est decli- uior ad obseruationem dispositionum digestio- nis, & ad in frigidatam cum syrupo acetoso facto cū semine citruli, & semine endiuie proprie con- tusis: Et post ipsum post duas horas, datur in po- tu aqua hordei: & ad subtiliationem cibi, & ad ad- ministranda clysteria lenia in principio, & ad pro- uocationem: & oportet ut cum facilitate procedant, & non insistant in potu de solutius in princi- pio, aut in eo quod ei appropinquat nisi ea, & quæ sunt sicut syrupus niol. & aqua fructuum, & non utantur nisi clysteribus lenibus.

CURA TERTIANA NON PURA. Cap. 39

REs in quibus dinerficatur cura tertianæ non puræ, à curatione tertianæ puræ sunt res in quibus communicat febres frigida. scilicet quòd licentia in balneo, quæ conceditur habentibus ter- tianam puram absque hoc quòd expectetur diges- tio, & non expectatur plurimum declinationis si expectetur digestio, est in eis illicita uel prohibi- ta. Quoniam balneum permiscet phlegma indi- gestum cum eo quod effunditur ad locum putre- dinis: & permiscet humorem malum cum putri- do, & resoluat subtile, & facit remanere spissum. Et quod cibatio omni die iterum, aut prope ciba- tionem, est ex eis quæ illis nocent: immo oportet ut cibentur uno die, & alio die non. Et sit in cibis eorum quod abstergat, & calefaciat parum: Et ne sit cibatio in principijs egritudinis grossior quàm sit in principijs puræ: deinde gradatim perueniat ad subtiliationem supra subtiliationem tertianæ. Et subtiliatio eius in ea in principijs fit cum famæ eius plusquam subtiliatio cum cibo subtili ualde. Et ut sit in frigidatio minor. Et ut clysterizetur in principio clysteribus acutioribus. Et ne expec- tetur digestio plus in solutione ventris eorum

forti.

forti. Et ut sint in aqua hordei eorum uirtutes digestiuz, & resolutiuz: sicut est illud quod diximus in eo in cuius stomacho acetat aqua hordei, immo fortiores quàm in illo. Fortasse enim necesse est ut decoquantur in ea hyssopus, & origanum, & calamentum, & spica secundum complexionem: & blitis iuuatiua est eis. Ex permissio eoque cicicris cum aqua hordei, & in fine eius aqua cicicris est iuuatiua eis. Et oportet ut consideretur propinquitas non puræ ad puram: & elongatio eius ab ea: & secundum illud diuersificetur inter curam eius, & curam puræ, quòd si fuerit ualde propinqua puræ, tunc diuersifica inter eas diuersificatione parua. Et cum uideris urinas eorum grossas, tunc phlebotomia. Et cum phlebotomia ueris non indigebis clysteri. Et scias quòd non est res magis iuuans eos, quàm uomitus post cibum. Et de solutiua in principiis eius, quæ sunt propinquiora æqualitati, est aqua algeniabin decocti: & syrupus acetosus. Et fortasse ponemus in ea caliam fistulam. Et fortius illo est ut ponas in ea uirtutem turbit. Et clysteria in principio sunt magis dilecta, quàm solutiua alia, & sunt clysteria in quibus est uirtus alha scech, & chamæmillæ, & ficæ, & cartami, & uiolarum, & sebesten, & ficus, & odor turbit. Et in eis sit casus fistule, & oleum sisaminum, & baurach, & fortasse indiget acutiore istorum secundum elongationem febris à purâ. Adiuantia autem ad digestionem sunt sicut syrupus acetosus permissus cum aliquanto de algeniabin: aut syrupus acetosus de radicibus. Et post septimum sicut decoctio absinthij: est enim iuuatiua, subtiliatiua materiei, & confortatiua stomachi. Et similiter aqua feniculi, & aqua apij cum syrupo acetoso: Et si pertransit 14. tunc non est malum dare in potu trochiscos ros. minores. Si autem ægritudo prolongatur, non inuenimus excusationem quin demus ea, quæ sunt sicut trochisci de eupatorio, & decoctio eius. Et calefactio partium hypochondriorum est huius generis. Et emplastratio mirachetorum iterum cum eis, quæ digerunt, & maturant, & mollificant tensionem, cum uenerit illic. Cum ergo sciueris quod digestio iam aduenit, tunc cœua cura, & prouoca, & non cures. Et de euacuationibus bonis eis est, ut sumatur hieræ picræ, drach. 5. succi absinthij, & eupatorii amborum ana, drach. 3. feminis apij, myrobalarum, citri xebulorū ana, drach. 5. turbit. drach. 7. fiant pilulæ ex eis cum aqua apij: & sit dosi eius, drach. 2. Et de illis est decoctio bona in uentione nostra. Recip. eupatorii, absinthij, myrobalarum, xebulorum ana drach. 5. feminis melonibus, feminis cucumeris, & alcheta & sem. apij, suchaha, bedeoard omnium ana drach. 10. turbit. drach. 1. casus fistule, drach. 6. passulorum enucleatarum, drach. 30. sicuum. 10. numero, sebesten numero 30. geleniabin facti cum ros. persici pondus, drach. 15. decoquantur om-

nia secundum quòd decoqui solent huiusmodi decoctiones. Et fumatur de ea cadus magnus, in qua posita sit filiqua. i. scammonæ. Et fortasse necessaria est medicina fortis uno modo, & debilis alio modo: eius uero fortius uale secundum hoc, quòd ipsa euacuat humorem uiscosum, sed ipsa debilitas est secundum hoc, quòd ipsa non euacuat plurimum uice una: immo possibile est ut fiat gradatio in ea, quare euacuat humorem cniua euacuatio est necessaria multis uicibus, ut non destruat uirtutem. Et hæc medicina est illa, quæ possibile est ut partiat in pluribus uicibus & possibile est ut aggregetur, & parum quidem ex ipsa medicina soluit parum ex humore malo, & plurimum de medicina prædicta soluet plurimum ex malo humore. De decoctionibus uero parum fortasse non facit aliquid. Et huiusmodi quidem medicina est, ut fumatur turbit quantitas drac. 5. & plus, secundum necessitatem, & scammonæ: proprie altusugli. i. aut supra id: & cōficiatur cum geleniabin prædicto, & bibatur. Aut fumatur de agarico, & scammonæ secundum hanc compositionem, & cōficiatur cum geleniabin prædicto, & bibatur. Aut ponatur in succo rosarum recentium cuius quantitas sit unc. 1. & bibatur. Aut in syrupo ros. & bibatur.

De febre causon, & est illa, quæ nominatur faricos id, est febre ardente. Cap. 40.

CAUSON est secundum duos modos: aut enim causon est cholericus, & est causa in ea multitudine putredinis: aut intra uenæ corporis totius: aut in uenis, quæ sequuntur partes cordis proprie, aut in uenis partium oris stomachi: aut in hepate. Aut phlegmatica, & sit ex phlegmate falso putrefacto in uenis, quæ sequuntur partem cordis, sicut dixit Hipp. in epidimia. Et non sit phlegma falsum, sicut sciisti, nisi ex aquositate phlegmatis cum cholera acuta. Est ergo cholera, quæ putrefit ignea cinerulenta permixta a quositate plurimæ. Et quoniam causon uementiora habet accidentia, quàm tertiana, oportet ut sit breuioris spatij quàm ipsa. Et senibus quidem parum accidunt febres causonides: & cum accidunt eis, pereunt: quoniam non sunt in eis nisi à causa ualde forti. Amplius eorum uirtutes sunt debiles: In iuuenibus autem, & pueris plurimum accidunt. & est in infantibus leuior propter humiditatem eorum. Et quandoque est in eis cum profundatione somni propter eleuationem uaporum ad caput. Et Hipp. quidem dixit, quòd si aliqui accidunt in febre causon tremor, tunc permissio mentis resoluit ab eo tremorem. Et uidetur ut sit illud, quoniam cerebrum calefit ualde, & calefit nervi: & est uicissimile ut sit causon, & sit permissio mentis, quæ resoluitur per tremorem, propter expulsiōnem materierum ad nervos. Et pluri-

num

num quidem consumitur cum vomitu, & solutione ventris, aut sudore, aut fluxu sanguinis narium.

Signa. Cap. 41.

Signa eius sunt inseparabilitas, & occultatio te-
poris, & uehementia accidentium ex asperitate
linguæ, & ex citrinitate eius in primis, & ex
nigredine eius secundo. Et ex retentione sudoris
nisi apud crism. Et uehementia sitis, nisi
accidat tussis parua, quæ sedat illam sitim sicut
dixit Hipp. Et uidetur, ut sit uehementia, sitis eo-
rum propter causam pulmonis: ergo cum mouetur
tussis parua, humectatur per id quod currit ad
ipsum ex carne molli. Et caliditas in causone quide-
m secundum plurimum non est ita fortis in ex-
terioribus, sicut fortitudo eius in interioribus. Et
est contraictio in ea leuior, quàm in alijs. Et in fa-
cta quidem ex cholera, fortia sunt accidentia ma-
la ex vigilijs, & in quietudine, & adustione, & per-
missione mentis, & fluxu sang. narium, & dolore
capitis, & pulsatione temporum, & profunditate
oculorum, & solutione ventris cum cholera pu-
ra, & casu appetitus. Et quando accidit infan-
tibus, abhorrent mamillam, & non recipiunt
eam, & corumpitur illud quod fugiunt de lac-
te, & accit.

Cura cansonidis. Cap. 42.

Et cura tertianæ puræ. Et cum indigent euacu-
atione, sicut cum illis, quæ dicta sunt, tunc
sestatio est melior. Complementum uero
est apud digestionem. Et non phlebotome-
tur, fortasse enim inflammabit eos, & fortasse iu-
uabit eos, si fuerit illis turbiditas, aquæ, & rubedo.
Verum indigent subtiliatione, & infrigidatione
uehementiore, & infrigidatione actuali eius quod
ipsi sumunt. Et cum times casum uirtutis, est ne-
cessarium cibare eos, quamuis non appetant: &
proprie in eo ex quo resoluitur res plurima: mul-
tities enim aduenit eis bolisimus propter priua-
tionem scus. Et indigent lenificatione in prin-
cipio fortiori, & curationibus febris acutæ præ-
dictis, secundum omnes modos uel uias narratas.
Et quandoque conueniens est ut dormiant apud
sepiorem paruum febris super aquam tamarindo.
ruin. Et quandoque ponitur in ea parum cam-
phoræ. Et diligitur eis syrupus acetosus, aut emul-
sio seminis portulacæ, aut emulsio seminis endi-
uiæ: & batech alachi est eis bona ualde. Et consi-
deret in potatione aquæ frigidæ secundum quod
diximus illud. Quod si non fuerit quod prohi-
beat detur in potu de ex etiam usque ad infrigida-
tionem uehementem, uel usque ad extinctionem.
Et fortasse aduenit eis permissio mentis, & obli-
uiscuntur petere aquam: quare oportet, ut sor-

beant de ea qualibet hora paulatim, paulatim for-
tiones plurimas: & proprie in eo cuius linguam
uides siccam. Et cura accidentia eius superflua
cum eis, quæ diximus in capitulis suis. Et oportet
ut caueatur in eis superfluitas sanguinis, uarium,
est enim de eis in quibus magnificatur timor apud
eos. Et oportet ut obseruetur anhelitus eorum: &
non dimittas partes pectoris spasari. Eropo-
tet ut obserues capita eorum cum aceto, & oleo
rosaceo, & sandalis, & aqua rosacea, & campho-
ra, & his similibus. Et embroces cum decoctio-
nibus in quibus decocta sunt ea, quæ diximus. Et
quando fortes fuerint eis uigiliæ, tunc cura eos.
Et non est malum, ut in potu des syrupum de pa-
pauere etiam, & si sit de nigro, in huiusmodi dis-
positione. Et in fine eius da in potu trochiscos,
qui conueniunt eis, sicut sunt trochisci de campho-
ra. Et in illa hora conuenit eis syrupus acetosus
cum emulsione seminis cucumeris, & seminis en-
diuiæ, & seminis portulacæ, de unoquoque eorum
sit pondus, drach. 2. Et syrupi acetosi sit pondus,
drach. 2. usque ad 3. secundum quod uidetur.
Et si fuerit illis uentris solutio, tunc dentur trochi-
sci de spodio contraictiui. Trochisci boni. Recip.
spodij, ros. aua drach. 2. f. croci sextam, drach. 1.
seminis portulacæ, seminis endiuiæ ana drach. 3.
seminis cucurbitæ, seminis cucumeris ana drach. 2.
sandalorum, drach. 1. f. succi liquiritiæ, amyli ana
drach. 1. camphoræ sextæ, drach. 1. f. & dosis eius
sit drach. 1. Et iterum ros. drach. 4. sem. melonis,
alchazar & alcheta, & portulacæ omnium ana drach.
2. croci tertiam, drach. 1. camphoræ sextam, drach.
1. gummi, amyli, dragaganthi, succi liquiritiæ ana
drach. 2. dosis eius, drach. 2. Et cum declinat ægri-
tudo manifeste, tunc non est malum uti balneo,
cuius aqua declinat ad frigus. Et illi qui quibus ma-
gis diligitur balneum ex eis, sunt quorum febris
est ex phlegmate falso.

De febre sanguinis. Cap. 43.

Opinatus est Gal. quod non sit febris sang. 2
putredine sanguinis. Nam sanguis cum
putrescit, fit cholera, & non est sanguis: fit
ergo tunc febris cholerica, non sanguinea: & fit
causon prædictus aut tertiana: & cura eam cum
illa cura. Hic uero sermo eius est contrarius ser-
moni Hipp. & contrarius ei quod est conueniens:
& plurimum quidem erroris eius est in sermone
eius: quando putrescit sanguis, fit cholera: iste e-
nim sermo facit opinari duas intentiones, quarum
una est: quod quando putrescit, peruenit ad
hoc, ut fiat post putredinem cholera: sicut dicitur,
lignum quando inflammatur, efficitur cinis, & se-
cunda, quod quando putrescit, fit in dispositione
qua ipse putrescit cholera: sicut dicitur, quod li-
gnum quando calefit, fit cinis. Consideremus
itaque in unaquaque duarum propositionum.

Intellectus vero primus est corruptæ acceptionis tribus modis, quorum primus est, quod sanguis quando putrebit conuertitur subtile eius ad choleram malam, & spiritum eius ad melancholiam: non ergo cum totalitate sua fit cholera. Et secundus est, quod illud si post putredinem: & nostra consideratio est in dispositione putredinis, & tertius est, quoniam post illud fit cholera, & non sciunt, an in ea sit putredo, an non: nam plurimæ res purebunt, & separatur ex eis subtile, & spiritum: & non est in spisso, neque in subtile putredo: quoniam non est necessarium ut sit putridum id, quod generatur à putrido: fit enim ex putredine, quod non est putridum. Et si generatio eius à putredine faceret putredinem eius necessariam, oporteret ut esset spiritum cinerulentum iterum putridum: esset ergo illic febris melancholica iterum: hoc ergo est illud, quod facit esse necessarium expositionis eius, quod primo intellectum est. Quod vero intelligitur secundo, est mendacium purum, quoniam putredo est via corruptionis: & putredo quidem habet tempus. Et conuersio sanguinis in choleram non fit in tempore. Immo putredo quidem est corruptio accedens sanguini dum est sanguis: sicut accedit phlegma, dum est phlegma: & non fit cholera, neque melancholia, nisi conuertatur post illud cum complemento putredinis. Verum veritas sana est sermo Hip. quod ex sanguinis putredine generatur febris. Dicamus ergo nunc quod febris sanguinis est febris putredinis, & febris calefactionis, & ebullitionis, quam nominauit Hippo. synochum cœclum non alias. Et plurimum ebullitionis eius est ex oppilatione suffocante caliditatem. Et quandoque fit à causis alijs, quæ vehementes sunt supra vehementiam febri ephimeræ. Et quandoque nominantur inflammatiæ vel incensuræ fortes: & est de summa febriū, quæ sunt inter febres putredinis, & febres ephimeras: quæ differunt à febribus ephimeris, propterea quod calefactum primum in ea est humor: & differt à febribus putredinis, quoniam non est ei putredo: & est febris acuta, non febris ephimera, neque febris hectica, neque febris putredinis. Et multoties quidem permutat ad febrem putredinis, aut febrem hecticam. Et multoties quidem facit eam curere Gal. cursu febrium diei. Et videtur Gal. quod febris sanguinis non componitur cum reliquis febribus, quoniam putredo in sanguine est communis omni humori: & in hoc est contra dictio quibusdam intentionibus suis, in quo non est necesse prolongare sermonem, quoniam non iuuatur cum eo medicus. Et causa quidem huius febri est repletio, & oppilatio, & plurimum eius est exercitio proprie non consuetos & dimissio euacuationis, deinde usus exercitij laboriosus. Et quandoque facit putredinem in eo multa aquositas sanguinis ex commestione fructuum aquosorum, quare conuertitur ad putredinem: & multitudo humoris cru-

di in eo est propinqua, quare præparat ipsum ad putredinem: sicut qui generatur ex alcheta, & alxethed, & piris & similibus. Et hæc quidem febris est continua, quæ non tepescit propter continuitatem materiei, & eius adherentiam vsque ad crism, aut mortem: & eius species sunt tres, quarum saluior est paracrafticus incipiens cum difficultate. deinde non cessat diminui, quoniam resolutio in eo est maior quam putrefactio. Deinde est homotenus: & fortasse similatur septē diebus. Et ne quior eorum est acrafticus, quoniam resolutio in eo est minor quam putrefactio, & eius crisis est vsque ad septimum secundum plurimum. Et eius consumptio est enim euacuatione, aut sensata, aut insensata. Et quandoque permutat ad causonidē, & ad sirsē: & quandoque permutat cum infrigidatione plurima ad lethargiam, & quæque permutat ad variolas, & morbilli: & quandoque accidit in ea ventositas, & inflatio ventris, ex qua prouenit sicut vox tympani, & non deponit eam ventris solutio cum iniquitudine. Et quando solutio ventris non valet, deinde egreditur alia viridis laza proprie est de signis mortis.

Signa.

Cap. 44.

Signa febri sanguinæ sunt adhærentia febris: & rubedo faciei, & oculorum. Et inflatio renarum, & temporum. Et repletio completa absque rigore. Et non est sudor nisi apud crism. Et multoties associatur ei pruritus in naso, & in loco ventosato, vel ubi iam posuere fuerint ventosæ: & constructio in anhelitu: & multoties accidit eis profunditas somni, & difficultas sermonis, & est malū: & similiter apostema gutturis, & duarum amygdalarum, & vix: & cursus lachrymarum. Et caliditas eius est plurima humida vaporosa similis caliditati balnei non sicca, sicut in causonide: & pulsus eius est magnus, lenis, fortis, plenus, velox, frequens valde, diuersus, non plurimæ diuersitatis, & est minoris diuersitatis, & velocitatis quam in causonide, & in tertiana. Et non est caliditas eius in termino causonidis, & tertianæ fortis. Et illius quæ ex ea est à putredine, & caliditas, & accedens sunt vehementiora, & cura eius est difficultior, & magis similis cum causonide. At verò subtilitas sang. & grossitudo cognoscuntur propter illud quod egreditur de eo. Et synocha febrilis est res magis similis in principio sui febri ephimeræ: verum caliditas eius est paræ mordicationis, & læsionis: & inuenit ex ea inflammationem, & dyspnœam, & est plurimū impressio eius prope cor. Putrida vero est æqualis, & similis æquali secundum plurimum. Signa autem permutationis eius sunt cuiusque eorum ad quod permutat: & pfocationis, & apostematū gutturis, & duarum amygdalarum: & tu iam sciisti ea. Et signa variolarum scitis: & signa sirsē, & doloris capiti-

tis, & permissiois mentis, & aliorum iam sciuit. Signa vero longitudo eius, sicut iam sciuit, sunt ex postpositione signorum digestionis, & tñatilitate faciei, & diuersitate dispositionis eius in spatium ex additione, & statione, & diminutione, ita ut sit quasi ipsa sit tepida. Illud enim significat, quod sanguis est plenus humore crudo. Spatium vero crisis eius significant apparitionem signorum digestionis: quæ si iardatur vltique post tertium, & quartum, non fit crisis in septimo. Et multoties quidem fit crisis eius in quarto.

Cura febris sanguinis. Cap. 45.

Intentio in curatione febris sanguinis est euacuatio plurima vsq; ad syncopiam. Et ingrossatio substantiæ sanguinis, si fuerit subtilis valde aquosus, aut cholericus. Et infrigidatio eius, & mundificatio, & subtilitatio ipsius si fuerit grossus & iam sumperit æger prius generatiua sanguinis grossi, & generatiua humoris crudi. Et digestio materiei facientis febrem, & eius resolutio. Euacuatio autem non est aliqua sicut phlebotomia ex manu, in quacunque hora accidat: & non expectatur crisis, neq; digestio, nisi sit repletio nauseata: tunc enim caue eam, & remoue ipsam. Quod si febris perseverauerit, tunc phlebotomia: & non cesses phlebotomare, donec æger appropinquat syncopiam, aut cadat in syncopiam, si corpus fuerit forte. Syncopis namque infrigidat complexionem fortissimam. Et scias quod phlebotomia, & sumere in potu aquam frigidam quandoque excusant à regimine alio. Et partitio quidem in ea est melior si non fuerit quod necessariam faciat festinationem: nam fortasse erit in ea, quæ est infra appropinquationem syncopis, sufficientia vel vltima in curatione. Et fortasse sequetur phlebotomiam vltimam statim fluxus ventris cholericus, & sudor, quæ oportet omni hora abstinere ita quod absterio successe fiat vel absterio cõtinue succedat sudori, fortasse. n. saluabitur cum en. Et succurratur ei, qui accidit de debilitate, & syncopi cum cibo subtili, & quiete. Et oportet ut continetur lenificatio naturæ cum illis, quæ sciuntur de illis, quæ sunt sicut aqua dunrum granatorum. s. dulcis & murei vsq; ad terminum, & siraceni, & tamarindij, & collyria leuia de quibus diximus. Et quandoq; est necessarium apud digestionem euacuare cum eis, quæ sunt sicut myrabol. & sumus terræ, & cassia fistula, & his similia de illis, quæ sciuit. Quod si dispositio non tolerat phlebotomiam in manu, phlebotometur vena, quæ est inter duo cornua frontis, aut ponatur vntofz. Si autem non præparatur aliquid enrum, & hinc propter accidens quod prohibet, tunc fac solutionem ventris secundum modum, qui est in caustione. Et infrigidatio sicum eis, quæ aperiant, & incidunt, & sedant ebullitionem. Et si acciderit ex phlebotomia syn-

copis, ciba cum pane, & aqua acresca. Quod si accidat fluxus sanguinis per se, non abscondatur nisi cum appropinquauerit syncopis. Sanguinis vero ingrossatio fiat cum eis, quæ sunt sicut rubi iubarum: & est, ut decoquantur. c. iubarum curi lib. v. aquæ, donec remaneat tertia, & inspissetur cum zaccaro: & quanto plus minoratur zaccaro, tanto est melius. Et leues iterum proprie præparatz cum aceto forti sunt huius generis. Et caue ne des in potu rubi iubarum, aut corpus lentum, materia existente grossa. Eius vero infrigidatio fit cum eis, quæ sunt sicut aqua lentum infrigidata: & aqua lactucæ infrigidata: & sumere in potu aquam frigidam, si non fuerit quod prohibeat: & fortasse sumitur in potu donec tremere faciat, & infrigidet vehementer, forsitan eum sanat eum. Et quandoque permittatur febris ad phlegmaticam, & curatur cum trochiscis de rosas. & similibus. Et hæc quidem cura est quorundam antiquorum: & secuti sunt eam quidam modernorum. Dare autem in potu aquam hordei, est curatio conserens ei, sed cum lenitate naturæ. Et melior horarum ad hoc, est hora vehementis ebullitionis, & angustiz, & inflammationis, & frequentiz casachan. Et scias quod esse enantemum infrigidatione, & dimittere phlebotomiam, & ventris solutionem, addit in oppilatione, & enantiatione: quare additur putredo & caliditas in secunda dispositione. Mundificatio autem fiat secundum diuersitatem exigitis virtutis, & debilitatis, cum digerentibus humorem crudum, quoniam fortasse ipse est causa in putrefactione sanguinis. Et in fine eius da ei in potu, quæ sunt sicut trochisci de camphora, & trochisci de spodio. Et isti etiam trochisci sunt boni. Recip. spodij drach. 3. seminis portulacæ drach. 5. feminis cucumeris drach. 4. feminis cucurbitæ drach. 6. gummi, & dragaganthi, & amyli omnium ana drach. 3. succi liquorizæ pondus drach. 7. fiant ex eis trochisci. Descriptio alia, & proprie apud debilitatem hepatis. Recip. rosarum drach. 3. succi berberis drach. 2. feminis cucumeris, & melonis, & alchetha. i. cucumeris angularis, & portulacæ, & spodij omnium ana pondus drach. 1. gummi, & dragaganthi, & amyli omnium ana drach. 5. raucedeni, & croci, & camphoræ omnium ana pondus quartæ drach. 1. fiant trochisci. Cibi vero sint illi qui sunt ex iuibis, & illi qui sunt ex lentibus cum aceto, & granatis, & sumach. Et si sit aliquid eorum restrictio cuius timeatur, frangatur cum siraco, & prunis, & cum cibo qui sit de cucurbita, & cum cibo qui sit ex succo limonium vel ex acenitate citri vel aranciorum. Et eius fructus sint pira de sceni, & granata, & mala de sceni. Et eius olera sint alchetha. i. cucumer angularis, & cucurbitæ, & alchethed, & endia, & portulaca, & herba dicta acetosa, & coriandrum, & quæ sunt eis similia. Et si accidat dolor capitis, aut pulsus cordis, aut vigiliz, aut pro-

funditas

funditas somni, aut fluxus sanguinis eorum superfluous, destruens virtutem, & alia de accidentibus difficilibus: cura cum eis, quæ docuimus te in loco suo.

De febre phlegmatica. Cap. 46.

SCinisti quod febris putredinis phlegmatis quandoque est paroxysmalis: & quandoque est inseparabilis & sciuisti causam in hoc. Et sunt ei horæ sicut reliquis febribus, & minor horarum sui principij secundum plurimum est: 8. dierum: & eius eradicatio in pluribus est inter 40. & 60. dies. Et saluor eorum est illa, quæ est mundorum temporum, & præcipue illa, quæ est multi sudoris: significat enim subtilitatem materiei, & paucitatem eius, & raritatem corporis. Longior ergo partium hominis aggritudine est augmentum: quamvis eius declinatio iterum sit longior declinatione tertianæ plurimum. Et phlegma quidē putridum quandoque est vitreum: & quandoque est acerosum: & quidōque est dulce: & quandoque est salsum: & tu iam sciisti quomodo ex falso sit causon. Et plurimum quidem accidit febris phlegmatica humidis: & ociose iuuenibus, & senibus, & infantibus, & patientibus nanctatiuam satietatem, & exercitantibus, & balneantibus se super repletionem, & habentibus eructationem acetosam, & habentibus repletionem, & patientibus, & defensionem cathartici ad stomachum, qui putrescit in eo. Et parum quidē euacuat in læsione in ore stomachi. Et scias quod cum omni febre cum qua est frigus, constringitur pulsus, & minoratur.

Signa phlegmatica periodica. Cap. 47

IN illa quidem in qua causa est phlegma vitreum, aut acetosum, frigus multiplicatur valde. Et rigor in vitreo est vehementior. At frigus non incipit in ea subito, immo paulatim in extremitatibus: deinde perueniunt ad hoc ut fiant sicut nix, quæ non calefiunt nisi cum difficultate, neque calefunt subito, neque secundum gradationem coniuniam: immo paulatim cum reditu frigoris, & fortasse commiscetur frigori eius in principio horripilatio. Fit ergo frigus propter illud, quod non putruit: & horripilatio propter illud quod iam putruit. Et maior frigus eius, & ipsius rigor, sunt in periodis status. Et hæc quidem febris non est ex materia, quæ faciat punctionem, ita ut sit causa rigoris secundum viam expulsiōis, putredo namque eius est putredo rei lenis: Et incipit cum grauitate, & profunditate somni. Et multoties incipit in paroxysmis primis sine frigore, & sine rigore, immo postponitur usque ad tempus: & fortasse erit frigus, & non erit rigor. Et multoties incipit cum syncope, & quandoque non fit. Et in hac quidem aggritudine multiplicatur syncope propter debi-

litem oris stomachi, & casum appetitus, & priuationem alisimbæ: quæ est preparans materiā nutrimenti, & virtutis. Illam vero, quæ est ex phlegmate falso, antecedit horripilatio, & non fit vehemens frigus eius. Illam autem quæ est ex phlegmate dolci raro antecedit in principio usque ad plurimos paroxysmos horripilatio, neque frigus, neque rigor. Et plurimæ quidem periodi febribus phlegmatis incipiunt cum syncope: Et iam apparet in ea in principijs calor vehementior, & in postremis minoratur illud. Et videtur ut sit causa in hoc, quoniam putredo antecedit prius ad magis dulce, & magis salsum, & magis subtile, deinde ad grossius & frigidius. Et tactus caliditatis eius in primis est debilis, & vaporosus, deinde cum prolongatur positio manus super membrum, secutit manus acuitatem & mordicationem. Veruntamen non est similis, neque æqualis in omnibus quæ quæ cadit manus: immo est diuersa: quoniam inuenit in loco vno adustionem, & in loco alio lenitatem: & est quasi caliditas coletur post rem eribellatam: quoniam phlegma viscosum est, quare diuersificatur eius passio & eius subtilitatio à caliditate: sicut accidit in reliquis viscosis cum ebulliant: ipsa enim disrumpuntur seu vesicantur in quibusdam locis, & non disrumpuntur seu non vesicantur in locis alijs. Et qualiscunque si caliditas eius secundum plurimum minor est, quam ut inflammer, & angustiam faciat, & magnificet desiderium aeris frigidi, & aquæ frigide, neque huiusmodi caliditas declinat ad discoperturam & inquietudinem, & magnificationem anhelitus, & exufflationem. Et multoties quidem accidit caliditati eius ut stet ad quantitatem horæ unius aut duarum horarum, quæ existimatur quod ipsa iam peruenit ad statum, cum ipsa adhuc sit in augmento, videbis enim eam iam incipere augmentari: & similiter sunt ei in declinatione stationes. Et febres quidem phlegmatis sunt multæ humorositas vel roritas in cute propter multitudinem humiditatis, & naporis sui, pauci sudoris propter viscositatem humoris. Et cum sudare facit, est res non exuberans. Et de prioribus significationibus eius, est paucitas sudoris, et priuatio eius. Et sitis quidē minoratur in febribus phlegmatis, nisi propter causam falsæ dēis, aut causam vehementiæ putredinis eius: et cum hoc est minor, quam sitis quæ est in alijs. Et inflatio laterum multiplicatur in eis. Et quandoque accidit cuti lateris, ut subelleatur cum tensione. Color autem patietium phlegmatis febrem, est dealuius ad uiriditatem, et citrinitatem, currentes in albedinem: ita ut sit illud quod aggregatum est, sicut color plumbei ita ut in statu etiam. Et raro quidem rubet color in eo cuius rubedo sit rubedo in statibus reliquarum febrium. Pulsus vero eius est pulsus parvus, submersus, debilis, rarus in primis, deinde fit frequens in fine. Et frequētia quidem eius et eius paruitas, vehementior,

tior est quam frequentia quartaor, & tertia: & eius paruitas, & vehementia frequentie eius est, propter vehementia paruitatis ipsius: verum ob est velocior pulsu quartana: & quandoque est tardior eo: aut similis ei in primis, & est vehementis diuersitatis, cum priuatione ordinis. Et parui, & debiles ex eis, sunt in diuersitate eius plus. Ex sigificatione quidem pulsus super eam sunt de certioribus significationibus. Vriosa autem eius in primis quidem est alba, subtilis propter multitudinem oppilationum, & frigoris: deinde fit rubra propter putredinem, & conturbatur propter malitiam digestiois, & quandoque alteratur in ea dispositio hora post horam. Et quando remanet ex materia grossa, & resoluitur putrida, & redierint oppilationes de albabus vriosa, deinde quando putrefit res plurima post illud & expellitur, & aperuntur oppilationes, rubet vsque quo redeat ad oppilationes, quod oppilet eas vice alia de illo eodem homore. Eius vero egestio est lenis, subtilis, phlegmatica. Et de eis, quae significant quod febris est phlegmatica, est vi in paroxysmus eius i. 8. horis, & dimissio eius. 6. horis: & non est dimissio eius, dimissio munda, quoniam materia eius grossitudine, & viscositate est multa. Et significat ipsam aetatem, & consuetudinem, & tempus, & tegio, & cibi, & adueniens causarum antecedeantium ex saetate nauseantia: & significant ipsam forma praedicta ex colore faciei, & isolatione eius, & lenitate tactus: & debilitas oris stomachi, & casus appetitus. Et quandoque magnificatur in ea splen, & antecedit eam eructatio acetosa in pluribus horis multoties.

Signa phlegmatica inseparabilia, & est illa, quae nominatur laticia. Cap. 48.

Sicut reliqua signa febris phlegmaticae, praeter eradicationem, & quod simulat eradicationi. Et praeter inceptioem cum rigore, & frigore & horripilatione, & est res magis similis hecticae & est iste tepor in sex horis, & simile ei supra illum qui sit in coitione, quoniam periodica etiam uero euacuatur a tepore quia tamen est occultus non apparet. Febres, quae sunt secundum plurimum de genere phlegmaticarum, & sunt quandoque ex cholera: & non sunt ex eis, quae sunt ex melancholia appropriatae eorum nominibus, & iudiciis. Et sunt febres emplicas, & lipariae: quae ambae sunt de summa febrium in quibus diuersificantur loca caloris & frigoris totus & exterius, propter diuersitatem loci eius, quod putrefit, & quod non putrefit. Et ipse sunt tres diuisiones & sunt febris appropriatae nomine syncopalis humorosa, & febris syncopalis miorta, & febris diuturna, & nocturna.

Febris in qua occultatur frigus, & apparet in ea calor. & est emplica, & liparia. Cap. 49.

Hae febris in ea phlegmate vitreo, comprehenso in occulto, & profundo, quod infrigit

locum ubi est. Verum ipsi accedit iam putredo quare spargitur ex ea vapor eius quod putrefit & dispersitur & inflammatur exterioribus: & illud quod non est putrefactum infrigidat interioribus. Et eius quidem frigus non fuit apparet in huiusmodi tempore, quoniam fuit quietum coosuetum, & patitur ab eo id quod occurrit ei: cum ergo incipit eo putredo, mouetur, & spargitur sparsione quadam, quamuis non perueniat ad hoc, ut commoueat toti corpori. Signa. Signa eius sunt eadem, quae praedicta sunt. Et quod eius vrina est frigida, cruda, minoris caliditatis quam vrina aliarum sanguineis. Et pulsus eius est rarus, tardus. Et ipsa secundum plurimum addit omni die. Verum propter grossitudinem materiae suae conuertitur quoadque in quartana, & tertia, quoniam huiusmodi materia in corpore est pauca & parua putrefactiois accidit raro & paucitas eius est ex causis elongationis periodi, & hoc non extrahit eam ad hoc quin sit phlegmatica, sed ipsa est phlegmatica propterea quod putredo est putredo phlegmatis, non propterea quod paroxysmus redeat omni die. Spatium vero paroxysmi eius est a quatuor horis usque ad 24. horas & secundum plurimum consumitur ante illud: quoniam haec materia non est cum illa multitudine.

Febris in qua occultatur calor, & apparet in ea frigus. & est liparia, & lipuria. Cap. 50.

Hae febris secundum plurimum est phlegmatica, & quandoque est cholericum ex cholera grossa valde. Quomodo autem est phlegmatica est quoniam phlegma intrinsecum quoad inflammationem & putrefit, calefacit illum locum, & quoniam non resoluitur, non calefacit exteriora corporis cum sparsione vaporis sui calefactione plurima. Et quoniam virtus effunditur ad locum ubi est lesio, tunc euacuatur exteriora calore: quare infrigidantur proprie quando in exterioribus sunt phlegmata cruda vitrea frigida. Et iterum quoniam resoluitur multoties ex eo vapor, qui non putrefit, sed ascendit & separatur propter caliditatem, & associatur ei caliditas spatii paruo, deinde separatur ab eo separatione vaporis aquae calefactae. Cum ergo separatur ab eo, & fuit in radice ante putredinem uehementis frigiditatis, redit & infrigidat corpus. Modus autem quo fit cholericum est, quoniam cholera, quoad est pauca, & intrinseca, & putrefit, & calefacit locum, & non resoluitur ex ea aliquod, accedit quod diuisum in sua simili ex phlegmate. Et appropriatur haec cholericum nomina taburos. Verum liparia est nomen generis, & est longioris spatii quam hamitritus. Et habet aliquis ut dicat, quomodo erit febris & non procedet in ea caliditas ex corde in totum corpus illud naque quod cernitur, est de genere eius, in quo non procedit caliditas ex corde in totum

totum corpus. Responsio itaque est, quod in diffinitionibus harum rerum attenditur una cōditio, ut non sit quod prohibeat, sicut diffinimus aquam frigidam & humidam, quando dimissa fuerit secundum naturam suam, & non fuerit quod prohibeat: & diffinimus graue quod est illud, quod tendit inferius quando dimissum fuerit cum sua natura: & in istis omnibus caliditas peruenit ad cor, & procedit in arterias, & spargitur. At uero accidit prohibitio illius, in quibusdam locis, sicut accidit si ponatur pruina uel glacies super ipsum. Nocumentum uero eius necessarium est esse actū.

Febris in qua sit unaqueque duarum rerum, in uno quoque duorum locorum. Cap. 51.

SI hæc febris fuerit, non erit nisi ubi sunt duæ materiæ frigida mortua, propter putrefactionem quarum una est in interioribus, & altera in exterioribus, & non est aliqua earum plurimum sparsionis. Deinde cum incipiunt putrescere, mandatur unaquæque earum uaporem calidum comprehendentem cum partibus suis, & ubi est frigidum. Et tunc quidem iam feciuit causam in refrigeratione humoris frigidi in dispositione motus.

Febris syncopalis humorosa. Cap. 52.

Hæc secundum plurimum est propter phlegma crassum spiritum uel grossum separatum plurimum, quod iam uincit uirtutem. Et secundum plurimum adiunat maliciam bel nocumentum eius debilitas istos romachti. Et quando mouetur, & incipit in putrefactione uincit uirtutem plus; & facit eam hæsiantem: quæ si dimissa fuerit cum materia, non sufficiet contra materiam. Et quando occupatio fit in euacuatione eius cum facilitate, fit inobediens, cum mouetur motu præfocante uirtutem: Et quando occupatur in euacuatione eius cum solutione uentris, aut phlebotomia cum labore, non tolerat uirtutem: Quomodo enim tolerabit, cum sit illic cum sua quiete syncopis? Et cum hoc toto ipsi indigent euacuatione uoluntate. Et iterum ipsi indigent cibo uoluntate, quoniam in humoribus eorum non est quod nutriat corpus, & uiuificet ipsum: & corpus eius est priuatum nutrimento. Quod si studuerit in cibando, addatur in materia aggrauante: & si non cibatur, cadit uirtus. Et accidit in inceptione sui, ut effundatur ad cor res frigida faciens accidere syncopiam; & minoratur pulsus, & tardatur, & fit rarus. Amplius natura sollicita est in calefactione materiei, & sublimatione eius: & putredo, quæ mouetur in quasdam partes eius adiunat super eam: quare euadit cor a nocumento frigoris eius, & cadit in nocumentum caloris eius quæ

re sit pulsus uelox, & propterea in constrictione sua, plusquam sit uelocitas aliorum: quamuis illud quod uincit cum hoc, sit paucitas, & raritas. Et periodus eius est periodus phlegmaticæ, & non alteratur ab ea: & est cum ea inflatio faciei, & mollities corporis. Et colores habentur eam non figuntur super dispositionem unam propterea quod materia earum non figitur super unam dispositionem immo quandoque est cinerea; & plumbea eius materia, & quandoque fit citrina, & quandoque fit nigra: & quandoque sunt labia eorum sicut labia comedentis mora. Oculi uero eorum sunt fusci, uirides, excuntes ualde apud commotionem ægritudinis, & fit sicut squinantia. Et quod est sub hypocondrijs eorum, est uehementis inflationis, & similiter uiscera eorum. Et quandoque enomunt acetosum. Et quando est eius apostema in quibusdam uisceribus, tunc non speratur omnino. Et quandoque accidit eis in quibusdam horis ex cholera dominante grossa: & fit cum ea in uisceribus auctio, & euomunt choleram, & sunt ei periodi phlegmaticæ secundum plurimum.

Febris syncopalis minuta subtilis. Cap. 53.

Hæc febris est acuta, faciens cadere pulsus & uirtutem in paroxysmo uno aut duobus paroxysmis cum additione dissolutionis accidente in corpore cum uelocitate. Et quandoque non sufficit cum ea uirtus usque ad 4. & fit ex chymis subtilibus, quorum plurimi sunt cholericis uehementis subtilitatis, & profundationis, malæ substantiæ uenenosæ, cui iam accidit putrefactio in corporibus calide complexionis, sicce ualde, & plures paroxysmi huius febris sunt paroxysmi tertianiæ.

Febris diurna, & nocturna ex phlegmaticis. Cap. 54.

Durna est cuius paroxysmus accidit in die, & eius tepor in nocte. Et nocturna est e contrario, & utraq; sunt malæ: sed diurna est longior, & deterior. & facit cadere multoties propter longiudinem suam, & suum euentum in calore diei, in hæticam. Et si ipsa non esset sæua, non accideret hora apertionis pororum, & resolutionis uaporis: & non accidit nisi propter multitudinem materiei, & fortitudinem eius. Et est necessarium cum hoc, ut patientes eam cibentur in nocte, & non permittantur dormire super repletionem stomachi: & præcipiantur uigilare, & est ex eis, quæ faciunt cadere uirtutem. Et tolerantia febris in calore diei, & uigilia in frigore noctis, sunt ex eis magis dignæ quæ faciunt cadere in hæticam: & ad summum est de genere febrium difficilium.

CVra huius ægritudinis diuerſificatur ſecundum horas ſuas, ſcilicet principium, & augmentū, & ſtatū, & declinationē. Et ſecundū apparitionem digeſtionis in ea, & eius occultationem: Et diuerſificatur ſecundum materias ſuas. ſ. phlegmaticā acetoſā, & ſlegmaticā vitreā, & phlegmaticam falſam & dulcem. Et omnes eius ſpecies communicant in hora principii in tribus rebus in neceſſitate lenificationis æqualis, aut vomitus: Et in neceſſitate adminiſtrationis ſubtiliantium, & in cidentium, & diureticorum. Et cum ſuperuenerint febris dies tres, ſubtiliatur in ea materia propter ſebrem; & ſi ante illud mouebis, nocebis, & non facies aliquid. Et in præſeruatione ab aliquo nouamento cum ſubtiliatione regiminis declinante ad æqualitatem. Et forteſſe eſt cōtentus aqua hordei io primis tribus diebus, ſperando q̄ ſit ſtatus eius propinquior, propter ſubtiliationem materiei aut paucitatem eius. Quōd ſi certe ſciretur, q̄ ſtatus eius eſſet tardus, non ſubtiliaretur regimen quāuis famēs, & ſomnus ſuper famem, & exercitium ſuper famem, ſi non debilitant, ſint vltima in iuuamento huius ægritudinis, immo declinaretur in principio ad ingroſſationem uſque ad ſeptimum, deinde gradaretur uerum cura conueniens eget vt ſubtiliatur regimen io primis. Si autem ſtatus apparet longinquus, poſſibile eſt ut ſuccurratur illi cum ingroſſatione regiminis: deinde gradetur uſque ad horam ſtatū, quoniam tempus eſt ſufficiens hoc in hac ægritudine, non ſufficiens in acuta. Cumque petraſſerit ſeptimus, non ſtes tunc ſuper ſubtiliationem: quoniam illa debilitat, & addit in debilitate oris ſtomachi. Et quoties ſenſeris longitudinem maiorem, ſubtilia minus: quāuis ſubtiliatio eius io ipſa, omnino magis ſit neceſſaria quā in quartana. Et ſimiliter oportet ne ſtines cibare ipſum cum eis, quæ ſunt ſicut pulli, & panis cum meſaſurati niſi timeatur debilitas: aut appareat declinatio. Amplius diuerſificatur cauſa eius, cuius cauſa eſt phlegma falſum, & dulce: & cuius phlegma eſt vitreum, & acetoſum, & hæc eis febris quæ dicitur ſerumundus. i. alzenherie in qua corpus non caleſcit. Verumamen in duabus primis neceſſaria eſt lenificatio cum medicina leni, & infrigidatio quædam: Et in duabus ſecundis cum medicina magis laborioſa: Et in duabus primis indiget incitione cum ſubtiliatiuis, in quibus non eſt calefactio plurima, quāuis ſit eſiccatio plurima. Et in duabus ſecundis neceſſarium eſt illud quod ſubtilietur cum incitione, & calefactione cum acuitate, & proprie quando phlegma eſt permixtum cum melancholia. nam ocellaria ſunt in huiusmodi ea, quæ ſunt ſicut diacyminum, & conſectio de ſulphure, & adminiſtratio ſalſorum, & Et

conuenientiores medicinz quæ adminiſtrantur in principio, ſunt geleoiabin uſque ad diem ſeptimum. Et non eſt malum vt adminiſtretur iterum aqua ſerniculi, & aqua endiuiz, & aqua apij cum geleniabin ſecūdum neceſſitatem. Et ſyrupus acetosus eſt uehementis iuuamenti iterum. Et aqua mellis cum hyſſopo, & eſt poſſibile ut conſequatur per eam illud, quod queritur de lenificatione naturæ. Et proprie cum ſolutiuo factio de zuccaro & roſis rubeis nominatis perficiat: quoniam eſt ſolutiuum, & lenitiuum. Et quando neceſſarium eſt, ut conſortetur eius lenificatio, conſtrictetur in aqua iuble: & permisceatur ſi uoluerit cum caſia. & penidiis. Et iterum geleoiabio acceptum cum melle teremiabin permittit cum aqua iuble. Et non fiat aſſiduatio ſuper ea cum ſolutiuis in principio, & poſt ipſum, & proprie quando cum materia eſt cholera: illud enim perducit ad corruptioem complexionis. Et multi quidē homines dant in potu in principio, ſicut eſt medicina de turbit in omni nocte, & ſicut pilulæ de maſtice in hebdomada bis, & ſicut pilulæ de ſeminibus diureticis. Deſcriptio medicinz de turbit. Recip. zinziberis, & maſtice amborum ana drach. 1. turbit, ſicut alcohol. drac. 10. zuccari tabarzet quantum omnia: & detur in potu ei omni nocte aure. 1. & illud fiat quando natura eſt nō lenis. Si enim obedit omni die bis, non indiget hoc. Ego uero non diligentiſſe expectationem digeſtionis, & lenificationem cum eis, quæ diſimus prius: immo oportet ut euacuetures ea aliquid, & expectetur in reliqua uſque quo digeratur: & fiat illud cum ſacilitate paulatim, abſque ſuperfluatitate, deinde perueniat ad diuretica. Et ſimiliter abhorreo quod eſt ſimile aquæ prunorum, & tamarindorum, & ſimilium de illis, quæ debilitant ſtomachum, & ſoluunt ſubtile. Et ſi materia fuerit decliuis ad additioem frigoris, miſceatur cum ea medulla cartami. Et ſi fuerit materia ad cholera decliuis, miſceatur cum eo ſyrupus uioli. aut uiolæ conditæ, & ſiracoſis, aut uiolæ ſecæ contritæ. Et adiuues cum clyſteribus leuibus, factis ex melle, & ſale, & aqua ſicclæ, & oleo liſſamino. Et uomitus fiat cum aquis raphani, & raphano ioſoſo in ſyrupo acetolo cum ſeminibus, & his ſimilibus, Et ſi neceſſarius eſt uomitus plurimus propter multitudinem eius quod accidit ei donauſca, & alteratione ſaporis oris, adminiſtrentur graua raphani, & bibatur ex eis uſque ad aure. 1. cum aqua frigida. Et uomitus quidem cum eo quod eſt in eo de debilitate ſtomachi, eſt uehementis iuuamenti ualde, & eſt ultimus huius ægritudinis. Oportet ergo ut expectetur in eo ſeptimus, ut nouo accidat ex eo in principio debilitas apoſtemans corpus ſtomachi. Et ſi ſit difficilis in eo uomitus, non prouocet ipſum ſuper ipſum cum labore. Et ſi accidit uomitus, & proprie in principio periodi, nō retineatur niſi ſuperfluat, & debili-

ter, tunc enim restringatur sicut cum mīa, & syrupo de menta, quæ dicemus post. Et si accidat dolor capitis, & administrentur embrocæ ex chamæmilla cum immisione quatuor extremorum in aqua calida, & ligatione crurium cum fortitudine. Et si indigetur aqua hordei, administretur de cocta cum radicibus quantitate moderata ut misceatur cum ea syrupus acetosus de melle, si non acetat in stomacho: aut aqua mellis, si acetat. Et melior hora in qua datur in potu illud, est, si fuerit in aqua eius in principio rei tinctura. tūc enim oportet ut in potu detur in primis de geleniabin, deinde detur in potu post ipsum duabus horis aqua hordei. Et non oportet ut fiat inunctio cum vnguentis resolutiuis: & neque embrocatio fiat cum embrocia subtiliariis: cum ægritudo est in principio: & humor est in corpore ambulans: ipsa enim mollescat ulcera sua calefactione humida. Et alienetur aqua frigida. Et quoties uideris urinam grossiorem, & rubicundiorē, non erit malum si phlebotomia fuerit. Et necessarium quidem est, ut redeat tunc ad syropus acetosus. Et scias quod fricatio est de curationibus iuuantibus eorum: quanto fuerit phlegma viscosius, & grossius, tanto erit fricatio magis conferenda. Et dicitur quod fricatio cum tela atancæ cum oleo est iuuatio ualde. Et quando incipit ægritudo augmentari, & post illud, tunc sit tibi sollicitudo plus de ore stomachi, & quod ipsum confortat. Et sint masticationes factæ ex menta, & mastice, & aniso: Et administrentur vomitus cum raphano, secundum quod diximus cum minoratioe cibi. Et sit cum geleniabin quod in potu datur in principio. Et post septimum permittitur quod confortet os stomachi: Et si in eo prouocatio pluitima, sicut anisum, & mastix. Et sit cum aqua calida, & propter principio perindidnam ipsum resistit rigori & frigori, & extinguit cum hoc situm, si excitata fuerit. Et multoties quidem conceditur euacuatio phlegmatia, & humoris crudi in hac hora, sed melius est ut expectetur in ea complementum digestionis. Et quando ægritudo incipit cum calore, & assiduatur, iuuatur cum huiusmodi trochiscis. Recip. myrobolanorum citrinorum, aloes, succi eupatorii, succi abstinii, omnium ana drach. 5. croci, & mastices, amborum ana drach. 6. infirmantur trochisci, & sumatur ex eis omni die pondus drach. 4. & omni nocte pondus drach. 5. Et cum uideris quod digestio appareat, adiua eam cum eis, quæ sunt sicut folia apij, & feniculi, & radices squinæ, & capillus ueneris. Si autem scias quod materia est frigida ualde, non est malum uti pipere pauco, & uti uino, pauco, subtili non plurimo. Et quandoque adiuuant vnguenta resoluentia ad digestionem, & resolutionem cum uirtute fortis: & sunt conuenientiora in hac ægritudine, quam in reliquis febribus. Et oportet ut consideretur in hoc ægritudine, & febribus, & rigori. Quod si uirtus fuerit for-

tis, & febris non fuerit sæua ualde, adde in uirtute vnguentorum, & si non, administrentur olea subtilia, quæ ad æqualitatem sunt declinua. Et quando pertransit. 14. tunc necessarium est administralia, quod subtiliat plus: sicut feniculum, & apium: & fortasse indigemus feminæ amborum, & aniso, & eo quod est sicut syrupus acetosus cum semini-bus, in quo ponuntur hyssopus, & althæci: & administralia trochiscorum de rois: & fortasse est necessarium addere in eis propter stomachum, tus, & mastice, & cyperum, & abstinthium, & his similia secundum quod exigit illud quod præfata est. Et uindem subtile confers eis in hac hora cum subtiliatione sua: & quia confortat calorem in uentrem, & quia prouocat, & sudare facit. Et cum uideris digestionem, & fortitudinem, dabis ei in potu post illud trochiscos de abstinthio. Et cum uideris frigida in principio paroxysmorum nocere, & ægritudo non est in principio, da io potu aqua calidam in qua decocta sunt ea, quæ sunt sicut semen apij, & anisum, & ozimum: & administralia iterum huiusmodi, & fortiora eis embrocando, & vaporando, & huiusmodi. Et quandoque datur in potu ad rigorem uehementem decoctio, secundu hunc modum. Recip. zinziberis, organii, ameos, omnium ana drach. 3. coriandri, drach. 4. rosarum, calameothi amborum ana drach. 3. passulorum drach. 7. decoquantur secundum descriptionem, & sit dosi voc. 3. Et cum uideris digestionem completam, tunc fiat enacuatio & prouocatio cum eo in quo est fortitudo, & detur in potu sicut de bidchenbiza. Et si fuerit materia ex frigidiore phlegmate, dabis in potu theriacam: & dentur iterum in potu trochisci de rois magni cum aqua feniculi: & detur ei omni nocte medicina de turbit: & plulæ de aloë factæ cum speciebus uel aromaribus. Et ad illud est decoctio huiusmodi. Recip. hieræ, drach. 7. turbit, drach. 10. myrobolanorum nigrorum, drach. 5. eupatorii, drach. 5. salis indi, dra. 2. bedecard, suchaha omniom ana, dra. 4. anisi dra. 3. decoquantur cum aqua apij, & sumatur de ea in potu secundum quantitatem necessitatis. Et fortu ualeat illud quod Recip. duarum radicum, & radices liquiritiæ omniom ana drach. 10. hieræ, drach. 8. succi eupatorii, dra. 5. femini apij, & feniculi omniom ana drach. 4. spicæ, mentæ amborum ana drach. 7. fiant ex eis trochisci, & administrentur. Decoctio bona. Recip. duarum radicum ambarum ana drach. 10. passulorum enucleatarum, dra. 7. anisi, & mastices amborum ana drach. 3. bedecard, & suchaha, & eupatorii omniom ana drach. 4. decoquantur in libris tribus aquæ usquequo redeat ad libram unam aquæ, & sumatur in potu aliquot diebus in ieiunio. Trochisci huiusmodi apud chronicas febres, & uehementiam rigoris. Recip. hieræ, succi eupatorii, abstinii, suchaha, bedecard omniom ana, drach. 5. seminis apij, & feniculi, anisi omniom

ana drac. 3. sal natri drach. 4. seminis cuscute myrobalanorum & cebulorum omnium ana drac. 10. agarici drac. 15. trochiscorum de rosas drach. 30. turbid drac. 30. fiant ex eis trochisci: & sunt solutivi. Et iterum aloes, myrobalanorum citrinorum & reubar. masticis, succi eupatorii, absinthii omnium ana partem 1. croci partis unius medietatem, terantur, & administrentur. Et iterum hierem, myrob. cebulorum, salis omnium ana drach. 4. seminis apii, & feniculi, & anisi omnium ana drach. 15. absinthii drach. 5. trochiscorum de rosas drach. 3. fuchaha, bedeoard omnium ana drac. 2. terantur, & informetur pilulæ. Decoctio bona. Recip. eupatorii drach. 5. & radices lilii, & radices liquiritiæ, & ameos omnium ana drac. 3. seminis apii, feniculi ana drac. 4. rosarum drac. 5. decoquantur omnia, & sit dosis eius omni die, drac. 3. Et iterum radicem triu omnium ana drach. 10. seminis anisi, apii omnium ana drac. 2. fuchaha bedeoard, eupatorii, absinthii omnium ana drac. 5. centaureæ drac. 3. decoquantur, & bibatur unc. 4. Et iterum herbe eupatorii, fumiterræ, bedeoard, fuchaha, absinthii omnium ana drach. 5. passularum drac. 2. myrobalanorum citrinorum drac. 10. Et hæc quidem cura est falso, & ei in quo uincit cholera magis conveniens. Et agaricum cum de eo sumitur in pulvere ex drac. 1. & 1/2 que ad drac. 1. & tertiam, diebus continuis prohibet elongari ægritudinem. Sumatur ergo pulvis ex eo, & cum miscetur cum melle, & bibatur. Et semen vitæ post digestionem est mirabile valde, sumptum in modum suffus, aut cum melle. Verum si voluerit pilulas solutivas, oportebit ut addat in eia propter debilitatem hepatis reubarbarum & semen cuscute: & propter debilitatem stomachi masticis, & anisum: & propter debilitatem splenis, & grossitudinem eius radice capparis, & scolopendri: nam multoties associatur huic ægritudini splen: & fortasse oportet, ut addantur propter ipsum ciperi, & grana de ben, & senugrecum: & consideretur cum hoc dispositio vehementiæ febris, ut non accidat vehementia calefactionis. De enacuationibus vero quæ sunt fortiora, & indiget eis in hac ægritudine apud digestionem, est ut augmentetur dosis de pilulis de turbie: & administrentur eysteria fortia. Eadem illis sunt pilule istæ. Recip. masticis sextam drac. 1. succi absinthii quartam drac. 1. pulpæ coloquintidæ sextam drac. 1. hieræ picræ drac. 3. agarici drac. 5. informetur pilulæ cum syrupo acetoso mellino, & sumantur in potu. Et de illis sunt pilule de masticæ, & de aloë. Quid si materia fuerit ad caliditatem declivis, sumantur de trochiscis de spodio solutivi tres trochisci & de turbid aure. 1. scamoneæ aure. 5. succi eupatorii aure. 2. & dentur in potu secundum quantitatem uirtutis. Et iterum eupatorii, absinthii, capilli veneris, & myrob. fumiterræ, passularum mundatarum & myrob. sumantur partes & dentur

in potu secundum quantitatem necessitatis. Et si non sufficit corpus solutionem ventris, perueniatur ad diuretica, & seduliatina, & sudare facientia. Et de summa illorum quibus indiget tunc est infusio aloes cum melle. Et quando declinat ægritudo, non est tunc introitus balnei ante cibum malus. Cibi autem eorum sint subiles, sicut acetum & oleum: & quandoque ponitur in eis parum almuri, & proprie in fine eius. Illi autem qui sunt fortiores, sunt altheiugi & pulli & albugi, & his similia, et post declinationem. Et oportet ut ponantur in eis, & proprie apud digestionem ea in quibus est incisio, sicut acetum, & sinapis, & almuri. Et si fuerit phlegma acetosum, malum, viscosum, porrum, & aqua cicieris sunt de melioribus cibis eis cum ponuntur in eis cuminum, & anethum, & oleum. Et iterum buared facta ex sicca, & almuri, & aceto, & oleo abluto, et alchamach, sicut alchamach de capparis & chamach de anetho, & origano, & aniden, & asparagis. Et de uentibus olera in quibus est infusio gidiatio & humectatio. Et hora cibi est post teporem paroxysmi, & eradicationem eius, & ante paroxysmum ad minus quatuor horas. Mensura autem somni eorum est ut sit 3. qualis uigiliis ut sit digestio materiei ad somnum, & resolutio ad uigiliis. Et balneum quidem est uehementis nocuenti nisi post declinationem. Et succurritur uomitui eius quando superfluit: Et oportet ut administretur in illo quod sit sicut mius, & syrupus de granatis cum menta simul cognitus. Et si necessarium est fortius, sumatur de granis granatorum mazorum drac. 10. & rurs albi, & masticis amborum ana drac. 5. mentæ drac. 7. decoquantur in duabus libris aque, in quas sint donec ad medietatem perueniat. Et succurritur fluxui uentris eius, cum superfluit, cum retentione eius cum eis, quæ sciunt de stypticis regiminis cibalis, & medicinalis. Sed eis quidem debilitatiõni succurritur ut cibetur successione eius pulvis affatis, & in patellis coctis: & ut adhibeantur suffumigationes, & odores uiuicantes. Et si acciderit inflatio in facie, & extremitatibus, iouantur cum administrentur huiusmodi trochisci. Recip. anisi & lactæ ablutæ, amborum ana pondus drac. 5. amygdalarum excorticatarum, croci maræ totum omnium ana drac. 4. seminis apii, feniculi, feniculi, floris squinanthii uel summitatibus squinanti omnium ana drach. 3. succi eupatorii drac. 3. 5. picræ drac. 5. hieræ picræ drac. 7. rosarum drac. 10. fiant ex eis trochisci, & administrentur. Et fortasse indigebis eis, quæ sunt sicut homonisia, & dialacca, et medicamen de amygdaliis amaris. Et ad longuindinem febris cum rigore et frigore, Recip. rosarum pondus drac. 10. masticis, et spicæ, et feniculi, & seminis apii, & seminis endiuiz, et succi eupatorii, et succi absinthii omnium ana drac. 3. spodium drac. 5. fiant tro-

chisci

chisci: & sit dosis ex duabus drac. usque ad. v. cum drach. 10. de geleniabin in decoctionis feniculi quantitate. drach. 2. Et ameos confectum cum melle est magni iuamenti in huiusmodi loco. Et fortasse indiges propter longitudinem frigoris fricatione: & modus in ea est, ut incipiat ab humeris: & inguinibus quando spargitur caliditas in manibus & pedibus, & calcantur. Si autem senserit similitudinem lassitudinis, fiat permutatio ad fricationem dorsus: Et quando vehemens sit calefactio eius, non est malum tunc vt fiat fricatio cum oleo ita vt in membro vltimetur calefactio ei necessaria, & dimittatur ipsa uel permuteetur ipsa ad aliud membrum. Et de oleis bonis est oleum dulce, in quo non est stypticitas, & oleum chamæmillinū, & oleum de antheo decoctum in vase duplici. Cū ergo compleueris, tūc absterge cum oleo aliquo, vt non angustietur. Et non est malum si fricationem siccam sequatur fricatio cum oleo aliquo. Et de illis, quæ seruant stomachos eorum, ut non debilitentur, sunt vnguentu inuncta capiti stomachi, quæ sunt sicut chamæmillinum, & oleum nardinum, & oleum anchinū, & fortius illo est oleū alrazachi. Et de emplastris iuuatiuis est ut decoquantur chamæmilla cum re pauca mastice decoquendo cum vino cum duplo sui de melle. Et si ceciderit appetitus, tunc melius est ut non administretur vinum, immo almbachtegi in quo decocta sint sicut chamæmilla, & silybrium, & melilotum, & ablinthium.

2. contundantur & cribellentur, & malaxentur, et fiant trochisci.

Cura empias & hypariæ. 1. epiale, & hypiriæ. Cap. 57.

CVra eorum propinqua est curæ quam diximus, & sunt ambæ associatæ uniore: & oportet ut incipiat in primis a syrupo acetoso mellino, & zuccarino. Et præcipue in eis ambabus, vt administretur rob acre sitz decoctum cum melle, & syrupo ros. deinde fiat aggrauatio de ius sumendi in potu semina, & aquas eorum ad infusionem aloes, & trochiscos de ros cum mastice, & pilulas de aloes, & hieram pieram, & pilulas de eupatorio. Et oportet ut in eis ambabus simul stomachi sollicitudo habeatur, & administretur uomitiu cum aqua fæscolorum & raphani, & aneti, & calamenthi, & diuretica. Ex de solutionis iuuatiuis est illud, quod fit ex myrobalanis nigris, & citrinis, & turbit, & zucearo. Et de illis quæ conferunt eis iuuamentum magnū sunt clysteria decliua ad acuitatem, & in quibus ponitur medulla cartami, & centaurea minor, & anethum, & chamæmilla, & alhasceh, & melilotum, & almuri, & mel. Et regimen lipariæ indiget facilitate plusquam regimen alterius.

Cura febris syncopalis humorosa. Cap. 58.

Hæc febris est difficilis curæ. Et modus curatione eius est euacuatio gradata ex subijli ad fortem: & proprie quando natura non respondet ex se tunc enim cum clysteribus danda quod est in intestinis, & uenis propinquis eis, ex superfluitate: Et administra in residuo subtilitatem cum fricatione. Et Gal. quidem dixit quod deficiunt pluri eorum ab euacuatione nisi cum fricatione. Et melior modorum in fricatione eorum est, ut incipiat a coris, & cruribus, descendendo a superiori ad inferiori, & administretur illud cum mantili aspero, abradente eum, deinde per motetur ad manus, descendendo ab humero ad spatulam, ita ut igneat cutis: deinde ad dorsum & pectus. deinde regreat ad crura: & reuertatur ad ordinem primum. Et ponatur medietas temporis eorum fricationi, & medietas temporis eorum dormitioni, si possibile est. Et ad summum canon curationis eorum est subtilitatio, non calefactio ualde. Et de illis, quæ conferunt eis sunt subtiliantia, sicut aqua mellis cum uirtute hyssopi, & seminis apii in matutinis, & similibus eis. Quod si fuerit illic fluxus uentris superfluous, decoque aquam mellis decoctione uehementiore, & non soluet nisi parum, temperate cum iuuamento. Et syrupsu acetosus mellinus iterum confect eis, in ista.

Cura phlegmatica continua, quæ nominatur latuca. Cap. 59.

Est cura facientia paroxysmum omni diei & differt ab ea quoniam oportet vt in ista sit administratio subuliantium calidorum vel acutorum cum facilitate. Et quod contetetur eis, quæ sunt sicut syrupus acetosus, & geleniabin, & iuleb de melle, & aqua eius, & aqua feniculi, & apii, & radicumarium sine dubio confert. Et quandoque confert eis chamach de anetho, & chamach de capparibus & proprie cum uestigiis digestionis. Et præparetur cibi eorum in obseruatione temporum, & diuersitatis eius, & fortitudine uirtutis, & debilitatis regimine cuius rememoratio præterit. Et de medicinis bonis ad eos sunt trochisci de deco generibus. Et iterum de medicinis expertis ad eos est illa, quæ Recip. ros. drach. vi. succi liquiritiæ sumitæ, spicæ omnium ana. drach. 4. mastice, drach. 3. karabe. drach. 3. anisi, drach. 2. præparentur. Et iterum trochisci eupatorii. drach. 4. rosati drach. 1. & terciam, spodiū. drach. 2. & 5. Et iterum eupatorii. drach. 3. rosarum lib. 5. spodiū vnc. 4. spicæ lib. 5. Et iterum troc. ablinthii quorum descriptio. Recip. ablinthii assati, seminis apii, anisi, amygdalarum amararum, suchacha, bedecard, succi eupatorii, spicæ, mastice omnium ana drac.

te quidem & cum consuetudine potus aquæ frigida, permistus cum aqua frigida, & in hyeme oportet vt non sumat eam in potu penitus, & sit contentus aqua calida. Et assumere calidum ex potibus ē melius eis, nisi apud necessitatē gŕŕus ætatis & vehementiam calorŕi plurimi. Et conuenientius quo potantur ad sitim est syrupus acetosus mellinus. Et viuum aquosum confert eis in principio, & proprie si fuerint febres eorum fortes & raro sunt, & proprie in senibus. Et necessarium est eis vinum post cibum. Et tibi quidem necessarium est vt consideres pulsum habentium hanc ægritudinem semper, & cum videris eum incipere debilitari, & cadere, subito eiba cum pane infuso in vino commisto, & si non prohibet aŕa in uisceribus. Cū ergo associatur ei huiusmodi ægritudo, non est curationi modus, neque fiduciæ locus, scilicet quando accidit huiusmodi alteratio in pulsu: & hæc quidem cibatio est ex eis, quæ necessaria sunt, quando vehemens sit fyncopis, uerū oportet ut sequatur illam fricatio. Cibus autem super quem sit dormitus est aqua hordei super quam non addatur: uisum cadit virtus, & si additur, tunc sit panis infusus in iuleb, aut aqua mellis. Et balneum quidem est de rebus nocibioribus istis: Et calidum, & frigidum valde ære: cum calido enim non sit securitas de cursu humorum ad pulmonem, & ad cor, & ad cerebrum: & frigidum prohibet digestionem eius, & addit in oppositionem eius. Quod si fuerit in ea humor cholericus aliquis, tunc si facilis est uomitus, & leuis est iuuauis ualde: & ad vltimum dignus est, vt tuet in ea.

Cura febris cum fyncopi minuta. Cap. 59.

Oportet vt emplastretur pectus eius cum sandalis, & aqua rosæ, & viuificetur cum cibo paulatim. Et sit cibus eius, sicut panis de simila infusus in aqua granatorū infrigidata si desiderat ipsum, & similiter in aqua de fructibus. Si autem iudicetur ad uirtutem almonŕus factis ex pullis, cum aceto & aqua acreŕa, & oleribus frigidis, & proprie coriandro, erit iuuamentum in hoc si exhibeatur.

Regimen nocturna & diurna. Cap. 60.

Regimen earum ambarum est regimen phlegmaticarum, neque est diuersitas in eis.

De quartana periodica. Cap. 61.

Plurimum quartana est periodica: & minoratur casus quartanæ inseparabilis. Causæ uero quartanæ sunt ea, quæ generant melancholiam, postea quæ putrefaciunt eam: & tu iam sciisti totum illud. Et sciisti quod melancholia alia est, quæ est sanguinis, & alia quæ est adustio eius,

& cinis humorum. Et sciisti quod de illa est sanguinea, & de illa est phlegmatica, & de illa est cholericæ, & de illa est adustio ipsius melancholiz naturalis. Et existimauerunt quidam hominum, quod quartana non generatur ex melancholia naturali, quoniam ipsa non putrefcit. Et huius quidem sermo non oportet ut ausculetur: immo de proprietatibus omnis humiditatis est, vt putrefiat quamuis diuersificetur in preparatione. Et plurimum quidem euenit successione ægritudinum diuersarum, & successione febrium putridarum propter diuersitatem humorum ex quibus generantur, & ex eorum putrefactione. Quando enim incinerati fuerint & noue uacuantur, multiplicatur melancholia, deinde cum putrefcit, est quartana. Et multoties quidem accidit successione splenis: & cum hoc ipsa secundum plurimum non euacuat ex dolore splenis, aut duritie eius. Et saluior quartana est illa, quæ non accidit ab apate splenis, aut alii: aut cum qua non est apasplenia. Quartana enim quæ euenit ab apate splenis, aut cum qua est apasplenia, multoties perducit ad hydropsim, & perniciem. Et quartana quæ salua est, liberat ab ægritudinibus malis melancholiz, sicut melancholia, & epilepsia. Et in ea est securitas a spasmo, quoniam humor est siccus. Et secundum plurimum est ægritudo salua. Et quando non accidit in ea error, non addit supra annum & quandoque perdurat. 12. annis: & quod est infra eos. Et quæ ex ea longa est, perducit ad hydropsim. Et scias quod autumnus est inimicus quartanæ.

Signa. Cap. 62.

Sunt quæ quartana incipit in primis cum frigore paruo: deinde incipit frigus eius addi, postea miuoratur parum apud statum, sicut in phlegmate. Cumque caleŕit corpus, non est caliditas uehementis, licet sit maior, & magis apparens quàm illa quæ est in phlegmatica: ipsa enim cum difficilitate sua in inflammatione non inflammatur inflammatione de qua curatur, sicut ignis in lignis grossis: Et non comprehenditur super corpus totum: immo est illic caliditas cum horripilatione & grauitate: & causa in hoc est grossitudo humoris. Et est cum frigore aliquid ex dolore quasi frangat ossa: & est illic rigor & concussio uel commotio propter quam strident dentes: uerum non sicut in phlegmatica, & perducit illud ad debilitatem uisus: uerum lenitur apud digestionem, quoniam malitia miuoratur, sicut fuit in principio parum. Et de signis quartanæ, sunt causæ eius antecessores ex febribus quæ prolongatæ fuerunt: & ex splene, aut dolore. Et de signis quartanæ etiam sunt dispositio cõplexionis, & significationes melancholiz, & ætas, & tempus, & cibus, & forma, & consuetudo, & quæ sunt his similia. Et periodus eius est. 24. horarum. Et multoties est febris tertia

na in ætate quidem, & fit quartana in hyeme. Et multoties perducunt febres diuerſæ ad febres permiſtas, in quibus non eſt ordo propter diuerſitatem reſidui humorum remanentium poſt febres. Cum ergo coſtitatur ſuper incinerationem, cum firmatur ſuper quartanam. Et illius quidem, quæ eſt a phlegmate aduſto, ſunt paroxyſmi longiores: Et accidit plurimum illius ſucceſſione quotidiana: & eſt ſudor tardior, & vrina groſſior, & durities venarum minor: & fit ſecundum plurimum ſucceſſione febrium phlegmaticarum. Et illam quæ eſt a ſanguine aduſto, antecedunt ſigna ſanguinis, & febris eius, & rubedo vrinæ, & ſignificat ipſam formam, & ætas, & tempus: & fortasſe erit poſt febres ſanguineas. Et in illa quæ eſt a cholera aduſta, eſt pulſus vehementioris velocitatis, & frequentior: & incipit cum horripilatione, & frigore in carne, & ſiti, & ſudore. Et quandoq; fit ira, quædam & ſitis, & inflammatio, & ſignificant ipſam formam, & tempus, & ætas, & quandoque ſignificant ipſam q̃ ipſa fit ſucceſſione febriũ cholericarum. Et pulſus in quartana eſt decliuſ ad duriciem propter ſiccitatem humorum: Ipſe enim trahitur ad interiora, quaſi ipſe eſſet pulſus ſenis: & ad æqualitatem, dum non mouetur: & ſi moueatur, diuerſificatur pulſus valde propter groſſitudinẽ ſuperſuitati: & fit rariſas eius apparatus apud teporem: & eſt ſignificatio completa ſuper quartanam. Et multoties accidit in eo diaſtole inæqualis, & ſyſtole vehementis velocitatis, ſecundum contrarium eius quod eſt in tertiana. Et pulſus quidẽ quartanæ melior eſt pulſu phlegmaticæ in paruitate, & frequentia: ſed eſt ſimilis ei in tarditate. Et apud inſectionem paroxyſmi additur tarditas ſua, & rariſas eius, & diuerſitas eius eſt maior diuerſitate reliquarum febriũ, deinde incipit magnificari, & fieri frequens, & velox. Et vrina in quartana eſt ſimilium horarum in priuatione digeſtionis, propter frigus materiei, & groſſitudinem eius, niſi apud ſtatum bonum. Verum diſpoſitiones eius, & colores eius diuerſificantur: & illud ideo, quoniam melancholia generatur ex humoribus diuerſis. Et de ſignis digeſtionis quartanæ eſt lenitas rigoris. Vrina autem in principio eſt alba ad uindictam decliuſ, cruda, cui non eſt digeſtio. Et poſt principium diuerſificatur eius diſpoſitio & coloratio, propterea q̃ melancholiz generatio eſt ex humoribus diuerſis & fit apud declinationem uigra. Et ſudor in quartana eſt plurimus per comparationem ad phlegmaticam, & non multiplicatur per comparationẽ ad alias: & ſitis minoratur in hac febre, niſi fit melancholia cholericæ.

Cura.

Cap. 63.

Conſideretur in hac ægritudine an ſit melancholia phlegmatica, aut melancholia ſanguinea, aut melancholia cholericæ, aut melancholia melancholica. Deinde rege unamquamque earum cum eo quod ei eſt conueniens, de illis, quæ dicemus. Verum omnibus ſpeciebus ſuis ſunt iudicia in quibus comunicant: & illud eſt q̃ ipſæ minuantur in principio. quare neceſſe eſt ut ante datur an ſit ſanguis dominans in ea, & proprie quando quartana eſt a melancholia ſanguinea, tunc enim phlebotometur, & extrahatur ſanguis ſecundum quantitatem neceſſitatis: & fortasſe exigit multitudo eius & ſpiſſitudo, ſeu ſæcralitas eius ut extrahatur de eo res plurima. Et quãdo non eſt neceſſaria phlebotomia, tunc phlebotomia eſt nociua, in quantum debilitat, & in quantum educit contraſtium melancholiz: & in quantum mouet humores ad exteriora. Et ſi oportet, euacuetur a principio de humore faciente febrem aliquid, propter alleviationem non propter mundificationem uel eradicationem. Illud enim apud digeſtionem ſi ſecundum q̃ innuam ad ipſum. Et ſit poſt paroxyſmum per diem. Et non oportet vt fiat prouocatio in primis cum fortitudine. Et oportet vt adminiſtrentur molliſcantia. Et ſi tibi non uidetur bonum uti potionibus, adminiſtra loco earum clyſteria conuenientia: ſed oportet vt ſint lenia & nõ conceditur conſortario eorum, niſi quando conſequitur ægritudo ſtatum. Et ſi medicus iam præſumpſerit, & ſolutione eduxerit melancholiam in principio, aliquoties ſolutione forti, & prohibuit ægritudinem penitus: ſed meliorario eſt facta ab errore. Et oportet ut prohibetur in die paroxyſmi a coeſtione: & præcipiatur ieiunium. Et prohibeatur ab aqua frigida illa die. Et eſt neceſſarium in reliquis diebus uti carne teiugi, aut pulli in primis teiugi uſque ad tres uel quatuor periodos, deinde pulli, tunc enim pullus eſt melior. Et ſit medicina in die alio a die paroxyſmi geleniabini coeſtiſtum cum aqua calida in die bis, aut tres drachmen geleniabini cum 3. x. ſyrupi aceroſi. Et tu quidem ſcis q̃ quando melancholia eſt cholericæ, tunc oportet ut adminiſtretur in ea, quod ſoluat eam ex genere myrobalaſtorũ, & uiolæ. Et ſi eſt phlegmatica oportet ut adminiſtretur quod ſoluat eã in primis aliquid in quo ſit uirtus turbit. Et ſi eſt melancholia, oportet ut adminiſtretur in ea aliquid in primis in quo ſit uirtus polypodii, & epiſthymi, & ſimilium. Et ſcis q̃ aqua caſei eſt bonũ uehiculum ei, quod adminiſtratur de uirtutibus prædictis: & fortasſe coſert adminiſtratio eius ſolius quando eſt caliditas uolentia, & geleniabini quidem & aqua eius colata a decoctione ſua forti, eſt loco iplius: proprie cum eſt in ſtomacho de bilicas, aut eſt illud quod uincit humor frigidus. Et uomitus iterum & proprie ante cibum, & poſt cibum eſt conuenientior etiam: & proprie in die paroxyſmi, & ante paroxyſmum: & proprie quãdo melancholia eſt phlegmatica eſt de rebus iuuantibus in ea, & non in principio tantum, imo & in omni

in omni hora . Oportet ergo vt non laboretur in principio, & in principiis digestiōis vsq; ad aduentum completenti digestiōis & fiat euacuatio superfluitatum cum eo quod non calefacit cū fortitudine, neque cum eo quod exicat cum fortitudine ex medicina, & dimissione ciborum, neque cum eo quod debilitat ex solutione ventris: neque iterum cum eo quod debilitat in principio ex subtiliōne regiminis. Et scias q̄ quando incipit quartana in ætate, aut hyeme, tunc oportet vt in potu detur in primis de aqua hordei, & secaniabini, vt aperiat vias oppilatas propter prouocationem, & consumatur velociter: & illud est post periodum antecedentē tribus horis, aut quatuor. Et cum accidit quartana in hyeme, tunc est curandum cum facilitate & non est modus vt dentur in potu trochisci. Et scias q̄ res frigide, & humide facili digestiōis, boni chymi sunt cōuenientes huic ægritudini ex parte febris, & ex parte sunt contrariæ uni duarum qualitatum melancholiz, quæ est siccitas, quare oportet vt administrentur iterum, ubi non timetur nocumētum digestiōis: aut sit eius quantitas ex qua non timeatur nocumentum in digestiōe: aut misceatur cum eis aliquid quod earū frigiditatem temperet, & non minuat earum humiditatem: & istæ sunt res calidæ cum æqualitate. Et ahenetur omne frigidum, & siccum. Et res humidæ, & frigide huic ægritudini cōuenientes sunt sicut endiuiæ, & lactuca, & melon, & persica quandoq̄. Et non oportet vt deuitentur huiusmodi, nisi aut propter uehementiam frigoris, & est illud inueniunt sicut in lactuca, & non est inueniunt sicut in melone dulci: aut propter uehementiam prouocationis perducens ad ingrossationem sanguinis, & illud est inueniunt in melone dulci: aut propterea quia præparata sunt ei quod permisceat ad putredinem: & est illud inueniunt in persicis: & oportet vt obserues huiusmodi. Cibi uero calidi cum æqualitate, cum additione in humiditate, sunt iuuantes ualde: & proprie cum volunt æquationem caliditatis eorum, ubi non diligitur ut per ea fiat iuuamentum ad digestiōem cum frigidis & humidis, sicut commissio sicuum cum endiuiæ. Et non est malum in primis sumere ea in quibus est salsedo, & acredo, & incisio, cum non timetur incementum caliditatis: In fine autem ægritudinis non est excusatio illius. Et trochisci de absinthio iuuatiui sunt usque ad finem ægritudinis. Et de illis quibus fit iuuamentum est sessio in aqua calida dulci ante cibum omni die: & balneatio, quæ humectat, & non facit sudare, neque excitat caliditatem, & continuatio delitiorum & quietis, & abhorrere exercitium, & motus corporeos, & animales. Et omnes istæ febres indigeni humectantibus: & diuersificantur in quantitate infrigidationis, & calefactionis. Et necessitas sua quæ indiget exiccatione, est propter illud quod est in eis de uirtute incisionis, & abscessionis, &

solutionis, & non propter exiccationem . Ex oportet ut obferetur stomachus cum emplastris bonis, confortantibus, quæ sunt inter virtutem caliditatis, & subtilitatem eius secūdum quod exigit dispositio: Et obferuentur splen & hepar: & regantur, vt non indurentur & apostementur . Et fortasse est necessarium ad prouocandum vomitum uti aqua raphani cum semine suo, quæ misceatur cum syrupo acetoso. Et fortasse iuuatur cum antecessione commestioni siccæ, & eius q̄ salutum est de piscibus, & sinapis, & his similibus ante ipsum. Et adiuuatur post illud cum potu aquæ multæ, deinde fiat successio cum syrupo acetoso, & euomat. Et de illis quæ conferunt ei est uti sumat ipsum in die paroxysmi: deinde euomat super ipsum. Et securitatem facit a nocumento frigoris, & rigoris, & acuitatis febris si somat allia & mel, & bibat syrupum acetosum mellinum, & impleatur cibo: deinde sumat aquam calidam & euomat. Cum ergo consumitur paroxysmus, cōtinet rem paruum, & balneetur in mane. & si somat ante paroxysmum, v. horis cibum, vt enomat, fortasse iuuabit illud, licet non euomat totum. Et vomitus ante paroxysmum quicunque humor sit, aut alleviat paroxysmum, aut eradicat ipsum . Et de regimine bono est quod ieiunet in die paroxysmi, si non est quod prohibeat: & non sumat cibum, donec consumatur paroxysmus. Et ingreditur balneum die secundo siquidem fuerit digestio secundum discreptionem: & si non fuerit digestio, non fiat in eo nisi effusio aquæ calidæ quantitate quæ deletat corpus, & humectat, minus quam ut perueniat ad hoc, ut moueatur ex ea humor. Et in die tertio administretur vomitus propter illud quod superfluit de cibo, & quod resoluit illi subtiliat balneum: quamuis oporteat vt administretur uomitus in die paroxysmi iterum. Quod si melancholia fuerit sanguinea, iuuabitur cū phlebotomia ex basilica, deinde per euacuationē subtiliorem cum eo in quo ponuntur de mandificantibus sanguinem, sicut uirtutes suchala, & bedecord, & polypodii, & fumiterræ, & myrobalanorum xebulorum: & hoc quidem genus uelociter recipit curationem. Et si fuerit melancholia cholericæ, tunc tibi inest ut administres infrigidationem & humectationem ultimas ex medicinis, & cibis: Et administra aquam temperatam sedendo in ea & ablucendo: Et fiat lentificatio nature in principio cum eis, quæ sunt sicut illud quod fit ex viol. & quod fit ex aqua cafei cum virtute polypodii: aut syrupus acetosus cum epithymo, & syrupus rosæ, & aqua inlebe, & casia fistu. At vero solutio eius integra speratur post 20. dies, quoniam digestio apparet in eo. quando materia est melancholia cholericæ: deinde fiat gradatio ad illud, quod subtiliat, & incidit. Et si necessaria est rectificatio stomachi, tunc fiat cum inunctionibus, & oleis, & epithymatibus, quæ non pertranseant virtutē char-

memilla, & absinthii, & meliloti, & similia. Et ieiunium plurimum etiam in die periodi. Quandoque est ex eis, quæ non conveniunt ei. Et si sit ut in die periodi, sufficiat eis de cibo parum modicum. Et de mundificationis iuvantibus sunt ea, in quibus est decoctio myrobala, & epithymi, & sene in syrupo acetoso, in quo decoctæ sunt violæ. Et fortasse sumitur in potu assa in ieiunio proprie in die paroxysmi, & euomat ipsam, si nauseat cum ea anima eius. Et si fuerit melancholia phlegmatica properet ad geleniabina mellinum cum aqua apii, & fœniculi, & similia. Et si necessaria fuerit lenificatio, misceatur cum eo in principio virtus solutiva phlegmatis de virtutibus turbit, & polypodij: & fiat gradatio pauca ad virtutem agarici: Et fiat ut vomat cum syrupo acetoso mellino de feminibus, & his similibus, nequequo incipiat digerere. Et sit vaporatio stomachi, & eius emplastratio cum eo quod est fortius: ita ut cum dactylis, & sicubus, & similibus: Et similiter inunge ipsum cum oleis calidis perveniendo usque ad oleum de castoreo. Et fortasse est necessarium in eo pronocare vomitum cum syrupo acetoso. & sit in eo virtus ellebori albi: immo quandoque est necessarium ut in potu detur elleborus albus in raphano, aut virtus ellebori in raphano, aut elleborus cum dissolutione sua, cum non timetur dispositio debilitatis virtutis. Et si fuerit melancholia melancholica pura de genere facis sanguinis, tunc rectificatur solutio eius in primis cum aqua iuleb, & penidiis: & est conveniens administratio geleniabina mellini, & zucarini. Et in fine eius evacuetur cum eis, quæ sunt sicut decoctio myrobalarum cietri porum, & nigrorum, & sumit eræ, & passularum. Cum ergo ægrotudo digesta est, tunc bonum est phlebotomare ex basilica. Et administratur vomitus super cibum cum fortitudine: aut leviter secundum horam, & necessitatem. Et oportet ut assidue ipsum, quoniam est radix. Et euacua cum medicinis & clysteribus fortibus: Et medicina quæ administrantur in huiusmodi hora, sunt epithymum, & polypodium, & agaricum, & stichados, & lapis armenus, & lapis lazuli abluti, & non abluti & succus foliorum pentaphyllon cum syrupo mellino. Et fortasse necessarius est elleborus niger, & fortasse sufficit in cholerica sene, & sumatur eræ cum epithymo, & in syrupo acetoso. Deinde provoca tunc apud evacuationem, & quæ in potu phlegmaticæ & melancholicæ ex cathariacæ, & myrsidatum, & medicamen de assa, & sulfur, & piper solum bibatur in aqua. Et de illis est sinapis, quæ administratur non assidue, immo in omnibus tribus diebus: & in primis, & ante illud in spatio longioris, & similiter diaperpon, & similia illi de electuariis. Et non festines cum aliquo horum ante digestionem: nam si tu dederis in potu theriacam & similia illi in primis, compones quartanam quæ quartana: & fortasse atque ægrotudines alias, &

proprie in hyeme. Et in fine eius si necessaria fuerit phlebotomia, aude super eam. Inquit Gal. sana vi gentem plurimum a quartana ei. Dedi eis in potu post digestionem solutivum: deinde dedi eis in potu succum absinthii: deinde dedi eis in potu theriacam. Et dico quæ assa, & piper singularia sunt iuvantia valde, quando apparet digestio, & pervenit status: Et ciba illum salane, & chamach de capparibus, & sinapi, & almuri, & omnibus in quibus est virtus subtiliativa cum fortitudine. Et fortasse erit tibi necessarium ut des ei in potu post 12 dies, omni mane quantum est nabaca una de eis, quæ sunt sicut medicamen de assa, & omni fero similiter, cum febris non fuerit acuta, & materiei radix non fuerit cholera. Et de trochiscis iuvantius in hac hora, & apud declinationem, sunt trochisci secundum hunc modum. Recip. succi eupatorii, & croci amborum ana pondus drac. 3. scopolendriæ, & laccæ, & reubarbari, & spodii omnium ana drac. v. & se. acetosæ, & se. portulacæ, & rosæ, & spicæ, & se. cuscute, & anisi, & semi. apii, & radicis capparis, & granorum alben, & semi. fœniculi omnium ana drac. 4. officiantur cum aqua apii, & sunt trochisci, & dentur in potu cum aqua fœniculi, & endiviæ, & cuscute: & hæc quidem medicina iuvantia est modis pluribus. Et quando materia fuerit digesta, tunc fac istud. Recip. myrrhæ drac. 15. spicæ pyrethricæ costi sumitatum squinanthi drac. v. petroselinii drac. 15. anisi drac. 10. conficiantur cum vino antiquo aut melle zinziberis. Et sit dosis eius quantum est nux. Et quandoque dabis in potu in fine, & convalescentibus, & apud panicatam nocentem in ea, & multitudinem caliditatis cum subtiliatione materie medicinam huiusmodi. Recip. seminis hyoscyami albi, mandragoræ amborum ana filiquam. i. & affix circiter fabas tres. Et de hoc genere est ut sumantur iterum calamenti domesticæ aure. 4. & seminis nrticæ auræ. 2. d. & epithymi auræ. si sunt trochisci parvi valde, & sit dosis drach. 1. Et ex eis quæ bona sunt eis, est ut administratur post apparitionem digestionis usque ad finem eius istud. Sumatur passularum de semi, & passularum althery, & alii sylvestris, & myrti recentis omnium ana parvi. i. decoquantur in aqua dulci postquam infusa sunt in ea, deinde bulliant exquisitè, & coletur, & detur de ea vnc. 1. Et iterum seminis apii, & anisi, & eordume ni, omnium ana drac. v. origani sylvestris, eupatorii omnium ana drach. 7. amedi drach. 4. fuchah drac. 3. passularum drac. 10. decoquantur in tribus libris aquæ usquequo redeat ad lib. 1. Et de illis quæ bona sunt eis, est, ut sumantur ameos, spicæ, & calamenti omnium ana drac. 10. & carvi & anisi amborum ana drac. 7. & assæ pondus drac. v. & zinziberis pondus drac. 4. & cassie pondus drac. 3. officiantur cum sufficientia mellis. Et sit dosis eius pondus drac. 1. cum aqua apii, & fœniculi, & trochisci huiusmodi. Recipe succi eupatorii drac. 1. q. scopolendriæ,

scolopendriæ, spodi, fœniculi, spicz, croci, omniũ ana dra. ʒ. laccæ, & reubarbari omniũ ana dra. 3. seminis cucumeris, & seminis portulacæ omniũ ana dra. 6. fiant trochisci cum aqua apii, & sum̃ tur in potu cum syrupo acetoso. Et ite r̃ ad phlegmaticam. Myrrhæ dra. ʒ. & tertiam croci, petroselinĩ amborum ana dra. ʒ. spicz dra. 4. castorei dra. 3. anisi dra. 3. seminis apij, & karui amborum ana dra. 3. quatuor, amomi, corticum caliz, sto racis omniũ ana dra. 2. & 3. sileos, adriani cõ sectionis omniũ ana dra. 1. & tertias duas. Et quã do uehemens sit rigor, est uomitus cum aqua repi da, & syrupo acetoso ad illud iuuatium. Quod si virtutes eius non obediunt, tunc fortifica eas cum eis quorum rememoratio præcesit secundum ho ram. Et fiat uaporatio cum embroca, in qua deco cta sunt secha, & chamæmilla, & similia homine cooperto cum pannis lanceis aggregantibus cale factionem.

Rememoratio solutiuorum, quibus indigent post digestionem. Cap. 64.

Kebulorum, dra. 6. epithymi, absinthij ambo rum ana drach. ʒ. mirobalanorum citrinorũ, succi eupatorii, emblicæ omniũ ana drach. 4. seminis apij, & anisi, seminis fœniculi omniũ, ana dra. 2. fiat ex eis decoctio, & soluat cum eo cum facilitate. Aut sumator passularum sine ari lis. dra. 10. mirobalanorum kebulorum, & epithymi omniũ ana dra. 8. & fumiterre pondus. dra. 7. & suchaba, & centaureæ maioris amborum ana pondus dra. 6. eupatorii, & radicis squinanthi amborum ana pondus. dra. ʒ. decoquantur cum quinque libris aquæ, donec redeat ad lib. 1. Pilulæ leues, quæ quando administrantur in omni bus quinque diebus semel sunt iuuantes in ea, & suot expertæ. Recip. epithymi, & turbit. amborum ana dra. 10. carui, anisi amborum ana dra. 7. ameos 8. seminis apij, & fœniculi amborum ana dra. 3. pulypodij, dra. 6. agarici albi quod facile teritur dra. 8. salis indi dra. ʒ. hieræ picræ dra. 2 ʒ. fiant pilulæ cum aqua mentæ: & sit dosis dra. 3. Et cum materia est phlegmatica, conserunt istæ pilulæ. Recip. epithymi, agarici, ameos omniũ ana dra. 8. seminis apij, anisi, fœniculi omniũ ana dra. 3. salis napiçi dra. ʒ. hieræ picræ, turbit amborum ana pondus dra. 10. conserantur pilulæ, & sit dosis pondus dra. 3. Et quando est eũ dolore spleois, iuuatur hoc medicamento, & soluit eum cum facilitate. Recip. scolopendriæ dra. 1 ʒ. agarici dra. 12. mirobalanorum nigrorum, hieræ ana dra. 10. kebulorum, absinthij omniũ ana dra. 8. suchaba, bedeoard, chamæpitoy, succi eupatorii omniũ ana dra. 7. fructus tamariisci, radicis capparum amborum ana dra. ʒ. seminis apij, anisi, seminis fœniculi omniũ ana dra. 3. fiat confectio, aut pilulæ.

Rectius est ut inclinetur regimen eorum in primis septimanis vsq; ad tres septimanas ad subillationem quandam, præter quod destruat uirtutem: & illud est, ut abstineant a carne, & alument: hoc enim minorat eorum materias, & est leue super eos: & abbreviat spatiũ ægritudinis eorum. Et post illud necessarium est virtutem viuificare cum eis, quæ sunt sicut pisces alardi, & oua forbilia, & pulli, & altheiugi. Cum ergo peruenit ad tempus in quo prohibetur in ea alument, & non minoratur ægritudo, tunc necessariũ est custodire virtutem, & cibare eũ eo, quod est fortius ex carnibus gallinarum, & pullorum, & arietum, & hædorum, & anium mollis carnis, sicut sunt pulli, & alduragi, & pisces boni, qui non sunt magni. Et scias, qd conditio in eo, ex quo cibatur habet quartanam, est qd sit aggregans proprietates, quarum vna est, ut non sit crudum, immo resoluens uentositates quam facit accidere melancholia. Et secunda est ut non sit grossum, immo subtilians grossum. Et tertia est, ut non sit confictiũ, immo soluens uentrem. Et quarta ut sit sanguis ex eo generatus fauibilis. Et plorimũ quidem est in ea illud, quod habet caliditatem & humiditatem. Et tu iam sciisti quomodo cibetur ante paroxysmum, & per quos horas, & quare sit illud. Et sciisti iterum, qd quandoque necessarius est cibus in paroxysmo, & in proximo eius propter causam prædictam. Verum rectius est ut eueniat febris ventre uacuo, ut non occupetur natura cum materia alia: nisi cum materia ægritudinis, donec expellat eam. Et vinum clarum subtile al bum est iuuatium.

Cura quartana continua. Cap. 66.

Dispositio huius febris est, secundum quod denunciuimus ante ipsam. Et cano in ea est homogeneus canoni quartanæ interpositæ: & non diuersificatur ab eã, nisi in rebus paucis. De illis est, quod declinatio in illa ad æqualitatem in calefacientibus, & ad infrigidationem in hac est melior propter ad hærentiam febris: quare oportet ut administrent in curatione eius ea, quæ sunt sicut syrups acetosus & geleniabon & syrups acetosus cum seminibus, & aqua de radicibus æqualis: & suppositoria cum melle. Et de illis est, qd phlebotomia in hac est magis necessaria, quoniam materia est comprehensa in uenis. Et de istis est, qd licentia in caribus in hac ægritudine est minor, ideo caue hoc.

De febre sextana, & septena, & similibus illis. Cap. 67.

ET nominatur phreanosis quidam nominis huiusmodi febres reuolubiles. Istæ generantur ex materia homogenea materiei quartanæ

tanz, sed est minor, & grossior. Et plurimum quidem fuit ex melancholia phlegmatica. Sextanam autem & septenam, & quæ sunt post illas. Hipp. dixit: & Gal. dixit. Ego non uidi in vita mea aliquam ex eis, immo neque uidi quietam apparentem fortiter, & neque est febris, nisi quasi occulta. Inquit, & non est longinquum quin sit causa in septe na huiusmodi, & nouena regimen, quod quando administratur, & procedit super ipsum, facit febrem. Et cum reiteratur, facit necessario in huiusmodi hora illam febrem, & si dimitteretur, & recedificaretur, non faceret. Est ergo causa in periodis eius, & in ipsius iterationibus, reiteratio regiminis & periodi eius non sunt periodi materis, quæ confundatur, & eius redictione. Inquit, oportet ergo ut obseruetur in experientia huius ægitudinis hæc intentio, ita ut non accidat error: quamuis Gal. sit quasi negans aduentum harum febrium, & quasi quidem sit necessarium ut non sit huiusmodi febri alia radix. Verum Hip. iam uerificauit sermonem in inuentione septenæ, & nouenæ, & non est illud manifestum mirabile, neque manifeste impossibilitatis, ita ut sit necessarium redire in eo ad manifestandum. Et sermones quidem quos locutus est Hip. in e. harum febrium sunt, quod septena est prolaxa, & non est mortifera, & nouena est lögior, ea, & non est mortifera. Et dixit, quod quintana est deterior febrium, quoniam sit ante phthisim, & post ipsam. Et dixit Gal. in ea sicut fixit. Et ego quidem opinor huic sermoni modum quandam, & est ut per phthisim intelligatur hæctica: & sit sermo eius quintana subiectum propositionis indefinitæ non significantis cōmunitatem: ergo est quasi dicat, quod de quintana est una species deterior febrium: quoniam ipsa est ante hæcticam, & post eam, & est intentio sermonis eius hæc, quod cum febres prolongantur, & læsionem fecerint, & fuerint permixtæ, & diuersæ, perueniunt plurimum ad inflammandum membra principalia, & ad hæcticam: & de proprietate harum febrium. est ut scire in fine suo secundum ordinem vnum. Et plurimum illius super quartanam. Et iam testificari sumus eam quintanam, uerum ipsa perducit ad quartanam quando in humoribus est exuberatio, & in humilitatibus multitudo. Cumque liquefactio iam multiplicatur, & euacuationes sensatæ, & insensatæ frequentes fiunt, non remanet in humoribus cinobritas, nisi illud, quod minus est & grossius, & illud facit esse necessarium ut sit paroxysmus tardior: & fiat illa, quæ fuit quartana, quintana. Et in huiusmodi quidem dispositione rectius est, quod sic corpus preparatum, ut inflammetur, & fiat hæctica. Et iterum hæctica quando antecedit, non est longinquum quin faciat accidere in humoribus cinobritatem quandam propter paruitatem suam uel paucitatem suam in postremis hæcticæ: & accidit illi cinobritati putredo, quare accidit febris: & iam destruxit febris hæctica corpus: est ergo mala ex:

hoc, quod ipsa est signum aduersionis humoris, de quo non remansit nisi parum: & sit adustus parum. & ex hoc, quod ipsa est causa additionis febris, & duplicationis eius. Et non oportet ut uegentur ægitudines quas non contingit uide re in tempore quodam, & quadam regione: nam hoc genus non comprehenditur per multitudinem. Neque iterum oportet ut dicatur, quod si est quintana, iunc necesse est ut sit materia quinta: nam melancholia generat quartanam, non propter hoc ipsum, quod ipsa est melancholia, immo propterea quod ipsa est pauca, grossa. Et iam non est longinquum quin sit in quibusdam corporibus melancholia grossa, panca, cui accidit putredo. Et non conuenit alicui, ut dicat possibile est in phlegmate, ut fiat ei paroxysmi alii, quando ingrossatur, & minoratur: quoniam concessio est res ampla, & raro sit possibile, ut necessario consequatur eius contradictio. Amplius non est dispositio in concessione eius, quod nunquam uidetur, & non auditur, neque de quo testificatur experientator, ane sapiens sicut concessio eius, quod testificatur qualis Hipp. Et iam retulit mihi fidelis quidam se uidisse nouenam. Quiniam uero nos multoties uidimus: & non cogimur propter hoc dicere, quod illic sit humor alius.

Cura specierum huius febris. Cap. 68.

A Propinquat huius febris cura curæ quartanæ phlegmaticæ: & indiget in curatione eius superfluo ieiunio: & sublimitatione cibi, & regiminis, & somno digerente ut resoluatur per illud materia grossa, & digeratur. Et iterum indiget ingrossatione regiminis, ut non destruat in eo uirtus: & sunt ista duo sicut duo contraria. Et propterea, quod febres istæ non faciunt accidere læsionem uirtutis, non curamus si subtiliorem regimen, & faciamus ægrum uti ieiunio uno tempore & succurrimus illi sicut ostendimus, ita ut ei beamus cum eo cuius bonum est nutrimentum, & velociter sit, & multiplicatur: & in quo non est ingrossatio materiei, neque additio in ea. Et de curationibus magis conferentibus ad illud est uomitus cum elleboro, & semine raphani & raphano, in quo sit uirtus ellebori, & nucis nonica, & etia cunctio cum hieris. Et post illud administratio theriacæ, & eis similium. Et confert tunc sudatio cum medicinis, & cum balneo calido absque administratione aquæ, & absque administratione humectatiui.

TRACTATUS III.

De hæctica. Cap. 1.



IAM sciuiti, quod in membris sunt humiditates diuersarum specierum, de quibus sunt humiditates preparate ad nutriendum, & humectandum iuncturas. De illis ergo est illud, quod est repositum in uenis

& de

& de illis est illud, quod est sparsum in membris, sicut ros. Et istæ sunt duæ diuisiones, & prima earum est materia febris putredinis, & febris ebullitionis, sicut sciuit, cum nutrimentum non totum expendatur seu distribuatur in cibum sicut aduenit, immo remanet de eo illud, quod est in semita expendendi, in cibum seu in nutrimentum, & remanet, quod est in semita thesauri vel in semita ut recondatur tanquam thesaurus repositus administrandus tempore necessitatis. Et de illis sunt humiditates proximi temporis coagulationi: & sunt humiditates, quæ sunt actu nutrimentum, scilicet attractæ ad locum, quæ sunt loco eius, quod est de eo resolutum: & sunt additio similis illi: veruntamen tempus fluxibilitatis earum propinquum est: quare sunt non coagulata. Et de eis sunt humiditates, cum quibus continuantur partes membrorum similitum partium à principio creationis: & per ipsarum destructionem perveniunt ad separationem. Et similitudo humiditatum primarum est oleum lucernæ effusum in lucernâ. Et similitudo secundarum est oleum imbibitum in corpore lychini. Et similitudo tertiarum humiditatis est humiditas quæ continuatur partes corti de quo factus est lychinus. Et cum inflammantur membra radicalia, & proprie cor, est illud ipsa ægritudo, quæ est hætica secundum quod sciuit. Et caliditas quidem hepatis quandoque perducit ad hæticam: verum non est ipsa hætica, immo hætica est illa; quæ est causa cordis: & similiter dispositio pulmonis & stomachi. Verum dum ipsa permanet finiendi humiditates diuisionis primæ membrorum, & proprie cordis, sicut finit candela oleum infusum in locerna, tunc est gradus primus appropriatus nomine generis, quod est hætica: & græce hæcticos, cum non habeat in speciebus suis nomen. Et cum finiuit humiditates, quæ sunt diuisionis primæ, & incipit resolueret humiditates, quæ sunt diuisionis secundæ, & finire eas, sicut enim finiuit flamma oleum euacuat in lucernâ, & incipit finire imbibitum in corpus lychini, erit gradus secundus, & nominatur debilis, & marasmus, & habet latitudinem, & principium, & medium, & statum. Amplius non sanatur ille, qui consequitur statum, albidus, & parum recipit curationem, nisi Deus uelit: & proprie quando pervenit ad hoc ut caro consumatur uel liqueat. Cum ergo finiuntur istæ, & incipit finire humiditates, quæ sunt diuisionis tertiarum, sicut incipit flamma a durere corpus lychini, & humiditates eius radicalis est ægritudo gradus tertij, & nominatur almesfet, & rhas græce. Et hæc quidem ægritudo est ex febribus, quæ non habent paroxysmos, neque horas paroxysmorum. Et quidam dixerunt: febres hæctice aut pendent cum humiditatibus propinquitatem temporis cum coagulatione. Aut cum eis, quæ sunt sicut caro. Aut cum membris radicalibus duris, sicut sunt ossa, & nervi. Et si ex sermone isto intel-

ligitur, quod pendent secundum semitam, quod finiunt quod in eis est de humiditate contrinnata cum eis, erit hæc: & intentio prima æqualis seu unum, & idem, & si significat, quod primunt, quod finit hætica est humiditates propinquitatem temporis cum coagulatione, non erit sermo sanus. Et hætica quidem quandoque accedit post febrem ephimeram. Et quandoque accedit post febres putridas: & apostematum. Et longinquum est ut accedat hætica incipiendo: quare sunt membra radicalia iam inflammata, & non inflammatur humor, neque spiritus ante illud: immo oportet ut caleant illa in primis, deinde secundum processum dierum caleant membra radicalia uel principalia nisi accedat causa fortis valde. Et causa quidem una quandoque est causa febris hæctice: & quandoque est causa febris ephimeræ, secundum vehementiam suspensionis uel dependentiæ ipsius & debilitatem suspensionis uel dependentiæ suæ sicut ignis. Nam ipse obuiat lictis secundum duos modos quorum unus est secundum modum, quod calefacit ea, & facit ex eis euaporationem: & secundus est secundum semitam inflammationis. Et febres quidem putredinis, & apostematis permittuntur multoties ad hæticam propter vehementiam febris & vehementiam subulationis cibi in ea, & prohibitionem a quæ frigidæ, & paucitatem observationis lateris cordis cum unctionibus, & emplastris, & epithematibus, & proprie in ægriudibus membrorum vicinorum cordi, sicut diaphragmati. Et multoties facit cadere in eam necessestas medico propter casum uirtutis, & frequentiam syncopeis ad dandum in potu unum, & aquam carnis, & medicinam de melle, & his similia. Et quandoque componitur hætica cum febribus putredinis, & apostematum. Et hætica quidem in principio rei est difficilis cognitionis, & facilis curationis. Et in fine sui est facilis cognitionis, & difficilis curationis. Et si, albidus, non recipit curationem penitus.

Signa. Cap. 3.

Pulsus quidem est minutus, durus, frequens debilis, fixus secundum dispositionem unam. In tactu uero eorum est illud, quod sentitur de caliditate minns caliditate synochi, & ei similitum inflammatarum in materia: & in principio dum tangitur est magis suavis: & cum remanet super eum manus hora una apparet cum fortitudine, & mordicatione, & non cessat augmentari: & est calidius, quod est in eo locus uenarum, & articularum. Et est eorum caliditas similis: non enim minuitur, uerum ipsa quando superuenit ei cibis, augmentatur uelociter: & fit fortis pulsus valde, & incipit magnificari: & propter illud accedit ignorans medicorum, quod prohibet eis cibum propter illud, quod accedit eis de eo ex accidentibus,

bus, quare oerduot ens. Sicut augmentatur flamma propter iniectionem olei, & frixio fartaginis cum effunditur aqua super eam. Et istz quidem significatioes eius sunt fortes. Et cibus in reliquis quidem febribus proculdubio oon incendit hac iniectione, sicut iouenit huic: quamuis necessario faciat diuersitatem uotus uaturz: & hec inflammatio oon est sicut incensio reliquarum febrium pnt coarctationem, neq; secundum periodos notas, immo eam comedunt, & in quacunq; hora sit. Et est habeois zgritudine non uehementer discernens illud, quod est io eodem de caliditate: quoniam facta est complexio membro conueniens: & iam sciuit in libro. 1. qualitatem dispositionum in huiusmodi: verum ipsa apparet apud suscepcionem alicuius ciboru propter exacerbationem suam. Et de significationibus permutationis febris ephemerz ad febrem hecticam est uehementia fortitudinis caliditatis in. iij. valde: nam secundum plurimum incipit febris post. xij. horas declinare. Cum ergo pertrausit febris. xij. horas, & noo appareat signa declinationis, immo contiunatur vsq; ad tertium omni die, & sit fortis: tunc illa est hectica. Et de significationibus compositionis hecticz cum febribus putredinis est rematio caliditatis sicq; post finem declinationis, & post sudorem exuberantem: & ad dno in arefactione, & extenuatione secundum illud, quod facit necessarium illa zgritudo: & uoluntas in urina, & egestionem. Et si fuerit hectica appareos, & alia occulta tuc significat ipsum coarctatio accides io paroxysmis: huiusmodi enim est noui iouentum in hectica omnino. Et scias, q; quandoq; incipit hectica accensa cum stomacho, quare corruptum complexinam hepatis per uicinitatem.

Signa albuli, idest, marasmi. Cap. 3.

Signa uero albuli sunt, q; quando febris expelliur vel permittitur ad dubul, uehementis fit dories pulsus, & eius debilitas, & paruitas ipsius, & eius frequentia: & proprie quando causa casus in hecticam est apostema, quod non resoluitur: nam illud scilicet frequentia additur ualde, & similiter uelocitas: & fit pulsus eius de genere eius, qui oominatur cauda muris. Quod si fuerit ex potu calidi uioi, erit loco candz muris similis acni magnz, & non erunt accidentia albuli uehementia ualde non enim dat ei spatium usq; ad huiusmodi. Et apparent in urina uetnostitas, & petala, & incipit oculus profundari. Cum ergo albulus peruenit ad statum, fit fortior profundatio amorum oculorum: & multiplicat lippitudo sicca, & crescut extremitates osium omnis membri: & in facie: planatur tempora: & tenditur cutis frontis: & destruitur enlocutis: &

fit quasi sit super eam puluis quidam & adustin solis: & perducit ad grauedinem eleuandi supercilia: & fit oculus somnolentus, & clausus absque somno, & subtiliatur nasus, & eloquantur pili, & apparent pediculi: & uideitur uenter iam minorari, & adhazere cum dorso, quali sit cutis sicca, que iam attrita est: & attrahitur cum ea cuius peccoris. Cum ergo curuantur ungues, & arcuantur, tunc iam uenit ad statum: & incipit almesfeter, & cum peruenerit iu almesfeter liquefiunt cartilagineos.

Cura hectica. Cap. 4.

Nientio in curatione febris hecticz, est iofrigidatio, & hometatio. Et uuaquaque eorum copectur cum approximatione suarum causarum, & expulsioue causarum sui contrarij. Et fortasse est causa unius eorum, causa cocontrarij alterius: sicut causa iofrigidationis, ipsa enim quandoq; est causa exiccationis, que est contraria hometationi: sicut iofrigidatio cum trochiscis camphoratis, & illis, que sunt ex spodio, & his similibus. Et fortasse hometatio iteru est causa calefactionis, que contraria est iofrigidationi, sicut uinui: oia ipsum hometat, sed calefacit: quare oportet obferuetur illud. Et si necessitas uocat ad fortem iofrigidationem, & non fit nisi cum siccis, coingantur cum eis, aut procedat ad ea: aut succedat res in qua est uirtus hometationis. Et similiter cum uocat oecessitas ad fortem hometationem uelocem io ea, sicut aqua carnis, & uioi, tu oia oportet ut adiungatur ei, aut antecedat eam, aut sequatur eam illud in quo est iofrigidatio. Et si fuerit causa hecticz apostema, aut lesio in membro, tuc necessarium est curare ipsum in primis. Et qui diligit componere regimen eius ex diuersis modis conuenientibus ei, io quo febris sit uehementis ualde, tuc necessarium est ut incipiat, & det in potu trochiscos camphoratos, & que currat cursu eorum cum syrupo acetoso diluculo, et in ortu Solis aquam hordei cum caocris, si non abhorret eos, apud cum inlebat, ant cum aqua granatorum: & apud somon mucilaginem psyllij, si noo fuerit prohibens aliquid propter stomachu, & alia. Et regimeo iofrigidans est per illud, quod sciuit de potibus iofrigidantibus, & de oleribus iofrigidantibus, & trochiscis, sicut trochisci de camphora, & emplastris, & uotionibus, & his similibus, & iofrigidatione aeris eorum, iia quod io hyeme. Si autem oon tolerat, alleuietur super ipsum coopertura: iofrigidatio namque aeris eorum est melior res: & sicut uestire cum com sandalaris, & camphoratis, & facere ipsum odorare illud in quo sunt rose, & camphora, & faodali, & fructus frigidi, & alsahesfrani aspersu cu aqua rosata: & sit alienatio sudoris &

Q balnei.

balnei. Et oportet vt non prolongetur retentio emplastrorum infrigidantium nalde super membra propinqua ualde membris anhelitus: fortasse enim inferit illud anhelitus, & uoci nocentum magnum. Et oportet ut declinet ad quietē, & somnum, & tranquillitatem, & gaudium. Et custodiatur æger ab eo, quod facit ipsum irasci, & quod facit ipsum tritari, & quod facit ipsum angustari, & à fame, & siti longa. Emplastra infrigidantia quibus oportet eos uti, fini aromatica, nam ipsa sunt propinquioris iuuamenti: & proprie super pectus, & quæ sequuntur ipsum: & sint infrigidata, & non sit in eis stypticitas. Stypticitas enim cum hoc, quod ipsa facit accidere excitationem, prohibet uirtuti medicinz profundari. Et oportet ut assidue tur permutatio, ut non remaneat medicamen, quare calefiat & calefaciat cum obseruatione vehementer infrigidationis eius: nam cum ipsum infrigidat vehementer, non elongatur quin debilitet membrum. Et quando est prope membra anhelitus, non est longinquum quin impediatur diaphragma, & alia ab emissionem anhelitus cum facilitate. Et de regimine humectante sunt cibi facti ex lacte & fructus, & tinx, & vnctiones, & emplastra, & odoramenta, & caputpurgia, & quiet, & tranquillitas: & ut non inferatur ei uolentia in fame, aut siti.

*Rememoratio medicinarum infrigidantium
eos. Caput 5.*

Ille vero quæ de eis sunt infrigidautes, aut humectantes, omnes sunt nutritiui: aut vincit in eis nutritibilis: sicut aqua hordei de cocta cū caneris ex parte cancri. Et oportet vt euellantur extremitates cancorū ex corporibus eorū & additamenta eorum, & abluantur cum aqua frigida, & sale bono, cum cinere vicibus tribus, & supra, donec mundificentur, & purgentur à Zheumet ipsorum: deinde decoquantur in aqua hordei, & sicut aqua lactis uaccini de quo extractum est butyrum: & sicut succi olerum notorum prædictorum in capitulis febrium acutarum. Et sicut mucilago psyllij. In aceto autem est vehemens excitatio, & virtus resolutionis: quare oportet vt bibatur cum eo, quod resistit duabus proprietatibus. scilicet per commissionem aquæ multæ, aut cum quibusdam humectantibus & lenificantibus. Et lac asinæ quidem existimatur, quod sit cum humectatione sua infrigidans, ita vt quidam faciant meliorem infrigidationem eius super infrigidationem lactis vaccini, de quo extractum est butyrū: verum ipsum conuenit ei, qui non habet nisi febrem hecticam, & ei qui non habet materiā, neque humorem præparatum ad putredinem. Et oportet vt caueatur calefactio lactis, & ex eis, quæ prohibent ipsam est succarum. Et cum times putre-

dinem accidentem ex lacte, tunc solue cum facilitate. Et si timueris calefactionem, tunc abstine ab eo aliquot diebus: & cura in ea cum trochiscis, & aquis fructuum, deinde itera lac. Medicinæ vero infrigidautes, quæ non habent humectationem sunt, sicut trochisci noti narrati, scilicet trochisci camphorati & trochisci de corallis frigidi, & sicut trochisci hmoi. Recip. spodij, boli armeni ana. 3. iij. rosarū. 3. vi. seminis portulacæ, & citruli, cucurbitæ, & Karabe omnium ana. 3. iij. fiant ex eis trochisci, & sit dosi pondus. 3. iij. & sunt boni valde. Et iterū alij proximi eis. Recip. arnoglossæ, amyli, & gummi draganthi omnium ana. 3. iij. boli armeni, spodij amborū ana. 3. iij. papaueris 3. v. rosarum, & seminis cucurbitæ, & citruli, & portulacæ omnium ana. 3. vi. granorum cydoniorum excorticatorum, & seminis melonis, & cucumeris longi arcuati omnium ana. 3. vij. succi liquiritiæ pondus. 3. x. conficiatur cū mucilagine psyllij. Vnctiones nero, & epithemata, & emplastra infrigidantia, & odoramenta, & caputpurgia infrigidantia sunt illa, quæ rusticis sunt. Et meliores vnctiones sunt cum oleo de cucurbita, & de papauere, & nensfare, & alchalef, & violis. Stratus autem infrigidautes, & humectantes sunt, qui sunt plani ualde de conij asperitis aqua rosæ, aut de lino de genere eius, quod sit in tabrasen, & sit impletio eius illud, quod non calefacit, immo sit de genere lini pectinati, & renouetur assidue. Aut sit stratus de corijs, quæ iā sunt impleta aqua postquā sunt super ea redificationes, quæ applanēt aquā bene, & prohibeant eius sphericitatem uel rotunditatem, & sint stratus prope aquas, & cursus earum, & sub eis folia arborū frigidarum, & humidarum, scilicet de salicibus, & semperuiuz, & olera humida, & odorifera frigida, sicut rosæ, & folia arborum frigidarū, & præputia uitæ, & his similia.

*Rememoratio medicinarum humectantium
eos. Cap. 6.*

Illarum quidem quæ sunt cū infrigidatione rememoratio iam præterijt. Et restat nunc considerare in qualitate dandi in potu genera lactis, & lac de quo extractum est butyrum, & in qualitate administrationis tinx, & balnei, & administratione vnguëtorum, & oleorum, & epithematum, & reliqui regimini. Et nos quidem iam docuimus modum dandi in potu genera lactis in capitulo phihys, & siccitatis stomachi, quare oportet vt sit illud canon. Et non est lac post lac mulieris, sicut lac asinæ, postea lac caprarum, cuius pascua oportet esse ex herbis, & oleribus frigidis humidis, sicut scis: nam ipsum, & proprie lac asinæ eradicat hecticam, si fuerit ei eradicatori: & non est electio super ipsum, nisi prohibeat putredo accidens, aut expectatio materiei cōprehensæ. Et
lac

lacquidem iuuat enim est eis à principio heclicæ usque ad finem eius. Et lac mulieris sugendo sumptum conuenientius est omnibus. Et canon in dando in potu lac de quo extractum est butyrum est proximis illi iterum. Et melius quidem est ut incipias à 3. x. usque ad xxx. & quod est super prætas, si fuerit virtus adiuuans. Et tibi inest ut commisceas cum eo aliquid de trochiscis infrigidantibus. Erit inest ut addas supra summam prædictam in potione prima, & postrema, si fuerit potens virtus super digestionem. Tina autem illa est melior, quæ est tepida, in qua non est caliditas multa, & est cum hoc cum virtutibus oleorum, & herbarum infrigidantium, & humectantium, & non sit ita ut torrifcet, necdum quod sudare faciat, & non licet ut napor tinx sit calidus: & si non esset, quod prohiberet ad ministracionem tinx frigide, non eligeretur super eam: uerum quod prohibet ab hoc est debilitas corporum eorum, & eorum extenuatio. In principijs uero rei iporum fortasse sanant eos illud, uerum debilitate corporis sanant quoadquod illud cum infrigidacione pauca quam facit in complexionem eius, quæ possibile est ut curetur. Quod si fuerit debilius illo, timetur, quod cadat in heclicam senilem: & illud secundum minus, ueruntamen cum illo tardatur magis tempus mortis, & fortasse uiuit cum ea tempore uel est quasi uita. Et multoties quidem est rectificatio seu curatio permutatio eius ad illam heclicam. Illud autem in quo sumus de resolutione tinx, rectius est ut fiat inceptio in ea cum aqua, quæ est calida ad terminum: & fiat gradatio ad frigidam, & ad temperatam frigidam tolerabilem: hæc enim gradatio facit corpus fusce ptibile aque frigide, cum lacte non fiat nisi per aduentum contrarij in complexionem subito. Et iterum corpus acquirit ex aqua calida similitudinem teneritatis, & tolerat cum ea frigidam. Et si uere sit tina io die tribus uicibus, erit rectum. Et oportet ut ministraretur cum facilitate, ut non cadat uirtus. Et si semper sit aquam hordei ante tinam duabus horis, erit conueniens. Et si præmittat ante emulsionem lactis super corpus eius, secundum quod dicemus, ut dilatat tina meatu cibi, deinde desuper aquam hordei, & quæ sunt ei similia; postea expectet, deinde administretur tina ut dilatetur cibis: erit bonum. Et ad ministrandum post tinam, & balneum inunctio cum oleis infrigidantibus, & humectantibus, sicut oleo uiol. proprie; quando factum est ex oleo de cucurbita. similiter oleo nenufarino, & oleo de cucurbita. Et si permuteatur post tinam ad illud, quod est de huius ad frigus parum tolerabile, deinde inungatur: erit melius. Et si præmittatur inunctio, & festinet eam, deinde ingreditur aquam frigidiorum parum erit rectum: & illud secundum tolerantiam: & non est malum gradari in eo. Et melior quidem horarum huius actionis, est post digestio-

nem cibi. Et si possibile est ut submergatur post tinam calidam in aqua frigida subito, abque gradatione, est magis ultimam ex parte curæ: & magis forte ex parte timoris. Et effusio eius cum facilitate est minor timoris, quam submergere infirmum in ea subito, & minoris iuuamenti. Et sit frigus secundum quantitatem frigoris aque æstatis, quæ est inter tepidam, & illam quæ est uehementius frigoris: Et si præmittatur emulso lactis super membra sua, si non fuerit debilis, aut eius quod inestum est aqua si fuerit debilis, deinde si ad ministratur tina: erit rectum. Nam emulso lactis super corpus est uehementis humectationis. Et genera quidem lactis bona ad emulgendum, sunt prædicta. Et oportet ut emulgeatur ex herbis. Et dignius est, ut fiat fixio super inunctionem fricando ex oleis prædictis corpori toti, & inuncturis. Ingressio autem balnei non conceditur ei, nisi fuerit ita, ne sudare faciat, neque igniat, neque alteret anhelitum, & sit calidum aque eius minus calido sui aeris: & sit calidior aque eius ita, ut deleat, & non lædat, & non faciat sudare: & quando non est in corpore eius materia præparata putredini, & proprie cum illud est, & non digestus est cibis: immo oportet ut sit illud cum uoluntas est ut expandatur digestum eius in corpore. Et non prolonget moram eius in eo, immo separetur ab eo uelociter. Et quando separetur ab eo, sumat aliquid de humiditatibus, & de sorbitionibus, quæ non nocent ei factis ex hordeo, & lacte. Et quando accidit ei in balneo sitis, sedet eam cum aqua hordei, & aqua alba. Et lac sit lac æstatis. Et oportet ut sit introitus in balneum, deinde exitus eius ab eo secundum modum, ut non sit labor in eo emulsiō. Et iam enunciamus illud in locis albis, & iterabimus de illo conditionem. Oportet ut permuteur ad balneum in lectica portata in qua sit lectus stratus æqualiter planus, donec perueniat eum ad primam domum: & tunc permuteur ad stratum lenè ex eis, quæ sunt conuenientia balneo. Et exuatur uestimentis suis in ea aut io media domo, si non fuerit calida. Et non moretur in aliqua earum, nisi quantitate permutationis, & anhelitus pauci, & quantitate quæ exuatur uestimentis, deinde ingreditur ad domum tertiam: ueruntamen non sit uehementis caliditas: & stet in ea quantitate quæ tolerat tinam. Hoc est illud, quod dictum est, & quod magis est dilectum mihi est, ut sit tina eius in domo media temperata. Cum ergo separetur à tina frigida, cooperiatur mantili, aut chlamyde habente duas tunicas, & permuteur ad stratum seu lectum suum, & lecticam seu sbaram suam, & exicetur seu fugatur sudor eius cum mantili, & inungatur, & cibetur.

Oportet ut separetur in eis eibus: & non cibentur in sauriate eorum uice una. Amplius melius quo cibantur est aqua hordei, & hordeū. s. fixa eius, & panis tritici abluti in fusus in aqua frigida. Et genera lactis, cum ab eis non prohibet aliquid eorum, quod diximus: & lac uaccinū de quo extractum est butyrum, quoniam est plurimi nutriti. Et almes, & cucurbita: & de fructibus melones feseitini, & sunt melones alzhachi cognominati apud nos indi. Et quando sentit rectificationem, tunc non est malum cibare ipsum casio humido non salito. Et si virtus debilitatur, non est malum ut cibetur iure isidabegi cum coriandro humido, decoctio enim eis, quę sunt sicut alduragi, & alteugi. Et fortasse oportet ut detur eis in potu aliquid uini subulis permisti eū aqua multa. Et fortasse est necessarium ut cibet cum moscos ex carne alduragi, & alteugi, & alcubegi, & pullorem, & helaman acetoso & alchalis acetosa facta ex carne hœdi, aut carne bouis, quādo est illie fortitudo digestionis: & acetum almosos, & alchalis est iuuatiuum eis, & confortatiuum in hac dispositione. Et fortasse non est excusatio ab aqua carnis permista cum styro de fructibus frigidis, acetosis, aut vitello qui forbilis. Et quando prolongatur cum ea debilitas ad syncopim, est necessarium ut cibetur aqua carnis accepta ea costis hœdi cum sale paucō, quę colētur, & fundatur super eam quantum totum eius est de aqua malorum, & quantum est decima eius de vino odorifero, & poterit tepida. Aqua uero frigida, quę non est ualde uehementis frigoris, nō est malum si in potu detur eis, si non fuerit debilis, aut aliquid prohibens: & illud prohibens, aut erit apostema sub hypochondrijs, aut erunt in corpore toto chymi putridi, & chymi crudi, qui omnes digestionem indigent, & non apparet signum digestionis: quōd si appareat, timor erit minor. Et similiter si fuerit hēctica permutata ex sisen aut bisen: nam eū hac melius est ut interdiciatur potus aquę frigide, quam cum alijs. Hēctica enim cum superuenit ægritudinibus destruentibus uirtutem, mollificatibus eam, arefacientibus ossa, & carnem, superuenit debilitati. Cum ergo coniungitur ei super debilitatem post sumptionem aquę frigide, non moratur quin cadat in genus alterius hēctice, quę communicat huic generi in siccitate, & diuersificatur ei in calore, & frigore: & nominatur hēctica senectutis, & hēctica senij. Et illa quidem est ægritudo sua, in qua innatus calor iam destructus est. Et similiter aqua ultimi frigoris, & plurimi nocet eis in omni dispositione, & corrumpit innatum calorem membrorum eorum radicalium. Et fortasse festinat mortem eorum, aut permutat eos ad modum alij hēctice.

DE illis est synopsis: & iam diximus regimen in hoc multoties. Et de illis est fluxus uentris. Et oportet ut curetur, & succurratur ei. Nam in hoc est timor magnus. Et de curia eius in primis est, ut sit aqua hordei eorum aqua sauih. Et ponatur in aqua hordei eorum milium torrefactum, & gummi, aut lentes elixate iteratę, aut lac decoctum cum lapidibus, aut eū igne solo, donec consumatur eius aquositas: & proprie enim milio: & potent hos trochiscos. Recipe boli arane ni 3. v. caltanę torrefactę, ros. omnium ana. 3. iij. spodij, karabe, amborum aoa. 3. iij. feminis acetosę excorticati, granorum berberorum oium ana. 3. vj. fiant trochisci cū fuceo cydoniorū: & deue in potu cum aqua pisorū in mane, & apud somnū. Et detur in potu pſyllium torrefactum: & similiter suffus de spodio in quo est bdelliū de mecha, est iuuatiuum ualde. Et si peruenit ad excoarationem, curetur excoaratio cum ȳsteribus, quę scis quoniam illud est conueniens.

De hēctica senectutis.

Cap. 9.

Ceteris consuetudo ut dicant hēcticam senectutis post febrem hēcticam, & nos etiam incedamus uia consueta. Intentio itaque hēctice senectutis est dominium siccitatis super complexionem absque febre. Et quandoque fit cum æqualitate in calore & frigore, & illud est secundum minus. Et quandoque fit cum frigore, & nominatur hæc dispositio hēctica senectutis, & hēctica senij: quoniam corpori accidit in non hora senij illud, quod accidit in illa hora ex debili seu arefactione & siccitate. Et senes quidem sunt uelocioris casus in ea, quam iuuenes. Et iuuenes uelocioris casus in ea, quam pueri, licet accidat in iuuenibus, & pueris. Et causa faciens cadere in eam, aut est frigida dominans cum debilitate corporis, quare prohibet uirtutem nutritiuam ab operatione sua integra: sicut accidit iterum in fine uitę. Et de hoc capitulo est potus aquę frigide non in hora sua, aut super debilitatem corporis cum febre, & in dispositione cruditatis aut successione exercitij resoluentis uirtutem, & aperiens poros, & quod uocat ad attrahendum aquam frigidam ad uiscera subito. Aut vapores mali, frigidi, qui eleuantur ad cor, & intrigant complexionem eius. Aut caliditas, quę resoluit, & liquefacit humiditates, quare caliditas innata debilitatur, & succedunt frigus, & siccitas. Et quandoque sequitur euacuationes. Et quadoque attrahit hanc ægritudinem superfluitas in infrigidando patientes febres, cum eis, quę bibuntur, & emplastrantur. Et hæc quidem ægri-

regitudo quando confirmatur, non curatur: & si
esset ei ingenium, esset mortali ingenium.

Signa. *Cap. 10.*

In istis videntur signa aldubul, & esicationis:
& non uidetur in eis inchoatio, & inflammatio;
immo fortasse inueniuntur frigidi tactus. Et
eorum pulsus non est sicut pulsus habentium feb-
res heclicas, immo est tardus; parvus; & rarus,
nisi fortis fiat debilitas: quoniam tunc incipit pul-
sus fieri frequens, & proprie in illis quibus adue-
nit hoc ex potu aquae frigidae. Et est urina eorum
alba, subtilis, aquosa, & sunt in dispositionibus suis
sicut senes.

Curatio hectica senectutis. *Cap. 11.*

Non adhibetur haec cura nisi cum nondum
confirmata est: & speratur, quod non con-
firmeretur: & cum confirmata est, speratur
ut postponatur perditio parumper. Et canon qui-
dem in curatione eorum est calefactio, & hume-
ctatio. Et ex humectatione sunt balnea secundum
quod sciuit, quae non administrantur nisi post di-
gestionem: nam si ipsa administrarentur, successione
me comelitionis, facius cadere virtutem. Et cly-
steria facta ex capitibus, & pedibus, & cicere & tri-
tico vehementer decocto & sicibus cum hasech
& chamemilla de quo administraretur: quantitas
medii lib. cum vnc. 2. olei sissimini, & aliquantulo
olei de ben: & administraretur frictio super ciba-
tionem. Et lac suctum ab ubere est vehementius
iuuamenti eis. Et mel est ultimum in iuamen-
to eorum, sicut est ultimum in nocumento haben-
tium febrem hecticam. Et omnis cibus hume-
ctans, facilis penetrationis, uelocis descensionis
in quo non est viscositas, sicut aqua carnis, & ui-
telli ouorum sorbilitum, & uinum subtile odori-
ferum, paruae quantitatatis, est vehementer conue-
nientis eis. Et oportet ut obseruetur humectatio
praedicta in capitulo hectica: & misceatur cum ea,
quod calefaciat ex odoribus, & emplastris, & un-
ctionibus fricando, & cibis & alijs.

TRACTATES IIII.

De febribus pestilentialibus, & quae sunt eis homoge-
nea, & uariolis, & morbillis.

De febre pestilentiali. *Cap. 1.*



VANDOQUE accidit aeri quod
docuimus te in libro universa-
lium, sicut accidit aquae de con-
uersione in qualitate sua ad ca-
lorem, & frigus: & de conuersio-
ne in naturam suam ad alterationem
uel transmutationem & putredinem: sicut alte-

ratur uel transmutatur aqua, & foetet, & putrescit.
Et sicut aqua non putrescit secundum dispositio-
nem suae simplicitatis, immo propter illud, quod
admisceatur ei de corporibus terrenis malis, quae
permiscuntur ei, & accidit toti qualitas mala: si-
militer aer non putrescit secundum dispositionem
suae simplicitatis, immo propter illud, quod admi-
scetur ei de uaporibus malis, qui permiscuntur ei,
& accidit toti qualitas mala. Et quandoque est
illud causa uentorum deferentium ad locum bo-
num fumos malos ex locis longinquis in quibus
sunt loca stagnosa uel paludosa alicuius ad poste-
riorem, aut in quibus sunt corpora cadauerum cor-
rupta in praedio aut corpora mortua ex peste non
sepulta aut non combusta. & quandoque est causa
sa propinqua loco in quo currit. Et quandoque
accidunt putredines in interioribus terrae propter
causas quae ignorantur cum suis particularibus
quare perueniunt ad aquam & aerem. Et febres
quidem accidentis causa aeris sicci minus sunt,
quam huiusmodi accidentis ex aere humido, nisi
quod cholera multiplicatur in aere sicco: quare
est ille etiam causa uel eueniat febres cholericae.
Pestilenciales uero sunt ex aere turbido, & humi-
do. Et febres in aere humido sunt plures euentus,
sed sunt minoris acuitatis, & longioris spatij. In
aestate uero sicca, paruae pluuie sunt minoris euen-
tus & maioris acuitatis, & uelocioris separatio-
nis. Et meliora tempora sunt, quae seruant natu-
ram suam. Et principium omnium harum alte-
rationum sunt formae ex formis caeli facientes esse
necessarium illud, cuius aduentus ignoratur: licet
sint quidam, qui dicunt in eo aliquid non pro-
portionatum ad causam eius: immo oportet ut
scias, quod causa prima longinqua ad illud sunt
figure caelestes, & propinqua dispositiones terre-
stres. Et quando faciunt necessario uirtutes agen-
tes caelestes, & uirtutes patientes terrestres, hume-
ctationem uerementem aeri, eleuantur uapores;
& fumi ad ipsum, & sparguntur in ipso, & putre-
sciunt eum cum caliditate debili, & quando fir aer
secundum hunc modum, uenit ad cor, quare cor
rumpit complexionem spiritus, qui est in ipso, &
putrescit quod circundat ipsum de humiditate, &
accidit caliditas egressa a natura, & spargitur in
corpore causa fluxibilitatis suae & fit febris pesti-
lentialis. Et communicat multitudinem hominum,
qui iterum habent in seipsis proprietatem praepar-
ationis. Ageus enim solum cum peruenit, &
patienti non est praeparatio, non accidunt actio &
passio. Et praeparatio corporum ad illud in quo
sumus de passione est, ut sint plena humoribus ma-
lis: nam munda non forsitan patientur ex illo, &
corpora debilia iterum patientia sunt ex ea, sicut
illa, quae multiplicauit coitum, & corpora dilata-
torum pororum humida multae balneationis.

dinem declivius. Et virides quidem, & violaceæ sunt malæ: & quanto plus additur declinatio ad nigredinē, tanto est deterius: & quanto plus sunt decliviores ad illud, tanto plus sunt decliviores ad malitiam. Et albz quidem sunt meliores: & proprie quando sunt pauci numeri, magnæ quantitatē, facilis exitus, paucæ angustia, debilis febris: & vides febrem minui cum carum apparitione, & ipsarum egressione: & est principium exitus earum in tertio, & quod ei approximatur: & post illas sunt albz, magnæ, pluris numeri propinquæ absq; continuatione. Nam illz, quæ continuantur ad invicem, ita ut continuantur in frusto magno carnis habentes costas aut rotundam formam, sunt malæ. Et similiter iterum duplices magnæ, in ventre unius quarum est variola alia. Albz vero parvæ, duræ, propinquæ, difficilis exitus, licet faciant existimari in principio rei salutem, tamen timetur in eis, quod difficilis fiat earum maturatio, & fiat cum eis mala dispositio ægri: & perveniat per eas ad perditionem, quoniam causa in eis est grossitudo materici. Et de speciebus malarum timoratarum, quæ plerumque interficiunt, sunt illz, quarum diversificatur egressio: nam quandoque apparent, & quandoque occultantur, & proprie quando apparent violaceæ: & similiter tenaces, quarum operatio non cessat à debilitate virtutis & viridificatione membri & nigricatione eius perducunt. Et si viriditas, & nigredo, quibus post succedit declinatio, non faciunt cadere virusem, immo additur cum eis virtus, non sunt mortiferæ: sed fortasse cadere faciunt in ulcera, & quæ currunt furcū corum. Et ut sit febris, deinde variolæ, salubius est quam sint variolæ præcedentes, deinde consequentes, & accidat super eas febris. Et illud quidem, quod plurimū considerare oportet in esse patientis variolas, est eius anhelitus, & ipsius nox. nam ipsa duo cum remanent bona, est res salua. Et cum videris anhelitum patientis variolas consequentem, & similiter patientis morbillum, tunc existima casum virtutis, aut apostema diaphragmatis: deinde cum vides sitim vehementem fieri, & angustia assiduam, & ea quæ apparet infrigidantur, & variola & morbillus virides fiunt, tunc iam percipitur æger mori: & verificatur illud, si variolæ fuerint de genere carum, quarum egressio, & apparitio tardantur. Et plurimū eorum, qui moriuntur per variolas moriuntur præfocati ex synantia. Et quandoque moriuntur per casum virtutis cum rasura intestinorum, & fluxu ventris. Et cum videris violaceas de variolis & morbillo profundari, tunc scias, quod super veniet ægro syncope. Et quando festinat ad mingendum sang. & succedit ei urina nigra, tunc est mortiferum, præcipue quando est illic casus virtutis. Et fluxus ventris viridis, sanguineus, aut lotius cum casu virtutis. Et albamica est aliquid inter variolas & morbillos, & est saluor ambo-

bus. Et multoties quidem variolatur homo duabus vicibus, quando aggregatur materis ad expellendum bis. Et alium coloris plumbini sunt variolæ, quarum bothor in facie, & pectore, & ventre sunt, plusquam in cruribus, & pedibus: sunt malæ, & significant materiam grossam, quæ non expellitur ad extremitates.

Signa apparitionis variolarum. Cap. 7.

Quandoque antecedunt apparitionem variolarum dolor dorsi, & pruritus nasi, & timor in somno, & punctio vehemens in membris faciei, & gravitas communis, & rubedo in colore faciei, & oculi, & lachrymæ, & inflammatio, & multitudo alicui & ossificationum cum contractione anhelitus, & rævedo vocis, & grossitudo sputi, & gravitas capitis, & dolor capitis, & excitatio oris, & angustia, & dolor in gutture, & pectore, & tremor pedis apud resupinationem, & declinationem ad ipsam. Et cum hoc toto febris conclusa.

De morbillo. Cap. 8.

Scias quod morbillus omnis est variola cholerica: & non est discrepans inter ea ambo in plurimo reliquarum dispositionum nisi quia morbillus est cholericus: & quod ipse est minoris quantitatis, & quasi ipse non pertransit cutem: & non est ei altitudo de qua curetur, proprie in principio sui. Variolæ vero in principio suæ apparitionis est eminentia, & altitudo: & morbillus est minor variolis, & minus accidit oculo, quā variolæ. Et signa apparitionis eius proxima sunt signis apparitionis variolarum, & cum suberit stomachi in eo est plus, & angustia, & inflammatio vehementior, & dolor dorsi minor: quoniam causa eius in variolis est repletio sang. extendens venam positam super dorfum: nam generatio variolarum est propter multitudinem san. corrupti: & morbilli propter vehementiam malitiz san. corrupti, pauci. Et morbillus secundū plurimū egreditur subito: & variolæ aliquid post aliquid.

Signa salutis eius. Cap. 9.

Sicut signa salutis variolarum: nam illz, qui est velocis egressio, & apparitionis, & maturatio, est salua. Et durus, & viridis, violaceus, est malus: & qui est tardæ maturitatis, frequentis syncopis, & angustia, est periculosus. Et qui occultatur iterū subito, est malus faciens syncopim.

Cura. Cap. 10.

Oportet in variolis ut incipiatur, & extrahatur sang. sufficiens, cum conditiones fuerint,

Et similiter si morbillus fuerit cū repletionē sang. Et spatium illius est usque ad quartum. Sed quando egrediuntur uariolæ, non oportet tunc ut administraretur phlebotomia, nisi inueniatur uehementia repletionis, & dominium materiestunc. n. phlebotometur quantitate, quæ alleuet seu minoret. Et conuenientius quidem, quod in hac administratur ægritudine est phlebotomia. Et si phlebotometur uena nasi, confert iuuamentum fluxus sang. narium, & tuetur partes superiores à malitia uariolarum. Et est magis facilis super infantes. Et quando necessaria est phlebotomia, & non phlebotometur iterum complete, timetur super ipsum corruptio extremitatis. Et similiter timetur quandoque simile illi super illum cuius assiduatur extinctio. Et oportet ut fiat in eis ciuatio in primis cum eis in quibus est confortatio cum percussione & extinctione absque constrictione nature, & inspiratione sang. sicut cibus, qui fit de iuiuibz cum tamarindis, & cibus factus ex thalhai. ex floribus dactylorum uel ex dactylis immaturis cum primo exire incipiunt, & ex lentibus preparatis in assidubegi. i. preparatis istis floribus dactylorum & lentibus in modum serculi liquidi. Et lenificatio uehementis. Et similiter oportet, ut: sicut cum istis tamarindis, & ex illis, quæ conueniūt, eis sunt cibus factus ex cucurbita & melon bachea alai: immo oportet ut sit natura lenis in principio, & melius cum quo fit lenificatio, est tamarindi. Et si non obedit cum eis, additur super eos siracost cum facilitate, & cautela, aut tereniabio, aut infusio prunorum. Et confert quandoque si in potu datur in principio apparitionis nestigiorum uariolarum poudus. 3. iij. de rob alchedar cū uno de trochiscis camphoratis & syrupus de floribus dactylorum seu de dactylis paruis immaturis est uehementis iuuamenti in huiusmodi hora. Cum ergo additur & pertransierit ægritudo diem secundum, & incipiunt uariolæ apparere, tunc fortasse est infirmitas causa erroris magni, ex eo quod retinet superfluitatem interius, & defert eā ad membra principalia, cum eo quod non sit eis possibile exire, & apparere, & accidit inquietudo, & angustia, & fortasse accidit syncopis immo oportet ut inueniatur superfluitas in huius dispositione cum eis, quæ faciunt bullire, & aperiri opilationes, sicut fœculum, & apium cum zuccaro, & succo eorum, aut decoctio radicum, & seminum. Et fortasse odoratur aliquid de croco. Et aqua ficum est bona ualdeficus enim sunt uehementis expulsiuæ ad exteriora: & illud est una de causis euasione à nocumeto eorum. Et de illis, quæ conferunt ualde in huiusmodi hora, est ut sumatur laccæ abluæ. 3. v. lentium extortitarum. 3. vij. dragaganthi. 3. iij. deinde decoquantur cum lib. 5. aquæ usquequo remaneat quarta lib. unius, & detur in potu. Et de illis, quæ sunt uehementis iuuamenti ad faciendum apparere uariolas,

est ut sumantur ficum citrinarum. 3. vij. lentium extortitarum. 3. iij. laccæ. 3. iij. dragaganthi, feminis scenicali ana. 3. iij. decoquantur cum lib. 5. aquæ donec remaneat ex ea fere tertia, & coeuret, & detur in potu de ea: expellit enim caliditatem à partibus cordis, & prohibet pulsus cordis. Et oportet ut nō approximet ei in hac hora oleum aliquid omnino. Et oportet ut cooperiatur, & elongetur ab aere frigido, & proprie in hyeme: & fiat cum illo illud, quod fit cum sudante: frigus enim oppilat poros, & redire facit materias retro. Et multitudo potus aquæ frigide cum niue. Et iutroitus in domo uenti mala sunt ualde. Et fortasse phlebotomia est mala: propterea, quod repellit, & conuertit illud, quod egreditur, quare caueatur post duos dies, aut tres. Et quando accidit ex cooptura pannorum, & calefactione quasi syncopis, aut exstimatur, quod accidit syncopis, tunc non est extensio ab infirmitate aeris, qui attrahitur proprie, & propter rationem ad odores camphoræ, & sandalorum. Et si non fuerit excursio quin detegatur corpus domui uenti, aut aeri frigido, paulatim fiat: & similiter quando adiutorium est cum calefactione aut dimissione infirmitationis. Et quando incipiunt exire, & non inueniuntur cum exitu alleuatio, immo inueniuntur caliditas inflammata, & lingua ad nigredinem declinans, tunc caue ne calefacias. Et oportet ut tu alienes ab habentibus uariolas, & morbillum, emplastrationem uentris in hoc enim est timor constrictionis anhelitus subito: & quod accidat fluxus neutris malus, & mictus sanguinis. Et in fine eius oportet ut consumatur natura, & cibetur loco lentium sicut sunt lentibus elixatis duabus elixationibus cum renouatione aquæ: & loco lentium acetosarum cum tamarindis, dentur lentes factæ acetosæ cum aqua granatorum, & sumach, aut acresta, aut similibus. Medicinæ autem ingrossantes sang. & infirmitates cum, prohibentes cum ab ebullitione, quæ in initio præcipiuntur, sunt sicut rob ribes, & acresta, & aqua fructuum frigidorum, & syrupus alchedar proprie & syrupus althai. de floribus dactylorum uel de dactylis immaturis & flores dactylorum ipsi seu dactyli ipsi immaturi cum primo exire incipiunt & algiemar. Et syrupus quidem alchedar habet descriptiones plures, quas diximus in antidotario, & dicemus hic de serpiuone fortem, mirabilem: & est illa, quæ fit cum aqua lactis acetosi iterati: & uirens eius est uehementis ualde. Descriptio hæc est. Sume rob alchedar partes. iij. si autem non fuerit tibi præfens, accipe alchedar, & fac ferrare ipsum, & accipe ferraturam eius: aut mole ipsum, & misce molitum eius cum medietate sui de sandalis in acetolo distillato, aut in aqua acresta puræ diebus aliquot: deinde decoquatur in eo decoctione cū facilitate, cum longitudine, donec dissoluatur: deinde exprimitur, & sumantur de succo, & quanto acetum,

accetum, aut aqua acetosæ est plus, tâto est melius: deinde sumatur aqua adog abstracto butyro, mûdificata à sua caseitate adog, aut cum colatione ultima, quæ fit dimittendo residere, aut cum decoctione, sicut est decoctio aquæ casei, donec separetur aquositas, deinde sumatur farina hordei, & fiat ex ea & aqua lactis acetosi focha, & fiat acetosum illud focha, deinde coletur, postea de nouo fiat focha uel renouetur focha ex eo & farina hordei & fiat acetosum, & quanto plus iteratur, tanto est melius. Sumantur ergo de eo partes. v. & sumatur aqua pîrorum de semi. & aqua cydoniorum acetosorum plurimæ aquæ, & aquæ granatorum acetosorum, & aquæ pomorum acetosorum plurimæ aquæ, & aquæ alzarur, & aqua limonis, & aqua prunorum acetosorum, & aquæ dactylorum in primis cum incipiunt apparere expressorum, & aquæ alchondet recetis, & aqua mororum de semi, quæ non maturantur integræ, & aquæ chrysmelorum immaturorum, & acetosorum, & succi agrestis, & succi ribes, & succi præputiorum uitis, & succi rosæ perlicæ, & succi nenufaris, & succi uiol. omnium ana tertîa partis unius, & succi acetosifatis citri. & succi acetosifatis citranguli ana duas tertias, partis unius, & succi coriandri, & lactucæ, & foliorum papaueris humidi, & endiuiz, & ponulæ ana quartâ partis unius succi foliorum salicum, foliorum malorum, & foliorum pîrorum, & foliorum alzarur, & foliorum rosæ, & foliorum uirgæ pastoris ana quartam partis unius, succi barbæ hircinz, & ro. liccarum, & nenufaris sicci, & semi. berberis sicci, & feminis endiuiz, & semi. lactucæ, & balauiliarû, & nenufaris ana medietate decimæ partis unius, & succi mentæ humidæ sextam partis unius, & succi. berberorum humidorum medietatem partis: aggregentur medicinz, & succi, & componantur super ignem, & ponantur in eis de lentibus partes quatuor, & de hordæo excorticato partes. ij. & de sumach partes. iij. & de granis granatorum partes. iij. & decoquantur omnia ad ignem, donec remaneat medietas, deinde dimittatur, donec infrigidetur, & confricetur fortiter, & coletur: & sumatur de camphora ad omne pondus. ccc. drach. pondus aure. i. & teratur camphora: & pulverizetur super fundum uasis dicti cucurbita, aut super fundum ampullæ, & fundatur super ea medicina cum facilitate: deinde ligetur caput eius cum re uehementis fortitudinis, deinde ponatur super prunas donec sciatur, qd forsitan feruet, & concutiat, & ponatur in uitreata, & stringatur caput eius ut non perdat camphora, & luteat: & dosis eius fit usque ad. 3. x. Et de hominibus est, qui ponit in ea spicæ, & zinziberi, & semi. fœniculi, & anisi, & ciperi, & pipæris partes æquales secundum quantitatem, quæ ei uidetur. Et quando egrediuntur uariolæ cum complemento, & pertranlit septimus, & apparet in eomaturatio, tunc necesse est ut rumpantur cum fa-

cilitate cum acubus de auro, & auferatur humiditas cum cottro. Salfio autem necessaria est: & cum uoluerit salire, tunc elonga salitionem ab eis quas erupisti de magnis dolorosis ex propinquo: illud enim facit dolorem immo sali illas, quæ sunt præter eas, & dimitte eas ut non claudatur à sale uia seu orificium ipsarum donec sugant salem suum: & non saliantur ante complementum maturacionis: illud enim fortasse faciet accidere dolorem uehementem, & apostema. Et salfio quidem est res, quæ est necessaria, postquam maturantur: & illud quidem fit cum aqua salis, in qua est uirtus croci. Et si aqua illa est aqua rosæ, tunc est melius. Et aqua in qua decoquuntur tamariscus, & lentes, & rosæ, deinde salitur, est ultima: & proprie si ponuntur iterum in ea camphora, & sandalithæ enim salfio maturat, & exiccat, & facit cadere cum uelocitate. Et suffumigatio cum tamarisco, est iuuatiua ualde. Et in hyeme oportet ut applicetur æger incensionem ex tamarisco. Et quando uariolæ sunt: uehementis humiditatis, tunc necessaria est suffumigatio cum myrto, & folijs eius. Et de regimine bono apud maturitatem uariolarum & magnam uoluntatem exicationis earum, est ut dormiat patiens uariolæ super farinam rizi, & milij, & hordei, & fabarum: & magis conueniens est ut ponas ipsam implendo stratum uel colictram, quæ sit ex tela rara in qua penetret uirtus. Et sulia liquoritæ sunt bona in hoc. Et oleum malum est in hac hora, quoniam prohibet exicationem. Et quando incipiunt uariolæ exiccare, tunc oportet ut liniantur cum adiuuantibus super ipsam, quæ sunt ex medicinis prædictis cum uirtute croci. Et quando accidunt ex uariolis vlcera, confert vnguentum album: & proprie permiscitum cum aliquantulo camphoræ, & rasura radicum canaræ cum aqua rosæ, aut rasura venarum arboris salicis, aut arboris alzarur. Et quandoque confert super aspersere cerussam & lithargyrium. Et quando sunt in naso crustæ, confert ceratum factum cum oleo rosæ puro, cum uirtute cerussæ, & clymæ. Et administratio alicuius olei post exicationem, & apud ulcerationem est bona apud exicationes quidem cum eo, quod facit cadere cum uelocitate, & apud ulcerationem: propterea, quod ipsum est materia emplastri & unguenti. Et unguentum quidem rubrum bonum est ad ulcera uariolarum.

De obseruatione membrorum, & defensione eorum à nocumento uariolarum, & morbilli.

Cap. 11.

Membra quæ oportet custodiri à nocumento uariolarum sunt, sicut guttur, & oculus, & partes superiores narium, & pulmo, & intestina: hæc enim membra sunt illa, quæ ulcerantur. Fortasse enim oculus destruitur, & fortasse

fortasse accidit in eo albugo. in gutture uero fortasse accidit præforatio: & fortasse accidunt nlece ra, quæ prohibent deglutionem in meri: & fortasse perueniunt ad hoc, ut sic illic corrosio perniosa. In superioribus uero partibus narium fortasse accidunt ulcera, quæ stringunt meatus odoratus. In pulmone autem accidit fortasse ex bo-
thor uariolarum, & morbilli, contritio anhelitus vehemens: & fortasse faciunt cadere in phthi-
sim cum ulcerari. In intestinis fortasse accidit
excoriatio cui succurrere est difficile. Conserua-
tio autem oculi melior est ut fiat alcohol oculo
cum almu, & aqua coriandri, & aqua ros. in qua
iam posita sunt sumach, & caphora, & proprie
in primo die, & cū almu solo. Ex similiter fiat al-
cohol cō alcohol nutritio ex aqua coriandri, & aqua
sumach posita in ea camphora, & fucus pulpe
granatorum est bonus iterum in principio. Cum
uero apparent, tūc facere alcohol cum aqua ros.
& camphora est magis conueniens. Et dictum
est, qd facere alcohol cum napa alba est bonum
in hoc. Et oleum de fistulis est de eis quibus un-
tur mulieres in regione nostra, post uariolas, &
euentum nocuenti in oculo, & eradicat caligine
si fuerit, & resificat osulum. Edcollyrium
album est bonum naide apud apparitionem bo-
thor. Conseruatio autem oris, & guttura est si-
cut suctio granatorum, & suctio granorum eius
in principio: & suctio mororum de seni, & garga-
rizatio cum rob eorum: & proprie quando con-
queritur de dolore in eis: & tunc oportet ut lam-
batur de rob eorum aliquid post aliquid. Sed su-
periores partes narium cū epithematione ex me-
mithe, & sandalis, & rob acreste, & aceto, & nari-
bus attrahere acetum solum est vehementia inua-
menti. In conseruatione uero pulmonis non est,
qd sit licet lohoc ex lentibus lenis cum semine pa-
paueris. Intestina autem plurimum quidem opor-
tet non conseruare post iniectionem cum stypti-
cis. Et cum incipit solutio uentris in fine agri-
tudinis, curetur cum trochiscis de spodio in rob ri-
bes & trochiscis de semine acetosæ.

De eradicatione vestigijs uariolarum. Cap. 12.

IN hoc quidem loquimur uice alia, cum loque-
mur de decoratione: nunc uero dicemus illud,
quod est magis conueniens & magis pertinens.
Ex de eis, quæ eradicant uestigia uariolarum sunt
radices arundinum, exiccatarum & farina faba-
rum & rasura ligni Kalef, & rasura arundinis sar-
cocollæ, & semen melonis, & cortices eius exic-
catæ, & rizi ablutum, & aqua hordei, & albumen-
oni, & creta rara uel lutum, & lithargyrium: &
zuccarum tabaret, & amyllum, & amygdalæ dul-
ces, & amygdalæ amaræ. Ex de oleis oleum de li-
lio, & oleum de fistulis, & adeps asini cum oleo
ros. & quæ sunt ei similia: & aqua quæ fit in ungu-

la arietis, quæ affatur est ultima. Et de illis, quæ
sunt fortiora, est spuma maris, & lapis piperis, &
costus, & amoniacum, & thus, & sapo cum bau-
rach, & ossa uetusta adusta, & semen raphani. fa-
rina raphani exiccata, aristolochia, lupini. Et de
cibis rectificantibus colorem sunt granata dul-
cis, & cicer, & uinum bonum, uicelli ouorum for-
billum, ius gallinæ, & alcubugi, & alidutagi impin-
guati. Et oportet ut assidue habens ea balnea-
tionem. Ex de compositis est vt funis ossium ad
storum, & stercoris onini antiqui, & testatur seu
uasorum ex terra nouorum, & amyli, & seminis
melonis, & rizi abluti, & ciceris omnium ana par-
tes. x. & granorum alben, & lupinorum, & costis,
& aristolochiæ longæ omnium ana partes. v. & ra-
dicis arundinis siccat partes. xx. fiat ex eis linimen-
tum cum aqua melonis, aut cum aqua cucumeris
syluestris, aut cum aqua hordei, aut cum aqua sal-
barum, & liniatur cum eo membrum, & ablatur
in mane eadē decoctione niol. Aliud testatur seu
uasorum ex terra nouorum, ossium antiquo-
rum, radices arundinis persicæ, lupinorum amy-
li, seminis melonis, rizi abluti, granorum alben
costis partes æquales. fiat ex eis gamera. Et iterum
lupini, & cicer nigrum liniatur cum eis.

De febribus apostematum. Cap. 13.

IAM sciisti dispositiones febrium, quæ sequun-
tur apostemata apparetia: & qd sunt secun-
dum plurimum de genere febrium dici, cum apo-
stemata ista secundum plurimum non perueniant
ad cor, nisi cum calefactione sua absque sua putre-
dine: & plurimum quidem horum est à causis pri-
mitiuis. Cum autem peruenit putredo eorum ad
cor, propter suam magnitudinem, aut propter
suam propinquitatem, fit febris fortasse non de
genere febriū dici. Et plurimū quidem similitudi-
horum non sit nisi à causis antecedentibus corpo-
reis, & repletionalibus. Et quandoque sunt ex ul-
ceribus, ad quæ attrahuntur materię malignæ: &
retinentur in carnibus mollibus. Febres autem,
quæ sequuntur intrinseca apostemata non existi-
mantur, qd fiant ex applicatione calefactionis ad
cor sine putredine. Et detiores quidem febres
sunt ab apostematibus intrinsecis quando sunt
ex genere erysipæ in quibusdam uisceribus, &
uehemens sit dolor, & sitis, & inflammatio: & si-
gnificant ea significationes permissionis cholæræ
plurimæ cum sang. Ex hæc apostemata intrinseca
sunt sicut apostemata cetebrī, & uelaminū eius,
& sumachauris, & gurturis quandoq; & in uela-
mine, quod sequitur pectus, & hepate, & tene, &
vesica, & matrice, & intestinis, & quæ sunt ei si-
milia. Et diuersificantur febres eorum in nehe-
mentia & debilitate, secundum propinquitatem
cordis, & longitudinem. Ex eorū iterum febres,
quæ sunt in membris carnosīs est febris nehemē-
tior.

undum paroxysmos phlegmaticæ: & tres quartanæ in paroxysmis phlegmaticæ. Et quandoque componuntur tres de febribus tertianis. Si igitur fuerint secundum coalternationem, erit paroxysmus in die. iiij. uehementior: quoniam pertinet ei periodus dici primi, & inceptio diei tertii: & similiter in die quinto. Et similiter hæc hemitritus, sicut compositio duarum tertianarum, similatur paroxysmis phlegmaticæ. Et propter huiusmodi non oportet, ut tota occupatione occupetur cum paroxysmis, immo oportet nec petur cum accidentibus. Et ex eis, quæ accidunt quando fuerint febres istæ tertianæ puræ sunt ut festinant paroxysmi earum ad breuitatem ita ut destruantur uel diminuantur debilius earum prius. Et quandoque significat compositionem reditio horripilationis post quietem. Et turpe quidem est medico sciendi significationes cuiusque febres, & accidentia eius, ut non percipiat compositionem à primo die, aut secundo. Et compositio febrius hæc cum febre putredinis, est ex illis, quæ ualde ambigua sunt: quoniam ipsi uident interpolationes, & inceptions rigoris, & horripilationis, & reditioem sudoris si fuerint, & horas particulares, quare existimant, quod sint illæ febres putredinis tantum inseparabiles, aut compositæ ex continua & interpolata. Et quandoque continuatur compositio ita, ut appareat febris una continua similis, quæ simulatur syncho: & tunc quidem non est excusatio reditiois ad significationes. Et si fuerint paroxysmi breues, non consistit eorum continuatio, nisi propter rem magis de multitudine numeri eorum, & proprie in eis in quibus eorum interpolationes sunt longæ. Et quando componuntur febres diuersæ, sicut hemitritus, eradicatur acutior ex eis, & remanet chronica pura, siue sint duæ interpolatæ, aut duæ continuæ: aut interpolatæ & continuæ. Et quandoque componitur cum hemitritus alia tertiana, & phlegmatica, & melancholica. Nam si est cum tertiana, eradicatur tertiana, & purus fit hemitritus: & si est cum phlegmatica, aut melancholica, eradicatur hemitritus, & depratur phlegmatica, & similiter melancholica. Et quæ accidunt compositio in eis secundum modum alium: est, ut componatur interpolata & continua diuersi generis: aut conuenientes ambo in eo: aut conuenientes in specie, sicut tertiana periodica cum tertiana inseparabili: & sicut componuntur duæ interpolatæ, similiter componuntur duæ continuæ. Quidam autem existimauerunt, quod duæ continuæ non componuntur, sicut duæ tertianæ: quoniam quidam materia est intra uenas, non est possibile ut diuersificetur illud in quo accidit putredo: putredo enim est sparsa in toto. Et hæc sententia non est de illis, quæ necessaria sunt procul dubio apud me, quoniam postmodum incipit procul dubio ex loco, deinde spargitur, deinde currit in

duæ uehementius, & teporis secundum uiam uel tempus putredinis primæ: & secundum eam sunt ei motus. & non elongatur quin accidat putredo secunda, cui sit dominium cum illa, quæ sequitur aliud, immo aggregatur in ea ut incipiat, & ut sequatur simul: quare erit ei gradatio teporis & uehementiæ secundum inceptionem eius. Et species quidem compositionis febrium sunt tres rursus, & coalternata, & communicans. Et interita est, ut ingreditur una earum super alteram. Et coaltere uata, ut ingreditur post eradicationem eius. Et communicans est, ut incipiat cum ea. Et cum uideris sibi compositam, & est in ea rigor, & non sudor, & fortasse accidit in rigoribus plurius sed unus: tunc testifica compositionem in ea. Et similiter cum uideris in conclusa superfluitatem in frigore extrematum, & retractione caloris ad intra, sed parum de eis ambobus fortasse accidit inconclusa.

De hemitritus. Cap. 17.

Hemitritus est febris composita ex duabus febribus, quarum est una tertiana, & altera est phlegmatica: & fit in die uno paroxysmus tertianæ, & quotidianæ simul. Aut secundum semitâ communis, & inuentionis. Aut secundum semitâ coalternationis, & uicinatis. Aut secundum semitâ introitus. Et de diuisionibus difficilius ad cognitionem est prima, deinde secunda. Et quæ sunt febres duæ continuæ, quæ duæ putredines sunt intrinsecæ: & quæ duæ sunt periodicæ, quæ eradicatur, quæ duæ putredines sunt extrinsecæ: & quæ est continua cholerica, & eius putredo est intrinsecæ: & phlegmatica est extrinsecæ: & quæ est non extrinsecæ. Et quidam ponunt hemitritus puri febrem compositam, quæ fit ex tertiana extrinsecæ, & phlegmaticæ intrinsecæ: & illa, quæ est præter eam, nominant non puram: & non est illud de illis in quibus superflua occupatio sit habenda. Et fortasse antecedens ad putredinem est cholerica: & fortasse antecedens ad putredinem est phlegmatica: & fortasse ueniunt simul. Et iterum quæ est materia faciens febrem phlegmaticam magis dominans, & quæ est materia faciens febrem cholicam magis dominans: & quomodoque sit materia phlegmaticæ ponit paroxysmos cholicæ longiores, & tardioris exitus: & materia cholicæ ponit paroxysmos phlegmaticæ & cōuerso. Et fortasse extenditur hemitritus longo tempore, usque ad vii. menses, & supra. Et quæ sit ex hemitritus ægrotudo acuta. Et quandoque est hemitritus de febribus magis in deficientibus, quoniam perducit ad hæc, & ad ægrotudines chronicas, & difficiles.

Signa hemitritus. Cap. 18.

Magis proprii signorum eius, & primum eorum, licet necessaria sint signa alia est ut sit spatium huius febri in uno duorum dierum lon-

gius spatio tertianæ, & magis quæta: deinde fit in die alio leuioris paroxyfmi, & paucorum accedentium. Et quandoq; iteratur in ea horripilatio fecundum plurimum & liquotes: propter illud, quod accidit de pugna duarum materierum, aut introitu unius earum super alterâ. Et fortasse accidit hæc iteratio tribus uicibus, aut quatuor: & iam calefiunt membra aliqua horripilatione fixa adhuc. Et ex hac quidem, quæ est hemitritæ, corpus non mundificatur integre. Et quicquid sunt principium eius, & augmentum ipsius uehementis commotionis: & proprie quando fuerit communicatio: aut fuerit intrans in huius hora, tunc non sunt horripilationis reditus. Et est status longinquus. Et cum existimatur, quod corpus iam calefactum est, & febris habet statum, inuenis horripilationem redeuntē: & ista accidentia sunt propter pugnam humorum. Et status quidem huius ægitudinis in horis particularibus, & uniuersalibus est amestatum phlegmaticæ, & uelocior status eius, & tardior statu cholericæ, quoniam caliditas non expanditur nisi cum labore, & proprie in primis. Et fit fortis eius acuitas apud statum. Et similiter fit declinatio longa propter illud, quod accidit de stationibus quæ efficit relaxatio unius duarum materierum cum alia. Et parum quidem tepescit cum sudore. Et in hac febre diutius de diebus eius est similis primo, & quartus secundo. Et quicquid: cadit significatio super hemitritæ, ea modis diuersis: nam quandoq; accidit ex cōsuetudinibus: & quandoq; accidit ex accidētibus. Et casus cōsuetudinum est, sicut si in corpore hominis multiplicetur cholera, & putredo eius, deinde uratur delicijs, & dimittat exercitia: & utatur cibis de speciebus regiminis generantibus phlegma: Aut multiplicetur in corpore hominis phlegma, & putredo eius, deinde exercitetur plurimū, & utatur eo, quod generat cholera de speciebus regiminis, aut fecerit necessarium ætas illud in eo, ita ut fiat adolefens uel iuuenis post pueritiam, & dominiū humiditatis: aut fiat senex post iuuentutem, & acuitatem complexionis. Et accidentibus vero sicut est pulsus, & vrina, & egressio eini, quod egreditur ex vomitu, & egestionē, & dispositio digestionis: & ligua eini, & dispositio sitis, & dispositio tactus, & dispositio horripilationis & rigoris: & dispositiones horarum & paroxysmorum. Pulsus autem fit in ea minoris magnitudinis, & uelocitatis, & frequentior, quam ille, qui est in tertians, & contrariæ earum sunt minores, quæ illæ, quæ sunt in phlegmatica. Vrina nero est tardæ digestionis. Et nominis est permixtus ex cholera, & phlegmate. Et egressio est permixta ex cholera, & phlegmate. De dispositione anrem calefactionis, & frigoris, & sitis, & horripilationis, & horarum paroxysmorum iam locuti fuimus, quod oportuit. Et non expectatur statim super dominantem duorum humorū nisi per uincentem

ex significationibus: nam si dominatur phlegma sunt paroxyfmi longiores, & horripilatio minor, & coarctatio, & proprie in pulsu fortior, & extremitates sunt uelociores ad fuscipiendū frigus in principijs ægitudinis, & tardioris mundificationis a suo frigore, & sitis est minor, & uomitus cholera minor, & urina uehementioris albedinis & eroditatis, & sudor minor, & ætas pueritias aut senectus, & complexio corporis significat eam, & similiter consuetudo, & quæ currunt cum ea. Et si dominatur cholera, sunt paroxyfmi breuiiores, & extremitates uelociores ad calefactionem, & sitis, & uomitus cholerae plus, & sudor magis exuberans, & fortasse declinat ad horripilationē, quæ est sicut rigor, & fit urina uehementius tincta, & ætas est iuuenis, & complexio corporis quandoq; significat eam, & similiter cōsuetudo, & quæ currunt cum ea. Et quando æquantur duo humores æquantur significationes: & est horripilatio pura completa, & non dimiuta neque perueniens ad diminutionem. Et quando cōpositio est inter interpolatam, & continuam, & est illa quam plures hominum appropriant nomine hemitritæ puri, & est continua ipsa phlegmatica, tunc est rigor debilis, quoniam materia extrinseca est cholericæ, & non est ei cōtrarietas ex parte phlegmatis extrinseci cum ea, in eo quod necessarium est de rigore, sed est debiliior, & fortasse iteratur in ea frigus & horripilatio ita, ut faciat errare in statu, sicut seipsa. Et multiplicatur in ea caliditas uiscerum, & uentris, cum frigore extrinseci. Et fit pulsus uehementioris paritatis & raritatis. Si autem continua est ipsa cholericæ, non fit rigor, neque magna horripilatio: & fit pulsus maior, & uelocior: & angustia uehementior. Et si componitur de duobus continuæ, non erit rigor omnino. Et accidit tertianæ continuæ ut alienetur ante alienationem phlegmaticæ, licet non sit eius reditio ante eius reditionem.

De cura hemitritæ. Cap. 10.

Necessarium est in hemitritæ, ut uehementem habeas sollicitudinē in euacuandō materiam secundū species euacuationis ex solatione uentris, & vomitu, & prouocatione, & sudatione, plusquā uehementia, quæ est percutientia. Et cū solutio oportet ut cōueniat digestio, nisi sint ex genere, quæ leuiunt naturam, & soluant, & non inquirant. Sicur aqua luleb cum gelenibin, si fuerit illud, quod superat phlegma. Et sicut receniabin, & siracost, & infusio tamarindi, & syrupus molli dominans fuerit cholera. Et sicut quod cōponitur ex istis, si fuerint duo humores quasi pares. Et post apparitionē digestionis, si euacuatio fiat humoris cū fortibus, pertransit. Et uomitus oportet ut sit iterū secundū humorē dominatē, aut ex aqua phani cū syrupo acetoso calido: aut syrupo aceto

so cū aqua calida. Et p̄uocatio oportet ut fiat cum eis in quibus est equalitas. Et cum festinat in potando decoctiones ante digestionem, tunc metur siccum. Medicinæ uero iuuauit in pia perueniente ad statum, ad restituendam materiam, & maturandam ipsam, & succurrendū nocuentis eius, ex singularibus est absinthium: uerū post septimum, & apparitionem digestionis, ita ut sit romanum, quod ex ipso bonum est. Et cum tu festinas cum eo, mouet humores, & non euacuat eos: & facit accidere angustiam, & tristitiam, & nauseam: deinde reuertitur super eos cum sua amaritudine, & exicat eos, & stypticat eos, quare facit eos pigros. Et Gal. quidem & qui ante eum fuerat curauit eos cum aqua hordei in qua est nirtus piperis. Et dixit quidā primotum medicorum, quod Gal. cecidit in errore maximum, & permansit, ubi oportet ut miretur de eo: & non scuit, quod piper inflamat febrē, & aqua hordei pigram efficit materiam. Et iste quidem contradicitor errauit errore, qui non appropriatur in hac intentione, immo canon datus in adiutorio naturę, quando preparatur ad restituendum huiusmodi materię, est cum medicinis compositis et infrigidantibus, & calefacientibus, ut discerneretur natura inter duas uirtutes, quare occupatur infrigidantium cum febres, & paribus cordis: & calefactiuum cum materia. Et quis est, qui curet hemitritum absq; hoc? Et si natura non est fortis ad discernendum, tunc non prodest curatio quocumq; modo fiat. Et errauit in alijs modis, id allatūne quorum non est necesse nos incedere, uia prolongantium. Et iste quidem contradicitor dixit, quod oportet ut administrantur subtiliantia in quibus non est fortis calefactio, sicut apium, & anethum, & non scuit, quod possibile est, quod piper non laent cum paucitate eius: ut frangatur eius calefactio, & non abbrevietur eius subtilizatio a subtilizatione apij plurimi: & sic aqua hordei adiuuat ipsum in faciendo: peruenire uirtutem eius, & destruendo superfluitatem eius, & in fundendo seu lenificando materias ut alleuietur uel facilis fiat penetratio uirtutis eius in eis. Amplius mirabile fuit, quod ipse posuit Galeum de illis, qui ignorant, quod piper inflamat febrem, & nominat ipsum de illis, qui obliuiscuntur ab hoc, ubi iudicat de hoc. Composita uero

(de medicinis quibus oportet uti in hac hora, sicut trochisci de abanthio, & trochisci de radis. Trochisci leues boni ad hemitritum. Recip. ros. radices liquiritie aniborum ana. 3. iij. terentia bip. 3. iij. spicz, succi absinthij, spodij omnium ana pondus. 3. ij. fiant ex eis trochisci. Trochisci alij ad inflammationem. Recip. ros. 3. vi. seminis acetosę gummi omnium ana. 3. iij. amyli pondus. 3. iij. berberis, spodij, seminis portulacę omnium ana pondus. 3. ij. draganthis, croci, spicz, reubarbi, omnium ana. 3. i. camphorę pondus tertię. 3. i. fiant trochisci. Trochisci alij boni habentibus hanc febrem, & proprie quando conquerruntur cum hoc de solutione uentris, & tussi. Recip. spicz aromaticę, sylloaloes, croci, berberis, & succi eius omnium ana. 3. iij. reubarbari. 3. iij. spodij, ros. cum capitibus suis, laccę, gummi torrefacti, Karabe omnium ana. 3. v. se. acetosę torrefacti. 3. vi. luti romani. i. e. sigillat. 3. vii. fiant trochisci. Descriptio alia bona. Recip. ros. rubearum. 3. vi. berberis, gummi, seminis acetosę omnium ana. 3. iij. spicz, eupatorij, spodij, amyli, seminis portulacę, granorum cucumeris omnium ana pondus. 3. ij. seminis endiuicę, seminis cuscute omnium ana. 3. i. l. succi liquiritię. 3. i. laccę, reubarbari, amborum ana. 3. i. aggregentur illa, & fiant trochisci. Pilule bonę ad hanc ægritudinem, & omnes chronicas, & febres ledentes ubi seera, & proprie quādo materia phlegmatica est magis uicēs. Recip. aloes, masticeis, myrobala. 3. rum citrinorum, reubarbari, succi eupatorij, succi absinthij, ros. rubearum omnium ana partes æquales, croci partem inediā, fiant pilule cum aqua endiuicę: & sit dosi. 3. ij. cum syrupo acetoso. Descriptio bona conueniens post digestionem. Recip. aloes, masticeis, succi eupatorij, succi absinthij, ros. omnino equaliter, croci. 3. fiant forpventur pilule cum aqua endiuicę: & sit dosi. 3. ij. cum syrupo acetoso.

De recidinatione. Cap. 30.

Recidiuatio est deterior radice: & consilium quidem est ut in ea non fiat festinatio ad curandum, donec manifestus sit modus ægritudinis: nam secundum plurimum est febra.

DE FEBRIBVS

R A S I S

L I B E R.

De prologo tractatus. Cap. 1.



FEBRICITANTES & prae-
pue acute, nō solū necesse est,
ut medicus sepe uideat: sed etiā
vt ei semper assistat. Nos tamē
ī hac parte ponemus summas,
& aggregationes vicem pūclo
rū, & extremitatū cōtinētes, quāz utiles erūt pru-
dētī, & vigilātī, licet ī hac doctrina nō studuerit
ne sit secūdū eā operatua. In pluribus enim me-
dicorū cōsilio nō indigebit, atque errātiū per
eas cognosceat errorē, & perfectiōnē, necnon di-
minuti diminutiōnē: hac tam parca paucis comprehē-
demus verbis, & distinctē, ac compēdiōse, quē
aduodum in aliis partibus huius libri peregrina-
nus: & dimittemus valde subtilia, & profunda
huius doctrinae perscrutari: hoc enim indiget,
qui multa vult inuestigare. Ad hoc uero persci-
endum diuino iuuabimur auxilio.

De febre aphimera. Cap. 2.

HAEC febris non habet periodos, sed est unius
periodus tantum. Cuius propria significa-
tio est, quod neque cum rigore neque horripila-
tione incipit: & quod antequam accedat praece-
dat eā causa diuersa ab eo secūdū quod currit cō-
suetudo: sicut superfluous labor, aut ira: aut angus-
tia: aut sollicitudo, aut ulni puri, uel multi pota-
tio: aut quia diu stetit ad solē aut sub aere frigido
aut ī aqua frigidissima: aut quia calidū apostema
quod accidit propter casum vel percussione[m]
in corpore praecelsit, aut sit propter dolorē qui
in aliquibus contingit membris, aut propter reple-
tionem ciborum multi nutrimenti, aut cros-
sorum opilantium, aut uehementis caliditatis,
aut propter forte fastidium uel propter frequen-
tem uentris fluxum, & uehementem, aut propter
multam moram in balneo, aut quia balneauit se
in aqua inconuenienti, ut sunt aquae naturaliter
calidae: aut quia non balneauit se ut consueuerat;
aut quia medicinas calidas fuspisit: uel quia mul-
tum comedit: aut propter corizam, & rheumatismum:
aut quia diu a comestione abstinuit. Vrina
quoque in hac aegritudine, neque in colore,
neque secundum substantiam, neque secundum
odorem multum mutatur ab hoc quod consue-
uerat. Calor etiam cum corpus aegri tangitur:
neque superfluous, neque mordacius uis sentitur.
Cum autē aegritudo minui incipit sudoris proue-
nit multitudo, aut si non aliud cutis saltem hu-
medatio aut resolutio, deinde sedatur perfectē.
In hac praeterea febre, neque multus est timor:

neque est mala. Quāq; in aliis malas trāsī febres
cū & ipsius regimine, & curatiōe error contin-
git. Cum ergo aliquis hanc febrem causa laboris
incurrit, oportet vt cū minui febris eius coeperit
egger balneum ingrediatur, & in domo media se-
deat iuxta porta: per quam reditur ad domū pri-
mam quae ante faciem ipsius aperienda est. Ad
ultimum quoque locus sit talis in quo delectetur,
& ne villo modo fudet si possibile est: neque in-
flammetur, neque aestuet, neque cogatur anhelare
nehelementer. Sit autem loca talis in quo ipsum
diu morari sit possibile, ubi & semicupium tepi-
dam continens aquam in qua delectetur in-
grediatur. Corpori uero ipsius aquae tepidae
multitudo superfundatur, & praematur mollitie:
deinde corpus ipsius abstergatur, & ex oleo ui-
lato tepesfacto inungatur, & maxima sollicitudo
adhibeatur praecipue circa iuncturas, & colli
spoudiles, & dorsū. Postquam autem hoc aliqui-
bus hōia factum fuerit: iterum in aquā tepidam
mittendus est: ex ea super ipsum aliqua hora fun-
dendum: deinde redcūdum est ad inungendum.
Lōgitudo quoque fundēdi aquā super eū, & inun-
gēdi ex oleo, & breuitas sint secundū laboris ue-
hementiā ac ipsius debilitatē. Post hoc uero eggre-
diatur balneū: & utriatur ex oleribus, & fructi-
bus recentibus, & carne pullina, & hedina, & pi-
scibus quae vocantur erie, & ipsi sunt boſſe, &
abstineat a cibis calefactibus. Et si nō cōsueuit
uinū bibere sumat in potu iulep factū de zucha-
ro tabernat, & aqua rosata. Si aut solitus fuerit bi-
bere uinū: sumat ex eo mōius solito, quod tamen
plua solito sit mixtum aqua. Lectua quoque eius
mollior sit quā prius, & plus solito dormiat. Et
si post aliquid de uestigiis laboris, & lassitudinis
supfluerit: ad balneū, ut diximus, & totū regimē
sedcūdū est, donec se habet ut solebatur. Si autē
hac febris cū uigiliari aut multae sollicitudinis cō-
tingat egger post quā ipsa minui inceperit balneū
ingrediatur, & si in loco balnei. f. qualē supra di-
ximus, nec cibetur oīno, sed aqua tepida proprie
super dorsum ipsius fundatur, & nutriatur ex ci-
bis similibus his quos praediximus, ut uinū si bibe-
re cōsueuit, mesurate sumat, & remoueatur ab
hōi soliciu dine interpositione uerbosū, & ali-
cuius iocūditiat, atque alicuius ludicri. Oleum
quoque violatum olfactat, & dormiat in lo-
cis suauiter redolentibus, & in strato molli.
Quod ex multa tristitia: aut ex multa ira fiat hęc
febris balneum cum minui coeperit ingrediatur,
& in-

& inter semicupium aquam continens calidam in qua deleſcitur, & aqua etiam ſuper ipſum in domo balnei exiſtente copioſe fundatur. Ipſe præterea i loco balnei moretur ubi neq; a uento neq; a frigore tangatur, aut moretur in prima domo balneum in qua ſandiu ſit donec, cutis molleſcat, & rubeat parum: deinde aquam frigidam ſubito ingreditur: & ab ea citiſſime egreditur. Cumque egreſſus fuerit aqua roſata ipſius capiti ſuperfundatur: & peſtus ex ſandalis & aqua roſata & camphora linatur: & in potu granati mozi ſuccum ſumat & ei ſimiles potus: aut rob quod ſit de ribes, & macianorum acetorum & acetuſtatis citri: & nutriatur ex oleribus frigidis & aceto: & ex oleo conſectum cum zucharo: & ex oleo amygdalino. A uino autem omnino abſtineat: niſi maximum inde conſequatur nocumẽtum. Quod ſi inde conſequatur cum ſucco granati milceatur, & ſuper niuem inſrigidetur: & ex aqua frigida multum bibat: & cum biberit uinum: granatũ acetofũ in aqua frigida abluta conueat, deinde aqua roſata ſuper ipſum roretur: & ingenietur qualiter eia ita quantumcunque poſſibile fuerit ſedetur. Cum autem hæc febris ex multo uini potatione ſuperveniat, aut ſortis & puri. Aegro aliquid de potibus quos nominauimus ſimplices, ſcilicet abſque aliterius rei commixtione dandi ſunt cum aqua frigidiſſima mixti ex quibus non imperioſe ſed paulatim bibat. Cumque febris ſedata fuerit balneum ingreditur, in quo moram faciat in domo temperata, ſanq; ſicut offendimus: & multa aqua ſuper ipſius caput fundatur. Ex nutriatur ex capitula docia xerina inſrigidatis, & his ſimilibus ex rebus frigidis mixtis cum ſucco grauato- rum, & ſucco ribes: & uix acerbis & ſucco & ex piſcibus qui uocantur azzæ coctis cum aceto & olſciat oleum uiolatũ: & dormiat diu. Cumque expegeſcatus fuerit, balneum iterum ingreditur, & ad prædictum redeat regimen. A uia præ autem omnino abſtineat: & in potu rob de fruſtibus ſumat. Si autem in capite fuerit grauitas, & in oculis rubedo & extenſio ſanguis extrahatur, cum phlebotomia, & uentofia. Eiusque regimen totum ſit ut diximus. Venter quoque ex ſucco fruſtium ſoluatur. Cum uero aliquis hanc febrem incurrit ex multo motu aut deambulatioe nimia ſub ſole: aqua roſata pars una ſumatur & olei roſei pars media aceti partis unius quarta, & in ampullam niueam mittantur: & concutiantur donec inſpiſſentur, & ex eis in niue inſrigidatis ſuper ipſius ſinciput paulatim fundatur. Panis quoque eia inſuſus in niue inſrigidetur & a principio acceſſionis uſque ad quietem capiti ſuperponatur. Poſt uero quiete febris æger balneum ingreditur: & ſit in loco temperato ut diximus: ubi aqua tepida ſuper totum corpus ipſius, & præcipue ſuper caput

fundatur. In potu autem ſumat frumentum fractum coctum in aqua: quod tamen prius ſit multoties ablutum cum aqua calida: cui poſtquam coctum fuerit multa aqua in niue inſrigidata admiſceatur ex qua æger niſq; ad ſatieta- tem ſumat: Cum uero febris ceſſauerit, ex cibis quos prædiximus nutriatur. Cum autem aliquis hanc paſſit febrem eo quod ſub frigido aere longam ſecit moram: totum corpus eius a principio ſebris uſque ſedetur ſepè fricandus eſt, non tamen duriter. Cumque febris ceſſat domum calidam balnei ingreditur, in qua moram faciat, donec ſudor egrediat. Poſtquam autem ſudor egreſſus fuerit, corpus ex oleo tepido cum frictione inungatur: donec ſudoris multitudo egrediat: deinde ex aqua calida locus abſtergatur, & indutus egrediat: & eo uſque dormiat donec iterum ſudet. Poſt hæc in conſeſſione cibos ſumat ſubtiles ex quibus, q̃ leue eſt. i. parũ comedat, & cũ meſura ſumat. Vinũ uero forte bibat, & ſi ex febre, & fractione aliquid redierit ad balneũ, & ad totũ regimen q̃ prædiximus redeat dõ eſt. Si quis uero hunc febrẽ propter aquarũ naturam calidas patiatur: ſi fuerit aqua illa tales ex admixtione ægeri, aut ſalis, aut ferri, aut aliarum rerum que corporis ſuperficiẽ exasperare, & contrahendo rugare conſueuerunt: eodem eſt regendus regimine quo iſi qui hanc incurrit ex frigore. Oportet tamen ut locus balnei in quo hic in domo calida moratur ſit temperatus: antea portam ſuam: & ſit porta ſecondæ domus corã faciẽ ipſius aperta: & aqua calida ſuper ipſum fundatur: & in ea ingreditur & inungatur cum oleo, & iteretur effuſio aquæ calidæ & introitus in eam: & fricetur multum uiciſſim donec pori aperiantur & corpus tẽmeſcat & febris ſedatur: & corpus rubeum fiat. Quod poſtquam factum fuerit egrediat, & indumentis ſuis indutus dormiat, deinde ex his que prædiximus nutriatur. Cum autem aliquis hanc febrem incurrit ex commiſſione calidorum ciborum: oportet ut poſtquam febris quieuerit, ex aqua ordei multum bibat. Cum nutritio ſit poſt febris ſedationẽ cibis cum aceto conditus, in quo non eſt caro. Ex eſt ingenandũ qualiter eia uenter ſolui poſſit ex prunis & ramanindis, & zucharo tabaræta ſyrupum quoq; acetolum ſimplicem de zucharo bibat: & comedat granata mura & acetofa: & omnia alia poma his ſimilia. Ab omnibus uero cibis, qui corpus calefaciunt abſtineat: febris enim hæc propria, & illa que ex ſortis uini potatione accidit utraq; in putridam cito mutatur febrem. Cum uero aliquis hæc febre laborat, eo quod plus ſolito comedit, aut cibum multũ nutientem, aut croſioris nutrimenti ſumpſit: quia hæc ſpecies xphimeræ plerumque adeo per multos dies ſit manſua, ut ſinochus eſſe uidetur: nõ eſt expectandũ donec febris a corpore recedat

immo uenter ægillico ex succo fructuum sicut nominauimus est soluendus, & syrupus acetosus est fumendus, & ex pisana tantummodo nutriendus. Sed postquam febris alleviari uidetur aliquantulum uenter in balneo est mittendus: in quo non longam facias moram: & sic in aqua tepida & ex ea super ipsum fundatur: cois etiam corpus ex sulphure diu fricari conuenit. deinde ex aqua lotus egrediarur. & sic ad sum redeat regimen, ad uentris scilicet solutionem ex succo fructuum & ad syrupum acetosum in potu sumendum, & ad frigidum ex aqua ordeis: cuius febris parum alleviari ceperit balneum iterum ingreditur in quo longiorem quam prius faciat moram: & plus balneetur secundum quod febris dimitti uisa fuerit. In principio tamen huius febris absque magna cauela balneum minime ingredi debet: Obseruandum est enim ne in eo laborem patiatnr. & ne corpus calcias. Quod si contingat ipsum in balneo horripilationem pati: illico est extrahendus: quod etiam in omnibus quibus post febrem ephemeram in balneo huiusmodi accidit horripilatio est obseruandum: hoc namque accidens non eam æphimeram patit: sed putridam potendit. Ex his autem per quæ singulatim & absque ulla ambiguitate febris cognosci potest æphimera cū alijs significationibus, quas prædiximus, est ut ægro cū se balneauerit, non superueniat horripilatio. Cū enim hæc species ephimere cognita fuerit, & uenter solutus, & urina pronota, & nutritio subtiliata fuerit: est ordo intrandi balneum, & balnandi secundum febris diminutiones obseruatus fuerit adeo bene sanabitur: quod in febre putrefactionis minime transibit. Si autem in regimine error acciderit in febrem mutabitur putrida: quæ erit acuta, & sinocham scilicet conclusam. Si quis uero hæc patitur febrem quæ in comestione una aliquid comedit ex quo grauior ceperit: si grauitas in superioribus sentitur uentris, euomat illud, antequam supponatur collirium: si in inferioribus sentitur grauiorem. Cuiusque passio minui ceperit, balneetur & somnus augmentetur, & nutritio subtiliatur: & per aliquot dies a labore abstineat, & ex aliquibus cibis qui uentrem parum soluant moueatur. De his quos in hoc nominauimus libro, ubi de sanitatis custodia tractauimus. Qui autem hanc incurrit febrem causa apostematis quod in aliquibus fieri contingat membris ex parte contraria minuendus est, & apostema illud infrigidandum, quemadmodum in capitulo de calido apostemate ostendimus. Balneum nullo modo ingreditur: neque bibat uinum, donec apostema illud fedetur, & eius igneitas reprimatur. Venter uero soluatur, & calor extingatur, sicut docuimus, & cibis infrigidatibus nutriatur. Cum autem aliquis hac febre laborat causa doloris, qui in quibusdam contingit membris: quæ

sit causa doloris considerandum est. Si enim est apostema calidum aut crossa uentositas, aut humor mordacior, aut quia multum comedit aut siccitas magna quæ loco dominatur, aut complexio mala calida aut frigida simplex: aut com materia ad ipsam causam remouendam est omnino intendendum quemadmodum in capitulo de causis dolorum & eorum curis docuimus. Febris enim illico sedabitur cum causa remota fuerit. Cumque febris quieuerit: egger leuiter balneetur: & ex cibis quorum fecimus mentionem nutriatur. Qui uero hanc incurrit febrem: quia balnei usum uel conserueuerat prætermisit: in balneum mittendus est, donec febris reprimatur: ubi multum de dolores aq. tepidæ super eum fundenda est. Ipse quoque ex sursum & semine melonum & pauco nitro diu est fricandus: deinde egrediarur: & ex cibis exinguentibus nutriatur & uinum album & clarum bibat: adde temperatum. In mane quoque iterum ad balneum eandem deinde ab eo egrediarur, & sic ad consueta redeat. Qui autem hac laborat febre: quia multum famem aut sitim passus est: si cum sola dolorositas & lassitudo & fractio eum inuaserit: antequam febris in eo sit confirmata inueniatur: triticum frustum multa aqua ablutum & coctum & in niuem infrigidatum dandum est: & zetharum tabaret. Si autem non inueniatur nisi postquam febris in eo inflammata fuerit: præcipiendum est ei sepe ex aqua frigida paulatim bibere: donec febris reprimatur: deinde per aliquantulum temporis in aquam tepidam est mittendus: & aqua super eum fundenda frigiditate cuius non laedatur: postea piscinam bibat, & ex cibis humectantibus nutriatur: & a labore abstineat donec sanitati restitatur. Cum uero aliquis hanc patitur febrem ex coriza quæ ei accidit phlebotomandus est: licet paruum a præcedenti minutione intercesserit (spacium: aut enim phlebotomiam parum poterit cum uentosis sanguinibus extrahatur & a carne & a uino abstineat: & aquam hordei bibat: & uenter ex his quæ in capitulo de coriza nominauimus soluatur. Pectus quoque eius mollescat & tussis sicut ibi docuimus fedetur. Cumque ad salutem peruenierit reumatisimus digestus fuerit, & tussis sedata, & febris quieuerit, in balneo est mittendus: & ordinatim ad consueta paulatim reducendus: huius autem febris cura non est negligenda. Eux enim plerumque perueniunt ad pleuresim, uel ad peripneumoniam. Sed quis hæc tenetur febre propter fastidium: hæc enim febres cum ructus fuerint fumosi & fetidi inuadere solent: & uir accidunt cum acetosi fuerint. si uenter postea solutus fuerit per se alia non indiget cura: nisi ut parum aquæ calidæ sorbendo traiciat: & balneetur & ex cibis infrigidatibus, qui neque cito corrumpantur, neque conuertantur, nutriatur: sicut sunt ea quæ ex succo uiz acer

bæ & sumach, & granis granati, & his similibus præparantur. Potus quoque bibat quæ his inueniuntur similes. A labore auem, & statione ad solem, & coitu abstineat. Quod si uenter per se non solutus fuerit ex medicinis quas in capitulo de custodia sanitatis nominauimus soluendus est. Si autem hæc febris superuenierit alicui in cuius stomacho aliquid contineatur, quod euomipossit: ex aqua calida surbeat, & cum ea ipsum euomat. Et si grauitas in inferioribus uentris partibus sentitur, collirium aliquod supponatur. Cumque uenter prout oportet mundificatus fuerit, & cum hoc neque ructus fumosus neque grauitas neque mordicatio in uentre sentatur: neque nausea: balneandus est æger, & nutriendus, & regendus eo regimine, quod prædiximus. Is quoque cui hæc febris accide causa frequenter a stellandis: ex his, quæ in suo nominauimus capitulo curandus erit. Cumque ipsius febris repressa fuerit: in balneum mittendus erit. & ex rebus quas in hoc libro nominauimus nutriendus. Sunt præterea ex hominibus quidam qui cum cibos multi nutrimenti frequenter comedunt, ut sunt carnes graues crotæ: & pulkes ualde spissæ, & frumentum coctum, & uinum crotissum hæc incurrunt febrem. Quapropter hi a crotissorum ciborum assiduatione abstinere debent, & ex carne hædina & pullina nutriendi, & syrupum acetosum bibere debent, & de uino sumere debent: quod iam peruenit ad subtilitatem, & claritatem, & in profuudum penetrare potest. Is quoque qui a prædictis læditur, ante comestionem uti exercitio debet, & uentris solutionem & phlebotomiam assiduare. Si enim nihil negligens affuerit agitudines incurrat acutas, & pestimas. Sunt etiam ex hominibus alii qui cum labore aut uigiliis pariuener, aut eorum tardatur comestio, aut ex cibis subtilibus, aut siccis nutriuntur ad febrem deueniunt. Quapropter huiusmodi hominum genus ab his rebus abstinendum est. Cumque febris eos inuaserit succutrendum est cito cum eis quæ corpus humectant. Ex hoc enim si neglectus fuerit, ad hecticam deuenient.

De febre hectica. Cap. 3.

Cum febris tribus diebus aut amplius permanserit, neque se mouerit, neque calor eius, neque inflammatio uehementis fuerit de qua: accenduntur quæ febres acutas comitari consueuerunt, cum ea affuerint ut est pulsus magnitudo & caliditas, & inquietudinis uehementia, & anxietas, & lingue siccitas, atque eius nigredo: ipsa tamen sic uno modo perseuerauerit, neque potest in ea deprehendi dimissio aliqua: neque paroxysmus, præter hæc etiam ipsa inuenitur quæta, & quasi tepida: tunc hectica adesse creditur. Est itaque ipsius uentris sic experienda. Aegro ut in diuersis come-

dat horis, est præcipiendū. Quod si inuenitur fuerit semper post comestionem a febre magis infestari hecticam proculdubio esse pronunciatum est. Quod si cum hoc etiam facies eius iam extenuata esse uideatur, & oculi concavi & caro imminuta atque cutis desiccata fuerit hectica iam non est in eo in principio, immo in ipso confirmata est, & operata, & diu est ex quo ipsum inuaserit. hæc autem febris in principio sui cum nodum, scilicet ad ariditatem peruenit, curabilis est. phthis itaque signa cognoscenda sunt ut dum aliquis de ægri sanitate confidit ad eam curandam properet. Dicemus igitur, quod cuius quidem hecticam in phthis transit: tempora uehementer plana sunt & oculi concuuantur, & nares subtrahantur, & sunt tormantes, & aures minorantur, & earum corpus subtiliatur; faciei quoque ac frontis tenditur cutis; ac si esset corium quod super ossa faciei desiccatum foret; & totum corpus similitera carne nudum existit. Collum præterea tenue fit, & epiglotis foris prominet. Cumque pectoris ossa tactu aut visu considerata fuerint; unumquodque eorum cum suis extremitatibus notari poterit, & postremo corpus non uidetur nisi corium & ossa. Eiusque uox ex illis auditur, & debilis, & uirtus omnino destructa uidetur, & pulsus subtilis, & debilis, & cum hoc etiam datus. Cordæ quoque manifeste apparent, quia caro dissoluta est, & uenæ similiter. & cum hoc a sanguine uacue neque earum concuitas magna rei capax existit. Pulchritudo quoque atque claritas ab ipsius corpore omnino recesserunt; & cutis desiccata est: & cuti existentis in senio similis facta est. Venter etiam eius attenuatur & debilitatur donec uideatur ac siccostis adhereat, & quod nihil in se contineat. Mirach præterea uentris in tantum subtiliatur, ut non uideatur esse nisi solummodo corium, & præter hoc spasmat & desiccatur. Ossa quoque raschete, & pectinis manuum plerumque apparere & ungues curuantur. Eum uero capilli cadunt alicui, & uenter soluitur, mors ei propinqua est. Cumque corpus ad huc diminutionis, & debilitatis uenerit terminum nunquam sanari poterit, neque meliorari. Sed dum carnis, & sanguinis pulchritudinis ac uirtutis reliquie in eo inueniuntur, & quod ex prædictis significationibus apparuit neque uehementis est, neque confirmatum, sanari potest, & ad suam redire dispositionem si ei, ut oportet, subueniatur. Cum autem non fuerit multa debilitas neque multa macies, neque longum intercesserit spacium ex quo pariter perit nec etiam ex signis hecticæ aliud apparuit, nisi quia febris lenta adest quæ iam per aliquos perseuerauerit dies, & postea parum siccitas, & maciei inceptus huiusmodi patientis leuiter, & cito sanitati restituitur, si Deus uoluerit. Hac igitur febre laboranti, in primis aqua hordei danda est, &

ut: & ne venter eius solutur, summopere est cauendum: ad cuius constrictionem si solui ceperit, est festinandum. Huic præterea plerumque calor fuerit fortis, confert lac vaccarum iuue nilis ætatis de quo butyrum vehementer extraxum est si fuerit acetosum & aqua hordei in potu est tribuenda. Et si venter solutus fuerit ipsam cum tortellis sumat. Et est necesse cum hoc quod diximus, ut ad in frigidationem & caloris extinctionem stupium impendatur. Cum autem huius vrina fuerit oleagina aut in eius superficie petala apparuerint vinctuosa, aut frustra carnis filis similia aut aliquid simile fursi in ultimo in huius regimine est iustitiedu. Sed si quis hac laboras egitudine corpus habuerit vehementer siccū, & uehementer mactū: neque fortis calor in eo fuerit, lac calidū ita ut ab ubenbus extractū fuerit si in potu sumatur: aut eū eo micæ panis comederit: conferret ei. Omni uero lacte ad hoc asinum melius existit. Et post ipsum est caprinum. In lacte uero recente duo sunt obseruandæ: scilicet in caseitatem transeat, & ne conuertatur. Lac autem quod prædiximus cum in stomacho fuerit, non transit in caseitatem, nisi raro. Quod etiam nunquam in caseitatem mutabitur, si parum zuchari ei miscatur. Cum autem à lactis conuersione quis ægrum custodire noluerit, eius dispositionem in caliditate quotidie tangendo consideret, & qualiter aerem attrahat, attendat: eiusque pullum inspiciat, & urinam, atque sitis ipsius quantitatem. Si enim inuenerit hæc omnia maiora quam prius essent antequam lac bibere, & uehementer augmentata fore à lacte prædicto erit abstinentum, & lac acetosum absque butyro: aut aqua hordei in potu erunt tribuendæ: & troscisci de spodio, & his similia. Venter quoque si stritus fuerit cum apozimate, aqua prunorum, & tereniabin erit soluendus. Quod eo usque fieri conuenit, donec prædicta remoneantur accidētia. Post quorū remotionē: ad lac redire est ei præcipiendū: hæc est eorū summa quæ hæcticæ patientibus adhiberi conueniunt. Cum autē aliqui hæcticæ laborantes ad hoc deuenierint ut ossa rascet, & peccinis manifesta appareant, & pulsus deficiat, & mirach utris colli abhæreat, omniaque eorum ossa manifesta uideantur, & subtilia, non est in eis laborandum ut ad sanitatē perueniant: sed ne quoquo modo sustineantur. Quod fit ex nutrientibus quæ uelociter penetrant, & ex bonis odoribus. Caro quoque pullina sumenda est, & in parua frusta incidenda, & succus ab ea paucum salem habente extrahendus quemadmodum ab alia carne succus extrahi consueuit, aut fiat hoc ex carne rubra quæ i collo hædi reperitur. Deinde huic succo parum de succo pomorum, aut citoniorum, & parum uini admisceantur aut tortella bene trita ei admisceantur, & sic bibatur, aut sorbeat, Camisias præterea tin-

ctas induant quæ ex sandalis, aut musco, si non capitis dolorem fecerint, sint infectæ. fumigium quoque ante eos fiat ex xilooloe, & nere, & ante eos, & in eorum circuitu ponantur odorifera, & confectioes odorifere, & aqua rosata super eos roretur, & olfaciant cibos odores habentes desidetabiles: sicut est cibus qui fit de carne hepatis, & pulmonis minutim incisa, & postea i feitorio cum ouis, & croco, & aceto cocta, & intestina ex carne frustatim incisa plena, & cusabegi, pulli quoque affandi sunt, & cotam ipso facie scindendi, ex quorum peccore carnem masticoando succum solum trahant. carnē autem proieciat si multum fuerint debiles. Quod si quis ex his aliquantulum fortior fuerit, pulli cum aqua, & sale coquantur, quorum peccora postea confusa cum iure exprimantur, quorum succus cum coriandro, & panko cinamomo conditus, & uinum atque tortellas habens admixta in potu tribuatur. Vnus autem ex veteribus medicis reuoluit, se uidisse unum uirum, & multos pueros, qui postquam ad hæcticam ad hanc deuenierant dispositionem, sanati fuerant. Ego tamen nunquam hoc uidi, neque credo uerum fore, & præcipue postquam puerilem transierit ætatem. Troscisci de camphora qui cum sint cordis, hepatis ac peccoris in frigidatiui hæcticæ quæ est cum ardore conferunt. Recipe rosarum rubearum. 3. x. spodiū albi quod sit magnum frustum, seminis cucumeris, anborum ana. 3. v. seminis lactucarum. 3. ix. seminis portulacæ. 3. vi. seminis endiuiz. 3. ii. seminis dulcis cucurbitæ. 3. vi. tereniabin. 3. x. camphoræ. 3. f. Ex his omnibus cum mucilagine pulii confectis informetur troscisci: quorum quisque duas ponderet dragmas. Quod si venter solutus fuerit, ex istis aliis trosciscis de spodio qui sunt constrictioni dētur. Recipe puluis rosarum rubearum, spodiū, anborum ana. 3. v. boli armeni, gummi arabici. anborū ana. 3. 2. succi berberis, succi sumach, anborum ana. 3. 3. balsantiz. 3. 1. & f. seminis coriadi in aceto infusi, & postea torrefacti. 3. 2. seminis acetosæ ex corticari. 3. 3. fiant troscisci, quorum quisque duas ponderet. 3. ex quibus unus in mane, & alius post solis occasum cum rob simplici de citoniis, aut de granatis aut de ribes sumatur.

*De febre quæ duobus diebus inuadit, et unum intermit-
tit, & vocatur tertiana. Cap. 4.*

Huius febris principium cum forti accedit rigore, & paucio frigore sicut est dispositio pedis cum obtopescit: sed non prolongatur diu sicut frigoris spaciū prolongatur: sed corpus cito calefacit adeo uehementer, ut si corpus aggritum, manus mordicationem sentiat caloris: accidit antem plerumque ut æger in tempore uehementis caloris huius febris, & in eius fine: in-
nite

niter loquatur, & præcipue si calida fuerit complexio. Plerumque etiam ex ea accidit nausea, & æstusio, & uomitus coloris ruber. Venter quoque quandoque soluitur, & egreditor cholera citrina. Pulsus in statu huius febris inuenitur magnus, & nelo, & frequens: sed tamen æqualis. Vrina quoque in colore est ignea: sed secundum subtilitatem non est spissa, habet tamen fetorem, & odorem malum ex putrefactione. Hæc autem febris sæpius euenit complexione habentibus calidam, & siccam, & qui multum perpersi fuerunt labore, & uigiliis, & ieiunium, & ex cibis calidis nutrimentum sumpserunt, & vinum forte, & uetus biberunt in regionibus, & temporibus in caliditate distemperatis. Hæc præterea febris non infestat ægrum ultra horas duodecim: quinimmo sæpe in horis paucioribus istis ipsius remouetur paroxysmus usque ad octo uidelicet horas. Cumque hora recessiois aduenit, cum sudore remouetur, & quando separatur a corpore, pulsus ab ea mündificatur. Cum igitur hæc accidentia cum febre inueniuntur, aut ex eis plura sciendum est febrē esse tertianam. Quod si cum prædictis accidentibus aut pluribus ex eis contingat, tertianam in illa hora multis euenire absque omni dubitatione sciendum est ipsam esse tertianam, ac si uidisset eam una diei infestasse, & alia quiesuisse. Cum igitur æger taliter dispositus fortis inuenitur, fueritque diu ex quo non fuit solutus de mirabolantis curitis. 3. x. in aqua feruente die, & nocte infundatur, deinde manibus fricatum coletur, cuius 3. xx. ex terribilibus miscetur, & in mane in potum tribuitur. Scamoneæ quoque recentis anthiochenæ, & bobæ quartæ. 3. minus in tanta quantitate iulep, & aque quæ semel sorberi possit dissolvatur, & ad bibendum tribuitur, donec uehementer solvatur. Cum enim hoc factum fuerit aut febris nullo modo accedet, aut præsumper aluiabitur: deinde ex toto regimine quod narro legendus est. Si autem æger fuerit deliciosus aut debilis, & tempus fuerit æstas, circa nūquamque noctem pondus. 3. x. tamarindorum, & pruna sicca, & crossea uiginti sumantur, & in duabus libris aque usquequo sunt dissoluta coquantur, deinde manibus fricata coletur, & miscetur huic colaturæ zuchari tabaret. 3. dectem, & in potum antequam dormiat sumatur. Cuiusque mane factum fuerit, & sol eleuari ceperit ex aqua hordei secundum magnam quantitatem bibat, & in loco bene quieto uel olente moretur, donec cibus digeratur, deinde ex oleis frigidis, & muscagarat in quibus non est amaritudo, nutriatur. Et a cibis in quibus est caro abstinere, & comedat medullas cucumeris, & citrulli, & de succo cucurbitæ in tempore suo bibat, de succo cucumeris saraceni, & sumat in potum aquam cum iulep, & sirupum acetosum ex zucharo

aqua bene temperatam. Modus quoque infundendi, & extinguendi secundum febris calorem obseruetur. Venter præterea si per se semel aut bis aut ter quotidie solvatur, apozima prunorum non est dandum: sed ex aliis est regendus. In loco quoque apozimatis prunorum succus granati muci cum mucillagine piluli est tribuendus. Hepati præterea in nocte in horis scilicet euenter a cibo vacuus est, panis sandals, & aqua rosæ infusus est superponendus. Siq; inter comestionem, & inualionis principium longum tempus, uidelicet nutriatur tribus horis uel duabus antequam febris accedat aut postquam recesserit. Hic autem æger ab omnibus calidis est abstinendus, & in loco frigido sit semper eius mora. Quod si febris cum magno ardore, & calore effluvideatur, & succo cucumeris saraceni, aut cucurbitæ, aut citrulli, & ex mucillagine piluli cum malis granatis, aut iulep plus erit dandum, & de aqua hordei plus bibendum. Si uero dies prolixus fuerit, aut eius cibus non cito digeritur, non cito uenit tibi ex aqua hordei iterum ei tribuas post solis occasum. Trocisci quoque de camphora quotidie cum sirupo acetoso de zucharo in potum dandi in mane antequam aquam hordei sumat per duas horas, aut ad minus per unam horam. Cumque febris ægrum dimiserit, adhuc eodem regimine quo prius post febrē per tres dies erit regendus. Quibus transactis pullina caro, aut hēdina est danda. Interim tamē a balneo, & sole, & uino est abstinendus: deinde ad conuersuetudinem reduendus.

De causis. Cap. 5.

Hæc febris de genere est tertianæ, ea tamen fortior existit, & maioris caloris: Quæ quidem una die fit ualidior: Alia uero minus calida. A corpore tamen non separatur, neque horripilatio cum ea accidit neque sudor nisi cum recedit. Alia autem tertianæ accidentia sunt cum ea, uehementiora tamen, & firmiora. Lingæ præterea ex labia citrina fiunt, aut denigrantur, aut absque dubio exasperantur si febris non ualide fuerit fortis. In huius uero febris curatione tali indigemus regimine quale in tertiana prædiximus. Est tamen in ea plura studendum, & diligentior cura est ei adhibenda, secundum quod est fortior illa, & maioris incendii. Aegro igitur in nocte ex apozimate prunorum, & tamarindorum quod prædiximus est tribuendum, usquequo uenter quotidie bis aut amplius solvatur, trocisci quoque de camphora, aut succus citrullorum, aut cnenetis saraceni, aut prisa semper in mane dunt. In die uero omni bora assidue, cucurbitæ aut citrullorum succus ei tribuatur, & ex mica panis abluta lacti a quo butyrum sit sublatum, cum zucharo admixta. regatur.

Quod

Quod si parū comederit: aqua hordei iterum sumat: sicut offendimus: quæ autem quæ illi in potu ministratur parū piluli admisceatur, & ex ipsius mucillagine cū tulep aut sacco granati, in potu sumat. Asperitas vero lingue cum pāno linco fricetur: deinde piluli mucillagine cum zucchero lambendo hauriat. Nuclens quoque prout parum adhuc carnositates retinens in ore retinendus de tur: & pāni aqua rosata infusi hepatis, & cordi plurimos superponatur horis. Et si eger in intestinibus apostema non habuerit: neque stomachus neque hepar debilia erant dum esset incolumis: ex aqua frigida super nivem in frigidata multum in potu sumat cum calor ualde accensus fuerit de qua ad eo usque bibat, donec facies eius uiridis fiat, & tremat. Calor enim febrilis et hoc illico extinguetur. deinde sudabit, & enadet aut fere liberatus erit. Venter autem si vehementer soluitur, hordeum confectum, & ablutum, & aqua coctum, cum troscis constrictiui de spodio dandum est. Sirupum uero acetosum, & inleup, & zucchero utitur: Rob autem simplex de granatis acetosis, & malis, & citonitis acetosis, dandum est, & ex omnibus quæ in capitulo de ventris constrictione diuisas est regendus. Quod si a nigilii, & capitis dolore sedatur, sicut in earum agitudinum capitulis continetur, medicandos erit. Nos enim in hoc nostro libro non ponimus curas agitudinum, nisi simplicium. Ideoque cum agitudines compositis fuerint, ex propriis capitulis sunt earum curationes sumende. Sit præterea in hac febre, & in omnibus cōtinuis febribus nuntiendi temporis, tunc cum æger aliquam sentit alleviationem, aut si alleviationem non sentit, scio hora qua solitus erat comedere dum esset sanus, aut in hora qua dies infirmitatis, & temperatur. Interpolatus uero oportet ut sit hora comedendi longe ante earum accessionem quæto plus possibile fuerit, aut post earum recessionem. Nos tamen offendimus quo modo sup nutritionis regimen obseruari debeat cum de acutis tractabimus agitudinibus si Deus uoluerit.

De syncho. Cap. 6.

Hæc febris cum incipit sine tremore ac horripilatione accidit, immo cum calore incipit, & est cum ea in facie, & in oculis & acribus, & naribus rubedo, & tristitia, & inquietudo, & inflammatio fortis, & inspiratio magna, & frequens. Hæc præterea febrem, antequam accedat, hæc signa præcedunt: Aegro namque adest in corpore grauitas & extensio, & pignitia, & dispositio quæ leuitudini similatur, & in somno superfluitas, & amentia, & in capite grauitas, & præcipue in fronte, & tympanibus. Venarum quoque exuberatio, & guidegi uidetur, & prurit in na-

ribus, & in locis ubi uentosas apponere consuevit sentitur. Hæc quoque febris accidit adolecentibus corpora bonæ habitudinis habentibus, & eis qui ex carne, & confectionibus de melle multum comedere, & multum uinum bibere consueuerunt, contingit autem sæpius in hyeme, & nere. Cumque corpus hanc agitudinem patiens tangitur simile corpori de balneo exuentis sentitur. Aut qui super corpus suum multum ex aqua calida fudit. Pulsus in hac febre magnus sentitur & frequens, & urina rubea, & crosia. Cū ergo in hac febre signa apparuerint, & alia plura ex eis festinandum est ad ægri minutionem faciendam, in qua ex sanguine multum est extrahendum: Ex hoc enim extingetur hæc febris. Si autem non prius subueniatur quam lingua nigra fiat: & superuenierit accidētia causon, æger ut diximus regatur. In hac tamē febre ea quæ sanguinem reprimant magis sunt danda, sicut rob quod fit de succo uog acerbg, & de acetosis citis, & ribis, & acetum, & malum granatum præterea ad regimen ægri subuiliandum est diuertendum, & ad multum ipsius conestionem minuendum. Si quis etiam ægrū in suæ agitudinis principio inuenierit, & flebotomari fecerit hæc quæ prædiximus cibis ipsis admisceat. In potu præterea aqua frigida tribuatur, & troscis de camphora. Et si necesse fuerit venter ex apozimate prunorum, & tamarindorum, & zucchero soluitur, aut ex succo granatorum acetosorum cū pulpa sua, & zucchero tritorū. Postquā uero febris recesserit, a carne confectionibus quæ ex melle sunt, abstineat, & a uino, donec ipsius sanitas sit confirmata. Hæc quoque febris est continua, & non interposita, neque nocatur tertiana, neque cum ea est aliquid ex igne, & inflammatione, & acutate quæ cum causon sentiuntur sæpe nisi in principio extinguatur. Hæc præterea tres habet species: Una est in qua a sui principio non cessat augmenari malitia, usquequo ueniat crisis, aut æger moriatur. Alia uero est quæ semper in una mouetur dispositione. Tertia quoque est quæ quotidie a sui principio minuitur: Illa autem quæ semper augeatur plus indiget minutione quā alia. Postquam ea quæ unius est tenoris, secundum æget licet etiam tertia ea non sit priuanda. Ille tamen duæ plus indiget, & præcipue ea quæ cū augmento semper.

De febre quotidiana quæ uocatur phlegmatica. Cap. 7.

Hæc febris cum horripilatione, & nero frigore in dorso, & extremitatibus incipit, & tepor frigoris in corpore prolixum sit, & uix calofit, neque cito peruenit ad inflammationem, & calorem sicut tertiana: Quinimo corporis caliditas in hac febre cum prolixitate, & labore accedit,

accedit, & plerunque calefit, & iterum infrigidatur, & post etiam calefit. Quod postquam multoties factum fuerit manifestatur calor, & erit in toto corpore æqualis post laborem tamen. Cumque calor incipit per totum corpus spargi & equari non est fortis neque purus neque in corpore egri sentitur incendium neque mordicatio ut in tertio: & cansonide neque sitis est cum ea neque nehemens inspiratio. Et si cum ea fuerit vomitus, aut ventris solutio, humores albi, & pure phlegmatici egerunt, aut cum pauca cholea rubra. Facies quoque in hac febre tumere aliquantulum uidetur, & corpus arefcit, & uirtus appetitiva deprimitur. Pulsus quoque in hac febre secundum uelocitatem, & spissitudinem, multo minor inuenitur quam in tertiana, & præter hæc est diuersus. Accidit autem hæc febris sæpius pueris, & mulieribus, & eumuchis, & corpora habentibus humida, & eis qui multum comedunt, & parum euacuatur, & parum exercitatur, & in temporibus, & in regionibus frigidis, & humidis. Urina uero in hac febre, alba est, & subtilis, aut rubra, & spissa, & turbida. Et secundum maius in principio est in prima dispositione, sed postea succedente tempore in aliam mutat dispositionem. Eiusque interpolatio in pluribus in recessione diei contingit, & iuxta noctem. Neque cum sudore separatur, & præcipue in primis diebus. Sudor, & si cum ea fuerit, erit paucus, & viscosus. Venæ autem cum recedit febris, non omnino a diuersitate purificantur, neque corpus a neutralitate, immo reliquæ ex ea remanent quæ in corpore sunt nisi quæ alia neniit accessio, hæc rursum quotidie innadit in qua tempus paroxysmi prolixius inuenitur tempore interpolationis, & fit longa, & mansua. Quæ plerunque multis moratur mensibus: præter hoc quoque est mala & mortis suspentionem secum habens. Cum igitur in febre hæc signa inueiuntur aut plura ex eis sciendum est ipsam esse phlegmaticam. Quod si in tempore huius multum hanc pati febrem inueniatur, iam certum credendum est, eam esse phlegmaticam. Festinandum est igitur, & a prima accessione huius febris situpus acetosus de melle cum aqua tepida est dandus ad bibendum. Quem si potest hortandus est uomere, non tamen cogendus. Ideoque ex eo multum bibere debet. De uomitu uero, ita sit ut res se habuerit. Aeger autem non est fatigandus, ut hoc modo omnino mundificetur, & ur prorsus inuestigetur. Ex medicamine quod fit ex turbit quaque ooste est ei dandum, quod. Recipe turbit fricati, & cribel. cum panno sericino qui uocatur orale. 3. x. mastic. 3. i. ziberis amborum ana. 3. i. zuchari quantum de omnibus. Ex hoc quaque nocte pondus auroi uois in potu datur, nisi uenter a oatra bis aut amplius inter diem & noctem soluat. Cumque mane factum fuerit, zelegebin, de zucharo. 3.

v. ei danda sunt, & ilico post hæc sirupiacetosi de melle collati. vnc. 1. est tribuenda. Hora quoque comestioni ab hora accessionis quito plus possibile fuerit, est elonganda. Nutriendus uero est æger ex acetis, & oleo abluto, & zucharo, & pauca menta, & ex oleribus huius similibus. Et a cucumeris, & citrolis, est abstinendus. Salsis uero in comestione utatur quæ ex acetis, & almuri sunt, & regatur ex radicibus sicæ, & eius extremitatibus, conditis ex acetis, & oleo, & almuri, & sinapi, & aliis his similibus. Regatur quidem æger sic per hebdomadam unam. Et si febris longitudo, & eius accidentia immorari inueniantur, & hora suæ inuasionis retardari compertur, iam erit regendus. Si autem inueniatur augeri aut stare, Aeger ex hac confessione soluatur quæ. Recipe turbit sani. 3. i. succi ablinthii. 3. unius quartam, colloquintide. 3. unius sextam, agarici. 3. i. hieræ piæ. 3. i. mastic. 3. i. unius sextam. Conficiantur cum sirupo acetoso molito, & dentur ægro. deinde ad ipsius regimen est redeundum. Quod si ægri uirtus debilitata fuerit, pulla sitis, & præparati in patella dætur, & separatim a iure, & micis. Et si stomacho superergerint aliqua accidentia, aut fortis nausea ex eis quæ in eorum capitulis nominauimus curetur. Similiter quoque si mala acciderit complexio, ut diximus subueniatur. Si autem febris quartæ transierit hebdomadam de troscisci rosarium completis in potu tribuatur. Troscisci autem completi de rosia sunt qui. Recipe pulueris rosarium. ru. 3. x. succi eupatorii. 3. 6. succi ablinthii. 3. iij. mastic. 3. i. & 1. spica affari. floris squisiantis, anisi omnium ana. 3. i. Infomentur troscisci quorum quisque sit. 3. iij. ex quibus unus cum vnc. 1. huius apozimatis datur, quod. Recipe corticum radice. apij, & radic. feniculi, amborum ana. 3. x. seminis utrorumque ameos, cuscuthæ, anisi, bedeguaris, fuchabæ. omnium ana. 3. v. Coquantur cum aq. lib. 1. i. donec ad medietatem redeat, & misceatur ex eo cum vnc. 1. sirupiacetosi, & datur. cum prædicto troscisco. Aegro quoque inter omnes duas noctes medicam de turbit semel daturus uenter moueatur. Si autem febris adhuc fortis fuerit, cum alia confessione soluat. Carnes quoque caligine & mutagenar dentur, ne uirtus dissoluatur. Amicis uero, & ab unctuousis, & confessionibus quæ ex melle sunt, custodiatur. Et obseruandum est ne aqua frigidam, in nique infrigidatam patiens in hac febre bibatur neque aliquid eorum quæ ei similia sunt ex rebus frigidis. Ex hoc enim si neglexerit febris fiet longissima.

De febre quartana. Cap. 8.

Hæc febris cum tremore adeo uehementi incipit ut dentes confringere faciat, & concutere. Iuncturæ quolibet atque ossa dolent, ac si aliquid

si aliquid super ea foret appensum quod cagra uaret & percuiretur. Et licque dispositio tremoris huius febris sufficiens ad ipsam significandam. Non est enim talis tremor in alijs febris. Pulsus autem in inceptione huius febris; ex paruitate ac debilitate raritate quoque & rarditate; ad mirabilem peruenit dispositionem. Et si quis recordatus fuerit pulsus infirmi qualis erat dum sanus esset; non indigebit alio signo in cognoscendo quod febris quae incipit sit quartana; nisi illud quod ex tactu venae ei manifestabitur; de superfluitate paruitatis & tarditatis; & debilitatis ac minorationis, & quod valde sit contrarium tempori pulsus febris phlegmaticae. Haec quoque cum calescit & accenditur; valde calidior existit quam phlegmatica. Non tamen ad calorem peruenit tertianae; neque tanta sit; neque tanta inflammatio; neque tanta aestuatio; neque tanta inquietudo; neque tantus dolor capitis; neque tantum alienationis inueniuntur in hac febre quantum in tertiana. Haec autem post longas febres quarum circuius planetarum fuerunt saepius contingere consuevit; & in autumno, & in fine aestatis, & complexionibus habentibus siccis. Urina vero in hac febre alba apparet & subtilis; aut atropinquat rubedini, & plerumque est clara valde, & cruda & crosse, & nigra aut rubra. Praeterea si in hoc tempore multae febres quarumque multas accidunt; securum credendum est febrem esse quartanam. Cum quoque urina in hac febre rubra, & spissa visa fuerit; & corpus rubrum & venae plenae; aeger ex basillia minuatur; deinde totum regimen, quod conuenit ei adhibeatur. Si autem hoc non fuerit visum siquae medicinae quae cholerae expellunt nigra ex his quae in capitulo de melancholia nominauimus dentur. Medicina quoque mouens in sequenti die post febris laborem; danda est. Cumque accessio incipit; sirupus acetosus cum multa aqua tepida est inbeuendus, & aeger ut ipsum caueat; hortandus est. Quod si uomere non poterit sicca, & sinapi, & salsa & eia similia; danda sunt. Quibus sumptis vinum multa aqua mixtum bibat desuper; deinde sirupum acetosum in quo raphanus fuit infusus in potum sumat. In alijs quoque diebus uomat & regimen ei amplifcet; & de carnibus pullorem, & haedorum, & agnorum annualium mensurata edat. Ante tamen comedat olea cum alnuri, & oleo condita, & aquam calidam super se fundat, & in ea sedeat antequam comedat. In balneo quoque mittendus est. In quo quidem ramen non sudet. Laborem praeterea atque vigiliis minus sollicito patiatur. Somni vero & quietis augmento assuecat; vinum subtile & valde tem-

peratum bibat. Solutio quoque ventris assidue per unum diem antequam accessio ueniat; ei adhibenda est. Sed notum in die accessionis; est dandus. Aliis vero diebus qualiter nutriatur & corpus ipsius humectetur; est pensandus. Er est considerandum an febris, & in suis accidentibus, & suae accessionis longitudine minuat, & quae cuerunt in ea; quia hoc bonum erit. Si autem non multum inueniatur minui aeger vehementer est euacuandus. Quod si in ultimo factum fuerit; non permanebit febris. Quod si ultra xl. dies perlongata fuerit; aegro cum reliquijs istius medicationis quae diximus ad magnitudinem nucis de diatrion pipereon quotidie in mane est tribuendum, & ex medicamine quod sit ex asa ad auellanae magnitudinem dandum, quod est. Recipe asae foliorum rutae siccae; piperis omnium aequaliter; mellis quod sufficit ad conficiendum. Sumat ex hoc medicamine quantum est auellana in bora dormiendi, & aeger post ipsum dormiat. Balneum praeterea ingrediatur & sudet in eo; non tamen in die accessionis. Vinum quoque uetus & purum bibat, & si fuerit tempus aestatis & corpus macrum & calidum melius erit ne aliqua ex calidis medicinis detur. Sed serum cum zucchero tabulet ei saepe tribuatur. Apozima quoque de epithimo & mirabolanis indissinredum detur; & ex cibis nutritiatur humectatiuis. Vomitus etiam in principio accessionis in die qua cum infestat febris; cum sirupo acetoso, & aqua tepida pro nocetur. A. A. 963. Thum.

De Febris continuis. Cap. IX.

Tertianae, quartanae, & quotidiana plerumque fortasse non remouentur; sed permanent semper. In hora accessionis tunc fortiores; postea reprimuntur; non tamen separantur. ita ut corpus ab eis omnino sit liberum deinde iterum ut prius in hora accessionis inualecent. Accidentia vero harum febrium; eadem sunt quae & praedictarum; excepto quod cum tremore non incipit; neque sudor in toto corpore est cum illis; nisi cum recedunt; materia enim illarum; illarum etiam est materia. Sed est in quantitate maiori; & in qualitate deteriori; & plus rimorosa. Eadem igitur cura istia sobueniendum est & illis medicinis, tamen in harum curatione magis studiosus, & frequenter debet esse sollicitus quam in praedictis.

De Febribus commixtis quas accidunt de quinto in quintum diem vel de sexto in sextum vel amplius.

Cap. X.

His febribus laborantes; in singulis accessionibus per unam diem ante sunt solvendi, & in die accessionis ut evasiant laborandum, & præter ista regimen, quod in capitulo de febre phlegmatica nominata est circa eos observandum est; si æger fuerit crosus, & comedendi avidus, & gulosus. Si autem fuerit siccus & macer; ex eis quæ choleram purgant nigram; est solvendus. Et præter hoc regimen; quod in quartana dictum est circa eum observandum. Mixta vero quæ certos non observant parvissimos sunt aut propter apostematata quod in aliquibus membrum sit, & præcipue in renibus; aut quia in quartanam transiura est. Differrentia tamen inter eas est; quod cum prima est dolor in aliquo ex membris, aut inferius sub dorso. Aut in suis operationibus est letitio. Cum alio vero nihil horum invenitur. Primæ quidem curatio est membrum inferius sanare, quod fieri observando ea quæ declaramus in locis ubi de his tractavimus. Secunda autem curabitur semel evacuando, & alii viæ calorem reprimendo. Quod ideo fieri convenit ne humores omnino integri adveniantur.

De Febribus ex quibus accidunt frigus & calor simul. *Cap. XI.*

Sicum febre causon in lingua fuerit nigredo & inspiratio magna, & sitis multitudo & æstatio; fueritque corporis superficies frigida erit significatio mala. Similiter quoque si extremitates & corporis superficies fuerint frigidissimæ, & fuerint propter apostematata quod est in interioribus. Ego tamen non in hoc sermone de hac tamen specie loqui volo: immo de omni febre in quacunque corporis superficie, fuerint frigida. Cum qua æger fatigationem, & fractionem & febrem, & alices, & oritationes sentiat, & pulsus est velox, & inspiratio similiter, & calor continuus sentitur interiori, nec interpolatus ex regimine febris phlegmaticæ erit regendus. Quod si in superficie corporis fuerit calor ut calor febrientis; in pulsu tamen non sit velocitas neque inspiratio sit spissa nec magna; neque æger ex calore febri aliquid magnum senserit interiori: immo totum calorem & incendium, & fractionem in corporis superficie senserit; fueritque hoc

cum interpolatione; siropus acetosus, & geleniabin de zucharo ægro dentur, & ex acetoso, & oleo amygdalino nutritur; balneum quoque quotidie ingrediatur in quo parum sudet et multum ex aqua calida super eum fundatur. Quæ si suffecerint bene erit. Et si non venierit ex apostemate mirabola erit solvendus, et ad regimen erit redeundum. Quod si æger horripilationem cum inflammatione mixtam senserit, et inspirat præter hoc inspirationem calidam et passus fuerit alices; et senserit calorem prius, et illico post frigus; aut prius frigus et post statim calorem, ex apostemate mirabolanorum citrinorum, et indorum, et turbit, et zucharo est solvendus. Troscisci quoque diarodon parvus, et troscisci de spodio quotidie pondere duorum aurorum cum siropo acetoso, de zucharo, et succo granatorum dandi sunt. Descriptio autem trosciscorum de rolis quiparui dicuntur ista est. Recipe pulueris rosarum rubearum drag. x. spice nardi succi liquiritis amborum ana. drag. j. seminis citrioli ana. seminis endiviæ amborum ana. drag. ij. Ex his cum iulep confectis informetur troscisci; et sumantur in potu. Descriptio trosciscorum de spodio. Recipe spodij. drag. a. rosarum rubearum drag. iij. seminis citrioli seminis lactuce seminis cucurbitæ omnium ana. drag. v. succi liquiritiæ terentia bin amborum ana. drag. v. ex mucillagine pulvis conspergantur, & sunt eis troscisci, & bibantur.

De frigidibus ex quibus non calefit patiens. *Cap. XII.*

Cum consuevit alicui tremor cum interpolatione supervenerit neque calefit in toto corpore ad primam redibit dispositionem; post aliquot tempus, ab inchoatione sua ad dispositionem suam præter quod non sequatur ipsum febri, æger & ex ea quæ prædicta in capitulo de febre phlegmatica est evacuanda, & ipsius regimen subleilandum, & omnia quæ phlegmaticis sunt generatiora sunt prohibenda. Hic præterea æger parum dormiat, & in hora ipsius tremoris deambulatio utatur. Et si egrotatio diu perseveraverit et medicamine de assa ad auctam magnitudinem ante horam tremoris datum est, deinde panis cooperiendus & præcipiendum est ei ut vehementer moretur cooperitus, neque saepe voluatur. Quod ideo fieri convenit ut sudet, & tremor remoueatut. Ex oleo quod de costo est inungendatur, & aqua calida in potu evocantur erit tribuenda.

tribuenda. Aeger quoque coopertus decor-
sum & caput ex antiquo croffo panno faciē su-
per aquam calidam ponat, cuius uaporem in
facie recipiat: ut sudor prouocetur, & tre-
mor remoueatur. Vinum itidem forte & pu-
rum cum pipere in potu tribuatur, & tremor
remouebitur.

*De Febre syncopali qua fit ex malitia hu-
morum & eorum acuitate.*

Cap. XIII.

Quandoque febris alicui superuenit quae
secundum maiorem partem in die ter-
tia paroxysmum facit cum qua facies aegri cin-
to sit sordidior, & corpus macrescit. Virtus
quoque quae in pulsu attenditur cadit post va-
nam aut duas accessiones. Quod si accessio-
nes amplius aduenerit: perducetur aeger ad syncop-
iam post ipsam, & fortasse morietur ex illa syn-
copi: haec vero febris in corporibus semper
generatur quae sunt complexionis in vltimo ca-
lidae & siccae. Cumque hoc visum fuerit: a-
egro succurrendum est aquam hordei in potu
tribuendam cum qua aliquid granati muci est
miscendum & dandum. Aeger quoque in lo-
co dormiat ventoso & camillam induat: quae
aqua ros. & sandalis sit infusa. Venter etiam
& latera ex sandalis & aqua rosa. liniantur, &
assidue paruum sumat nutrimentum ex mela pa-
nis simulaginei in succo granati muci infusa,
& fructuum ei similium. Ex pulvis quoque
cum succo uuae acerbae conditus, & cucume-
ribus & citrulis ac cucurbitis & fructibus fri-
gidis in uuae infrigidatis nutriatur. aquam et-
iam frigida bibat. Ante vero quam accef-
siones granatorum in quo panis de simula sit infusa
tionis sit principium: succum in potu sumat:
aut aquam hordei. Quod si cum circuitu to-
ceperit: antequam aliud detur superuenient syn-
copis, os aegri in illa hora erit apertendum:
& elaborandum ut aquam in qua pulvis tor-
tellarum sit infusus, & auctissimam trahat.
Si autem syncopis fuerit fortissima insistendum
est ut parum ex cortelli pulueris rosae cum uino
subtili habende aqua in frigida sumat. Ex aqua
admiram trahat. Custodiendus est praeter
ea ab aere calido, & balneo, & labore & uigi-
liis, & ab omnibus quae euacuate possunt. Ex aqua
uero frigida est lauandus, & omni tempore nu-
trendus etiam si accessiones hora affuerit. Si
uero febris alidica cum inceperit: vehementius
sumat fuerit cum siccaetate. Lac de quo butyrum
sit extrahum cum croculis de canphora in po-
tu sumat.

*De febre syncopali qua ex multitudine
& cruditate humorum fit.*

Cap. XIII.

Saepe febris aliquem inuadit, quae secun-
dum maius paroxysmum uephlegmatica fa-
cit. In qua corpus mollescit, & facies iu-
mere incipit. Et si corpus non fuerit nutri-
tum sed euacuatum; superueniet aegro inde
syncopis. Et si nutrimentum adhibeatur mol-
licies consequetur & febris fiet ualidior, & in
longum pro trahetur tempus. Cuius itaque
febris curationis principium est: ut crura aegri
à genibus usque ad pedes cum pannis qui in-
ter lenitatem & asperitatem sunt medij fricantur
donec rubere nideantur; deinde ad co-
xas tendendum est in quibus similiter fricatio
fieri conuenit incipiendo superius, & descen-
dendo usque ad genua; donec parum rubere
incipiant, & sit fricatio in uehementia aequa-
lis; post hoc quoque manus eorum ab alcel-
lis usque ad uolam ad praedictorum similitu-
dinem sunt fricandae; deinde pectus & dorsum.
Postquam omnia ad pedum ac aliorum mem-
brorum fricationem sicut praediximus est re-
deundum. Cumque huiusmodi patiens si-
tim passus fuerit: oximel in potu sumere con-
uenit. Famem quoque cum habuerit, aquam
hordei, & panem aique hydromel mixtum cum
zucharo sumat. Cauendum quoque est ne
aqua frigida detur. Tempus autem inter fri-
cationem & somnum partiendum est; ita ut
medium deputetur fricationi, & medium so-
mno & quieti. Huic uero aegro si cum solam
pulsam sumit non debilitatur, Aliud non est
dandum nisi ipsa, & panis cum hydromelle.
Si autem debilitatus fuerit cum cibis quos in
febre praediximus phlegmatica erit nutriendus,
& si uenter constingatur collitium ex succo si-
cle & nitro supponendum est. Aegro quoque
quod magis praeter supradicta pondus duorum
aureorum seminis apij cum siroppo acetoso est
dandum. Quod modo hoc usquequo sanetur
regendus erit.

De Febribus quae concomitantur apostema.

Cap. XV.

Febres quae sequuntur apostema quod accidit
ex percussione; aut casu; aut horum simi-
libus de genere est ephimera. Non est enim
putrida neque habet in se nocuum mentum neque
malitiam. Quae uero committitur apostema
quod alicui membro cum incipiendo inuasci-
tatur mala est. Timor enim magnitudo aut
paruitas qui post de ea habendus est: existit se-
cundum illud membrum. Febris quoque qua-

ipsum sequitur est secundum apostematismag-
nitudinem, & ipsius quantitatem. Febris ve-
ro quæ concomitatur apostema quod sit in pā-
niculis cerebri est mala. Ipsa nanque est febris
frēncis. Cuius significacionem & curam iam
prædiximus. Illius vero quæ accidit propter
apostema quod in gutture & suis partibus ori-
tur, & vocatur sinanchia iam etiam nominavi-
mus. Febrem vero quæ sit in apostemate in in-
strumentis anhelius: aut quod sit in carne quæ
est inter costas & in panniculis qui ibi sunt, &
in diaphragmate, & ex pleuresi, & quod oritur in
pāniculo qui pectus in longitudinem dividit: &
ex peripneumonia: iam in prædictis demonstraui-
mus. Ex eo tamen quod principaliter generatur
in pulmone: provenit anhelitus maior, & spif-
fior, & genarum rubedo. Tussis quoque cum
eo accidit cum quæ ex creatio spūi spumosi ad
est: quam etiam iam nominavimus. Cum febre
vero quæ sit propter apostema quod generatur
in meri: est dolor cum scapularum grānedine
qui in hora transigendi grāuior sentitur. Ex
febre quoque quæ propter stomachi apostema
accidit pronenit dolor & inflammatio in ante-
rioribus partibus ventris & inferioris thoracis.
Vbi plerumque dolor & apostema cum est ma-
gnum sentiuntur. Sed si non est magnum dolor
in loco illo ventris sentitur cum præmitur. Ad
sunt etiam cum hoc apostemate: sitis & appeti-
tus casus. Similiter quoque si in aliquo intesti-
norum fuerit apostema: locus ventris in quo
est tactu sentitur calidissimus. Cum quo se-
pe ventris constringi contingit. Cum autem
contingit apostema in hepate generari sequit-
ur febris fortissima & sensuum turbatio, & vri-
næ coarctatio. In matrice quoque cum calidū
fit apostema: febris comitatur acutissima scilicet
causam & sensuum perturbatio. Omnes
autem febres quæ propter apostemata genera-
ntur, remedianda sunt ex curatione apostema-
tis: quod sit aut minutione vel inunctione em-
plastri superpositione. Et præter hoc ex cura-
tione quam in prælojs scripsimus capitulis.
Febris enim sequitur illud apostema: dum est
calidum & ardens. Remouetur vero febris.
aut cum calor ipsius sedatur, aut cum sanies
adunatur.

De febribus quæ ex pestilentia accidunt.

Cap. XVII.

Febribus quæ ex aeris corruptione generantur:
non videtur in principio multa in esse acui-
tas neque caliditas cum tangitur eger. Sunt ta-
men in oculis corporis partibus & in ipsis
profundo magni nocimenti: & sunt decepto-
riz, & vehementis operationis, & sunt febres
lente & tepide, sed coneluse. Cum quibus inhe-

litus & quicquid à corpore egreditur valde fœt-
da sentiuntur. His vero febribus laborantes:
tribulationem magnam & sitim vehementem pa-
tiuntur: eorumque anhelitus augmentatur & sit
spissus. Ex quorum corporibus cum vomitus &
egestione res fœda egreditur, & insolita: deinde
incipit eis superuenire syncopsis, & moriuntur.
In hac igitur febre directè incedendum
est aquam frigidam dando, & rob ea feustibus
acetosis & stypticis: ut est rob quod fit ex grana-
tis, & ex succo rutæ acerbe, & ex piris, & macia-
nis & citri acetositate. Quod si nullum istorum
habeatur acetum cum aqua agris dandum est,
& lac acetosum cum farina hordei, atque lac val-
de acetosum ex quo nutriuntur. Hac præter
terea laborantes passione: aliquid comedere
sunt cogendi: Plures enim ex eis nil sumere
volunt. Et mitte eos in domos frigiditas, &
regendi sunt ex omnibus quæ in capitulo de
hæctica diximus, excepto quoddam balneum non
sunt ingressuri: neque aquam calidam ne-
que lac recens in potu nisi sumpserint. Do-
mus autem in quibus moraturi sunt: cum hoc
quod frigida sunt: sint ventosa, & ex aqua
& aceto rorentur: patientes vero herbas tri-
gidas & bene resolentes olfaciant. Troci-
sci quoque de camphora cum rob de citris quoti-
die dentur, & pectoribus eorum emplastrum
ex sandalis & caphora, & aqua rosata superpo-
natur. Sineque eorum mansiones ex folijs salis-
cis, & vitis, & malorum, & omnium aliarum
retum in quibus est frigiditas, & stypticas:
plena. Et ex sandalis & camphora suffu-
migentur, & ex aqua rosata multoties in-
die rorentur.

De febribus compositis.

Cap. XVII.

Plerumque superueniunt aegrotantibus fe-
bres quæ quandoque sunt unius generis ut ter-
tiana quædamque diuersorum ut cum aegrotans super-
uenit quartana cū tertiana, aut phlegmatica cū
ethica. Sæpe etiam una ex eis continua, &
alia interpolata, & sæpe accessionum princi-
pia videntur: ut in una sine hora & sæpe elon-
gantur. Quapropter ordo periodorum ipsarū
corrumpitur: & accidentia commiscentur: ut
cognoscat nemine queant nisi ab eo qui cognos-
cendi species simplicium peritiam adeptus est.
Ideoque genus febris non solum ex interpola-
tione sua sciri debet, sed ex accidentibus ipsam
comitantibus quæ sunt eis propria. Contingit
autem haberi tertiana: quotidie interpolatio-
ne pati. Vnde si hæc ab cognoscatur nisi ex inter-
polatione iudicabitur esse phlegmatica. Cui si se-
cūdū hoc regimen adhibitum fuerit aeger interfi-
cietur. Quapropter species ex accidentibus quæ
sunt

sunt ei propriis cognoscenda est: & non ex circuitu eius. Sitque cura quæ huiusmodi adhibetur febri secundum accidentium fortitudinem & debilitatem: & eorum simplicitatem: ac permutationem. Neque attendatur interpolatio: nis ordo: cum accidentium testimonium ab interpolatione dinerfum fuerit: licet n. cum aliquis duobus infestatur tertiana quotidie à febre legatur non tamè curatione quotidiana ei subueniendum est: sed tertiana. Adhuc etiam præter sopradicta omnino nitendum est: & in cura eius studiose elaborandum. Si autem febris una die accidat: & alia non accidentia tamè quæ tertiana sunt propria non sint fortis. neque pura: imo debilia, & commixta: non est medicanda cum sola tertiana cura: immo ipsius curatione temperanda & secundum accidentium declinationem. Vniuersaliter autem dicimus febrium compositionum curationem compositionem debere esse: ex cæris simplicium: & quod duarum curationum commixtio: secundum duarum febrium compositionem fieri debet: plerumque tamen oportet nos scire ut ad unam febrem curandam intendamus: cum ipsa fuerit magis timenda, Cuius exemplum est: quod si aliquis febrem pateretur quartanam & superueniret ei alia febris propter apostemata in hepate: aut stomaco: aut aliquo ex membris in instrumentis anhelitus: dico quod in hoc loco cum hoc accideret: studiose esset attendendum ad febrem curandam quæ taliter accederet propter timorem ipsius magnum: licet in medicina aliquid contineretur quod aliam febrem faceret validiorem. Et si contingeret febrem una die infestare & alia non: sed accidentia huius tertiana non apparerent pura neque fortis neque tremor eius esset pungitius neque calor ei post ipsum accessus foret: neque huius multa: neque æstus: neque calor: febris: neque dolor capitis: neque inania locutio: neque sudor: sed forent omnia hæc debilia cum comparentur eis quæ in pura tertiana videri solent. Et ponamus etiam quod præter hæc febris ista prolongaretur: donec ad xiiij. horas pertingeret: diceremus quod hæc febris non esset curanda pure tertianæ medicatione: sed huius curatione ex phlegmaticæ febris cura commiscenda foret: & deberemus dirigere intentionem nostram ad id quod phlegma atque cholera ab egro educere posset. Eiusque nutritio ac totum regimen secundum hoc esset ordinandum. Nos quidem omnes compositiones febres nominare non possumus neque cuiuslibet illarum propriam subijcere curam. Oportet autem ut huius discipline inspector simplicium febrium formas & earum curas optime cognoscat: & post compositionum cognitionem bene mensurat: & earum curam ex duarum simplicium curis temperare sciat.

De Variolis & Morbillo. Cap. xviii.

Cum febris acuta & conclusa pueris præcipue aut iuuenibus evenire cæperit: fueritque cum ea dorsi dolor & osium pruritus: in somno timor ac capitis gravitas: & oculorum rubedo: & in corpore sentitur punctio: sciendum est quod egro aut variolæ: aut morbilli citissime superuenient. Quapropter si antequam apparere incipiant: medicus egro inueniat mittere eum faciat aut cum ventosis sanguis extrahatur. Minuat equidem sanguinis multitudo. Consequenter vero troscisci de spodio cum succo granati acetosi in potu tribuantur. Aeger quoque non nutrietur nisi ex prisa: & hoc in mane & prope nocte fiat. Quia si ipse largiorem appetierit nutritionem: fueritque ipsius virtus debilis: alia non deuto nisi lentes absque corticibus cum paucio aceto conditæ. Aut forbitiones quæ sunt ex amilo & zucchero & oleo amigdalino & epulum quod ex oltribus frigidis quæ haberi possunt præparatur. Rob quoque quod fit ex froctibus acetosis aut stipticis ad bibendum detur. Venter autem si strictus fuerit: infusiones quotidie in potu fumantur. Ex hoc enim aut omnino prohibebitur pustularum egressio aut si quid egressum fuerit: paruum erit. Si vero eger à medico non prius fuerit inuentus quam passio egredi incipiat non erit tunc minuendum neque troscisci de spodio erit dandi: sed corpus ipsius erit bene cooperiendum: ut sudor pronocetur. Ex hoc enim lenis fiat materia ad excedendum. Si autem videatur passio dura esse ad egredendum: & æger videatur esse vehementer nauseæ: & cum multa æstuatione: & accidit ei leuitas in aliquibus horis: apozima de sicibus & visis passis lentibus absque corticibus & semine feniculi & fistibus de lactea in potu sumat: quod hoc modo fit. Cuius prædictorum pugillus vnus fumatur: deinde omnia in aqua coquantur: & colentur quorum apozima multoties in die sumatur. Aqua præterea ro, in qua sumat infusum fuerit: aut succus qui ex carnositate granati exprimitur: oculis inquantizetur. Aqua et frigida cum paucio aceto mixta in potu tribuatur & gargarismus similiter ex ea fiat. Quod ideo fieri conuenit ne in oculis aut naribus aut gutture ex ea aliquid egrediatur. Antimonium quoque cum succo coriandri fricetur & in oculis multoties in die mittatur. Cunque tota passio egressa fuerit & matura eger super folia salicis ponenda est ad dormiendum: aut lectus eius ex rosis tritis est puluerizandus. Si quid autem ex prædicta egritudine non cito siccatur quod sit magnitudo: & enim multo humore ex aqua salsa cum coto imbibatur. Et si fuerit hyemis tempus ligna tamarisci ante egrum sunt comburenda. Si vero æstatis tempus fuerit: ex sandalis ex folijs rosarum

& miri suffumigatio faciēda est. Hęc quoq; omnia cum aqua coquenda sunt: in qua eger si siticitas prædictarum tardata fuerit: mittendū est. Cunque illud quod prædiximus beneficiatus fuerit & remanserit desuper cortex sedos & habens estas: ex oleo tepido cum coto multotiens in die inungatur. Cunque omnes cortices ceciderint, & ager ex toto sanus fuerit: sed signa quę remanserint remouenda fuerint ex eis quę in capitulo de remotione signorū prædiximus huiusmodi sepe. Balneo quoq; & regimine quod ad huius curā uidelicet, utatur. Quia si variolę & morbilli egrediantur modo inuito sanguine: succus duorū granatorum cum troscisca de spodio datur & ex omni regimine quod potest infrigidare regatur. Pullos præterea non comedat nisi postquam omnes cortices: qui sunt super loca variorum remoti fuerint, febris à corpore atque om

nis calor separatus fuerit. Sumopere etiā est cauendum: ne aliquid quod, ueniret soluat egro postquam variolę aut morbilli apparere ceperit tribuatur. Quod si uicē multū solutus fuerit pusilla cum spodio & gummi arabico & bolo armeno atque rosas sicut in capitulo de fluxu uentris prædiximus in potu tribuatur. Omnibus uero uariolis ille quorum colores sunt violarij: & quę sunt parue & durę: & non maturantur: de teriores eas sunt. Morbilli quę cuius color est, ut violę color similiter est malus. Si autē variolę & morbilli duriter egredi & maturari uideantur: neque febris neque estuatio sedantur: neque alleuiatur & superuenerint præter hoc syncopis & cordis tremor: eger proculdubio moriturus est. Quid si variolarū egressio uelox fuerit & maturitas uelox, febris quoq; atq; calor sedatur: non erit egro uimendū: quia nihil mali inde patietur.

ABIMERON AVENZOAR.

D E F E B R I B V S.

L I B E R.



Quod est de Febris ephimeris.

Cap. I.



DICIT seruus Auenzoar quoddam consuetudo est medicorum nominare unumquemque calorem excurrentē à corpore præter naturam, febrem: sciendo, quoddam ex febribus quædam sunt in spiritibus: & cum dico spiritus, intelligo substantiam subtilem, quę est in corde: quę quidem substantia in intellectu non fit breuis est ad intelligendum. Sed uicinus donec ipsam habemus: & morimur, quando deus ipsam à nobis uult remouere: & quædam febres oriuntur in humoribus: & aliquę generantur in substantialibus membris. Et nunc incipio ab ea, quę omnino habet à spiritibus. Et dico quoddam hæc febris parte generatur à causa extrinsecis sicut à forti ira, & à superfluo uigilia: aut ab intenso, & forti labore, & exercitio exiēs à natura vel ex cōtractione superflue moræ in sole, aut ab intensa frigiditate, aut ex balneatione in quibusdam aquis stipticis, sicut in aqua uirgoli, vel aluminis, & suis similibus. Ira autem procreat febrem: eo quoddam ab ipsa inflammantur spiritus cordis, & totius corporis: & inde sequitur ephimera, quę cum recedit à corpore non

redit amplius. Et hoc intelligendum est, dummodo humores temperati fuerint, & æquales in corpore, in quantitate, & qualitate: interdum durat per tres dies: & hoc est raro. Et hæc febris dicitur ephimera. si nero humores non fuerint in corpore temperati æquales: sed exeat ab æqualitate & temperie in quantitate, & qualitate vel substantia: tūc ad putridam leuiter poterit deueniri: uel ad aliam speciem febrium: de quibus rememoratus ero cum de putrida pertractabo. Cura autem huius ephimerę quę ab ira procedit est infirmum letificare donec remoueatir ira: & non subtilis eius regimen multum: & da ei bibere syrupum mitigatiuum & refrenatiuum irę: sicut est syrupus de buglossa: cuius dosis sit vnc. j. cum vnc. v. aquę rosacę & quiescat absq; excitatione aliqua: & uideas urinam eius. Quia si signa laudabilia in ipsa apparuerint attestantia sanitati: scias quoddam liberabitur ab ipsa: ita quoddam non redibit: & signum certissimum huius est hypostasis alba pineata & lenis, & qualiter ita quod in motu nalis cito ascendit sursum: & cito redit inferius ad suam debitam dispositionem: & in isto signo nūquam cognoui errorem temporibus uitę mex. quare cum uides hoc certissimo scias quod non redibit. Et si cum tali hypostasi urina fuerit in colore & in substantia similis urina sanorum, adhuc certior esse poteris quod non redi

bit

bit. In illa etiam quæ sit ex cogitationibus & vigilijs seruabis prædictum regimen præter quod in illa quæ sit ex uigilijs debes infirmum sollicitare, ut dormiat diu: & confert odorata florea neupharis, & ungere nares eius cum oleo seminum cucurbitarum uel eucumeris: & potus eius sit syrups violaceus, uel de buglossa: quoniam conferunt: & cum uideris signa laudabilia cibabis cum pullis uel carne hœdi lactatis. Et hæc cura sufficit in illa quæ sit ex ira & solitudinibus & cogitationibus & vigilijs. Ephimera autem quæ hœc fatigatione & labore indiget maiori cura: quoniam oportet ut ponas eum in tina plena dulcis aquæ tepidissima quæ balneetur corpus totum præter caput: & fricetur corpus eius totum in exitu cum interioribus melonum, uel pulpis ipsorum quando sunt bene maturi: & si non reperiantur melonca recipiantur semina eorum & pistentur optime: & cum ipsis fricetur corpus perfecte ut eueant uapores fumosi qui resoluuntur uel resoluti sunt a caliditate febrili: & postquam uideris signum certissimum quod tibi iam nominauimus, habere debes pro constanti quod non redibit febris amplius: & potus ipsorum sit sicut potus prædictorum. Et ille etiam qui incurrit ephimeram ex contractione moræ in sole balneetur similiter, & regatur regimine dicto: quæsi causa solis habuerit dolorem capitis intensum: infunde caput eius oleo rosaceo aromatizato sit tempus, & ætas, & regio, & complexio consenserint: & infunde sic, conuascescum cum isto oleo tantumdem aquæ dulcis: & distilla eam ab alto per canulam, uel cum aliquo uase habente orificiū strictum: faciēdo quod infirmus sit sedens & taliter super caput distilletur ut spergatur per totum: & in cameta ipsius perge: & suspende folia cannarum seu arūdioum & vitis, & myrtellæ: torādo optime domum cum aqua, & hoc etiam confert prædictis ephimeris: & cōsidera urinam: quod si uideris in ipsa hypostasim residētē in fundo albam & subtilem & regulatam in omnibus sicut dixi: scias pro certo quod non redibit febris. Sed ille qui cā frigoris patitur ephimerā est balneandus in aqua dulci similiter frigido eū cum semine melonis: & detur ei omni mane de syrupo quinazabin. vnc. j. cum. vnc. iij. aquæ calidæ: & cibetur pullis si uideris quod in urina sit hypostasim alba residēs in fundo & continua atque lenis & cæteris bonis dispositionibus regulata. Sed illi, qui patitur eam causa balneationis: ideo a quibus stipticis aperiantur pori ipsius: & hoc ponendo in eum balneo dulcis aquæ tepidæ frigando eum cum melonibus uel cum seminibus ipsorum. Et si uideris signum laudabile prænominatū in urina: cibabis eum pullis elisis in taspheā cum modico aceti. Si uero cum ista febre non apparerit in urina dicta hypostasim laudabilis: sciat proculdubio quod redibit febris & transibit ista fe-

bris ad aliam specie febris: & hoc secundū est quod corpus fuerit dispositum & preparatum: quod si hypostasim non relidet in fundo: sed est pendens & nigra uel tendit ad rubedinem, inque ei dictam subtilem prohibendo pullos omnino: & regge eum cum pulvis saring ordici: & cum pane abluto quæmuis antiqui nō habuerit istam pro subtili dietam: immo secundum ipsos subtilis digesta erit nihil dare. Et temperata apud ipsos erat date mellucratum tantū: sed pro certo dico quod omnes præter Hippocratem: tunc reponis erant idiotæ & medicinam penitus ignorantes, sed illud non tamen eis inferebat nocuum causam consuetudinis. Sed ille qui non est assuetus caueat ne faciat istud regimen.

Quod est de febre cholerica, seu tertiana. Cap. II.

Etiam feci scire quod hæc febris leuiter cōuertitur ad putridam: quod si complexio patientis fuerit simpliciter cholerica febris erit degeneret cholera quæ putrefcit in uenis uel extra uenas. Si autem fuerit in uenis erit tertiana continua quæ sit absque rigore & typo aliquo. Et si extra uenas extiterit: erit simpliciter tertiana: quæ quauis magnam habeat alleviationem: tamen ex toto nō depuratur perfecte: & cū dedit paroxysmus monetur cum acuitate maxima & furore ualido, atque fortis & pro maiori parte non accidit hæc febris nisi iuuenibus & habentibus complexionem calidam & sic. & ideo æstatis: & eius paroxysmus durat a vi. hora usque ad iij. & permanet tandū dicta febris quousque materia seu humor a natura digeratur: & postea expellatur ab ipsis & scias quod in ista ægritudine non erit salus perfecta nisi prius in die indicatiua signa digestionis apparuerint sicut in urina appareat hypostasim alba tali modo, uidelicet. quod in aliqua die laudabili primo appareat hypostasim pendens in medio uasis, tendens ad rubedinem: & in alia die indicatiua sit dealbata, & in fundo, & cum sic fuerit. s. quod primo in aliquo die indicatiuo incipit hypostasim in medio apparere cum aliqua rubedine: cum ante nullatenus uisa fuisset, & postea in sequenti die cretico uel indicatiuo in fundo reperitur esse cum albedine, certum est atque firmum signum liberationis omnino: cognoscēdo quod dicti dies iudicatiui uel cretici non sunt neque sunt in omnibus diebus: qualiter: sed sunt secundum ordinem atque decursum secundum quem deus sublimis noluit eos ordinare. & ego de eis commemorauit ero cū adiutorio Dei.

Quod est de febre quousiana plegmatica. Cap. III.

Et potest etiam esse quod dicta febris ephimera cōuertatur ad phlegmaticā secundū præparationem

tionem corporis & suæ complexionis & dispositionis, & hæc febris habet paroxysmum in oī die. & eius putredo est ex phlegmate quare longior existit ualde quā tertiana, & eius paroxysmi si militer languiores existunt quā ipsius tertianæ, & propter humiditatem huius phleg. citius, & facilius recipit putredinem. vnde paroxysmi sunt in omni die, & paties modicam percipit alleviationem vel requiem inter unum paroxysmum & alium. Confulo ergo vt medicus sit studiosus in dirigendo hanc humorē. sin subtilian do ipsum & incidendo & diuidendo, & hoc cum syrupo squinzabin composito dādo ei omni die de ipso vnc.ij. cum ista decoctione. Ret. radicis lilij, & radicis sceni. ana pondus vnius denarij: semina melouis & solij polimontani. a. ris. partes tres denarij vnius; contrāreæ minoris quarta pars aure. j. liquiri. mundaiz ad pondus omnium: cōquassentur quæ sunt conqassanda & ponantur ad ignem cum vnc. x. aquæ, & bulliant lento igne vsque ad consumptionem tertie partis, & colentur & cum ista decoct. distem perā prædictum syrupum, & præpina ei omni mane in ieiunio; cum autem syrupus descenderit de stomacho ciba cum pullo decocto cum aceto, & cū pane bene fermentato. & conuenit cuilibet medico vt faciat scire patienti q̄ hæc febris est longa ita q̄ durata. xij. die vsque ad xl. & potest peruenire vsque ad. lx. & hoc totum prouenit secundum grossitudinē & viscositatem humoris. Et scias, q̄ hæc febris multotiens perducit ad hydropsim: quare difficilis curationis atq; grauius existit, & infirmus remanet in periculo grauiusimo atque forti.

16. *Quod est de sanguinea febre. Cap. 1111.*

ET passibile est q̄ supradicta ephimera conuertatur ad febrem sanguineam: cuius tres sunt species; quia aut incipit à principio sui ascendere, & non cessat sic ascendere usque ad finem, seu usque ad creticam sui determinationem, & alia e contrario, quæ incipit à summo & semper proeedit descendendo vsq; ad creticam sui determinationem. & tertia est quæ permansit in uno tenore seu statu usque ad finem. & hæc febris continue & semper affligit usquequo infirmus moritur cum ipsa uel liberatur, & pro maiori parte non accidit hæc febris nisi iuuenibus. Cura huius est sibi tota subrahendo de sanguine usque ad syacopim: cum sciueris pro certo q̄ febris sit ex sanguine: quoniam si sic certisime fuerit liberabis in una die uel in una hora: aut ante ligationem brachij; cum hac conditio ne q̄ patiens sit enacuratus à cholera ante phlebotomiam duas uel tres fellas.

17. 2. iud. *Quod est de melancholica febre. Cap. 11.*

T potest etiam esse q̄ ephimera conuertatur ad melancholicam febrem, & efficitur quarta; quæ est granioris & difficilioris ac tardioris digestionis quā quotidia na phlegma. sed ista nō est ita deceptibilis & maliciosa sicut quotidia na; quamuis sicut diximus sit languinaris & difficilioris digestionis ipsa quotidiana & pro maiori parte non curatur nisi in æstate, & paroxysmi ipsius sunt de quarto in quartum diem, & duobus diebus est inquiete, & paroxysmi huius prolongantur diutius quā paroxysmi phlegmaticæ, & hæc febris naturaliter multum prolongatur; quoniam pluries uidi eam incipere in æstate, & non dimittere vsque ad aliam æstatem, & quandoque prolongatur usque ad duos annos, & interdum plus, & hæc pro maiori parte non accidit nisi senibus, & illis qui utuntur carnes grossas ualde & calcum salitum atque retus, & qui utantur comedere carnes arietum magnorum, & hircorum & castrorum, & etiam qui aliuscunt comedere pisces magnos & ueteres ualde, & carnes salinas quodrunecumque generum sunt, & oliuas, & melongenas. Et in summa dico q̄ hæc febris accidit illis in quibus melancholia prædominatur, siue à complexionis sua radicali, aut à cibis malis generantibus illum humorem, & cum incipit paroxysmus huius uidetur infirmo q̄ grandio cadat super dorsum eius, & incipit cum tussi, & cum recedit paroxysmus remanet mundus omnino longe plus quā in quotidiana; quia in quotidiana non depuratur palatens perfecte nisi post iuiuersalem liberationem, & hucusque rememoratus sum, & rememoratus ero de istis simplicibus febribus parti culariter, ut per simplices intelligas compositiones, cognoscendo tum q̄ pro maiori parte uix reperitur febres ex humore uno simplici; ita q̄ possis dicere q̄ ex pura cholera fiat febris; cū sit calida & sicca ualde, & subtilis substantia, q̄ si occidit hoc est in minori parte, sed denominatio sit à maiori; ita q̄ quando cholera daminatur in aliqua febre, dicitur cholericæ; quæ cum putrefcit intra uenas facit febrem absque rigore; sed cum æstuatione & calore ualido atq; forti, & cum multa siti. Cum autem putrefcit extraneas sicut cum rigore fortis, & sudat infirmus in declinatione, & remanet quietus, & dux hæc febris. si tertiana continua uel interpolata creticant pro maiori parte à. xiiij. die vsque ad xvj. diem; nisi error superuenient ad infirmo uel ab alijs. Sciendo tamen q̄ secundum mixtionem ebolæræ remittuntur accidentia, & prolongatur febris plus uel minus.

Quod est de febre qua fit ex cholera vitellina prasina aut arginosa. Cap. VI.

Et potest etiam fieri febris ex cholera quæ inultima caliditate & siccitate existit cum sub stantia spissa atque grossa; sicut est cholera vitellina & prasina & arginosa. Et potest esse quoddam hæc cholera sit admixta phleg. sed denominatur cholerica à dominio; & secundum quoddam elongatur à simplicitate & puritate cholere; secundum illud prolongantur paroxysmi & accedentia sunt quietiora, & ista febris tertiana quando fit ex cholera vitellina quæ est mixta phleg. facit paroxysmos longiores quàm quæ fit ex simplici cholera atque pura.

Quod est de cura febris tertiana non pura qua fit ex cholera mixta phlegmati. Cap. VII.

Cura huius est potare infirmum cum rebus temperate frigidis & absterfuis, & his quæ habent prouocare urinam & sudorem; sicut sunt ista. Rec. semina melonis & cucumeris, & florum camomillæ. an. aur. x. feminis, & lini, & fenn greci, & orobian. aur. iij. squinæ, sparagi, spicæ nardi, mastice, & seminis feniculi. an. aur. v. conuascentur quæ sunt conuasanda & ponantur in duabus lib. aquæ dulcis, & bulliant usque ad consumptionem medicatis, & colentur in hac colatura ponantur lib. ij. zuecari, & lib. ij. mellis, & lib. j. aceti, & bulliant internum simul usque ad spissitudinem disrupti, & de isto dentur infirmo omni mane. unc. ij. cum. vj. unc. aquæ, & ciba cum pullis paruis decoctis in agrestore vel cû aceto. Sed febribus illa quæ fit ex cholera prasina vel arginosa est fraudulenta & deceptibilis multum, & eius accidentia sunt difficillima & perniciosiora atque fraudulentiora valde accidentibus prædictis quæ sunt in illa; quæ fit ex cholera vitellina, & pro maiori parte non euadunt infirmis ab ipsis quin moriatur, & qui euadunt liberantur cum difficultate, & post longum tempus. Et cû inuadit paroxysmus huius febris angustia torrens patiens multum, & habet inquietudinem magnam cum siti valida atque forti, & habet alienationem varias atque magnas, & iacet se per lectum hoc & illuc, cum instantia vigiliarum, & pulsus patiens in febre est durus parvus atque diuersus, & pro maiori parte finis huius est malus, & in maiori parte liberatur, & qui euadunt cû difficultate euadunt & post longum tempus. Et accidentia quæ superueniunt in hac febre sunt pessima & fraudulenta, atque deceptorum, quia urina talium est pertinens ad viriditatem vel nigredinē, & hypostasis etiam eius est talis, & compendit hypostasis talis in medio, motitur patiens in breui, & quando est in fundo adhuc citius. Quod si in die critica incipiat apparere urina ni

gra absque hypostasi; est signum fortitudinis virtutis expulsiue, quare bonum est, & signum salutis. Sed hypostasis nigra est mala quia significat lassitudinem virtutis in digerendo hunc humorem; eo quod quando natura est fortis & boni esse; conuerit hypostasis ad albedinem; & cum deficit natura; color hypostasis fit niger & mortuus patiens velociter; si tuerit dicta hypostasis in fundo nasus, & si fuerit pendens in medio tardatur mors. Et est elongatio necis secundum elongationem ipsius hypostasis à fundo.

Quod est de febribus compositis. Cap. VIII.

Scias quoddam diuersitas febrium compositarum est secundum diuersitatem humorum qui ad invicem componuntur, & accidentia etiam ipsarum diuersificantur secundum varietatem dictarum commixtionum, & medicus qui perfecte cognoscit simplices, ex ipsis facit & cognoscet compositas.

Quod est de signis febris tertiana. Cap. IX.

Febribus autem tertianæ signa sunt; calor est uisus & fortis & sitis intensa cû instantia vigiliarum & uigilationes, quæ cû est intra uasa, est continua & absque rigore. Sed cum est extra uasa, fit cû forti rigore, & hoc ideo quia cholera spargitur exterius ad membra sensibilia, & mordicat ea, & accidit ei sicut illi cui spargitur subito aqua calida super eam qui contrahitur & patitur rigorem, & sicut accidit vulnerato quando percutitur super idē vulnus, & paroxysmi illius sunt breues & inuadunt de tertio in tertium.

Quod est de signis febris sanguineæ. Cap. X.

Modus uero sanguineæ febris est, quia contineat affligitur, & patitur sitim & vigilias, & habet perturbationem mentis. Sed vapor qui procedit ab hac febre non est intantum mordax sicut ille qui exit à tertiana.

Quod est de signis febris quotidianæ. Cap. XI.

Signa autem quotidianæ sunt; quia est absque frigore; sed habet frigus & specialiter extremis infrigidantur ualde, & habet alices & oscitationes, & lachrymantur oculi eorum, & interdum patientur syncope propter reuocationem & constrictionem caloris naturalis ad interiora corporis. Et paroxysmi huius sunt longiores prædictis febribus, & corrumpitur seu destruitur appetitus stomachi eorum, & sunt absque forti siti, & pulsus non est durus neque minimus diuersus uel uariabilis, neque tantæ uelocitatis sicut pulsus cholericæ, & urina eorum est spissa, & non

non depuratur perfecte inter unum paroxysmum & alium.

Quod est de signis febris quartana. Cap. XII.

Signa autem quartanæ sunt hæc scilicet frigida magnū cum oripilatione, & uidetur patiens quod grando cadat super eum uulque, & paroxysmi istius sunt longiores quàm quotidianæ; sed depurantur perfecte magis quàm quotidiana, & omnes isti humores diuersificatur & uariantur & secundum diuersitatem suam specierum; eo quia plures sunt species cholerae, & plures similiter sunt species phlegmatis, & melancholiz & sanguinis. Et non rememoratus sum hæc nisi signa simplicium febrium in quibus nulla est admixtio alterius humoris; quam quis uix reperiat in omnino simplices atque puræ sine aliqua admixtione in rei ueritate, sed intellectū solo apprehenduntur. Cum autem perfecte cognoueris simplices febres & signa earum; ex ipsis habebis uotissimam compositionem & fuorum accedentium. Et iam superius cum me morauī & sufficienter declarauimus uniuersumque humoris. Cum autem uidebis febrem compositam ex duobus humoribus; compone medicinam secundum illam commixtionem: ageudo plus contra humorem prædominantem. Et cum sic feceris habebis consuetudinem inde, & eris tibi lucē curare has febres & ægitudinem.

Quod est de febre hæctica & signis & cura eius.

Cap. XIII.

Et est adhuc alia species quæ dicitur hæctica, & hæc pro maiori parte nū accidit nisi post alias febres chronicas quæ debilitant corpora & excitant humiditates, & inde corpus acquirit siccitatem & caliditatem, & ista febris proprie sit in radicalibus membris, & pro maiori parte fit post ephimeram, & huc quādo corpus præparatum est ipsam recipere & maxime cor. Et hæc febris permanset, & generatur in radicalibus membris propter siccitatem eorum; sicut ignis permanet & reseruatur in rebus siccis multum, quoniam uidemus quod lapis calcis quando tangitur sentitur frigidus, & cum tangitur ab aqua incenditur, & ardescit ardore ualido atque forti: ita quod manifestissime percipitur & sentitur. Et sic est de illo qui patitur hanc febrem; quia cum tangitur corpus eius sentitur esse calidum non forte calore, & cum cibatur: siue illa cibaria sint calida seu frigida; post duas horas uel tres uisumatur corpus eius totum; & anhelitus eius sit frequens & magnus, & pulsus eorum est durus & tensus: & remanet in hac dispositione usque ad complementum tertie digestionis: & postea

paulatim diminuitur dicta inflammatio atque calor. Et hæc febris in principio sui leuis est ad curandum. Et cura eius est pouere infirmum in balneo dulcia aquæ tepida pluries in die. Et da ei quolibet mane in diluculo de lacte capræ recenter multo: & sic capra parua quæ generet multum lac, & moretur capra prope lectum patientis, ita ut iucouientem post multationem ipsam recipiat ne corrumpatur ab aere, & mala inde fiat digestio. Et istud fieri debet tam in calido aere quàm in frigido, eo quod lac uelociter corrumpitur & alteratur, & cum est corruptum non facit laudabile nutrimentum. Et incipiat bibere de isto ab. vncj. & gradatim ascendat usque ad lib. v. quia, si inciperet dare quantitatem magnam in principio coagularetur in stomaco, & inde mala & corrupta heret digestio. & quod hoc habet remouere est, ut ponatur aliquid mellis dispartum in fundo uasis, & super illud murgatur lac, & miscetur simul & propinetur infirmo secundum mensuram & ordinem prædictum & post potum lactis non comedat aliquid omnino donec digeratur. Facta autem digestionem si uis iterum dare sibi de lacte ad comedendum da, & si nou est assuetudine eum panem frumenti bene fermentati, & carnibus assueti, tamen omni mane da ei lac secundum ordinem dictum, & carnes eius sint gallinae elixæ & præparatæ in tasphea. Et omni hora quando stomachus est uacuus a cibis poue eum in tina aquæ dulcis tepida, & post exitum cibis cum; & sic remouebitur febris cum adiutorio Dei. Et scias quod hæctica habet tres gradus. primus est facilis curationis, eo quod nondum finita est humiditas in radicalibus membris. Gradus autem secundus est quando calor profundatus est in humiditate rorida, quæ imbibita est in radicalibus membris, & hoc etiam bene curatur, si perfecte regitur. Et gradus tertius est, quando calor profundatus est in ipsis radicalibus membris. & hoc postquam humiditas eorum ex toto est consumpta atque finita, & hoc ex toto est impossibile ad curandum. Sciendo similiter quod quilibet ex istis gradibus habet alios gradus ita quod alii qui sunt qui citissime curantur, & quibusdam eorum prolongatur sanitas plus vel minus, & sic etiam aliqui cito moriuntur, & quibusdam eorum mors dilatur & prolongatur. Testiculi autem gallorum qui impinguati sunt ex lacte sunt optimi in hac passione, & etiam qui non sunt impinguati ex ipso sunt satis boni. Potest autem esse quod hæc febris hæctica coniungatur alteri febre, cuius cognitio est difficilis ualde uisi illi qui assuetus est ualde & longo tempore experimentatus, quoniam possibile est quod hæctica coniungatur febribus cholericis & phlegmaticis & sanguineis, & etiam melancholicis. Et si quis quæserit dicere quomodo hoc esse possit: quod hæctica

cum

eam sit calida & sices iungatur febribus sanguineis & phlegmaticis quæ sunt humidæ. Rēpon. quod ex membris quædam sunt siccæ complexionis, & quædam humidæ, & aliqua frigida & aliqua calida, & etiam in uno singulæ in membro quamvis sit calida & siccæ complexionis est possibile, quod in eodem commoretur humor frigidus & humidus, sicut apparet, & manifeste reperitur in stomaco & in vulva: quia cum sint in aliquibus calidæ & siccæ complexionis cōiunguntur in ipsis phlegma, quod est frigidum & humidum, & potest humiliter esse e contrario. scilicet quod aliqua membra sint frigida & humidæ complexionis, & in ipsis reperitur cholera quæ est calida, & siccæ complexionis. Ex febribus sicut dicitur quædam sunt quæ sunt in spiritibus quæ dicuntur ephemeræ, & quædam putridæ, quarum species sunt quatuor. scilicet quod aliquæ sunt ex cholera, & aliquæ ex phlegmate, quædam ex sanguine, & aliæ ex melancholia. Ex componuntur etiam hæc febres interdum adinuicem diuersis compositionibus, uidelicet quod cholera potest componi cum sanguinea & cum melancholica, & aliquando cum phlegmatica. & est possibile quod compositio fiat ex uno eodem humore. scilicet quod cholera fiat & sit putrefacta intra uenas & extra, & sic erit continua & interpolata ex eodem humore. & potest esse quod cholera sit putrefacta intra uenas & phlegma extra uel e contra, & possibile est quod in omnibus istis compositionibus pariter iungantur simul, vel incipiant simul: quare accidentia sunt confusa & mista adinuicem: unde sunt difficilius cognitionis ualde, & non potest haberi ista cognitio absque studio & labore uehementi cum magna præuisione, quoniam graue est & difficile res ualde cognoscere compositionem interpolatam cum interpolata, & compositio nem continuam cum interpolata, & etiam quando sunt ex diuersis humoribus & componitur interpolata cum interpolata, uel interpolata cum continua, & propter hoc ad cognoscendum ista indigemus studio magno cum præuisione & sollicitudine uehementi. & hæc de causa non possunt perfecte scribi in libro, & est possibile etiam ut componantur duæ febres ex uno humore, ita quod interpolata est multæ putredinis extra uasa, & continua pauca putredinis intra uasa, & aliquando reperitur quod ambe sunt magnæ ualde, uel e contrario. scilicet quod ambe sunt paræ multum, & commiscetur paroxysmi adinuicem, ita quod unus subintrat alteri, & commiscetur simul accidentia, & erunt hæc febres, aut omnes magnæ uel omnes paræ, uel aliquæ magnæ & aliæ paræ. Et cum dico magnam uel paruum, intellige per magnam multæ quantitatem putredinis, & per paruum modicam quantitatem eiusdem. Et est possibile quod

cholera quæ est materia febris sit grossæ substantiæ & phlegma, subtilis substantiæ, uel quod melancholia sit subtilis substantiæ & sanguis grossæ. Ergo cōsistendum sit paroxysmi & eorum cursus, & considera iterum quomodo componuntur interpolata cum continuis unius speciei uel diuersarum specierum, & quomodo cōponuntur in una cum paruis, uel e contrario interpolata & continuæ, & cognosce similiter quod una febris potest componi cum duobus uel cum pluribus. Et est possibile iterum quod aliquis humor putrescat extra uasæcum hoc habebit pleuritidem ac peripneumoniam, aut apostemam in diaphragmate quare paroxysmi adinuicem componuntur, & unus alteri subintrat, & propter hoc cognoscere ista difficile est ualde, nisi illis qui multum assueti sunt in his. Sed illi qui non sunt assueti & per longum tempus approbati nonquam ad istam cognitionem poterunt peruenire. Quæ de causa medici multum reperiuntur errare in his. Ergo medicus primo studere debet diligenter in cognoscendo febres simplices. Et postea attendere debet solite si una ex compositionibus est cum aliqua ipsarum febrium uel plures ex componibus. Quod si sic studiose & aniente studuerit leuiter ad cognitionem dictarum compositionum poterit peruenire, & quanto febris fuerit simplicior tanto dies indicatiua & critica erit facilius cognitionis, & quanto fuerit magis mista tanto dies indicatiua & critica erunt magis confusi & difficilius notiones. Et ego intendo nunc rememorate de diebus indicatiuis & criticis postquam dixero hunc sermonem super febres. Istotertius quod multæ febres sunt propter debilitatem uirtutis & stultitiam medicorum, & hoc quando medici cōsultant eis comedere plura cibaria quam uirtus eorum sufficiens sit coquere & digerere, & hæc de causa sunt febres; quare necesse est ut proponatur eis cibaria ad pondus donec febris ex toto remaneat: nec post recessum febris incipienti debes addere in cibis sed ea pascere debes usquequo transierit. v. dies & tunc addere debes pondus apre de cibis, & sic gradatim ascendere debes donec fuerit recuperatus, & si sic non feceris reciduas erit grūtudo. cognoscendo quod omnes species earum febrecitamentibus citissime cōuertuntur ad putredinem. Et est impossibile quod post crīsim aliquid putredinis non remaneat in aliqua parte alicuius membri quæ potest uigorari & augeri ex regimine malo uel inconuenienti. Et si regitur sicut debet ordinata natura confortabitur & uigorabitur donec ipsam consumatur, & perfectissime expellet. Completos est tractatus de febribus cum laude Dei; secundum quod mihi sufficiens esse uidetur.

A V E R R O I S

D E F E B R I B V S

L I B E R.

Quod est de signis Febris ephimera.

Cap. I.



NCIPIAMVS à mala cõplexione vniuersaliter totum corpus ambienſe quæ febris noncupatur & incipiemus à febre dici. Et dicimus quod ipsam semper præcedit aliqua ex extrinsecis causis efficientibus: excep-

pro quod hæc in ipsa nõ est et ligna propriis, quod est, quia cum feb. dici semper hoc inuenitur. Sed non conuertitur, vt semper talibus causis stantibus necessario febris adſit. Et propterea in stando est vt signa propria cognoscamus & etiã communia ad credulitatem fortificandam adducamus, & etiam quia valent ad contrarium remouendum. Et hæc febris signa propria sunt duo. Vnum est quod pulsus in hac febre varius non est, quod est quia varietas nõ fit in putridis febribus; nisi propter humorum multitudinem aut malitiam. Secundum est quodd vrina suum naturale sedimen non mutat, quia in hac feb. vrina non mutat nisi colorẽ, & hypostasis non egreditur à solito, nisi propter humorum putredinẽ. Et ob hoc necesse est vt in hac febre hypostasis à solito non mutetur, & ex significationibus aliquando erit vt in hac febre accidentia fortia nõ sint, & est leui caloris non inflammãtis & vt plurimum semel accidit vel forte ter aduenire potest, & dicitur quod quando patiens intercalaneum & horripilationem non sentit quod tunc est ephimera. Et hæc sufficiunt significationes in febre dici.

bent interpolationem circuitus & typos. Et causa propter quã habent circuitus est, quia humor qui putrefieri debet non putrefcit simul & semel, quod est, quia in eo preparatio putrefactionis non est cõpleta, sed paulatim in putrefactione procedit, & hic sequitur modus ordinationis, quod est, quia hæc operatio secundum aliquem modum est naturalis, quod est, quia natura in hoc regimen habet, eo quod est putrefactio cum digestionẽ, & propterea varietas ordinationis in circuitibus signũ est malum, & non est hæc operatio attribuenda calori putredinali simpliciter, sed calori naturali, eo quod in materia non naturali operatur sicut in multis viis nature repetitur. Et rationes Galeni quibus conatur attribuerẽ ordinem circuituum substantialiter calori putredinali hic inſurgunt, & nostras radices naturales non sequuntur quæ super philosophiam & metaphysicam inſcribuntur, & qui ita las non intelligit hoc non consistebit. Et propterea mea sententia penitus est quod natura istos circuitus cum calore intrinſeco operatur, quãuis superuenierit huic calori aliquid extrinsecum in quantitate aut qualitate, in eo quod est agens in materia non naturali, videlicet in humore agritudinem faciente. Et accidens quod cum humore aduenit est simile in hoc accidenti quod ei aduenit cum cibo, quod est, quia incontinenter sumpto cibo inſurgit. Et non est inter hæc duo differentia nisi quod accidens quod aduenit propter cibum est naturale: quia cibus est naturalis: sed quod aduenit cum humore est præter naturam: quia calor cum materie primo obuiat sepelitur, & postmodum affonit victoriam super ipsam, & augmentando ad suum reuertitur esse quando ipsius digestio fuerit perfecta. Et iam bene exposuimus omnia in tractatu quod fecimus super libro de febribus Gal. Et ille ordinationes circuituum diuersificantur secundum naturam humorum, & quantitatis facientis febrem secundum quod infra dicemus. Et causa quare febres quæ sunt intra venas interpolationem non habent: est quia quando in partem humoris putridi calor accenditur non potest ipsum naturam dissolvere: donec alia particula accedatur. & hoc propter solidationem usorum contingit & propter eãdem causam etiam typus non fit:

Quod est de febribus putridis & de earum signis.

Cap. II.

ET dicamus de putridis: harum febrium vniuersaliter duæ sunt species; vna in omnibus venis fit, & alia fit in humoribus digestionis mēbrorũ. Et differentia quæ est in his duabus speciebus talis existit, quod est, quia febris quæ fit ex materia existente intra venas; interpolationem non habet neque typum: quãuis paroxysmus aliquod plus fortificetur alijs diebus temporibus: Sed febres quarum materia est extra venas ba-

& etiam quia illud quod ex eo dissoluitur à mebris sensibilibus non sentitur. Sed potest factio quæ in humore fit qui contra oenas est huic contraria existit propter evaporationem quæ per porositate membrorum fit, & propterea sunt in istis circuitibus typi propter spationem humoris puncti sui super membra sensibilia aut humoris ventosi: propterea quia typus magis appropriandus est humori mobili ventoso quam fixo. Et signa propria febrium putridarum sunt duo. unum est quod urina in principio hypostasim non habet: propterea quia calor est impeditus propter humoris digestionem, aliud est quia pulsus est varius & diuersus. Item alia sunt signa istarum febrium à signis significatibus duas species repletionis: hoc est secundum uas & secundum uirtutem. Ista sunt propria signa uniuersali tatis febrium putridarum.

Quod est de signis febris cholericæ.
Cap. III.

Sed signa propria unicuique febris sunt hæc. Scias quod signa febris quæ fit ab humore extra uenas, & in febre cholericæ sunt typus fortis puncti ueni. Et pulsus in principio istius febris est par uis rarus & debilis, & hoc est propter humorem qui eam lolem obritur naturalem, & propterea refrigeratur corpus in principio paroxysmorum: ex eo quod calor naturalis ab humore opprimetur putrido. Et quando calor extraneus generatus in humore putrido calori naturali admiscetur tunc crescit & per totum corpus augmentatur, & propter hoc pulsus in eodem statu non permancet; sed propter caloris incrementum crescit & fortificatur. Et urina in hac febre pro maiori parte est ignea, & patiens penitus affligitur siti, & aliquando huius iungitur amaritudo oris. Et dicitur quod quando hæc febris dicitur pura quod ipsius paroxysmi ad plus usque ad duodecim horas prelongantur. & circuitus huius febris est tertianus, sed tamen non conuertitur, quia non est necessarium quod omnes febres quæ habent circuitum hunc sint de cholera. Sed possibile est ut sint duæ quantæ aut duæ quantæ, & hoc non accidit nisi in principio egreditur. Ista sunt signa propria huius febris, & aliquando significationes istæ febres communibus fortificantur. hoc est quia complexio, ætas, & aliud regimen huius humoris comparantur. Et æter cum hoc humore comparationem habes modis duobus, unum est secundum suum tempus naturalem, ut est ætas quæ est calida & sicca, aliud est quando egreditur suum cursum naturalem ad caliditatem & siccitatem, quamuis tempus per sui naturam debeat esse frigidum. Sed febres quæ paroxysmos non habent istis communicant

exceptis circuitibus & typo. Et in hoc genere ingreditur febris quæ causon nuncupatur cuius materia intra uenas est, & maxime circa os stomachi, & hepar posita est, propterea in hac febre non est rigor. Et sius fortis huius febris proprium signum est. Et peior specierum causonis est illa quæ fit à cholera zinzaria aut prasinia. Et illius paroxysmus longus est propter inobedienciam humoris illius ad digestionem recipiendam.

Quod est de signis febris phlegmaticæ.
Cap. IIII.

Accidentia magis propria huius febris sunt, quia in principio extrema infrigidatur & est tempus frigoris longum, sed paulatim inualescit. Et quando incipit calor apparere reddit frigus & fortificatur super eum. Et tempus paroxysmi istius febris. xviij. occupat horas, & calor istius febris non est mordacitatis nec furiosus, & propterea primitus tactui non manifestatur. Et huius febris pulsus rarus & minor est pulsu febris tertianæ in quolibet iussu suorum temporum. Et urina in hac febre est subtilis & alba, aut spissa & obscura, & si calor putredinis est fortis, & phlegma purum non est, tunc possibile est ut urina sit rubra, & palpebræ patientis tumide erunt. Et in pluribus horum patientium os stomachi est frigidum, & si uomitus eueniat phlegmaticum eo odient. Et aduentus ipsius paroxysmi omni die signum proprium non est, quia dicitur tertianæ hunc eundem faciunt paroxysmus. Paroxysmus longus est propter ipsius humoris tarditatem, & paroxysmi ipsius plus conuincuntur quam cholera paroxysmi, quia iste humor putrefactioni magis est appropriatus. Et adhuc propter longitudinem paroxysmi aduentus humoris non corrupto preparatio putrefactionis propter longam moram caloris extranei in corpore diu permanentis, & hoc propterea accidit, quia calor febris huius est temperatus & subiectum habet humiditatis. Sed in febre cholericæ quia calor extraneus cum ea recensens cito transit non est tempus præparatum ad putredinem in parte non putrefacta, & uniuersaliter in hac febre calor intrinsecus est habet sepius, hæc enim est causa ad plus continuandos in hac febre paroxysmos. Et deterior harum febrium est illa quæ ex phlegmate fit uirens. Et similiter etiam aliquando cognoscitur hæc febris, ære, etate, & consuetudine & complexionem, quia hæc comparationem habent cum humore hanc faciente febrem.

Quod est de signis febris quartana.

Cap. V.

Haec incipit cum frigore graui, ita quòd tunc accidit patienti stridor dentium. Et pascens tunc sentit membrorum contractionem, & hoc fit propter frigiditatem ipsius humoris & grauitatem. Et pulsus istius febris est tardus, rarus, & paruus, plerumque fit in phlegmatica, hoc dico in principio paroxysmi. & dicitur quòd in augmento maior est quàm in phlegmatica, quia calor in hac febre manifestatur & febris fortis exillit. Et colores uirg in hac fe. uariantur, nam aliquando est alba & subtilis ad uiriditatem declinans, & aliquando nigra & grossa ad rubedinem declinans, & ut plurimum hæc febris aliquas sequitur febres. Et tempus huius febris est longum, & tempus reuolutionis ipsius est dimittens duos dies, & inualescit tertium. Et quartana cirentus est quasi sicut proprium signum in hac febre, propterea quia non inuenitur talis circuitus in aliqua alia febre simpliciter uel composita. Et maior pars hanc patientium sunt splenetici. Et fortificatur significatio in hac à rebus communibus secundum quòd in alijs dictum est, ut ab aere & ab aratibus, & à complexionem, & à signis significantibus dominium istarum humorum.

Quod est de signis feb. que in arabico nominatur michabechæ, & est sanguinea.

Cap. VI.

Haec febris typum non habet, eo quòd sanguis eam faciens est in uenis, excepto si fieret propter apostema nominatum phlegmæ, quod in aliquo membrorum principalium esset generatum, sicut in hepate & etiam diaphragmate, quia tunc in hac febre essent paroxysmi tertianarum similes cholerae paroxysmis, quia sanguis quando supercalescit ad naturam declinat cholerae, & propterea in hac febre non est differentia inter febr. cholericam quæ habet materiam intra uenas & istam nisi in magis & minus, quia non potest in corpore fieri febris de cholera pura solum, quia talis febris de cholera de necessitate mortifera esset, quod est, quia cholera non est apta recipere aliquam digestionem, nisi in hoc quòd cum sanguine est admixta, aut cum materia quæ nutriuntur membra radicalia, hoc est sanguis dealbatus. Et signa quæ significant hanc febrem sunt signa dominium sanguinis significantia, & iam nos narrauimus ipsa. Et pulsus hanc patientis est in ultimo magnitudinis & fortitudinis. Urina est rubra & grossa & suspuria, & inquietudines sunt propria in hac ægritudine & in cholera. Excepto quòd in

ægritudine illa fortiora existunt. Et alienatio mentis propria est in febribus acutis. Et uerba Galeni uaria sunt in hac febre, quia aliquando dicit quòd est cholericæ continua, & aliquando dicit quòd est aliud à cholericæ, & quod non debet attribui cholericæ, nisi quia non habet putrefactionem perfectam, quia natura istius febris est media inter febrem dici & febrem putridam, & sententiam meam tu iam nouisti. Item febris ista non habet nisi unum periodum, & in illo aut soluitur aut occidit. Et aliquando incipit lenta & semper ad ultimum fortitudinis crescit, & aliquando est contrarium, & aliquando in nno permanet statu, & causa huius paroxysmi alias per alios multoties dicta est. Ista sunt signa cognitionis februm simplicium, & qui simplices cognouerit, compositas cognoscere poterit. & ista exempla non fuerunt data nisi per modum similitudinis, quia raro inueniuntur. Et adhuc quia maior pars accidentium quæ in his febribus tibi narraui non uerificantur nisi in febribus quæ sunt de materia humorum naturalibus propinquiorum: uerbi gratia quia paroxysmus febris cholericæ maior. 1. occupat horas, quando cholera naturalis est putrefacta. Sed quòd uitellina aut zinariæ putrescit, tunc longior erit paroxysmus, & accidentia erunt pessima, & pauci euadunt & maxime ex zinariæ, eo quod aptitudinem digestionis non habet, quod est, quia quandocunque humor adeo contrarius est ut complexio corporis non possit agere digerendo super eum, tunc febris deteriorum exitum habet, & quandocunque potenter principior est, tunc febris salubrior est.

Quod est de compositione februm.

Cap. VII.

Et scias quòd compositio febris est à causa locali, aut à causa materiali. Item cause materiales tres habent modos. Vnus est quando duo miscentur humores, & tunc materia febris fit inter illos duos humores simplices qui singulas possunt facere febres, & etiam accidentia tunc ex his mixta erunt. Item alius modus est ut non sit putrida, & alia hæctica. Tertius modus est ut unus modus faciens febrem sit cum apostemate & alius sine. Et aliquando componuntur duæ febres & miscentur earum paroxysmi absque eo quòd materię misceantur, & hoc propter causas locales accidit, sicut possibile esset si una esset intra uenas, & alia esset extra, & in hoc genere locatur feb. quæ emittitur non occupatur. Et aliquando humores febrem facientes erunt uicini, sed non mixti. Et possibile est etiam ut omnes iste species aduicem componantur, Et etiam potest unus modus compositionis dici ut secundum magnitudinem & paruitatem secundum fortitudi-

nem

nem & debilitatem, hoc est ut causarum efficien-
tiam una sit fortis, alia debilis.

Quod est de signis febris hæcticæ.

Cap. VIII.

Hæc febris tres habet secundum quod ab alijs dicitur, & accidentia in hac secundum plus & minus differantur, & accidentia eius occulta sunt in principio, & quodcumque videbis corpus cum calore continuo lento ultra dies tres: quando non in corpore incipit manifestari tunc lente continue assimilatur. Et si patiens eam quasi non sentit: nec habet putridarum febrium significationem opinandum est ipsam esse hæcticam. Itē post horas tres ab assumptione cibi patientis pulsus considerare debes, & calor quantitate, & si calorem inueneris augmentatum, & pulsus uelocitatem in aliqua dimensione magnificatū tunc istam febrem hæcticam iudicabis: quod est propterea quia membra malam complexionem acquirunt calidam: de natura nutritibilis est sibi nutrienda assimilare, necesse est ut cibis corpori adueniens calorem extraneum debeat adipisci: quamuis cibis ille frigidus sit aut non, & propterea tunc febris fortificatur, & accidentia augmentantur, quod in putridis non conuenit, propterea quia calor extraneus in illis radicaliter non est fixus in membris quæ in cibum agere debent. Et causæ quæ ab alijs medicis dantur accidentales sunt sicut fabula cantatorum, quia dicunt quod cibus in talibus patientibus & corporibus est secundum similitudinem aquæ super calcem proiectæ: quia impossibile est ut uirtus nutritibilis à nutriendo tantum sit elongata ut ipsum eadem sit contrarium. Sicut aqua calci reperitur enim quod vnum quodque istorum alterum corrumpit. Et raro hæc febris accidit nisi post alias febres sicut post ephimeram in corporibus ad hanc paratis aut post aliquando ex febribus putrida. Et quando fortificatur hæc febris marcescit corpus infirmi & siccatur pellis eius, & deformatur facies & profundantur oculi. Ecce cum uenerit ad ultimum gradū hæctice videbis oculos eius quasi asperos cinere sicut uidetur in oculis coru qui tangunt puluerem & contrahuntur palpebre in ferus sicut accidit patienti subeth & pellis frontis est tensa & sicca quasque orium præparatum, & tempora habet tensa: auriculæ & palpebre ei trini sunt coloris. Et pellis myrach uentris sit sicca & rugosa, & pulsus eius est tensus sicut chorda, uelox, & debilis, & urina est oleagosa. Alia uero signa istius febris manifesta sunt & in libris spiculatorum plene narrata. unde non est necessarium ea reiterare.

Quod est de cura febris ephimeræ in generali.

Cap. IX.

Et dicimus, quod intentio medicationis in illa duæ res existunt: una ad remouendum caliditatem, & sic malam complexionem, quæ est in ipsius substantia, & hoc fieri debet infringendo, & humectando. Et alia, ut causæ extrinsecæ febrem facienti resistatur: ob hoc quia hæc febris nihil aliud est, nisi mala complexio non materialis, quæ ut plus à causis extrinsecis causatur. Et mensura in frigidationis, & humectationis in hac febre est secundum mensuram rerum particularium, sicut est complexio, ætas, consuetudo, & regio, & causæ ipsam facientes. Et scias, quod refrigeratio in febribus per se, & per accensum sit. per se sicut per medicinas, & cibos frigidos, per accensum uero, sicut balneari in aqua calida, aut tepida, & maxime in hac febre, eo quod per ipsam in spiritalibus vaporibus dissoluitur, qui nisi resolverentur, corpus nimis inflammaretur, & fortasse ad putridam conuerteretur, & propter hoc balneum est omnibus cura uniuersalis. Sed in aqua existit diuersificatio secundum diuersitatem causarum facientium febrem, & hæc febris secundum plurimum accidit propter cutis densitatem, quod pluries accidit propter frigus, aut propter in aquis stipticis balneationem, aut propter necessariam balnei negligentiam, aut propter totius corporis siccitatem, sicut illis accidit qui in aere calidissimo degunt. Et uere plurimum hæc febris accidit habentibus complexionem calidam, & siccam.

Quod est de cura febris ephimeræ in speciali.

Cap. X.

Et de hac prima loqui uolumus, & postea de complexione ea. & hu. & ultimo de cal. solum. Et dicimus, quod quando accidit propter cutis inspissationem, aut propter aquarum stipticarum balneationem medicatione per contrarium illis erit balneatio in calida, aut tepida aqua post declinationem paroxysmi, & frictio utilis existit in exitu balnei cum oleo tepido, in quo nulla stipticitas reperitur, non est necessarium balneum reiterare ultra semel, sicut Galen. faciebat, qui infirmum faciebat intrare bis, & ter, eo quod hoc regimen non conuenit, nisi hominibus assuetis multum balneari, sedem broeatio post balneum cum aqua frigida, ut mihi uidetur iterata conclusionem faceret pororū, nisi pori nimium forent aperti, aut corpus esset nimis calefactum. Et melior eibus, qui post balneum est propinandus si erit complexionis calidæ, & siccæ, & tempus fuerit ea. est ptisana hordei, eo quod infrigidat, & humectat,

T 2 &

& adiuuat ad expellendum superfluitates per omnes suas uias, & post huius digestionem dandi sunt pisces petrosi, carnes perdicum, & similia. Et si alium fecerit paroxysmum, balneum, & digram hanc reiterare debet. Et aliquando propter nimiam tristitiam, & multam iram fit, & propter multam in sole moram. Et quæ propter iram accidit, maiori indiget refrigeratione quam illa, quæ propter vigilias, aut propter tristitiam proveniit, & nulla istarum indiget frictione: sed balneo solum. Et quæ propter vigilias, & tristitiâ fit, maiori indiget humectatione somno, & gaudio. Et quæ propter moram plurimam in sole accidit, indiget refrigeratione, & ut longam in aqua calida contrahat moram, & facta frictione cum oleis frigidis, & inungatur cum oleo uiol. & similibus. Et quando propter malum am accidit frigiditatem, balneum intret calidum, & balnei calidus aer utilior existit balneo aque. Et cibi temperati esse debent aut ad caliditatem declinant, ut turtures, coturnices, & similes, & aqua mellis ualde utilis est, caput vero talium oleo ros. inungatur, & alij actui calidis: quem ad modum alij frigidis in actu inungi debent. Et scias, quod vniuersalis medicina omnibus patientibus ephimeram exstiterit balneum exceptis patientibus reuma propter frigus. Et in ephimera ab apostematibus inguinum, aut subascellarum causata, & si causa reumatis calida fuerit, dicit Galen. q. balneum inrare debet, & hoc non dicit, nisi quia sufficiens est in humorum subtilium digestione, sed grossos disperget per totum eorum, nec balneari debet nisi post digestionis complementum. Et vina aquosa alba aromatica omnibus istis vitiis sunt si bibere afflicti fuerint, ita quod post digestionem bibantur: nam plura habent iuuamenta, quam aqua, nam uinum natationem cibi in stomacho vetat, ventositatem resoluunt, urinam prouocat, & sudorem, animam laxificat, & adiuuat naturam ad expellendum superfluitates quando patientes hanc feb. debilitatem incurrunt digestionis, & maxime habentes ipsam ex vigilia uel tristitia. Sed quæ a festinatione est, tantum in sua curatione indiget dicta uersus frigiditatem tendente, & ut cibetur quantitate tali, quæ uanescam non inducat. Sed illi, qui hanc febrem patitur ex fame propinanda sunt cibaria, ualde & cito digestibilia, tendentia ad frigiditatem, & humiditatem, & propter hoc si inbueris tales in principio paroxysmi, non febricitabunt. Sed si propter cutis fuerit coarctationem, in primis tribus diebus erit sufficiens frictio, sicut cum semine melonum, mili, aut hordei farina, aut fabæ nel orobi, & quæ appropriantur, propina sicut squinzibin cum aqua ireos, & capill. uene. & uiol. & si hæc sufficere non uidentur, & feb. tertium transierit diem, aut tu arbitratus fueris à principio,

ut tanta fuerit in corpore repletio, ut propter frictionem, & apertionem sine uniuersali euacuatione ægrum ledere posses, ob hoc quia tale medicamen in corporibus plenis plus oppilat, quam aperit, tunc medicatio talium media inter ephimeram & putridam esse debet. hoc est in phlebotomia, & corporis inollificatione. & hoc facias secundum excessum à signis consideratum. & secundum quod ab experientia, & bonitate æstimatione poteris perferari, quia propter solam doctrinam certificari non posses quod in quoque indiuiduo faciendum sit in quantitate & qualitate in hac arte. & necessaria est in hac arte præter auiuersalem rerum cognitionem experientia, propter quam particularia principia habeantur, in eo quod in nouoquoque indiuiduo fieri debet. Et scias quod ista principia scribi non possunt omnia, quia sunt infinita. & ista pars scientiæ medicinalis nobis vetat perfectionem habere in hac arte, eo quod magis est appropriata experientie quam rationi. & propter hoc dixit Hipp. ars longa & uita brevis. Et egomet non studui in hac scientia ut uideatur mihi ut sim fructificiens: sicut uidetur multis medicis nostri temporis, qui multum elongauit ab eorum intentione, exceptis filiis Auenzoar & maxime Abouli & filio eius Abenariam, cui deus conferuet vitam: nam isti ueri magistri sunt in scientia medicinali. Reuertamur ad dictum nostrum & dicamus quod maior pars istius feb. à stipticitate provenit & siccitate, & maxime in complexionibus calidis & complexionibus siccis habentibus. Et hæc eis non peruenit: nisi quia cibi permittantur in eorum stomachis ad fumositatem, & quibus superuenit eis fluxus ventris & pluribus eorum quibus hoc accidit, accidit propter corruptionem ciborum & ipsorum mordicationem. Et aliquando accidit illis ventris constipatio. quod prauum existit, & constipatio hæc accidit propter caliditatem & siccitatem, & nimis espoliæ debilitatem. & sic dicendum est de medicatione cuiusvisque istorum per se.

Quod est de cura febris ephimera quando est cum fluxu uentris. Cap. XL.

ET dico quod illi cui accidit fluxus ventris in ipsius curatione consideratio est habenda. Ita quod si humor eductus est & fluxus cessauit: fac ipsum ingredi balneum, & ipsum ciba cum confortantibus stomachum, & ipsum stomachum cum ueniens confortantibus vngere. Sed cum fluxus est in statu melius est ut in balneum ipsos ire non permittas. hoc G. dicit: sed noui medici medicantur forte fluxu cum balneo, quia dicunt quod attractio non facit ad oppositam partem. & quamuis ita sit non est propria medicina, sed est per accidentem, & ideo quia est per similitudinis uiam. Et in scis

q̄ contrarium debet expelli per suum contrarium. unde hoc quando possumus est dimittendum. Sed patiens est cibandus absque positione ipsius in balneo, immo debes conservare ut restitui ipsius stomachum evacuatione cessante cum lana infusa in oleo ablinthij & oleo ros & si masticem congitum acceperis & cum oleo ros. misceveris, & prædictæ lanæ infuderis: multo fortius operabitur. Et vniuersaliter scias q̄ in membris principalibus non est superdonesda medicina actualiter frigida, quamuis potentialiter frigida existat. Et si fueris multa inflammatio in ore stomachi misceas cum tistis oleis succum extremorum vitium & succum cydoniorum. & aliqui apponunt ceram & faciant inde cerotum. Et aliqui ex hac medicina mirantur, & dicunt cum ægros stomachi habeat mala complexionem calida viciatum, cur. q̄. ponit masticem cum oleo ro. & nos respondemus q̄ significatio hæc recepta à mala complexionem sola est alia à significatione recepta à complexionem membri. Ob hoc quia intentio medicationis istius in membris est ut fortificetur cum medicinis habentibus aliquid stipticitatis cum amaritudine & aromaticitate. Et propter hoc primi experimentatores non curabant debilitatem stomachi nisi cum his prædictis. Et possibile est ut multis hominibus nocebat q̄ malam complexionem non considerabant, sicut dicit G. vni accidit qui malam complexionem habebat in stomacho calidam & siccam. Multum ergo considerandū est si mala complexio est tanta ut ipsam nimium timentus, studeamus solum in horis stomachi confortatione. Et si non admiscebimus cum his frigidis medicinis observato ut sine illis similes in stipticitate, & tales medicinz sunt multæ. Sed si fluxus non cessauerit non desistas ipsum cibare cum rebus stipticatem habentibus, & secundum quantitatem fluxus ipsum regere. Nam si paucus sit fluxus sufficit panis biscoctus cum rucharo vel succo ro. confectus, aut cydoniorum succo. Et si multus sit fortioribus viere vel pane biscocto hordei cum succo cydoniorum, & vinū pomorum granatorum est bonus: cibus secundum G. Sed si cessauerit fluxus mica panis conueniens est. Et si superuenerit casus appetitus sumat electuarium cydoniorum cum aliquantu lo masticæ cum succo extremorum vitium. Et Gal. utitur hoc electuario cydoniorum quod composuit in fine regionis sagittarum. Sed medicina in qua intrat piper aut res calidæ tunc est vitanda, & maxime in climate nostro tempore calido & calida complexionem. Et quando illis accidit ventris constipatio, tunc considerandum est in quo loco sit cibi retentio. vitum in stomacho aut intestinis. si est in stomacho, q̄. precipit dari confectio nem trium piperum, sed non de forti in qua intrat medicinz, sed de debili quam

posuit in libro de ingenio sanitatis. Et hæc medicina non est conueniens: nisi illi in quo cibus permittitur in stomacho ad acetositate: quia stomachis calidis & nauseam ex caliditate habentibus hæc non erit vilis medicina. Et est dictum Gal. quod iam declaratum est in agnitionum libro q̄ virtus membrorum æque debilitatur per complexionem calidam malam sicut per frigidam: quia aliq̄d membrorum non habet suam accidentia nisi per mensuratum calorem. Et si debilitatur per complexionem frigidam est hoc substatiale, eo quod est ei necessarium. Et propter complexionem calidam erit per accidens sicut sol fortis qui extinguit ignem, & calor fortis formacis extinguit candelam. Similiter potest dici secundum Gal. de debilitate stomachi que fit propter causas calidas & nauseas calidas. ergo Gal. non respicit nisi ad frigiditatem que stomacho accidet per accidens in hac arte, & hoc curare intendebat. Sed providendum est super complexionem malam, & sic medicinz misceri debet. Sed credo q̄ clima suum ipsum in hoc sustentauit. Et mihi videtur q̄ electuarium cydoniorum mixtum cum ligno aloes, masticæ, gar. multum ualet si sit saliter compositum ut frigiditas cydoniorum vincat ipsum caliditatem. Et non est tradendum obliuioni de modis compositionis harum compositionum: quoniam si uoluerimus scingere uirtutes ipsarum medicinarū absq̄ cydoniis per hoc facere cum extremitatibus uitium, uel cum aliis rebus frigidis & stipticis, & medicis in hoc promissus esse debet ut resistat ei quod plus est intendendum. Et melius est q̄ calor qui ex promissus emittitur sit in primo gradu. Et quoniam fuerit necesse frigiditatem stomachi remouere diminuat, & hæc gidas: sicut nos dietionis aut in aliquibus quantitatem calidam quando non oportet complexionem calidam procurare. Et Galenus præcepit embrocari uenterem istorum cum aqua calida, & intendit per hoc uentrem mollificare, sed quia mollificatio nocet stomacho, oportet q̄ fiat cum timore, & quoniam mollificatio sit huiusmodi grauægritudine nature membris geratis existit. Ob hoc est necesse has duas res misceri aut semper rem conuenientem ordinare. Sed cum cibus ex stomacho descendit, tunc embrocatio ualde utilis existit, hoc obseruato ne cibus indigestus ad membra trahatur embrocari, & hic cliste re melius est omnibus que fieri possunt, & si non est mordicatio aut uentositas tunc sufficit clistere factum ex melle, oleo, & aliquantulo sale, & si in ordinatione fuerit, tunc admisceantur pinguedines anseris & gallinæ. Et si uentositas affuerit necesse est ut in oleo coquantur parū rutæ, & seminis resolucentis uentositatem: uel seminis apij & cimini & similibus. Et uentositas cum nauseam in hoc loco significat quod natura calida calor debilitat,

& propter hoc non est calefaciendū nec refrig-
randum; sed utriusque utendum erit, & aliquan-
do hæc febris tribus diebus perdurat: sed non
timeas & rege ipso post exitum paroxysmi, &
post euacuationem nentris ponendo ipsos in
balneo, & ciba ipsos cibis conuenientibus. Sed
ea uasica acetosa hæc feb. non fit ob hoc: quia
ex illis substantiis fumosa non generatur quæ spi-
ritum inflamet. Et scias quodd in complexioni-
bus frigidis & humidis raro hæc febris accidit, si
militer neque in frigidis & siccis. Sed calida &
sic. omnibus paratior ad hoc existit, & propter
hoc illud quod plus nocet corporibus sic disposi-
tis est fames, & exercitium temperamentum ex-
cedens & negligentia balnei. Sed qui febricitat
feb. quæ fit propter bubonicum apostema quod
fit in subscellis & inguinibus vltimum medica-
mentum illius apostematis est curatio. Et si propter
rheuma hoc accidit medicinæ purgantes necessa-
rie existunt. Et si fuerit propter sanguinis abun-
dantiam minutione indiget quia hæc præseruat
ne in ueteriora egredietur cadat. Et Gal. præci-
pit ut has febres patientes ponantur in balneum
sed mihi non placet ut fiat nisi in declinatione.
Et hoc sufficit in medicatione ephemerarum: cō-
iuncto tamen hoc causis exterminatis in libro
agritudinum.

Quod est de curatione febrium acutarum arduarum.
Cap. XII.

DEinceps volumus loqui de febribus arsis
vel acutis quæ dicuntur arduæ. Ideo quia istæ
febres sunt mediæ inter putridas & ephemerar.
Et dicimus quodd iam dictum est in libro agri-
tudinum, quod hæc febris fit ex multo sanguine,
& sunt species duæ, una est dum sanguis noui
est putrefactus, & alia est dum sanguis iam putrefe-
ri incipit. Et unaqueque istarum trino dispo-
nuntur modo. Vnus est ut homocenus cōtinue affli-
gatur à principio usque ad finem æqualiter: &
hoc fit propterea quia id quod dissoluitur est
æquale ei quod resoluitur. Secundus modus est
ut à principio augementur usque ad finem, &
hoc accidit propterea quia illud quod dissolu-
itur plus eo quod resoluitur. Tertius modus
est ut à principio usque ad finem decrescat, &
hoc fit ideo quia illud quod dissoluitur minus
est eo quod resoluitur. Et quia hæc febris fit pro-
pter oppilationem secundum uas: medicatio
ipsum erit per phlebotomiam, & maxime cū non
est sanguis putrefactus. Et Gal. hic dicit quod
quando natura fortis est extrahamus usque ad
syncopim, & dicit quod propter hoc corpus re-
frigerationem habebit, & possibile erit ut chole-
ra abijciatur per partem superiorem aut inferio-
rem. Et dicit hanc medicationem in hac fe. esse
necessariam. Ego dico quod hæc quantitas

euacuationis & rificialiter non existit: immo val-
de est erronea eo quod hæc ars imitator naturæ,
& nunquam fit citius laudabilis per euacuationē
sanguinis usque ad syncopim perducere immo
hæc prouenit à crisi bus malitiam quibus virtus ea
pullius plus quam conueniens est, expellit. Ad-
huc non est intentio euacuationis in quatuor
est euacuatio, nisi ad remotionem superflui san-
guinis peccantis quantitate, & ad conseruationē
quantitatis naturalis: ergo quomodo potest san-
guis euacuari usque ad syncopim: nisi cum detri-
mento sanguinis nominalis, hoc impossibile esse
videtur. Et Gal. non intellexit per hoc nisi subi-
tam corporis refrigerationem: ergo hæc medici-
na accidentaliter est periculosa. unde melius est
ut aliquantulum ex calore remaneat extraneos
quàm calor naturalis diminuat. Adhuc non
est credendum ut in tali corpore quale est istud
non sit putrefactionis alienius humoris præpa-
ratio. ergo si diminuatur calorem naturalem cor-
rumpetur humoris & virtus diminuetur, & non
erit qui huius erroris faciat correctionem. Si-
gna ergo per quæ cognoscimus febrem esse à pu-
trefactione exemptam, sunt signa commutata
& non fixa. Cōsidera ergo quot in hoc loco emi-
nent pericula. Et cum in hac febre appareant si-
gna putrefactionis peritiam aut pulsum phle-
botomia non fiat usque ad syncopim perducere
quia impossibile est ut post minutionem non re-
maneat putrefactio usque ad septimum diem,
& propter hoc est necesse ut remaneat virtus suf-
ficiens digestioni. Et dicit. G. quod quando me-
dicabis hanc febrem sanguinis cō putredinet tūc
non est expectandum usque ad digestionem mate-
rie. Et ex hoc intelligere debemus quod in prin-
cipio phlebotomare debemus, & deinde potare
aquæ frigidā in niue frigidatā tandem donec cor-
pus ipsius ad frigiditatem deueniat. Et hoc fieri
debet consideratis certis considerationibus.
Prima est ut agritudo sit digesta, & ut in visceri-
bus non sit apostema, & ut in ore stomachi non
sit debilitas neque frigiditas: nec quando infir-
mus non est assuetus aquam frigidam bibere, &
sic esse debet: quoniam illud quod hic inducit ad
malam complexionem contrarium existit elul-
dendi rei quæ causam habet remouere: quoniam
aqua frigida humorem inerat & impedit di-
gestionem. Et impossibile est hanc febrem ite-
gre remouere donec causa ipsam faciens in cor-
pore reperiat, & quomodo potabit aquam
frigidam habens stomachum debilem & frigidū
quoniam ei accidat timor & stupefactio & consimi-
les agritudines et mala complexionem frigida. Et
iā inuenti sunt homines qui biberunt aquam fri-
gidam semel in quantitate multa, & inde ad con-
strictionem anhelitus deueniunt propter frigi-
ditatē musculi uel nervi & diaphragmatis, & ta-
liter quod non potuerunt aliquid deglutire, & qui
ipsam

ipsam bibunt iam facta digestionē, tunc naturā optime adiuuant, eo q̄ tunc ibi iam aliud non remanuit, nisi mala complexio calida, & illa tunc remouetur ab aqua frigida bibitione, & sic natura meliorem facit operationem in humore tali. J. perficiendo digestionem & malam materiam expellendo, quoniam ipsa mala complexio hoc facere prohibebat, & hic est tractatus. G. in potatione aqua frigida in hac agnitione. Et debes scire q̄ hęc febria latitudine habet magnam in suo calore secundum magis & minus, & propter hoc quę fortioris caloria est dicitur ardua. i. causā. Et hęc latitudo diuersificatur secundum climata. Et quando omnia particularia concordant cum febre quę est ardua, & infirmus multum desiderat aquam frigidam: non in hac est digestio expectanda, quia æger ante digestionem cōsumetur, & si feceris ipsum pati usque ad digestionis apertionem, tunc erit ipsius digestio mala, quemadmodum est nebula nigra, aut hypostasis nigra propter nimietatem combustionis, & tunc aquę frigide exhibitio non ualebit. Et propterea melius est in principio sine etiam digestionis signorum apparitione exhibere & non curare, ex dictis aliquorum, quoniam hęc res est ueracissime probata, nam materia quę talem facit febrem qualis ista est cum sit in ultimo caliditatis nō est priuata digestionē nisi propter malam qualitatem acutam, nō propter grossitatem, nec propter viscositatem, & quando hanc infrigidabis, tunc statim erit materia digesta, & melius est ut coherens talem febrem ad febrem leuam & longam quę curari potest, quam eger subito moriatur. nam error qui sit in alteratione complexionis febrium facilius est quam mors. Et ego credo q̄ illi quibus digestio debet expectari sit detra aqua frigida citius curaretur si eius virtus extiterit fortis, quamuis ægritudo fuerit longa. Dicit. n. Rasis q̄ duo in uenae in diebus canicularibus iter agebant, quorum unus erat dominus & alter seruus, & ambo hanc inciderunt febrem, & medicus domino aquam præbuit frigidam & seruo non propinquit. dominus euasit, & seruus mortuus fuit. Et terrę istę nostrę medietas sunt inter terras Gal. & Rasis in temperamēto, & egrediis sumus ex eo quod nostrę intentionis erat. & propterea quia tractatus curationis istius febris est una partium tractatus feb. putridarū, & propter hoc bonum fuit narrare medicamentum quod utrisque commune existat.

Quod est de cura febrium putridarum, & primo de ea in generale. Cap. XIII.

Sed dico quod febrium quę sunt ex mala complexionē materiali, prima illarum intentio duas considerat res: hoc est ut malam remoueat complexionem, & malam euacuet materiā. Et quia

materia est cum calore putredinali accidit hęc intentio, hoc est ut remoueat causa iuuantes ad faciendum putrefactionem, & est suppelui diminutio & pororum apertio oppilationis. Ex pororum oppilatio accidit propter reas stipticas, aut frigiditas, aut delicatitas; aut propter humorum grossitatem, aut viscositatem, & aliquando hęc omnia aggregantur. ergo tertia intentio est, ut vnumquodque istorum remoueat per ipsius contrarium. Ergo ut plurimum accidit ut contrariantur hęc accidentia medicationi, & maxime quando superuenit accidens quod est contrarium significationi medicationis febribus. Sed quando fuerit significatio recepta ab essentia febris & causis ipsius, & nūm erit contrarium alteri, tunc oportet medicum considerare super accidentia si fortissima sunt. Et si non cogatur medicus à feb. vel accidentibus, tunc in stare debet remotioni causę, & per hanc uiam remouebitur febris sicut est in febribus de frigida causa, ut est feb. melancholicę & phlegmaticę. Et si feb. fortior causa fuerit, tunc opponat se febri, saluo ut causę non obliuiscatur, & possibile erit ut cogantur ambo considerare equaliter. Et nos uolumus in prima narrare febrea quę non habent accidentia resistentia eorum medicationi, & postea narrabimus illas quę habent accidentia contraria, eo quod tractatus resistentia accidentium est alia, medicatione egritudinum, & etiam alius a medicatione accidentium. Quod est, quia eorum medicatio est per remotionem causarum sicut in egritudinibus. Sed resistere accidentibus sit cum rebus quę cito remouent, & subito per contrarium: quamuis ut aliquando augmentent accidentium causis sicut opii in summis doloribus. Dicimus quod frigidas, & humiditas in omnibus febribus ingressum habent per modum medicis & cibi, & hoc in rebus assumptis in corpus, & hoc sit per primas ipsarum virtutes solum, & aliquando sit ut aerem infrigidemus, & aliquando ut ipsum calefaciamus, & aliquando ægrum remoueamus de uno climate ad aliud, sicut sit in peripleemonico cui præstamus ut uadat in ethiopiā uel ad arabiam. Sed euacuationis in febribus per phlebotomiam vel pharmacia sicut per virtutes secundas aut tertiās, aut per proprietates, & aliquando sunt per balnea aut fricationes. Sed euacuationes per exercitium in febribus non sunt, & est considerandum in quo sit vnumquodque istorum faciendum, aut plus vno, & in quo tempore, eo quod tempus est una ex rebus valde necessariis in hac arte. & propterea dixit Hipp. quod tempus sit acutum; hoc est quod tempus medicis latitudinem paucam habet. Et dicimus quod phlebotomia fieri nō debet, nisi signa multi sanguinis appareant, sed melius est ut fiat quando non est malicia nisi quantitativa sicut superius dictum

dictum est. Et tempus faciendi sequitur fortitudo, quia secundum plurimum fortitudo virtutis plus est in principiis egritudinum et propter hoc ordinauerunt quidam fieri phlebotomiam in principiis egritudinum, & multi sunt egrorum qui phlebotomia patiuntur usque ad ultra septimum diem. Et ad remouendum illorum errorem dici Gal. quod debilitatem virtutis aut fortitudinem non sequitur numerus dierum. Et quantitas phlebotomationis recipitur à fortitudine egritudinis, & à cōplexione & ab ætate, & tēpore anni, consuetudine, digita & conditionibus alijs. Sed bonitas virtutis, & eius malitia sequitur malitiam complexionis & eius bonitatem, & propter hoc ponitur à medico in uno genere. Sed euacuatio quæ fit aperiendo oppilationes fit incidendo humores, & subtilitudo ipsos, & digerendo ipsos, & rectificando illud quod potest rectificari nec accipere, & expellendo illud quod nō potest rectificari, & hoc fit in omnibus febribus & maxime in illis quæ non sunt insensuales, & etiam in omnibus horis seu temporibus egritudinis; eo quod materia putrida non rectificatur, nisi his duobus rebus scilicet expellendo illud quod rectificari non potest, & rectificando quod potest rectificari quemadmodum fit ab hominibus volentibus putrefactioni obuiare. Et necesse est regere naturam continue in promouendo yrinam. Sed quia maior pars harum medicinarum est calida & sic cōplexionis ut est semen apij & feniculi & similia, & possibile est ut ex tali operatione febris augmenteatur, & propter hoc necesse est ut frangantur earum vires ut principium cum rebus frigida ex natura sui adiuvantibus illam operationem, & talia sunt semina melonis, cucumeris, & horum similia; & sunt etiam ex medicinis harum operationum quæ sunt temperatæ vel paucè caliditate: quas dāmus febricitantibus, sicut capillus veneris & endiuia & similia. Et in summa intelligere debemus quod quando operari volumus medicinas calidas quod frangere debemus earum virtutes, & in his prædictis medicinis inueniuntur duæ res. scilicet incisio & subtilitatio. Et scias quod euacuatio per urinā est ex medicinis magis manifestis in febribus. Et hæc medicinæ aliquando inducunt angustiam & inquietudinem & corruptionem stomachi & hepatis, & proprio in fine febrium chronicarum, & propter hoc conuenit ut eis adnoscantur ea quæ habent cunctorum membrorum principalia sicut bulliō in aqua prædictarum aliquid malicia, vel ut bibat aquā illam cum zucchero ra. & in his conuenit nobis magna exercere. scilicet in confortando, subtiliando, & incidendo. Et si materia huius febris fuerit humor frigidus & sic oportet abstinere ab his, scilicet calidis & sic. eo quod si facta non debet quartana eis exhiberi. & si vis ei propinare debes hoc fa-

cere frangendo siccitatem earum cum radice liquoritæ & zucchero violæ. Sed quia zucchero violæ habet ultorem relaxatiūm prohibere poterit cum passulis, quoniam optime existuat in hoc casu, & sunt necessariæ scilicet passulæ in remouendo siccitatem superfluum squinzibin scilicet syrupi acetosi eo quod habet mordicare membrum nervosa scilicet yso-phagum seu merij & stomachum & cannam pulmonis, & aqua cicieria confertur in maiori parte febrium. Et quamvis aqua hordei sit frigida & humida habet mundificare vias à superfluitatibus, & abstergit & lavat vias absque inflammatione, & est ex medicinis laudabilis valde in hoc casu. Et propter hoc squinzibin & aqua hordei laudata sūt in curia febrium. Sed aqua hordei interdū ori stomachi habet in ducere nocumentum, & propter hoc indiget rectificatione. scilicet ponendo in rotulo dimidio aque hordei characterem unum ex mallice, scilicet pondus, quatuor granorum hordei, & hæc omnia indigent cū digestionem scilicet opponendo se periculis & fortiori secundum plus & minus. Medicinæ enim laudatæ in relaxatione naturæ sunt quæ habent hæc secundas virtutes. scilicet relaxare & qualitate febrili obuiare, & tales sunt tamarindi & benefeg. i. violæ & terenabibin seu manna & medulla bathæ. Sed oportet ut vitemus dare myrabolanos ante digestionem propter siticitatem ipsorum: sed alubleb. i. corrigiola optima est in principio febris, quamvis aliquam habeat caliditatem. Ordo autem medicinarum in mollificando naturam est quem dicturus sum scilicet terenabibin primo. secundo benefeg. i. violæ. tertio tamarindi; postea alubleb. i. post medulla cucumeris saraceni scilicet angioie, & postea charbasar. scilicet asafistula, deinde mirabolan & conueniens est omnibus febribus uti contrariis à tota specie putredinis febrilis. Sed quia hæc medicinæ pro maiori parte calide existunt sicut sunt species, ideo in modica quantitate de ipsis ponere debemus, & frangere debemus earum virtutes primas. Sed medicinis quæ hanc exercent operationem absque calefactione uti debemus ut in hoc loco, sicut est vinum pomorum granatorum, & sandali albi & rubei, & rabazir. i. popidum. Sed in sandali aliqua existit oppilatio, & cum rectificata fuerit medicina materia utilis existit. Sed medicinæ quæ habent in frigidare & humectare sunt diuersæ vel variæ nō multæ secundum diuersitatem & multitudinem febrium in quantitate calidarum & paucitate earundem. Et ordo harum medicinarum est talis, quia primo dauda est aqua hordei, & postea syrupus iulep, & est syrupus secundum quosdam factus ex aqua rosæ & zucchero solum, sicut laudauerunt aliqui nūci. Sed propter siccitatem aquæ rosæ ponendum est tatarum aquæ simplicis, & plus & minus secundum quod videtur conuenire, & quæ

magis

magis fortis existit est syrupus factus ex succis frigidis & humidis, sicut est succus cucurbitæ, & cucumeris saracenicis, & citrulorum & melonis, & sunt exterioris coloris citrini, & interius sunt cōtinni & albi, sed quod fortius existit est bibere succum prædictorum absque zucharo, & maxime succum anguine. Sicut meris saracenicis, eo quod contrariatur cholera à tota substantia sua. Sed tempus in quo de necessitate debemus purgare materiam peccantem cum medicina attractiva est hora in qua exuberat malicia humoris exsurgens in qualitate. & iam declarauimus superius. & hoc facere debemus forti existente virtute, & tunc est certum quando signa digestionis apparent, quoniam eo tempore collaudatur euacuatio facta à natura, eo quod virtus expulsiua non mouetur ad expellendum superfluitates per viam naturalem nisi facta digestionem, & in hac arte imitari debemus opera naturæ totio posse. Et sci re debes quod facta digestionem fit descensio & expulsiua absque aliquo impedimento grossitudinis uel uiscositatis uel oppilationis. Sed quando non apparet digestio, tunc dissensio inter medicos reperitur, eo quod Gal. & maior pars medicorum dicunt quod minime purgare debemus nisi materia sit digesta, nisi ægritudo fuerit in ultimo acutata. Et hoc intelligere possumus ex dictis Hipp. quoniam quando ægritudo est in ultimo acutata, tunc humores sunt in ultima furiositate, & non est securitas, quin descendant ad quædam membra principalia, & lædant ipsa nisi sint euacuati in principio ægreditur, eo quia humores qui acutissimi existunt sunt subtiles, & quia ibi non est grossities nec viscositas quæ prohibet operationem medicinæ laxatiuæ. Et non potest inde provenire nisi non solum nocumentum. Quod est, quia medicinæ laxatiuæ suis qualitatibus primis augmentant febrem, & illud potest remoueri miscendo cum eis frigida & humida secundum quod conuenit. Sed quando ægritudo non est peracuta valde, sed est quieta, tunc expectanda est digestio. Et scire debes quod ægritudines quæ acutæ sunt in terris Hipp. in terris nostris peracutæ sunt, & hoc manifestatur, quia Hippocr. non curabat ægritudines acutas nisi cum aqua hordei & melicæ, & postquam ita est, ægritudines acutæ nostræ regionis & aliarum calidarum terrarum medicandæ sunt cum medicinis attractiuis, uel laxatiuis in principio ægreditur. Et in ægredituribus peracutis pro maiori parte humores corruptuntur circa officinum stomachi, & propter hoc quando apparet abundantia sanguinis, licet non sit superflua euacuare debemus, quoniam inde magnum prouenit iuuamentum, & incontinenti quiescit validus ægreditur, nisi sit quod prohibeat ex rebus supradictis. Sed quando ægritudines non sunt acutæ, sed sunt ex humoribus mucilagino-

sis & viscosis & indigestis ipsas euacuare & purgare debemus post subtiliationem & incisionem, & hæc est digestio eorum, alioquin non oportet cum medicina purgari. Sed ægritudines quæ non sunt acutæ & sunt ex humoribus subtilibus, sicut est uera tertiana quæ non transit ultra septem periodos, dicit Auicenna. quod expectare debemus digestionem, eo quod digestio humoris subtilis est eius ingrossatio, & grossus est eius subtilis, & sicut difficile est uirtuti expulsiuæ expellere homines grossos propter sui grossitatem, sic difficile est uirtuti expulsiuæ expellere subtilem, quia disrumpitur & dispergitur propter sui subtilitatem. quare difficile existit naturæ expellere homines grossos, eo quod oppilant meatus & transistunt, & subtilem, quia disrumpuntur & sparguntur & imbibuntur, tamen medicinæ laxatiuæ citius expellit & facilius humores subtilem quam grossos. Et propterea quidam medici disserunt quod nunquam dederunt aliquam medicinam laxatiuam ad purgandum aliquem humorem quin cholera prius purgaretur propter sui lenitatem & subtilitatem, & adhuc magis quod quando dantur medicinæ laxatiuæ quæ trahere & purgare debent melancholiam, aut phlegma grossum & uiscosum à proprietate & sui natura priua illæ eadem trahunt cholera & expellunt. Et hoc idem manifestat intellectus quod subtilem homines habiles sunt ad purgandum & expellendum grossum, quamuis hoc non fit ex opere naturæ, quoniam si sic faceret natura, illud quod prius exiret in ægredituribus acutis esset cholera, eo quod tales ægritudines pro maiori parte sunt ex humoribus subtilibus, & quanto sunt subtiliores tanto difficilius à natura expelluntur. Et propter hoc dicimus quod minime tradere debemus in peracutis exhibere purgationes, neque expectare ad perfectam digestionem, quia non est ratum quin mala qualitas prædomineatur naturæ, & tunc erit mala digestio expectanda cum dissindicia liberationis. Et postquam ita est quod purgare debemus non facias illud nisi primos frangas suam caliditatem & siccitatem. Sed in febribus phlegmaticis & melancholicis Rasis in principio earum purgabatur, & hæc erat eius opinio omnino, si purgare in principio febribus. tamen Gal. dicit contrarium manifeste. scilicet quod minime debemus in principio febrium melancholicarum. & illud idem dicit in epistola ad Glauconem. Et illud est quia finis huius ægrediturum est secutus, nec expectare digestionem mala, sed phlegmatica est male determinationis. & propter hoc necessarium existit ut infirmis euacuatur præterquam expectetur digestio perfecta, & propter hoc medicus prius incipere debet à medicinis subtiliationis & incisionis per hebdomadam unam, quia non timemus calorem buius febris cum sit debilis ut magnum inferat nocumentum, & cum hoc fecerit tunc medicus

dicus purgare incipere debet. Et demonstratio huius est illud quod uidetur fieri in apoplezia; & etiam in similibus egreditur in talibus ab euacuatione ponendo in medicinis laxatibus incisua & subtilia tua. Et mihi uidetur impossibile recipiendo syrupum quinzabam per hebdomadam unam factum ex decoctione radicum lilij celestis, & seminis pij, & liquiritie quin praparet humores, & digerat, & leuiorem faciat exitum à corpore, & quamuis totus humor non euacuatur à corpore tamen natura inde alleviationem suscipiet omoio. Et inde redire debes ad incidendum & subtiliandum per aliam hebdomadam, quemadmodum diximus, & postea purgare, quia taliter operando humores habiles reperiuntur ad expellendum. Et simile hoc est homini ferenti gravem pondus quoniam quando ferre non potest ipsum, & dividit ipsum in partes facilius tolerat ipsas, & postquam natura fuerit alleviata: tunc digestio laudabilis apparebit, & resuscabitur domo concedente. Et hoc melius existit valde quam infirmum dimittere agitudine & naturæ. si uidebis naturam egreditur in præualeat tunc digestio & regimen tutum iubebis, & hoc in arte minime collaudatur quoniam nisi naturæ violentiæ feceris vel adiuvando ipsam nihil boni ei feceris, nisi quod verba ei dederis retinendo ipsum; Et istud idem regimen facere poteris in febris melancholicis, & sic facimus hominibus suis quando volumus ipsos purgare. quia ipsis digestioui propinamus primo ad subtiliandum humores & uias aperiendo: sic & in agitudine: hoc oportet facere, tamen in egredituribus maior diligentia est adhibenda, eo quod earum humores difficilius recipiunt digestiorem. Et hoc manifestatur in opere Gal. in labore spontaneo febris propioquo, quoniam ipse purgabat omnes humores facientes hunc laborem præter humores viscosos mucilaginosos: eo quod omnes eordare videntur quod tales non sunt purgandi, Gal. autem uidetur quod euacuare debemus habentes hanc febrem per fricationem solum. Ego uero tem affirmo quod climata in hoc multum sunt consideranda propter hoc non est danda regula generalis, quoniam mihi uidetur quod etiam humores viscosi & mucilaginosi purgari possunt in his nostris regionibus: facta tamen incisione & subtiliatione per longum tempus, & tunc tepor digestiouis abbreviabis, & natura inde alleviabitur. Et ex tunc uidebis digestiorem laudabilem. Ette oportet has res multoties caperis, quia experientia in his rebus non modicam uirtutem habere uidetur. quod scripsimus de hoc in hoc loco sufficit.

Quod est de cibatione & fricatione & balneatione febricitantium. Cap. XIII.

Dico quod cibis dari non deberet febricitantibus usque ad statum egrediturinis. Et hoc ut natura tempus habeat digerendi humores facientes agitudinei & ipsos expellendi, sed quia uirtus non est sufficiens omnibus, te oportet considerare agitudines, quoniam si fuerit ex agitudinibus peractio, cuius status est propinquus & crisis debet esse in seipso, & natura totus existit, tunc illud facere debes, & si uirtus debilis fuerit nullatenus facere debes. Sed si uirtus medicis fuerit, & ætas fuerit iuuentutis cibabis ipsum aqua hordei, & mica panis lota. etiam cum aqua calida ad quantitatem uncijs uel. ij. ponderis. Et istud est subtilius regimen in nostro climate secundum consuetudinem nostram. Sed regimen antiquum subtilius erat nihil dare per hebdomadam unam, & quando uolebant ingestillare dabant aquam mellis solum. Sed hoc ære non possunt illi qui sunt nostri climatis propter complexionem aeris & consuetudinem. Sed in climate illorum corpora habent tioriorem resolutionem, & cum hoc bibunt uinum non in multa quantitate & comedunt carnes porcinas, quæ duo sunt plurimi nutrimenti. Et generaliter consideranda est consuetudo, quoniam qui consuevit sunt comedere ter in die non possunt prædicta sustinere, & maxime habentes complexionem calidam & resolubilem. Et si cognoueris statum agitudinis esse longum, & ultius infirmis fuerit debilis cibus est plus quam diximus in principio, & cum status propinquabit minuendus erit, & totum hoc est intelligendum forti existente uirtute, & fortitudo uirtutis existit in complexione fortiori. Sed qui habent complexionem calidam & licet pauci ex his famem possunt sustinere, & maxime in agitudinibus suis continilibus & in temporibus calidis: eo quod quando talibus paratam famem fecerimus, febres eorum ad incontinuas declinare faciemus: quamuis debiles existant in radice: uel ad hæticam: quia in complexionibus consumilibus multiplicator qualitates inale sui natura, & magis quando eis facimus sustinere famem, multiplicatur & adunantur humores. Et hora cibandi eos est in declinatione paroxysmi primi, & in principio secundum ut natura habeat spaciū digerendi humorem in tempore paroxysmi, & hoc melius existit. confortare uirtutem nec ei accidat accensum periculosum, cui necessarium sit cibum propinare ut in syncope ex resolutione. Sed si timuerimus aliquod ex his cibabimus eos in principio paroxysmorum, quoniam tunc eos à syncope taliter liberabimus quæ uiam admodum recitat Gal. de puero qui præcepto medicorum sustinuerat famem tribus diebus. Et aliquando conatur cibare ipsos in medio paroxysmorum. In febris

febris autem continuis horam cibandi eligere debemus in qua maioris existunt quietis: considerando tamen consuetudinem. Ex ex horis di ei meliores sunt frigidae. *ſ. mane & fero.* Et ſcias quodd balneum in declinatione febrium collaudatur, quoniam ſuperfluas evacuat ſubtiles. In principiis vero minime, quia rigores habet provocare, & diſſolvit humores & multiplicat oppilationes, & ſpargit ſuperſuitates per corpus totum, & non eſt tuum quin inde proneniat apoſtema in aliquo principali membro, & quamvis humores evacuet, multiplicat tamen caliditatem & ſiccitatem febrilem, ſive fuerit ex aqua calida factum, ſive ex aere calido. Et neceſſe eſt ut corpora ſaltem non tanguantur aqua frigida, quoniã humores efficit crudos, & propter hoc balneum fieri non debet uſi poſt factam declinationem, & in febris quæ non ſunt acutæ. Vix quoque aromatica & levia quæ modicã aquã ſuſtinere poſſunt pnegmaticæ & melancholicæ ex habere poſſumus, ſed in inceſſu ſuis à viuo omnino elongare debemus. *Gal.* quoque curabat febres quæ erant ex humoribus mucilaginoſis cū frictione, & hoc indiget conſideratione, quoniam non eſt tuum quin humores ſpargantur ex frictione per totum corpus. Et ipſemet præcipit in libro de conſervatione ſaniatis quod ille qui habet laxitudinẽ & corpus eius fuerit plethoricum vel plenum humoribus mucilaginoſis ut minime moveatur neſt exercietur, neque balneum iutret, neque faciat frictionem & ſimilia, eo quodd frictione non evacuat ex humoribus niſi qui ſunt ſubcutanei & inter muſculos, qui autem ſunt in venis nullatenus evacuari poſſunt niſi cum medicis laxatiuis. Et etiam vides quodd ſi ſanus faceret frictionem præcepam ab ipſo in laxitudine ſcilicet ita magna, de neceſſitate curtis apoſtemaretur, eo quod frictione hæc in ultimo gravitatis exiſtit, & illis maxime qui hæc patiuntur ægritudinem: cum in laxitudine ſemper videantur eſſe. Iam ergo ſufficienter ſcripſimus ſicut nobis videtur generaliter curas febrium putridarum. nũc autem redibimus ad curam uniuſ cuiuſque particula riter.

Quod eſt de cura febrium cholericarum, & primo de curatertiana. Cap. XV.

Hæc febris ſi fuerit pura tertiana erit ſecura abſque periculo. Ex ſcimus certiffime quodd natura habebit dominium ſuper hũc humorem, & propter hoc nõ debemus eum movere cum medicis attractiuis ſicut eſt ſcamonea, eo quodd reſtituendo eam quantum plus poſſumus ſemper membris principalibus haberi inducere nocumentum, & propter hoc uirtutem debilitat. & aget etiam caliditatem febrilem & ſiccitatem ſuam, & ſi aliud non induceret nocumentum niſi

ſi conamen ſurgendi & decumbendi modicum nõ inueniretur, quia complexio inde ſupercaleſcit & debilitatur. Sed apparẽt ſigno digeſtionis non eſt inaleum dare aliquam medicinam attractiuam in hunc modum ſcilicet quia primo dare debes ea quæ primo habent lenire materiam & humectare ſicut ſyrupum viol. & amaritudi, & ad reperimẽdũ nocumentum ſtomachi adde ali quid ex maſtice, & reubarbarum in hoc loco optimum exiſtit, quoniam reprimendo nocumentum prædicatum laxat. Et quamuis quid dare debes ex reubarbaro eſt à duabus drag. uſque ad tres miſcendo ei ſyrupum iulep & ſquinzibir. *an. unc. j. cum. v. paribus aquæ frigide, & infra diem potabis cum aqua bordei, & hoc faciendum eſt omni die niſi uisura moueretur uis in die ad aſſellam, ſicut conueni, & ſi natura moneretur ex hac medicina altera quantitate minue ſecundũ portionem ex ea. Et ſumus contenti in hac febre ex inſtigatione & humectatione cū aqua bordei & ſyrupo iulep. eo quodd hæc febris non exiſtit in teſe caliditatem cum ſit ex cholera naturali. Et ſumus contenti oppilationes ipſius remouere cum aqua ordeï & ſquinzibin ſolum cum modica in ea reperiatur oppilatio & forſitam ni hil. Et facta digeſtione ſi ſufficit dare myrabola nos citrinos bene quidem, ſi nãrẽ propina inſermo ex ſcamonea charateres, ij. cum ſautundem maſtice, & cū. nnc. j. ſyrupi de nenuſare, & an. j. ſyrupi malorum. Syrupus de nenuſare, quia frangit qualitate ipſius ſcamoneæ primas ſcilicet eius caliditatem & ſiccitatem, & cum hoc conſortat aromaticitate ſua membra principalia. Et ſyrupus pomorum, eo quia frangit eius ſiccitatem, & remouet nocumentum principalium membrorum ab ipſa, & maſtis quia conſortat & remouet nocumentum principalium membrorum. & mediciam ipſis uſi fuerunt ad occultandam malitiam ſcamoneæ. Et ſi timebis debilitatem inſirmi cibabis ipſam mica panis lota, & iã reſtituauit Hip. quodd niſi fuerit ex errore quodd hæc ſe. non tranſiit. i. q. diem etiam ſi fortiffima fuerit. Sed ſi hæc feb. non fuerit ex pura cholera, ſed erit ex uitellina, uel praſina, uel æroginofa non enadi hic abſque periculo magno, & maxime quando fuerit ex praſina uel æroginofa, & mihi uidetur impoſſibile quodd aliquis ab æroginofa ſua dere poſſet. Et hæc febres longos habent paroxiſmos & peſſima accidentia, & propter hoc indiget purgatione cum medicina attractiua quam ſupraſcripſimus, prius ablata caliditate, & ſicci. ipſina. Et non eſt malum ut miſceas ipſi medicinẽ aliquid de polypodio quodd arabicẽ dicitur belbeg, eo quodd purgat choleram aduſtam, et groſſam & melancholiã, poſtquam ſregeris ſiccitatem eius cum oleo amygdalarũ dulcium, & aperire oppilationes in hac febre proprium exiſtit niſi fuerit excedentis caliditatis, quod*

quod si fueris, tunc intendere debes solum ad in
frigidandum & humectandum.

Quod est de cura febris phlegmatica.
Cap. XLII.

Quod est de cura caustionidis. Cap. XVI.

Haec febris est intensus caloris & prauorum
accidentium, & dicitur incelsa, & impossibile
est quod hoc ex cholera naturali generetur. Et in
ista conueniens existit purgare cum medicina
attractiua à principio ipsius, & minuere ex san-
guine signa sanguinis apparchunt dādo ei om-
ni die x. aureos tamarindorū infusorum in aqua
simplici absque syrupo & aliqua alia re dulci, &
post dabis ei bibere aquam hordei, & postea per
totum diem potabis cum aqua angurie, & hoc
regimen proprium existit omnibus febribus quæ
sunt in ultima caliditate, & non dimittas aquam
angurie & aquam superniciem infrigidatā: quo-
niam si conuerteris hanc febrem in lentam &
chronicam melius longe existit quā ut eger
moriatur. Et hoc etiam dixit Abumernn Auen-
zoar de quodā puero quem ipse medicauit: cui
dabat omni die aquā angurie, & quotidie cho-
leram uomebat, & tamen taliter fuit operatus
donec illa febris conuersa fuit ad chronicā, & in-
de liberatus fuit. Et mihi uidetur quod aqua angu-
rie longe melior existit quā aqua in fine infri-
gidata in hoc casu: eo quod aqua in oīe infrigida-
ta: quamuis sit in ultima frigiditate, ne locuerat
mē recipit caliditatem & adhuc magis: quia aqua
cū sit simplex nihil restaurat neque præstat cor-
pori nisi frigidam qualitatem solum: sed aqua
angurie restaurat & addit in sanguinem facien-
do frigidam substantiam & qualitatem. Sed quā-
do febres erunt lentæ & longæ erunt paroxysmi,
& cæcus eris quod omnem ex cholera pura erunt
sed erit ea utellina quæ naturali frigidi-
tate existit tunc rodere debes plus in aperiendo oppi-
lationes quā in infrigidando contrarium eius
quod fieri debet illa quæ fuerit ex cholera pura:
quamuis raro tales inueniantur. Et laudabiles
medicæ in hac parte sunt quæ habent uirtutem
aperitiuam absque forti caliditate sicut capillus
uene, & radix apij, & semen feniculi frangendo
siccitatem eorum cum radice liquiritiæ, & calidi-
tatem cū uiolæ, & flore penularis, & seminibus
eōibus. Et si uideas ponere in medicinis res quæ
habent membra principalia confortare, sicut
est mastia & spica nardi componendo illa, cum
syrupo squinzibin. Et esto studiosus potuere in
medicinis solutiuis quæ habent cholera euacua-
re cū quantitate phlegmatis sicut est semen bru-
lei, semen chartami, frangendo tamen calidita-
tem & siccitatem eorum. Et hæc est cura omniū
februm cholicarum.

Haec febris cū fuerit ex phlegmate simplici
& naturali, & de hoc fueris cæcus: tunc studius
esse debes in incideodo humores, & in subtilian-
do & oppilationes aperiendo plusquam intrigi-
dando & humectando, & sufficit tibi in hac in-
teotione squinzibin cum iure cicero occultan-
do siccitatem eorum cum radice liquiritiæ. Et
adde huic componi aliquid ex spica & mastice
quoniam in hac febre stomachus debilis repe-
ritur, & conuenientior operatio in principio
huius febris est lenire naturam cum semine charta-
mi & semine urticarum fracta siccitate eorum
prius cū tereniabin. Et seruato hoc regimine
per hebdomadam unam propinabis ei medici-
nao laxatiuam quæ habeat illum humorem eu-
acuare, & melioe illarum medicinarum est tur-
bith, quia à proprietate habet trahere & expelle-
re humiditatem quæ in hore stomachi est, & aga-
ricus etiam cum eo: quia eradicat humorem gros-
sum & aperit oppilationes, & si addideris ali-
quid ex hucrapigra non est malum confidendo
magis in agarico & turbith, & aliquando occultan-
tando & frangendo siccitatem eorum cum oleo
amigdalæ dulcissimæ. Collaquantidam autem in
tuis medicinis conabis ponere quantum plus po-
teris. Et si apparuerit tibi quod humor sit tantæ
duricie quod non possit euacuari alicui ea, adde ex
ea aliquid in prædicta compositione occultan-
do malitiam eius cum chachina, & credo quod sit
dragacum, & cū amigdalæ. Et dosis eius est
media pars aurei, & tales purgandi sunt bis quo-
niam in una vice non possunt purgari, propter
grossiciem humoris, & hoc non facias nisi uirtus
tuerit fortis consideratis alijs conditionibus su-
prædictis. medicina nero facta ea turbith in prin-
cipio huius febris non est mala. Cibis uero in
principio huius febris sit pallia parua secare, eo
quod status eius non est minor erum septimanarū,
& est possibile ut ipsa duret usque ad .xl. dies &
ultra. Rasis autem dicit quod transacta septima-
na quarta non est malum infirmo ambulare eo
quod de rosis completus cum aqua cicero, eo quod
hanc febrem patientes in fine leuiores decemunt
ad debilitatem stomachi & hepatis, & cadūt de
facili in hydropisim. Et ego meo tempore uidi
quosdam habentes febres chronicas quibus me-
dici nostri propinabant eis syrupum squinzi-
bin solum, & ceciiderunt in hydropisim, & mor-
tui sūt. Et quod dico de trosciscis de rosis in hoc
loco nō dico nisi cā exempli & similitudinis, tamē
tū debes dare ex similibus medicinis secundum
plus & minus prout tibi melius uidebitur conue-
nire, etiam quod simile huic intentioni repente
est zucharum rosatum præterquam frigidita-
tis magis uidetur peruenire quā troscisci desci.

Et

Et si uidebitur tibi conueniens miscere cum ite re cicerum syrupum squinzibin facit illud, & si inflatio in pedibus aut in palpebris apparebit tibi, caueas à syrupo squinzibin, quoniam habet perducere ad hydropisim quemadmodum diximus. In febris uero phlegmaticis non recipientibus digestionem; quorum facies & uenter tumescunt; & colores eorum plumbei videbuntur, Galenus uidetur quod tales sunt euacuandi per fricationem donec vigilante diuidendo tempus eorum ita quod dimidium tempus eorum sit fricando, & dimidium sit dormiendo. Et dabitur ei bibere aquam mellis cum byssopo & liquiritia. Sed Galenus potabat eos aqua hordei: sed eam ego non laudo in hoc casu, eo quia nocet stomacho, & facit horripilationem, nisi cum ea fuerit parum malisticis, & piperis, & radicem scennelli, & non debemus eos diu dimittere absque cibo; quia inde recipiunt nocumentum, quamuis leuiter pari famen possint; quoniam quando iste humor mutillaginosus multiplicatur in corpore, talis humor cum difficultate maxima potest ad sanguinem conuerteri, & propter hoc uirtutes eorum debilitantur donec ad syncopim habent prouenire. & ideo eis dare debemus micam panis locum cum aqua mellis, uel cum uino aromatico. Et hic est modus fricationis qui preceptus est à Galeno in hoc casu scilicet quod habere debes gausapi aliquantulum grossa & uetusta, & in primis incipere debes à superiori crurium descendendo inferius ad pedes, & postea frica genus, & postea superiora coxarum descendendo ad genua. Et postea incipiens fricationem ab humeris uel spatulis descendendo per brachia ad manus, deinde fricabis dorsum incipiendo à summitate eius ueniendo usque ad pedes, & sic fiat per totum diem. Et si infirmus senserit laxitudinem in ungue cum oleo non habente stipticitatem. sicut cut oleum camomellinum & anethinum, quoniam est bonum. Et dicit Galenus quod postea abstergere debes oleum, eo quod angustia prestat; & hoc est quod Galenus uidetur dicere de huius aegritudinis regimine. Et quia in hac febre accidens syncopis consuevit peruenire. ideo memoratus ero eius curam ubi tractabo de curis accidentium obmittendo eorum causas.

Quod est de cura febris quartana. Loup

Cap. XVIII.

Illud autem quo plus indigemus in hac febre est aperire, incidere, & subtiliare, & modicum in ipsa indigemus fricatione, in frigidatione & humectatione, quasi nihil, & cura huius febris quasi contraria existit curæ causonidis

dis eo quod in causonibus attendimus ad febrem solum, & in hac causam. Et propter hoc eligere debemus medicinas incisivas, subtiliarias, & spleni appropriatas sicut radix caparis, & scolopendria, & amariscus eo quod istud membrum potens est ferre medicinas fortes & aperitiuas absque nocumento. Et potest conficere has medicinas cum syrupo squinzibin facto ex uis passa. Et oportet in principio te euacuare materiam cum belbegide, id est polypodio extracta uirtute elusi in iure galli ueteris, & oleo amygdal. & si uis digestionem expectare in hac febre potes facere propter ipsius modicum periculum quod ferre potest. Et si uis purgare ante perfectam digestionem poteris facere facta incisione cum syrupo predicto per duas septimanas uel tres. Et medicinas que habent trahere hunc humorem, & purgare sunt tam manifestæ & etiam habent gradus, & quæ in primo gradu reperiuntur sunt myrabolan. ladi & emblici & postea polypodium, & tales sunt qui dimittunt myrabolanos propter eorum stipticitatem, & post polypodium est epithimum. Et operatio istius fortior est operatione polypodij & maiorem corpori infert angustiam, & hac de causa indiget occultatione illarum duarum rerum scilicet remittendo ipsius qualitates primas, & eius remittendo malitiam; & propter hoc non est malum miscere istas medicinas medicinarum que faciat ipsam uelociter festinare sicut ponendo cum predicta medicina Karacta duo scamoneæ nel tria cum tertia parte uinis anrei de maiorana, & hoc non facimus causa expellendi ipsum humorem, sed propter debilitatem & tarditatem ipsarum medicinarum ordinamus dictam additionem ut recipiat inde principium expellendi, post epithimum est lapis lazuli. Sed ab elleboro niu gro cauere debes toto posse, completa autem digestionem huius febris à Galeno. theriaca collaudatur, & ante digestionem recepta postea ipsam ad causonidem conuertere. Sed si remota fuerit frigiditas, & ætas senectutis existet ratio propter confectionem digestionem mirabiliter coovert; & maxime in frigidis regionibus. Et indiget in hac febre circa splenem studere, scilicet emplastrando ipsum cum rebus remouentibus ipsius tumorem, & eius duriciem resoluentibus quemadmodum in cholerica solliciti esse debemus circa hepatis, & in phlegmaticis in orificio stomachi, quoniam membrum istud in quo maxime talis humor potest, & ardet sicut ignis in hac febre melancholica est splen, & in cholerica est hepatis, & maxime continuas ex choletæ patientes, & in phlegmaticis circa stomachum existit, quare in istis tribus generibus febrium conueniens est dicta membrum confortare & humore digerere & reddere

V re

re. Et si cognoueris in prædictis sanguinem exuberare in principio eos mouere debes. In phlegmatica uero mihi uidetur quod cum timore magno phlobotomia sit facienda. quia in ea multa quantitas humorum crudorum reperiuntur. In febre autem acuta quæ dicitur morthabacca, & in latino synocha uocatur, scire debes quod quando putredo præualuerit, tunc purgatio existit melior phlobotomia, & si quantitas sanguinis plus ipsa potestate reperitur, tunc melius est phlobotomare quam purgare. Et sic iam finitus est tractatus omnium febrium putidarum generaliter & specialiter. Et postquam curas simplicium cognoueris perfecte ex ipsis scire debes leuiter curas compolitarum uelut hemitriteorum & suarum similium.

Quod est de cura bactice. Cap. XVIIII.

Nunc autem mihi remanet de hæctica determinare. Hæc febris cum sit mala complexionis materia calida & sicca, ideo intentionis una existit scilicet infringere & humectare, & plus indigemus in hac humectatione quam in infrigitatione, quare infringere debes & humectare cum omnibus rebus quibus potes. Ex hoc dupliciter fieri potest, uno modo cum rebus intrinsecis, & alio cum extrinsecis, sicut cum balneo unctionibus & emplastris. Hæc quidem febris tres gradus habere uidetur qui variantur secundum plus & minus, quorum quidem primus leuiter curari potest, secundus difficilis existit, tertius uero minime curari potest. Et cura quidem primi gradus & secundi eadem existit, nisi quia diuersificatur secundum plus & minus. Cibum autem qui maxime conuenit in hac ægritudine est lac, & melius ex eo est lac mulieris, & post ipsum est lac asinæ, & post illud est lac capræ, & est necesse ea à quibus recipitur lac nutrire cibis optimis secundum suam naturam & facientibus digestionem laudabilem, & ipsum in ieiunio dare debemus in ea quantitate quia digerit possit. & conuenit tibi studere ut bene digerat, eo quod lac in stomacho de facili caescere consuevit, quare incipere debes à modico dando ei primo. unc. j. & sic addendo donec deuenias ad dimidium rotulum. Aqua quidem hordei est magnam habent necessitatem, quamuis corpora eorum maiori indigent nutrimento cæteris corporibus, ideo quia uirtus eorum nutritiua debilis existit, conueniens est studium adhibere in prebendo eis cibaria digestibilia & boni chymi. Quare de carnibus laudabiliores quæ eis existunt sunt pulle gallinarum quæ nutritæ sunt ex frumento. Et uellum ouis similiter eis est optimum nutrimentum, capones nutriti ex amygdalis & frumento

eis collaudantur optime. Et si in corporibus eorum calor fortis reperitur non est malum eis propinare aliquid exoleribus aliquibus frigidis, & quæ ex eis magis laudabiliores existunt sunt lactuca, quia somnum prouocant, & ipsi indigent ipsi plus cæteris hominibus, & quia uirtutes eorum sunt debiles ideo cibaria eorum debemus diuidere in nicibus pluribus sicut in sequenti dicturi sumus. Sed in balneando eos debemus magnam habere considerationem, eo quod isti non uidentur habere necessitatem calefaciendi, resolendi, nec euacuandi, quid enim proficies ex infrigitatione accidentali acquisita ex balneo, cum humores inde euacuentur, & hoc non confert nisi mala complexionis materiali. Et postquam ita est mihi uidetur quod ipsi non indigeant aliquo ex aere balnei, & quamuis aqua calida habeat humectare, cum hæc tamen facit resolutionem. Sed balneum aquæ frigide mihi uidetur esse melius si possit ipsum conuenienter sustinere.

Et scias quod Galenus manifeste dicit quod ipsi non indigent balneo nisi causa preparationis suorum corporum ut aquam frigidam ualeant sustinere cum aqua balneari debent in tinea balnei. Et balneum secundum ipsum taliter debet præparari scilicet quod infirmum ferre debemus cum lecto suo ibi, & cum fuerit in camera prima ipsius balnei extendere debemus plumarium paruum & eum superponere ibi debemus, & si illa prima camera tepida esse reperitur ibi eum à pannis expoliare debes, & ordinare debes quod à quatuor hominibus capiendo à quatuor angulis plumarium feratur ad cameram secundam, & ibi ipsum reponant nudum. Sed temperantia camerarum balnei una alteri comparari debet scilicet quod eadem proportio esse debet secundæ ad tertiam quæ primæ ad secundam, & cum fuerit in camera secunda innigi debet oleo tepido, & postea ponendus est in camera tertia, & ibi ponendus est in balneo uel tinea aut pila, quod idem est. Et in omni aqua camerarum tancum morari debet quantum ipse infirmus possit incedere inuenerit ab uno capite earum ad aliud. Et ex tunc ipse infirmus debet poni in balneo uel tinea seu pila aquæ tepidæ plena, & illic morari debet temperate, & postea balneandus est aqua frigida, & istud est regimen quod aperuit Galenus in hoc casu de balneo. Sed Rasis sentire uidetur quod tales infirmi non indigeant nisi balneatione aquæ tepidæ. Sed quia impossibile est ut tales quando expoliantur ut eis non eueniant horripilationes, & specialiter in exitu ab aqua calida, ideo necesse est ut tinea nel balneum eorum sit in camera temperata quæ non excedat in caliditate uel frigiditate, & aqua similiter temperata esse debet, & sic uidetur ei ut inde aliquod

aliquid iuuamentum recipere debeant: Sed iuuamentū appositionis foci picipis est eo quod nirtus istorum attractiua debilis esse reperitur, & propter hoc ponendi sunt primo in aquam calidam, eo quod in illa principium attractionis esse reperitur, & in eadem tantum morari debent quousque membra eorum undique tumescere uideantur. & pori per totum aperiantur, & deinde pix est apponenda. & hæc omnia recitat Galen. ubi loquitur de cura maliæ complexionis calidæ & siccæ stomachi. Abumeron Aenezoar autem uelle uidetur quod nos eos in tina aquæ tepide solum ponere debemus absque intratione stupæ, & in exitu tinae propinandum est eis lac, & cum digestum fuerit iterum ponendi sunt in tina; & postea dabis eis aquam hordei, & facta digestionē ipsius dabis eis micam panis lotam cum rebus prædictis. Sed ex rebus quæ exterius sunt sunt balneum, & balneatio secundum quod diximus, & etiam aer, quod si fuerit calidus, debemus eum infrigidare abstergendo domum, & substernendo in ipsa folia frigida, sicut sunt rosæ, & folia salicis, & flores nepularis, & folia uitæ cum suis floribus, studeo uel ingeniando, ut aqua frigida à superioribus ad inferiora descendat. Erunt domus septentrionalis existat. Et quod illæ fenestree sint apertæ unde sol minime possit penetrare, & illæ claudantur unde potest intrare. Et quando aer fuerit frigidus non indigebunt prædictis, nisi ut ipsum retineant sicut est, & maxime quando principium malæ complexionis fuerit à stomacho uel à pectore uel ab intestino iciumo uel à renibus, & ab istis ipsa mala complexio deinde deriuatur, & possibile est quod illa mala complexio, incipiat à corde, & inde ad prædicta & ad totum corpus deriuetur. Quare studere debes ad sciendum unde habeat provenire febris ipsa, & cum sciueris membrum à quo primo procedit hæc mala qualitas febrilis studeas ipsum infrigidare & humectare absque trahendo ipsum à sua naturali complexione & specialiter si membrum fuerit maximi iuuamenti. Et emplastra consequentia his membris sunt emplastra facta cum rosæ & sandalis & herbis frigidis aromaticis, uel cum cera sicut dicit Galenus. Ex cum infrigidare uolueris principalia addas aromatica & sliptica. Et istud est regimen hæcicæ cum fuerit in ultimo, sed quando fuerit in principio cum leuioribus curari poterit.

Quod est de syncopi & suis particulis, & omnibus accidentibus impediens curationem febris. Cap. XX.

ET postquam locuti sumus de febribus absque accidentibus prohibentibus curationes ea-

rum nunc tractare uolumus de febribus secum habentibus accidentia. Dicamus ergo quod ista accidentia generaliter proueniunt ex omni re dissolueute uirtute, & hæc resolutio syn copis nominatur, & pronenit necessarium à mala complexionis cordis calida uel frigida. Complexio autem mala calida aut prouenit ex rebus extrinsecis, sicut ex aere calido, ut sæpe contingit diu moranti in balneo calido, aut ex rebus intrinsecis sicut ex mala complexionis totius calida corporis ut contingit in caufone. Frigida uero contingit aut ex rebus extrinsecis, sicut accidit ambulanti per loca frigidissima, aut ex complexionis frigida membrorum intrinsecis plurimi iuuamenti, sicut accidit ex ore stomachi, & ex suffocatione matricis. Aut ex mala complexionis totius corporis frigida ut contingit in febribus putridis quæ sunt ex humoribus grossis & niseosis, & mucilaginosi, & hæc complexio frigida quandoque acquiritur ex superflua euacuatione diminuitæ calorem naturalem quoniam quando calor naturalis superflue diminuitur, impossibile est ut possit regere corpus, & omnes operationes frigidiores debito existunt, quare prouenit syncopis. Non dico tamen quod ipsamet diminutio quantitatis inducat syncopim, sed inæqualitas qualitarum, eo quod cuiuslibet generabilis, & corruptibilis causa est proportio quatuor qualitarum, scilicet caliditatis, frigiditatis, humiditatis, & siccitatis, quemadmodum in libris naturalibus declarauimus. Species autem euacuationum quæ aliquando præabundare consueuerunt sunt sicut superflui fluxus ventris & uomitus, & superflui fluxus sanguinis narium, & hæmorrhoidarum & aliorum membrorum, & in mulieribus superflui menstruum, & etiam quando in partu superflue exuberant. Et potest etiam syncopis prouenire ex ruptura seu crepatura, uel ex aperta magna apostematis subito, & uigilæ similiter hoc facere possunt. Et etiam accidentia animæ sicut excedens gaudium & tristitia, quoniam hæc faciunt spiritus exhalare superflue dilatando, & contrahendo, & inde in substantia membrorum anhelitus spiritus malam acquirit complexionem. Et etiam fortis dolor est una ex rebus quæ docent ad syncopim, & hoc accidit aut ex mala complexionis acqutita ex dolore aut superfluitate motus uitæ expulsiue facientis dolorem, sicut dicit Galenus. Hæc autem quæ dicta sunt, sunt omnia accidentia quæ habent syncopim facere & promouere. Et summane scire debes quod quando syncopis fuerit cum febre, studendum est tunc in remouendo & rectificando seu curando syncopim, quamuis contrarium feb. uideatur. Ex nos dicturi summa modum eius

eum ipsis curam tractabimus. Et nunc incipere intendimus tractare de syncopi procedente ex causa crudorum humorum. Dicimus itaque quod curatio huius est regimen prae dictum in curatione harum febrium. quare si ex negligentia, uel defectu ipsius in syncopim inciderit, iuuabimus eos in primis propinandum cibum, etiam si in medio fuerint paroxysmi, quamuis nostrae intentioni contrarium uideatur, cum intendamus quod natura aegritudini debeat praeualere, & in hoc casu nihil uino melius reperitur. quare dico quod quamuis uinum sarracenis bibere licitum non sit, tamen in hoc loco ita licitum esse uidetur uinum bibere, quemadmodum eis licitum est comedere carnes morticinas. scilicet quae per se moriuntur uel suffocantur habentibus necessitatem, quare incipere debemus eis dare micam panis infusam uino. Et uinum quod melius reperitur est aromaticum, enius caliditas penetrare potest per totum corpus, quod sit sine amaritudine & stipticitate, & est illud uinum quod est uinosum pinguissimum in principio, & post delectabile sine aliqua amaritudine & ponticitate. Et mihi non placent uina in nostris partibus assueta sicut sunt in alicuius, ideo quia sunt uina medicinalia & non nutritiua & nocent principalibus membris sua siccitate & acuitate. Diamusculum autem in talibus propinatum cum uino non nocet, & in principio syncopis rotare faciem & aspergere cum aqua rosae, uel saltem conueniens est cum frigida, & si syncopizans habuerit apostema hepatis uel stomachi uel similibus membrorum, non speres eum curare cum exhibitione cibi, quia cibis plus multiplicat apostema quam fortificat uirtutem. & fricare extrema in hora syncopis conueniens existit. Illis uero quibus provenit syncopis ex caliditate uel acumine renum, quod scire poteris ex signis dictis ab Hippo. quae sunt nares acutae, oculi concaui, rimporum plana, & similia, cura illorum est contraria supradictae, quia ad conseruationem illorum non indigemus abstinentia cibi nec respicere diem criticam neque statum aegritudinis aliquo modo. Et ex cibis conuenientioribus omnibus est mica panis, uel xist hordei cum granis granatorum, quia in granis granatorum proprietates reperitur resistendi putrefactioni, & ut cibis in fumositate malis conuenit minime possit. & ex cibis etiam qui ipsos habent confortare sunt uitellae ouorum, & testiculi gallorum, & pullae paruae. Et si syncopis fuerit ex errore cibi cibandus est ex pane infuso in uino, & sit uinum aquosum lenius, odoriferum, album, sicut dicit Hippo. & lymphatum sit cum aqua frigida. quod si syncopis provenit ex humoribus uiscosis mucillaginosis, uinum lymphatum esse debet cum aqua

calida, quoniam aqua frigida illis magnum infert nocumentum. Et tu scis quod syrupus pomorum & cydoniorum cum medicinis muiscatis conferunt syncopi, sed non in uamento uim, quia natura necessario dominari debet super ipsas ad ipsarum conuersionem. Visum autem digestionis citius preparatur omnibus alijs cibis & medicinis, ita quod dicitur quod in stomacho non moratur ad digerendum nisi in hepate solum, & in talibus tantum indigemus refectione & nutritione. quod si inueniri possit aliquid quod non nitre possit absque digestionem illud melius ceteris diceretur, & uilius propter eorum debilitatem, & quia intendimus ipsos citius iuuare quam ille potest. aer autem in quo in firmus iuuari debet frigidus & stipticus debet esse, & generaliter tibi necessarium existit, ut talibus ordines omnia quae habent resolutionis obuiare, & emplastrando super uentres eorum & stomachos res stipticas & aromaticas, & si calor in talibus esse fortis reperitur, propinabis eis res stipticas & aromaticas. Et habes syncopim causa apostematis aliquotum membrorum principalium uulla, eius de ipsius liberatione considerare debemus.

Quod est de syncopi proveniente causa stomachi.
Cap. XXII.

Syncopis quidē ex stomacho procedens si ex choletica quae in ore stomachi abundauerit fuerit in primis uomitum prouocare debemus, ponendo pennam eis in ore, & si cum eijcere non poterit naturam tuam mollificare debes. Et Gal. uidetur ut talibus in hoc casu oleum tepidum dare debemus, quoniam si uomitum non habuerit ab eo saltem natura mollificabitur inde. Sed quia haec medicinae quae habent uomitum prouocare de sui natura est & proprietate stimulare uirtutem, plus eo quod facit humor efficiens syncopim, & addit in eadem aegritudine, & propter hoc dico quod longe melius est contorrire eorum stomachos cum melle & spice nardi, & succo cydoniorum & foliorum uitae, quia taliter uirtus eorum expulsiua confortatur & humorem expellit, & si uomitus a se prouenerit in hoc casu ual de laudabilis existit, in syncopi quidem facta ab humoribus frigidis dabis de electuario diatrion pipereon, fluendo extrahere humores quemadmodum dicturus sum in curis cuiusque membri.

Quod est de syncopi accidente causa doloris.
Cap. XXIII.

Dico quod si potes remouere dolorem remouendo causas ipsius non intendas curare ea rebus existentibus contrariis aegritudini, & hac cura tuentis i curis male complexiois quae accidunt tu unquoque

vnoquoque membro, eo quod dolor aliquando procedit à mala complexionē calida vel frigida, materiali vel non materiali, & accidit aliquando à mala complexionē sicca absque materia sicut accidit dolor in spasmus sicco. Sed quando dolor in tantum foris fiat, quod non est tempus expectandi, tunc curare debemus etiam cum rebus augmentibus causam. suspensando membrum dolorosum, & hæc cura non confert nisi per accidens, si prius quando sensum illius membri in quo mala complexio reperitur causa humoris ibi existens, & inde diminuitur motus eius & spasmus. Scina virtus expulsiua, absque tamen resolutione vel spirituum aliqua. Quando autem sensus superficialis membri esse reperitur, tunc certissime superficialis resolutionis spirituum reperitur. Et quando facimus hanc speciem curationis in doloribus à causa frigida provenientibus in fine, tunc sequitur magnum momentum. Sed si causa fuerit calida, tunc non tantum sequitur momentum, neque operari debes illam curam in causa frigida, nisi cum infirmus in articulo mortis esse reperitur causa doloris. Et ex huiusmodi medicinis quæ in hoc casu magnam habet proprietatem est pilonion, & est rationabile propter opium receptum in ipso. Et hæc cura generaliter in omnibus doloribus acutissimis operatur, & in quibus magis necessaria existit est in doloribus oculorum, auris & dentium & intestinorum. Et Gale. præcipit quod minime exercere debes hanc curam nisi postquam pronosticatus fueris infirmo quod in fine ex ea lesionem habere debet, tamen conari debes in remittendo momentum quod ex eo cognoveris esse futurum, & in partibus nostris quando volunt opium operari non faciunt nisi miscendo cum alijs medicinis, sicut est in pilonion. Et melius pilonionem illud quod non est uestustum superflue, quia in eo virtus opij est consumpta non recens nimis, quia in eo virtus opij superflue abundare reperitur. Cura uero cum theriaca in doloribus remouendis est cura causæ remotionis, quemadmodum faciunt illa quæ habent removere malam complexionem facientem dolorem; & propter hoc in illo casu opus theriacæ laudabilis existit operari pilonionij. Et cum nolueris removere dolorem remouendo causam ipsius considerare prius debes quis humor est in causa, quoniam si ex humore calido fuerit, sicut dicit Galen. de illo qui periebat dolorē vētrīs, & extimabatur quod causa illius esset ex humoribus frigidis, sicut pro maiori parte accidere consuevit. Et quando cum quæ dabatur ei calida per os aut clysteria ponebatur, dolor in eo semper augmentabatur, & sic cognovimus quod dolor erat ex humore calido. Cholerico imbibito in pelliculis intestinorum, & tunc cibatus fuit cibus non facilis compositionis, & bis eidem propinata fuit medicina

facta cum oleo, & sic fuit liberatus ab ipso. Sed si fuerit dolor ex humoribus frigidis, tunc curabis cum euacuando humorem ductum sicut fecit Galen. in seipso cum clysteri, cum extraxis humorem vitæ, & inde liberatus fuit. Et quandoque etiam fit dolor causa venositatis sumole quæ resolvitur ex corporis humoris. & talis dolor non est curandus cum medicinis ultimæ caliditatis, eo quod quamvis resoluant ipsam, faciunt oritur iterum ex ipso humore aliam sumositatem, quare cura istius doloris esse debet cum medicinis modicæ caliditatis, & quæ cum hoc habeant virtutem digerendi. & theriaca etiam in hoc casu magni existit iuvamenti. Hucusque iam elongatus sum ab intentione materię, eo quod curam remotionis causæ memoratus ero cum tractabo de curæ remotionum accidentium, & nunc redire intendo ad illud quod prætermisi de mea præscripta intentione superius. Dico ergo quod in doloribus aliquando sunt loca remedia, sicut cum pinguedine auferis & galinæ & anatis, & aliquando sunt cum embrocatione aquæ calidæ & olei & ponendo eos in balneo & cum his similibus. In doloribus uero factis ex vaporibus calidis solum apponimus ventosas cum igne, & hoc tamen est faciendum donec medicus tempus vel spatium habeat causam remouendi, eo quod maior pars illorum dolorum qui ex ventosis remouentur redire consueverunt, nisi medicus temporis spatij fuerit studiosus ad remotionem ipsius causæ, quia uix esse poterit quin error cadat in regimine ipsius infirmi, & inde videbitur recidivare, & sic rationabiliter esse debet, quoniam vapores istius humoris semper faciunt paroxysmum donec ex toto sit resolutus, vel ex toto euacuatus.

Quod est de syncope proveniente ex superflua euacuatione. Cap. XXIII.

Scias quod cura istius syncope fit pluribus modis. Primus est vel fit trahendo materiam ad partem oppositam. Secundus fit confortando illud membrum unde finit materia ne ipsam superflue spargere possit. Tertius modus fit stringendo vias unde fluunt humores ad locum. Quartus modus fit impediendo nimiam expulsiuam quando superflue expellit sicut fit in illa passione quæ cholericæ nominatur, & in arabico dicitur almayda in qua uomitus & scissus simul sunt, quæ contrahit stringendo & ligando crura & brachia, & ponendo eos in balneo, & cum hoc etiam in eadem necessitatem habemus ponendi stiplica in eis & extra. Sed quia balneum superflue habet solvere & euacuare, ideo cum timore magno tales in balneo ponendi sunt, etiam cunctis eis stiplica, & etiam de istis adhuc locuti

erimus quando tractabimus de curā malę complexionis materialis dom euacuatur de membro ad membrum.

Quod est de syncopi superueniente ex superfluo fluxu sanguinis natiui vel aliorum membrorum. Cap. XXIIII.

CVra sanguinis narium si fuerit ex nare destra ponendę sunt ventosę hypochondrio dextro super hepar, & si fuerit ex sinistra ponendę sunt super splenem, & similiter si ex mensuris super fluxe fluxerit ponimus ventosas super mammillas, & cum hoc propinanda sunt stiptica quę habent contrahere orificia uenarum.

Quod est de syncopi proueniente ex superflua nigilia. Cap. XXV.

Vigilijs subuenimus cum cibis quorum proprietates sunt inducere somnum, & eū unctionibus prouocantibus somnum, sicut est oleum nufarium & uiol. & oleum de seminibus cucurbitarum, & cum odoratis iudicētibz somnū, & etiam debemus dare eis ninom lymphatum si fuerit sine febre. Hęc autem omnia supradicta diximus ad rectificationem seu curationem prauorum & periculorum accidentium febribz superuenientium. Contra autem remotionis causę rememoratus ero quando tractabo de curia accidentium & malorum apostematum.

ISAAC ISRAELITAE

DE FEBRIBVS

LIBER.

De genere feb. & diuersitate & causa & significatione eius. Cap. I.



FEBRIS est morbus qui de mala & ea nascitur complexione, & totum corpus circumdat. unde taliter diffinitur. Febris est calor inaturalis a corde exiens & arterijs ad omnia membra corporis eiusque nocuus actioni. hęc diffinitio de febris essentia sumitur a calore cursu naturę egrediente, non de accidentibus se. concomitantibus, sicut quibzdam uidetur medicis febres dicentibus ex accidentibus longo post tempore sequentibus. quidam enim dicunt ex rigore, quidam ex fatigatione, alij ex capitis dolore, uel quibzdam alijs accidentibus & longe eas sequentibus. non enim eas diffiniunt esse ex essentiali calore cursu naturę superegrediente, sicut inuenitur Hipp. dixisse in epid. Febris inquit est calor exiens cursu naturę & eius motio de essentiali calore. Dixit quzdam sunt feb. pungentes, quzdam suauiter tangentes. he enim differentię calori naturali uidentur attingere. Itē dixit sunt quzdam non pungentes, sed augmentantes. he autem differentię ex qualitate caloris sunt tractę. De motione dixit quzdam se. in initio sunt sa. quzdam calidissimę, quzdam uero inflatiorę, hęc differentię ex natura caloris sunt sumptę. Item ex accidentiū diffiniunt uicinitate cum dixit quzdam feb. citi

nissimę, quzdam robundissimę, aliz liuidissimę & uiriditati contiguz. hęc differentię ex uicinis sumuntur accidentibus. ab humoribus qui causa sunt febrium nascentibus, non de remotionibus sicut a postemate, capitis dolore & rigore. Febriliū autem sunt tria genera. vnum est in spiritu quod ab ipso incipit & ad cor ueniens ipsum calefit. post ad arterias uenit & ab arterijs ad oīa corporis membra. hęc autem feb. uocatur ephimera. totum enim spiritus calefit, & in igneum calorem calor naturalis mutatur, eor inde necesse est calefieri. corde uero calefacto ab ipso ad arterias penetrat calor. & ab arterijs ad alia membra corporis. Secundum genus feb. est in hu. quod ab ipso incipiens paulatim membra singula vicina calefacit quousque ad cor ueniat, & a corde ad arterias & inde ad omnia corporis membra, & ita totum corpus circumdat. hęc uocatur feb. ex putredinibus. Tertium genus in solidis est artubus a quibus ad cor, a corde ad arterias ab arterijs progređitur per membra totius corporis. hoc autem genus hæctica uocatur. Tot esse cōstat febrium genera. Causa quare sunt tria. nulla enim se. apparet nisi in materia, sunt tres in corpore spiritus, quatuor humores, solida membra, in quodlibet quorum calor incidit se. suum genus facit, quia Ga. bonis similitudinibus adaptauit. Ephimera inquit calido uento uideretur esse si milis quo oter impletus ex sui calore necesse est calefiat. Idem enim facit spiritus circa cor & totū corpus. Febres ex putredinibus aquę calidę comparauit

comparauit. G. aqua enim ea. cum frigidum vas impleuerit, ipsam ex calore suo calefacit. similiter circa cor faciunt hu. & alias partes corporis. Hæcticam febr. valis comparauit calidis frigida aqua plenis, aqua enim in his ex calore uasorum calefit.

De ephimera fe. & causa eius & significatione.

Cap. 11.

Ephimera febr. in corpore perma-
net. 24. horis. i. integra die & integra nocte sicque uidetur
secedere, aliquando tamen in hoc tempore diu-
tius uidetur immorari, aut 48. aut. 76. horis. hu-
iusmodi ortus fuit causa aliqua primitiua, cuius
primitiue quatuor sunt genera. Vnum genus
est cum extrinsecus corpus patitur & calefit, aut
actualiter, sicut calore solis & ignis & aere bal-
nei cum quis immoretur ibi, aut potentialiter, si-
cut aqua sulphurea lauari & similibus, aut consti-
patione pororum actuali, sicut ex frigida aqua
contingit quæ fumum in interiora claudit corpo-
ris, aut ex constipatione potest statua sicut aqua
lauari aluminosa. Non autem omne corpus con-
stipatum ephimeras patitur febs, sed tantum il-
lud in quo fumus calidus, aut succus adunatur. cu-
ius cum pori oppilentur, fumus exire & dissolui
prohibetur, & ita calor coadunatur. Si autem ma-
teria humorum corporis non preparata sit pu-
tredini, ephimeras febr. facit. quod si prepara-
ta sit febr. ex putredine facit secundum quali-
tates humoris intus uelociter uel oppilati. huius-
modi febr. acuta est & molesta, sicut dicitur iu-
nius. Secundum genus primitiue ephimeræ est
quæ ab interioribus accedit corporis, sicut de ci-
bis & potionibus calidis. Tertium genus ex ni-
mio est motu, aut in corpore sicut nimia exerci-
tia & laboriosa aut in anima sicut ira, angustia,
tristitia, & nigilia. Quartum est causa quam ex-
teriora patiuntur membra, sicut apostemate cali-
do in inguinibus & pedum uulueribus, cum in
ab inguinibus calor membratim ascendit ad cor,
à corde ad cetera corporis membra uenit. Est au-
tem significatio febr. ephimeræ cum præcesserint
causæ iam dicendæ. Infirmus uimium non pa-
tiuntur dolorem in initio, pulsus eius equalis parum
tamen diuersus & absconsus. Diuersitas cito in
equalitatem redigitur, & in tactu calor est quie-
tus, lenis & non pungitius, sed sicut balneari
est tactus. Infirmus uero facilis est in patiendo
morbo. Urina autem habet hypostasim in fun-
do & lenem in morbi tempore toto, neque ni-
mis fetet urina. Cum uero se. discesserit, aut cum
sudore perfecte descendit, aut cum parua qua-
dam infusione, quæ cum recesserit nullum signum
sui infirmo relinquit sicut febr. putredinum fa-
cit. quæ & in pulso, & in urina remanet. Si uero
post ephimeram æger balneatur in balneo, neque

sensit rigores neque punctiones, sed in priores
revertitur suas qualitates. hæc sunt significationes
febr. ephimeræ. Significatio uero unde fiat est
huiusmodi, quæ de solis est incensione, uel de ca-
lido aere, oculos in tactu calefacit, caput incen-
dit, cutem & faciem ericcat quibus si manut ap-
ponatur, calidæ iuueniuntur, pulsus parvus & ue-
lox, ex constipatione nascens pororum, cutem
facit conuictam & solidam, cui si manus appo-
natur in initio parvus calor sentitur. Sed si mo-
retur calor augementari sentitur, calor enim non
apparet propter poros constipatos, sed cum ma-
nus diu inhearet sui calore poros laxat, & ita ca-
lor demum emergit qui se prius occultauerat.
oculi eorum & facies parum tument, pulsus non
est parvus, quia uirtute custoditur & calore na-
turali iuncta corpus, parum tamen est diuersus &
occultus. horum urina aut citrinæ est, aut alba, quia
humores aliqui qui de corpore solent dissolui
cum elaudantur ex constipatione cutis urinae co-
misti suo colore mutari, rubore quoquo modo
sunt commutati. hæc tamen fe. aliquando in febr.
putrida mutatur, si in corpore sint hu. appari
ad febr. putrida. Oportet ergo discernatur inter
ephimeram & apparatam putredini. Si igitur
recedit cum sudore laudabili & pulsu equali: si-
gnificat proculdubio ephimeram. si autem mo-
retur in corpore, neque à calore totum corpus
mundificauerit, & pulsus fuerit diuersus, & uri-
na non digesta & fetida, mutatio in febr. putrida
designatur. Cum uero febr. moratur, neque in pri-
ma periodo discesserit, sed quasi continua sit, uel
synochus, & pulsus fuerit diuersus, & ex urina
nulla putredo significatur, oportet te male sus-
picari, & hæcticam eam expectare, & ex parte
plurima mutabitur in acutissimam. hu. enim
putridi, neque sudore, neque dissolutione euanes-
cunt propter conclusionem pororum. unde festi-
nandum est in medicanda hæc febr. medicamine
quod dicitur sumus, antequam putrescant hu. &
pesima nascantur. febr. Febres nascentes à rebui
mutantibus corpus, sicut cibis, aut ex eorum fuit
quantitate, sicut fastidio & saturitate, aut ex qua-
litate utpote ciborum siue potionum calore. Na-
sectum à saturitate significatio est talis. fumosa
ructuatio & fetida, sitis nimia, ardor ex cibi cor-
ruptione, aliquando habet solutionem uetris, aliquan-
do constipationem. sed constipatio in his est mo-
lestior propter conclusiones malorum chimo-
rum in interioribus corporum. Quæ ex ciborum
siue potionum nascuntur calore, huiusmodi no-
tatur significatione, facies & oculi in tactu sunt
calidissimi, & rubicundissimi, hæpar similiter in
tactu calidum & infirmus in stomacho & hepate
quali sentit incensionem & siccitatem, & in ore
amaritudinem & similia, quia calor in hæc febr. à
spiritu incipit naturali, & cibus calidus in pri-
mis stomachum & postea calefacit hepar qui il-
lius

lius sunt fundamēta. Vrina autem in feb. ista ru-
bea est alihina. Febribus autem modo nimio la-
bore uel motu corporis nascuntur, si labor sit
fortis dura & sicca redditur cutis, & post recessi-
onem febris permanet pulsus parvus, quia ni-
mius labor dissoluit uirtutem, sed si labor nō sit
multus, cutis durities remanebit dum febris se-
cesserit, & post de cute funus exiens humectat
cutem, poros aperit, pulsus magnus est, quia uir-
tus in hac feb. multa est, & calor augmentatur,
quia non fuit labor multus. Si enim labor non
multus fuerit, augmentatur calor corporis, ta-
ctus in laboriosa feb. secundum qualitatem est
aeris si labor precesserit. q. si aer sit calidus sicut
calore solis & similibus: non multum cutis exic-
catur, & si aer sit frigidus, tactus cutis erit frigi-
dus, neque sicca multum erit cutis. Si feb. ex mo-
tibus animæ nascitur, sicut ex ira & similibus tali-
ter notabuntur, multum exeunt oculi facies rubet
& tumet, calor enim in hac feb. ex petit exte-
riora corporis dum uindictam homo sibi qua-
rit, pulsus magnus, urina exiens punctiones facit
& ardore propter calorem. Si ex angustia sit
& tristitia, oculi sunt concaui, facies sicca & citri-
na, quia spiritus & calor funguntur in interiora.
pulsus parvus propter caloris diminutionem eius
demque occultationem. urina rubea ardorem fa-
ciens cum exeat. Febris ex uigilijs oculos conca-
uos facit & humidus dormitioni cōtiguos, pal-
pebras graues & dure mouentes, facies & totū
corpus sunt inflata, & citrinati uicina, quæ om-
nia contingunt ex debilitate digerendi cibum.
digestio. n. cibi molestatu uigilijs. cibis uero in-
digestus non generat spiritum, uel sanguinē ani-
malis, & sanguis si non generetur necesse est co-
lor mutetur. Item ex indigestione sequitur albe-
do urinæ. Si feb. propter apostema in inguini-
bus uel alijs corporis membris nascatur, taliter
significabitur, facies rubet & inflatur propter sa-
guinem & calorem corporis non puigentem.
Cum autem in statu progreditur, ascendit suauiter
fumus calidus corpus, magnus sit pulsus &
uelox atque spissus, urina albedini pertinet, ma-
gnus & uelox atque spissus erit pulsus ex uirtute
& multitudine caloris. Infirmus enim duas pati-
tur infirmitates calidas, apostemata & feb. ip-
sas. albedo urinæ: quia chole. urinam tingentia
rendunt ab apostema. omnis enim dolor prop-
ter habet humores sibi trahere. Hæ sunt signi-
ficationes unde ephemeræ febr. omnes intelli-
guntur species.

*De putredine febrium & causa earum, & causa
periodorum earundem. Cap. 111.*

Febres putredinum ex putredinibus nascun-
tur quatuor humorum, quia hu. calefacti cale-
fiunt membrum calefacientes ubi putrescunt, &

postea, alia illi membro uicina. sicque membra-
tim ad cor, de corde ad arterias perueniunt calor,
& de arterijs in omnia membra corporis. Et cau-
sa unde putredo nascitur est quintuplas: multitu-
do quantitatatis humorum, grossitudo eorum, cō-
clusio humorum ab oppilatione uata, humorea
enim qui dissolui non possunt putrescunt, sicut
humiditatem uidemus putrescere exteriore in tū-
no non habeat aeris capacitatem. Species autem fe-
brium ex putredine nascentium multæ sunt. Sūp-
enim simplices, sunt & cōpositæ. simplices quia
palam sunt, sicut & hu. quatuor sunt. unū quod
uocatur synochus qui ex putredine nascitur. hoc
autem molestationem facit: quia quiescere in fine
num non permittit. Secundum genus ex cho. ru-
nascitur & triens uocatur: quia una die accipit,
& alia die permittit qui est salubris & breuis. Sa-
lubris qui corpus una die quiescit, breuis: quia
humor unde nascitur subtilis est & uelox & cito
digeritur, citoque dissoluitur. Tertium ex pu-
tredine nascitur cho. ni. & uocatur quartana,
una die incipiens duabus quiescere permittens;
sed salubris est & longa salubris: quia corpus duo-
bus diebus quiescit, longa quia materia unde na-
scitur dura est ad digerendum & grossa, & ad dis-
soluendum inobediens. Quartum genus est: pu-
tredine phlegmatis nascitur, & amphimerinos
dicitur omni die inuadens, est autē longa & mo-
lestā: longa quia materia est grossa & uiscosa,
unde non est digestibilis dissolubilis, molesta,
quia hī die inuadit nec corpus quiescere per-
mittit, unaqueque harum multiplicitate diuiditur,
Febres enim quæ ex putredine sanguinis nasci-
tur in tres partes diuiditur. Est enim quedam ab
initio usque in finem æqualis, & uocatur æqua-
lis. hæc autem est cum tantundem finitur sangui-
nis quantum habet putredinis. Est & altera quæ
in initio est debilis, sed postea crescit. cum au-
tem in finem peruenit, molesta sit. postea mi-
nuitur quoad debilitatur, hoc est cum plus san-
guinis putrescit quam sinuatur. Est & altera in ini-
tio fortis, & postea debilitatur quoad omnino
deficiat, hoc est cū plus sinuatur sanguinis quam
putrescat. Febres quæ ex putredine nascitur hu-
morum aliorum, unaqueque in duas diuiditur,
una est copiosa, altera interpolata, sicut iam di-
ximus. Cum enim hu. qui febrium nascitur materia
est, intra arterias sunt & uenas, & in ipsis putre-
scant, feb. continuas necesse est fieri, quod si ex-
tera uenas & arterias sunt & putrescant, interpo-
latas si b. faciunt, unde feb. ex putredine nascentis
sanguinis continua sit, quia intra uenas & arteri-
as est sang. & interdu cum putredo sangui-
nis in parte sit perforat per totum & comburit
iplum, & feb. non dimittit quoad pars sinuatur
quæ putrescit & digeratur, atque dissoluitur. Fe-
bris ex alijs nascentis humoribus est continua,
quia humores intra uenas & arterias putrescunt

tes nō cito possunt dissolui propter constipationē, & suam viscositatem, unde postquā finita sit prima remanet pars sui caloris quoad secunda succedit, & à secunda ad tertiam, & ita sit continua. Si autem hu. extra venas & arterias putrescant febres interpolares faciunt, quia quæ putrescit eum in uno loco sit paulatim ad putredinis locum accedit, cuius collectio in tempore illo est cum interpolatur inter duas accessiones. Aliquando quoque putrescit sanguis intra venas & arterias, & febr. facit continuas; quia cum in uno membro multa adonetur quātitas, & putridum apostema faciat, & ex constipatione pororum quam facit apostema propter putredinem calefacit membrum, necessesse est ubi est apostema, & calor membratim uadit per arterias, & à corde per eas ad omnia membra, & ita febr. non dimittit donec apostema digeritur & mundificatur, hæc est causa cuiusdam feb. continuæ, & cuiusdam interpolatæ. Diuersitas periodum febrium ex causis tribus est. Vna est putrescentiæ humorum uelocitas uel eorum tarditas. Secunda collectionis humorum qui putrescere debent uelocitas uel tarditas eiusdem. Tertia purgationis eorum uelocitas uel tarditas unde amphimerinus omni die accidit propter uelocitatem suæ collectionis quæ contingit ex multitudine suæ quantitatē, & facilitate suæ putredinis propter humiditatem & tarditatem suæ purgationis propter viscositatem. Cholera ni. facit febr., una die accipientes & duobus uon. quia tarda est ad collectionem propter suæ quantitatē paruitatem ex doricie putredinis propter frigiditatem & siccitatem, & ex uelocitate purgationis: quia non est materia ipsius melancholicæ multū viscosa. Cholera rub. febres nōius diei, & alietius non, facit, quia est media inter cholera nigra, & phlegma, minoris etiam est quantitatē quā phlegma, maioris uero quā cholera nigra, & phlegmate est siccior. cho. uero ni. humidior substantia quoque eius leuior est his duobus. hæc est causa diuersitatis peryodice feb. & ex hac causa temporis sue passionis est diuersitas; quia amphimerinus ad multum 18. horis permānet propter grossitudinem & viscositatem phlegmatis non cito dissolubilis, quarana ad plerimum. 24. est horarū propter materię suæ grossitudinem, & viscositatem, quæ cito non putrescit, & si cito putrescat, non cito tamen dissoluitur, similis enim est lapidi uel ferro. ignis enim hæc non cito calefacit quæ etsi caleant, cito tamen refrigescunt. Vera tertia ad multum. 13. durat horas, quæ ex leuitate fit materię, & viscositatis suæ paruitate. ut cito putrescat & dissolui queat. Aliquando harū feb. tempus in quibusdam est longius, in quibusdam uero breuius, quod ex tribus causis consequitur. Vna est materię natura, quæ si grossior

& viscosior & frigidior sit longior erit. Si autem subtilior & calidior & minus viscosa sit breuior. Secunda secundum quantitatem uirtutis infirmi. Si autem est fortis ut materiam eicere & purgare cum sudore possit breuior sit, quoddā defecta, longior. Tertia est ex figura corporis, quia si corpus est rarum & pori aperti sine leuior est, materia enim cito dissoluitur & exit, si uero corpus est viscosum & constipatum, & pori non sunt aperti est longior, quādo autem tanta breuitatis suæ totam se coadunat, fit breuissima, si autem extra sit longissima. Cum autem feb. sit breuis infirmus quiescit post recedente peryodi, donec aliera succedat, & corpus à febribus mundificatur, si autem feb. longa sit infirmus uon mundificatur à feb. quoad altera subsequitur, neque interpolatur ut quiescat infirmus, & ita se habet feb. ista quasi continua. Oportet autem te intelligere, quia feb. periodis sit semper stabilis in ordinatione sui donec putredinis materia in qualitates mutetur alias, neque cum alijs humoribus se misceat, ne in ordinatione infirmi peccatum fiat. Quando autem ista materia à sua qualitate in species mutetur alias, neque cum alijs humoribus se misceat, ut si quis sanguis mutatus incendatur & putrescat, subtilis autem pars in choleram mutetur rubeam, grossa uero inigram, aut si alij hu. putrescant & febres secundum suam naturam faciant. Oportet infirmus fecit pessima, unde generentur h. febres diuersas secundum sui naturas facientes, unde omnia ordinationem peryodi sunt corruptentia & motantia ut ante suum tempus festinent, aut in alias periodicas feb. quā prius fuerit se immutet. Est autem multitudo & minoratio in hac causa secundum quantitates humorum se mutantium & actiones eorum. hæc sunt species febrium ex putredinibus simplices, & causæ diuersitatis suarum periodum.

De significatione putredinis febrium.

Cap. 111.

Significatio putredinis febrium aut est secundum genus suum, aut secundum species earum. Genus significatur cum ex putredine febres esse denunciantur, quod ex tempore accessionis earum intelligimus, cum debilitate incipiant, & postea augmententur & confortentur, quæ cum recedunt partem caloris in corpore dimittunt neque perfecte recedunt. Item ex caloribus substantia, quia calorem oportet esse pungentem & corpus inflammantem, sicut flamma ignis rarificantem. Item ex accidentibus feb. comitantibus, quia hanc rigorem & tremorem in initio sequuntur, & diuersitas in pulsu, ablatio digestionis in urina uel hypostasis non appareat lenis, quæ omnia cū uideantur feb. ex putredine esse intelligitur.

Significationes

Significationes specierum singularium, quia feb. periodis tertiana, aut de re naturali, aut non naturali, aut de re cum extra naturam nascitur. De re naturali cum ca. & sicca est natura infirmi, cui cho. dominatur ru. ætas est iuvenrus, tempus anni est æstas, aer calidus, & sic. De re non naturali, cum infirmus antequam feb. incidit ca. & sic. comederit, & habet angustiam & tristitiam. vigilia, labore nimium longi temporis ieiunium ars eius ferraria, aut fornacina, quæ omnia corpus calefaciunt, & desicant & cho. ru. generant. De re extra naturam, quia quædam feb. ex calore est forti, & sicut aqua cuspis est pungibilis, quæ ex cho. ru. ex acumine, calor eius in tactu fortis & acutus atque pungitivus, pulsus in initio peryodis parvus & defectus atque rarus, & tamen non permanens nisi parvum tempus, & in magnitudine & diversitate mutatur. Magnitudo eius quia cho. ru. est levis, neque gravat uittutem, & tunc ex magna necessitate refrigerandi calore. Diversitas enim feb. est propria maxime eius quæ ex putredine est, sed tamē in hac non diversitas est multa quia eius levis est materia, neque virtutem gravat. Urina huiusmodi feb. est ignei coloris putrida, & cum sit nimia, angustia, abominatio, vomitu cho. ru. nimio sudore propter subtilitatem materię, aliquando quoque succedit egestio cho. ru. Cū has significationes invenias, aut earum plurimas, iudicanda est esse vera tertiana, maxime si hæc feb. multos fatiget in tempore illo anni. Quartanæ autē significatio aut de re naturali, aut non naturali, aut de re extra naturam. De re naturali ex completionē infirmi frigida & sic. & sibi dominatur cho. ni. ætate senili, tempore anni autumnio, aere frigido & secco. De re non naturali, cum infirmus ante cibos accepit unde cho. ni. genita fit, sicut lentes, caviles, carabiam, carnes caprinæ, & bovinas, & similia. De re extra naturam cum aut res antecedit, sicut ante hanc alia feb. sit composita, & duricies splenis, aut cum præsens sit, res apparet quando est accessio. In initio rigorem habet vel nimium tremorem cum gravitate & nimia fatione & totius corporis forti frigiditate, pulsus raro & tardo atque multum diversus, cum autem augmentetur habet calorem non acutum, neque pungitivum, non ergo sicut calor est tertianæ, pulsus mutatur in velocitatem & spissitudinem quā in initio fuit maiorem, sed tamē ad comparationem tertianæ tardior & minor, si sis parva. Urina putrida & indigesta. Feb. declinante sentit infirmus frigiditatem, & cum recedat pulsus est tardus, rarus, diversus, & urina colore diversis & non digesta. Cum has significationes invenieris, aut plurimas, quartanam nequam esse iudica, maxime si in illo tempore anxi quartanam patiat. aut plurimū. Significatio quatuor feb. aut de re naturali, aut non natu-

rati, aut extra naturam. De re naturali, sicut si completio infirmi frigida & humida & sibi dominatur phlegma, ætas eius aut pueritia, aut senium, pueritia propter gulositatem, senium propter multitudinem phlegmatis in corpore eorum, tempore anni hyeme, aere frigido & humido. De re non naturali cum infirmus in sanitate sua gulosus & bibosus sit, multum quiescens, piger sepe balneans post cibum. De re extra naturam cum infirmus sentit dolorem in ore stomachi, & humiditatem in lingua, inflationem in latere muta to colore, siti parva, rigorem & frigus nimium habet in extremitate corporis & diu, cum antequam corpus in hora accessionis non apparet calor nisi cum moretur manus & calcet & aperiantur pori, calor habet humiditatem propter phlegma, parva acutus est propter putredinem, aliquando sudans parum, aliquando non, durat autem in tempore longo propter putredinem, atque permanet in corpore usque ad secundam accessionem, pulsus minor est pulsus quartanæ & spissior. parvas propter phlegma, quia deficit virtus ex frigiditate eius & dissolvitur, & angustatur propter multitudinem quantitatis eius, unde multum est diversus. Spissitudo eius ex ne cessitate recipiendi magnitudinem eius. Urina quodam tempore subtilis & al. & quodam tempore turbida & grossa. subtilis ex contipatione pororum propter grossitudinem & viscositatem materię. albedo ex frigiditate est phlegmatis. grossitudo & turbulencia, quia natura alit quando aperit illam viscositatem & expellit grossam & viscosam humiditatem quæ fuit causa contipationis. Rubor, quia si phlegma movetur & putrescat, necesse est calcet. Quas significationes cum invenieris ex parte plurima certitudinē est vera quotidiana, maxime si multi patientur hanc in illo tempore. Oportet autem te intelligere, quia feb. amphimeron cum materiam habear nitreum phlegma in initio habet parvam rigorem. Si autem sit ex falso, in initio est multus rigor. Si ex acido frigeret in initio. Si ex putredine sit dulcis phlegmatis, nihil horum habebit. Ex his ergo significationibus intellige feb. ex putredine peryodis esse & simplices. Oportet item intelligas, quia rigor in feb. incipit à dorso mulieribus, uris ab extremitatibus manuum & pedum. Feb. autem continū significatio unius salis est, quia post 24. horas non recedit, neque rigorem, neque tremorem habet, neque sudorem nisi cum tota recesserit, pulsus multum est diversus, urina indigesta. His significationibus cōtinua intelligitur. Significatio omniuscuiusque speciei est, quia in ea quæ sit ex putredine sanguinis invenitur grave corpus infirmi, & fatigatum, flatus, pulsus cum angustia & siti, oculi rubri, venæ eorum plenæ, & rufæ facies & totū corpus pertinent rubori & quasi inflatum est, pulsus nimium diversus,

diuersus, urina rubea, alui hina. Quæ ex putredine aliorum huius est hanc habet significationem quiescit infirmus, sicut in febribus cõtinuis. Quæ nascitur ex putredine cho. rob. vocatur causon, ex mollicie & mitigatione doloris intelligitur in die habet remissionem & fortitudinem & augmentationem in die accessiones, & sequuntur eã nimius calor, atque sitis maxima, & angustia & acumen, propinquitas ad perditionem alienatio mentis, cum molestior sit & acutior, tanto crasis est velocior, nascitur plurimum his quibus in corporis venis cho. multa adunatur, & maxime in his quæ in concauitate sunt hepatis, & in pulmone & in ore stomachi, unde sitis semper sequitur. Oportet autem hæc omnia r. frigerari plusquam alia. Feb. continua nascens ex phlegmate habet remissionem quando dimittit, & confortatur, quando incendit. Quartana continua nascens ex chn. nihil habet duorum dierum remissionem, & in die accessus unius caloris confortatur em. cum his significationibus quæ diuinus certificatur simplices species ex putredinibus.

De febribus compositis & causis earum & significationibus. Cap. V.

Febres compositæ sunt multæ & diuersæ, quia aliquando componitur tertiana cum quotidiana, aut tertiana cum quartana, aut tertiana & quotidiana cum quartana aut quotidiana, cū quotidiana, aut quartana cum eadem continua, aut tertiana peryodi cum tertiana continua, aut quotidiana continua cum quotidiana peryodi aut quartana peryodi cum quartana peryodi, aut tertiana peryodi cum tertiana peryodi, & aliquando componuntur sibi iuicem tres ex his febrib. aliquando quatuor, & compositiones aliæ sunt plurimæ. Hæ compositiones sunt hisformes, aut secundum uiciniam, aut secundum similitudinem. Si autem ambæ materię quæ ambas feb. faciunt commisceantur & completantur se accessiones & recessiones eiusdem sunt temporis, si secundum uiciniam, & unaqueque locum habet proprium, accessiones earum in duobus temporibus sunt diuersæ, & si milititer recessiones earum. Omnes huius qui compositi sunt, aut æquales in quantitate sunt, aut quidam plus, quidam minus habent. Et feb. compositæ, quædam habent proprium nomen, quædam uero nou, habens proprium nomen est hemitritus. i. media tertiana. Hęc enim feb. componitur de feb. phlegmatica continua & peryodi tertiana, si sit uera, quando non est uera componitur aut de tertiana continua & phlegmatica continua, aut de tertiana peryodi, & phlegmatica peryodi, & aliquando ex duabus feb. in uirtute equalibus. Hęc etiam feb. componitur aliquando ex duabus quarum una maior est altera. Hæ autem sunt significationes specierum compositarum feb.

significationes unde unaqueque possit intelligi, sunt hæc compositæ secundum uiciniam, faciliores sunt intelligi de tempore suæ perferuatione ois. Quod si se. continuz cõponantur cū febribus peryodibus: peryodes intelligitur de rigore quæ habent in actionis tempore, & continuz æqualis habilitate. Si oero compositio sit secundum compositionem, intellectus harum durus & molestus est propter diuersitatem suarum significationum, maxime si complexio sit æqualis dura & molestus est, si autem una ex materiis in complexione dominetur, sic leuior intellectus, quia significatio dominantis apertior erit. Oportet autem acas discretionem, tuamque in his subtilem intelligentiam, & non confidas in peryodi compositæ feb. neque credas interpolationi suæ significationis, aliquando enim duæ sunt retianæ quæ accipiunt quonidie, quas multi medici putant esse continuas. Aliquando etiam duæ componuntur quartanæ accipientes omni tertia die, & putantur esse tertianæ, in quibus non secundum quod oportet solet medicari, unde se. confortantur & augmentantur, & aliquando perit infirmus, quia medicina necessitati est contraria, & propter hoc oportet te ingeniare ut intelligas se. de affectu suæ naturæ & de actionibus proprietatis suæ secundum quod meminimus ois dixisse ut certificatis significationibus competat medicina febrientibus neque confidas in duratione feb. Feb. composita ex phlegmate & ch. rn. quæ uocatur hemitritus si uera sit, significationes habet quatuor, unam qui est continua, aliam quia quotidie interpolatur, & una die leuior accipit & facilior, altera uero durior atque molestior, facilitas eius propter feb. phlegmaticam omni die inuadentem. Rigorem non habet propter materiam in uasis contentam. Molestatio eius & durities in altera die, quia in die tertianæ cum forti uenit rigore, quia in tertiana solet evenire, & mouetur feb. phlegmatica, quæ omni die solet inuadere, unde die illa molestia est & dura. Tertiam quia patitur in tempore accessus maximum rigorem, aliquando in una die his uel ter uel quater. Quartam quia suum tenere est æquale, dum forti assimilatur forte, & debili debile. Hemitritus non uera est composita cum feb. in uirtute equali, quædam cum altera fortiori, sed in cõpositione æqualis si est cum tertiana peryodi, rigorem omni die facit, una tamen die est debilis cum rigore, & habet frigiditatem, in corporis extremitate: Vna die cum forti rigore & tremore, punctione quàm & acumine. Quæ autem est composita cum tertiana continua, & quotidiana continua, non habet rigorem neque tremorem, composita cum tertiana continua, & peryodi quotidiana similia est ueraci, sed tamen feb. huius rigor non est fortis, quia est phlegmatica feb. & ideo neque pœngit neque acuta est, quando

quādo hæc febris componitur cum febris non equalibus significatio dominantis palam plus erit, & debilior occulta. Hæ sunt significationes febrium ex putredine quæ sunt compositæ. Aliquando quædam accidentia sunt febribus cōpositis & simplicibus. Vnde inter se differantur ex calore suæ materiæ & diversitatibus. Itidem unaqueque à simili deoominatur, quædam enim commixta nimis humiditati vocatur eloidis, quædam cuius calor nimium est iocensus & vocatur caustica, quædam semper omnia sitis sequitur, & in lingua nigredo, & in stomacho pueritio, in qua cum tangatur corpus nimia iocensio sentitur, & est feb. in qua infirmus sentit calorem & frigiditatem simul in corporis interioribus & exterioribus. Hoc autem in phlegmatica contingit cum ex putredine nascitur phlegmatis, calor enim in feb. ista propter putrescentiam est phlegma frigus ex nodum putrescenti, & vocatur yclus & est in qua sentit infirmus omnium calorem in corporis interioribus & tepiditatem in exterioribus, quod ex grossitate & viscositate est mariz, & propter hæc calor non potest exire ab interioribus ad exteriora. Et est in qua sentitur nimia frigiditas in interioribus corporis quæ ex phlegmate frigidissimo cōtingit, & vocatur euiliados. Et est in qua habetur omnium calorem in corporis interioribus, & de calore illo ascendit fumus acutissimus in corporis extremitatibus, & consequitur, quia non est viscosa materia unde efficitur, & propter hoc cito est dissolubilis & fumus exit, vocatur autem feb. ista typhosus. De sunt omnes species quæ de putredinibus nascuntur humorum.

De febre hæctica & causa & significatione eius.

Cap. VI.

Febri quæ vocatur hæctica, dividitur in duas species. Una vocatur senectus in qua naturalis humiditas finit, & succedit siccitas dominans per omnia corporis membra quia desiccantur, & rugantur, & calor naturalis dissolutus finitur. Senectus ideo vocatur, quia cum senes ætatem descrepitam ingrediantur, calor eorum naturalis est exiōdus & siccitas illorum membris dominatur, quia humectatio eorum finitur, unde hoc eomen huic febre datum est à simili. Secunda species phthyfis vera est. phthyfis vero est collectio caloris extra naturam in solidis membris quia humectatio corporis finitur, & in tria dividitur. Vnum est quo humectatio desiccatur quæ in parvis venis habetur in unicuique membro pertinentibus, unde tenerorum calcat humectatio membrorum, sicut est pinguedo & crassitudo, & hæc vocatur phthyfis absoluta. Secundum est quo humectatio finitur quæ in teneris est carnis, & incipit calor ab humectatione quæ in membris est similis, quæ humectatio est sicut ros

aut acris umbra, hæc est quæ vocatur hæctica cōsumptiva. Tertium est in quo hæc humectatio finitur, & illa humectatio incipit calefieri quæ in conuoluiōibus est fundamenti cuiuslibet membri, quæ vocatur phthyfis & consumptio. Phthyfis vocatur propter consumptionem humectationis in membrorum fundamentis, & propter siccitatem eorumque molliem quæ ex finita sequitur humectatione in membra solidæ sicut videmus in terræ nascentibus quæ cum desiccari incipiunt emollescunt & ita consumuntur. Causa unde hæc febris nascitur, aut antecedens, aut primitiua esse comprobatur. Antecedens est si cut si feb. putredinis immorans iocosa fuerit, & calor ab humectatione incipiens cordis, membrorum quæ fundamentis eam finierit, quæcumque autem febris est huiusmodi in initio cōsumptiva sit. sicut hæctica nascens ex hemiparico, & apostema calidum in pectine natum cuius calor propter vicinitatem suam teodid ad cor, & arteriarum humectationem consumens, & membrorum humectationem desiccans. Aliquando hæc eadē nascitur ex defecatione quæm infirmus ex acutus patitur passio, quædē medicus cogitur dare syrupum. In hac desiccatur cor primum, deinde fundamenta membrorum. Causa primitiua est angustia, ira, tristitia, labor, vigilia, ieiunia maxime si iuuenilis est ætas, cōplexio eadem tempus æstiuum, & ordinario infirmis, quæ de huiusmodi causa nascitur, phthyfis & consumptio vocatur. Significatio unde intelligitur, quia feb. ab initio molesta & dura non inchoatur, male enim cōplexio quæ est causa equalis est per totum corpus & non diuersa nec infirmus sentit in corpore suum calorem febrilem, neque dolorem & fatigationem, neque aliquam significationem quæ ad febrium attineat putredinem, sed calor igneus ex traous totius cordi dominatur æqualiter, neque membrum aliquod est sine calore, quod calorem sibi sentiat contrarium esse. Calor enim nondum ad plenum incipit augmentari ut significationes possunt perperodi. Unde hæc dura est sanari, cum non in initio valeat intelligi quæ medicina valeat subueniri, cum tamen ad consumptionem perueniat, aperta sui monstrat indicia, sed tamen impossibile est sanari, quia corpus propinquat perditioni. Eius tamen significatio talis est in initio, si febrem inquam inchoantem tres dies videmus continuantem, neque calorem habentem sortem, neque aliam etiam significationem caloris febrium ex putredine attinentem utpote rigorem & tremorem, sitim, angustiam, siccitatem, & in lingua nigredinem, fatigationem, capitis dolorem, urine putredinem, pulsus magnitudinem, & eius diuersitatem, aliæque signa quæ febrem ex putredinibus sunt comitata, calorem quoque quietum & mansuetum, & tribus vel amplius diebus continuum, sed tamen

men

men confortatum cum cibum accipiat, in nocte dormiat. febris hæc ita proculdubio est intelligenda, eius talis ab initio debet esse significatio. cum vero augmentatur ab humectatione venarum inchoatur, unde infirmus consumitur, calor eius minuitur, cutis desiccatur, facies tennatur, oculi concitantur, imo totum corpus consumitur, calorq; ab alia incipit humectatione. quod intelligitur, quia oculi cōcitantur, lippiuntur, palpebre pendunt inferius ac si dormiretur. hæc aut omnia ex virtute sunt defecta, totū corpus exiccatur, & rugatur. splendor & flos vitæ auferuntur. cutis faciei siue totius corporis fit thetinosa sicut corium super ossa extensum, tempora planiora, auriculæ contractæ, color citrinus, sparulae eleuatae, venter lictus. q̃ si tangatur sub diaphragmate, omnia viscera licta inueniuntur, & quali non apparent exterius, venter thetinosis; & cum dorso inunctus, calor corporis in initio tæctus debilis, & cum iunioreretur manus fit acutus, pulsus durus & extensus quasi chorde debiles & firmatæ. hæc sunt significationes feb. hæc itaq; & eius causæ.

De cura febris ephimeræ quæ fit propter calorem solis. Cap. VII.

Febbris itaq; ephimera quæ fit propter cal. solis differt ab illa quæ fit propter calorem æstiuu aeris, quia illa quæ est de calore solis maiorem capitis infert calorem quàm toti corpori. Illa vero quæ fit propter æstiuum calorem aeris plus calefacit corpus quàm caput. unde huius febris utilisior hæc est cura, ut aerem qui subtilis est, & cibum infrigidemus & humefaciamus & in pavimento domus sternamus flores refrigerantes & frondes calidæque fumos extinguentes sicut violâ rosam nensur frondes pilij semperuinam, salicis frondes, & frondes basilicon, hæc omnia semper sunt cum aqua frigida vel rosata infundenda. Et licet basilicon sit calidum in tertio gradu tamen proprietatem habet inducendi frigiditatem aquæ per nares. Sed oportet nos patientium nares saepe humefacere cum oleo viola. & nensurino in aceto mixtis & similibus. Vngenda sunt tempora de sandalis camphora & aqua ros. si non habent reuma. Quod si habuerint reuma cauendi sunt ab aceto & camphora. Ad nares eorum apponamus fumum aquæ calidæ ubi cocta sunt viola & camomilla, caueant ab omnibus olei inunctionibus. Quod si non habuerint capita de humorum fumositatē plena, neque reumate bonum est ut capita eorum rorem post declinationem febris aqua in qua decocta sunt viola & camomilla, quia si capita eorum plenitudinem habuerint abstineant se ab hac aqua & solimodo fumum eius odorant. Succum yriusq; gene-

ris malorum granatorum accipiant. Comedant melones palestinos, uuas hyemales, medullam tritici & cucumeris omnia cum niue refrigerata si niue fuerint assueti. Vinum bibant mixtum cum sirup. malorum gran. & uiol. Si egellio eorum fuerit sicca humectanda erit cum sirupo viol. nel de prunis & osifenicia facta & luis similibus. Post febris declinationem bonum est si balneentur in temperato balneo aerem & aquam habente temperata. Manducant in initio prandij medullas curuli & cucumeris cum anetaro, & micam panis in aqua lotam. Mundificato autem stomacho de humorum copia & febris fumositatē expulsa, demus pollos gallinæ eos perdicis coctas cum iure condito de succo maligra. & aceto uuarum agrestium & eum ramis potulacæ, & similibus.

De cura feb. ephimeræ propter aeris frigiditatem. Cap. VIII.

Patientes ephimeram propter aeris frigiditatem oportet eos ante omnia cauere ut balneis priusquam morbi fiat digestio & violentia febris sit declinata. Cumque morbum uideris digestum esse & febrem declinatam, mittendi sunt pedes eorum usque ad genua in aquam calidam in qua cocta sunt camomilla, sanclus, ysupum, sisimbrum, abrotanum, & similia. Inclinantur super fumum eius, deinde balneum temperatum ingreditur & fricentur ibi, ut pori eorum sint aperti, & calor qui ad corporis interiora coadunatus fuerat dispersus sit & dilatatus, quædam pars etiam eius sit ad exteriora corporis egressa, lauabimus capita eorum cum aqua calida in qua cocta sunt camomilla, anetum, & misceantur in aqua quedam olea uirtutem dissolutiuam habentia, ut sunt camomileon, yreleon, anetileon, & cauendi sunt ab epithimatis, nisi cum omnis sudor fuerit egressus, ne causa epithimatis pori claudantur & materia quam necesse est cum sudore exire, non possit exire, sed permanens in interioribus corporis maximum generet nocuentum, & ducant patientem ad magnam molestiam perditionis. Cauent ne diu in solio morentur quia aqua licet sit humectatiua magis cæteris rebus, eius tamen caliditas perforat corpus usque ad interiora, unde fumi cum sunt in corpore existentes calefunt, repugnat eis grossities aquæ, & ideo melius est si in aere morentur quàm in solio, quia solium implet poros & claudit eos cum humiditate aquæ. Aer uero balnei poros aperit & fumositatem corporis dissoluit. Idcirco exercitia sunt istis conuenientia, quia exercitia temperata dissolunt & ratificant corpus sunt & uia qua fumi eorum transeunt. Oportet illos accipere subules cibos & laudabilem chimum generantæ, & nullam eis frigidationem

X facientes,

ficientes, sicut sunt hedulina caro & annalis agnus & similia. Et quia secundum nostram intentionem oportet eorum corpora non humectari cum artificio convenienti, & iura sint condita cum albumine oui paucis ceptis & modico cinino carni cinamomo & similibus, abstineat se à grossis cibis & viscosis, potent vinum cum aqua calidum, multis operiantur iudumentis, & iuxta eorum latus apponantur carbonēs ignis ut repugnent aeris frigiditati. Naribus odorifera applicentur, quæ temperatæ sunt, calefacientia sicut sunt sanfucus, yreos, limbrum, & de fructibus sicut sunt citruli & similia. Quicunque eorum reuma habuerint, caveant sibi à balneo nisi morbo cessante.

De cura ephimera propter balneum.

Cap. IX.

SI ephimera sit propter balneum aque stipticæ, sicut vitæ sulphureæ aluminosæ, et si cutem habeant sicciorē & magis oppilatam quàm superiores, tamen eius feb. curatio similis est superiori. Oportet enim sicut diximus ut balneetur nisi febre declinante, sed postquam declinata fuerit deponant pedes eorum vsq; ad genua in aqua quam diximus, deinde in temperato balneo balneentur. Cavendi sunt ab omni olei inunctione, bonum est si aliquantulum exercitii videntur. Cibus levis accipiant qui sint faciles ad digerendum & bonum generent chimum, & aliquotulum frigiditati pertineant, ut valeant fumorum ad interiora coadunatorum acumen extinguere. Vitum non bibant nisi corporis plenitudinem careant, & cum omni fumositas à corpore fuerit expulsa.

De cura feb. ephimera propter cibos & potus.

Cap. X.

Oportet patientes ephimeram propter cibos & potus calidum hæpar in initio curari cum osi zaccara & succo maligræ cum aqua ros. & camphora & cibos accipiant. s. portulacam atriplicem scariolâ pullos gallinæ. cucurbitam & similia. Cataplasmemus hæpar stomacho tamen cibis in initio, de sandalis, rosâ, farina bordei, aqua ros. camphora & similibus. Comedant melones palestinos mala granata, citrini pomi medullam coctam mespila ruas mizas & similia.

De cura ephimera propter ieiunium.

Cap. XI.

IN statu ephimeræ quæ sit propter ieiunium nullum cibum oportet dari, sed succum accipiat malorum gr. & uvarum hyemalium succum sorbeant. Quod si hæc eis non sufficiat & fames

eos percutiat, dandus erit succus micæ panis cum zaccara lotæ. Declinat itaq; febre si uiderimus succum esse digestum, dabimus puissam calidam & expectabimus quousque sit digesta, deinde mittemus eos in balneum, & cum corpora calefieri incipiet & sudorem emittet omnino ungeodus erit oleo viol. ut claudens poros repugnet humiditati corporis & extrinsecus excat, deinde digerent leuibis cibis & subtilibus & ad digerendum facilibus atq; sanguinem tenuē generantibus.

De cura febris ephimera propter laborem.

Cap. XII.

SI ephimera sit propter laborem, sicut æquitate, laborare, ambulare, oportet ingeoiri ut requiescant. Deinde oleo viol. uel nucisfarisio ungantur. Quod si labor modicus extiterit, fricentur corpora eorum multum, si autem multus fricatio fuit parum, postea in temperato balneo sæpe lauentur, neque ullam muram in eo faciāt ne substantialis humiditas eorum consumatur & in hæticâ incidant. In solium descendant ut corpora eorum humescant: eueantes autem solium cum oleo viola. uel nucisfarisio ungantur ut clausis eorum poris humiditas accidentaliter acquisita ioris in corpore eorum permaneat. Caveant coitum ne corpora eorum deficiant, accipiant sturnas, perdicæ, pollos, gallinæ, hedulos auouales, agnos, pisces laudabiles digestionē obediētes. Potent oīum subtile & multum mixtum quod membra eorum humefcet. Vinum enim corporis penetrariū est, quo eum te aqua cum eo dirigitur & membra humefacit. De fructibus comedant malagranata, uuas, pruna, mala, & similia.

De cura febris ephimera propter bubones.

Cap. XIII.

Ephimera quæ sit propter bubones oportet uos ante omnia studere ad curandas pustulas & apostemata, quæ cum bubonibus fuerunt. Deinde balneentur, in aere balnei morentur ut humorum copia paulatim dissoluatur, nec aliquo oleo ungantur, qui uolentes in solium descendere, nec in eo morentur, dictam accipiant subtilem & ad digerendum facilem, & substantiam laudabilem habentem.

De cura febris ephimera propter uigilias.

Cap. XIV.

IN ephimera propter uigilias oportet magnū impendi studiū, ut prouocemus somnū cum suauifricatione pedū; hoc. n. trahit humores in capite existeres, & repngnat fumo ad caput ascendēti.
Cibum

Cibum accipiant modicum qui sit facile ad digerendum quia natura propter defectum non multum sufficit cibum, vinum bibant temperatum in quantitate & virtute, & à coitu omnino sibi caveant quousque ad proprium eorum statum & usum conuersi fuerint.

De cura febris ephimera propter iram.
Cap. XV.

Quando ephimera sit propter iram, necesse est vt in eius initio ingeoicemus quo cor eorum cōfortetur & calor extingatur, quod fit cum expulsionē itē quam ipsi obinent, deinde in temperatam mittantur balneum. s. prout eorum fuerat consuetudo, & post sudorē ungantur oleo viol. & camomil. & postea descendant in solium ibi tamen diu non morentur. Egrescentes à balneo comedant frig. & hu. abstineant à uino quousque calor eorum declinetur, sin autem multum mixtum illud accipiant, Caveant sibi à coitu ne putrefactis eorum humoribus in putridas incidant febres, aut ne humores ab eorum capite descendentē spolemata generent.

De cura febris ephimera propter angustiam.
Cap. XVI.

Inter angustiam & tristitiam est differentia, quia tristitia ad rationalem pertinet uitē in cerebro existentem, angustia uero ad spirituale uitē in corde existentem, ideo angustia sit magis causa phthisis quam tristitia. Igitur, quia perfecta medicina est quæ causam ægritudinis tollit, necesse est ab ea incipiamus & ingeniemur quomodo possimus ab eis auferre cogitationem & inspirationē cū diuersis generibus musicorum, & cum omni causa lætitiæ pronocite ut obliuioni tradant tristitiā, & quiescat anima eorum à labore, quia anima præ cogitationis ni mietate debilitatur atque infirmatur. Similiter & corpus infirmatur propter animam, sicut dicit Aristoteles, vitium animæ sequitur complexio corporis, & corporis complexio animam comitatur. Proinde oportet non negligere corpus, sed adiuuare illud cum rebus humefacientibus. Caveant sibi ab omnibus cibis desiccatis ne causa eorum neniant ad phthisim, quia hætica magis pertinet ad istam quam ad ceteras ephimeras. Siccitas enim istorum cor poribus dominatur, & corda eorum sunt calidiora: unde oportet illos humectari, scilicet cum balneo temperato & descendā in solium, deinde vngantur ex oleo uiol. Dietam accipiant frigidam & humidam quæ sit facili ad digerendum sicut perisana, hæbuli, cucurbita, atrplex, perulaca, blisii. Vinum bibant quod non sit uetus & multum mixtum. De fructibus uero,

humectantibus concedatur sicut sunt uinum, melones palestini, & similia.

De phthisi & hætica & eius cura.
Cap. XXVII.

Ostenso uniuersali disputatione de omnibus ephimeris, omnimodo expedit vt de cura phthisis & hæticæ dispuremus. Sed quia phthisis alia naturalis & sit in senibus decrepita ætate, alia nō naturalis quæ duobus modis sit, aut cum febre, aut sine febre. Sine febre aut calida aut frigida. Frigida phthisis consumit corpus, & sit uel propter diuturna apostemata, uel propter alios diuturnos morbos. Hi enim morbi qui sunt diuturni nimium de substantiali corporis humiditate dissolunt, unde infrigidato corpore uirtus digestiua debilitatur. Ideo quæ cibaria cruda & indigesta permanent. Phthisis quæ est calida & sine febre sit propter calidos chimos cordi oppositos, quorum lumen ad cor ascendens mutat eius complexionem: eique accidentalem parat calorem, unde sanguis corrumpitur, & membra ab eo non nutrita consumuntur. Oportet ergo ut in frigida phthisi primitus hæpar confortemus ut cibaria digerantur, & hoc cum rebus digestiuam adiuuantibus uirtutem sicut ligno aloes, galanga, & zinzibete, pipere longo, cinamomo, (pica, garinfi, & similibus). Dietam similiter uirtutem digestiuam adiuuet sicut caro pullorum, perdicum & huiusmodi. Vinum bibant roseum uel dactylicum uel palmæum uel cum supradictis rebus factum. Balneentur aliquando post cibum quia digestiue conuenit uituti. Nonnunquam exercitentur ante cibum ut uirtus fortior sit in digerendo.

De signis & causis hætica & phthisis.
Cap. XXVIII.

Cum in theorica de hætica & phthisi sufficenter disputauimus, placet hic de ea parum disserere ut in eius cura non erremus. Phthisis itaque quæ est cum febre duobus modis est, aut ipsa quæ per se morbus, aut per aliud. Quæ uero per se est morbus sit à rebus calefacientibus, & desiccantibus. Altera uero causa eius est ephimera, maxime si propter animæ accidentia fuerit sicut propter uigilias & cogitationes tristitiæ aut angustiam legere & inuestigare. Phthisis uero quæ cum febre sit & propter alium morbum quatuor fit modis. Aut de ephimera cum proprio terminum transit, aut propter acutam febrem cum calefaciat, & ultra modum exiccat, aut propter putridas febres, aut propter diuturnas ægritudines sicut tuum dolore pectoris diaphragmatis & his similia, quæ si prolata fuerint corpus calefaciunt & desiccant.

Hæctica tribus fit modis. Vnus est in uasis sanguineis & in uenis humorum existens, & dicitur rosaceus. Secundus est humiditas in membrorum concavitate in quibus uondum natura per fecit tertiam digestionem & dicitur cambium. Tertius est substantialis humiditas qua reguntur & custodiuntur membra que in uasis sanguineis existit, & dicitur glutine sue humiditas spermatica. Est prima species leuior hæctice, proinde hæc species est ad curandum facilis si patiens in sapientis manum incidat. Medicus enim si incipiat calorem extinguere uelociter cum frigidis & humidis, sicut cibis, & potibus aere & similibus, citissime sanabit infirmum. Quod si calor humiditatem membrorum deficiet quæ coagulationi est uicina, sit secunda species hæctice quæ dura est ad sanandum. Quod si calor membrorum iam perfectior humiditatem eiciet, sit tertia species hæctice quæ incurabilis est; quod possumus perpendere ex calore solis & ignis qui in longo tempore humiditatem lignorum exicat & separat. Calor. n. ignis humiditatem lapidis exicat & in calore conuertit, hæc sunt causæ hæctice propter aliud morbum. Causa hæctice quæ non est propter alium morbum humiditas est in concavitate cordis uenis & arterijs inhabitans, quæ si calefiat & in caliditate & siccitate propter assuetudinem exercitii mutetur, fiet prima & simplex species hæctice quæ per se est morbus, hæc itaque facile curatur. Sed si calor augmentetur, ut humiditatem cordis arteriarum atque uenarum deficiet, sit secunda pars hæctice quæ non cito curatur. Quod si calorem substantialē cordis arteriarum & uenarum humiditatem deficiet, fiet tertia species hæctice eritque incurabilis. Oportet autem intelligi quia si omnia membra fuerint deficcata & infrigidata, angustiam faciemus eis curam quia molestum est. Sed si hæc fecomposita fuerit cum febre de putredine difficilis est & dura sanandum, quia sunt contrariæ & oppositæ, febri. n. putredinis uecessaria est res lauatua & colatiua & deficcatiua ut lauet corpus & deficiet humores qui sunt cum putredine, & hæctice conuenit res refrigerans & humefaciens urinifrigidet & humefacet calorem febri & laudabilem corpori præstet humiditatem, unde utraq; cura est inter se opposita. Bonum est ergo ut cura hæctice auferatur per contrarium sicut labor cum quiete, uigilia cum somno, tristitia cum læticia, ira cum patientia. Danda est sola aqua calida cum accessione putredinis feb. uenerit uidelicet cum rigore incipit. Quod si uomitus sponte ueniat bonum est, sed si non cum leuissimo prouocemus. Acumine cessante & angustia infirmi quiescente & appetitui cibi surgenti damus prisanā & panem bis uel ter lotū in aqua frigida cum rocca. Damus ordeum cum leuicibus coctum, sed lentius sicut mūdare &

elixare & prima decoctionis aqua auferatur, deinde cum hordeo miscetur. Similiter ramos portulacæ, lactucæ cum modico coriandri recentis uel ueteris cum aceto & zuc. & modico croco. Si uero sit febr. de putredine phlegmatica poneudū erit in uice portulacæ & lact. parū mēthæ & apij & blitis, sumo mane accipiant rodozaccarā & uiolam cum zuc. mixtā. Sed si ca. feb. hæctice nōdum uenerit ad humiditatem quæ coagulationi est uicina, demus succum scariolæ lupuli & apij, sed tamen raro ne assuescant illos sepe maxime succo apij, quia calor hēt & siccitate. Dandi sunt troscisci de rosis & de berberis, quandoq; mastix & maratrū cum rodozaccara raro tamen tribuatur. Oportet ab aqua frigida omnino caueri. Sed si uecessario fuerit coagulationem modico masticiā, miata cum aliquo syrupo detur. Quod si apostemata patiuntur in uisceribus omnino abstineat ab aqua fri. & prohibeant esse ne ad conueniat quomā si ad cor ueniret cum sua frigidi. extingueret calorem naturalem. Oportet iterum ne cibis in accessione putredinis febri tribuatur neq; parum autem, quia angustia dabit infirmo & fe. augme utabit. Sed si accessio sit mane ea. aquam damus rigore in cipiente, & præcipiunt infirmum malum. Sugere in tempore accessionis, accessiones uero cessante dabimus prisanā, digesta prisanā of feremus cibū. Sed si fe. in medietate diei incipit augmentari, mane dandū erit prisanā, sed rigore incipiente ea. dabimus aquam ut uomitus prouocetur. Recedente quidem fe. damus prisanā, cūq; digesta fuerit cibum donamus prout oportet, sed iam minorem quantitatem cibi quæ in natura digerere ualeat incipiente quidem rigore, uomitus cum aqua ea. prouocabimus.

De hæctica simplici & eius cura.

Cap. XX.

Si hæctica sit simplex bonū est ut eorum illius causæ incipiamus per contrariū, sicut tristitia cum læticia, ira cum patientia, uigilia cum somno, labor cum quiete, & similia eum suis contrariis. Deinde expellamus materiam putrefacti incipientem cum medicamentis mundificatibus absq; caliditate & siccitate sicut est succus lupuli cum rodozaccara zuc. myrobal. māna, casie fist. & similibus mixtis. Materia uero purgata ordinemus aerem, quia necesse est ut sit fri. & hu. & locus sit septentrionalis. In diuertia siur fri. & hu. sicut lines, & siur lota & aromatizata cum sandal. & aqua. ro. Cibaria sumant infrigidantia, & eitraueum calorem extinguentia, & naturalem confortantia, & substantialē corporis humiditatem custodientia, sicut sunt prisanā, panis lotus bis aut ter in aqua frigida aut panis albisimus infusus in uiuo albisimo & bene mixto, & olera sine si cot lactuca, portulacæ, uenerbita, bletæ, atriplex

plex, omnia condita cum amygdaleo. De fructibus sicut sunt mala, urtiuque generis, melonae palcatini, mala muza, pira, uux hyemales & similia. De syrups, syrupo malorum gra. & intepiacipiant, mittamus in aquam quam bibere uolunt spodium, faudalos albos, semen portulacae & similia. De aromatis sicut sunt frondes & flores confortatiui, refrigeratiui sicut sunt rosae, salices, myrtae, uioleae, nenufar & sandal. Caueant camphoram propter siccitatem quam habet, uisunt herbae in suis capitibus substantiam humidam habentibus quae repugnent siccitati camphorae. Non enim humiditas capitis siccitati ualet repugnare camphore nisi cum maioris quantitas fuerit quam siccitas caphorae. Cataplasmatuero quae hepatis sunt apponenda concedamus ut habeant camphoram, quia naturalis humiditas hepatis repugnat siccitati camphorae & conuertit eam ad temperamentum. Sed de hoc reprehendimus a sophistis, quare inquit, humiditas cerebri siccitati camphorae non repugnat, cum cerebrum naturaliter sit humidius ceteris membri corporis. Quibus ita respondemus. Cerebrum semper moueri propter imaginationes & rationes, quia est fundamentum sensuum & uoluntarij motus, & fumi semper ascendunt ad illud, & calorem etiam aeris plus patitur quam hepatis, & ideo cerebrum accidentaliter est siccius quam hepatis, licet ceteris membris sit humidius naturaliter. Quandoque damus troscicos de spodio & bolo cum syrups quos diximus, damus pitauum si egestio sit humida. Solutio enim uentris in hac passione pessima est, quia membra defecta humores non possunt expellere per poros qui in interioribus corporis clausi reuoluuntur ad intestina, & in eis duas faciunt actiones ut lubricationem ut egestio nequeat retineri, aut exoriant ea & nascitur dysenteria. Si autem tempus fuerit hyemale & frigidissimum panis cooperiantur, ne frigiditas aeris cutem deficiet & sumos claudat in interiora. Sed si tempus sit aestiuum domus infirmi sit spaciola & septentrionalis, & portae sint septentrionales, & in pavimento domus sternamus rosas uioleas, nenufar, salices, balsilicij, semperuiuas, ramos uitium, & earum, modicum a quae super eas roremus. Quod si corpus eorum inducit materiam ad putredinem praeparatam, ungamus corpora eorum de succis laeturae, portulacae, uuarum foliatum, cum oleo rosato mixtis. Haec tamen inunctio super eorum pectoribus non diu moretur, quia instrumento rom spiritus est percussus. Quod si uirtus coram fuerit defecta & membra dissoluta & uenae appareant albae propter sanguinis inanitionem, ossa quoque brachiorum subtilissima, eorumque concatenatio inanitas proxima portenditur mors.

De haetica quae fit propter alios morbos. Cap. XXI.

Sed si haetica fuerit propter alios morbos sicut freuclis, tussis, acuta febris, & huiusmodi, prohibemus patientes ab aqua & frigidis, & ab iunitione succorum quos superius diximus, nisi cum apostema per quod est febris futura sit calidissimum, quia calidum apostema trahit ad se humiditatem aquae & prohibet eam ne uadat ad cor & noceat calori naturali. unde Galen. aqua inquit frigida in haetica quae est propter alium morbum pessima est, praecipue si morbus fuerit diuturnus. Palam est ergo quod non debet dari aqua in haetica. Debiles caueant aquam, necesse est ergo ut festinemus ad restauranda eorum corpora in uirtute nutrimenti cum cibus & potibus qui sunt faciles, & subito & multum nutritiles, sicut est uinum album & grossum, aut rubecum grossum, sicut Hippo. in apho. facillius est repleri potum quam cibo. sed tamen non dandum est purum in ieiuniis, quia membris & maxime stomacho praestaret caliditatem & siccitatem, nec subito & multum dandum, quia sic uelociter membra non nutrit, si sit multum & grossum faciendo moram in angustis locis oppilationem generat, unde oportet nos illud negare in aegritudine existentibus uel eam exeuuibus, & maxime haeticis. Cibum accipiant mediocrem, facile masticantem & quidam grossissimi habentem ut permansens in membris nutriat & confortet. Intentio Hippo. non fuit de potu absolute, nec hominibus cibis absolute, sed de rebus natura corpora facile & leuiter nutrita uibus sicut sunt uina quaedam grossitatis habentia & in membris permannentia, nutrimentum eis inferentia, inferunt ergo nutrimentum de cibis facile nutritibus & naturae obedientibus sicut sunt, lac, pitaua, panis lotus, & similia. Sed si cognouerimus corpora eorum nullam habere materiam seu humores qui sunt ad putredinem parati, cauendi erunt a lacte, & solum modo pitauum & panem lotum accipiant. Vniuersaliter dicimus quod lac & uinum potu uentis, perdicis & similia non sunt danda, nisi certissime sciamus febrem ab eis esse ablata. Haetica uero extincta damus mane lac caprinum statim emulsum, misceatur tamen cum aqua calida, ad suauem ignem coquatur usque ad aquae consumptionem, deinde calidum prout ab uberibus emulsum fuerit accipiat, quo digesto de mus starnos, perdicis, pullos galinaceos omnia iussellata, uinum album & pdricum medicet mixtum. Sed si non potuerint lac bibere miscendum erit cum hordeo uel similia tritici. Deinde balneamus eos in balneo aquae lapide in temperato aere, & calor aquae sit quasi calor lactis cum ab uberibus est emulsum. Et quoniam in istis potu sunt clausi & oppilati naturaliter, & nostra in aetio est ut aperiantur, & cum nulla res possit in

ueniri quæ poros deopillet & dilatat & cutem mollicet sicut aqua calida, ideo de balnei utilitate & quo tempore & qualitate ipsius & de solio balnei & quantum morari debeat est dissiendum.

De balneo aqua calida. Cap. XXII.

Oportet autem diu in solio morari & aqua solij sit temperata & solium sit spaciosum, & ostium balnei vicinum, & aqua non sit multum calida, quia cum suo calore nimio cutem indurat, neque multum frigida quia in corporibus debilibus calorem extinguit naturalem & cutem oppilabit. Mora balnei, quia si uidemus rubicunda & inflata corpora fieri & incipiant minui eos à balneo extrahemus, quia si dimittamus eos plusquam oportet, consumuntur. Ideoque si uolumus carnem in corpore augmentare dimittamus in balneo quousque fiant rubicundi, & inflati. Si uero eam minuire uolumus post inflationem dimittamus eos in balneo donec inflatione transeat, & ipsi ad suam naturam fuerint reuersi. Egre dientibus itaque à balneo ungamus eorum corpora cum oleis frigidis & humidis ut custodiatur humiditas quam ab aqua susceperant ne nec illam consumat. Rursus oportet ut in diuersis temporibus balneentur. primum balneum sit marine, priusquam lac aut pusulum accipiant. Secundo ut sperere postquam lac & cibus luti digesti sed si amplius balneentur optimum est si uirtus eorum sit fortis. Bonum est autem si lac super infirmum fuerit emulsum priusquam in solio descendat, & huiusmodi flores & frondes mittantur ut uio la & cæca & similia. Si autem infirmus est ab humonibus mundificatus ad putredinem se preparantibus, demus eis balneum exuentibus lac asinum cum ab ubetibus fuerit emulsus. Hoc enim lachrya passioni optimum est, quia cæteris est subtilius & tardius ad coagulationem. Alina sit iuuenis & sana, lac sit album medio cre inter liquidum, & spissum. Lacte digesto iterum ad balneum mittantur. Quod si in eo delectentur eo quod eis assuetum fuerit, tertio ad balneum dirigantur, sed spaciolum unius alio septem sit horis, postea cenent perdicem, pullos gallinæ, & alas gal. Sed si uidemus eorum corpora multa sectionibus quantitate carere, dabimus lac vaccinum, butyrum tamen ab eo prius sit extractum prima uice duas vnc. & sic ascendendo usque ad decem. Sed quia lac cæteris cibis facilius omnia corporis membra nutrit, erit omnibus tribuabilis ad phthysim maxime mulieris puellam lactantis, post hoc asinum, tertio loco caprinum. Capra uero nutriatur cum hordeo, lactuca, endiua, coriandro frondibus celsi & his similibus. Si solutionem patientur extingantur lapideis uel ter in lacte ut aquositas eius consum-

atur. Quod si uirtus eorum confortata fuerit demus caneros fluuiales coctos in hordeo uel similia uel tri. Palam est ergo quod si hæctica sit simplex & corpus sit absque ulla putredinis materia damus aquam frigidam & cætera in frigidam & humectantia maxime si uirtus imbecillis non fuerit. Si hæctica sit propter aliquod supradictorum, prohibemus aquam frigidam, & cætera in frigidam. unum tamen eis concedimus, quia naturaliter confortat calorem, sit tamen mixtum & album & lenè. Sed quia phthysis est consumptio totius corporis & maxime pulmonis, oportet ut de cæra pulmonis parum dispueamus.

De cura pulmonis ulcerati. Cap. XXIII.

Primo si vulneretur ex cholera & emittat farinam da farinam hordei conditam cum lacte amygdalæ dulcis uel uvis purgatis passis. Aristoteles in libro secretorum aureis literis scripto, dicit quod non solum pulmonis defectionem & siccitatem, uerum, & totius corporis humiditatem possumus restaurare. Hordeum excoctum ponamus super regulam siccam, donec rubere incipiat, deinde laua & pugillum plenum cum gallina crassa pone in magna olla & tamdiu bulliat donec caro separetur ab ossibus, & aquam illi da bibere, & fac etiam syrupum de succo cucurbituræ in pasta inuoluitæ & coctæ cum zuccata.

De phthysij sine febre. Cap. XXIIII.

In phthysij quæ est sine febre damus syrupum factum de zucca, & iringi radices, pecorinam carnem non multum ueterem, uinum non multum uetus. Sedeant in aqua ubi cocta sunt sansucus basilicon yreos frondes citruli, fumigentur de ligno aloes, caueant a coitu, prout octus eis somnus.

De phthysij calida. Cap. XXV.

In phthysij calida si habuerint tu sim & secreant album & viscosum & grossum phlegma, damus apozima de hyssopo, & electuarium, quod. Rese besten. liuiubas. 30. liquiritiz voc. 1. uuaru passaru enuclearu. dr. 3. capil. ve. vn. t. ficus. 10. omnia in .10. lib. aquæ coquantur, donec redeat ad duas, deinde da. vn. 4. ad bibendum cum. vn. 1. 10 dozæ. postea comedant ius frumenti & sennegri. Accipiant ex hoc elect. Rec. maratri radiapij radi. an. vnc. 1. seminis maratri anisana. dra. 3. malue sem. dr. 3. luti semiuuibæ an. dr. 20. ficus siccas septē, uuaru passaru enucleataru. dra. 5. omnia in 6. lib. aquæ coquantur, quousque ad duas redierint, dabis omni die ad bibendum. voc. 3. cum rodo zaccara uol. zuccara an. vnc. 1. Quod si calorem non habeant tempusque fuerit hyema

le cum melle dr. 5. accipiant illud. Troscisci qui ualent ad phthysicos hepaticos cardiacos. Rec. gummi arab. berberis boli sna drag. 4. basilicon arnoglossæ ana. drag. 2. corisandri succi. drag. 2. & sem. insuli in aceto, & ad solem siccati, dragagāti amidi feminis citroli cucu. an. drag. 2. semina mirte dra. 4. seminis malorum citoniorum seminis herbe acetofr. ana. drag. 2. liqui. dra. 3. reub. dra. 2. & sem. karabe genimæ non perforatæ an. drag. 2. Omnia trita con aqua ro. temperentur & troscisci ex eis fiant, dabis ex eis drag. 2. Eleazarium conueniens phthysicis tussim habentibus maxime quibus in pulmone & pectore humores descendunt grossi & uiscoli. Rec. sebesten centom. iuiubas. l. vusrum passiarum enucleatarum dra. 20. capilli ueneris arnoglossæ an. dr. 5. liquir. drag. 2. omnia in 7. lib. aque coquantur tandiu donec redeant ad uelut, deinde. vnc. 4. sapæ adde & zuccari. 4. & omnia coquantur ad spissitudinem mel. deinde adde puluerem istarum rerum. Rec. gummi dragaganti seminis citoniorum. vnc. 8. sem. cucu. drag. 1. amid. dolcis. dr. 8. sem. post. drag. 6. amidi. drag. 7. semi. papaueris al. drag. 5. fac puluerem tempera cum aqua ros.

De febre qua dicitur causon. Cap. XXV.

Diximus in theoria, quia cho. ru. alia naturalis, alia innaturalis. Cho. rub. habitat in felle & virtus eius in hepate. Hæc cum dominatur cor poris generat febrem quæ dicitur causon. i. incēdiū, huius enim materia est ignea acutissima in concuuitibus coadunata uidelicet arteriarum uentrum cordi nicionantium, & maxime nenarū ori stom. & in concuaitate hepatis & pulmonis. Sed quia ut dicit hip. in apho. acutorum morborum non omnino ceteri sunt sanitatia pronuntiationes de signis huius febris placet hoc repetere ut in curia non erremus: Rigor in initio morbi guttæ sanguinis per nares maxime in secūda die, singultus, dolor in aisceribus, hæc omnia signa timorem in causon nūciāt, quis rigor in secūda die timorem in 6. longinquitatem morbi significane, subita sitis & ablatio, omnia ista signa timorem in causon nūciant. Palam ergo est quod ubi sanguis per nares exit non est rigor, & ubi rigor non est sanguinis fluxus per nares in acuta febre. Sed quia pulsus in hac febre aliquando est magnus & uelos, significat apostema in cerebro, aut in diaphragmate esse. Difficiliter inter utraque, quia apostema cerebri sequitur alienationem mentis & rubor oculorum. Apostema diaphragmatis habet angustiam spiritus & pectoris stricūram. Sudor frigid. si in quarta die appareat, aut longitudinem morbi aut mortem in sexta die pronūciāt. Medicus licet sit peritus, tamē sit studiosus ad cognoscenda quatuor tempora morbi. i. principium, augmentum,

statum, & declinationē, & uideat quomodo possit diætare & curare morbos secundum quatuor tempora. Si enim uidemus quod crisis in quarta die ueniat, negetur cibus in his quatuor diebus nisi contrarium ei aliquid accidat sicut puericia ca. complexio infirmi pori rari consuetudo multū comedendi. in his complexionibus non oportet multos cibos prohibere. unde Hipp. In tenuibus dixit peccant ægrotantes. Si ergo crisis sit in quarta die, damus mellicratum si complexio stomachi patiens sit frigida. Si autem ea. syrupū rosatū concedamus eis ut viol. succum malorum gra. & his similia. Quæ si eis non suffecerint ad virtutem regendam, dari conuenit pitissimum colatum, sed tamen non multum, quia natura defesta nequit cum degerere, unde dimitit eū, sitq; causa pereundi infirmum. Nā si infirmus sit rari corporis uel puer, aut sit complexio calida, uel sit confectus multum comedere, accipiat pitissimum colatum primo & secundo die, in tertio & quarto prohibetur. Quod si crisis sit in septima die, damus pitissimum colatum à prima die vsq; ad quintā, in sexta & septima negamus & solos syrupos eis tribuimus. Simili modo facinus in oī stato acuti morbi, licet sit longus aut breuis. Eodem modo in periodicis faciendum est. nec tribuamus cibū in die accessionis, neq; concedamus cibū nisi quiescente febre. Sed quia utriq; morbi molesti sunt & suspecti secundum uerba Hipp. dicentis. Oportet inquiri nō solum seipsum præbere. quæ oportet facientem, obliuioni ne tradamus. Medicus ergo si in initio morbi uident quæ necessaria sit pharmatia uel phlebotomia, festināter eā agat prorsusq; morbus confortatus augmentetur, & natura debilitetur. Si uero fuerit necessitas purgandi inferius fiat purgatio cū oxifenizia prunis iuiub. viol. castasis. māna rodazac. & similib. Si materia leuis & natatilis appareat, & dolorem in capite, & imaginationē ante oculos habeat, prouocanda erit cum vomitu uidelicet cum succo a triplicis & oxizaccara, & modico salis & pitissimæ cū oxizaccara. Quod si febris leuis fuerit & virtus fortis accipiant hoc catarticum quod. Rec. dra. septē myrr. citrinorum mundatorum, hæc. n. non fiant nisi in morbi initio. Quod si impediāt nos aliqua sicut uirtutis debilitas, demus diætā ad digerendum facilem & laudabilem chinum facientē & uirtutē infirmis custodientem sicut pitissimā, & mica panis loia. hæc tamen faciendā sunt in extremitatibus diei & maxime in aurora propter aeris fri. & ca. feb. in illa hora repugnantem. Sed cum hæc febris ab initio vsq; ad statum uenerit, fueritq; acuta & dura, necesse est ut in omnibus eius temporibus subtiliter demus diætā, sic. n. conuenit fieri in omni morbo qui uelocem habet motionē & statum breuem. Grauior autem & tardior si fuerit, ingrossemus diætā in initio uirtutis

tus custodiat, appropinquante quidem statu subtiliamus eam. Bonum est etiam si ca. extinguiamus in illis temporibus uidelicet cum succo maligra. uua hyemali melone palestino & similibus. Quod si stiptice fuerit nature, humefaciamus eum autem statum cum mēna uiola, zoccara solutis in aqua ca. aut in succo cucurbitę allate. quod si fortius uolumus humeficare, damus vnc. ij. caliasit. mundatę. Si autem hæc non sufficiant clystere faciamus humidum quod Rec. spinę egyptiacę maluz hordei mundati. an. unj. furfuris fromenti quantum in utraque manu potest capi, sicla. i. blerę frondes duas cucurbitę agrestis frondes. 10. febestę. 30. iuiubar. 30. o. omnia coquantur in .4. lib. aquę usque ad .3. Deinde colatis in .8. eius uucis mittantur. vnc. 2. olei violari uel vnc. 1. oxizaccarę obfomogate vnc. 1. sal. dra. 2. nitri. dra. 1. & fac clystere. Damus et ad refrigerandum stomachi calorem pilium cum succo maligratu, aut cum succo melonis palestini. Si autem dolorem capitis patiantur humefaciamus nates cum viol. & neuufarino. Similiter cura & plantę pedum fricentur cum plantis manuum puellarum unctis de oleo neuufarino & viol. In temporibus posuimus cataplasma quod. Rec. sandali albi ro. farinę hordei assati. omnia puluerizata cum succo semperuiuę temperentur aut cum aqua ros. aut oleo ros. cum modico aceti mixto rorandum est fronti & temporibus. Cataplasma ponimus super hæpar & sto. quod. Rec. sandalia lbi & ru. ana drag. 3. ro. drag. 3. & sem. corticum cucurbitę. drag. 4. frondium uiridum uiolarum. dra. 3. campho. dra. 1. tempera cum succo semperuiuę. Similiter in pauimento frigide frondes ponantur ut salicis mirtę rosę & similes, & sæpe roremus super eas aquam. Ponimus ante infirmum uasa magnas argillofa & clausissima aqua plena, & mittimus aquam unius in aliud. Cauendum est quoque ne ungatur aut cataplasmetur caput de oleo alijus cataplasmati bus. Quod si uigilias habuerint iungimus in cataplasmate quod super frontem ponimus & temporibus semen papaueris & lactacę. Si autem dolor capitis non cessauerit neque infirmus reuina aut tussim habuerit, fomentemus caput cum aqua calida in qua cocta sint uiola camomilla ro. hordeum mundatum. Quod si adhuc dolor non quieuerit infundimus super caput eorundem lac caprinum aut asininum, postea fomentemus illud, cauendum est tamen ne aliqua istarum fomentationum aut aliquid rem quam superius diximus in statu faciamus, neque cum sentimus caput humido fumo pleuum. hæc autem si fecerimus augmentatur & generatur dolor in capite. Possumus etiam scire utrum fumus sit humidus aut siccus. Si humidus sentiantur dolorem & grauēdiem. Si siccus sentiantur dolorem cum uacuitate capitis & leuitate & inde negamus fo-

mentum lac & unctiões. Hęc enim omnia non definunt in fumos humores dissolui & maxime oleum, quia poros cum sua uiscositate oppilat. Infundimus autem manus & pedes in aqua calida in qua cocta sint uiola. camomilla. Ficamus plantas pedum positas in hac aqua cum oleo viol. fricamus etiam & crura, & ligamus ea à superiori usque inferiori, hoc enim sæpe fiat quia deponit materiam & dissoluit. Bonum est etiam si dolor capitis non cessauerit, ut ligemus fundamen tum testiculorum. Descendente autem materia & dolore capitis quiescente ponimus caput infirmum super fumum aquę superius dictę. Sed si dolor capitis sit cum leuitate & acuitate, scimus illum fumum esse acutum & siccum, unde ponimus in capite oleum ros. & acetum. A cetum. attenuat & aperit, oleum aut refrigerat. Quod si dolor non cessauerit, frigidiora in capite apponamus, sicut succum semperuiuę, & ea quę superius diximus. Cauenda est tamen camphora in cataplasmatibus frontis & temporum, sed in cataplasmatibus stomachi & hæpatis est ponenda. Quod si ardorem & calorem nimium senserint in stomacho & primitus pectus habuerint sanum, & tussi careat, damus syrupum malorum gra. aut de ouiseiticia aut de prunis. Si pectus habuerit infirmum & tussim damus syrupum uiocum pilio. Sed si patiantur siccitatem & asperitatem in lingua, lauamus eam cum pilio & succo cucurbitę allatę hoc modo, inuoluatur in folijs eiusdem, & sub eindre coquatur calidissimo deinde mundetur à cortice & exprimat, compertit in omnibus acutis febribus. Damus etiam si siccim habet magnam syrupum squilliticum cum succo factum. Damus & electuarium piliticum, & huiusmodi. Si autem dietam necesse fuerit ingrossari damus pistauum non colatum & pauem non lotum. Cauent amygdalas, quia ut Ga. dicit, cerebrum petunt, damus quoque pruna mora celsi, omnia tamen sunt concedenda in aurora diei febre mitigante. Quod si patiantur cordis tremorem tribuamus pilium cum succo cumeris & syrupo acetoso pomi citrini & de succo uuarum agrestium. Si tussim habuerint damus eis hoc electuarium. Rec. gummi dragagati seminis citoniorum mondati ana. drag. 2. amidi. drag. 1. & sem. seminis cucumeris. drag. 2. & sem. temperetur cum syrupo viol. si consputatus fuerit. Si solubilis est cum rosato. & fac pilulas in modum fabę & unam sub lingua teneat. Vngimus pectus cum hoc unguento. Rec. dragagati drag. 1. succi maluz & uiolarię quantum sufficit, ponantur in mortario & agita quousque ad mellis spissitudinem redierint, deinde cerę albę drag. 4. olei viol. vnc. 1. liquefac super cinerem & misce omnia & agita quousque ad modum guentii fiant. postquam uero status transierit & febris declinauerit, damus cucurbitam carnes pullorum

pollorum perdicum & huiusmodi. Si autem eris non uenerit ut oportet debet primam retinere diem qua dixauerat ante statum do nec alia crisis ueniat. Oportet autem intelligi quia alienatio quae fit propter apostema diaphragmatis non est continua, sed alienatio quae fit propter apostema cerebri incipit in augmento sui tota modicum continuatim, neque febre cessante & mitigata quiescit ipsa, quia passio est in essentia cerebri. Ideoque status eius insensibilis paruisimam, facies & caput eorum nimium patiuntur dolorem & calorem. oculi lachrymantur, nares aqua distillant & os eorum emitit liquorem. Dicunt quidam quod fumus de ebullitione sanguinis qui ascendit ad caput sit calidus & humidus, quod falsum, quia fumus ad caput ascendens si fuerit humidus eliquabitur in pectoris concavitate descendens & de pectore in diaphragma & ibi apostema generabit quod uera pleuretis nuncupatur, pars uero fumus qui in capite remanet dissoluta per pororum sudore & fumo egreditur. unde dicimus quod fumus qui fit ex ebullitione sanguinis est calidissimus & sicciissimus de genere cho. ru. unde non potest eliquari inferius ad diaphragma, sed in cerebri pelliculis inniscatur & generat ibi apostema quod frenesis dicitur. Aliquando est ex infectione cho. ru. in uentriculis cerebri existens quod peius est & molestius. Palam itaque est quod causa frenesis est de fumo igneo & siccio. Causa uero pleuretis est calidissimus & sanguinolentus, idcirco antiqui febrem frenesim appellauerunt causam, & febrem pleuretis acutam. Quandoque fit frenesis propter colligantiam nervorum quam habet cerebrum cum diaphragmate. Aliquando propter passionem matricis. Quandoque fit propter putredinem quae est de phlegmate. Nonnunquam fit propter adustionem cho. ru. & mutationem eius ad cho. ni. hoc genus frenesis pessimum est & difficile ad curandum. Si autem frenesis fit ex infectione cho. ru. in uentriculis cerebri, sequitur cor dis tremor, stupor, defectio, mutatio faciei a naturali ad non naturalem colorem sicut ad citrinatatem. Quod si sit ex ebullitione sanguinis cordis fit naturalis mutatio faciei ad ruborem. Medicus licet sit perfectus, tamen dicta apud se non negligat, & maxime in hac agitudine, siue enim in diaphragmate siue in cerebro malde sunt rimenda. Sed si queratur quid intersit inter febrem causam & febrem sinocham quae inflata dicitur. Respondemus urina causam est lucen-tissima & rubicundissima, sed urina sinochae sine puridine est sublevis alchima. hanc febrem igitur curemus, scilicet causam sicut superius diximus, frenesis uero curetur sicut in suo loco dicitur fumus. Sed si ex ignorantia medici & inordinatione deiectionis ex materiae malignitate, quae die vel 21. transierit, & septomia, aut uentigo,

aut lethargia sequitur, medicetur sicut infra dicitur fumus. Si syncope & ictericia sequatur, ita curentur.

77.

De syncope & eius cura. Cap. XXVII.

Syncope est cordis defectio & totius nritus in se coadunatio & fumosae emissionis ablatio. Syncope autem huic febri non accidit nisi ex plenitudine, uel inanitione. Si ex plenitudine, aut in stoma. aut in intestinis, aut in toto corpore. Si fuerit in stoma. habet imaginationem ante oculos, dol. in stom. & capite, unde prouocamus uomitum cum oximelle aqua calida & sale & succo crisolocannae, aut prifano cum oxizaccara. Si in superioribus intestinis, sentimus dolorem & punctionem & torsionem si cholericus fuerit materia, cum grauitate & inflatione, si fuerit melancholicus. f. pargetur cum succo lupuli viol. zaccara calidissima. oxifenicia prunis & similibus. Quod si materia fuerit in inferioribus intestinis clystere faciamus humidum quod. Rec. viol. camomillam ordinem maluum, scabstem, iuinbas, oleum vio. zucca, nitrum & similia. Si autem syncope sit propter inanitionem necesse est fieri aut ex nimio uomitu, aut nimio sudore, sanguinis fluxu per nares, uel nimia solutione. Si ex uomitu, damus succum malorum gra. aut eorum sapam, siropum de succo uuarum agrestium, & damus summitatem uigum rosam spodiolum lignum aloes masticem aequo pondere puluerizata cum syrupo superioribus, cataplasma mus stomachum cum sandal. ru. landano ligno aloes camphora, omnibus cum. aqua rosae cum succo mirre temperatis. Quod si sit propter nimium sudorem nungimus corpus cum oleo mirgino salicino ro. & similibus. Si autem sit propter sanguinem de naribus fluentem stringatur sicut in suo loco dicitur fumus, uel pannum infusum in succo myrtis portulacae uuarum agrestium malorum gra. acetosorum capiti imponimus, manus & pedes a genu usque ad inferius ligamus. Quod si fortis febris non fuerit, accipe gallas non persulfatas missas ad ignem & aceto extinguitas, deinde puluerizatas misce ibi modicum camphorae & licinium lineum in euasto infusum & illi pulueri inuolutum naribus iniice. Si uero sit propter solutionem cho. damus psilium affatum & spodiolum cum syrupo citoniorum & aqua frigida. Quod si non habuerint nentrem sanum tribuimus syrupum mirae, damus & prifanam cum oleo uel hordeo affato & amygdalas cum suis corticibus affatas, paucem lotum cum amygdalis affatis. Succum accipiant mespilorum pirorum citoniorum. Utantur hoc electuario quod. Rec. citoniorum purgatorum interius & exterius lib. 2. malorum & pirorum mundatorum an. lib. sem. coquantur cum aqua rosae simplici lib. 2. omnia coquantur

coquantur ad ſpiſſitudinem. Deinde adde puluerem berberis. ꝛnc. 2. da drag. 4. cum ſirupo uuarum agreſtium. Quod ſi egeſtio fuerit quali lotura carnis, ſignificat contentiuam uirtutem in hepate eſſe deſectam. Da hunc puluerem. Rec. berberis ſpodij ana. drag. 2. coriandri infuli in ſucco nuarum agreſtium, aut malorum gra. aſſatorum, drag. 4. gummi, boli ana. drag. 2. ſeminis herbar acetofae. drag. 4. ſc. mirix. drag. 2. & ſem. omnibus puluerizatis da. drag. 3. cum ſyrupo citoniorum & aqua frigida. Sed ſi ad diſſenteriam uel lienteriam uel diarriam deueuerint, curentur ſicut in ſuis locis dicturi ſumus.

De ictericia & eius cura. Cap. XXVIII.

Nomen ictericiz ſumptū eſt à quadā aue aureum colorem habente in monumentia & locis deſertis habitante, & in nullo tempore apparet, niſi in media æſtate, quæ tota die dormit & ſomnum terribilem facit. Omnis ictericia cum febre peſſima eſt niſi cum in die cretica ſit. Illa uero quæ eſt propter paſſionem fellis aut hepatis peſſima eſt, cui ſuccurrimus cum diæta & medicina cho. ru. mundificata ſicut cartatico de prunis oxifanicia ſucco malorum gra. oxizaceara, ptifana & ſimilibus. Cunque febris declinauerit purgetur cum ſucco lupuli uſcutę ſolatri māna uiola zuccara. Quod ſi uomitus ei acciderit damus ſuccum malorum gra. cum ſpodio & oxifenicia cum modico laſtis & aceto malignati ſorbeat meſpila citonia ſorbas & huiusmodi, ea taplaſmata & diæta ſint cōpetentia ſicut in ſeptima prædictæ particula dicturi ſumus.

De febre inflatima & eius cura & de frenſi.

Cap. XXIX.

Peracuta febris de puro calidoq; naſcitur ſanguine intra uafa. i. intra uenas & arterias abſque ulla putrefactione, proinde facies patienti eſt mollis rubicunda & humida quaſi facies balneū egredientis, proprium huiusmodi febris eſt ſemper generare inflatorem, ideoque faciunt ſpiritum anguſtum anhelum & orthomiam. Ideoque hæc febre antiqui uocant inflatiuam, quia cauſa inflatōis ſpiritus eſt calor peſtoris pulſusq; deſectio, huiusmodi febris materia cum aſcendit ad caput, & à capite in diaphragma deſcendit, generat apoſtēma quod dicitur pleuriſis; quandoque eadem materia à capite ad pulmonem deſcendit, quandoq; ad lacertos quibus coſte ſunt induta quod abuſue dicitur pleuriſis. Vera pleuriſis. i. diaphragmatis habet duritiē febris anguſtiam ſpiritus & puſſionem dolorem lateris continuū & tuſim & orthomiam. plurimum enim apoſtēmata ſequuntur frenſiſis & alicatio propter colligantiam neruorum

quam habet diaphragma cum cerebro. Sputum in initio huius morbi eueniens in tertio aut quarto die eſt laudandum præcipue ſi fuerit pauſum lenē iunctum, album, & facile re cū una aut duabus ruſibus exeat, quia ſignificat perfectam ſalutem in die ſeptima eſſe uenturam. Sed omnibus coloribus laudabilior eſt rubeus, quia materia eius eſt ſanguis. Sputum igitur rubeum cum albedine mixtum melius eſt quā citrinum. Si autem citrinum in initio appareat ſputum, demonſtrat uel criſim eſſe futuram in 40. uel 60. diebus. Quod ſi infirmus nil ſcreauerit & ſiccata tem oris habuerit duritiā ſpiritus anhelitum orthomiam ſcēpre incenſam inter mortuos cōputatur. Si autem ſcreauerit ſanem ueq; pront oportet mundificetur ante 40. uel 60. ab illo die quæ apertum fuerat apoſtēma, futura eſt mors aut periplemonia. Non nera pleureſia habet grauitatem lateris abſque tuſi & ſputo. Quod ſi apoſtēma ſit in hepate & ſit calidum cognoscitur per citriniorum uultus infirmi & ſiccę ruſis quia eſt fundanientum ſanguinis. Quod ſi apoſtēma ſit in pulmone, labra ſunt plumbea, ſupini iacent, grauiter ſomno detinentur, oia habent apertum, de quorum ſignis ſatis in theoria diſputauimus. Hec itaq; febris curatur cum minutione ſanguinis de media uena brachij priuſ quam incenſio augmentetur, ſi ſanum peſtus habuerit. Sin autem infirmus de baſilica uena minatur, ubi paſſio eſt, hoc enim factō febris extinguitur, proinde antiqui hæc febre ephimeram uocauerunt, quia multoties in uno die diſſoluitur. unde Galen. dicit in negategni, ſe multos homines ſanaſſe cum minutione ſanguinis nſq; ad deſectionem & ipſeſtigeta tamen uirtute & ætate & huiusmodi. Virtus enim ſi in initio imbecillis ſit, negetur phlebotomia, miſtamen eſt mala quā ſi in ſtatu ſit. q. ſi in initio fiat perditio infirmi lōga erit in 7. die uel 14. in ſtatu uero nūciat perditionem in illo die aut in tertio. Quod ſi ex naribus emanabit ſanguis, & ſi uirtus fuerit bona, quieſcit infirmus maxime ſi fuerit in die cretica. Quod ſi uirtus ſit debilis morbus augmentatur & natura debilitatur, unde periculum oſtenditur maxime ſi nō fuerit in die cretica, Quod ſi propter hoc ſanguinem minuere nō audeamus, extinguiamus acumen ſanguinis cum ſucco malorum gra. pruni oxifanicia. & bona eſt aqua frigida ſi ieiuno dabis, ſed tamen non temere niſi cum ſcimus peſtus & uiſcera & membra principalia eſſe ſana. Sed ſi apoſtēmata tanti fuerint caloris ut frigidi tati aque ualeant repugnare, danus parū aque, prius tamen egeſtione necelle eſt fieri ſi quidā cum rebus acumen ſanguinis extinguentibus. Demus pilulum cum ſucco malorum gra. ſyrupum uio. quæ ſi non profuerint, & ſanguis in ſua permanſerit uſione, demus catarticum de oxifenicia

frœncia & prunis, si tamē pectus habuerit sauum quia acetositas nocet pectori & neruis stomachi. Quod si sanguis non fuerit mollem vltus aut calidus, negemus aquam frigidam, & bume faciamus uentrem cum manna casia silula. an. vnc. i. temperatis cum succo cucurbitę assatę. Si sudorē capitis patientur, medicemur cum oleo, & cataplasmatibus in temporibus ponendis in causā dictis, ligemus erura cum fasciā. Sed quia in hac febre sæpe euenit tarditas anhelitus capiti nullum cataplasma aut fomentum faciamus. Si patientur stuporem mētis & grauitatem oculorum, aut os non possint aperire, nec loqui valeant, non est faciendū aliquod cataplasma vel inunctio capiti, neq; uariis aliquod fomentum appropinquatur, sed manus & pedes in aqua militariu, in qua cocta sint camomilla & viola, fricentur quoq; manus & erura fortiter. & plāte pedum intus in aqua cum oleo & sale fricentur deinde panem lotum cum succo malorum gestant. Quod si iustum excitetur a stupore subito uertat se ad sinistrum uel dextrum, ueter etiam sonet quasi tonitruum, & post uentris solutionem illa inflatio non soluitur, mortem pronūciat. Sed si hæc febris apostema fecerit in diaphragmate, sit spiritus leuior & dolor est fortior. Si in pulmone erit dolor leuior spiritus autem angustior. Quod si materia apostematis fuerit sanguinolenta & dolor ascendit usq; ad furculas, ante omnia cum phlebotomia occurre. deinde cataplasmatibus acumen sanguinis extingueatibus & dissolutiuu uirium habentibus, sicut est furcus maluanifci, succus violarū, hordcum mūdatur omnia cocta & colata. deinde oleum uiol. misce & pannus iufusus loco patienti opponatur, si tempus fuerit frigidum, qd si calidum & febris non est fortis, addimus cataplasmati camomillam. Item si uirtus sit fortis gras, complexio infirma, tēgio, consuetudoq; cōueniant, fiat phlebotomia postquam morbus incipiat augmentari. Si uero uirtus sit debilis, molestissimum est, quod si minuatur, caue ne sit de basilica uena de la tere infirma. Sed quia de uisumodi passionis cura senta prætice particula disposita sumus, ideo ad aliā transcamus. Est & alia pleuresis quę nou est cum febre acuta: est enim de materia phlegmatica uel melancholica, hæc cutetur cum cataplasmatibus. Rec. seminis lini. dra. 4. fenug. dra. 5. radices maluę. dra. 3. bordei mundati. dra. 2. Omnia coquantur & coqueantur. deinde misceatur cum amygdaleon aut irelecon. Spōgia iufusa in illo cataplasmate loco patienti superponatur. Quod si 40. dies transierint & apostema non mundificetur, moritur in periplemonia, unde accipiat hoc apoxima mūdificatiua. Re. cancrorum flumineaorū mundatorū. vn. i. scbesten. 30. i. iulbar. 20. liquitix. dra. 5. ficus. 5. radices marari apig. geminis añi. vnc.

se. seminis maluę. drag. 2. amygdale amarę & dulcis. ana. drag. 5. yfop. drag. 3. capill. ueneris. drag. 5. yreos. drag. 4. seminis lini ass. drag. 3. solij pinearum ana. drag. 2. graua mali granati, medulle seminis bombacis. drag. 3. & se. Omnia coque in 6. lib. aque ad medietatem, quę colata cum. drag. 6. penidiorum poiectur. Pilulę. Rec. succi liqui iug. vnc. i. croci. drag. 1. smidi seminis lini ass. ana. drag. 2. & se. medulle seminis bombacis. drag. 2. tēpera cum lacte asiuę, & fac pilulas in modum ciceris, quarum vnā sub lingua teneat, donec fuerit eliquata, deinde aliam accipiant. Cataplasma valens contra pleuresim quę est ex febre acuta. Re. maluę poliius hordei ana. drag. 5. uiol. faudali al. ana. drag. 2. seminis portulacę. drag. 10. omnibus pulverizatis accipe cerę albę. drag. 5. olei ro. drag. 15. qua liquefacta pulueres misceantur, dixta sit succus orizę zuccara uel sicc.

De putridis febribus & eorum curis. Cap. XXX.

Quia de curis acutarum febriu ex pura cholera & ex puro sanguine nascentium disputauimus, consequens est ut de curis febrium esputredine nascentium tractatus habeatur, & prius de causa putredinem generante, ut in curis non erremus. Vnde dicimus qd maior causa putredinem generans est contusio corporis & oppilatio pororum, ut in eis fumorum conclusio. Cōstipationis pororum causa est bifariam. Vnde exterioribus, sicut balneum stipticę aque ut sulphurę, nitreę, aluminosę. Secunda est de interioribus quorum causa est quinaris. Prima causatius est coadunatio grossorum humorum & uiscosorum in interioribus corporis ex uimia reque, quia nimia requies corpora refrigerat. Secunda est ablatio exercitij ante cibum. Tertia est exercitium post cibum. Quarta est assiduitas ciborum grossorum & uiscosorum & multar quantitatē, & non secundum ordinem acceptorum, neq; cum stomachus est inanis. Quarta est balneum post cibum antequam cibis digeratur. hæc omnia poros claudunt & constipant, unde sanguis & alij humores in interioribus corporis clausi putrescunt. De his enim in theoria in tractatu accidentium & causarum sufficenter disputauimus.

De sincho ex putredine sanguinis.

Cap. XXXI.

Sanguis cum putrefit in toto corpore facit febrem linocham, quam curare debemus cū phlebotomia, & hoc ante statum, nisi aliquid nobis obuiauerit sicut debilitas uirtutis & huiusmodi, quam doctrinam satis aptam ostendimus in tractatu de sincho sine putredine. Quod si debilitas

bilis uirtutis nobis obuiuerit, aut aliquid aliud ad minuendum sanguinem, extinguamus acumen sanguinis cum succo mal. gra. oxifenicia & similibus. Demus ptisanum euni amygdaleon & zucca. Quia hæc febris licet sit acuta, putredo tamen sua oppilationem generat, unde nisi attenuatiua dissolutiua & refrigeratiua dederimus, putredo augetur & morbus necessario augmentatur & confortatur. Si autem materia sanguinis fuerit acutissima, demus refrigerantia sicut psilium succus mal. gra. oxifenicia syrupus de prunis & uiol. casiafist. manna & his similia hæc enim acutum sanguinem extinguunt. dā dū est ptisanum colatum & panis lotus. Quod si sanguis fuerit mediocriter dandæ sunt iuiubæ in uice oxifeniciae, & psianum, & panis lotus. Si autem sanguis grossus & phlegmaticus fuerit, demus succum lupuli & succum endiuicæ cum manna casiafist. & similibus. Si dolorem capitis patientur humectemus nares cum oleo viola. neque farina. temporibus imponamus oleum rosa. cum aceto. pedes in aqua calida imponamus, in qua cocta sint camomilla & uiol. Si uigilias patientur fronti roremus aquā ubi cocta sint cortices papauicis semen lactuicæ uiol. & similia. Si uero habuerint angustiam spiritus infundendū est caput hac aqua. Quod si senserint in uentre acumen aut punctiōem accipiant succum cucumeris & mal. gra. Damus etiam succum melonis palestini eiusq; carnem. Dolore capitis non cessante fundamus in eo lac mulieris cum oleo uiolati mixtum. Pedes eorum & crura mittantur in aquam in qua cocta sint camomilla viola, ligentur eorum crura, quia trahit materiam ad superioribus ad inferiora. Si habuerint stuporem mentis neq; oculos aperire nauerint, calefiant eorum capita cum aqua in qua cocta sint camomilla centaurea melilotum viola & similia. Si uirtus fuerit defecta & calor fortis cum uiola & camomilla solummodo fiat calefactio. Fiant iuxta infirmum sonitus delectabiles de muscorum generibus ut anima delectetur & confortetur. Quod si patiens ad stuporem mentis surgens uertit se ad dextram siue ad sinistram, & hoc cum magna angustia, pessimum est signum & mortis nunciatiuum. Quod si habuerint inflationem quasi tympanum habentem post uentris solutionem inflationem non cessauerit, sit certius & uelocius signum mortis, maxime si in corpore nescit uidetur liuidæ aut nigrae & principalibus membris uicinis, Si istis accidentibus careant & patientur fluxum sang. de naribus & uirtus fuerit bona febrilisq; mitigetur & morbus extiterit in declinatione cephalicam uenam incidimus. Quod si sanguinis fluxus fuerit nimius, stringatur sicut in causone diximus. Si autem patientur cordis tremorem, ponamus super stomachū sandalos & farinam hordei maluum camphora

cinerem fornacis fabrorum omnia tempera cum succo protulacæ semperuiuæ citruli arnoglossæ & aceto. In eorū mansione sternantur frondes & flores frigidi, & uasa ponatur aqua plena, sicut in causone diximus. Quod si hæc febris fuerit propter apostemata ut berisipillas, accipiant succū solatri. nel cucumeris coctum & dispartatum cum casiafist. manna uiol. zucca. ponantur super apostemata sandali ro. maluz memthæ solatri coriandrum. Si calor non fuerit fortis aliquid de croco miscemus. Quod si apostema fuerit de actione naturæ secundum crism ponimus dissolutiua, sicut memthæ maluum camomillam, crocum solatri & similia. Si autem hæc febris fuerit propter uariolas & defudationes, quod potest cognosci ex signis in theoria dictis, nigeretur oculi cum oleo oliuæ aut succo mali grana. acetosi, & mond. facietur eorum putredo, deinde lauenter cum aqua ro. & somac. & caridimo & camphora cum succo coriandri temperata. Ad iunetur etiam natura ad expellendas uariolas in exterioribus cum hoc apozimate. Rec. lacce drag. 3. lentis mundatæ. drag. 7. dragan. drag. 4. omnia coque in tribus lib. aquæ usq; ad tertiam & da potui guttatim. Et quia in hac febre solutio uenit sponte canendum est ne artificialiter fiat. Quod si tempus hyemale & frigidum fuerit, facimus focum in hospitio infirmorum de lignis iunium & thamarisfei. Quod si uariolæ deficiuntur necesse est infirmum balneari, lauatur cum farina hordei rizi milij & similibus.

De tertiana febre & eius cura. Cap. XXXII.

Febri tertiana molestior est ceteris putridis propter acumen materię eius, & quia causon est uicinis, unde oportet medicum in hac febre sibi cauere ab initio ut non det infirmo rem calidam facientem ne materia calefacta cum sui acumine ad caput saliat & frenesim generet. Bonum est etiam si uirtus infirmi sit fortis & materia furiosa ut demus catarticum cho. ro. purgans eiusq; acumen extinguens, sicut est oxifen. pruna mirrob. citrini casiafist. manna & similia. Si autem necesse est egestionem eorum hominieri, aliquā tulum diagridij oportet admisceri. Cave tamē in die accessionis ne catarticum detur, sed aut in secunda aut in quarta die. de cibo dea, sufficit autem in die accessionis psilium cum succo malorum gra. uel aliquis syrupus conueniens. sed hæc non sunt danda nisi cum calor fuerit nimius & fortis, & sitis nimia, quia psilium aliquando coagular & induratur materiam unde sufficit solus syrupus. Si autem accessio fuerit post prandium, sufficit syrupum dare in mane. Febre autem tractata ptisanum detur, & uespere panis luteus cum zucca. Quod si accessio in medio die inceperit, nihil sumat nisi febris cessauerit, pretereunte quidem

quidem febre panem cum zaccar. hocum accipiat. Si autem febris in vespere, aut in prima hora noctis inceptis, mane sumat pisanū & cū febris cessauerit panē lotū. Sed cauere oportet ne in hora accessione aliquid ei tribuatur, neque tribus horis ante accessione, quia si tunc aliquid acceperit stomachus euomit illud. Stomachus in mouetur in tempore accessione ad expellendam putridam materiam in eo contentam, unde si tunc aliquid datum fuerit, calor febris augmentatum erit & materiam ingrossabit. Est enim febris quasi oleum in lampade ardenti. Si autem dolorem capitis patiatur, aut scititas capiti augmentetur & infirmus alienationem patitur facunctionem & cataplasma in temporibus cum oleo & lacte sicut diximus in alijs aortis. Oportet nos etiam mitigare incensionē stomachi cū syrupo malorum gra. aut succo eorū & spodio.

De quotidiana febre & eius cura. Ca. XXXIII.

Amphimerina. i. quotidiana, quia nascitur de phlegmatica materia & quia phlegma naturaliter friet. Est ha. necesse est ut hæc febris curetur cum rebus hu. attenuantibus & dissoluentibus. Sed quia phlegma aliud naturale, aliud acetosum, aliud salsum, aliud vitreū, aliud dulce. Acetosum frigidius ceteris. salsum calidius. Similiter & attenuatiua sunt diuersa, quia quedam cū nimio calore & incensione sunt attenuatiua sicut radices origani calamitæ xinxin. & similia. Sunt & quedam quæ extenuant absq; calore & fri. quemadmodum maritum apii lupulus & similia. Sunt & quedam quæ attenuet acumen cal. extinguentia sicut pisanū oxizac. & his similia. Si igitur hæc febris ex frigidityte & grosso phlegmate sit, medicetur cum re attenuatiua calefactiua & dissolutiua. Si phlegma fuerit calidius & lenius, curetur cum re extenuatiua & refrigeratiua. Febre mitigari incipiente curetur cum re attenuatiua & non calefactiua, aut si quantulum caliditatis attineat. Bonū est etī ut medicina sit mediocris. i. attenuans sine calore, & cum modico calore, & hoc fiat ab initio usquequo materia sit digesta. Cumq; signum coctionis in urina. aliusue locis apparuerit, festinandum est ad expellendam materiam. Si autem phlegma fuerit salsum, datus catarticus de mirob. citrinis. Kebab. absinth. bedegare succaha cuncta eupatorio caliasist. muna, & cum pill. de hierap. & similibus. Quod si acetosum fuerit phlegma purgatum cum pilulis stomachicis, sed tamen non omnino. sed paulo post purgetur materia. quia si omnino purgetur conuertitur potio ad substantialem corporis humiditatem & natura iterum repugnat ei ex quorum certamine perit infirmus. Eo modo est faciendum in omni passione de graui materia & dura ad dissoluedum. Salsa materia cognoscitur ab acetosa his signis, quia si fuerit acetosa parua

erit sitis, gtauitas in uentre & stomacho, uentre habent cōstipatum. Si fuerit falsa sit sitis nimia, uenter solutus, puuctio in stomacho, & dolor habent os siccum & salsum cum nimia siti, frigiditas sit minor, calor fortior & accessio breuior propter leuitatem & acumen materiæ ecōtraria sunt signa, si fuerit acetosa. Quod si uirtus infirmari ut extenuetur materia absq; ullo labore natura, ver. gr. si materia fuerit in hepate donetur medicina hepatis mūdificatiua cū vrina, scilicet trocisci de rosīs, berberis & oximelle cū succo herbarū, si materia fuerit acetosa, quia si falsa sit donetur trocisci de spodio cum oxizac. Sed si materia fuerit aggrauata erga stomachum mundiū cetur stomachus cum lupulo melle rosato, si fuerit acetosa, si falsa cum rodoraccara. in 1177 q.

De particulari cura febris. Cap. XXXIII.

Diximus de uniuersali cura, nōne dicendum est de particulari, nōne dicimus quod si materia fuerit falsa ab initio morbi, demus oxizaccaram cū aqua calida ueniente quidem accessione & frigore incipiente ponantur pedes patiens in aqua calidā qua cocta sint camomilla uiola anemum, fricentur plantæ pedum cū oleo uiol. & sale. Quod si uomitus sponte uenerit bonum est signum, si autem non, cogatur in initio morbi, quia magnum infert stomacho noxamentum, proinde non debemus facere curam stomacho laxationem inferentem, sed dare conuenit rodoraccaram cum calida. Aqua enim calida in hac febre est ebullio & putrefactio materiæ, unde cum fuerit extenuata propter aquam calidam sitis extinguitur. Deinde demus pisanum cum oxizaccara. Si autem febris septimam diem transierit & materia digeri inceptis, demus in initio accessione oxizaccaram cum apozimate aneti, & prouocabimus uomitum sine angustia. Quod si uenter fuerit cōstipatus clystere facies de uiol. camomilla spinis egyptiacis ana. vnc. i. seminis croci hortensis. dra. 20. furfuris bleitę centaureę maioris sebesten omnia coque in 4. lib. aque donec ad unam redeant. Quibus colatis adde olei uiol. zucc. obfomogari ana. vnc. i. falsis communis uitri ana. drag. 2. Si autem febris 14. diem transierit & patiens sentit fumum calidū de corpore exeuntem, aut patitur abominationē naturæ aut uentris rugitum, significat quod materia est commota, & uult exire per sudorem si fumofitas sentitur, cū uomitu si abominationē. habet cū egestiōe si rugitū passus fuerit. Expellatur ergo materia cū hoc catartico. Rec. myrob. Kebab. citrini ana. vn. t. bedagar. dra. 7. succaha absinth. eupatorii ana. dra. 3. uuarum passarū euocleaturum. vn. t. iuiubas. 20. pruna. 20. oia in tribus liaque coquantur ad medietatē, deinde misce rodoracc. ana. vn. i. adde & colatis oibus potui dabis. Quod si

Y materia

materia fuerit acetosa in initio morbi dabis mel licratum, aut osimel cum calida, multum enim prodest. Cautus autem friquia materiam ingrossat & congelat, accipiant pistanum coctum cum radice maratri, aneti, calamenti, & modico pipenis. Cūq; frigus accesserit ponantur pedes in aqua calida in qua cocta sint camomilla anetum sanfucus abrotanum & similia. Quod si frigus sit quasi glacies epithima facinus dorso & ventri cum oleo in quo cocta sunt piperum staphisagria nitrum & calamentum, damus etiam oximel cum calida. Si uomitus non sponte uenerit, prouocemus cum oximelle de radicibus aucto & apuzimate feteleorum sale communis, quæ omnia ca. accipiantur. Damus has confectiões. Rec. ciperi, spic. mastic. an. drag. 3. fac puluerem da. drag. 1. Rec. gallie ligni aloes an. an. drag. 3. fac puluerem da. drag. 1. cum odorifero uino. Si patientur gravitate capitis, inclinetur caput super fumum aque calidæ in qua cocta sint camomilla mellilorum & sanfucus. Cautantab omni infusione lactis uel aliarum rerū ut olei in omni parte corporis. Dixta sint iura cicoris bile, parum comedant. Si febrem accipiant ad mediam diem mane accipiant pistanū. Incipiente uero frigore oximel cum calida fumant. Si mane febris accesserit nihil accipiant quousque febris cessauerit. Vniuersaliter dicimus q; inter cibum & accessiōem. 6. horarum sit spatium. Quod si uirtus patientis defecerit in accipiēda pharmacia, da eirem suauiter ex tēnuatiuam & mundificatiuam, uerbi gratia. Si materia fuerit hepatis uicina dabis rem hepatis mundificantem. Quod si fuerit in stomacho dabis apozima de absinthio de alue de hierapi. & similia. quemadmodum uideris materiam esse grossam aut subtilem. Bona autem sunt cataplasmata, aut epithimata calefactiua & dissolutiua in stomacho & hepate, sed tamen post mundificationem cum certissime nouerimus materiam esse dissolutiua & liquefactiua, apparet si gno coctionis in urina dabis inuicem oximel rodozacca. & medicinam cum sirupis miscemus. Et quia huius febris proprietates est dolor stomachi, oportet stomachum confortare cum cataplasmatibus quæ sunt facta de masticæ spica, absinthio, cinamo. & his similibus. Quod si stomachus defecerit ut careat appetitu, confortabimus eum cum oleo nardiuo & absinthio. Si diutius splenis habuerit, curetur eum medicina splenicorum. Si patiat in stomacho frigiditatem & acerositatem, mundifica stomachum cum his pilulis cum de corruptis humoribus inanentibus. Rec. Kibul. dr. 3. hierapi. dr. 2. & sem. tur bith. drag. 3. garici. dr. 1. & sem. succi eupatorii succi absinthij ante dra. 3. fac puluerē & cū aqua calida tempera & pilulas, fac. Quod si uis eas fortiores fieri adde modicum scamoneæ. Quod

si minus in hac febre rigor fuerit epithima super dorsum. frigore ascendente imponatur cū oleo ubi cocta sunt piperum staphisagria piper calamentum. illud similiter. Rec. masculi thuris piperi æquale pondus, fac puluerem tempera cū oleo ex quo ungas dorsum.

De hemitriteo & eius cura. Cap. XXXV.

Hemitriteus quia de materia cho. & phlegmatica est commixta, necesse est ut sit curamentum eius medicinæ inter rem calefactiua & refrigeratiua. Et quia omnis commixtio aut est in potetia, aut in actu, aut nna est fortior altera, oportet utranq; huius hemitritei materiam aut esse æqualem aut inæqualem. Si autem equalis sit, sit uerus hemitriteus, cuius curatio est cum rebus attenuantibus & dissoluentibus nullam caliditatem aut frigiditatem facientibus, sicut cum succo lupuli apij manna uiol. zucca. rodozaccara pistana cum oximelle. Quod si cho. fuerit maior, sit facilior & leuior quam curari decet cum rebus mundificantibus & modicum refrigerantibus sicut cum endiua succo maratri rodozaccara uiolis zucca. manna prunis. Si autem phlegma uideatur dominari sit hemitriteus multior, qui medicetur cum mundificatiuis & dissolutiuis & aliquantulum ex phlegmate plus calefactiuis quemadmodum mellicrato cum aqua calida syrupo de absinthio pistano in quo cocta sint radices apij & maratri, anetum calamentum osimel accipiant & troiscos de rosis de berberis omnia cum succo maratri & oximelle. Sumat mel ro. cū masticæ maratro aniso & aqua ca. Si uideris materiam attenuari & moueri & signum coctionis in urina apparuerit, dabis pharmaciam suauiter solutionem facientem. Etiam bonum est si post cibum uomitus prouocetur & diuretica tribuantur, sicut sunt troisci de absinthio de lacca cum succo maratri apij & endiua. Pilule ualentes. Rec. hierapi. calamenti ana. drag. 5. anisi, maratri, apij, succi absinthij succi eupatorii ana. drag. 4. tempera cum succo sumitetræ, & fac pilulas, dabis putui drag. 3. cum aqua calida.

De febre quartana & eius cura. Cap. XXXVI.

Quartana febris quia fit de materia grossa & dura oportet medicum præuidere quatuor res. Prima quæritur est quod in initio non debet dare remissionem calefactiua, ne calefacta materia dum generentur febres, nna uidelicet interpolata & diuturna, & alia acuta continua, quibus uirtus patientis deficiat, & infirmus ad periculum deueniat. Natura enim non est tantæ uigutis ut possit morbi acumen eiusque prolixitatem tolerare. Secunda ne det refrigeratiua

frigeratua, ne congelat materiam, unde indore
 iur & moretur ad digerendum & dissolucundum
 fiatq; causa proluxi morbi & eius pestimitatis.
 Tertia ne conformet & debilem corpus faciat cū
 subtilitate digge & abstinentia qnq; causa faciat
 mutari patientē ad hēticam uel phrysim. Quar
 ta ne confundat corpus cum pharmacia maxi
 me in initio morbi priusquam materia morbi
 eliquatur & si obediens actio nī naturę. Tribuat
 ergo medicus rem maturantem & digerentem
 & cito eicientem, & ingenet purgare mate
 riam acutam modicum leni uomitu. studeat &
 in regimine, & in confortatione hepatis & sple
 nis ne deficiat, quia hęc generat sanguinem,
 splen mundificat eum. Quod si defecerit eumq;
 non purgauerit, permaet commixtus cum aliis
 humoribus putridis unde putrefit ipse & incen
 ditur. Splen vero qui trahit fecē sanguinis &
 turbiditatem si defecerit permanet: sed in san
 guine & corrumpitur vnde idem sanguis cor
 umpsit putrefit & incenditur. hac de causa
 utilissima huius febris est curatio vt donetur o
 ximel cum apozinate radicū & herbarum &
 syrupus abstinētijs: scilicet de eupatorio de scolo
 pendria, aut de zeubarbaro. Oportet ne huius
 modi troisci in initio dentur, ne deficiat &
 inducent materiam ad obediendum naturę. sed
 conuenit dari postquam materia fuerit matura
 ta. Abstineant a pullis gallina starnis per dū
 bus per tres hebdomadas in initio febris. Vo
 lauofum est febris quasi ut oleum in lucerna.
 Quod si materia non fuerit maturata per illas
 tres hebdomadas abstineant usque ad 40. dies.
 si tūto patientia hęc pati ualeat. Quod si hęc
 febris fuerit de additione sanguinis, da in in
 itio rem dissoluentem & attenuantem; tamen
 non calefacientem sicut pitfana cum oxizacca
 ra, rodozacca, viol. & zaccā. cum aqua cali. Vo
 mitum prouocabis in initio accessionis cum fri
 gida incipit. Infundantur etiā pedes in aqua
 cali. vbi cocta sint camomilla & viola. Acci
 pian succum malorum gran. & uas hyemales.
 Quod si materia incipit digeri festinantes ex
 trahē sanguinem de basilica uena sinistri brachij
 aut de mediana, & minue quousque clarum &
 purum sanguinem egredi videas uirtute hoc pa
 tientē. Prouocat egestionem si necesse est cum
 hoc catartico. Rec. mirabolanos citrinos Ke
 blos iulubas pruna uas passas enucleatas fe
 men somittere calasifin. mannam rodozacca
 ram radices marari apij & endiuiz. Quod si fe
 bris elongabitur, ut. 20. transeat dies inuenit in
 firmus per oēm diem accessionis, & in alio die
 non multum comedit, quia sanguis propter ab
 stinētiā extenuatur. Vtator diēta subtili quę
 facillime digeratur. Quod si quartana de inces
 sione choletę fuerit, dabis in initio tā refrigeran
 tē, quā materia propter calorem ingrossata nō at

tematur nisi cū frigidia, proinde in initio da
 bis succum malorum gra. cum oxizaccata & pu
 sano. Quod si conspata fuerit egellio homēiat
 cū manna rodozacca prunis succo endiuiz ca
 lasifin. Quod si nondum per hęc fuerit humefa
 ctā, cane ne dona cataricum priusquam mate
 ria digeratur, sed fac clystere. Quod si materia
 incipit digeri & de loco in locum moueri, purge
 tur cum catartico de micro. citrinis Kebalos qui
 fenicia, prunis, eupatitio, viola, calasifin. māna,
 rodozacca, abstinthio, eu seute, semine sumittere
 & radicibus endiuiz. Quod si materia fuerit in
 tra uasa purgabatur uel ter cum catartico. Bo
 non est etiam si phlebotometur de basilica ue
 na sinistri brachij, cauendum tamen est ne fiat
 anto quā materia digeri incipiat. In fine autē
 tem morbi laueatur in aqua calida in qua cocta
 sint mellilotum camomilla abstinthium. Quod
 si dolorem capitis patiatur humefiant nates eo
 rum cum oleo niol. Si uigilias habuerint, lauen
 tur pedes eorum & crura cum aqua in qua co
 ctā sint papauer lactuce viol. & his similia. Quod
 si incensua fuerit materia phlegmatica, dabis
 in initio mel ro. & violatum cum calida: appa
 rente coctionis signo de secco marari & apij cū
 semine croci hortensis & succo lupuli. Si ego
 stionem nis humefacere fac clystere de ficibus
 siccia spinis egyptiacis camomilla semine cro
 ci hortensis si fameleon obomogaro zacca. ni
 tro sale comuni colouintida & his simili
 bus. Nutriantur de iure cicieria & laquicia. Quod
 si febris. 40. dies transierit accipiat carnem, sed
 tamen caneant uiscosam carnem & noctuosam
 ac multum pinguedinis habentem, abstineant in
 die accessiois a cibo, in die tranquillā consu
 tum accipiant cibum, sed tamen non multum.
 cancantigitur a frigida & humidis. Da etiam
 gallinam hoc modo preparatam. Rec. folio
 rum petroselin. drag. 7. qui crudi totam substan
 tiam unius cecepto cortice, sanguinis porci maf
 culi lib. sem. salia quantum sufficit. Omnia teran
 tur & in corpore gallinarum annuū quō ha
 bentia mittantur & fumatur, deinde inuoluitur
 in pasta & optime sub testa coquantur. Cōpeit
 enim tertianarijs quotidianarijs & quartanarijs
 urinam prouocat febrem auferi, uirentem con
 fortat. Similiter potest fieri de folijs basilici .ij.
 ozimi, quia appetum irritant, cor & stomachū
 confortant. Cane tamē ne totam una uice comē
 dant, sed paulatim & spū modo plenum & car
 nem, de pasta moimo; exporem est. hac ta
 men accipienda sunt in die tranquilla. Potē
 subtilē uinum in calore temperatum. de quibus
 comedant eas quę teneras habent carnes & fa
 cile digeruntur, uomitus prouocetur, & post
 cibum sumant diaciminū diatrion piperon.
 Statu morbi accedentem & coctionis signo in
 urinā apparente subtiliter diēta, purgetur cum

pharmacis, clysteribus. dabis deinde diuretica, & nomium omni die accessiones stomacho inanico prouocabis, & in die qua non ueniet accessio prouocetur uomitus post quam comedint, abstineant a pullis & omnibus uolatilibus per tres hebdomadas & plus donec materia fuerit digesta. deinde si uirtus permiserit, dabis annualem agnum. Quod si febris non fuerit fortis, neque uirtus defecta da helleborum album cum pitana, & prouoca uomitum cum succo radicis aneti, & oximelle, assuefaciat chyriacam magnā, diatriopipereō, dia sulphur & similia. Trocisci ualentes contra dolorem hepatis & splenis & febrem quartanam. Rec. lacte reub. marari anisi ana dr. 4. eupat. o. ablinthij succi amborum spodij. an. dra. 3. cōscuię dr. 6. scolopendrix. dra. 6. seminis portulacę spicę anisi apij feminis an. dra. 3. tempera cum succo maratri. Rec. maratri. drag. 3. croci piperis albi mundi an. dra. 4. femali gran. capparis radieem an. dra. 4. tempera cum succo apij. Antidotum contra quartanam quę fit de incontinentia plegmatis. Rec. myrrhę. drag. 7. spicę. drag. 3. amomi. dr. 4. aristolo. rotun. reub. an. dr. 6. opij. dr. 4. anisi apij, sem. petroseli. an. dr. 1. castorei dr. 5. liquanet piperis al. casulii. an. dr. 4. piperis nigri. dr. 7. ameos dr. 1. storacis. drag. 6. croci. 10. mellilo ti drag. 8. liseleos drag. 4. ydiocri. drag. 5. mellis quod sufficit, dabis. drag. 1. & sem. cum calida. Trocisci ydiocri. Rec. storum herbę polieariz albe & cinnę mirrhę an. dr. 2. dauci calami aromatici ciperi xilobalastari ligni aloes an. dra. 4. rubę colti spicę croci amastici an. drag. 5. tempera cum odorifero uino & fac trociscos. Pillule uulsiuiz. Rec. hierępi. epithi. an. drag. 5. agari ci dr. 4. iurbi. drag. 6. ablinthij drag. 3. sulphuris albi ameos an. drag. 4. polipodij. drag. 3. maratri anisi apij an. dr. 1. & sem. tempera cum succo mēthę & fac pilulas, quarum duz dōnentur in die tranquilla.

De epialos & eius cura. Cap. XXXVII.

Epialos quia de uitreo nascitur phlegmate, necesse est ut curetur sicut amphimerina, sed tamē phlegma quod est in epialos quia est frigidum, oportet medicinam fieri calidiorē secundum quod materia est frigida. Sed decet ab initio incipi a medicinis quę debilitur sunt calefacientes donec eas assueat, deinde paulatim ad calidiores ascendi. Plurimum nostra intentio est in hac febre ut mundificetur stomachus cum repugnatiua & colatiua. purgetur etiam materia per uomitum, & nimiam cum oximelle & aqua calida in qua cocta sint spica anisum & similia. Quod si materia inceperit se mouere, & signum coctiois in uetina apparuerit, purgetur materia cum apozimate de aloę, & apozimate de hierapi. &

pillule de stomari, & pillule de fetida. Clystere fiat eis in quo inirabit semen croci bouensis cętaurea anetum abrotanum herba poliearia ameos bdellium serapionem coloquintida & his similia. post purgationem materię assuecant antidorum ubi alliarum & castoreum ponantur, & pillule in quibus eupatorium mastis abbinthium aristo. ro. & longa spica crocus & similia inirāz. Digram accipiant quę sit lauatina & diuretica si cut est ius cicetis cū obfomogaro ciminio amigbluis radice sparag porris omnibus conditis. Potent oximel squilliticum cum aqua calida. Accipiant post cibum diaciminnm diatriopiperecon diacalamentum & similia.

De lipario & eius cura. Cap. XXXVIII.

Liparios autem quia materia eius cholera est cum phlegmate mixta, dari oportet minus calida quim in epialos sicut mel ros. oxizaccara apozima de aloę de hierapigra oxizaccara cum succo maratri apij mastice & similibus.

De febre qua alios morbos sequitur. Cap. XXXIX.

Aliquando est febris propter hepatis dolorem aut splenis cerebri lateris pulmonis renum aut similium, & cessante morbo qui est causa febris cessat & ipsa, unde huiusmodi febris uilis curatio est ut certissime causam eius curemus. si sanemus nēdum unus occasione est febris generata, sed prius oportet intelligi quia hęc febris quę alios sequitur morbos, aliquando est debilis, aliquando est fortis. Debilis sicut ea quę fit propter splenem, aut renes, aut propter uesicę. Aut est fortis & molesta sicut ea quę fit propter cerebrum hepatis & laus, & nonnunquam est debilis sicut & aliquando fortis sicut ea quę fit propter pulmonem, dolor enim pulmonis si fuerit propter sanguinem aut cho. fit eius febris molesta. Quod si dolor fuerit propter phlegma & cho. nig. febris erit lenis. Molestatio autem febris quę fit propter hepatis est propter materiā quę est sanguis, leuitas autem eius quę fit propter splenem est propter chole. nig. quę est eius materia; Molestatio autem febris quę fit causa cerebri est propter neruos & sensum acumen. Lateris autem molestatio fit propter sanguinē qui est eius materia propter uicinitatem cordis.

De dispositione interpolatarum febrium. Cap. XXXX.

Omnis complexio quę est extra naturā & temperamētum est quadruplex. Prima calida & humida. Secunda cal. & sicca. Tertia frig. & humida. Quarta frig. & sicca. Quarum nulla pure diu potest durare.

nerare potest, nisi calida & humida. Hic queritur quomodo eho. ru. & nig. suscipiunt putrefactionem cum eorum natura non sit parata ad putredinem suscipiendam. Solutio: Siccatas tribus modis fit, aut enim est res sicca in natura & substantia eius liquida sicut mel uinum chole. nigr. aqua salia & similia. Quædam in natura humida & in substantia sicca, sicut piper longum crocus zinzib. & similia. Sunt & alia in natura & substantia sicca sicut ferum lapis & similia. Quæcumque autem in substantia sunt sicca & in natura humida, recipiunt putrefactionem. Quæ autem in natura & substantia sicca sunt, nonquam recipiunt putrefactionem. Palam itaque est quod cholera nigra & rub. non recipiunt putredinem propter earum complexionem & naturam, sed propter substantialem humiditatem illarum atque liquoris. Sanguis enim qui cum utraque qualitate conuenit putrefactiui, extraneo obedit calori unde fit febris continua. Cholera rubra quia cum una qualitate conuenit putredini. i. cum caliditate, & cum alia. i. siccitate non obedit extraneo calori, unde habet 12. horas in labore & in requie. 36. Quod si eius accessio, t. 3. horas transierit, & 7. periodos quæ sunt. 14. dies, dicitur notha. i. non uera. Febris quartana, quia cum duabus qualitatibus non conuenit putredini, durat. 24. horis & quiescit. 48. Quotidiana febris quia cum una qualitate. i. humiditate conuenit putredini, habet, 18. horas in labore & sex in quiete. Hic queritur quare terminus sit in quartana. 24. horis & non plus aut minus. Respondemus quod omne quod constituitur sub lunari circulo fit propter repugnantiam. 4. elementorum adinuicem oppositorum. Destructio enim nihil aliud est nisi conuersio unius rei ad aliam, uerbi gratia. Elementa mutantur in cibum cibis in membra. Corpus cuius destruitur humores ad aquam spiritus ad aerem, ossa ad terram conuertuntur. Hæc. 9. actio elementorum adinuicem facta non est nisi propter motum solis & lune & omnium stellarum motum habentium, & sol est causa cæterarum & earum dominatur, & cursus eius a loco procedens quo oriatur & rediens usque ad eundem, non est nisi. 24. horis, proinde fit ultimitas accessionis quartanæ. 24. horis. Rursus si fuerimus inter rogati quare calor extraneus in quartana. 18. horis moritur ad unam qualitatem. i. siccitatem & 24. permaneat. Respondemus siccitas corporis duobus modis fit, aut cum calore, aut cum frigore. Calor desiccatur corpus, quia illud rarificat & humores desiccatur. frigiditas autem non sic, quia materiam coadunat & congelat ad quam extra uero calore accedente materia congelata aperitur & fit perflua & obediens putredini. Siccatas uero quæ fit propter calorem, quia non in ea hum. sunt clausi uel coagulati necessario calor extraneus tardatur in eo quod liquefacit. Inter-

polatio nil aliud est quam qualitas materiam impediens cum sua duricia. Quod si prædicti humores intra uasa putrescant, faciunt febres continuas siue interpolatione, quia sunt cum sanguine in uasa, neque patiuntur rigorem ut in tertiana, neque frigidem ut in quotidiana uel quartana. Rigor enim non est aliud nisi materia membra pungens sensibilia. Rigor differt à frigore, quia in rigore sentit patiens ponctionem quasi acus uel spinæ sine in eo fixæ. quia causa ipsius sunt acuti funi. Frigos sentiunt egri quasi inuis congelatio, quia causa eius sunt graues funi & taroi ad mouendum. Item si dixerit quare chole. ru. in lipario calefacit exteriora & interiora minime. In tertiana uero simplici non simili modo agit chole. rub. Respondemus chol. ru. in tertiana est simplex, in liparios est mixta cum phlegmate. Item queritur quare vitreum phlegma & liparios non generant febrem sicut in epialos. Respondemus quia phlegma non est in toto corpore æquale, sed in epialos est phlegma per totum corpus æquale. Merito ergo ex præmissis inferitur quia qualitates non sunt nisi quatuor. i. calida, frigida, sicca & humida. Humana enim corpora non uidemus mutari nisi ad eas, & non sanantur, neque restantur, nisi per eas. Quia medicina nil aliud est nisi repugnatio unius contrarij ad aliud contrarium. Nos quoque non inuenimus nostra corpora mutari ac conuerti, nisi ad calida, frigida, sicca, & humida, neque uidemus ea restantur nisi cum calida, frigida, humida, & sicca. unde Aristoteles in quarta particula microscopi, per contrarium inquit curamur, per simile augmentamur. Quatuor igitur sunt qualitates, neque plures, neque pauciores, quarum duæ sunt actiue calid. & frigid. & duæ passiuæ, scilicet humid. & sicca. Quia calid. semper facit sic. frigid. uero humiditatem, quam sententiam Iohan. Damascenus non approbavit, Aristoteles e contra. Palam intellegimus quia caliditas fortior est actiua & sicca, fortior passiuæ. Hæc de causa tertiana febris habet 12. horas in requie, quia siccitas repugnat calori ut non fiat febris continua, & tardat eam usque ad tertiam diem. Et quia in quotidiana est debiliior & actiua, id est frigiditas & debiliior passiuæ, id est humiditas est modica interpolatio. i. sex horis. Ac quia cholera nigra debiliior est actiua, scilicet frigiditas & fortior est passiuæ. i. siccitas, necessario induratur unde requies est. 48. horis ad minus. Materia enim cholerica quia pauca est in quantitate, & quia fortiolem habet actiuam, id est calorem naturalem uel actiualem facit febrem continuam, id est sinocham. Materia enim cholerica, quia pauca est in quantitate, & quia fortiolem habet actiuam. i. calorem & fortiolem passiuam. i. siccitatem

facit febrem interpolatam. Materia enim phlegmatica quia est multa & grossa & humida, partem facit interpolatiuam. Melancholica uero materia, quia est pauca in quantitate & habet unam sortem actiuam. id est frigiditatem, & sortem passiuam. id est siccitatem habet longam interpolationem. Omnis enim calor aut est naturalis aut nonnaturalis uel accidentalis. Calor naturalis cibum digerit, subleuat, mundificat feces per propria loca, sed calor febris operatur cum sua uatura in materiam quae est putrefacta per unamquamque exacerbationem ut eius humiditatem per unamquamque accessioneem consumat. Ideoque cessante materia transit & febris.

De tertiana interpolata & eius cura. Cap. XLII.

Igitur si tertiana febris non sit continua, cum vomitu facile curatur. Rec. se. atriplicia. vnc. i. & sem. tritu. vnc. in panuo raro mistum & in aqua ca. mollificatu fricetur in citho. Lac uero quod egreditur sumatur cum syrupo acetofo. uel semen infundatur in aqua in qua coctae sunt radices cucumeris agrestis, aut cum osimelle. Rubea ad tertiana probata. Rec. opij. drag. 4. croci auisi cardamomi, storac. ruber, iusquiamis, baccarum lauri ana. vnc. i. confice eum melle da duabus uel tribus horis ante accessioneem. Si tertiana fuerit continua med. cetur sicut acuta febris.

De tertiana notha & eius cura. Cap. XLIII.

Si tertiana notha fuerit, cum hoc nomitu medietur, misce mel & acetum semiosis atriplicis. drag. 3. huic misce frica & cola & da patienti. Si tertiana fuerit duplex, dabis hydrocopion panchristum cum balsamo & rubea & musa. Si solutionem patitur dabis mel citoniatum ita confectum. Rec. succi mali citonij partem unam, melis unam coque lento igne ad spissitudinem melis. Si autem tertiana in autumno uenerit, curabis eam cum diatesaron destemperato cum uino calido & cum rubea, aut musa. Cibi dandi sunt temperati, ut far grannum bene coctum lactuca spinachia coeurbia assata & similia.

De cura quotidiana febris. Cap. XLIII.

Quotidiana haec febris curatur cum vomitu.

Rec. apiz lib. i. cila. ceteri lib. se. cinamomi vnc. 3. da cum osimelle dr. 3. uel secundum uirtute patietis. Si stomachus plenus sit humoribus detur citho mel ut uomant. Rec. acetii phialas duas, mellis unam, seminis radice. raphani semina atriplicia ana. vnc. sem. & coquantur ad medium & bibant ante accessioneem & ieiunent una hora postea. Si uero non uomuerint accipiant aquam cal. Si uero quotidiana sit acuta, ferant usque ad septimum diem, digesta sit pisanom. Si quotidiana ad miscetur tertiana, de iur panchristum & rubea tro. & ydropion quasi portione una utantur. Si uero non profuerit detur tyriaca. Si quotidiana in tempore ueris fuerit, euacuabis panchristo rubea & esdra. Cataplasmata uero. Rec. micap. panis fel terrae a quo poudere confice cum ouo molli affum cum oleo cypresino aut laurino & pano induto super uiscera poue, probatum est.

De cura quartanae febris. Cap. XLIIII.

Si quartanam nullus morbus praecesserit, in principio tribus diebus uinctis dabimus tyriacam magnam in modum auellanae cum osimelle squillitico, postea dabis laxatiuum sicut pigram, theodonicon, aut hieralogodion, aut uomitiuum superius scriptum. Corpore purgato mittatur in tinam aqua plenam in qua cocta sunt nepita, pulegium, laurus, absinthium, itaque bibat tyriacam magnam cum osimelle squillitico, aut diatesaron, aut adrianum, aut diatironpi pereon, aut unum illorum quod in antidotario summa dictum. In die accessioneis nihil manducet, & in duabus horis ante accessioneem inuret tinam.

De cura duplicis quartanae. Cap. XLV.

In duplici quartana detur panchristum & adrianum temperatum cum succo balsamiae. In hyeme curetur cum esdra mixta cum portione sancti Pauli & musa enea. In aestate cum portione mixta rubea cum tyriaca mundissima & nino temperata, & fumigium facimus. Rec. gipsi spoliis serpentis pellis uisuli marini hyeme cum mulsu adriano & cum trociscis ad quartanam probatis. Oleum petroleum dabis bibere, & vagatur dorsum cum calidis oleis & unguentis.

ISAAC ISRAELITAE
 FILII ADOPTIVI SALOMONIS
 REGIS ARABIAE.
 DE FEBRIBVS
 LIBER.

Prologus in eundem Constantini Monachi.



QUONIAM te charissime fili Iohannes lachrymas mesto cordis dolore perpetim effundere prospexi eo quod exilio nimioque calamitatis merore extenuatus in ultima desperationis inopia te perisistere fatebaris, praesertim cum in literarum assidue imbecillia permanens, quaecumque medicinae artis solida longae temporis interuallum penetraueras, ignauiter in breui obliuioni tradendum te manifestabas. Vnde ego Constantinus Cassianensis monachus magno pietatis amore commotus, te paternae charitatis dilectione familiariter suscepi, & quae medicinae artis uilia scripta seu in mente imaginata habui, proculdubio tibi anhelanti animo concedere non negavi. Atque quoniam generum & specierum febrium diuersitates tibi super omnia difficiles uidebantur esse, neque humiliter petitionibus & dulcibus uerborum precami ne indefinenter oraueras, ut in modico uolumine omnium febrium differentias tibi planissime distingerem, tanti licet operis laborem huiusmodi facere denegaueram, multo tamen ac suppliciter precamine monitus, quia in nullo modo cessaueras, tot flexus petitionum hunc librum rraustolite Arabica lingua in latinam, cuius uerba quisquis legendi summa assiduitate perfecte intellexerit, causas & accidentia nuiuersas febres ostendentia agnoscere poterit. Quibus itaque cognitis, curas earum leuissime impendere sciet.

De libri diuisione. Cap. I.

Liber iste in quinque diuiditur partes. Prima est de essetia febris eiusque definitione, febris natura & causam uniuersaliter ostendente. Secunda de ephemeris in tribus spicibus generatis. Quorum primus uitalis spiritus dicitur, cuius fundamentum est cor à quo procedit ad totum corpus omnia eius membra quiescunt. Secundus

autem animalis spiritus nuncupatur, cuius fundamentum est cerebrum, & ab eo in totius corporis membra uenit, sensus ei praestans & uoluntarium motum. Tertius spiritus naturalis uocatur fundamentum, cuius est hepatis, & ab illo ad totum corpus edit, omnibus membris quatuor uirtutes dante naturales, quae uidelicet sunt appetitiua, calida, & sicca secundum naturam cholerae, ut desiccet humiditatem cibi, & attrahat eam ad se. Necessae est etiam quod unumquodque membrum uirtutem habeat contentiuam, cuius natura sit secundum cholerae nigram, ut continet cibum quousque digestio sua compleuerit suam actionem in eo. Conuenit iterum in eius uirtutem habere digestiuam secundum sanguinis naturam existentem, quatinus digerat cibum contentum, & in suam mutet essentiam. Virtus autem expulsiua phlegmaticae naturae existens, sit necessaria, ut per eam superfluitas & ex se cibi expellatur à membris. Tertia pars est haec, quae nuncupatur physis quae innascitur in solidis membris sicut in carne, uenis, laceris, cartilagine, & his similibus. Quarta de acutis est febris & acutis eas comitantibus, sicut phrenesi pleuresi, variolis, de sudatione, & his similibus. Quinta de putridis febribus quae sunt in humoribus, in sanguine uidelicet & phlegmate, & in uirga cholera. Omnis enim cibus corpus ingreditur cum non totus sit landabilis clarum quae creans sanguinem, necesse est ut à natura digeratur & mundificetur eiusque; sex cum egestione expellatur. Si de prima digestionem fuerit, quae constat in stomacho, aut per secessum, aut cum urina. Si de secunda sit in hepate existente, aut cum sudore, aut cum spatu siliis modis per oculos, per nares, & per alia loca egredientibus, eiciatur. Si de tertia digestionem in omnibus membris existente, sit humor unicuique parti corporis praeparatus. Sunt & alia quae licet separentur à sanguine, quodam tamen modo regimentum sunt corporis, quamuis non sunt nutrimentum aut cibus sicut ueraque cholera & phlegma. Ideoque, natura quaedam

dam eis preparatur loca, scilicet uidelicet cholera in
 bea, splenem cholera nigra, stonachum peccus
 & pulmonem phlegmata, Idcirco quodcumque ho-
 rum augmentatum fuerit, scilicet; qualitatis mo-
 dum excefferit, egreditur à loco suo, natura.n.
 illud odium habens deserit pec regis ipsum. Per-
 manens ergo in concuiritate membrorum, scilicet;
 conculcans calefit & putrescit generatq; febrem
 putridam secundum naturam putredinis gene-
 ratum. Nascitur hæc febris cum quilibet humo-
 rum quantitate augmentatur, sed non propter
 detrimentum alterius qui ei oppositus est, non
 enim ipse à loco suo proprio egreditur, aut pu-
 trescit in humore ei contrario diminuto, sed tan-
 tum cum virtus eius corpori dominetur, conuer-
 titur illud in suam qualitatem, atq; morbus gene-
 ratur secundum suam naturam. unde Gal. phleg-
 ma inquit in corpore augmentatum si putrescat,
 febrem generat, si autem non putrescat, rigorem
 sine febre facit aliquantulum.

De quatuor inquirendis. Cap. II.

Oportet eos qui nolunt aliquid inuestigare,
 primum hæc quatuor ante animum suum pone-
 re, id est an sit, quid sit, quale, & quomodo sit, &
 quare sit. At quia omnis interrogatio fit qua-
 tuor modis, necessario & responsio est quadru-
 plex, ut bi gratia si queratur utrum medicina sit,
 decet responderi utique si credatur medicinæ.
 E contrario respondendum est si non ei creda-
 tur. Quid sit inuestigatur de rerum essentia, ideoq;
 non potest responderi nisi data dispositione suâ
 naturam ostendente, quemadmodum interro-
 gant quid est medicina, dicendum est, medici-
 na est scientia regendi complexionem naturalem
 & conuertendi eam quæ est extra naturam ad na-
 turalem. Qualis & quomodo sit ostendatur ex
 subsequenti de descriptione, sicut si dicatur qualis
 est medicina, respondendum est rerum natura-
 lium rationabiliter comprehensua, & cum eis pro-
 pter necessesse est comparatiua. Quare sit medicina
 si interrogemur necesse est ut respondeamus pro-
 pter quatuor hanc fuisse quæ dominantur medi-
 cinæ, id est materiam formam artificem & perfe-
 ctionem medicinæ, uidelicet pertinentes. Que-
 renti ergo quare sit, dicemus medicinâ esse cau-
 sa necessitatis integritatis corporis, quæ cû sunt
 temperata cum nutrimento custoditur, & ser-
 uatur ea in propria sua sanitate, & reuocat ea ad sa-
 nistatem cum à temperamento sunt egressa. In
 hac ergo responsione sunt illa quatuor quæ medi-
 cinæ pertinere diximus, materiâ enim medici-
 nę sunt humana corpora, quæ uidelicet subiecta.
 Forma medicinæ temperamentum est comple-
 xionis corporis suæq; compositionis perfectio.
 Artifex est cibus & medicina, & medicus cum
 eis operans. Perfectio regimentum est sanita-

tem custodiens & infirmitatem ad sanitatem re-
 ducens, hæc est intentio & causa quare sit medi-
 cina. Palam ergo est quid sit, quare sit qualis sit,
 & quomodo sit medicina. Si queritur unde sit me-
 dicina, necesse est ut inuestigetur rerum essentia
 in eo sunt ex natura. Sed tamen qualis & quo-
 modo sit non est inuestigandum nisi tantum ex
 sola rerum essentia, proinde sufficit responderi de
 materia & forma. Quare sit, & si non solum
 inuestigari conueniat ex rerum essentia, sed etiâ
 perquiri ex sua causa, necesse est responderi de
 quatuor rebus quas superius diximus. An sit
 quoniam non interrogatur nisi ad sciendum utrû
 innocentia necne, sufficit hæc responsio, si illam ha-
 buerit naturam, e contrario si caruerit. Quod si
 reprehenderint nos suphiſte dicentes, quare ta-
 cnisti qualis sit cum eius inuestigatio non esset
 nisi ex rerum essentia uidelicet utrum esset nec-
 ne, quemadmodum dicimus homo est animal
 rationale mortale an non. Respondendum est
 eis non sequitur, vestra interrogatio falsa est &
 corrupta. Vnam enim propositionem & perfe-
 ctam & necessariam essentialiter inuestigatam
 quæ nullo modo potest destrui nisi ablatis re-
 bus quibus est inuenta opposuisti alij imperfectæ
 & superficiali quæ etiam est possibilis poni &
 non poni cum suis rebus, verbi gratia, ratio est
 essentialiter in homine, quis impossibile est ab
 eo rationem separari nisi ablata sit humanitas;
 propterea nequimus hominem dicere non esse
 rationalem nisi abusive. Necesse est igitur re-
 spondere de quali quomodo & qualiter sunt
 ex substantia rerum: hæc enim interrogatio nil
 aliud significat nisi de quali sit abusiua uel abso-
 luta interrogatio ex sequentibus rebus & eius
 proprietate inuestigata, unde conuenit respon-
 dentibus multis modis reuoluerè quæstionem
 donec securi fuerint & firmi de proprietate quæ
 interrogatur, quæ uidelicet interrogatio si uera
 uideatur esse, affirmetur, si falsa negetur. Vna-
 queque enim res multas & diuersas habet pro-
 prietates, quia quedam proprietas à substantia
 est inseparabilis, ut calor ab igne, rifus ab homi-
 ne. Sunt & alię proprietates rerum affluentes
 quemadmodum canities in homine. Sont & alię
 proprietates rerum accidentia ostendentes si-
 cut vilio igitur, litteræ & artificia hominem.
 Quod cum ita sit, necesse est non responderi de
 qualis sit nisi quæstio prius reuoluatur & inuesti-
 getur ut proprietates de qua sit quæstio pateat.
 verbi gra. Si fuerimus interrogati qualis sit ho-
 mo, respondemus homo est compositus ex mul-
 tis qualitatibus ac diuersis rebus, licet risu litte-
 ris arte canicie, & his similibus. De qua igitur
 harum qualitatum discretim uidemus quam si
 uiderimus esse veram, oportet nos eam affir-
 mare & falsam negare. Palam ergo est quod omnis
 quæstio debet esse responsioni opposita, & seruan-
 dum

dum numerū questionis deesse numerus respo-
sionis. Interrogatio autem est quatuor modis, &
eodem modo necesse est responsio fiat, quod pa-
lam ostendit Aristotelem. eum dicit. Inuestigatio re-
rum inquit cū æquali sit numero. quod optime
dicit, æqualis enim numerus quatuor habet an-
gulos, verbi gratia, quatuor longitudo sunt duo
& latitudo duos quoniam latitudinem si secun-
dum longitudinem multiplicauerimus sunt qua-
tuor. Sed reprehenditur à philosophis dicentibus,
cur Aristotelicam intentionem non dixisti esse
de nouem, inuenimus enim nouem quatuor ha-
bere angulos quia eius longitudo sunt tres & la-
titudo tres, & si multiplicata fuerit longitudo
cum latitudine sunt poucem. Quibus respon-
dendum est corruptam propositionem duobus
modis opposuisse. Primum quia si Aristotel. in-
tentio non esset de quatuor oportueret eum mō-
strare de quo alio numero quatuor angulos ha-
bente sua fuerit intentio sicut sexdecim viginti-
sex, & iterum triginta sex, hæc omnia quatuor
angulos habent. Rursus si eius intentio non fue-
rit de quatuor oportuerat eum dicere quadran-
gulo secundo, vel tercio, vel quarto. Alioquin
quatuor est prius & dignior omni quadragulo
& per eum totius numeri fit completum, ver-
bi gratia: incipiamus ab uno qui est elementum
& causa numeri, cui si iungimus duo quæ sunt
initium numeri sunt tres, quibus si addimus tres
quæ sunt ei viciniores sunt sex. Deinde si poni-
mus quatuor quæ sunt cinaturatius vicini sunt
decem, sit itaque numerus completus. Palam igitur
est quod si Aristotelica intentio de numero nō
fuerat nisi de quatuor. Et licet dixerimus om-
nem questionem fieri quatuor modis, dicimus
tamen quoniam tunc sit quadruplex cum essen-
tia rerum est sensualiter incomprehensibilia, sed
cum sensui patet non est necesse ut prima quæ-
stio dicatur, id est an sit, interrogare eum utrū
homo sit necne maxima stulticia est, nam si in-
sipientibus est hoc cognitum, quanto magis & sa-
pientibus. palam enim patet sensui, quod testa-
tur Aristoteles. in libro qui dicitur apodexia, om-
nem inquit scientiam quæ nostro cognita est
intellectui accepimus ab alia scientia, sic .n. una
ab alia procedena venit ad eam scientiam quæ
non habet mediocritatem in se & nostram intel-
lectum, nulla ergo est querendi necessitas utrū
sit homo an non, quia sensualiter potest hoc in-
ueniri sicut cum dicatur omne duo est par, & om-
nis numerus aut par aut impar, & omne æquale
si mouit ut ab æquali necesse est quod ex eo per-
manet sit æquale. huius scientiæ nulla est medio-
citas inter se & nostrum intellectum, sed con-
uenit inuestigari quid sit & quomodo sit & qua-
lis sit & quare sit. Igitur si fuerimus interro-
gati quid sit homo, homo est animal rationa-
le mortale. hæc itaque definitio est ei propria,

& suam ostendit naturam, atque facit eum dis-
ferre ab aliis animalibus, quoniam animal est
suum genus & elementum, & eius formæ subie-
ctum, ratio autem & mortalitas sunt eius spec-
ies & forma. de qualis sit sit est responden-
dum, homo est compositus ex anima immor-
tali & sempiternali & de corpore destructibili
& dissolubili. testatur autem sempiterna-
lem esse animam post corporis separationem
contrarietas quia ipsa in æternum non indiget
motio eius quæ sit per se substantialiter & non
per aliud, omne inquit quod per se mouetur est
indestructibile & infinitum. Sed corpora mon-
stratur esse destructibile & finitum per motum
eius qui sit de contrariis oppositionibus, & de
eius operatione nō in alium, & quia sem-
per naturaliter nolunt conuerti ad sua elemēta.
Sed potest à quibusdam nobis obijci dicentibus,
quoniam contrarietas est ablata ab anima cum il-
lam sensualiter ideamus contrarium recipere.
Videmus eam enim mutari de scientia in stulti-
tiam & e conuerso quæ utiq; sunt contraria. Qui-
bus sit hæc responsio, scientia & stulticia non ac-
cidunt animæ substantialiter sed qualitatue, quia
anima essentialiter est nna, id est substantia in-
corporea corporis completiua, naturalis nō elē-
ctæ & instrumentalis vitam in potestate habē-
tis, anima ergo essentialiter nullam habet con-
trarietatem, quare sit homo si fuerit interroga-
tio, fiat illa responsio. Homo enim cum sit de na-
turali corpore constitutus, est organum rationa-
lis animæ, ut cum eo rerum veritatem discerne-
re valeat, & cum eo operetur secundum quod ra-
tioni stinet. Sed si dicatur quare sit homo ra-
tionalis. Respondendum erit hoc modo, ut discer-
nat bonum à malo, verū à falso. Ratio enim nil
aliud esse conspicitur nisi discretio boni à malo.
Igitur quia cōpleuimus de quo sit homo & quo
modo & qualis sit & quare sit, subsequens est
ut incipiamus de febribus quid sit & qualis sit &
quare sit, superuacuum & magna stulticia est in-
terrogare an sit cum ipsa sensui pateat. Est ergo
incipiendum de febre quid sit: hæc enim inuesti-
gatione essentia rerum ostenditur.

De febris diffinitione. Cap. III.

Febbris est calor præternaturæ in initio pe-
tens cor per mediocritatem, deinde subito se di-
uidens cum calore naturali per totum corpus na-
turali nocet actioni. Extraneo enim calore ad
cor accedente naturalia egreditur à tempera-
mento, cumque ipse per totum corporis mem-
bra diuiditur ut eis vitam tribuat, quia est egres-
sus à suo temperamento, necesse est ut membra
eum recipiant in ea qualitate qua est. vnde ca-
lescit & ori ea, generatq; toti corpori febrem
actioni naturali subiecto nocet. Palam ergo est quod
febris

febris nil aliud est nisi calor extra naturam prius actioni nocens naturali. Sed cum absolute dicimus calorem, ostenditur calor febrilis & alii calores sicut naturalis corporis regitius & alius calor extraneus, sicut solis ignis balnearum & his similibus. Cumq; dicimus calorem extra naturam, discerni oportet si naturalis calore corporum regitius, quia calor naturalis semper est ab animalibus inseparabilis, & calor febris est extraneus & ab eis separabilis, sed cum diuiditur per totum corpus, licet naturali nocet actioni, differt tamen a naturali & ab alijs caloribus sicut a calore solis balnei ignis & his similibus. horum enim calor quomodo sit extra naturam, insimul tamen exteriora & interiora corporis, non calefacit, neq; actioni nocet naturalis & postquam ei nocet, tamen lexio non est primitiua, quia primum mutatur ad febrem, deinde febris nocet actioni. Illud ergo nocuum est propter febrem & non propter solis calorem. Cum naturalem dicimus actionem, intelligenda sunt eiubi appetitio, somnus & uigilia sedere ambulare, & alia multa his similia, hae enim omnia deficiunt & mutantur propter febrem. Ideoq; febris est morbus molestior, eiusq; disputatio dignior, quia omnes morbi praeter febrem uni tantum membro eueniunt, & permanentes aliquo temporis intervallo, nec subito actioni naturali nocent sicut podagra hydropilis uel a cholica & his similia, nam unaqueq; aegritudinum harum uni corporis membro accidit & non omnibus; febris autem econuerso, quoniam per eam corpus intus & extra patitur. Nocet etiam spiritibus & uirtutibus animatis actionibusque naturalibus. Et licet dicamus febrem actioni naturali esse nociuam, non tamen eam destruit. Actio enim naturalis nunquam destruitur, nisi cum sit separatio animae & corporis. Quod si reprehendant nos quidam sophistae dicentes, quare calor extra naturam prius ad corpus, arterias uel uia; quam ad cerebrum per nervos, & ad hae pariter aenas? Respondendum est, cor enim scimus naturaliter calidius & siccus cerebro & hepate, quia fundamentum caloris naturalis est, & ab eo ad totius corporis membra procedit. Arteriae etiam calidiores & sicciores sunt uenis & neruis naturaliter, & sunt uix coloris naturalis, praecipue si aliqua harum sanguine uel habuerit & spiritum leuissima est, & uelocissimam habet motum. Cor ergo & arteriae, quia sunt calidiores & sicciores naturaliter necesse est ut calor extraneus prius citius adhæreat eis quam neruis & uenis propter siccitatem & similitudinem quam habent, uel, grat. ignis citius in ficula lignis quam in humidis & uindibus incenditur propter siccitatem quam utraq; habent cum siccitate. Similiter hac ratione credendum est, quia calor praeter naturam accidit uelocius cordi & arterijs ca-

lorem & siccitatem habentibus naturaliter quam alijs membris. Sed tamen quondam huius caloris uisioem propter citius & continuo patitur, & quidam tardius secundum quod est materia febris quomodo modum sanguis, & cholera rubra, sanguis enim augmentatus & sua uisa egredietur, & a natura spreus mox putrescit, quia sanguis est calidus & humidus, cholera rubra, licet cum una qualitate putredini repugnet, id est cum siccitate, cum calore tamen illi conuenit. Sunt & alie materiae quae sunt tardiores, sicut cholera nigra putredini repugnans cum utraq; qualitate, & phlegma cum frigiditate. Sed reprehendimus a sophistis nobis dicentibus, si ueridicus est sermo quem dicis ut nulla putredo fiat nisi cum materiae regimento a natura relinquatur, sanguis enim quomodo a natura dimittitur cum omnibus patet quod sanguis sit citius fundus mentum & ab eo ad totum corpus procedat, & per eum consorteitur, atque ipse siccus nutrimentum. Quibus respondendum est, sanguis licet sit amicos naturae, tamen cum lucia temperamentum egrediens augmentatur, & naturam aggriuat, odio tenetur ab ea, qui quoniam ab illa non regitur nec custoditur, necesse est ut putrescat ei, huius uideamus patrem filium spernere & a se expellere cum ei sit inobediens, & tamen dilectus est. Quia iterum si dicerint quomodo febris possit fieri de phlegmate cum phlegma natura licet si oppositum febris febris enim est calida & siccata, phlegma uero frigidum & humidum. Respondemus ita, diuinus febrem non posse creari de phlegmate in sua natura existente, sed cum egrediatur a suo naturali loco suaeque naturae, & ebulliens putrefat. ex ebullitione uero accidet ista tem calorem, quod plenius si uisus fuerit in suo loco cum de putridis febribus disputabimus. Cōpleta uero hac disputatione, oportet nos inuestigare utrum possit esse febris aut aliquis morbus de qualitatibus tribus necne, aut de dicamus quia impossibile est trium qualitatibus febrem fieri conuentione, quarum duae sint oppositae. Est ergo impossibile, ut febris de tribus qualitatibus in unis generetur, quemadmodum de calore & siccitate & frigiditate. Frigiditas autem repugnat calori & destruit eum. Similiter de humiditate & siccitate & calore fieri morbum impossibile est, quia siccitas humiditati repugnat & destruit eam. Quod si aliqui sophistae dicant, cur negasti morbum esse ortum de tribus qualitatibus, & dixisti unam esse complexionem de quatuor qualitatibus, cum quatuor magis sint repugnatiua quam tres res enim in uno loco repugnant & quatuor in duobus, quia calor repugnat frigiditati & humiditati & siccitati. Respondimus qd humana corpora sunt composita de quatuor qualitatibus aequaliter adinuenire repugnantiis, & una alteri non dominatur, quae

cum egrediuntur à temperamēto suo ut uua superet aliam, impossibile est ut duæ qualitates duabus alijs dominetur ac eas destruantur, quia non est domitatio nisi in uua. nam destructa est ea quæ sibi fuerat opposita. Sed febrem dicimus habere tres qualitates. eius enim genus est triplex. Causa est, quia humana corpora tribus modis composita sunt: membris uidelicet, solidis humoribus, & spiritibus. cumq; sunt ex tribus composita, necesse est ut eius genus febris sit triplex, uuum in solidis membris sicut carue, pinguedine neruis, uenis, cartilagine, & similibus. Aliud in humoribus sicut sanguine phlegmate & utraq; cholera. Tertium in spiritibus. id est in vitali qui est in corde, quod est fundamentum caloris naturalis, & in spiritu animali qui est fundamentum sensus & uoluntarij motus, & naturali qui est fundamentum quasi uel naturalium uirtutum, appetitiuæ retentivæ digestivæ cibi & expulsiuæ. Vnum quodq; eorum membrorum corporis has quatuor habet, sed ramen stomachus & hepatis fortius habent has uirtutes, nam sunt eis familiariores plus quam cæteris membris; quia licet eum eis operentur propter utriendam semetipsa, illa tamen faciant operationem propter omnia corporis membra. Proinde quidam aut qui naturam sulto & iniusto regi assimilauerunt dicentes, quædam enim membra fecit esse delectantia aliorum membrorum actione, quædam etiã fecit esse laborantia causa inuendit alia. Ipsi etiã arbitrarij sunt stomachum & hepatis duas & diuersas habere actiones, quarum uua sit propria ad eius nutrimentum, alia uero sit communis etiam omnibus corporibus diuersis. Fecerunt argumentum de harum actionum diuersitate, & de remotione earum non in uno tempore uenientium, dicunt enim stomachum in initio uniuersalem facere actionem & cibum mutare in chylum quasi in pituitum. deinde suam prout oportet particulariter facere actionem cum proprietate quam habet ad digerendum cibum, & conuertit eum ad nutrimentum suum essentiam. Hac de causa æstimant illum duas actiones habere, propriam scilicet & communem. Quorum intentio sic est destruenda, quia argumentum eorum duobus modis est corruptum. Vno modo si duas uirtutes digestiuas propriam uidelicet & communem prout dixerat stomachus habet, necesse est ut si uis remoueat diuersæ, uua scilicet operans in uno tempore, & altera in alio. aut sunt commixtæ ut ureq; in uua hora faciant actiones. Quod si unus actio ad alterius differat actione, & utraq; in uno fuerit loco atque in uno membro, impossibile est non murari cibum secundum illius membra, naturam, sed conuertitur & assimilatur essentia illius membri, quemadmodum uidemus cibum omnibus membris corporis assimilari. Naturalis enim actio in omnibus mem-

bris nihil aliud operari uidetur nisi conuertere ad essentiam eorum illud quod fuerit eis simile, Stomachus igitur quoniam est unum membrum: uiam uirtutem necesse est habeat digestiuam. Quod si illæ duæ uirtutes, propria uidelicet & communis duo stomachi loca habuerint, necesse est ut illæ stomachi partes cibum pro toto corpore digerentes permiscuant absq; nutrimento, propria enim indiget uirtute qua cibum possit mutari & digeri & ad eorum similitudinem conuerti, quoniam membra omnia propriam habent uirtutem per quam cibum conuertitur ad eorum essentiam. unde reguntur nutriuntur & augmentantur. Rursus si fuerimus interrogati, utrum uirtus digestiua sit unus uariæ, calidæ uidelicet & humidæ, aut diuersæ, ut in quibusdã membris sit calidæ & siccæ complexionis, & in quibusdã frigidæ & siccæ, in alijs calidæ & humidæ, in alijs frigidæ & humidæ. Respondemus uirtus digestiua in omni corporis membro ea est & lunatur. Sed tamen ab unoquoq; membro quandã sumit proprietatem, per quam cibum mutat ad eorum similitudinem. quia si aliter esset, omnia corporis membra fuissent æqualia in forma & substantia. ossa scilicet caro essent, & caro ossa sic cætera. Item si dixerint, quomodo sensus aliter actionem stomachi uidemus esse diuersam, si est uua. Nam modo conspiciamus cibum in pituitum mutari, & postea uidemus ipsum conuerti in substantiam stomachi. Responsio fiat huiusmodi, quamquam actio uirtutis digestiue in stomacho uideatur esse diuersa, uua tamen est & eadem, quoniam digestio cibi in stomacho mutans in pituitum, est quædam præparatio cibum conuertens ad stomachi similitudinem, deinde finita digestionem, quandam accipit partem stomachus quæ est ei similis & nutritur ex ea, ceterum autem quod ex cibo restat finit ubi est quæ sibi superfluum. & ideo non dimittit ut alia membra nutriat. sed quoniam stomachum aggravat neq; ab eo potest reuerti. Vnde Gal. causa inquit nutrimenti quinq; modis est. Prima est causa secundæ & secundæ tertiæ, & sic alia. Prima, u. est inauitio humiditatis membrorum & dissolutio eius quæ fit per corporis poros. Secunda est naturale desiderium in omnibus in membris existens, quod cogit membra ut appetant cibum. Tertia eueculatio substantiæ stomachi, aut intestinorum propter meseraicas eum sugentes. Quarta sensus aliter stomachi cibi inanitionem sentiens. Quinta est uirtus appetitum faciens, quæ fit propter cholera nigram à splene ad os stomachi ascendentem. quæ os stomachi mordente fit appetitus. Quod si quidam philosophi dixerint, cur non dixit quod causa appetitus fit inanitio, & paupertas cibi in stomacho existens, quemadmodum dixit sensum membrorum inanitionem cibi sentientem esse causam euacuandi

uacua,

uenas, & uenarum euacuationem esse causam
ptinendi stomachum. fames etiam similiter
quare stomachum non constringit. Responden-
dum est si appetitus sit in stomacho propter ue-
narum & membrorum inanitionem, necesse est
ut eius actio non sit naturaliter, sed rationaliter,
quia cum eius actio fiat propter aliud, & deside-
rat aliquod aliud remotum longe ab eo, necesse
est fieri cum ratione. quare si possibile est fieri
in omnia qualitate, necesse est ut fiat in
omnibus. Oportet ergo ut ignis non ardeat nisi cum uolu-
mus, aliquod urere. Cuius quæstionis falsitas pa-
lam patet intellectu. hoc testatur Hipp. cum di-
cit. Omnis inquit digestionis complementum
sit cum attractione rei attrahendæ & immutatio-
ne eius & causa attractionis omnis est desiderium
omnis etiam desiderij causa est paupertas eius
æci quam desiderat indigentia, cuius sermonis in-
tentio talis est. uirtus digestiua non digerit, nisi
prius operetur uirtus appetitiua quæ semper est
ante digestiuam, similiter appetitiua non opera-
tur nisi prius sit in actio cibi. Appetitio ergo ci-
bi & inactio & sensualitas appetitus quæ est in
stomacho, non est propter aliud, nisi propter se,
causa uidelicet se nutriendi.

Propter quid sit febris. Cap. V.

Febri sit propter aliquod accedens humorem
& spiritum calefaciens & eos faciens extra tem-
peramentum exire, quod tribus modis fit. Est
enim causa febrem generans, & est alia custodiens
eam, & est alia qua febr. crescit & augmentatur, si-
cut uidemus in igne esse tria. Est. n. causa quia
ignis generatur, est & alia causa qua custoditur,
est & alia per quam augmentatur. Causa quidem
ignem generans est putredo aut uehemens mo-
tio, quemadmodum aliquid cum putruerit, si-
cut cum sordities quæ se se conculcat & con-
stringit calefit & putrefcit uritur ac ignem gene-
rat. Similiter uidemus fortem & uelocem motum
loca calefacere eum circumdantia, & ignem gene-
rare. hoc testatur molendinus qui cum suo mo-
tu calefacit aerem sibi uicinam, quam si in mo-
tu suo multum augmentetur in sua morione fer-
uendo ignem generabit. Causa ignem custodiens
res est cum operiens ab aeris percussione. Et quo-
niã aeris idus dupliciter fieri potest, necesse est
duo in igne faciat, quia si aer fuerit mobilis ignem
cum suo fuscitat motu uel idus. & eius adeo con-
fortat actionem in corpore quod est ei subiectum
donec illud diuidat atque consumat, deinde quia
caret subiecto extinguit. Si uero aer fuerit quie-
tus & immobilis cum sua naturali humiditate, &
accidentali frigidiitate, ignis superficie percu-
tiens extinguit, quæ extincta necat alteram, sic
quæ pars partem destruit, & sic omnino ignis ex-
tinguitur. Sed reprehendimus à quibusdam quæ

uentis dicentibus, quare in quintum uentum super ignem
perflantes eum fuscitant & confortant. cum etiam
si cum flabellis mouetur aer ignis ilico excitatur.
Quibus sic fiat responso, perflatio uentorum non
est causa custodiendi ignem, sed consumendi cum
quia uenti super ignem inflantes expellunt ab eo
cinerem & terrestrem partem corporis quod est
ei subiectum, proinde augmentatur & conforta-
tur. Sed si uenti super ignem plus moti fuerint,
omnes partes corporis in quo ignis constat ape-
riuntur. unde uirtus ignis multo magis augmen-
tata deuorat & consumit partes corporis, deinde
carens subiecto extinguitur. Veni ergo non sunt
ignis custoditini. nulla enim causa custodit ignem
nisi ea quæ tegit eum ab aere ne extingatur ab
humiditate naturali, & accideotali aeris frigidi-
tate, sicut diximus. Illa tamen res qua tegitur
ignis, necesse est ut habeat uacuum inter se &
ignem, in quo aer permanceat fiat calidus causa
caloris ignis, & custodiat ignem cum sua simili-
tudine, propter hoc ignis extinguitur magis in
hyeme quam in æstate, propter frigiditatem aeris
hyemalis calori ignis repugantem. Res uero
augmentans est ea quæ nutrit eum sicut oleum
cera pix & similia. Simili modo intelligenda est
hæc ratio in feb. Tres enim causæ in feb. continen-
tur, una feb. generat, aliam eam custodit, tertia
eam augmentat. Causa uero feb. generatiua est
oimia corporis & animæ motio & putrefactio
atque humorum ebullitio. Causa autem qua fe-
custoditur non dissoluitur, corporis est oppres-
sio, & pororum constipatio, per quos claudu-
tur fumus in corporis interioribus. Causa uero
eam augmentans calida sunt cibaria & potus &
calida medicina. Febris causa generatiua est tri-
plex generatiua scilicet, custodiua & augmentatiua.
Sed generatiua duobus modis est, aut præ-
sens aut præterita. Dominus est sicut est eam cor-
pus extrinsecus petentiens, quæ tripliciter diui-
ditur, una nimis est seruo foris & ignis, secun-
da est nimia frigidiitas sicut niuis & similitum. ter-
tia est putrida horribilis & corruptibilis odor,
sicut cadaueris, bestiarum reptilium & similitum.
Præterea quemadmodum est ægritudo quæ fit
propter angustiam & tristitiam & humorum co-
piam ad putredinem præparatorum sicut diximus
de actione nature, quia autem natura cum
non est innuens cibum laudabilem humano cor-
pori similem, illam partem cibi quæ est cor-
pori inconueniens ac dissimilis separata simili & à
congrua & claudit eam in quibusdam corporis
locis. Pars uero quæ est conueniens corpori & mo-
dicata bene nutrit totum corpus. Superfluitate
cibi itaque augmentata ac in loco ubi clausa fue-
rat multiplicata, egreditur foras implet locum
cum sua multitudinem, quæ à natura dimittitur &
non ab ea regitur, quia cum fuerit in loco in
quo natura eum posuerat rexit & custodiuit eam.

Egredia

Egressa uero inde odio tenetur nec ab ea regitur, sed permanet in membrorum concauitate. Vnde quando aliquod euenit sibi accidens sicut à natura temporis regionis loci aeris & his similibus illa superfluitas mutatur contra naturam & putrefaciens generat morbos. Hac de causa antiqui assimilauerunt naturam temporum anni absolute humanæ complexionis & compositioni, & naturam regionum atque locorum humanæ etati, & naturam aeris non existentem secundum complexionem temporum anni assimilauerunt humanæ naturæ quæ non est secundum suam complexionem. Oportet autem in corpore sit actio suæ complexionis & compositionis, quæ in eo operatur. Reperierunt etiam regionis complexionem i. aerem qui non est secundum complexionem temporum anni facere in corpore sicut in eo actio complexionis agit temporum anni, quæ non est secundum corporis complexionem uel compositionem, ac etatem, quoniam si humana corporis complexio est secunda uel prospera ad similitudinem anni regionis augmentatur & regitur. si autem fuerit e contrario minuitur & destruitur. Et quia in hoc loco nostræ disputationis est finis & nostram absolutam compleuimus intentionem, dicendo quid feb. sit & qualis sit & quare sit, oportet nos dicere disputationem uniue.rius quæ feb. sigillatim. Incipiendum est igitur ab ephimera, quæ sit in spiritu quod propter quatuor res facimus. Una quia hæc cito ad corpus uel ad cor de parua uenit occasione. Secunda quia eius duratio & significatio ad aliarum febrium comparationem facilissima est & planissima. Tertia quoniam curatio eius leuissima, si secundum quod oportet fiat, caret enim materia unde medicus cape. ret digestionem & solutionem. Quarta quia plurimum hæc fe. est causa aliarum durarum. Spiritus enim non habet materiam per quam calor permaneat causa feb. cessante. Sed febris quæ est in humoribus & in solidis membris, quia habet materiam, permanet in corpore: calore qui est causa febr. præterente. Ideoque febr. ephimera causa est durarum aliarum febrium, quæ sit duobus modis quia aliquando humores sicut diximus in corpore augmentati suis excurrentes locis, suntque præparati ad putrefactionem. Vnde cum ephimera feb. accedit ad spiritum, necesse est illam calefaciat materiam, & eam putrefacias, qua putrefacta feb. necessario ex ea generatur aut quia medicus nonnunquam errat in cura ephimeræ feb. & facit sumere infirmum cibum ante congruum tempus, aut quoniam iubet ei abstinere habere, quousque status febris transit, deinde cibum donat & balneare eum fecit, priusquam eibus digeratur. vnde calor balnei cibi digestionem, secundum quod oportet non præu.les perficere & crudus circa corporis exteriora egrediens quæ

tis poros cum sua claudic. eruditate atque uiscositate. vnde illic permanet illius eruditas & superfluitas non potens per poros exire. Similiter fit in solidis membris, quia aliquando quandam habent humiditatem eam naturalem ad suscepiendam calorem præparatam, aut siccitatem. quæ si calefiunt per ephimeram & deficiunt non ualent illum calorem à se expellere, permanentes illæ calor in eis febrem hæcicam generat.

De ephimera febre. Cap. V.

Ephimera est abusu.rium nomen, fuit enim à quadam bestia maris translatum quæ non uiuit nisi per unum diem quæ feb. quia non permanet nisi per unum diem, hoc nomen ei à simili impositum. Sed tamen Gal. dixit se eam uidisse usque ad tertiam diem & quartam procedere, quod raro contingit cum pori corporis sunt clausi, maxime cum tumor qui ab eo dissolutus fuerit grossus, quia pororum corporis oppilatio naturalis siue accidentalis grossum tumorem non sinit resolui. vnde fit causa elongandæ febre, quæ si quartum diem transierit, & sanguinem calefacit & incendit, à sua natura egreditur & mutatur in causam, quæ iterum si multo plus morabitur, ut naturali corporis humiditati coniungatur, in hæcicam febr. mutatur. ideoque diximus quod ephimera est causa aliarum febrium, & nulla alia est causa ephimeræ. Reprehendimus à quibus sophistis dicitur. quare Galen. dixit ephimeram annis dici & postea dixit eam posse venire usque ad quartum diem? Quibus respondemus Galen. dixit feb. generaliter in tria. scilicet in spiritibus humoribus & solidis membris. Quia igitur ephimera in spiritu moratur plurimum non transiit nisi unum diem & raro ad quatuor dies ascendit, nequirit aliud nomen inuenire quod ei imponeret, unde appellauit eam ephimeram, sed tamen non diuisit eam absolute, quia determinauit eam dixit sic, si ephimera transierit diem quartum mutabitur in causam. possibile est enim ut causa ephimeræ diu in corpore morans uarietur sanguis & febris nascatur continua. Causa uero ephimeræ generaliter in duo diuiditur, aut enim sit propter alium morbum, aut ipsa est morbus. Illa autem quæ non sit propter alium morbum in duo partitur, aut sit intrinsecus aut extrinsecus. quæ iterum diuiditur in tria. Vnū est calor solis & æstatis magnum incendium facientis. Aliud est nimietas algoris & congelatio & balneatio in spiritibus aquis, sicut est alomina nitrata & sulphurea. Tertium est animæ siue corporis excercitia. Animæ sicut ira tristitia angustia cogitatio. Corporis uero sicut nimis labor ambulatio & equitatio. Aut sit intrinsecus sicut ex cibo & potibus & medi-

cina omnibus calidis. Feb. itaque facta propter aliud quoddam est febris apostemata semper sequens in inguine in collo sub ascellis & sub auribus nascentia, his enim præcedentibus febr. est eorū accidēs, licet morbus sit accidēs corporis, quia accidēs duobus modis est, aut simplex, aut compositum. Simplex sicut febr. non facta causa alterius, sed ipsa sit morbus. Compositum quemadmodum est febr. propter aliud creata. Sed Galen. diuidit accidens duobus modis, unum inquit est vniuersale; & aliud est particulare. Particulare vero est illud quod non est propter aliud; sed propter ipsum est morbus. Vniuersale vero quemadmodum accidens aliquod morbum subsequens, quod est duobus modis, aut est inseparabile sicut dolor capitis sicut, spiritus angustia, quæ semper accidunt febribus neque ab eis separantur, quæ licet sint in quibusdam fortiora in quibusdam debiliora, se tamen sine istis nunquam potest esse, sicut corpora nullo modo inuicuntur quæ umbra omnino careant. aut est separabile ut sit aliquando quandoque non, sicut vigilia alienatio stupor in quibusdam accidunt febr. quibusdam non, hæc enim feb. eueniunt pessimis aliquando. Sed potest nobis obijci à quibusdam dicentibus, quare feb. de causa inguinis apostemata factam dixisti esse de ephimeris, cum Hipp. in Aplo. dicat quod omnis fe. de inguinis a postemate nata est pessima. Quibus respondendum est, gloriosissimum Hipp. suam intentionem determinate dixit, cum dixit si non est ephimera febr. Apostema enim in inguinibus duobus modis fieri potest: aut cum illud sit per se morbus, aut cum sit propter aliud. propter aliud cum est palam ostensum sensui, si cuticula sunt vulnera in talo pede & in simili quæ sunt salubria. & eorum feb. cito dissoluitur proinde etiam compositum in genere ephimeræ febr. Sed si ipsum est per se morbus sine causa sensui comprehensa sit feb. eius molesta & pessima, significat enim aliud apostema esse de humoribus grossis & putridis & in inferioribus corporis existentibus & pestilentialibus morbis creatis. hæc de causa determinauit illud Hippo. cum dicere si non est ephimera febr. Rursus si opponant nobis dicentes multos uiderimus homines anime & corporis laboribus utitur, aut in ephimeram non inelidunt. Respondemus accidentia corporis eueniunt quatuor modis, aut propter eorum complexionem corporis simulantem sicut est oleum cetera pia adipsa quæ tunc sunt similia, aut propter corpus ad recipiendum accidentia præparatum sicut calamus pili & similia, quæ sunt præparata ad recipiendum ignem, aut propter eorum accidentium utritum corporis dominantium sicut est vitus opij, quæ dominatur omnibus corporibus molestem eius qualitatem accipientibus, aut propter illorum acci-

dentium idem continuatum per longum tempus corpora percutientem, sicut sensualem uidemus aquam guttari lapidem percutiendo perforare propter continuationem longi temporis. Quod cum ita sit, necesse est ephimera generetur in corpore ad causas febrium generatuas præparato sicut corpori calido & lico, quæ uis ipsæ causæ sint multum fortes, aut sint multum debiles uel multum copiosæ. Quibus ergo tribus causis si corpus careat, impossibile est ut in ephimeram incadat.

De significationibus ephimeræ. Cap. VI.

Ephimera habet significationes quibus differt ab hætica. habet & alias quibus differt à triphimera etiam habet alias cum quibus febr. putredinis non conuenit. De sententia uero quam habet cum hætica, hæc est, quia causa ephimeræ est ex paucis tempore. Causa uero hæticæ ex longo. In hoc ergo differunt, sed & in calore conueniunt. Causa enim ephimeræ febr. est ex duobus uel tribus diebus, causa uero hæticæ ex duobus uel tribus mensibus uel pluribus est. Sed febr. putredinis nullam concordiam habet cum ephimeræ. Hætica quidem est cum ephimeræ concordans tribus modis. Vno quia causa ephimeræ & hæticæ est quædam, sicut angustia tristitia fortis cogitatio & his similia. Secundo quia ephimera & hætica sunt de simplicibus qualitatibus materia parentibus. Tertio quia calor ephimeræ & hæticæ non est multum fortis. Sed febr. putredinis sunt istis oppositæ, quia ipsa eorum est quædam cum materia, & illæ sunt simplices, illæ uero compositæ. Amplius quia cal. & causa istarum est fortis & pinguis propter ebullitionem & incensionem putredinis humorum quæ est earum materia. Distantia uero ephimeræ & triphimeræ est, quia si ephimera fuerit secundum quod oportet, nec infirmus nec medici aliquod accideri peccatum, determinabitur in primo, triphimera uero non similiter, quoniam ephimera sicut diximus, si nullum habuerit impediendum, in primo die erit dissoluta quasi à balneo egredientium, & omittatur urinx & sudoris: triphimera uero licet raro habeat sudorem, in primo tamen die non est secundum crum, sed propter lenitatem materię & subtilitatem iocet cutem & carnem laxantem, nec tantus calor febr. fuerat ut omnino prohiberet illam desiccare, proinde debilitet eam caliditas eam exiccat modicum. Quod si repetentis erimus à quibusdam sophistis dicentibus, si ephimera febr. est de sola qualitate materia non habente, quare determinatio eius sit cum sudore & fumo. Respondemus recte ephimeræ febr. sudorem & humorem esse de gaudiis,

mus; quia de seruit digestionis superfluitate est hoc quod dissoluitur per corporis poros cum sudore & fumo & vana propter febrem calorem & virtutem actionis naturę, quemadmodum videmus homines semper pati propter nimium momm vel propter aeris uel balnei calorem. Inuenimus enim hanc humiditatem sub cute existentem dissolvere nonnunquam & usque ad corporis interiora perforantem, & iuuiorem humiditatem excoquendo eliquantia cum urina expellere eam; propter hoc saepe uidemus: quis qui balneo temperatum habent calorem ingredior, si sitim habuerint propter corporis eorum siccitatem curantur a siti, quoniam calor balnei cum sui subtilitate dissolvit humores & sicca humidat membra quę sunt causa sitis. Febris item ephemera ita habet significationes quibus a febribus putridis differet. Vna quia calor ephemere est levis & suavis, quę cum ad statum uenit nullam facit angustiam & laborem, quia caret materia in qua noua labores ad digerendum & ad expellendum. Secunda quoniam urina ephemeram habentem est quasi sanorum in colore siquore & hypostasi, quę licet inter se differant, modica tamen earum erit discordia, uidelicet in colore & rubore. Tertia, quia pulsus ephemeram patiens non distat a sanorum pulsu, nisi in dilationis uelocitate & constrictionis tarditate. Tarditas enim constrictionum pulsus significat materiam non esse in corpore partem arteriarum constringentem ut illa exterius expellatur, quia uelocitas dilationis pulsus acutem & calidam inuoluit qualitatem. Unde necesse est ut natura organorum partem uelociter dilaret, ut multam aeris quantitatem attrahat per quam illius uelocitatis acumen refrigeretur. Ephemera igitur febris quę fit ex sola qualitate id est calore hinc materia non est sibi necessitas ut constringat uelociter partem organorum, quia non habet quid expellatur. proinde fit motus pulsus in dilatione ad attrahendum aeris subtilitatem quia calor refrigeratur plus & uelocius quā cum pulsus constrictione. *Appendix IV*

De ephemera quę fit propter calorem solis, & eius causa. Cap. VII.

Ephemera quę est propter solis feruorem, intelligenda est si capiti patientium toto corpore sitientior, quia calor solis spiritum calefacit animale & uitalem fortiter & uelociter sine mediatore. Spiritus animalis calefit causa feruoris solis caput percutientis, & propter solis feruorem cito ad eum per statum uenientem. Sed tamen illa quę est de calore solis, maiorem capiti infert calorem quā toti corpo-

ri propter solem capiti repugnantem & ei oppositum, proinde nimium capiti patientur calorem, & in facie feruorem, & uenarum plenitudinem in temporibus existentium. Nonnullam etiam rheumatē exagitat cum nimio calore & narium inensatione. Subtilitas enim caloris tenues calefacit & eliquat capitis humores, & facit eos ad narea descendere. Illa uero quę est propter ælium aeris calorem, plus calefacit corpus quā caput, quia calor aeris per statum facilius ad cor ascendit quā ad caput. Cuius significationes hæ sunt. Corpora enim patientium sunt insensa & sicca propter aeris calorem, unde magnam habent sitim & aerem desiderant frigidum. Vile huius sebecuramentum est ut in frigidum & humefaciamus aerem, & in panimento domus steruamus frondes & flores infrigidentes, & calidos fumos extinguentes, sicut uolunt rosas nensur frondes psilij temperuam salicis frondes flores basiliconis & huiusmodi, & semper sunt cum aqua frigida uel rosaria infundenda. Et licet basilicon sit cal. in primo gradatamen proprietas habet ducendi frigiditatem aquę per nares. Sed oportet non patitur nares sepe humidare cum oleo uolunt nensurari & frigidibus. Vngenda sunt tempora camphora & aqua ros. si non habuerint rheumatē & rheumatē habuerint capitis de humorum fumesitate, cauidi sunt de aceto & camphora. Ad nares eorum apponuntur fumum aque calidę in qua decocta sint viola & camomilla. Cautant ab omnibus oleis undionibus. Quod si non habuerint capiti de humorum fumesitate plena, neque rheumatē, bonum est ut capiti eorum curemus post declarationem febris aqua in qua cocta sint viola & camomilla. Quod si capiti eorum plenitudinem habuerint, abstineant ab hac aqua, & solummodo fumum eius odorant. Succum utriusque generis malorum granatorum accipiant. Comedant melones palestinos, uas hyemales, medullam citruli & cucumeris, omnia cum niue refrigerata, si niue fuerint assueti. Vinum bibant mixtum cum syrupo granatorum & viol. Gestio eorum sicca si fuerit, humidanda erit cum syrupo viol. facto de prunis oxidentia & similibus. Post febris declarationem, bonum est si balneentur in temperato balneo aeris & aque temperamentum habente, Manducant in initio prandij medullas citruli & cucumeris & micam panis lotam cum zaccaro. Mundificatio autem stomachi de humoris capiti & febri fumofitate expulsa, demus pullos gallinaceos, perdicis coctas cum iure conditis de succo malorum grana & aceto yquam agrestium cum ramis portulacę lactacę, & similibus. *beatus*

De ephimera qua fit cauſa frigiditatis & congelationis, & eius cura. Cap. V 111.

Patiētes ephimeram propter frigiditatem & congelationem, cognoscuntur cum ſignificationibus oppoſitis ephimerę propter ſolis & aeris calorem generatę, quia hi qui patiuntur ephimeram de ſolis & aeris ſeruore creatam, habent ex teriora corporis calefacta, unde cutis rariſcitur. Iſti uero qui cauſa frigiditatis ab ephimera moleſtantur, habent ſuorum ſuperficiem corporum frigidam & ſiccam, & poros cutis conſtipatos & oppilatos, quare calor ad interiora corporis clauſus ſanguini dominatur, & uenit ad hæpar & naturali uirtuti dominatur priuſquam uitali & animali, propter hoc color cutis eorum mutatur in plumbeum & obſcurum colorem, facies eorum eſt tumida, & ſentiunt nimiam frigiditatem & grauicatem in capite. Nares eorum aut nihil emittunt, aut ſi aliquid ab eis currit, eſt frigidiſſimum & uifcoſum. Pulſus eorum eſt paruus & uelox. Cauſa paruitatis eſt oppilatio pororum. Cauſa uero uelocitatis eſt conſcluſio caloris ad corporis interiora. Sed tamen paruitas & uelocitas pulſus minor eſt iſtis quam eis qui in ſtipitica aqua & nitroſa ſe balneauerint. Il li enim pluſ iſtis oppilatos habent poros, & cutem ſiccam. Urina eorum alba eſt & cruda duobus modis. Vno quia ſumus qui ſolitius erat per poros exire eſt clauſus ad interiora uenarum, qui cum fuerit augmentatus (alias humectatus) ſanguinem humefacit, etiam cum adiuuata aer qui per ſtatum intrat, uade inſtigidato & humectat o ſanguine calor eius deſicit, proinde ſanguinis color mutatur in albedinem. Et quia urina eſt colamentum ſanguinis, neceſſe eſt ut ſit alba & cruda. Alio modo quia humores ad interiora corporis coadunati naturalem impediunt calorem ad digerendum urinam, unde merito urins eſt alba & cruda.

De cura prædictæ febris. Cap. I X.

Oportet hos ante omnia cauere ſibi à balneis priuſquam morbi fiat deſectio, & uolentia febris ſit declinata. Cum cuius morbum uideris degeſſum, & febrem declinaram eſſe, mittendi ſunt pedes eorū uſque ad genua in aqua calida in qua cocta ſint camomilla ſaſſucus hyſopus ſiſinbryl abrotanum & ſimilia, & ipſi inclinentur ſuper ſumum eius, deinde balneum temperatum ingredientur, & fricentur ibi, ne pori aperiantur, & cutis eorum humefat. Igitur cum cognoscimus quod pori eorū ſint aperti, & calor qui ad corporis interiora coadunatus fuerat, ſit diſperſus & dilatatus, & quædam ſit pars eius ad corporis exteriora progreſſa, lauabimus capita eorū cū aqua calida in qua cocta ſint camomilla ane-

tim & miſcebimus cum aqua quædam olea uirtutem diſſolutiuam habentia ſicut camomilleon anetileon yreleon nardileon. Excauendi ſunt ab ephimematibus niſi cū omnis ſudor fuerit egreſſus, ne cauſa ephimematū poti claudantur, & materia qua necesse eſt cum ſudore exeat exire nō poſſit, ſed permanens ad corporis interiora maximum generet nocumentum, & ducat patientes ad magnam moleſtiā perditionis. Cauent ne diu in balneo morentur, quia aqua licet corporis ſit humectatiua magis cæteris rebus, eius tamen calor perforat corpus neque ad interiora. Vnde cum ſumi fuerint intus in corpore exiſtentes caſeſcunt, repognat eis groſſities aque. Ideoq; melius eſt ſi in aere morentur quam in ſolio, quia cum ſolium implet poros & claudit cum humiditate aquæ, aer uero balnei & poros aperiens eſt, & ſumofitatem corporis diſſoluens, idcirco exercitiis iſtis ſunt conuenientia, & quia exercitia temperata diſſolunt & rariſicant corpus & uias per quas ſumi torum tranſeant, oportet illos cibos accipere ſubtiles, uide licet laudabilem chimum generantes & nullam eis frigiditatem ingerentes, ſicut hedulina caro annualis agui & ſimilia: quia ſecūdm noſtram intentionem oportet corpora eorum humectari cum artificio quo a prætoribus iure condito, ut uidelicet cum albumine oui & ſucco paruę cepę & modico eymini carui cinamomi & ſimilibus. Abſtineant à uifcoſis cibis & groſſis. Potent uinum cum aqua calida mixtum, multis operiantur indumentis, & iuna eorum laſus ponendi ſunt carbones ignis ut repugnent frigida ti aeris, naribus eorum odoriferæ applicentur quæ teperate ſunt caleſcificationis, ſicut ſanſucus yreos & ſiſimbrium & de fructibus ſicci ſunt citruli & ſimilia. Quicunque etiam rheuma habuerint caueant ſibi à balneo niſi ceſſante morbo.

De ephimera qua fit propter balnea aquæ ſtipitica. Cap. X.

Quicunque ephimeram patiuntur cauſa balneorum ſtipiticam aquam habentium & delicatius ſicut eſt nitroſa & aluminofa & ſulphurea cutem habet ſiccioſam & magis oppilata quam ſuperiores, propterea quia calor clauſus eſt ad interiora corporis eorum, & dominatur ſanguini; & ueniens ad hæpar priuſ actioni nocet naturali quam uitali & animali, quorum hę ſunt ſignificationes. Si tangitur cutis eorum inuenitur extenſa & aſpera, quædam modum coris in longotempore infra gallas & cortices mal. grana poſita. Quod ſi manus alicui parti corporis impoſita diu motetur ne cutis caleſcat cauſa caloria palatæ manus ſumum ſentiet qui de illo corpore loco diſſoluitur calidum & acutum eſſe

& pungitium. Pulsus etiam eorum in initio febr. minor est & uelocior pulsibus superiorum, quia cutis eorum est siccior & magis oppulata. vnde cum siccitas contingit usque ad interiora corporis membra, fit pulsus eorum tardus & largus. Causa tarditatis est siccitas organorum, quoniam frigiditas in interioribus & exterioribus corporis dominatur. Causa largitatis est multitudo & coadunatio eorum fumorum quæ in organis est non dissolutorum. Urina eorum est multa & turbida & aliquantulum pertinens ad albedinem & candiditatem. Mula uero est propter humiditatem ad corporis interiora conclusam, quæ solita fuerat per sudorem exire & fumum. Cruda est & alba duobus modis. uno quia urina non permanet in loco coctionis ut coquatur & rubet fiat coloris, alio propter nimiam humiditatem sanguinis conmixtam.

De eius cura. Cap. XI.

Huius febris curatio similis est superiori. Oportet enim sicut diximus ut balneentur, sed non ita declinante febr. & deponantur pedes usque ad genua sua in aqua quam supradiximus. deinde in temperato balneo balneentur. cauendi sunt ab omni iniectione, bonum est si aliquantulum exercitij neantur. cibos leues accipiant, qui sunt faciles ad digerendum, & bonum generent chymum, aliquantulum frigiditati pertinent, ut ualeant fumorum ad interiora coadunatorum acumen extinguere. Vinum non bibant nisi eorum careant plenitudine, & cum omnis fumositatis a corpore expulsa fuerit.

De ephimera quæ fit propter cibos potusque calidos & eius cura. Cap. XII.

Ephimera quæ fit propter cibos & potus calidos in initio ad spiritum peruenit naturalem. Omnis enim cibis siue potus uenit ad stomachum, & ab eo ad hepatis, qui cum fuerint calidi, necesse est ut calefaciant sanguinem & spiritum naturalem. Deinde uenientes ad cor per totum corpus diuiduntur. Ideoque urina eorum rubicundior est ceteris omnibus ephimeras patientibus, augmentata igitur febr. sentitur dolorem & calorem in hepate. vnde oportet studiose hæpar curari cum oxizæ. & succo malorum grana. iulebæ. & aqua ro. & camphora, cibos accipiant portulacum uidehæc atriplices scariolam pullos gallinaceos cucurbit. & similia. Cataplasma hepatis & stomachum a cibo inanitu de sandalæ rosæ farina hordei, aqua ro. camphoras & similibus. Comedant melones palestinis mala granata mala poma pira pomo cicino medullæ coctæ, thespila uas morsa & similia.

De ephimera quæ fit propter ieiunium, & eius cura. Cap. XIII.

Ephimera quæ est propter ieiunium differt ab omnibus ephimeris, quia facies patientium est macilenta citrina quasi facies agritudines exuentium oculos habent concauos pulsuq; debiles & ueloces, urinam aentem & rubicundam. Causa debilis pulsus est defectio nituitis eorum. Subtilitas eius est propter inanitionem organorum. Velocitas eius est propter necessitatem aerem attrahendi ad cordis calorem mitigandū & aentos fumos abintus exterius expellendum. Rubor urinae fit causa paucitatis naturalis humiditatis & siccitatis corpori dominantis. Vnde oportet in statu febr. nullum daricibum, sed succum accipiant malorum grana. & potum accipiant aquæ palestine uarum hyemalium succū sorbeant. Quod si hæc eis non sufficiant & famem eos percutiat, dandus erit succus micæ panis cum rucara lorp. de limante itaque febr. si uideatur succens esse digestus damus piscinam calidam, & expectabimus usquequo digesta erit, deinde mittamus eos in balneum & cum corpus calefieri inceperit, & sudores emittere ungendum erit cum oleo uiol. ut claudens poros repugnet humiditati corporis ne extrinsecus exeat, deinde digestæ cum cibis lenibus & subtilibus, & ad digerendum facilibus atque tenuem sanguinem geuerantibus.

De ephimera quæ fit propter labores & eius cura. Cap. XIII.

Ephimera quæ fit causa laborantis corporis fit ut propter equitare, ambulare, & cetera subitotribus uirentibus accidit spiritu alibus, sed tamen ad spiritum animale magis est pertinens, quia in exercitiis membra fiteantur & calefiunt, quibus necesse est ut laerati & nervi sint calefacti, ut calor ad cerebrum priusquam febris accedat. na de febr. veniente & calore cerebro dominante, necesse est quod ictus caloris cerebrum perueniens dupliciter fiat, cuius significaciones hæc sunt, corpora eorum sunt debilia & siccæ. Quod si labor eorum multas fuerit, & sudor eorum acutissimus, aut nihil sudat, & hoc duobus modis. Uno, quia sudor qui debet exire cum febre est finitus causa laboris. Alio quia spiritus solens per poros emittere sudorem est defectus. Qui etiam si parum laborauerint, sudant tamen paruissimè, quia humiditas eorum ex labore dissoluta & quasi finita est. Proinde pulsus eorum parus subtilis nelo, & duplex in dilatione propter necessitatem attrahendi aerem ad interiora, ut mitigetur acumen caloris corporis eorum. Paruitas & subtilitas pulsus est propter membrorum

deſe&tionem, & paupertatē ſpiritus vitalis. præ laboris enim nimietate diſſolutus eſt. Ideoque magnum in articulis, & in concatenatione dolorum patiuntur, qui ut curētur oportet aliquid requiri ingeniari, deinde cum oleo ro. uel nenupharino vngantur. Quod ſi labor modicus exiſtit, fricentur corpora eorum multum, ſi autem multus, fricentur parum. Poſt ea in temperato balneo lauentur ſæpe & nullam moram in eo faciant, ne ſubſtantialis eorum humiditas conſumatr, & in hæticam incidant. In ſolium deſcendant ut corpora eorum humefiant. exeuntes autem ſolium cum oleo violaceo uel nenupharino vngantur ut clauſis eorum poris humiditas accidentaliter intus in corpore acquiſita permaneat. Coitum fugiant ne corpora deſiccantur. Dietam accipiant ſtamos perdoes pullos gallinaceos, hedulos agnos annuales, piſces laudabiles digeſtioni obediētes. Potent vinum lene & aqua multum mixta, quæ membra eorum humefcet. Viuum enim corporis penetratiuum eſt, coeunte aqua cū uino digeritur & humefacit membra. De fructibus comedant mala granata uinas pura mala & ſimilia.

De ephimera qua fit propter bubones in inguine, collo, & ſub aſcellis & eius cura. Cap. XV.

Ephimera ex bubonibus in inguine collo & ſub aſcellis accidentibus duobus modis eſt, aut enim cauſa eius eſt in propatulo, aut eſt e contrario. Ea uero cuius cauſa eſt non in propatulo, ab Hippoc. in aphoriſmis teſtante cognoſcitur. In bubonibus inquit feb. omnes male exceptis ephimeris. Quæ autem eſt manifeſta fit propter puſtulas uel apoſtemata & uulnera in manibus uel pedibus ſiue capite naſcentia. Cauſa uero horum bubonum hæc eſt, natura enim naſcētibus his puſtulis uel apoſtematibus currit ad regenda & cuſtodienda eorum loca, ſimiliter & ſanguis & vitalis ſpiritus cum ea portantur, ſanguis ergo per mollia & laceroſa loca præteries replet ea & morans in eis generat apoſtemata, nomina & locis ſumentia, qui diu ibi permanens caleſcit, cuius calor ad cor perueniens febrem generat. Vnde pulſus eorum eſt magnus uelox & ſpiſſus, urina cruda & alba, facies eorum rubicunda & turgida, febre quoque ceſſante quædam in ſuperficie apparet inſuſio. Cauſa magni pulſus eſt multitudo ſanguinis & caloris vitalis ſpiritus nimietas, uelocitas & ſpiſſitas fuiſt ex neceſſitate naturæ multum aerem ad cor attrahentis, ut refrigeretur & extingatur caloris acumen. Albedo & cruditas urinae eſt propter ſanguinem & calorem naturalem in coſtione loco remotū, & ad loca infirma exeuntem rubor faciei propter ſanguinem ſuperficie corporis dominantem, tumor propter ſanguinis plenitudinem, ſu-

dor declinante feb. euenit, quia natura abundantiam humorum interioris coadunatorum excluſit uel expellit. Vnde oportet nos ante omnia ſtudere, ad curandas puſtulas & apoſtemata quæ cauſa bubonis fuerint. Deinde balneentur & in aere baluci morentur, ut humorum copia paulatim diſſoluatur, neq; quolibet unguento vngantur, qui uolentes in folio deſcendere in eo morentur. Dietam accipiant ſubtilem ad digerendum facilem & ſubſtantia laudabilem habentē.

De ephimera qua fit propter uigilias & eius cura. Cap. XVI.

Ephimera quæ fit propter uigiliam, in ſpiritu conſtat animali, quæ his ſignis cognoſcitur. Patientium facies & totum corpus eſt citrinū oculi concaui, palpebræ molles & grauæ ad mouendum tarde, pulſus eorum eſt paruus, urina ſubtilis & indigeſta, uulſus timidus. Citrinitas propter cholera eſt ſe ad exteriora propter uigilias moyentem, tumor faciei eſt propter uentoliſtatē & ciborum cruditatem; quia propter uigilias calor naturalis ad exteriora egreditur, unde locus coſtioneis abſque calore permanens crudus & ſumoſam uentoſitatem facies, facies cutem tumefcit. Concauatio oculorum duobus eſt modis. Vno quia ſpiritus uitalis uifiſibilis ſolens implete ſubſtantiam oculorum defectus eſt. Alio quia carent nutrimento propter uigilias. Paruitas eſt pulſus propter uirtutem cauſa uigiliarum deficientem. Subtilitas urinae eſt propter ſollicitudinem quam patitur anima in uigilia. Cruditas eius eſt propter uigilias naturæ in coſtione uirgimpedientes, & actionem ſenſuum eam ad exteriora prouocantium. Vnde cum fit huiusmodi feb. uirtus in animali ſpiritu in cerebro exiſtente, neceſſe eſt ut turbetur cerebrum propter nimietatē ſui motus, proinde oportet impedire magnum ſtudium. ſ. ut prouocemus ſomnum cum fricatione pedum, hoc enim trahit humores in capite exiſtētes & repugnat fumo ad caput aſcendenti. Cibum accipiant modicum qui ſit facilis ad digerendum: quia natura propter defectiōnem non multum ſuffert cibum. Vinum bibant temperatum in quantitate & uirtute. A coitu omnino caueant quouſq; ad priorem uſum eorum conuerſi fuerint.

De ephimera qua fit propter iram & eius cura. Cap. XVII.

Ephimera quæ fit propter iram, uirtuti animali & naturali dominatur. Animali propter impetum animæ ad faciendum uindictam ſe mouentis, naturali uero propter naturæ ſollicitudinem ad corporis exteriora exeuntem. Proinde oculi eorum ſunt rubicundi foras exeuntes, citoq; hunc & illoc

& illuc se mouentes palpebrę eorum sunt sicę, pulsus magnus & fortis, rubor faciei & oculorū eminentia, motusque eorū uelocitas propter sanguinis ebullitionem, & propter naturam ad corporis exteriora exeuntem, & propter animę furorem se uindicare uolentes, sicut Arist. dicit. Ira inquit ebullitio est sanguinis uatura ad exteriora tendente propter animam se uindicare uolentem, sed tamen si ira cum timore fuerit mixta, erit color eorum modo rubicundus, modo citrinus, quia cum natura mouetur ad exteriora cum anima causa uiuificam faciendo sanguine cum eis egrediente facies fit rubei coloris. Anima uero & natura ad exteriora redeuntibus, ut præ timore cor custodiant, conuertitur cum eis sanguis, quocirca facies citrina fit, uicinitas est palpebrarum propter uinum earum motum animæ sollicitate illas. unde defecatur eorum humiditas. Magnitudo pulsus duobus modis fit. Vno propter fortitudinem cordis uatura illud sollicitante. Alio propter uirtutē corpus in celsa fortitudinis sue permanens. Non. u. prius aliquem morbum habuit quo uirtus corporis debilitata sit. unde necessario urina eorum sit digesta nullum habens acumen. digestibilitas eius fit, quia calor naturalis est in loco coctionis. indigentia acuminis est propter extraneum calorem ad non interiora intrantem & cito exeuntem. Oportet ut in initio curę ingeniemus quomodo cor eorum confortetur, & calor extinguatur, quod fit cum expulsionē irę quam ipsi obtinent, deinde in temperatum mittantur balneū scilicet prout fuerat horum consuetudo, & post sudorem ungantur cum oleo uiolac. Poltea descendant in solium, ibi tamen non egredientes à balneo, comediāt frigida & humida & abstineāt à uino quo asq; calor eorum declinabitur, uinum autē mixtum accipiant, caueat sibi à coitu ne putrefactia eorum humoribus putrida incidant feb. aut qui dā ab eorum capite humores descendentes apostema generent.

De ephimera quę fit propter angustiam & tristitiam ac eorum differentia.

Cap. XVIII.

Differentia est inter angustiam & tristitiam, quia tristitia ad rationalem pertinet uirtutē in cerebro existentem, angustia uero ad spirituale in corde existentem, ideoque angustia plurimū fit causa phytis quā tristitia, sed tamen quia causa utriusque & curatio est una, necessario diuersio earum est una. Dicimus igitur quod ephimera quę fit propter angustiam & tristitiam habet has significationes. Oculi patientium aliquando foris eminent, & ueloces sunt ad mouēdum, & aliquando concaui & difficle mobiles, nonnunquam enim neque concuantur, neque

foris sunt eminentes. Causa diuersitatis est tristitia, aliquando enim est tristitia propter magnam filiorum uel parentum cogitationem, & quandoque propter magnam suspectionem & rimorem, & aliquando est neque timorosa, neque suspecta. Igitur cum sit cogitatio de rebus latificantibus, oculi eorum sunt foris eminentes huc & illuc, nonnunquam mobiles, quia anima desiderat uindicare (alias uidere) quod amat. Unde natura egrediens ad corporis exteriora exit sanguis cum ea. Ideo facies & color eorum est rubicundus, & urina eorum minus habet acuminis solito, & pulsus eorum magnus est. Quod si tristitia & cogitatio fuerit propter aliquē timorem & suspectionem, sunt oculi eorum concaui & quieti, quia natura conuersa est ad interiora ad custodiendum cor. Idcirco splendor faciei mutatur, & corpora eorum sunt macilentia, pulsus subtilis & urina acuta. Si uero tristitia fuerit inter rem amabilem & odibilem me diocris, erūt oculi eorum quieti neque concaui, neque foras exeuntes. Diuiditur tristitia iterum duobus modis. Vno in cogitatione & inuestigatione laudabilium rerum ad rationem pertinentium, sicut est cogitatio diuine bonitatis seu eternę iustitię uaturę rerum & finium, quę naturaliter ad animam pertinent. Alio in cogitatione pessimis & immundis rei atque illaudabilis apud animam sicut est amor, qui heros dicitur, ludus & carnalis letitia. Quęcumque uero cogitatio sit de laudabilibus erit cogitatio semper laudabilis & acceptabilis apud animam. Cogitatio uero de pessimis & uisuperabilibus rebus profert uerba corrupta & pessima animę inconuenientia. igitur quia perfecta medicina est quę & causam tollit egritudinis, necesse est ut ab ea incipiamus, & ingeniemus quo possimus auferre ab eis cogitationem & suspectionem cum diuersis musicorum generibus, & cum omni causa letitiam prouocante, ut obliuioni tradant tristitiam, & quiescant animę eorum à labore, quia anima per cogitationis nimietatem debilitatur atque infirmatur, similiter & corpus debilitatur propter animam. sicut dicit Aristot. initium animę sequitur complexionem corporis, & corporis complexio animam concomitatur. proinde oportet nos non negligere corpus, sed adiucemus illud cum rebus humefaciētib. Caueat sibi ab omnibus cibis defecatiuis, ne causa eorum ueniant ad phytism, quia hæc cā magis pertinet ad istā quā ad cetera ephimeras. Siccitas enim istorum corporibus dominatur, & corpora eorum calida sunt. unde oportet illos homestari, scilicet cum balneo temperato, & descendant in solium, deinde uigantur cum oleo uiolato, diartam accipiant frigidam & humidam quę fit facilis ad digerendum sicut pisana, caro hardulina cucurbita ascriplex porrus

laca

Iacea blitas. Vinum bibant quod non sit vetus & multum sit mixtum, de fructibus uidelicet humectantibus comedant, sicut sunt vix melones palestini & similia.

De baslica & physis & cura eorum.

Cap. XIX.

Priusquam de hæcica & physis disputemus, necesse est ut eius diffinitionem dicamus. Dicimus ergo physim esse corporis humiditatis consumptionem. quæ est naturalis uel non naturalis. Naturalis est sicut pariuertur senes uel decrepiti cum naturalis eorum uirtus in digerendis cibis, & in humiditate nutritiua attachenda deficit, ut restitueretur corporis humiditas, quæ per frigus & sudorem dissoluta est. Hæc est causa consumptionis decrepitorum corporum atborum & tettenascentium. Causa uero consumptionis est tribus modis. Vnus est nimius calor substantialis humiditatem desiccans sicut calor solis facit in æstate. Secundus humorum nutritiuum ablatio, sicut in hyeme non pluuiosa. Tertius humorum nutritiuorum est corruptio, & eorum ad malas qualitates permutatio, sicut ad nitrositatem uel sulphurositatem, & aluminositatem & similia. Sic & in humanis corporibus contingit, consumptionem enim ablatiis humoribus ea nutritiuis, & natura prout oportet in digerendo cibos deficiente, neque membra quæ dissoluta sunt restituerentur ualente, sicut senibus euenire diximus. Vnde antiqui nocauerunt hanc speciem physis decrepitam. Corpus etiam calore extraneo dominante, & substantialem membrorum humiditatem desiccante, consumitur, sicut fit causa acutarum ægriudinum eam precedentium, similiter de angustia & diuturna tristitia. Præterea corpus aliter consumitur, cum sanguis corporis nutritiuus à sui dulcedine & saporitate mutatur quem admodum propter longam ægriudinem mutatur, quia sanguis in diuturna ægriudine corrumpitur & proprium perdit saporem. Vnde membrorum natura odio tenetur, nec ex eo nutriuntur, membra igitur nutrimento carentia infrigidantur & desiccantur, & consumuntur. Consumuntur quia non nutriuntur. infrigidantur, quia sanguine qui est calidus & humidus cessante necesse est membra infrigidantur quæ solebant de sanguine calefieri. Quod si reprehendant nos sophistæ & dicant, quare antiqui seniores dicuntur sicca habere corpora cum sensus ostendat contrarium, inuenimus enim senes maiorem esse humiditatis quam iuuenes. Respondimus in prima huius libri particula diximus quod humiditas decrepitorum sit accidentalis propter defectionem caloris naturalis eorum cibaria prout oportet digerere neque omnis, & propter debilitatem membrorum tertiam digestionem

superfluitatem expellere non ualentium, quod testantur hydropici, corpora enim eorum plena sunt multitudinis citius aquæ, membra tamen habent macilentia & consumpta. Non naturalis itaque consumptio duobus modis est, aut cum feb. aut sine feb. sine febr. est aut calida aut frig. fri. uero consumit corpus, uel propter diuturnam apostematam, uel propter alios diuturnos morbos, humidie enim morbi quia sunt diuturni nimium de corporis humiditate dissolunt. Vnde infrigidato corpore uirtus digestiua deficit, ideo quæ cibaria cruda & indigesta permanent, quæ cum ita sint membra corporis abhorrent ea, neque eis nutriuntur, quam quidem molestiam patientes pulsus habent debilem tardum & strictum, urina albam & subtilem & crudam. Pulsus est debilis ex dissoluitioe uirtutis corporis propter ægriudinis diuturnitatem, & tardus propter caloris naturalis defectionem, sicut quæ congelationem. Cruditas urinae propter frigiditatem consumptionis corporis dominantem, & propter calorem naturalem in loco coctionis deficientem. Subtilitas & claritas sunt propter corporis siccitatem, & naturalis humiditatis indigentiam urinam ingrossare solent. Consumptio quæ est ea sine feb. sit propter calidos humores cordi appositos, quorum sumus ad cor ascendens eius mutat complexionem eique accidentalem præstat calorem. Vnde sanguis corrumpitur, & propria eius saporositas mutatur & membra illum odientia nec ab alio nutritia consumuntur. Vnde Gal. uidit inquit hunc chinum sensualiter uolens enim corporis interiora persequari sicut stomachum intestina & similia, præcepit in spacio solo loco poni simiam simul & sape perquiri ut qualiter corpus eius consumeretur, tandem per medium diuidens eam inueni ad cor eius humores corruptos, quorum sumum ad cor accessisse, & suam complexionem contraxisse credidi, quo circa antiqui hanc consumptionem vocauerunt physim decrepitam. At quia complexiuius disputationem physis naturalis & non naturalis oportet incipiamus de accidentali quæ est cum feb. Physis igitur quæ cum febr. sit duobus modis est, aut ipsa per se est morbus, aut propter alium. Quæ uero per se est morbus, sit ex rebus calefacientibus & desiccantibus, plurimum tamen causa eius est ephmera, maxime si propter exercitia animæ fuerit, sicut propter uigilias, cogitationem, tristitiam, angustiam, legere & inuestigare: ex omnibus enim istis animalis spiritus fatigatur & spiritalis, & accidentalem accipiunt calorem, qui calor cum morbo sit substantialem consumet & desicabit humiditatem, maxime si corpora fuerint ad hoc præparata, sicut sunt calidam & siccam habentes complexionem. macilentia stricta habentes peccata, & capita spicularum foras exeuntia, sicut alij auim stantem

in ætate innentili, videlicet quæ est à 18. annis usque ad 35. præcipue si ætas fuerit uel calidus aer, aut regio calida. Nonnumquam etiam fit propter corporis exercitia, sicut propter equitare alioque labores facere, aut propter calida cibaria & potum & medicinam. Phrysus vero quæ est cum feb. quæ fit propter alium morbum est quatuor modis, aut est de ephimera quæ moratur, maxime & proprium terminum transit & sanguinem calefacit, aut est propter febrem acutam, cum calefacit & extenuat sanguinem & dominans consumit substantiam le humiditatem, aut est propter febriles putredines cum commiscetur & suas mutant interpolationes, aut est propter diuturnas egritudines consumentes membrorum humiditatem, sicut cum venit ex usui dolore peccoris pulmonis dyaphragmatia tenui & ylij dolore qui est de calore & apostematibus omnibus apparentibus, quæ sunt proluxa corpus calefacientia & consumentia. Significationes autem phrysus inueniuntur quatuor modis. Vno quia feb. totum corpus circumdat, & omnibus membrorum humoribus & spiritibus æqualiter dominatur, membrum tamen solidum multo plus est familiarior, proinde aliqui hanc feb. naturali calore non in temperamento, sed in continuatione assimilauerunt, quia membrum est inuiscata, nec ab eis fringunt, sed miscetur naturali colori & ei assimilatur, quia ipse est a membrum inseparabilis sicut calor naturalis, neque enim augmentatur, neque decrescit spiritus ipse, si tamen declinat uouoquam ut febris putrida intra sua existens. Differt tamen ab ea, quia febris hæctica sine causa manifesta declinat sicut putrida feb. sed feb. putrida intra uasa permansens, aliquando declinat in initio cum uomitu. Secundo quia calor licet totum corpus circumdet, est tamen lenis neque pungitinus, unde infirmi se nullam pati feb. estimant. Tertio quia calor plumbeus est & linidus, & citrinus, splendido enim sanguine indiget. Quarto quia tempora eorum aspera oculi concaui siccam comitantem cachexiam, nutritiua enim humiditas ablata est ab eis, hoc testatur torius corporis siccitas. Hæ sunt significationes inueniuntur hæctice, particulares uero diuersæ sunt. Hæctica uero quatuor modis est, causa est, quia humores sunt quatuor. Vnus est in uasis sanguineus. Humor in uenis existens sicut humiditas arborum terræ quæ nascitur permanens in summitatibus eorum, uelut humiditas in ramis nitens existens. Secundus est humiditas existens in concavitatibus membrorum, in quibus natura nondum tertiam fecit digestionem, nec eam membrum assimilauit, sicut est aquosa humiditas quæ est in arboribus & terreniscentibus, & uelut humiditas quæ est in frumento & uitis nondum maturis. Tertius humiditas est membrorum in quam natura incipit operari, sed ta-

men non coagulat neque perficit eam sicut est caro tenera quæ non est membrum assimilata, & sicut humiditas frumenti quæ cepit coagulari & saporifera fieri, & mollis tamen adhuc permanset & humiditas uis coagulari & dulcis fieri incipiens, sed tamen non est deificata nec ad duriciem conuersa. Quartus est humiditas membrum regens & custodiens sicut humiditas in membrum coagulata, & ad duriciem conuersa & cum membrum unum effecta, sicut humiditas frumento assimilata, illud ne putrefiat custodiens, & sicut humiditas uisum passiarum substantia earum ne putrefiant obseruans. Igitur quia corpora humiditas quadruplex est, necessario species hæctice tres sunt. Vna est humiditas in membrum permansens, in qua natura nondum tertiam digestionem operata est, neque membrum eam assimilauit. Secunda membrorum est humiditas qua operari natura iam incipit, sed tamen non coagulauit neque eam perficit. Tertia est substantialis humiditas qua reguntur & custodiuntur membra. Causa primi hæctice est, humiditas enim sanguinis se augmentat, & natura superet, odio tenebitur, nec ab ea regitur nec mundificabitur, quia amplius demorans maxime calefit & putrefit ex corporis calore, & feb. putrida secundum suam naturam intra uasa generabitur. Quod si non augmentabitur, neque a natura dimittatur, sed solummodo propter id quod in ephimera feb. diximus calefit, & calor, usque ad mundificationem sanguinem qui est in arterijs deueniat, coniungitur cum eo & confortabitur, & uenarum & arteriarum substantiam calefaciet, calor etiam usque ad humiditatem quæ est in raritate membrorum permanentem accedet, & eius inuiscositatem deficiabit, qui quia inuiscositatem & saporem amittit merito a membrum non suscipitur, membra igitur nutrimento. carentia consumuntur. Hæc est prima species hæctice, proinde hæc species ad curandum facilis, si sapientis manus paucis incidit. Medicos enim si inciperit solociter calorem extinguere cum frigida & humidis sicut cibis potu odore aere & similibus, citius sine ulla calore extinguet, & infirmum sanabit. Cui nisi succurratur, & calor in corpore sit permanens & augmentans, & usque ad humiditatem membrorum quæ coagulationi uicinis est, deueniat, eorumque deficiet inuiscositatem & saporositatem membrum non assimilatur. ipsi odientibus. unde consumptio & siccitas eorum augmentata fiet. Et hæc secundum species hæctice quæ dura est & molesta ad curandum. Quod si calor magis augmentetur & substantia membrorum humiditati dominetur & eam siccet, & ueniens usque ad humiditatem membrorum quæ fuerat cum eis ab initio coctionis deficiabit eam, & fit tertia species hæctice quæ incurabilis est. Calor enim extraneus humiditatem membra

bra custodientem defecavit operans in ea sicut calor solis in lapide & ligno operatur. Calor enim solis longo tempore lapidum & lignorum humiditatem defecavit & eorum unctiuitatem separat, & quasi cinerem eam facit. Causa est, quia lapis & lignum sunt de quattuor elementis composita, proinde calor in eis hanc operatur, quod testatur actio ignis in lapide frigido, deficit enim & ad calcem illam conuertitur. Est ergo possibile ut simili modo operetur calor solis in eo tempore, nulla enim differentia est inter calorem solis & ignis, quia ignis nisi velociter, iste vero tardius operatur. Possumus namque intelligere quod lapis habeat substantiam humiditatem, cum arbores & herbe in montibus & lapidibus oriuntur, quod si humores non habeant nutrir & augmentari minime possent. Completa igitur hæc dispositio quæ est propter alium morbum, oportet nos sequi ordinem hæc quoque non est propter alium morbum existens.

De hæcica qua non fit propter alium morbum.

Cap. trig. XX.

Causa hæcica quæ non est propter alium morbum humiditas est in concavitate cordis & venis & arterijs inhabitans, quæ si calefit, & à sua natura in calorem & siccitatem, propter animæ exercitationem prout diximus, mouetur sine ulla diminutione sui fiet prima & simplex species hæcicæ quæ per se ipsam est morbus. Hæc itaque facile causatur, quia calor extraneus non est nisi in humiditate sanguinis quæ in corde est & in suis venis & in arterijs, nihil enim in eo facilius solummodo calefactionem & ebullitionem. Quod si calor augmentetur & calefaciat substantiam cordis & arteriarum, æque venarum, & succur humiditas eius quæ est viscera coagulationi, fiet eipda species huius hæcicæ. Quod si plus augmentatus fuerit calor hæcicæ, ut de siccat subtiliorem humiditatem cordis & suarum venarum & arteriarum illum custodire & regere solent, fiet tertia species huius hæcicæ, hæc quoque ita accenditur sicut diximus. Hæc quæ est plenior causa hæcicæ quæ est propter alium morbum, & causa tertia quæ non est propter alium morbum, sed propter se, necesse est ut dicamus tria quæ sunt species significationes. Dicitur namque quod hæcica quæ propter alium morbum fit sicut propter ephemeram, intelligenda est ita, quoniam cum videris aliquem ephemeram habentem de angustia, tristitia ita & similibus animæ exercitationibus, & febrem peruenit usque ad tertium diem consensu in una qualitate, hæc non auguetur neque minuat, & apparens in cute ipsius obcuritas lividitas, durities & consumptio, & manus super infernum positas sentitur calor pungens & acutus, & nulla hora augmentatur neque minui-

tur aut declinat, est prima species hæcicæ febrium. Quod si appareat cum his signis augmentum febrium cum infirmum manducauerit, intelligimus secundam speciem huius feb. esse. Sed tamen subtilius oportet investigari, quod si damus ei cibum temperatum & laudabilem tribus diebus in diversis temporibus, in prima videlicet die mane, in secunda ad festam in tertio vespere, & in unoquoque horum dierum feb. augmentum viderimus, & ad corporis exteriora exire, pro tanto credendum est hanc esse secundam speciem. Causa est, quia calor infirmorum est intra corpus quietus, ad quem cum cibus & potus venerit, suscitatur & dividitur exiens extra corpus, quod testatur de calido lapide vel calce, aqua super eum incidente mox calor in interioribus eorum reconditus extra corpus egreditur. Causa est, quia aqua cum frigidiatur & humiditas calori opposita est, & aque calorem percutiens humectat eam cum sua humiditate. vnde sui speciemur pori, & veniens aqua usque ad calorem, calor suscitatur & quæ repugnat & fugit ante illam exteriora perena. Eo modo intelligendum est de cibis & potibus his infirmis facere. Quidam vero arbitrati sunt calorem febrilem fulco pro cibo augmentari, cibi enim in augmentum feb. accipiuntur. vnde feb. materiam inveniunt crescere extra corpus egredientem, & incernam ad testationem dederunt, quæ dum habet oleum crevit & augmentatur ignis. Sed postea suam destruxerunt intentionem cum hac probatione, eorum enim in diversis temporibus oblatæ febribus videtur augmentari equaliter, unde est manifestum quod calor seu in cibo augmentatur propter cibi humiditatem cui calor repugnat, sicut diuinus in calce fieri & calidus lapidibus, hæc est sententia species hæcicæ. Tertia vero plus palam patet sensui, quia facies infirmi est mutata in plures colores aut lividus, quæ significatio ostendit substantialem humiditatem esse defecitatem, & virtutem naturalem defectam esse, vires fubeiles sunt & acutæ, vultu contritus siccat cathectæ habent, quia nutrimentum ad oculos nemina non est bonæ qualitatis, quod virtus digestiva quæ defecta est minime potest digerere, permansens ergo clausus in oculorum angulis calore acris & feb. defecatur, osium quoque compositio oculorum circumdantiam moratur, & tempora sunt aspera, motus palpebrarum & superciliorum fit gravis propter siccitatem eorum, quia iactantes claudunt oculos sine ulla voluntate, quasi à somno sint gravati propter virtutis defectionem & dissolutionem, sed & manus super eos impostæ frigidi & sicci inveniuntur, & diuina ibi morata donec eorum corpora ex calore manus calefiunt, calor sentitur à corpore eorum paulatim ascendere. Quod si ventrem discoperiant, apparent quasi non habentes viscera & sæcra co-

rum est quasi tabula, & si eam eorum cum di-
gitis conlignas aliquantulum extendens, exte-
sa permanebit miuime inferior descendens, ca-
ret enim humiditate qua molli fiat, & ad suum
locum conuertatur. Quam feb. speciem si quis
iouenerit mortem proculdubio iudicet. Pulsus
eorum est debilis parvus durus & spissus, tactus
eorum quasi chorde. Causa debilis & parui pul-
sus est defectio & consumptio virtutis, spissitas
uero est propter multitudinem fumi cogentis
exire. Vrina eorum est sicut oleum in liquore
habens squamas, quæ si super petram fundatur,
sonabit quasi oleum. Causa eius est propter con-
sumptionem substantialis humiditatis in solidis
membris existentis, & hæc causa consumptionis
& dissolutionis & propter siccam complexionem
membris dominantem vocatur decrepita sen-
ctus morbus. neque sanabitur nisi cum natura
conuerfa fuerit ut auct fuit. Stomachus eorum
est quasi stomachos decrepitorum, cui impossi-
bile est ut conuertatur in ipsa qualitate qua fuit.
Sin iuvenire, unde stomachos eorum semper
est defectus, & pora occasione digestio eorum
impediatur. Similiter patientis siccitatem eo qui
hædam membris solidis, cum substantia cordis
aliquantulum patitur siccitatem cito consumi-
tur. Si uero siccitas fuerit multa, mors erit pro-
xima. Post hoc hepær & stomachus si in siccitate
moueantur periculum significatur, sed tamen non
cito mortiferum sicut sunt priora. Oportet etiã
intelligi, quia si omnia solida membra fuerint de-
siccata & uoluo tempore taliter permaneant,
necesse est ut infrigidentur, quia siccitas cum so-
la uenit, non permanet longo tempore, quoniam
membra putrumentum non inuenientia refrige-
rantur & desiccantur, nutrimentum enim coram
calidum & humidum est, sanguis. Unde cum
uidebatur membra desiccari & nullam habere
humiditatem & frigiditatem humectentur ea, si
autem fuerint infrigidata, nullam faciamus ei eu-
ram, quia molestum est.

De hætica composita cum febre putrida.
Capitulum XX. Le. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Alienus dixit se hanc febrem uidisse esse co-
positam cum alia febre de putredine, & uidisse
eam solam nullum habere commixtionem. Cui
id compositi significatio hæc est, interpolatio
febris putredinis & continuatio hæcicæ
feb. illa interpolatione prætereunte, & non pul-
sant de antiquis uisitationibus spirituum, de eius
cura cum est composita, difficilis enim est & du-
ra, quia sunt conseruati uisitationes, febri enim pu-
tridæ necessaria est resolutio & colatio eius
desiccatio, ut lauet colet & desiccet humores
qui sunt causa putredinis. Et hæcicæ conuenit
refrigerans & humidans ut refrigeret & hume-
tum

det calorem febrilem & laudabile corpori per-
sistat humiditatem. unde utraque causa est sibi op-
posita, proinde conuenit medico ut inuestiget
& studeat ne aliquam incurrat fallaciam. Vtilior
igitur est hæc cura si febr. fuerit commixta, ut eu-
stodiatur naturalis humiditas & expellatur put-
redinis materia, sed prius oportet ut causa hæ-
cicæ auferatur per contrarium, sicut labor cum
quiete, & uigilia cum somno, tristitia cum laci-
tis curetur. Similiter necesse est substantialis hu-
miditas corporis membrorum regitura custo-
diatur, & calor extingatur accidentalis & natu-
ralis confutetur, sicut cum cibis & potibus shi-
mum laudabilem generantibus & refrigerantibus,
& humores extinguantur, quemadmodum
est perisana & similia, quæ discurruntur. Causa
autem medicina quanto plura possint uisi cum magna
fuerit uetustitas, deinde eligantur medicamina quæ
est leuis & facilis naturæ, & inuestiget uirtutem
medicinæ utrum sit attenuatiua absque calefa-
ctione & desiccatione. Danda est ergo aqua sal-
cum accessio se. putredine uenerit, sicut in quo in-
cipit fieri. Quod si uomitus sponte uenerit hor-
num est, quo non ueniente si uis cum pronosa
re, necesse est ut fiat cum leuissimo uomitu. Acu-
mine autem ut febris cessante & angustia infirmi
quiescente & appetitu cibi surgente dabimus pil-
lanum & panem bis uel ter locum cum aqua tri-
gida & zuccara. Damus hordeum coctum cum
lentibus, sed leuiter sint mundatæ & elixatæ & pri-
ma decoctionis aqua auferatur, deinde miscetur
cum hordeum & ramis portulacæ & lactucæ,
cum modico rotandi recentis aut ueteris & cum
aceto & uetere & modico eroco. Si uero febr.
putredinis, hæc de phlegmate sunt ponenda inui-
cem portulacæ lactucæ aliquantulum menthe &
apij & blitis. Summo mane accipiant rosoracæ
ram cum zocaro mixta. Quod si cognoscimus
procerto calorem hæcicæ non esse mem-
brorum raritatem, & non uenisse ad humidita-
tem quæ est coagulatio uicina, & necesse erit
dare infirmo succos scariolæ lupuli & apij dā
de sunt, sed ramentum raro, nec illos sæpe assuescit
maximè succum apij, quia calorem habet & uet-
citatem. Similiter si necesse habent troisci, de
zobis accipiendi sunt siue de berbæis, aut si sunt
necessaria malix & maratrum cum rosoracæ
ra raro tribuantur, & cum necessitas fuerit agro-
tanteum oportebit omnino ab aqua frigida absti-
nere. Uterum si fuerit necessitas magna coctam
ei dabimus cum modico malix mure cum ali-
quo uisio tyropo. Quod si apostema in uisceribus
fuerit omnino abstineamus aqua frigida &
si cum enlidiuina fuerit apostema, quia salu-
da apostema trahunt ad se frigidam aquam, &
prohibent eam ut ad cor ueniat, quoniam si ad
cor uenerit cum sua frigiditate parum talem excip-
guit calorem. Oportet etiam ut cauamus ne ci-
bum

hum in accessione feb. putridæ tribuamus, neq; parum antea, quia angustiam dabit immo & febrem augmentabit; tempus etiam exacerbationis elongabit, quia si niderimus accessione manere fieri calidam dabimus aquam rigore incipiente & impediemus infirmum fugientem mala gra. in tempore accessionis, accessione uero cessante dabimus ptisanam, digesta itaque ptisana offerimus cibum secundum quod natura expetit. Si autem febris in medio diei inceperit augeri, mane danda erit ptisana, rigore uero incipiente calidam dabimus aquam ut uomitus prouocetur. Recedente quidem fe. acumine & infirmo quiescente cibabimus eum secundum q. oportebit. Quod si fecit respere incipit mane dabimus ptisanam. Cunque digesta fuerit, cibum dabimus prout oportebit, sed tamen minorem quantitatem cibi quam natura digerere naleat. Incipiente itaque rigore uomitus cum calida prouocabimus. Sufficit quantum disputauimus de hæctica quæ est cum putrida febre commixta. hæc autem est regula per quam medicus potest addere & minuire diptam secundum quod uirtutem patientis & feb. cognoscit.

De diata simplicis hæctica. Cap. XXII.

Simplex hæctica duobus modis est. aut eorpus est mundificatum ab humoribus ad putredinem præparantibus. unde oportet nos incipere eam causam hæctice expellentem per conerarium sicut diximus sicut tristitiam cum lætitia, itam cum patientia & similia cum suis contrariis, deinde expellamus materiam putrescentem cum medicinalibus cibis attenuantibus & mundificantibus absque calore, & siccitate, sicut est succus lupuli, cum rodozaccara & uiolis zuccara myrobal. manna castafistula & similibus commixtis. Cunque certi sumus quod materiam corporis sit purgata, ordinabimus aerem loca & indumenta cibum & potum odores cataplasmata & similia, & mutabimus ea ab inutilitate ad utilitatem, quia necesse est ut sit nec frigidus & humidus, nec septentrionalis, indumenta naturaliter sint frigida & humida sicut linea uetusta & loca aromatica cum sandalis & aqua ro. Cibaria sumant infrigidantia & extinguunt extraneum calorem & naturalem confortantia & substantialem corporis humiditatem custodiunt sicut sunt ptisana panis locus bis nelter in aqua frigida aut panis infusus in uino albisimo leuissimo & bene mixto lactuce portulacæ cucurbitæ blitæ ascriplices, omnia condita sint cum amygdaleon. De fructibus sicut sunt vitæque malagra. melones palellini, mala, pira, uæ hyemales, & similia. De syraps sicut malorum gra. & iulep accipiant. Mittamus in aquam quam bibere uolunt, bolum, spodium, sandalorum

albos, semen portulacæ & similia. De aromaticis sicut sunt frondes & flores confortatiui & refrigeratiui, sicut rosa salices mirta uiola nœuphar & sandali. Caveant camphœcam propter siccitatem quam habet nisi cum certi fuerimus habere in suis capitibus substantiam humidam, quæ repugnet siccitati camphœre. Sed si humiditas capitibus est parua & accidentalis humiditas, æthiophoram caueat quantum plus possint, quia rheumatia licet sit calidum, camphora tamen nocet eis licet sit frigida, quod est duobus modis. Uno quia frigiditate sua accidentaliter humiditatem repugnat quæ est in capite & eam ingrossat, unde sit causa agmentandi rheumati. Alio quia cum sua siccitate naturalem desiccant capitis humiditatem, non enim humiditas capitis siccitati camphœre ualet repugnare, nisi cum fuerit maioris quantitatis quam siccitas est camphœre. Cataplasmata uero quæ hepati sunt ponenda cõcedimus ut habeant camphoram quia naturalis hepatis humiditas siccitati camphœre repugnat & conuertit eam ad temperamentum. Sed reprehendi niderimus à quibusdam soporistis nobis questionem opponentibus de cerebri humiditate, quare inquirunt humiditas cerebri siccitati camphœre non repugnat cum cerebrum naturaliter sit humidius ceteris membris corporis. Unde respondendum erit cerebrum semper mouetur propter imaginationem & rationem, quia est suadamentum sensuum & uoluntarij motus, & sumi semper ascendunt ad illud. Calorem etiam aeris plus patitur quam hepar, ideoq; cerebrum accidentaliter est siccius hepate, licet ceteris membris sit humidius naturaliter. Nonnunquam dabimus trociscum de spodio & bolo cum syrupo quem diximus, & aliquando dabimus psilum si egestio non sit humida, solutio enim uentris in hac passione est pessima, quia materia eius acuta est & pungitua, & humores in hac ægitudine soliti sunt ad intestina descendere, quoniam membra sunt de siccitate ad dissoluendum & expellendum eos per poros qui ad interiora corporis clausi resoluuntur, descenduntque ad intestina & eisdam faciunt actiones, aut lubricitatem faciunt ut egestio nequeat retineri, ut excernat & nascitur dysenteria. Cura igitur quia usque ad hunc locum nostram diximus de spationem, & monstrauimus plane, quia curatio huius febris est cum ordinamento aeris loci indumentorum cibi & potus aromatum balnei unctionum, necesse est ut plane dicamus quomodo & ubi ordinanda uet hac omnia. Incipiendum est ab aere, quia nobis familiarior est. Igitur si tempus fuerit hyemale non tamen multum sit frigidum non debet illud aliquo ingenio ingeniari bonum est. Quod si multum fuerit frigidum necesse est illud ingeniari uidelicet panis operiantur ne frigida aeris uirtus corporis exterioribus dominetur & cutem de-

siccet

siccet atque fumios ad interiora claudat. Si autem fuerit glutinum, coisparari oportet illud ut infrigidetur & humefiat, scilicet ut mansuetum infirmis sit spaciofa & septentrionalis & portæ septentrionales. in pavimento sterneamus rosas, violas, nenuffar, basilicum, semperuiam, ramos vitium, & modicam aquam super ea roremus. Quod si corpora eorum indicant materiam ad putredinem præparatam, bonum est ut ungamus corpora eorum de succis lactucæ porulacæ vuarum amararum solati cum oleo rosaceo mixtis. hæc tamen inunctio non diu super peccora moretur, quia instrumentorum spiritus est percussus. In geniumus etiam prout possumus melius ne humiditas eorum dissoluatur. quod si uirtus eorum fuerit defecta, & membra dissoluta, & uenæ apparent albæ propter sanguinis inanitionem, ossa quoque brachia subtilissima & eorum concateatio inanita, proxima portendit mors.

Cumq; feb. aliquando per se est morbus, & aliquid per alium sicut frenesis & alij morbi huius similes, aut est per putredinem febri in quibusdam membris existens, sicut in diaphragmate pulmone, aut per diurnam causam, propter hæpatis dolorē renuū illij, necesse est ut cum ea cognouerimus esse in aliquo illorum, prohibeamus patientem ab aqua frigida, & ab unctione sicciorum quos superius diximus, nisi cum apostema per quod febris fuerit sit calidissimum. Deinde et ea modicum dabimus, quia calid. apostema trahit ad se humiditatem aquæ, & prohibet eam ne ueniat ad cor & noceat calori naturali. Quod si apostema non fuerit calidissimum, abstinemus eos ab aqua frigida, & mitigabimus calorem eorum cum aere cibo frigidiq; aromatibus. Vnde Gal. aqua inquit frigida in hæctica quæ est propter alium morbum pestima est, præcipue si morbus diuturnus fuerit. Causa quia morbus qui causa est hæctici necesse est ut sit calidus sicut frenesis & similia, aut diuturnus sicut putrida fe. erratica cõmixta & similia. Si vero morbus fuerit acutus morans paruo tempore percussus substantialem corporis humiditatem & desiccavit eam & dissoluit uirtutem membrorum. unde calor cordis est defectus & nequit humiditati aquæ repugnare. sic ergo humiditas aquæ causa est caloris naturalis extinguendi. Si autem morbus fuerit diuturnus, consummatuit sanguinem membrorum & emundauit eum à carne. unde membris infrigidatis calor deficit naturalis, necessario igitur calor cordis sit defectus. proinde frigiditati aquæ calor cordis nequit repugnare aut resistere maxime si fuerit materia in uenis & arterijs ad putredinem præparata, quia humiditas aquæ illā augmetur & materiam indorat ut nequeat digeri. præcipue si in urina nullum signum decoctionis appareat. Palus ergo intelligimus, quod nullo modo danda est aqua in hæctica nisi cum ipsa

morbus per se fuerit, si uirtus eorum instodita sit. quod si uirtus eorum debilis sit caueant aquam. Vnde oportet arbitrari qualiter corpora eorum humefiant & confortemus uirtutem eorum cum cibis qui sunt faciles ad digerendum & multum nutritiles, quia sanguis corporum eorum licet sit laudabilis, tamen modicus est, similiter spiritus animalis, & uitalis, & propter sanguinis paruitate membra minus uiuunt quæ sunt totius corporis fundamenta & per paruitate aialis & uitalis spiritus deficit calor naturalis. unde necesse est festinus nemus ad restauranda eorum corpora & in uirtute & nutrimento cum cibis & potibus qui sunt faciles & subito & multum nutritiles. sicut est uinum album & grossum & rubei grossum. Sicut Hipp. in Apho. Facilius est repleri potum cibo, sed tamen prout oportet dandum est ei & quod oportet, hoc est non purum nec icuinus ut præstet membris maxime stomacho calorem & succum, sed non debet accipi multum & subito ut intras uelociter exeat nec membra nutriat. nec multum grossum ut morans in angustis locis oppilationem generet, idcoq; oportet nos illud negare & egritudinem exuentibus & maxime hæctici, cibum accipiant modice, facile nutriendi & quiddam grossifici habentem ut permanent in membris nutriat & confortet ea. Neq; intelligere debemus ut Hipp. intentio esset de potu absoluto uel de humidis cibis absoluto, sed cõuenit nobis noscere, quia eius intentio fuerit de rebus nutritiibus leuiter & faciliter sicut sunt uina grossificata aliquid habentia & in membris permanentia ut nutrimentum eis inferant. De cibis similiter facile nutritiuis & naturæ obediens sicut sunt lac panis sana panis lotus & similia. Hæctici uero cum pro certo noscunt febrē cessauisse, nec alia re indigent nisi augmentatione & nutrimento corporis, accipiunt mano lac caprinum in quo statim emulso miscetur in eadē quantitate calid. aqua & ad suauē ignē coquatur quousq; tota aqua consumatur, deinde potui detur calidum prout ab uberibus emulsum fuerit. quo cibifico tempore expectetur quo digne sit fuerit. deinde dabimus sturni perdes pullos & similia. oia inscellata, uinum album & potum mediocriter bibant. Quod si non potuerint solum lac bibere miscendum erit cum hordeo & similia critici & similibus secundum quod uirtus digestiua eorum fortis fuerit. Sed tamen si cognoscimus corpora eorum nullam habere materiam seu humores qui sint ad putredinem præparati, cauendum erit ab eis cibis & dabimus solum modo pisanam & panem lotum. maxime si in eorum egestione cholera appareat. Vniuersaliter etiam dicimus quod non debemus dare lac perdes & his similia, aut uinum ponticum nisi cum certissime cognoscimus febrem ab eis esse ablatam, quod cum palam nouerimus balneabimus eos in balneo aquæ sapide temperato in aere, & calor aquæ sit quasi

quasi calor lactis cum ab uberibus est emulsum, & ingeuimus ut balneum mansioni eorum sit uicinū. & ducatur in culcitra aut in lecto ut morio eorum pedibus enutium duo nocumenta faciat, aut faciat ossificiores, aut calefaciat & de biliet eos ut in balneo stare nequeant, quia necesse est eis in solio balnei diu morari, quia aqua solij quæ est temperata præstat corporibus eorum humiditatem augmentum & uirtutem. Oportet ideo ut sit solium spaciosum & hostio balnei uicium ut non ambulēt per aerem balnei ne parua eorum humiditas substantialis desiccetur, & oportet ut aqua balnei maxime temperata sit, quia calida si plusquam oportet fuerit, coaduuabit cutem plusquam oportet & indurabit eam. Si uero frigida plusquam oportet debilibus corporibus tribuet frigiditatem, & calorem extinguet naturalem, cutem claudet & oppilabit, & secundum nostram intentionem horum pori debent speriri & cutis mollificari, quia sunt in istis clausi & oppilati naturaliter, quia sine consumptione humiditatis res nulla potest iuueniri dilatans & aperiens poros corporis eorum sicut facit aqua quæ est temperata calida: quia membra corporis delectantur in ea, & natura excitatur & per totius corporis membra dilatat propter aque delectationem quæ est eis similis. Vnde natura se delectante sanguis eam sequitur, & ueniens usque ad corporis exteriora poros mollificat aperit & dilatat: quia actio nature in hoc loco quo delectatur est opposita actioni loci quem odit, quoniam à re uocitua fugit natura ad interiora corporis, unde extremitates de sanguine & naturali inaniuntur calore, proinde patiuntur oppilationem & duritiem in cute. Oportet igitur iterum nos inuestigare ut diffiniamus quantum patientes morari in balneo debeant, quæ mora talis sit, quia si uiderimus rubicunda & inflata fieri corpora priusquam consumi & minui incipiāt eos à balneo extrahimus, quia si dimittimus eos plusquam oportet consumabuntur. Ideoque cum uolumus carnem in corpore augmentare, dimittimus eos in balneo quousque fiant rubicundi & inflati. Si autem eam minuire uolumus post inflationem dimittimus eos in balneo donec inflatio transeat, & ipsi ad suam naturam fuerint conuerſi, sed cum decet inuestigare illa tempora, quia sunt uultus stricta & acuta præcipue per carnem uolumus augmentare, propterea ueris terminus cum à balneo debet egredi, est robur corporis ne ipsi ultra permanētes ad deterius neniant. Egrediētibz itaque à balneo ungamus corpora eorum cum oleis frigidis & humidis, uel uinguētis ut custodiāt humiditatem quam ab aqua acceperant ne aer illam consumat. Rursus oportet ut diuersis temporibus balneentur. Primum balneum sit mane priusquam accipiant lac aut pisanā ut iungidat & refrigeret corpora eorum, secundo die uespere postquam lac & cibus sint digesti.

Quod si uirtutem infirmi forte prospexeris esse ut possit amplius balneari bonū est. bonū etiam est si lac super infirmum fuerit emulsum priusquam in solium descendat, & mittatur in balneo frigidis frigidæ & humidæ sicut latuæ uenularum uio la & similia. Si autem infirmus est ab humoribus muudificatus ad putredinem se præparantibus, damus eis balneum exentibus lac asinum cum ab uberibus fuerit multum. hoc, u. lac huic passioni est optimū, quia ceteris subtilius & tardius ad coagulationem, sed oportet eligi aliud iuuenē & sanam, & probare eius lac utrum sit albu, ueque naturaliter liquidum neque spissum multū, & nutriamus eam cum lactuca semper uia coriandro & bono hordeo, & bona aqua. lacte uero digesto iterum ad balneum mittatur. Quod si balneo patientes delectantur eo quod eis assuetū fuerat, tertio ad balneum deducantur, sed spatium sit unius ab alio quinque horis, postea comedat perdicem pullos gallinaceos & alas gallinarum. caueat ab omni cibo graui, sed oportet cibi quantitatem fieri talem quæ stomachus non grauetur. quod constitui possumus hoc modo, quasi niderimus cibū & patientis stomachum extensionem patiatur & acidum & fumosum ructum faciat, cognoscimus eos non bene digerere. unde cibi quantitatem decreſcimus adeo donec prospiciamus eam optime esse digestam. Rursus si niderimus eos multa quantitate refectionis carere, dabimus lac uacinum, prius tamen butyrum ab eo sit extractum. Deinde prima uice dabimus ei. 2. v. sicque ascendamus usque ad quatuor. Et quoniam lac nominauimus illud determinare uolumus cuius horum conueniat & cui non. Vnde dicimus quod cum lac ceteris cibis est facilius & omnia corporis membra nutriet, erit omnibus nutritibilis & laudabilis ad phisim maxime qui alium nequeunt sumere cibum. & laudabilis est lac muliebri, maxime si puella lactauerit, post hoc est asinum: sed tamen quidā odiunt utrumque: & quia eis abominabile est, oportet dari caprinū. Est. u. mediocre inter subtile & grossum, sed priusquam demus illud, decet poni caprā in loco puro, & nutriamus eam cum bono hordeo & herbis sicut coriandro lactuca frondibus celsi & hisi minilibz, & caueamus ut infirmus patiatur solutionem. proinde oportet bis uel ter calidum lapidē in lacte extingui ut aquositas eius consumatur. Quod si uirtus eorum fuerit confortata dabimus eis sacros fluuiales coctos cum hordeo uel pisanā & similia. Igitur quia sufficienter de lacte disputauimus, oportet nos quibus conueniat aquæ frigidæ potus monstrare, uel aliter res frigidæ. Sed priusquam dispositionem earum incipiamus, monstrabimus quæ sint frigidæ aut calidæ absolute sine alicuius rei comparatione. Phisice itaque concordant dicentes nullum corpus esse salidum, frigidum, humidum aut siccum absolute

solute sine alicuius rei cōparatione nisi elemēta solum. Dicūt enim se reperire ignem calidū nō ad alterius rei cōparationem, quia si esset calidus ad cōparationem alterius, necessario esset frigidus ad alterius cōparationem. Nosq; nullam rem inuenimus igne calidiorē. Ergo cum dicimus calidum frigidum humidum aut siccum, non dicimus nisi ad cōparationem humanorum corporum quę sunt temperata: quia humana corpora ceteris corporibus sunt temperatiora. propter hoc cū aliquam rem inuenimus nullam passionem nostro sensui inferētem, sed eo delectantem eiq; conuenientem cum quadā similitudine, intelligamus eam esse temperatam quā humani corporis tēperiem. Rursus si aliā reperimus qua noster patitur sensus, sed tamen sine illius doloris horribilitate, intelligimus eā temperamentum humani corpora trāgressam esse uno gradu. Iterū si aliqua res maiorem sensui faciat passionē, & tamē eā tolerare ualeat, dicimus eam duobus gradibus ultra tēperamentū esse. Si autem adeo sensui dominetur ut dolotē generet, in tercio gradu cognoscitur esse. Si uero magnum faciat nouementum uel destruat sensum & coniungat membra sensus, in quarto nō dicitur esse. Palam est quia calidum & humidum frigidum & siccum sunt ad cōparationem humanorum corporum temperierum exceptis solis elementis. vnde conuertamus stilum ad eos qui bns conuenit aqua frigida & alia frigida & qui bns non. Cum hæc tria si per se morbus simplex & corpora patientiū sunt absq; ulla putredinis materia, opimum est ut de his cibaria infri gida naturaliter, eaq; artificialiter frigidiora faciamus, sicut sunt pūsana panis lotus lactuca, cucumeres palestini. Ex aqua demus frigidam prout oportet maxime si uirtus eorum non sit imbecillis, & si digestio appareat in urinis. Quod si hæctica propter alium morbum fuerit acutum uel diuturnum, prohibeamus aquam frigidam & alia infri gida prout melius possumus, maxime si nullam signum digestionis appareat in urina, & corpora non sint pura de materia putredinis generante. Causa huius morbi modis est. Vno quia membra corporū egri tudinem patientium olim sunt defecia, & calor eorum debilis est & parus unde aqua & alia frigida sunt membroitum percussus & naturalem calorem extinguunt. Quod si corpora eorū fuerint immodica propter aliquod apostema nel crudorum humorū reliquias, aqua & cetera frigida indurant & ingrossant eos ne nequeant digeri. Vini uero natura quia calefacit & naturalem confortat calorem, oportet consumpta corpora propter diuturnum morbum habentes accipiant moderate, tamen mixtum sit & album & lene. Consumptio nero corporis quę est sine feb. & causa eius est substantialia humiditas cor

poris consumptio, & naturalis calor eorum extinctus est propter sanguinis paruitatem, oportet ut restituantur cum corporis calefactione. Incipiamus a modico calore & casimodice ad maiorem ascendamus ne subita corporis mutatione infirmus deficiat. Demus itaq; syrupum de zinzibere & iringorum radice, pecorinam carnem, uinum non multum uetus, ne dolorem capitis faciat & corpora eorum deficiet. sedeant in aqua in qua tota sint sāsucus basilicę, yreor, frondę citruli, fumigenter de ligno aloes, caueant omnino a coitu. Quorum uirtus si augmētari incipiat dabimus tyriacam & muscatam. Plus itaq; si sint confortati balneentur & balne egredientes comedant annualem agnum, uiscelatum conditum cum spica & zinziber, & bibant uinum ut prouocet eis somnum. Si aut aliquam patiatur febrem modicam uidelicet aut tussim et si screant albu uiscosum & grossum, dabimus eis apozimata de hyssopo, & electuariū quod reipit sebesten. l. iuiubas. 30. liquiritiæ. unei. 7. uuarum passarum enucleatarum. drag. 15. capillorum ueneris. vnc. 2. ficus siccas. 10. omnia in 10. libris aque coquantur usquequo ad duas redcant, da exinde. vnc. 4. colatas ad bibendū cum vnc. 1. de rodazac. postea comedant ius frumētī & sænugreci. & accipiant electuarium quod recipe se. lini. vnc. 1. sem. orobi. vnc. 1. medullę se. bombacis. vnc. 1. succi liquiritiæ. vnc. 2. fac polu uerē & cū oleo amigda. frica, deinde adde aucca, quod sufficit. Alias Rec. succi caulium lib. 3. mellis dispumati lib. 1. coquantur usq; ad mellis redierint spissitudinē, postea medullas fistici quantum sufficit tere & cum melle tempera. deinde cum potui dare uolueris da eum lacte caprino aut alinino nel pecorino coctis cū dra. 2. leuisti ci. Alias Reci. maratri radici, apij radici ana. vnc. 2. anisi. drag. 2. malug seminis. drag. 3. lini seminis. dra. 3. iuiubas. 10. licus siccas. 5. vnarū passarū enucleatarū. dr. 5. hæc omnia in 8. lib. aque coquantur vsquequo ad duas redierint: dabis oī die ad bibendū. vnc. 3. cum rodazac. violazac. ana. vnc. 1. Quod si calorem non habeat tēpusq; non fuerit hyemale cum melle. vnc. 5. accipiant illud. Trocisci ualētes ad physicos empiricos cat diacos qui. Rec. gummi ara. berberis boli. ana. dr. 4. ro. spodij. se. portulacę ana. drag. 3. & sem. cancerorum fluuiualium assatorum. dra. 7. basiliconis amoglossę se. boragi. an. dr. 2. coriadi sicci. drag. 2. le. infusi in aceto & ad solē siccati postea assati. dragaganti, amidi, semi. citruli, cucu. ana. dr. 3. se. mirtæ. dr. 4. se. malorum citoniorum. se. herbę acetose ana. dra. 2. liquiritię. drag. 3. reub. dra. 1. se. cacabrę gemmarum non perforatarum ana. drag. 3. omnia tria cum aqua rosaces. temperentur & trocisci ex eis fiant. dabis exinde. dra. 2. Alij nalescentes simili modo. Rec. berberis sand. al. spodij. ana. dr. 3. rosarum. dr. 5. se. portu

laccz, citru. cucu. cucur. ana. drag. 1. sem. dragagati gummi ara. amidi ana. dra. 3. boli. drag. 4. herbz acetosæ, cacabræ, gemmarum non perforatarum. ana. dra. 2. tempera cum succo arnoglossæ. Alij Rec. spodij. bol. ros. ana. drag. 4. gummi arab. dragaganti se. arnoglossæ ana. dra. 3. feminis papaveris drag. 5. se. portulacæ. se. a. riplicis. an. drag. 3. berberis. drag. 2. fac puluerem & tēpera cum aqua rosacea. Alij ualentes propter lenteriam frigidam Rec. ro. spodij ana. drag. 4. se. mirthæ herbæ acetosæ ana. dr. 3. se. portulacæ fumæ. ana. drag. 5. se. maligranati. dr. 4. boli. dr. 5. gūmi arabi. drag. 3. hypoquistidos. drag. 3. puluerizentur & cum succo citoniorum temperetur, da potui cum syrupo citoniorum. Alij ualentes cōtra dysenteriam cum tnsi quam phtyfici patiuntur. Rec. gūmi se. citruli. ana. drag. 3. se. basiliconia. dr. 2. se. sem. mirthæ. dr. 3. herbæ acetosæ. drag. 4. semi. portulacæ. dr. 3. hæc omnia affata iu puluerē redigantur. dosi eius. dra. 3. cum syrupo mirthæ. Electuarium conueniēs phtyficis tussim habentibus confectum cum syupo uiolaceo, maxime quibus in pulmone & pectore descēdunt humores grossi & uiscoli. Rec. febe. se. iuiubas. l. uvarum passiarum enuelcatarum. dr. 20. se. maluz. dr. 3. cancerorum lauorū & assatorū. dr. 20. capill. ue. arnoglossæ ana. dr. 5. liquiritiæ. vnc. 1. omnia in. 7. libris aquæ coquantur quonq; ad duas redeant. Deinde. vnc. 4. sapæ adde & zucca. vnc. 4. iterum usq; ad mellis spissitudinem coquantur. Deinde accipe gummi dragaganti. se. citoniorum an. dr. 8. se. cucu. vnc. 1. amigdalārū dulcium. vnc. 8. se. portulacæ. dr. 6. amidi. dra. 8. se. papaveris. al. drag. 6. fac puluerem, & cum superioribus tēperetur. Pilulæ quæ sub lingua positæ ualent cōtra tussim. Re. gummi dragaganti. se. portulacæ. se. citoniorum. ana. drag. 4. se. cucu. drag. 5. amidi. drag. 3. amigda. drag. 6. fabæ mundatæ. dr. 2. se. maluz. drag. 3. liquiritiæ. dr. 5. omnia in puluerē redacta temperentur cum succo psilij. Cataplasma cōtra tussim pectora humectans. Rec. maluquisci, radicum & frondium maluz. an. dr. 4. dragaganti. dr. 2. ceræ albæ olei viol. ana. vnc. 3. fac cathaplasma. Troiscisci nales cōtra sanguinis sreatum qui fit phtyfica. Rec. gummi dragaganti se. portulacæ. ana. dr. 5. succi liquiritiæ. drag. 6. boli. chimoleæ. ana. dr. 5. succi hypoquistidos acatiæ. ana. dr. 3. coralli. cacabræ. ana. dr. 4. spodij. drag. 6. rosarum. drag. 4. se. mirthæ. drag. 4. coriandri infusi & affati dra. 7. tempera cum aqua rosacea. Cataplasma cōtra sanguinis sreatum & tussim & febris calorem. Rec. cucurbitæ trixæ quasi medullæ. drag. 4. camphoræ. drag. 1. sandal. al. & rub. dr. 2. rosæ siccæ. drag. 2. sem. ceræ al. vnc. 30. olei rosati. dra. 1. fiat cataplasma. Syrupus iuuans sanguinem sreatantes. Rec. succi arnoglossæ, succi cucur. cucu. citruli. aquæ rosacæ. an. lib. 2. succi mirtillorū lib. 2.

succi pomorum citoniorum. li. 5. omnia coquuntur donec fiant quasi sapa, deinde cum aqua frigida potui detur. Electuarium ualēs cōtra humores sanguinolētos qui sunt in pectore & pulmone, & calorē extinguit, vulnera pectoris sanat. Rec. amidi. se. citoniorum. an. drag. 5. fabæ. boli. ana. dra. 7. se. maluz. se. melonis. aua. dra. 3. gummi. dra. 30. dragaganti liquiritiæ. an. dra. 3. omnia puluerizata cum sapa temperentur. Quod si non fuerit febris nec humores grossi & conuenit melius mundificari, iungantur orobi. dra. 7. hyssopi. dra. 8. marathi se. apij. ana. dra. 2. & sem. Si uero humores fuerit grossiores putrefacti se. fenugreci. se. lini. carui, equali pōdere cum oleo amigdalino & melle temperabimus. Alias Rec. prasilij orobi medullæ se. bombacis. aua. drag. 4. se. lini. fenugreci. drag. 2. omnia in puluerem redacta cum melle temperentur.

De febre accidentē propter dolorem hepatis splenis vel alterius membrīs. Cap. XXIII.

Quia disputauimus de febr. in spiritu nascentibus & ephimeris, & de eis quæ sunt in solidis membrīs. i. hæc triæ & de utriusq; acutis, quarum una nascens est de cholera rubra. sc. caufon, altera nero cuius est purus sanguis materia dicitur & vocatur inflatiua, oportet nos ordinatim de febris putridis disputare. vnde primum dicendum est quid sit putredo, & quia causa generatur, & quomodo & quæ complexionis putredinem cum suis qualitatibus recipit, & quæ non cum una qualitate, & quæ non recipit eam nisi accidentaliter. Vnde dicamus quæ omnis complexio quæ est extra naturam & temperamentū sit quadrupliciter. prima ca. & hu. secunda est ca. & sic. tertia fri. & hu. quarta fri. & sicca quarum nulla putredinem recipit nisi ca. & hu. putredo. in ea naturaliter est. Causa quia putredo necessario generatur ex humiditate qua liquefit & materia diuiditur dilatās eam ad extremitatē, & faciens eam habere motum facilem currendi. Item necessarium est ex calore calefiat perturbetur & seruetur. vnde nō naturales chimæ qui sunt contra cal. naturalē cum ebullierint seseq; perturbauerint, sit eorum ebullitio extra actionem naturæ, quæ ebullitio & perturbatio cum fuerit non ex actione naturæ eius sex permanet in ea neq; diuiditur, vt mundificetur & expellatur. vnde sit causa materiam convertēdi ad corruptionem & putrefactionē, quia putredo nō est aliud nisi corruptio humidorum & liquidorum corporum propter ebullitionem & turbationem extranei caloris ueniens. proinde putrefactio non est nisi cum qualitatibus ad exteriora se mouentibus. i. calore & humiditate. quia humiditas cū dilatat & eliquat materiam, & eam diuidit in exterioribus faciens eam currere inuenit locū caloris quo possit bullire & turbidam eam facere quam

quam calor perturbans, & tamē nondum suam complens digestionem neq; partem illaudabilem à laudabili diuidens se miscens utraq; eorumpit eamq; putrefacit. pars enim illaudabilis à laudabili non potens diuidit ac mundificari corrumpit eam cito ac putrefacit. Qualitates autem quarum motus ab extremitatibus ad centrum reuertitur sicut frigiditas & siccitas non recipiunt putredinem, quia siccitas desiccatur coadunatur & repugnat dilatationi & diuisioni. sic etiam frigiditas congelat refrigerat & resistit calori & ebullitioni. eodem modo si quædam res fuerit cōposita ex duabus qualitatibus contrariis cum una mouetur ad interius & cum alia ad exterius sicut calore & siccitate humiditate & frigiditate quæ non recipiunt putredinem, quia calor licet materia ad extremitates suas dilatat siccitas tamen coadunatur & desiccatur eam & prohibet eam dilatarī & bullire, similiter & humiditas quæ uia materiam humefaciat & dilatat & currere faciat ad exteriora, frigiditas tamen congelat & in grossat eam & prohibet ne actioni humiditatis obediat. Palam ergo est non posse fieri bullitionem & putrefactionem nisi cū humiditate mollescente & dilatanre & rem cōgrere faciente ad extrema. Res ergo quarum species non diuiduntur cum dilatantur & bulliunt necessario putrefiunt, nam bullitio non est nisi propter calorem & humiditatem, quæ enim in aqua cōquuntur dissoluuntur & mollescentur, quæ uero assantur desiccantur & indurantur.

De causa putredinem faciente. Cap. XXIIII.

PRior causa putredinem generans cōstipatio est corporis & pororum oppilatio & conclusio humorum in eis, potest enim clausis & cōstipatis necessario fecerit tertiam digestionem in interioribus corporis remanent, quibus uō aliquid euenit propter quod defluant sicut calida cibaria & cōuertibilia, aut corruptus putridus aer sicut de corporibus mortuis exiēs corrumpit omnium corporum cōplexiones & generat pestilentiam & pessimam in eis mortalitatem. Causa cōstipationis pororum generaliter in duo diuiditur, aut de interioribus aut de exterioribus. De exterioribus sicut de aere frigidissimo balneis stipticis & sulphureis aluminosis uel nitrosis. De interioribus uero sicut grossis humoribus & viscosis in interioribus corporis coadunatis, propter requiem & delectationem & exercitij ablationem assiduitatem grossorum & viscosorum ciborum & multæ quantariis non secundū ordinē acceptorū, neq; cū stomachus sit inanitus. quia multitudine requiei & suauitas corpora infrigidat. unde cibus nō digeritur sed ingrossatur, unde & humidus efficitur, proinde superfluitas tertie digestionis ad poros cutis ueniens grossa & viscosa & non potēs

egredi claudit & oppilat poros cutis, sicut fecerit uini claudere foramina colamenti & prohibere grossitatem uini ne exeat, eodem modo fit si cibus grossus & viscosus sit naturaliter, multū est comedere uirtutem aggrauat, unde nequit eum digerere & permanet crudus. Similiter cibus acceptus priore nondum inanito indigestus permanet, quæ oīa sunt cā grossitatis & viscosi satis humorū. balneo et luti cibo nondū digesto calor balnei irahit cibi humiditatem ab interioribus ad exteriora. unde pro sua cruditate non potens egredi cōstipat poros. Præterea quæ comedunt ultra quā uirtus rolarare queat, quo incipient digerī, alius sumitur node priore egrediente rrahitorum eo qui nōdum erat digestus qui necessario descendens ad poros ueniens cum sua grossicie & viscositate poros oppilat. hæc sunt causa putredinum feb. putridas facientiū. Significationes aut putridarū febriū sunt. 10. Prima est quoddā præteritū & in corpore inueteratū, cuius feb. non nascitur de præsentibus rebus aut exterioribus nisi fiat accidentaliter. uer. gra. ephimera de præsentibus exterioribus causis nascens est inueniens aliquid in corpore inueteratū calefacit & putrefacit illud. præsens ergo est causa quædā accidentaliter putrefaciens rem antecedit r. sicut uidemus nūc accidentāliter extremitates corporis urere & eius iuncturas separare, quia p. p. nimitatem suę frigiditatis calor ad interiora coadunatur incidit & urit extremitates. nix ergo est cā inflammationis licet nō sit naturaliter. Secundā significatio quia rigor semper antecedit putridā fe. & frigus maxime si materia sit extra uasa & lenislibus mēbris uicina. sed tamē nō oēs febres rigore uel frigore habentes sunt putridæ, quia aliquādo rigor accidit ephimerę accidentāliter. Nā ephimera si malos in corpore chimos inuenerit calefacit eos & fumū prouocat quo se sibi libi mēbra pūgēt rigor nascitur, t. s. n. rigor nō d. in permanet. Rigor autē differt à frigore, quia in rigore sentit patiens punctiōem quasi acus & spinæ sint in eo infixæ. & non permanet diu quia causa huius sunt acuti sumi citum exitum habentes. Frigus sentit infirmi quasi niuis cōgelatio sit in eis mixta, quia causa eius sunt chimi graues & tardi ad mouēdum. Tertia quia putrida interpolatur & multis interpolationibus interpolatur nisi paruissima & leuissima materia erit, unde disputamus de causa suarū interpolationū & diuersitate. Unde dicimus, quia cā putredinis febris est materia in corpore diu coadunata. quæ uel de quatuor humoribus est mixta uel est pura. Si sit cōmixta interpolatur indefinitę. Præterea cā putrefaciens materiā. sc. calor nō naturalis est qui si inuenerit materiā putredini obediēt cōuenientē calori obedit, si uero a diu ni eius repugnat, proinde sanguis qui cū utraq; qualitate cōuenit putredini cito extrinsecus obedit

calori. vnde fit feb. continua. Interpolatio enim non est aliud nisi propter materiam extraneum calorem impediens eum sua duricia quam necesse est ut calor extraneus diu durice deinde calescat, & eam feruere faciat. Idcirco cholera quia cum una qualitate putredini conuenit, & cum alia non, fit cum calore conueniens, cum siccitate uero impeditur calor donec illa siccitas suae actioni obediat. Phlegma quoque quia cum una qualitate putredini obedit. i. humiditate, & cum alia non conuenit. i. cum frigidityte necessario calor moratur in frigidityte quousque suae actioni conueniat. Cholera nigra quia cum utraque qualitate putredini repugnat, multum impedit calorem naturalem uel extraneum proinde interpolatio eius tardior est ceteris. Quarta significatio est quia calor putridae febris est fortissimus & sensum pungitius, nam manus super patientem posita cum febris ad eam sentit percussionem caloris magnum perforantem, manu etiam ablata permanet calor. Quinta significatio est quia peryodica febris maximam generat angustiam propter grossitatem fumi putredinis in stomacho bullientis, sed si materia sit subtilis & uirtus sit fortis fumus eius dissoluitur, & patientis quiescit, pulsus temperat & conuertitur ad suum ordinem. Quod si sit grossa & humida tarda que ad mouendum, naturam aggrauat ut praeter eius dissolutione deficiat, vnde fumus ingrossatur in corde & angustia augmentatur, pulsusque non conuertitur a sua innaturali qualitate ad naturalem. Sexta significatio est quia in statu peryodicae febris significationes ostendunt complementum putredinis. i. dolor capitis sitis siccitas oris & angustia. Septima significatio est quia corpora in putridis non mundificantur cum febris in una qua quiescant accessione, quia materia putredinis est in interioribus corporis clausa. Octaua significatio quia putrida materia si sit intra uasa fit calor inseparabilis, qui licet aliquando separetur aliquantulum tamen sentitur, quod si sit extra uasa fit cum interpolatione. Nona significatio est, quia urina in initio putridae crudae est propter cruditatem materiae. Decima significatio est, quia pulsus putridae durus est & plenus, quia uasa sunt plena grossis & crudis fumis, nam omnia patientes hanc febrem non sudant in initio. Sed peryodica ad augmentum ueniente fit pulsus in prima accessione parvus & uacuus, cessante autem rigore & calefacta materia fit pulsus plenus se ad exteriora dilatans cuius dilatio maior est quam contractio. Sed quidam medici attributi sunt quod paruitas sudoris in principio febris putridae existens sit propter caloris fortitudinem corporis humiditatem paulatim extenuantem, quod falsum est. quia si paucitas sudoris fuisset causa caloris humiditatem defecantem pulsus esset inanitus & uacuus. & nos in initio febris peryo-

dicam uidemus pulsus esse plenum & durum. Sudoris ergo paruitas in initio peryodicae febris est propter grossitatem materiae & duriciem eius ad dissoluendum inobedientis. Sufficit itaque quantum disputauimus de causa putredinis febris faciente. Incipiamus ergo & dicamus de unaquaque specie prout ratio postulat, & quia in epidimia Hippocritus semper medicum sequi debere actionem naturae, oportet nos suam auctoritatem seruare, sit enim oportet medicum ministrum esse naturae. Quocirca incipiamus a synocha quae fit de putredine sanguinis, quia sanguis est principalior ceteris humoribus, & hoc tribus modis. Vno, quia est temperatior & saporosior ceteris, proinde fecit eum natura esse materiam & nutrimentum totius corporis. Alio cum sit acceptabilior ceteris elementis sensu naturali & animalis, fecit eum naturam materiam & primum in adolescentia ad sui uidelicet nutrimentum, quia propter debilitatem suorum membrorum adolescentem nequeant pati nutrimentum alterius materiae quae sit longe à temperamento. Tertio propter amorem eius quae dignitatem fecit eum maioris quantitatis quam ceteros & diuisit eum per totum corpus. Igitur quia uidemus tantam naturae esse dilectionem in sanguine, ut eum dignior rem faceret, oportet ut à principaliori & naturae familiariori incipiamus. Sed si quidam interroget quid differat inter sensum naturalem rationalem & animale. Respondemus sensus tripliciter diuiditur, alius est animalis, alius rationalis, alius naturalis. Naturalis est in omnibus membris animalium, quia sentiunt materiam quae est eis similis vnde eam per se trahunt, sicut felliculus amaritudinem sanguinis sentiens, & eam ad se trahens, & sic unum quodque corporis membrum suum simile ad se ducit, quemadmodum ossa quod frigidius & siccus est ad se trahunt, caro & lacerti quod calidius & humidius est, cerebrum quod frigidum est & humidum. Animalis autem sensus est sicut lingua quae sentit saporem, oculi quoque qui sentiunt colorem formam & figuram, aures autem quae sentiunt sonitum & similia. Rationalis sensus pertinet rationali animae ut comprehendat rem certam rerum uirtutem & uerum à falso discernat.

*De synocha quae fit de putredine sanguinis.
Cap. XXV.*

Sanguis secundum cursum naturae existens in uenis & arteriis clauditor, quia sentit eius uir per quas per totum corpus diffunditur & ipsum nutrit, qui cum à suo naturali loco disgregatur, non custoditur à natura, sed eius regimen dimittit vnde corrumpitur, & in diuersos morbos mutatur, maxime si ultra mensuram naturalem egreditur. Quod si in suo permanserit loco & agit quod proprie

proprie facere debet, nutrimentum & regimen-
tum omnibus membris tribuit. Sed si in quantita-
te augmentatur, mutatur à sua propria qualita-
te. vnde odit cum natura eiusq; regimē deferit
vnde permanet crudus & indigestus & corpus
nō nutri, necessario putrefit & se. putridā gene-
rat, quæ synochus appellatur. Quod si repeten-
dunt nos quidam dicentes cūr accidit sanguini
putredo cum sit amicus naturæ & per eum rega-
tur & nutriatur corpus. Respondemus sanguis li-
cet sit amicus naturæ, tamen cum augmentatur
aggranat naturā unde odio tenetur ab ea, sicut
pater odit filium cum ei inobediens sit: sanguis
eodem modo à suo temperamento egressus à
natura rejicitur & per nares eiicitur aut per a-
lias partes egreditur, quem quidem si non po-
terit expellere dimittit eum vnde putrefactus
febr. generat synochum. Diximus quoniam
sanguis aut est intra vasa, aut extra corpus, aut
solummodo extra vasa. Sanguis autem qui
est extra corpus, aut est actione naturæ secun-
dum crism, sicut videmus in die cœtica sangui-
nem fluere per nares, per hemoroidas per men-
strua, aut non secundum naturā propter aliquod
accessionis accidens naturæ eam cogens ut ex-
tra eiiciat sanguinem. Quod autem sit interius
aut exterius. exterius sicut incisione gladii, aut
his similibus. Intrinsecus vero cum aliqua pectō-
ris vena rompitur, aut propter multitudinem
sanguinis vel organorum sanorum angustiam.
Sanguis autem qui solummodo extra vasa est,
aut est in toto corpore, aut in uno loco clau-
sus. Si in toto corpore fuerit generat tumorem
ruborem calorem in toto corpore. Si fuerit in
uno loco & maturatus mutatur in saniem. q̄ si
non digeratur generat tumorem ruborem in eo-
dem loco. Sanguis vero qui est intra vasa, aut
est in omnibus vasīs, aut est in quibusdam. Si
fuerit in omnibus synochum generat si in aliqui-
bus facit in illo loco feb. & ab eo nomē accipit,
quam cognoscimus ex calore & dolore illius lo-
ci. Sed disputatio nostra non est de febre quæ
fit in parte corporis, sed de illa quæ fit propter
sanguinem in omnibus venis putrefactum. vnde
priusquam de ea disputemus oportet nos mō-
strare causam illius caloris generatiuam. Qua
de re dicimus, quia causa quæ calor generatur.
6. modis est, quinque sunt calorem facientes &
unus passivus, quorum primus est calor solis ig-
nis & æstus. Secundus calida cibaria & potus ac
medicina. Tertius nimis motus & labor inci-
dentes substantiam membrorum, propter mem-
bra ad invicem se fricātia. Quartus est putredo.
Quintus est conclusio pororum. Sextus est ma-
cilitas corporis & paruitas sue naturalis humidi-
tatis, quia corpus si in hac mensura fuerit sit
preparatum ad recipiendum calorem. Ex quia
hic sex sunt causa caloris & feb. non est nisi ca-

lor extra naturam, necesse est ergo ut hic sex sit
causa feb. Sed si fuerimus interrogati quæ sit dif-
ferentia inter feb. synochum quæ sit cum putre-
dine sanguinis, & synocham quæ non sit de pu-
tredine sanguinis quæ inflatiua vocatur. Respon-
demus synochum quæ sit de putredine sangui-
nis patientes faciunt putridam urinam propter
putredinem sanguinis & pulsū habent inordi-
natum, quia constrictio eius velocior est quā
dilatatio propter naturam festinantem se ad ex-
pellendam sanguinis putrefactā fumoliatem.
Inflatiua vero sic dinoscitur. quia urina patien-
tis nullam habet putredinem, quia eius materia
pura est sanguis non putrefactus. Rursus si di-
xerint quæ sit differentia inter feb. quæ est de pu-
tredine sanguinis & febr. continuam quæ fit de
putredine cæterorum humorum. Respondebi-
mus, febr. quæ sit de putredine humorum, licet
videatur continua esse, bonus tamen medicus,
si bene eam inuestigauerit sentit eius interpola-
tionem, quæ fit inter finem unius accessionis, &
initium alterius. Sed synocha nullam habet di-
missionem nisi aliquid tranquillitatis in extre-
mitatibus diei cum aer fuerit frigidus. quæ miti-
gatio non fit propter feb. sed quia infirmus quæ
scit & gaudet de aeris frigiditate se. acumen mi-
tigante. Quæ feb. tribus modis fit quia quædam
est æqualiter ab initio usque ad finem, aliqua
de biliter incipiens & paulatim ascendit usq; ad sta-
tum. est & alia fortiter incipiens in initio, dein-
de cathamodicum descendit vsque ad statum.
Causa quia materia quæ putrefit de sanguine,
aut est tanta quāta dissolvitur, aut minor quā
dissolvitur, aut plus. vnde si tanta sit materiei
putredo quanta eius dissolutio est nascitur illa
species synochæ quæ dicitur homotenus. quia in
unaquaque die dissolvitur idem & putrefit, quæ
cum ita sit, significat mediocritatem inter spe-
ciē salutis & timorem mortis. Sed si quod de ma-
teria putrefit minoris sit quantitatis, quā id
quod resolvitur nascitur illa species quæ dicitur
epaugmasticua quæ salutem significat. Nam si
quod de materia dissolvitur maius est eo quod
putrefit finitur paulatim materia. vnde necesse
est ut veniente morbo ad statum vel ad crism,
nihil de materia illa, aut pusillū permanet quod
facillime purgabitur, quia uictus est fortis. Rur-
sus si de materia plus putrefit quā dissolvitur
fit illa species quam dicunt angmasticum, quæ
speciea est pessima & timoris nūciativa, quia il-
lius materiei multa quantitate putrefacta, & pau-
ca dissoluta, necesse est ut omni die augmentetur
feb. angustia & molestatio, nō de timore est du-
bitas, quia in unoquoque die augmentante ma-
teria timemus ne in statu tanta illius materiei
quantitas augmentetur, ut nullo modo eam
natura pati valeat, quæ de re natura cedere mor-
bui dominetur. Significationes autem synochæ
duobus

duobus modis sunt, aut antecedentes eam sicut fatigatio grauitas & plenitudo membrorum rubor & calor in easterioribus corporis, aut eam subsequentes sicut dolor capitis cum iucensione & grauitate rubor faciei tumor temporum & extensio uenarum suarum eminentia turbatio & tenebrositas oculorum & figuræ rubor ante oculos apparentes pulsus fortitudo & uelocitas & eius magnitudo ac plenitudo, atque mollicies organorum facies patientis quasi balneum egredientis urina rubicunda & temperata in liquore. Causa fortitudinis pulsus est propter fortitudinem uirtutis naturalis. eius magnitudo est propter sanguinis plenitudinem. uelocitaseius est propter sanguinis calorem. organorum mollicies est propter sanguinis humiditatem. Robor ueritatis rubedo & calor sanguinis faciunt. spleu dorurum est propter sanguinis claritatem. Sed cum tamen illa species de cuius materia plus præfuit quàm dissoluatur augmentatur putredo in corpore, & urina fit turbida atque color eius fit arfenicus. Accidit etiam hanc feb. patientibus in flatu quem admodum eis qui inflatus molestatur, non enim differunt nisi quia est cum putredine sanguinis, inflatus uero minime. Et quia huic feb. hæc sunt accidentia. iuariolæ & ceteræ pestilenciales passionēs accidunt, necesse est de eis disputare priusquam curā eius incipiamus.

De causa feb. pestilentialium. Cap. XXVI.

CAUSA pestilentialium febrilium est pessima mutatio aeris & corruptio eiusdem in quatuor temporibus anni, & mutatio aeris fit quatuor modis, aut cum dominatur ei una ex quatuor qualitatibus, aut propter fumum & puluerem terræ eū perturbantem & obscurantem, aut propter magnum fetorem sicut cadaueris corporis animalium quod est ceteris peius. proinde plurimi patiuntur pessimos morbos de pestilentiali genere & feb. non de genere humorum, quia sicut pessimos morbos aut venenosus, similiter & aqua nocet & destruit substantiam eam accipientium non saluantur nisi rarissimi, sicut aer si corrumpitur & putrescit, quicunque patitur non euadit nisi paucissimi. Aer etiam nocibilior cibis & potibus, quia uelociter perforat ad cor & pulmonem cum flatu attracto sine ulla corruptione, proinde omnes infirmi & sani plurimi infirmantur ex aeris corruptione. Antiqui concordati sunt maxime Hipp. quia si in quatuor annis temporibus aer corrumpitur, generantur in illo anni pestilentia, & mortales passionēs. Dixerunt etiam si uenti in tribus mensibus hyemis in Decembri Ianuario Februario, perflent & puluis in aere augmentatur, & aeris complexio in siccitate mutatur nullam habens pluuiam & dies in qualitate diuersantur, ut uidelicet una dies sit calida & alia frigida fuerit hæc pessima signa hye-

me, uere autem accedente pluuiali & turbido cuius perturbatio non dissoluta. 2. 3. 4. 5. aut. 7. die raro sunt feb. pestilentes non secundum humores, sed plurimæ nascuntur uariolæ & pullule multæ etiam tunc plurimæ oriuntur mortales pestilentia. Dixerunt iterum si uer & hyems aliter fuerint, necesse est sit in æstas aer turbidus & humidus & non clarus & arboribus & terræ nascuntibus puluis dominatur, unde fit causa in corpore defudationes generans. corpora etiam non fundant nec humectantur, sicut solita sunt in æstate humectari naturaliter. Rursus inquit si æstas uer & hyeme sint, ut diximus, sit in initio accedentis autumnus mortalitas in animalibus. Conque æquinoctium uenerit autumnale appareat in aere, uidelicet septentrionalis flammæ ac lampades multæ ac diuersæ. Quod si quidam præterit huius intentionis rationem, dicemus hæc quæ dicta sunt non posse ab eis intelligi nisi præuisa ac intellecta motus stellarum scientia & coniunctio ne earum adinuicem quæ sit circuli suis & qualitatibus cuius stellarum quæ est secundum earum loca, & in circulis & in unoquoque anni tempore. Rursus si dixerint si hæc quæ dictis sunt propter actionem motus stellarum, quæ necessitas fuit hæc in libris scriberetur à medicis cum ea defendere cōtra repugnatores nequeant. Respondemus corruptio aeris non accidit nisi corporibus ad ea præparatis. Vnde cum medicus uiderit significationes aeris in unoquoque tempore anni venturi, poterit mūdificare materiam de corporibus corruptioni præparatis priusquam corruptio accidat eis, & etiam temperamentum præstare scierit, ut uenturæ corruptioni repugnare ualeat. Nam si præuiderit motu stellarum debere facere nimium calorem in aere & nimiam siccitatem & uisionem, festinat ad purgandam cholera eorum quibus inest cholerica complexio naturaliter, ne illius calore feruorem facillime propter similitudinē recipiant, dans quoque frigida & humida calori uenturo repugnantia, quia rationalis anima dignior stellis est, nā actio earum ei minime accidit nisi cum ignorantia teneatur, dum enim illam scierit eam omnia non caueat, quod testificatur ab eo quod uidemus ab optimis mathematicis qui cum certissime nouerint dies periculum mortis inferies eis qui in mare ingrediuntur satis possunt eos tueri, similiter & eos qui in bello morituri sunt, in quo quidem homo differt ab animalibus, nam rationis & intellectus est semper inquirere bona & defendere, & mala respicere eisque repugnare, quia non est subditus naturali actioni & pestilentiali desiderio nisi cum ignorantia tentus est, sed cū scit & discernit bonum à malo uerum à falso & iustum ab iniusto, querit bonam partem quæ est eis similis, unde homo est, & spernit malam quæ non est ei similis unde est animal.

De feb. variolarum quae fere omnibus accidunt.
Cap. XXVII.

CAusa variolarum omnibus aut pluribus nascentium materia est in compositione fetus in volva existentis, quam natura in quibusdam locis clausit à principalibus membris remotis cuti; vicinantibus propter debilitatem membrorum fetus qualitatem materiz illius non sustinentium, quæ cum moventur propter aliquod exteriorum sicut propter pessimos chimos, aut corruptum aerem à suo loco egreditur cum natura repugnans expellit eam ad cutem, quia sibi vicina est. hac de causa sunt variolæ, nec ullus remanet quin eas habeat, quia eorum materia sit in conceptione fetus. & plurimum ad adolescentulis & pueris sunt raro iuuenibus & senibus, decrepitis vero nunquam. impossibile est illam materiam in corpore, usque ad decrepita manere propter mutationem ætatis temporis exercitiorum & cibariorum & cæterarum diuersitatum, quia natura eam assuefecit. vnde non mouet illam nisi cum ipsa per se mouetur. Ideo adolescentuli & pueri plurimum hoc patiuntur, quia sunt gulosi & cibos inordinate sumunt, neque caueant aerem aliquem neque accidentia & istis quibus cal. & humida complexio dominatur, quæ est putredini familiaris & conueniens. signa, quarum non dum apparentium hæc sunt dolor capitis in initio feb. rubor & tumor faciei turbulencia oculorum & lachrymæ capitis grauitas totiusque corporis, pudor in naribus sternutatio pectoris asperitas uocis rauca puctio in corpore quasi ex acubus infixis, quia materia uolens egredi cutem & carnem separatur ut facilius exeat. sed plurimum in tertio die egreditur, & aliquando in principio uel secundo festinat propter magnitudinem caloris feb. Sed variolæ quatuor modis sunt, aut de puro sanguine aut phlegmatico aut cholerico, aut melancholico. Quæ de puro sanguine sunt sunt rubæ superius acutæ, & inferius late citoque maturantur, & in saniem conueniuntur, suntque salubres, quia materia earum & sanguis est amicus naturæ & digestionis obediens quia ca. & hu. est. Si sint cholericæ sunt citrinitates pertinentes parue rotundæ capita eorum acuta & quasi acus punctiua propter acumen materiz earum, proinde signa eorum sunt ad timorem & ad salutem dubia, quia si laudabilia signa eas sint concomitantia, sicut coctio digestionis in urina in die critico apparet & feb. atque sitis mitigetur & uariolæ aperientur & ab eis humiditas effluat bonum nuntiant, contrariæ si sint contraria signa. Si fuerint phlegmaticæ sunt albae late lenes duræque; ad digerendum uel sunt indigestibiles quarum materia sub cute putrefacta nimis sub cute pudor generatur maxime si phlegmata falsa fuerint, aut prurire cæperint discoriantur & fluunt ex eis

putredo eruginosa. quod nunciat mortem maxime si urina cruda sit. Melancholicæ autem in initio sunt linidæ postea uenetz, deinde nigrae in quibus non coadunatur humiditas, sunt enim parue duræ quasi duræ verrucæ, unde sunt pessimæ quia nullam habent qualitatem quæ maturari, aut humores recipere valeant vnde siccantur & finduntur, unde generatur syncopis alienatio & defectio, quibus apparëtibus nunciata est mors. Sufficit quantum disputauimus de variolis incipiamus de cura synochi.

De cura synochorum. Cap. XXVIII.

Quia hæc feb. sit de putrido sanguine in uasis decet phlebotomia priusquam non putrefactus sanguis putrescat, prius tamen considerata uirtute ætate tempore regione & consuetudine an sint conuenientia. deinde minuatur sanguis ante statum. quia phlebotomia omnibus curis synochi & synochæ est utilior, synochæ tamen conuenientior, quia sanguis eius purus est. quod si omnia supradicta sint conuenientia, uirtus quoque non sit imbecilis his succurrere non est. Item omnibus supradictis bonis & uirtute existente debili ne temerarie sanguis minuatur, sicut diximus in cura synochi in qua monstrauimus sanguinem non debere minui in statu nec in augmento, quia inde natura impeditur. Nam uirtus licet in his utriusque feb. sit fortis in augmento tamen & in statu non oportet uos ea credere in initio morbi nisi uirtus obliterit minuatur. Si autem in initio non audemus extinguamus acumen sanguinis eum succo mala. gran. oxifœntia & similibus, damus pituitum cum amigd. & raccara. Si sint congesti humefiant eum refrigeratiua attenuatiua & dissolutiua, quia licet hæc feb. sit acuta, putredo tamen eius oppilationem generat. vnde nisi refrigeratiua attenuatiua dederimus & dissolutiua, putredo augmentatur, & morbus necessarius confortatur. Solis enim datis refrigeratiuis, putredo augmentatur, quia refrigeratiua non dissolunt, demus ergo attenuatiua refrigeratiua dissolutiua putredinem cum urina & egestione & sudore prouocantia, nisi cum materia acutissima est, sanguis enim in hac feb. aut est acutissimus & cholericus, aut grauis & phlegmaticus, aut medius. Si est acutissimus, damus frigida & acumen extinguentia sicut psilium succum granatorum oxifœntiam syrupum prunorum violæ sigill. mannæ & similia, pituitum quoque colatum & panem lotum. Si autem medius dandæ sunt in iube pro oxifœntia pituitum panem lotum & similia. Item si sit grossus & phlegmaticus, dabimus succu lupini uel endiuiz cum manna casia sili. & similia. Clysterizetur & pessaria faciamus. Si dolorem capitis patiuntur, nares humefiant cum oleo uiol. & nenuparisino temporibus,

ribus imponatur oleum ros. cū aceto, pedes quoque infundantur in aqua calida, in qua cocta sint camomill. & viol. Si habeant uigilias, fronti roremus aquam in qua cocta sint cortices papaveris fe. lactuca lactuca uiola & similia. Cataplasmetur caput ex succo uiol. portulacæ semperuiz cū oleo niol. nenupharino & similibus. Quod si persistit in uentre acumen aut pruritum, accipiant succum cucumeris, & mal. grana. damus etiam succum melonis palestini eiusq; caruem. dolore capitis non cessante, fundamus in eo lac mulieris cum oleo uiol. pedes & crura in aqua mittantur, in qua cocta sint camomill. & viol. crura eorum ligentur, quia trahit materiam & superioribus ad inferiora. Si stupor est mentis, nec oculos possint aperire calefiant capita eorum cū aqua in qua cocta sint camomill. centaurea meliliosum uiola & similia. Si uirtus sit defecta & cal. fortis calefiat solummodo cum camomilla & uiol. siat circa eum sonitus delectabiles & dulces ad audiendum de genere insaniorum, quia anima delectatur & confortatur & natura ad dissoluendum materiam excitatur. Sed quidam arbitrantur naturam ex hoc impediri adeo ut materiam nequeat digerere sicut cibis & medicina, quod falsum est, natura enim non impeditur nisi ex digerenda re & mundificanda, ea igitur quibus non impeditur confortari eam, ita dico sit in eis delectatio. Quod si dixerint de pharmacis cur pharmaciam accipientes prohibeas ne ad aliquid cogitandum se impendant ne ad aliquid cogitandum mentes inducant, quia dicitis naturam ostendi in diuidendam materiam & eam digerendum propter eorum impedimentum. Respondemus inter hæc duo magna est differentia, quia anima si in cogitatione aut aliqua re fuerit dedita coadunata in se uirtutes, unde ad actiones operandas natura impeditur. Sed sonitus delectabiles contra habentur, nihil enim animæ aut naturæ impediunt nisi solam delectationem qua confortantur & fortiores fiunt. hoc sic tellatur, uidemus enim in adolescentulis enim aliquos facimus eis delectabiles sonitus statim furor eorum mitigatur & somnus eis prouocatur. Quod si patientes surgentes a stupore huc & illuc se uertant modo in uno latere, modo in alio, & cum magna angustia, pessimum denotat signum & mortis nuntiatio. Quod si habuerint inflationem & sonum quasi tympani & post uentris solutionem & inflatio non cessauerit, si certius signum ad mortem, quia significat pestilentialem fumum sicut est inflatio mortuorum cum naturalis cal. est ab eis ablatas. Quod si in corpore quædam pustulæ appareant liuidæ aut nigre, sit pessimum signum, maxime si principalibus membris sint uicinate. Quod si his accidentibus careant & patientur fluxum sanguinis de naribus & uirtus sit bona febrisq; mitigata, & morbus sit in declinatio

ne, cephalica incidatur. quoniam ille morbus sanguineus est & minutionem suffinet, quibus non sufficientibus curentur ex medicina quam duximus in cura fluxus sanguinis qui est in caupon. Si patientur cordis tremorem imponimus stomaacho sand. farinam hordei maluum camphicinerem fornacis fabrorum temperatum cum succis portul. semperuiz citruli amoglossa & aceto. In eorum manione sternantur frondes uirium mirtæ salicis basilicon, & uasa aqua plena in circuius mansionis mittantur. Cathaplasmetur uenter ex oleo ro. encurb. cucu. & similibus. Clysterizentur ex succis cucu. cuscute uiz agrestis succo amoglossæ cū oleo ro. Quod si hæc sit propter aposte. aut erisipilas accipiant succu solatri coctum & distemperatum cum casia fist. manna uiol. zaccara. ponantur super apostema sand. rosæ malus memicha sulatrum coriandru. Si calore est fortis aliquid croci miscemus. Quod si apostema sit de actione naturæ & secundum crum ponimus dissolutiua sicut memicha maluam, camo. crocum solatrium & similia. Si autem hæc feb. sit propter nariolas & defudationem & potest sciri per signa quæ diximus in initio morbi oculi rigentur, lauentur ergo cum iure oliu & succo granatorum acetosorum. Deinde lauentur aqua ros. sumac & antimonio cum campho. temperatis cum succo coriandri ut mundificetur eorum putredo. Apozima ad expellendas uariolas. Rec. lacæ. drag. 5. lenis mundas drag. 6. diagraganti drag. 3. coquantur in tribus lib. aquæ ad tertiā & dabis potui guttatim. In festo non foris ingantur huic apozimati. Rec. succi maratti. drag. 2. detur quoq; apozim. mar. apij cimini rodazaccaræ & croci & gargarizentur. & etiam accipiant piscinam crisolocannam cucurbitam portulacam bliter, humefiat uenter si sit necesse in prima hebdomada cum manna casia fist. rodazaccara & similibus. Solutio uentris huic passioni solet euenire sponte, quia materia cum sui acumine pingit intestina, unde solutio sit quibus artificiali solutione cauendum est & ab acutis & falsis, accipiant granata uas pira coctana & similia. Si hyems frigidum uenit rempus fuerit habeant focum cum lignis uirium & tamariscis. nariol. autem desiccatis si necesse est balneentur cum farina hordei rizi milio & similibus. Si habent solutionem uentris accipiant trociscum spodij qui. Rec. gummi boli ana. drag. 3. amidi. drag. 2. & sem. berbe. spodij ro. ana. drag. 3. sem. herbæ acetosæ. drag. 4. mirtæ. drag. 2. croci. drag. 1. tempera cum succo citoniz, & da potui mixto cum succo coctanorum. Quod si uariolæ sint plumbeæ & superficietius late aut nigrescentes funi. si autem in fine synochi uis reliquias purgare & extinguere da trociscos synochi reliquias eatingnemes. Rec. spodij. drag. 3. sem. portul. cucu. ana. drag. 4. sc. cucurb. citru-

li ana. drag. 3. gum. draga. 2. midi. ana. drag. 2. ber betis. drag. 3. liquirit. drag. 5. tempera cum aqua ros. potetur cum succo granatorum & similibus.

De causa putrida febris. Cap. XXIIX.

Quia causa feb. putridæ cal. est extra naturam operans in fecce humorum, quæ fit de tertia digestionem in omnibus membris corporis existente, quæ fit inest, quia omnia quæ accipimus siue sit potus siue cibus non sunt omnino laudabilia, unde cibi venientes ad stomachum facti quasi pristanum, hæpar trahit colamentum eius ad se quod digestum est, & in sanguinem conuersum mandat membris ut ex eo nutriatur quod suæ complexionis conuenit, fit autem quia non conuenit per poros cum sudore & fumo expellitur. Quod si membra fuerint defecta ad expellendū fecem propter mutationem suam complexionem vel compositionem, aut propter oppilationem pororum aut propter gravitatem materię si fuerit in quantitate multa, aut grossa, aut utilis, fit permanet in concavitate membrorum & raritate eorum, sicut pulmonis & splenis, & concavitate stomachi uenarum & similibus, quæ si moveantur in quibusdam temporibus, uel ma li cibaria qualitatem eius augmentat, aut propter seris mutationem & similibus, odio teneantur a natura propter suam corruptionem nec regit eam. quæ sine regimento permanens calēst interiori calore & sua fumiūitate proinde bullit & putrescit, sicut humores ea ducunt bullientes contrahuntur & putrescunt cum naturalem perdidit calorem & regimentum naturæ, quæ putrefacta generat feb. secundum uiam conculationis: unde nomen accipit a suo elemento. Si materia fuerit cholericā tertianam uetam generat duodecim horas tenens. & 36. quiescens. Si sit phlegmatica amphimeriam faciat. 8. semo uens horis, & sex quiescens. Quod si melancholica quartanam generat quæ 24. horis mouetur. & 48. quiescit. Causa diuersitatis harum grauitas & leuitas est in materia ad putredinem conuenientem. Nam omnis putredo non fit nisi cum calore & humiditate. quæcunq; ergo materia humis fuerit complexionis, aut ei vicina sit facilius est ad putredinem, contraria uero e contrario. Unde quartana quia materia frigida est & sicca, & causa putredinis est cal. & hum. repugnat putredini cum utraq; qualitate sui dimissio ergo eius est. 48. horis & moritur. 24. necesse est enim ut calor extraneus. 24. horas habeat in mutanda alia qualitate. Quod si quidam philosophi nos reprehendant dicentes. Quare iste terminus ideo non maior uel minor est 24. horis & non plus neq; minor: quia omne quod constituitur quod est sub lunari circulo est ex 4. elementis adinuicem oppositis, & destruere. n. est conuersio unius in aliud,

uerbi gratia. elementa mutantur in cibum, cibus in humores, humores in membra. Item cum de struitur corpus, humores reuertuntur ad aqua, spiritus ad aerem, calor ad ignem, ossa ad terram. Actio quoq; elementorum fit propter motum lunæ solis omniumq; stellarum motum habentium. Sol quoq; est causa cæterorum & diminutor & cursus eius ab ortu suo exiens ad eundem rediens nō manet nisi. 24. horis. unde li materia in aliqua parte putredini obediat, sit tempus accessionis citius. Ideoq; tertiana, quia caliditas sicq; materię est, & cū una qualitate, calore conuenit & cum alia non, necessarius calor extraneus moratur. 36. horis in mutanda illius siccitate in putredinem. Unde reprehenditur, quare calor extraneus in quartana moratur, 24. horis ad unam qualitatem. siccitatem, & in tertiana ad eandem qualitatem moratur. 36. Respondemus siccitas corporis duobus modis est, aut cum calore vel frigidityte. calor autem deficit corpus, quia illud rarificat & humores deficit. frigidityte uero materiam coadunat & congeat. unde humor in ea clauditur ad quem calore extraneus accedente dissipato aperitur materia & humor eius defluit putredini obediens. In ea autem quæ propter calorem est deficcata, quia humores non sunt in eo clausi nec coagulantur necessarius calor extraneus in eo tardatur in ea liquefacienda & diuidenda. Similiter si opposuerint de amphimerino, cur amphimerius sit, facilius ad putredinem quàm tertiana, cum etiā repugnet putredini cum una qualitate. i. frigidityte. Respondemus phlegma est sanguis semicoccus & in albedinem & frigiditytem moratur, videmus enim naturam mutare materiam sanguinem in lac in mamillis & in testiculis sperma. ideoq; natura mandauit phlegma cum sanguine per totum corpus, neq; clausit illud in aliquo membro, nec loco sicut utranque cho. quia aliquando corpus ex eo nutritur cum paupertatem sanguinis habuerit. Igitur phlegma est continuatim obediens putredini sicut sanguis. & nō differt nisi propter paruitatem suæ frigiditytis in qua calor extraneus aliquot tempore moratur in mutando illius qualitatem in putredinem. Præterea dicitur hanc feb. tertianā de cholerico chimo & putrido nasci propter id qd diximus, quia cho. ru. cum dominatur corpori, aut putrescit aut non. quæ nō putrescit, aut est in uno membro, aut in toto corpore. si sit in toto corpore, generat ictericiam sine fe. quæ aut est in quibusdam membris facit tertianā putrefactam. Aut est in toto corpore, aut in uno membro. si sit in uno membro generat apostema quod dicitur crispilla. si sit in toto corpore, est ut intra uasa, aut extra. si sit intra uasa, aut generat tertianam sine rigore, aut causon. si sit extra uasa facit tertianam interpositam. es enim materia quæ est intra uasa non facit

ciet rigorem eo qd est clausa in nasa, non potest transire per loca sensibilia & pun gere ea. Rigor enim non est aliud quam materia pungens membra sensibilia. Sed hæc scilicet intra uasa sit cum interpolatione, in die tamen remissionis non quiescit sicut ea quæ sit extra uasa, quia eius materia est mixta cum sanguine & eius eo mouetur. sed tamen in die tranquilla quiescit & mitigatur aliquantulum. vnde à die exacerbationis destruitur itaq; feb. à cause differt. quia materia tertianæ continuè intra nasa existens continua est in omnibus uenis corpora. sed materia causon plurimum consistit in uenis cordi uicinanibus sicut sunt uenæ oris stomachi hepatis & pulmonis, proinde est acutior & molestior. materia autem tertianæ feruentior est alijs in locis corpora quàm in illis, sed tamen hæc utreq; febres concordant adinuicem, quia materia utriusq; est cho. utraq; etiam est continua, causon tamen aliquando fit de falso phlegmate sicut Hippoc. in epidimia. feb. inquit quedam est amara & quedam salua. Tertianæ uero quæ habet interpolationem intelligitur cum tribus significationibus, quas Gal. ostendit in re naturali non naturali & contra naturam. Naturalis uero ut est etas complexio. non naturalis quemadmodum tempus aer regio. res extra naturam uelut occasiones quæ creant morbi naturam quæ sunt iussus accidentia & medici significationes sicut rigor frigiditas & tarditas accessionis & alia similia. Per rem naturalem sic cognoscitur, quia plurimum patitur hæc feb. eius complexio calida est & sicca, ætas iuuenus a. 15. annis usq; ad 35. maxime si fuerit macilentus & crispus pilos habuerit corpus rarum. Per non naturalem rem cognoscitur, quia plurimum oritur in ætate cum aer fuerit mutatus in calorem & siccitatem. Similiter & regio exercitium infirmi, & si in sua sanitate fuerat laboriosus & ipse studiosus assollicitus, quoniam natura temporum anni est quasi natura complexionis infirmi, & si complexio humana aliquid significat, necesse est id natura temporum ostendat. & natura aeris quasi natura patientis. natura regionis est quasi natura grati, vnde quodcumq; hoc significant necessario idem illa nuntiant. Similiter labor & sollicitudo sunt quasi macilentia & extenuatio: macilentia enim calorem & siccitatem significat, & sollicitudo atq; labor faciunt calorem. De re extra naturam sic intelligitur, sunt enim quedam in quibusdam quibus hæc feb. cognoscitur, quia hæc feb. de materia cholericâ calidâ & sicca est & uicina sensibilibus membris, necesse est eam præcedat rigor molestissimus pungitior quasi acus antequam. Admen enim cholera rubra transiit per sensibilia membra quæ non fuerant assueta pungitæ & generat tremorem qui rigordicetur, hoc testificatur, quia si aqua calida in chole-

rica corpora incidit priusquam eis fuerat assueta tremorem patiuntur & repugnant aquæ, sed eam assuescentia utraque una res efficitur, propter societatem quam habent in calore, quia si materia cholericâ tanti fuerit acuminis qd membra sensibilia per eam superentur, natura fugit ad interiora corporis propter illam rem nocuam, unde exteriora iusfrigidantur quoq; materia calefiat & seruetur eiusq; calor per totum corpus diuidatur. Cum ita sit necesse est patiuntur iussus in incensiuem & nimium calorem sicut in uigiliam dolore capitis siue grauitatem & sentiantur punctione in hepate & acutæ fumi de cute egrediuntur appetitum perdant, & aliquando eorum extremitates refrigerantur propter nimietatem angustia & delectantur panon quibus sunt cooperiti expellere aut eis in aqua insulis se induere, maxime si fuerit in quarta accessione, tunc enim est ultimitas & stat morbi. cumq; uenerit in fine quartæ accessionis dissoluitur materia cum sudore si fuerit subtilis & leuis, aut cum egestionem si fuerit grossa & grana. Solet etiam huic feb. vomitus euenire cholericus & tussis egestio maxime in tertia aut quarta accessione, proinde canere oportet ne in his temporibus detur pharmacica, quia natura per se purgat materiam in his temporibus. Quod si hæc feb. sine aliquorum humorum commixtione fuerit, hæc signa apparent pura & simpla. Si autem feb. commixta & eius signa sunt composita secundum commixtionem materiarum, sed si principio diei huius feb. signa apparent perfectam digestionem ostendunt, finitur in tertia accessione, quæ si non fuerint perfecte & complentur in quarta. Rursus si digestio fuerit debilis in septima finitur accessione, quod si nullum signum coctionis demonstrantur appa-ruerit hæc feb. diuturna & monstratur esse non uera, quæ si fuerit uera eius accessio multum. 1. 2. horas tenet & dimissio. 3. 6. & finitur in. 7. peryodis qui sunt. 1. 4. dies. quod si accessio. 1. 2. horas transierit & 7. peryodos intelligitur non esse uera, uirna patientum hanc feb. est rubicunda ignea subeitis. causa roboris calor est cholera, causa subtilitatis eius siccitas est cholera. Pulsus in initio accessionis priusquam calor fuerit per corpus dispersit paruus & subtilis propter naturam ad corporis interiora se coadunantem, sed calore in toto corpore diuiso & accessione ad ultimitatem appropinquante fit pulsus magnus & uelox, sed tamen uirtus eius fortior est in dilata-tione quam in contractione propter multitudinem fumi ad interiora corporis accumulatum in qua natura laborat ut extrinsecus eam expellat uelociter. Sufficit quantum diximus de signis tertianæ feb. oportet nos plane dicere qualiter & quomodo chol. ru. recipit potredinem cum eius natura sit calida & sicca. Diximus quia putredo non est nisi caliditas & humiditas sint con-iunctæ.

iuncte. Item dicimus q̄ siccitas sit tribus modis, aut n. sicca est in natura, aut io substantia aut in veroq; quia quēdā sūt naturaliter sicca & substantia eorū est liquida sicut mel vinū chol. ru. aqua salsa & similia. Sūt quēdam ēt in natura humida & in substantia sicca & dura sicut piper longum zinzibee & similia. Sunt & alia in substantia & natura sicca & dura sicut lapis ferrum & similia. Quod ergo in substantia est siccū, in natura humidum recipit putredinē, quia calor extraneus humiditatem in eo inueniens dilatat eam facies eā finire. Item diximus q̄ oīs bollitio & perturbatio quę sūt extra actiōnē naturę faciunt putredinem. Quod ēt in natura est siccum & in substantia liquidū, suscipit putredinē quia calor extraneus inueniens liquorē io eius substantia, facit enim fluere. Quod aut in substantia & naturaliter siccum est nunquam recipit putredinem, nam ex utraq; parte siccum est, proinde calor extraneus in ea nullam recipiens humiditatem sit eā eam sicciorē & duriorē facere. Palā ergo intelligimus quia quod in suo corpore erit humidum suscipit putredinē, licet naturaliter sit siccū, unde cholera rubea licet in substantia sit liquida in natura iō est sicca, recipit ergo putredinē, similiter & cholera. Palā igitur est quia chol. rub. & nig. oon recipiunt putredinē propter earū cōplexionē & naturā, sed propter substantialem humiditātē illarū atq; liquorē. Et quia cōpleuimus cām putredinis cho. ru. absolute oportet nos distinguere spēm chole. ru. quę recipit putredinē, & eam quę nō. Unde dicimus chol. rub. modis duobus esse, aut est naturalis aut nō naturalis. Naturalis est rufa habitans in felle & virtus eius ī hepate. Nō naturalis in stomacho, est iō diuersa, quia quēdā vitellina est, alia crocea, alia prasinā, & alia æruginosa. Vitellina & crocea minoris sūt caloris & siccitatis quā rufa quę est natural. prasinā & æruginosa maiore habent calore & siccitatē quā naturalis. eā quia naturalis chol. ad stomachum veniens miscetur cum humoribus in stomacho existentibus, qui si fuerint landabiles & tēperati sicut humores qui oriuntur de pane bene fermentato annuā agno hādolo lac adhuc fugente conuertitur in cholera croceam naturalis vicinātem. Quod si humores quibus cholera est commixta ad frigiditātē & humiditatem pertiōentes sūt sicut eis qui nascuntur de piscibus & frustibus mutatur cholā vitellinam. Ideoq; vitellina minus est cali. & sicca quā crocea, & crocea minus quā rufa. Quod si inuenierit humores io stomacho calidna & acutos sicut qui generantur de pipere sinapi porris allijs & similibus augmentatur calor chol. sitq; prasinū coloris. Si autem illa chol. in suo permanet acmine & calefaciat eam calore extraneus sicut calor temporis aut aliarū rerum incēditur sitq; æruginosa. Crocea iterum aliquando nasci

tur in hepate cum sanguis humidior sit quā decet, proinde natural. chol. in iuuenibus est iō fa senibus aut & peris est crocea, senioribus est vitellina. Prasinā autem impossibile est in hepate generetur, neq; transit a stomacho neq; generat se. quia tanto tempore in corpore & permanet ut putrefiat & feb. generet, natura. n. semper se adinuā ut eā a corpore expellat propter eius malignitatem. Quod si natura dēfecerit eam expellere nequens incenditur corpus & homo moritur. Igitur si talia de prasinā accidunt tanto maiora & certiora de æruginosa euocant, necesse est ergo ut rufa crocea & vitellina recipiat putredinē & fe. generet. Sed si materia fe. fuerit vera cho. rufa generatur caufon. si fuerit crocea sit tertiana, si est vitellina nascitur hæmorrhoides.

De febre tertiana & eius cura. Cap. XXX.

Feb. tertiana molestior est ceteris putrida febr. propter acmē eius materię, & quia caufon vicina quę cum fuerit vera sit eius crisis in septē peryodis sicut Hippo. dixit, si non sit una trāsiet hunc terminum & secundum materiā cum qua miscet sit longitudo suę determinationis, quę aliquando incipit in autūno & dimittit in nere. solent etiam patientibus enire in nocte antequam accessio euenerit angustia & vigilia, veniente autem accessione accidit parua frigitudo sitis & calor. prima quidem accessio. 4. horis permanet aut. 6. aut. 7. deinde dissoluitur cum aliquanto sudoris. Causa sudoris in prima accessione subtilitas est materię. Paruitas eius ē duobus modis. Vno quia materia non bene digesta est. alio quia calor fe. defecit & cōuertit eum in fumum, unde sudor paucus apparet. Secundę autem accessiōnis accidentia sūt quasi primę sed rō longiora, quia permanet. 10. horis, uociente uero tertia exacerbatioe molestatur, natura est. n. nunciatina. Ideoq; ne significaciones apparent monstrantes nia fecerit perturbari & bulli incipiunt. 4. dolor capitis nimis incensio angustia sitis nimis cholericus. Veniente quidem quarta accessione induratur & augmentatur fe. quia status morbi est vicinus. Idcirco dolor capitis augmentatur & sinit sitis uomitus angustia defecio siccitas laborum rubor oculorum & aliquando cutis faciei fit liuida aut nigra, & aliquando natura cholericam prouocat egestionem secundum crism quia dies critica est & moratur accessio. 12. horis. & aliqñ. 14. si materia fuerit grossa, deinde cum nimietate sudoris dissoluitur maxime si egestio fuerit ex contrario, quia hæc materia solet dissolui in accessione. Quod si materia subtilis fuerit atq; lenis expellit per poros cū sudore, si est gravis cū egestionē, mediocriter existens cum uomitu eijcitur, his itaque accidentibus transactis infirmus quiescit & confortatur. Quinta autem accessione accedente p̄ciens est minoris molestationis quā

fuerit in quarta, licet. n. molestatio tertie accessio-
 nis malignitati vicinatur. Sexta autem accessio
 debilis est & modicum suorum accideo. u.
 apparet. Septima autem accessio ut multum. is.
 horis permaoet, deinde ab infirmo cedit ois mo-
 lestatio & angustia & ipse ualde abgritudie
 egredit. Et aliqui hanc se. i. tercia accessione finit,
 & nonnuq. in. 4. sed plurimum in. 7. quod intelli-
 gitur ex significatione in vrina alijsq. locis sicut
 diximus apparentibus. q. si in prima die appa-
 ruerint erit brevis, si aut postea tardabit, sed in
 si uera fuerit non transit. 7. peryodos sicut Hip-
 po. determinauit. Vnde oportet medicum in
 hac se. se cauere ab initio ut no det infirmo rem-
 eum calefacientem ne materia calefacta cum
 suo acmnie caput saliat & frenem generet, fiat
 que timor & molestatio peiores quam materia
 qua geueratur. Ruber enim cholerae acumen &
 velocitas oon sustinet medici ignorantiam & in-
 firmi stultitiam. Vtilis autem huius curamen-
 tum saliter est ut in primis perquiratur virtus
 rum si fortis uel non. quz si fortis fuerit & ma-
 teria morbi furiosa catarrhico dari coouenit
 chole. rub. purgans eiusque acumen catinguens
 sicut de oxifenicia. drag. 1. pruna. 20. mirabol. ci-
 tri. vnc. t. calizfi. drag. 5. mano 4. & his similibus.
 Si autem egestio eorum stiptica fuerit & est ne-
 cessitas ea liquidam faciendo aliquidulum dya-
 grid. oportet misceri, sed no in diu accessiois ca-
 tarrhico de. i. sed aut die prima aut tercia aut
 quarta die. Cavendum etia est quatu plus pote
 heri ne impediatur natura in die accessiois volens
 morbo repugnare & materia eius expellere cu
 catarrhico cum cibo. Sufficit autem in accessione
 psilium cum succo mal. grana. aut syrupaliquia
 sit ei coueniens, sed hac danda sunt cum oimius
 aut fortis sit calor & sitis. Si autem taliter no ex-
 titerit sufficit solus syrupus, quia psiliu aliqui
 congelat & idurat materiam. Si autem accessio
 inceperit post prandium sufficit infirmo solus si-
 rupus ei datus mane, se. quidem traisacta ei ptisa-
 num def. vespere panis lotus cum zaccara. Qd si
 accessio ad medium diem inceperit matutino
 psisanum accipiat oeq. sumat aliud ois se. cessia
 uerit. Pretereunte quidem se. panem cu zaccara
 accipiat. Si autem feb. in vespere aut prima no-
 ctis hora inceperit mane sumat psisanum, & cu
 se. cessauerit panem lotu. Sed cauere oportet or-
 in hora accessiois aliqd ei tribuat nec tribus ho-
 ris aote quam accessio ueroerit, quia si aliquid i
 hora accessiois acciperit stomachus illud euo-
 mit, qa tunc temporibus stomachus mouet ad ex-
 pellendu putrediois materia q in eo coioet. Vn
 si tempore accessiois uicioate aliquid datum
 fuerit sit calor is se. augmentum & materiam io-
 grostat & pderosam eam facit. est. n. febris qua
 li oleum ardentis lampadi. Quod si in initio hu-
 ius se. no audebis dare catarrhicum propter uis

tutis defectione aut propter paruitatem etatis
 & aerem da i die quietis mannam calisi. viol.
 zueca. oxifeni. pruna rodozeca. in die aut accessiois
 succum mal. gra. cum psilio. q. si hanc no
 suffecerint suppositiois necesse est fiat de licio
 nitro dyagrido zncea. & his similibus. his uero
 no sufficietibus elystere fiat de hordeo mudato
 uiol. malua bleia sebesten surfure obsomog. zuc-
 ca. ole. uiol. nitro sale coi dyagrido. Qd si quin
 que dies transierit patiens & morbus ad ultimi-
 tari uenerit prohibe cibū & da infirmo solu pei-
 sanum mane, uespere panem lotum cum zucca.
 Eodem modo dicta in. 5. 6. die utatur sicut in
 die accessiois fecit, ut ueniente. 7. corpus sit
 inanium & natura libera possit morbo resiste-
 re oullum habens impedimentum, & in. 6. so-
 lum accipiat psisanum mane si accessio ad 6. est
 uentura. Quod si aliqua fuerit suspicio ne cibua
 in stomacho augmentetur propter sui inanitione-
 nem extingue cathamodicum cum succo mal.
 grana. & melonibus palestiois. feb. autem miu-
 gata & angustia & incoessione ab infirmo ceden-
 tibus si punctionem in ore stomachi sentiat acci-
 piat panem lotum cum aqua aut colatum aut so-
 lum aut cum modico zucca. Si gulz siccitatem
 aut incensionem habuerit in palato garganizet
 succum cocui. & psiliu potet & apozima prun-
 rum & oxifeni. si dolor capitis patitur humecta
 nares cum oleo viol. caput infundatur de mulie-
 bri lacte uel asinino uel caprino, emplastrum de
 psilio suppone capiti, psiliu lotum & paru aque
 ro. misce & diu agita donec incipiat inpsillari &
 superpone fronti & temporibus uel sandalos al-
 bos, fricetur in testa tintina aque ro. & ex eo
 quod inde elicietur. fiat troscici. 3. ad mixto mo-
 dico camphore & siccati cociciatur cum aque
 ro. & sterne, & cu facce successerit aqua super-
 natante iurugatur pannus & superponat tem-
 poribus & fronti & superponatur temporibus o-
 leum ro. aut uiol. cum aceto mixtum infundatur
 Si aut siccitas augmentata capiti domineatur, & i
 firmus alienatione patiat, sternutatione fac cu
 oleis & lacte q dicturi sumus, lauet eia caput ex
 eis, pedes ei & crura mitant in aqua io qua co-
 cta fuerit uiol. papaueris cortex lactuca & ali-
 quantulum camomilliz, ex hac aqua si fuerit neces-
 sitas lauetur caput. Quod si io die septima solu-
 tio aut uomitus uenerit sitq. ex actione nature
 oullum artificiale ingeniu oportet coapiari quo
 usq. solutio permalescit si fuerit uide oportet
 & secundu q oportet, & quantu oatura sustinuo-
 rit. oportet nos mitigare incensionem stomachi cu
 syrupo mal. grana. aut uiol. & spodio, sed si aug-
 mentet se. sitis & defecio in ultimitate status &
 mutetur pulsus in calidu & uelocē & inordina-
 tu. urina uero fiat rubicunda & incensa & infirmus
 sit pusillanimus aut timidus quousque uideris
 eam uenire quam tu oportet & secundu q oportet

tes. Quod si ventris solutio augmentabitur sitq; necessitas vt cōfortetur natura cū cibo, dabis pīsa nū factū de bōrdō assato & panē assatū lotū farina mal. grana. cū aqua ro. & si post hoc solutio nō cessauerit da troscū de spodio cum syrupo de succo agrestis vū aut de aceto pōi citri. Nutri ri cōuenit de milio riscū sumach & amigd. vltis & similibus. Bibat mane ieiunus aquā ro. de pne deciso. Quod si ebolera i egestionē fuerit augmentata, & dubium est ne discoriet intestina, & patiens disinteriā patiatur, cōfortetur intestina cū dr. 2. & se. herbæ acetosę, & cū clysteri de succo arnuglosi virgę pastoris ramis portu. oleo ro. terra sigillata testis onorum assatorū & similibus in caupon dictis. accipiat pul. gummi boli terrę sigillatę an. dr. 4. amidi spo. an. dr. 3. se. malnē assati. se. mirrę an. dr. 3. fac puluerē, & dabis. dr. 4. cum oleo ro. tēperatā, & cū syrupo mirtino & aqua frigi. & cataplasmeū stomachus de flore vitium salicis mali coctani pīorum, bōrdō oīm flores an. dr. 4. galli. dr. 1. ro. sand. rub. panis aphricani an. dr. 4. oīa in puluerē redacta cum aqua ro. & succo mirrę distēperet. si calorē nimium habuerit modicum cāphorę admisceatur. mitte in aquā quā potui dabis spodium bolum gnm. sr. oīa assata cum sumach zucca. & aqua frigida mista. sumat citonia zaccari simplicem & diamilon. Quod si disinteriā patitur, aut siu. copiam aut ictericiā cura cum medicina harum passionum quam diximus in caupon, ibi enim plane diximus quantum oportuit. vnde non est opus illud repetamus hic.

De amphimerino. Cap. XXXI.

Amphimerinus de phlegmatico chimo nascitur, phlegma. n. si corporis cōplexioni dominatur, aut putrefit, aut minime. non putrefactum, aut in toto est corpore aut in parte. si fuerit in toto corpore generat hypofarcam aut frigid. cōtinuū sine fe. Cū huius diuersitatis est fortitudo, & defectio membrorum. quia mēbra cum fortia sint expellunt paulatim illud phlegma neq; dimittunt illud coadunari ut hypofarca generetur. qđ fuerit de frigida coadunat in corpore, vnde de hypofarca nascitur. Si aut fuerit in uno loco facit humidum apostema quod zimia nuncupat, si vero fuerit putrefactum, aut est in toto corpore, aut in uno mēbro. Si est in uno mēbro generat vulnera aut pustulas de quibus humores fluūt saniosi & aquosi. Si fuerit in toto corpore, aut ē intra vasa aut extra. Si est intrinsecus generat cōtinuum amphimerinum siue rigore pp cām quā superius diximus de alijs humoribus cum fuerint intra vasa. Si est extrinsecus facit amphimerinū cū interpolatione quā tribus modis cognoscimus sicut in tertiana diximus. i. naturali nō naturali & extra naturā. Res naturalis est etas, cō

plexio. Nō naturalis est tēpus regio aer & artifi cū infirmi. Res extra naturā sunt accidentia q̄ ex hac feb. generantur, quę sunt infirmi accidentia medici vero significationes. De re naturali quia hac febris plurimum accidit frigiditas & humiditas habentibus naturas gratem decrepitam aut pueritiam pp phlegma senioribus dominans & defectiōnem calons eorum, ut cibaria non digerant secundum qđ oportet, neq; superfluitas tertiz digestionis ab eis expellatur. Eodem modo intelligimus de omni corpore cuius complexio ni frigiditas & humiditas dominat. pueri vero accidentaliter sunt phlegmatici propter eorum gulositatē, quia accipiunt cibum vltra qđ possit calor naturalis pati & enim est sumunt inordinate, vnde humidi chimii eorum corporibus sanguinērant accidentaliter, quia calor naturalis in pueritia fortior est q̄ in ceteris etatibus naturaliter & in iuuenibus abundantior est qualitate, sicut Gal. calor inquit naturalis in pueritia plus est in substantiā quā in qualitate, quia in pueris est sicut sanguis tēperatus, in iuuenibus sicut cholera rubra in acuminē permanens. Palā ergo est in pueris phlegma dominari propter gulositatē & cibi inordinationē. Sed intelligendū est in oibus gulosis cibum potumq; multum sumentibus inordinate & maxime ebrietatē assuescentibus, & maxime si cibo nō dum digesto hac fecerint. Palam ergo est quod hac febr. naturaliter accidit senioribus & eis qui similes habent cōplexiones sicut glaucis aut rubeis albis crassis humidis nō pilosis, & angustos poros habentibus. Nascitur etiam in pueris & eius qui similes sunt eius id est gulosis multum comedentibus ebriosi sapā, & multum frigidam aquam bibentibus. De re non naturali ita intelligitur, quis plurimum hac fe. nascit in byeme, aut cum aer mutat in frigiditatem & humiditatem. Similiter cū natura regionis fuerit mutata maxime si patiens in sua sanitate fuerat assuetus requie delectatione & neque vlla exercitatione solitudine, & labore fuerit vsus. Res autem extra naturam sic cognoscitur, quoniam hęc fe. cū sit de putredine phlegmatis necesse est in vna quāq; accēssione precedat priusquā in materia putrefiat ac calefaciat nimius frigor quasi glacies refrigerans totū corpus vsq; ad extremitates & pmanet quasi nna hora. Cum quē phlegma fuerit putrefactū & inceperit cale fieri transit frigiditas, calorq; levis est & grauis, sed tamē est diuturna ac formidolosus. Leuitas & diuturnitas fe. quia materia est phlegmatica & phlegma est durum ut digeratur. Tremor eius ē pp naturā laboris ex cōtinuitate & propinquitate sue interpolationis, quia tēpus sue accessionis ē. i. 8. horis & requies. vñ priusquā sciat in firmis vnius dimissionē incipit altera neq; pfecte mūdicat de corpore sicut tertiana, materia cū tertianę ppter calorem & suā siccitatē cito cū

extraneum calorem accēdit & cōuertit quasi i cinere, vnde patiens quiescit donec altera veniat accessio, sed quotidiana nō fit similiter quia materia eius propter grossitatem & viscositatem suā tarde dissolvitur & annexitur corpori, eiusque calor servatur, proinde patiens non quiescit neque sentit quā interpolatur. Ideo quā naturam fatigat unde est molesta ac timorosa. Huiusmodi patiens nō sudat nisi modicū propter grossitatem & frigiditatem materici. Veniente autē morbo in ultimitate laboris & sanguinis nuntiatiuis apparentibus crisi quā appropinquante dissolvitur materia, & nimium sudare incipit infirmus. Habet etiā hæc febris proprietates quæ sunt ab ea inseparabiles. i. dolorē stomachi, proinde patiens enomunt phlegma, & spleniam, sed tñ maior ē in stomacho, quia phlegma ac p ē in ore stomachi, proinde patiens euomit phlegma & facies eorum fit tumida & motatur in lividū aut plumbeū colorē, os eorū semper est humidum & insipidū neque vllā patiuntur litiā, & si in statu siccitatis fit modica, quæ siccitas nō est propter materiam phlegmaticā, sed accidētaliter propter calorem phlegma calefaciētem & putrefaciētem sicut huius qui pisces & melones comedunt, hæc. n. cibaria si calore in stomacho accumulata inuenerint cito i eius naturā cōuertuntur & si tum generat, quia naturaliter sunt cōvertibiles. Quod si vltimitas caloris in vna quāque febre veniat mutat facies eius i citrinitatem, vrina fit rubra & pulsus fortis, hæc sunt propter calorem phlegma putrefaciētem cessante quidem calore cōuertitur patiens in albū & plūbeū colorē & vrina in albedinem & cruditatē. Cā quia materia eius est cruda. pulsus eius fit latus tardus diuersus de bilis. Lantudo fit propter humiditatem & abundantiam materici. defectio & paruitas propter paruitatem naturalis caloris, diuersitas eius, quia natura aliquā materici dominatur vnde pulsū facit fortem & aliquā materici nature præualeat quæ de causa fit pulsus debilis. veniente autē morbo ad finem & materia digesta fit vrina digesta rubra & eurbida & nunciat propinquitatem crisis. Quod si quidā philosophi nos reprehenderint & dixerint si natura febris est calida & sic. & phlegma est frigidū, & hu. quomodo febris ex eo nascitur. Respondemus non dicimus febre de phlegmate generari secundum suā propriam naturā existentem, sed dicimus quod omnis materia phlegmatica siue cholericā sit melancholica cum putrefcit bullit & calefit vnde febris generatur, quæ si non putrefcit febre nullo modo faciet licet naturaliter sit calida, hoc testatur per iſtericiam quæ nascitur de chol. rub. mixta cum sanguine per totum corpus & tamen patientes nullam febrem patiuntur quia chol. non est putrefacta. Palā ergo intelligimus quia phlegma non generat feb. naturaliter, sed propter sui bullitionem de putredine procedentem. verbi gratia, aqua calinceditur nō pro-

pter sui naturam, sed propter calorem quem ab igne recipit. Sufficit quantum disputauimus de causa & significationibus. amphimerini incipimus curam.

De cura amphimerini. Cap. XXXII.

Quia hæc febris de phlegmatica nascitur materia & phlegma naturaliter est frigidū. & hu. necesse est hæc febris. curetur cum rebus grossiorum humorum attenuatiuis, sed tamen quia phlegma diuersis modis est, quia quedā species phlegmatis est grossior & frigidior naturali, & quedā calidior, necesse est cum materia est frigidior, dari plus attenuatiua quā cum fuerit calidior. Vnde medicum oportet inuestigare vt certissime cognoscat quomodo debeat curare, & fiat hoc secundum qualitatem, res. n. subciliates & attenuantes diuerso modo sunt in qualitate. Phlegma iterum similiter est diuersum in qualitate, quia est phlegma frigidū & hu. cuius species est naturalia quæ est de colamento sanguinis aquosi, perinde sanguinis nō perfecte digestus est phleg. est & phlegma frigidius, est & aliud calidius & leuius sicut salum, quod ostendit calorem aquositate sanguinis esse dominantem. Similiter & attenuatiua diuersa sunt, quia quedā cum nimio calore & in censione sunt attenuatiua sicut radices origani calamenci zizibe. & similia, & quedā quæ attenuant absque multo calore & frigore quemadmodum maratrum lupinum apium et similia. Sūt & alia attenuatiua acumen cal extinctionis ex interiori sicut pisanum oxizaccara & his similia. unde quia attenuatiua calidiora sunt, vniunt eis calidior, si phlegma intelligit esse frigidius & grossius medicetur cum re calefactiua & humectatiua. si fuerit calidius & humidius curet in initio cum refrigeratiuis & attenuantiis, feb. aut mitigari incipientem curetur patiens cum re extenuatiua & calefactiua aut aliquanti calorificatiua. Quæ si data fuerint refrigeratiua calore se. decrescere timeamus ne materia induretur & ingrossetur. Phlegma. n. licet calefacta accidentaliter, nō naturaliter retinet frigiditatem & humiditatem. Iterum si calidior medicinis assuefacimus augmentamus materiam plusquā prius fuerat, quod si calorem eam fuerit frigidum suscepit magis preparatur ad recipiendum calorem cum accidentaliter sit calidum, propter hoc necesse est fit medicina mediocrius. i. attenuans sine calore aut cum modico calore & hoc fiat ab initio usque dum digesta fuerit materia. cumque signum coctionis in vrina alijsue locis apparuerit festinari oportet ad expellendum materiam extrinsecus, hoc. n. si negligemus timēdū est ne materia ingrosset & induret, quia sic cōuertitur natura. Signum etiā coctionis si nō pateat quodam modū si cruda apparet vrina & alia signa mōstrant motū esse materici ne creditur

darur vniuz, possibile enim est cruditas vniuz fiat ex cibi & potus inordinatione. vnde uo tuā actionē dimittas propter vniuin, sed purga materiam cū vtriū solutione secundū q̄ oportet. si phlegma fuerit catarrhicū dabis de mirabol. c. tri. chebul. absinth. bedegari cuscute eupatorio cassiā. & manna, & cū pill. de hierapig. & his similibus. Quod si fuerit acetosum phlegma purgabitur cū pill. de stomacico, sed tunc non omnino materia expellatur subito, sed multis uicibus paulisper, quia si materia purgetur in vna vice cū forti portione timendū est ne repugnet materia portioni cū sua grossitie, & cōuertatur portio ad substantiā ē corporis humiditātē, vnde nauarra iterū repugnet ei, & fiat hoc certamē cā infirmū molestans ac periculans. Eodē modo oportet faciamus in omni passione quē fuerit de graui materia & dura ad dissoluendū. Potest itaq; materia cognosci si fuerit falsa uel acetosa his signis, quia si fuerit acetosa infirmus paruam habet sitim & sentit grauitatem & in uentre & uentre habet constipatum. Causa quia phlegma cum frigidum fuerit & grossum adharet se uir & prohibet eam ne eiciatur, vnde patiens sentit grauitatem. Quod si materia fuerit falsa, sit sitis nimia egestio solubilis & patiens sentit in stomacho punctionem & dolorem, & habet os siccum & salum cum nimia siti, quia phlegma cū sua falsedine pungit stomachum & intestina & cogit ea ut expellant a se quicquid fecis habuerint. Sunt & alia signa quia si materia fuerit falsa frigiditas minor & calor fortior & actio fit breuius propter leuitatē & acumen materiæ, & cōtrario aut signa si fuerit acetosa. Quod si uir totus infirmus nequeat pharmaciā tolerare, oportet ingenari ut euenietur materia absq; vllō naturæ dolore, verbi gratia, si materia fuerit in hepate debetur causa hepatis mū difficultatē cū vrina si cut troisci de ro. & troisci de berberia oaimel. cum succo vel apozimate herbarū. s. radices apij maratri scariolæ scolopē. ameos. cōfice cū succo mastice, si materia fuerit acetosa. q̄ si falsa dabis troiscū de spodio cū oxizaccara. Sed si materia fuerit circa stomachū mūdificet stomachū cū lupinis mel. ro. si fuerit acetosa. si falsa cū rodoreccara. Audiuimus quosdam antiquos referentes se uidisse aliquos quotidianam habuisse de acetoso phlegmate, deinde cū osiremiā inciderint & vomitū, qui quādo falsa digesta vī sunt sicut bilis elixatis cū obfomogaro & porris radicibus sparagis & similiter potauerunt vinū forte & vetus, & posuerunt epythima calidū supra stomachū cū a cibis fuerit inanius de oleo uardino & sic euasi sunt; quia materia dissoluta cū egestione egressa est. Alij autem comederunt pices cum sinapi & forte vinum potauerunt & sanati sunt effecti. Sufficit quātum disputauimus de cura amphimerini absolute & vniuersaliter, vo-

lunt modo dicere particulariter de vnaquaq; specie eius, vnde dicimus quia in initio oportet inuestigare qualitates materiei vtrū fuerit falsa, & sic in initio morbi detur oxizaccara cū aqua calid. veniente autem accessione & frigore incipiente ponās pedes patietis in aqua calida in qua cocta fuerint camomill. & viol. autem, friccatur plantæ pedū cum oleo viol. & sale. Quod si spōte patitur vomitū sit bonū signum, significat enim leuitatem materiæ eiusq; facilitatē. Quod si vomitū nō habuerit ne cogatur ut egredietur in initio morbi, quia significat grossitatē & duritiā materiæ. vnde vomere cū fecerimus magnū stomacho nocuētū tribuimus, & ipsamet feb. propriē sit stomachi nocitiua, proinde nō debet causa fieri stomachi læsionē inferes, sed dari cōuenit rodoreccari cum calida, aqua enim calid. in hac feb. est vtilissima, materiā. n. attenuat & dissoluit & sitim extinguit, quia causa sitis in hac feb. est ebullitio & putrefactio materiæ. vnde cū fuerit extenuata propter aquā calidam sitis extinguitur, deinde accipiat pisanū cum oxizaccara. Quod si egestio fuerit stiptica dabis manna. dra. 30. oxizaccara. vnc. 1. aquæ calidę. vnc. 3. Si autē feb. primā transierit hebdomadā & signū coctionis apparuerit in vrina & materia moueri & digeri inceperit, tribue in latius accessionis oxizaccara. drac. 3. cum apozimate aneti & pro uocabis vomitum sine angustia. Quod si uenter fuerit constipatus humectat eū cum lupino manna rodoreccara. & cū aqua calid. Quod si nouū humefactus fuerit clystere ei facies de viol. camomilleon spinis ægyptiacis malus ana. vnc. 1. se. croci hortensis drag. 20. furfuris blezæ cetaurę maioris sebestem, omnia coquātur in. q. lib. aquæ donec ad unam redeant, deinde colaturæ adde olei uiolarum zucca. obfomog. ana. vnc. 1. salis cōmunis niri ana. drag. 2. Quod si se. elongabitur ut. 14. transeat dies & manifestabit se patiens sentiet sumum cal. de suo corpore exire & patiens sentiet abominatiōem aut uētris rugitū, cognosce quia materia est perturbata & cōmota & vult exire per sudorē si fumositas sentit, aut cū vomitu si abominatiō: aut egestione si rugitū passus fuit. Vñ oportet festinare ut expellat materia cū hoc catarrhicū qđ. Rec. mirabo. cit. chebul. ana. vnc. 1. bedegar. drag. 6. ruiæ absinth. eupatoriū an. dr. 3. vix paxie enucleatę. vnc. i. iuiuas. 20. pruna. 20. oīa in tribus li. aquæ coquātur ad medietatē, deinde māne rodoreccara. vnc. 1. adde colatis oībus potui dabis. Pill. simili mō valētes. Rec. chebul. dra. 3. xurbi. dra. 2. & se. hierę pi. dra. 2. troiscū de rosīs debegar an. dra. 2. absinth. eupatoriū cuscute an. drag. 3. mastice. dra. se. tēpera cum succo apij aut lupini & fac pill. ad modū cicercis dabis. dra. 3. aut. 4. cū aqua calid. aut oximel. cū calid. quia osaimel oppilationē hepatis & renū aperit, vrinē promocat

ſtomachū de frigidis humoribus mōdificat, maxime ſi cum aqua cal. bibatur, quia aqua calida multū inuā. Ideo eūdem eſt in hac feb. aqua frigida ſemper, neq; dari oportet ſecundum potum aut ſecundum medicinam; quia materiam ingroſſat & congelat, accipiat priſanū quod eſt coctū cum radicibus apiij maratri aneti calamēti cum modico piperis, cūque frigus acceſſerit ponantur in aqua cali. pedes in qua cocta fuerit camomilla anetum ſanſuccus abrotanum & ſimilia. q̄ ſi frigus fuerit forte quaſi glacies epiſthima dorſo ſcemoſi & uentri imponatur cum calido oleo in quo cocta ſint pīretum ſtaſiſphigria nitrum piper & calamentum, dabis oximel cum calida in qua coctum fuerit anetum, Quod ſi non uenerit nonnīus ſponte pronoeet cum oximelle de radicibus aut de aneto & apozimate ſaſcolorum ſale comuni que omnia calida accipiāt. Si egeſtio fuerit conſtipata dabis ſue cū lupini cum carpoſo balſamo croci hortēſis dra. 7. zacearq. vnc. 1. q̄ ſi hæc nondum ſufficerint clyſtere facies cum ſe. croci mala coloquintida cē ſaurea ſurfure bleta obſomog. ſi ſameleō nitro ſale. Dabis priſanum cum radicibus maratri apiij & oximelle coctum. Si autem priſanum in aceto ſtratē conuerſum fuerit negabis illud, & da mel licratum in quo cocta ſuerint ſpica maſtis cum einamomo. Quod ſi uomitus in initio morbi uenerit ſpontaneus nō coſtringas eum, ſed ſi adeo augmentatus fuerit ut uirtus patientis pati eum nequeat coſtringe eum cum ſyrupo de fructibus aut ſyrupo mal. gra. ſaſto cum menta. Accipiant hanc confectionem que. Rec. boris maſtis ligni aloes ana. dra. 1. xiperi. dra. 1. & ſem. car damo. dra. 2. ſem. menta licz. dr. 1. ſem. malā gra. 8. drac. omnia eo quantur in tribus lib. aq̄z uſq; ad tertiam, & dabis poti paulatim. Alius. Rec. ſpicę maſtis an. dra. 2. gal. ligni aloes ani ſi ana. dra. 2. ſac puluerem & dabis dra. ſe. cum odorifero uino. Si patientur granitatem capitis ponatur facies ſuper fumum aq̄z calā in qua cocta ſint camomilla mellilotum & ſanſucus. caueant ab omni effuſione lactis aut aliquid reſum, nec capiti ſui imponenda olea, etiam nec capiti nec faciei nec toti corpori imponantur: quia materia febris eſt multa & uiſcoſa & oleū conſtipat poros, vnde nequit materia diſſolui. Dixtam accipiat hanc intra uidelicet cieteris, ble ta. nō multum e comedat ne ſtomacho aggrauato cibis non poſſit digeri neque multum ſubtili utatur diata ne prę longitudine morbi patiena deſiciat, ſed ſi febris incipiat ad medium diē ma ne accipiat priſanum, incipiente uero rigore oximel. cum calida ſumat, eumq; ſeb. ceſſauerit comedat. Ruſus ſi mane febris acceſſerit nihil accipiat quouſq; ceſſabit. Vniuerſaliter quoq; dicimus ut inter cibum & acceſſionē ſex horarum fiat ſpaciū. q̄ ſi uirtus patientis deſecerit in ac

eipiēda pharmacia da cauſam ſouiter attenuati uam & mundificatinam, uerbi gratia. Si materia fuerit hæpatici uicina dabis meri hæpar mōdificatinam. q̄ ſi fuerit in ſtomacho dabis ea que ſtomachi ſunt mundificatina, ſicut abſinthium apozima de aloë hierapig. & his ſimilia quemadmodum uideris materiam eſſe groſſam aut ſubtilē. bona autem ſunt cataplaſmata aut epiſthimata calefactiua & diſſolutiua in ſtomacho & hæpate, ſed tamen poſt mundificationem cum certis ſime noueris materiam eſſe diſſolutam & liquefactam. Apparete ſigna coſticionis in urina inuat eū thiriaca magna poſt uomitum. Si fuerit materia mixta cum cholera prohibere ea que ſunt calida, & dabis inuicem oximel & oxizaccaram, & inuicem mel roſ. rodozaccara & materiā cum frigidis miſceas, & quia huius febris eſt proprietas dolor ſtomachi, oportet ſtomachum confortari cum cataplaſmatibus & epiſthimatis que ſunt facta de maſtice abſinth. ſpica & amonito & his ſimilibus. Quod ſi ſtomachus deſecerit ut careat appetitu confortamus eum cum oleo maridino & abſinth. Si duritiā ſplenis habuerit eueretur cum medicina ſpleneticorum. Si patitur in ſtomacho frigiditatem uel acetoliſiatem, mundificamus ſtomachum cum his pilulis eum de corruptis humoribus inanientibus. Rec. Keb. dra. 2. hierapig. drag. 2. & ſe. ſucci. eupatorii ſucci abſinth. ana. drag. 2. ſac puluerem & cum aqua calida tempera & pill. fac. q̄ ſi nis eas fortiores facere adde modicum ſcampeę & euporbiij. Alius. Rec. hierapig. drag. 2. coloquintidę interioria. drag. 2. euporbiij niri ana. drag. ſem. cēpera cum ſucco caulū ſilueſtrium & adde dyagndij bellij gummi an. dr. 1. Alius ualens ad mundificandum ſtomachum de groſſis humoribus & uentroſitate inflatus. Rec. Keb. ſalis gemmę ameoſ apij ſemi. zinaibe. pīretri ana. dra. 2. piperis longi. dra. 3. turbit. dra. 7. dyagridij ſcrup. 2. penid. quantum omnes ſpecies, mel quod ſufficit da. dra. 3. cum calida. Apozima radicis ualena cōtra hanc feb. ſi fit dura & diuturna. Rec. radices maratri apij radicis an. vnc. 1. ameoſ. 2. apij eupatorii ana. dra. 3. bedegar. dra. 6. origani abſinth. an. dra. 1. ſpinę egyp. enſcutę ana. dtag. 4. ſquinganti ariſtologiæ rotun. ana. dra. 5. omnia eo quantur in tribus lib. aq̄z donec ad unū redeat, deinde colentur. Apozima de eupatorio ualens contra hanc febrem cum eſt diuturna. Rec. eupatorii & ſucci eius ana. dra. 3. aſari ameoſ apij ana. dra. 4. origani. dra. 2. abſinth. dra. 3. ſe. ſumma terra. drag. 4. lactis amigdala. amararum ana. dra. 4. omnia eo quantur in tribus lib. aq̄z donec ad unam conuertantur, deinde colatur da poti. vnc. 2. A lind. Rec. origani. dra. 3. ameoſ. dra. 4. zinzib. pīretri an. dra. 2. ſem. coriandri. dra. 3. ro. dra. 4. calamēti. drag. 6. liquiritię bedegar ana. dra. 4. omnia in tribus libris aq̄z eo quantur

tor usq; ad tertiam partem & colatum dabis potui. Troicisci Gal. usque, cetera febres diurnas cum nimia frigiditate. Rec. laceæ. drag. 10. succi eupatorii. drag. 4. spicæ. drag. 7. asari arist. rot. an. dr. 4. longæ. dr. 3. amig. amara. maratri apij anisi mentæ. an. dr. 4. cucur. dr. 3. hieræ pig. dr. 6. tempera omnia cum succo lupi. dabis cum mel licariorum & succo maratri apij. Alius similiter valens. Rec. anisi. dr. 5. amig. dra. 2. squinanti. dra. 3. hieræ pig. dr. 9. succi eupatorii. dra. 7. & sc. maratri apij an. dr. 3. spicæ rosarum. an. dra. 4. tempera cum succo maratri & dabis ad potidum enim apozimate radieum. Alius. Rec. aloes. dr. 3. coriand. dra. 3. calamenti. dra. 5. vuarum passæ. enu electa. dr. 7. coquantur in tribus lib. aquæ ad tertiam & colatum dabis potui. Troiciscus alius. Recipe spicæ asari. amex. solit. abioth. laceæ ana. drag. 3. anisi. dr. 6. succi abioth. succi eupatorii an. dr. 3. aloes lotæ. dra. 5. apij. se. drag. 1. & sem. omnia cum succo apij aut maratri temperetur troicisci informantur. dabis eos ad potidum cum apozimate superiori. Quod si uimioisio hæc febre frigore fuerit, pythima supra dorsum frigore accedente imponatur cum oleo ubi cocta fuerint pectrum staphisagria piper calauicetum. Alius similiter. Rec. thuris maseuli piperis pectri æquale pondus. fac poluicem & tempera cum oleo ex quo vagas dorsum.

De hemitriteo & eius materia. Cap. XXXIII.

Hæmitriteus nascitur de materia cholericâ extra uasa existente, & phlegmatica intra uasa quæ utraq; in quantitate est æqualis. vnde Hipp. in primo libro epidimix. hæmitriteus inquit non dimittit. quod bene dixit, quia una suarum materiarum est intra uasa. materia enim cum fuerit intra uasa non quiescit paries, quia non habet interpolationem quamuis fuerit interpolata naturaliter, & quia hæc febris de duabus uasitur materijs contrarijs. phleg. & chol. sit in die tertianæ accidentium significatio commixta & molestatio se. valida, quia molestatio est de duabus feb. contrarijs. Lo die autem amphimerinæ signa apparent simplicia & aperta, & molestatio febris est mollior & leuior quia uisus febris est. Quod si quidam sophistæ nos reprehenderint & dicant, si est hæmitriteus feb. de duabus febri. composita. i. amphimerina & tertiana, & amphimerinus palam in eo apparet, eosq; significationes satis patet, quare accipit nomen à tertiana & non ab amphimerino. Respondemus quia amphimerinus aperte patet sensui & non est necesse sibi nomen imponatur, sed tertiana quia est omnino occulta si nomine careret omni modo & ipsa negaretur. Si iterum dixerint quomodo possumus noscere tertianæ materiam utrum sit extra uasa, & amphimerini materiam intra uasa.

Dicimus quia si frigiditas quæ solita erat in àphimerino non apparet & rigor tertianæ apparer intelligitur materia amphimerini esse intra uasa. Preterea cum hæc febris quotidie accidit cognoscimus cum phlegmaticam habere materiam & quia frigore earet & rigorem habet, cognoscimus ei cholericâ materiam commixtâ esse.

De cura hæmitritei. Cap. XXXIII.

Hæmitriteus qui de cholericâ & phlegmatica materia est, necesse est curamentum eius sit mediocre inter rem calefactiuam & refrigeratiuam, & quia omnis commixtio aut est in potestate & actio equalis uel inæqualis, aut una fortior est altera, oportet utraq; huius hæmitritei materia aut sit equalis aut inæqualis. Si fuerit æqualis sit nera hæmitriteus, cuius curatio sit cum rebus attenuantibus & dissoluentibus nullum frigorem aut calorem facientibus, sicut lupini maratri succo mauua mel. zacara rodazacara pisano cum oximelle. Quod si cholera fuerit maior sit facilius & leuior, quam curari dectum rebus mundificatiuis & modicum refrigeratiuis sicut codiua maratro rodazacara uiol. & zacara mauua prunis pisano cum oxizacara & similibus. Si autem phlegma uideatur domari sit hæmitriteus molestior qui medicetur cum mundificatiuis & dissolutiuis & aliquantulum calefactiuis quemadmodum mellierate cum aqua calida syrupo abioth. pisano in quo cocta fuerint apij radix maratri radix anetum calamentum oximel. accipiat & troicisum de berberis omnia cum succo maratri & oximelle. fumet mel ros. cum mastice auiso maratro & aqua calida. Si uideris materiam attenuari & moueri ut egredietur & signum coctionis in urina apparuerit, dabis pharmaciam suauiter solutionem facientem. & bonum est si post cibum uomitus prouocet, & diuretica tribuantur sicut troicisci de abio. & de lacea cum succo maratri endiuie & apij. Pill. valentes. Rec. hieræ pig. calamenti ana. dra. 5. maratri anisi apij an. dra. 2. fac puluerem tempera cum succo apij dabis. drag. 2. cum tepida. Aliæ pill. similiter ualentes. Rec. hieræ pig. calamenti ana. dra. 5. maratri anisi apij an. dra. 2. succi abioth. succi eupatorii an. dra. 3. tempera cum succo sumitæ & fac pill. dabis potui dr. 2. cum aqua calida.

De tertiano. Cap. XXXIV.

Tertianus nascitur de chimo melancholico, cuius materia aut est putrefacta, aut non putrefacta. Non putrefacta aut est in toto corpore, aut in uno membro coarctata. Si fuerit in toto corpore nigram generat id est itia quæ sit ex defecatione splenis sanguinis feces ab hepate trahere deficientis,

uz virtutis est ut possit morbi acumen eiusque
proliatate tolerare. Secunda ne det frigida ne co-
gelent & materiam coagulent. unde induretur
& moretur ad digerendum, fiatque causa proliai
morbi & eius persimilitatis. Tertia ne consumat
aus debile faciat corpus cum subiliatate dięę &
abstinentia, quę causa faciat mutare patientem
ad hęcticam & phisum. Quarta ne confundat
corpus cum pharmacia & maxime in initio mor-
bi priusquam materia morbi eliquetur, & sit ino-
bediens actioni naturę. Sed oportet medicum
magnum habere studium in sua actione ut det
rem maturantem & digerentem & cito eiicientem,
& ingeniet purgare catamodicum materię
cum leui vomitu, studeat etiam in regimine &
consortatione splenis & hepatis, quia hepar ge-
nerat sanguinem & mundificat eum. Quod si de
fecerit eumque non purificauerit, permaret cum
mixtis cum putridis humoribus, unde ipse pu-
trefcit & incenditur. Splen autem quia trahit
fecem & turbiditatem sanguinis si defecerit per-
manens sęa in sanguine corrumpitur, unde
idem sanguis putrefcit & incenditur. Hac de cę
utilissima hominis febris hæc est curatio vt detur
oxi zaccara cum apozimate radicum & herba-
rum & syrupo abstin. trociscus de eupatorio &
scelopon. & de rheubarbo. Oportet etiam ne
trocisci in initio dentur ne deficiant humida-
tem materię, & induretur ad obediendum natu-
rę, sed conuenit dare postquę materia fuerit
maturata. Abstinētiā a pulis gallinacis starnis
perdicibus p tres hebdomadas initiatis febris
ne cū vntuositate carnis calebat & vrat se. quia
vntuosus in se. est quasi oleū in lucerna. Quod si
materia nō fuerit maturata p illas tres septima-
nas abstinentiā habeat usque ad. 40. dies, si vitius
patientiū pari valeat. Ei quia hæc se. de humorū
inceptione generatur, i. sanguinis phlegmatis &
cholę rubeę oportet discerni de horum quo
humorum sit generata ut putetur prout oportet
vnde inuestigetur ytrum ante hanc febrem fue-
rit sanguinolenta feb. aut sanguinei morbi, aut
complexioni infirmi dominetur sanguis & ueng
cuius spiss plenę pulsus latus spissus urina rubes
& spissa & in ore eius dulcis sapor tepua ver aer
calid. & humid. somnus patientis grauis sitis par
us patiens mansuetus & pacificus, intelligimus
enim fieri de sanguinis inceptionsione. Quod si hæc
feb. certiora antecesserit aliusve cholericus mor-
bus & patiens fuerit iuuenis macilentus choleri-
cus pulsus acutus & aelox urina rufa & ignea si-
tis nimia & vigilie iracundus & intolerabilis tem-
pus etas & aer & regio calida & sicca, intelli-
gimus eam esse de inceptionsione chole. rub. Quod si
amphimetricus præcesserit aut phlegmaticus,
morbus, & patiens senior fuerit & pinguis com-
plexio eius frigida & humid a pulsus latus & lat-
us urina grossa & cruda somnus grauis sitis pat

ua tempus hyemus aer & regio frigida & humi-
da & pluuia fuerit multa, cognosce eam de in-
ceptionsione phlegmatis fuisse natam. his itaque signis
quantum diuersitas sensui facillime patet. Igitur
si certissime noueris eam esse de vitione sangui-
nis da in initio rem attenuatam & dissoluti-
uā & tamen non calefacientem sicut pilasnam cum
oxi zaccara rodozaccara viol. zaccara cum aqua
calida uomitum prouocabis. in initio accessio-
nis cum frigus inceperit infundatur pedes eius
in aqua calida in qua cocta sint cęomilla & ui-
ola. accipiant succum maligra. & vnas hyemales.
Quod si materia incipiat digeri festinauerit san-
guinem detrahi conuenit de basilica. uena fini-
stri brachij aut de media, & minue quousque ui-
deris clarum sanguinem egredi virtute hoc pa-
tiente, prouoca ergo egestionem si necessaria
est hoc catarrhico quod Rec. mirabol. citri. che-
bul. iniob. prona vnas passas enucleatas se. sumi-
terre calisistula. manna rodozaccaram radiceę
apij & endiuiz. Quod si febris elongabitur ut
vicesimum transcat diem icinet infirmus per
omnem diem accessions & alio die nō multum
comedat, quia sanguis propter abstinentiam at-
tenuatur utatur dieta subtili, quę facillime egre-
diatur. Quod si quarsana de inceptionsione cholę
rubeę fuerit, dabis in initio adiutori refrigerati-
ua & attenuatiua, quia materia pp calore in-
grossata nō attenuatur nisi cū frigiditate, proin-
de dabis succū maligra. cū oxizaccara & pilasna.
Qđ si cōstipata fuerit egestio humefiat cū māna
rodozaccara prunis endiuia calisist. Quod si nō-
dū per hoc fuerit humefacta caue ne donec catar-
thicum priusquam materia digeratur sed fac cly-
stere. Quod si materia inceperit digeri & de lo-
co in locum moueri, purgetur cum catarrhico
de mirab. citri. chebul. oxifenicia prunis eupato-
rio viol. calisistula māna rodozaccara abstinth.
calcute se. sumi terre & radicibus endiuiz.
Quod si materia fuerit intra vasa & purgausti-
bis vel ter cum hoc catarrhico bonum est si mi-
nuatur. sanguis de basilica uera sinistri brachij
cauendū tamen est ne fiat antequā materia dige-
ri incipiat. in fine autem morbi lanetur in aqua
tepidā in qua cocta sint camomilla mellilotum
abstinth. vngantur cum vino odorifero mixto
cum oleo ro. calamo aromatico temperatis om-
nibus cum succo marari. comedant maligra.
vnas hyemales melones palestinos & similia.
Quod si dolore capitis patiuntur humefiant
nates eorum cum oleo viol. si uigilias habuerint
lauentur pedes & crura aqua in qua cocta sint
papauer laquæ viol. & similia. Quia si de in-
ceptione fuerit materia phlegmatica dabis in initio
mel ro. & viol. comi calid. Apparente autem co-
stionis signo da succum marari apij cum se. cro-
ci burthenis & succo lupini. Si egestionem vis hu-
mefacere clystere fac de sicubus siccis spinis

egyptiacis camo. se. croci hortensis sisamele on
obfomoga. zaccara nitro sale communi colo-
quintida & his similibus. Eptibima facias cum
oleis calefactiuis humectatiuis & aperitiuis. no-
triantur de iure cicieris & lactu. Quod si feb. 40.
dies transierit accipiant carnem, sed tamen car-
nem caueant viscosam & unctuosam ac multū
pinguedinis habentem abstineant in die accef-
sionis a cibo, in die tranquilla accipiant cibum
assuetum, & tamen non multum caueant se a fri-
gidis & humidis, potent subtilē uinum in calore
temperatum, de auius comedant cas quæ tene-
ras habent carnes & facile digeruntur, uomitus
prouocetur & post cibum sumat diaciminum
diatrion piperon. statu autem accedente & co-
ctionis signo in urina alijq; apparente subtilie-
tur dicta purgetur cū pharmacis & clysteribus.
dabls etiam diuretica. & uomitum omni die ac-
cessionis stomacho inanito prouocabis in die
qua non uenerit accessio prouocetur uomitus
postquam comederit. abstineat à pullis & om-
nibus per tres hebdomadas & plus donec diges-
ta fuerit materia, deinde si uirtus permiserit da-
bis annuāle agnū ei. Quod si febris nō fuerit fori-
tis neque uirtus defecta da helleborum albū, &
pronoca uomitum tū succo aneti radice & oxi-
melle, & assuefaciat thynicam magnam diatef-
feron diasulphur & his similia. Trocisci ualen-
tens contra hepatis dolorem & splenis & febris
quartanæ. Rec. lacce reubarbari ana. drag. 4. eu-
patorij absinth. succi amborum pondus e quale
spodij ana. drag. 3. cuscute. dra. 6. scolopendrie.
drag. 5. semi. portulacæ spicæ anisi apij se. ans.
drag. 3. maratri. drag. 4. croci piperis. nna. drag.
3. ro. se. maligra. capparis radice ana. drag. 3. tē-
perata cum succo apij. Alij simili modo ualen-
tes. Rec. succi eupatorij scolopen. ana. drag. 10.
lacce aristol. longe. ana. drag. 2. spodij. drag. 5. se.
cucumeris portul. ana. drag. 6. maratri. drag. 6.
croci. drag. 4. piperis alb. drag. 3. tempera cum
succo apij & da potui cum oximelle. Alij con-
tra quartanam quæ fiede incensione phlegma-
tis. Rec. myrrhæ. drag. 7. spicæ. drag. 6. amomi. dr.
4. aristol. ro. rheubar. ana. dra. 6. opij. drag. 4. ani-
si apij se. petrosil. ana. voc. 1. castorei. dr. 5. squi-
nanti piperis alb. caslig. ana. drag. 4. piperis ni-
gri ame. ana. voc. 1. storacis. drag. 6. croci. drag.
10. melliloti drag. 8. silefen drag. 4. ydiocri dr.
5. mell. quod sufficit dabis dra. 1. & se. cum cali-
da. ydiocri. Rec. florum herbæ policariæ albæ & ci-
trine myrrhæ ana. drag. 2. dauci calami a ro. cipe-
ri xilobalsami asari ligni aloes ana. dra. 4. ruber
colli spicæ croci masticia ana. drag. 5. tempera
cum uino odorifero & fac trociscum. Alius si-
mili modo ualens Rec. myrrhæ. drag. 17. spicæ.
drag. 18. croci. drag. 6. castorei auis an. drag. c.
amomi. drag. 4. apij. drag. 12. squinanti. dra. 17.
gummi mal. gra. drag. 5. sileleos. drag. 4. ydio-

crum. drag. 4. mel. quod sufficit. Diacostum ad
quartanam & ad supradicta ualens Rec. cina-
momi alipie spicæ casig lignæ costi an. drag. 4.
myrrhæ squinanti succi eupatorij anisi apij asari
an. drag. 7. reubarba. aristol. ro. croci an. voc. 1.
absinthij. drag. 5. mel. quod sufficit. da. drag. 1.
cum aqua cali. Alius simili modo ualens. Rec.
ameos. drag. 10. piperis nigri. drag. 3. zinzibe-
drag. 4. asari. drag. 5. calamenti. drag. 10. casig.
drag. 8. spicæ. drag. 10. carui. drag. 7. uisid. drag.
7. masticeis. drag. 6. maratri. drag. 4. mel. quod
sufficit. Pill. otillissimæ. Rec. huzarpi. epithimi
an. drag. 5. agari. drag. 4. torbith. dra. 6. absinth.
drag. 3. sulphuris albi salis ameos ana. drag. 4.
polipodij. drag. 4. maratri apij anisi an. dra. 1. &
sem. tempera cum succo mentæ & fac pill. qua-
rum. drag. 2. cum calida donentur in dietran-
quilla. Trocisci. Rec. croci. dra. 2. sulphuris. dra.
3. casig lig. se. costi spicæ an. dra. 3. castorei mye-
rhæ an. drag. 1. & se. rutæ amomi. drag. 4. opij.
drag. 3. se. papauæ. drag. 6. figie anisi an. drag. 3.
succu liquiit. drag. 6. tempera cum succo apij
dabis ad potandum cum calida tribus boris an-
te accessionem. Apozima ualens contra quarta-
nam de phlegmatica materia natam. Rec. squi-
nanti ameos an. drag. 4. calamenti carui apij se.
anisi an. drag. 6. succi eupatorij. drag. 6. absinthij
cuscute an. drag. 6. origani. drag. 7. uox passif.
voc. 2. omnia in tribus lib. aquæ coquantur ad
tertiā & colatis ad dimidiū libram potui dabis.

De epiala. Cap. XXXVII.

Epiala est febris qua corporis interiora incen-
duntur & exteriora infrigidantur, quia eius ma-
teria est phlegma grossum & vitreum, cuius que-
dam pars est putrefacta, quædam minime. Pars
autem quæ putrefcit generat febrem, altera autē
quæ est imputrefacta facit cōgelationē cum sua
natura. Causa quare non putrefcit eius grossitu-
do est & duritia materiz, quia phlegma non
naturalis sunt quatuor, nōm dulce, secundum
salsum, tertium acetosum, quartum vitreū. Dol-
ce uero est uicinum naturali, sed tamen
modicum est calidum propter suam dulcedinē,
non enim est aliud nisi sanguis non perfecte di-
gestus, proinde natura cum naturali indiget
phlegmate habet dulce in uice eius & digerit il-
lud cum sanguine & emollit eum eo membrorū
concauitatem & concatenationem, ut facile mo-
ueantur, illud etiam expulsiuæ uirtutis facit esse
materiam. Salsum uero & acetosum sunt in sto-
macho. Causa enim eorum aut est calor extra-
neus stomachi complexionis dominūs, aut nimia
frigido, quia phlegma naturale ad stomachū
ueniens ad mitigandum & confortandum expul-
siuam uirtutem tū in stomacho carumque inue-
nerit calorem calefit & in salsum conuertitur, quæ-

fi extraneam reperierit ibi frigiditatem deficit calor naturalis & sua augmentatur frigiditas, unde in acetositatem mutatur. Causa autē falsi minis duobus modis est, aut est putredo phlegmatis calefaciens naturalem illudque conuertens in aciditatem. vnde fit falsum, aut est nimis calor phlegmatis humiditatem desiccans qua de re suam amittit sporisositatem & conuertitur in falsum. Similiter causa acetosi phlegmatis duobus modis est, aut est frigiditas, aut calor, quia frigiditas si aquositate sanguinis dominet prohibet eum ne ad coctionis perfectionem veniat. vnde cum suam actionem complete nequiverit neque in sapiditatem uenerit eius aquositas permanet subtilis, proinde cito mutatur in acetositatem sicut uidemus frigidum aerem in musto operari cum paruitatem habet dulcedinis, quia mutat illud in acetositatem. Calor autem si sanguinis aquositate iuuenit inspidam & inunctuosam, quandam in ea facit ebullitionem & conuertit illud in acetositatem, sicut calor solis & aeris in aqua mellis & musto facit cum dulce do eorum fuerit parua unde eam enim calefacit & excoquit, quia in eis tanta non inuenitur dulcedo ut custodiat eorum humiditatem, mutatur in acetositatem. Eodem modo uidemus calorem aeris agere in peisina & lacte, cum nou in eis tantum inuenerit dulcedinem ut sua custodiatur humiditas conuertit eam in acetositatem. Phlegma autem uitreum grossissimum est & viscosum, quia causa eius nimia est frigiditas naturalis dominans phlegmati, unde ingrossatur & fundū eius fit quasi liquidū uitrū. Proinde non possunt illud natura in regimento corporis propter eius duritiem actioni naturae inobedientem. vnde non naturalis calor cui ad illud uenerit nequit illud oīno putrefacere, sed partem eius quae facilius est putrefacere, aliam putrefacere non uolet. Ideoq; in hac febre interiora corporis calent & exteriora frigent, quia partem phlegmati interioris existenti calor extraneus accidit, cui quia ipsa obediens putrefacit eam. pars autem circa corporis exteriora habitans, quoniam illi non obedit calori non putrefcit, sed in sua constat natura, unde naturaliter generat frigiditatem. Amphimerina autem differt ab epiala, quia tota materia amphimerinae putrefcit, unde calor eius totum corpus circūdat. Epialos non est huiusmodi, quia tota non potest putrefcere interiora calefacit & exteriora infrigidat. Hec etiam se aliter ab amphimerina differt, quoniam urina in ea crudissima est & sibiior quam urina quae apparet in amphimerina. pulsus similiter est paruus & debilis plus quam in amphimerina, & aliquādo cum materia epialos melancholica miscetur materia. unde sua augmentatur grossitudo & eius confortatur ponderositas, suusque motus fit tardus, quia aliquando de 5. m. 5. mouetur, & ali-

quando per. 7. nonnunquam per. 10.

De liparia. Cap. XXXVII.

Febri autem liparios causa est de cholerica materia incensa mixta cum uitreo phlegmate aut cum melancholica materia. unde conuertitur & à natura cholerae egreditur, quae differt ab epialos, quia illa interiora corporis calefacit & exteriora infrigidat vsq; ad corporis extremitatem & oppellans pororum foramina prohibet ne sumus dissoluatur, & accidunt patienti nimia sitis & linguae asperitas propter calorem in corporis interioribus dominantem, sed in liparios omnia sunt contraria, quia interiora sunt frigida & exteriora sunt calida. Causa quia cum materia eius sit composita de melancholico & phlegmatico humore, chol. rubra nero licet incendatur & ingrossetur, diuiditur tamen extra corpus & calefacit illud exterius, uitreum autem phlegma & melancholicus humor naturaliter sunt ponderosi coadunati & iuncti. unde in corporis interioribus una sunt accumulati, qui quoniam in interioribus existunt, & tamen non putrefcunt necesse est ut interiora infrigident. Quod si quisdam philosophi nos reprehenderint de hemitriteo dicentes, quare non interiora calefunt & exteriora infrigidantur cum materia huius febris sit cholerica & phlegmatica. Respondemus phlegma in hemitriteo est leue & mobile, unde facile obedit extra uero calori & putrefcit & calefit, sed in liparios materia phlegmatica est dura, quia phlegma uitreum est putredini inobediens, proinde interiora naturaliter infrigidat. Rursus si disierint si in liparios cholericis materia cum fuerit incensa calefacit exteriora interiora minime, quare in tertiana non simili modo agit cholera. Respondemus cholera rubra in tertiana est simplex non ut cum alia materia sit mixta, quae quia est simplex equaliter suam operatur actionem interius & exterius. In liparios uero cholera cum phlegmate est mixta, unde cholera prohibet actionem in corporis interioribus, & sit ibi naturaliter frigiditas. Si interum opposuerint quare uitreum phlegma in liparios non generat se. sicut facit in epiala? Respondemus phlegma quod est in epialos licet sit frigidissimum & durissimum, tamen non in toto est eguale, proinde cum extraneus calor ad illud uenit partem eius liquidam & putrefactioni convenientem calefacit & putrefacit. Aliam nero duram & putredini inobedientem putrefacere nequit, in epialos uero phlegma est frigidissimum & durissimum & totum æquale. Idcirco extraneus calor non ualet ad eam accedere, neque illud conuereere ad putredinem.

De cura epialos. Cap. XXXIX.

Epialos quia de uitreo phlegmate uasctue necesse est ut curetur sicut amphimerina, sed tamen phlegma quod est in epialos quia est frigidus, oportet fieri medicinam eius calidiorē secundum quod materia eius fuerit frigida, sed decet ab initio incipi à medicinis quæ debilitant sunt calefacientes donec eas natura assuefaciat, deinde paulatim ad calidiores ascendi quousque; ad illam caloris quantitatē nemini in qua nostra fuit intentio. Plurima nostra intentio est in hac febre, ut mūdificetur stomachus cū re purgatiua mūdificatiua & colatina, purgetur materia per uomitum & urinam cum oximelle & aqua calida, in qua cocta sint spica anisum & similia. Quod si materia inceperit se monere & signum coctionis in urina apparuerit, purgetur materia cum apozimate de aloë & apozimate de hierapicra, pilul. stomaticis & pilul. de fetida, clystere fiat eis in quo intrauit se. croci horrentis centaurea anetum abeotanus herba polica ria ameo bdelium serapinū eoloquintida & his similia. Post purgationem materie assuefaciant antidotum ubi alia & calorem ponuntur, & pilul. in quibus eupatorum mastix abutib. aristol. r. d. spica crocus & similia intraverint. Dietam accipiant quæ sit laxatiua & diuretica sicut est ius ciccris cum obsomogaro & cimino & amigdaleon blitis radicibus iparagis porris omnibus coctis & cum obsomogaro coctis. potent oximel squillicum cum aqua. accipiant post cibum diaciminum, diatrion pipereon, diacalamantum & his similia.

De cura liparia. Cap. XL.

Liparios autem, quia materia est phlegmatica cum cholera mixta, dari oportet minus calida quam in epialos sicut mel ro, & oxizaccara apozima de aloë hierapicra & oxizaccara cum succo maratri apij anisi mastice & similibus.

De causa diuersitatis febrium adinuicem interpolantium. Cap. XLI.

Quia compleuimus quicquid uolumus dicere de humorum putredine, oportet nos explanare causam diuersitatis febrium adinuicem interpolantium, & quare quedam non habent trāquillitatem, licet parum quiescant quod non oportet sensui, & quare alia. 18. horas teneat & sex dimittat. Alia etiam. 12. horis moueatur. & 36. quiescat. & alia. 14. habeat commotionem, & 48. requiem. Et quauis superius in tertiana uide licet, de hoc disputauius, placet tamen nobis illud repetere ut firmus sit annexus memoriz. unde dicimus causam esse duobus modis.

Unus qualitatum elementorum est diuersitas suarumque actionum. Alii sunt quantitates & qualitates materierum. Ratio & sensus ex elementorum natura demonstrant qualitates esse quatuor, calorem, frigiditatem, siccitatem, & humiditatem. Humana enim corpora non uideamus mutari neque conuerti nisi ad eas, & non sanari neque restaurari nisi per eas. Quod si alia quanta esset in nostris corporibus aliquid his quatuor necessario ad eam mutarentur sicut ad istas conuertuntur. Necesse etiam esset exhiberi aliam qualitatem isti quantitati contrariam ut cum ista curarentur & restaurarentur, quia medicina non est aliud nisi repugnatio unus contrarij ad aliud contrarium, nos enim non inuenimus quod nostra corpora mutantur ac conuertantur nisi ad calidum frigidum humidum & siccum, neque sanari & ea restaurari uideamus nisi cum calido frigido humido & sicco sicut Aristoteli dicit in quarta particula megacosmi, per contrarium inquit contrarius & per similitudinem augmentamus. Quatuor ergo sunt qualitates neque plus neque minus. Oportet iterum intelligi quia de istis quatuor qualitatibus due sunt actiones. calor & frigiditas & due sunt passiones sicut humiditas & siccitas, quia calor semper facit siccitatem, desiccatur enim humiditatem corporis, frigiditas enim facit humiditatem quia claudit & coadunat eam atque prohibet ne dissoluatur, humiditas autem & siccitas nihil faciunt in calore & frigiditate. Calor ergo & frigiditas sunt facientes humiditatem & siccitatem, & humiditas & siccitas sunt illorum passiones. Unde miror de Ioanne Damasceno quare negauit calorem non facere siccitatem & arbitratus est ut intentio Aristoteli de calore siccitatem faciente taliter esset ut siccitas sit instrumentum per quod calor suum operatur actionem. & fecit huic similitudinem sensualiter cum dixerit quod ignis aquæ calidus sit actiuus & aqua sit actiua passiuæ & olla quæ est sicca sit instrumentum & mediatrix aquæ & ignis ut per eam ignis ualeat calcificare aquam. Mihi autem uidetur quod non exercitauerit se in sermonibus philosophorum neque inuestigauerit eorum intentionem, non enim similitudo sapientie Aristoteli, qui non intendit actiuam qualitatem facere in passiuam cum instrumentum, quia actiua actiuus operatur essentialiter & naturaliter in passiuam, & instrumentum est coniunctum accidens adiutorium actiuus præstans actioni, olla ergo non est aliud nisi instrumentum aquæ ne curat retinens & custodiens ut ignis in eam operari ualeat, quod si ignis non poterit illud facere sine mediatoribus & instrumentum quo in tendit oleum & eliquat ceram plumbum & multa alia corpora, uisi quia actio sua est naturaliter non cum mediatore instrumento. Ego autem non paruipendo scientiam & prudentiam Ioannis Damasceni.

damasc. & dico suā intētionē nō esse ex ignorantia philosophorū nerborū: sed spero i hac ductio ne itēdisse sicut rhetorici dūt i liturgione dū īge nīat qualiter possint vicere aliqū, licet nō cū ue ritate. Et quia palā intelligimus calorē & frigiditātē qualitates esse actiones: & hūiditatē & siccitatē eē passiuas, debemus iterū itelligere quia ca lor fortior actiuus ē & frigiditas debilior: & sic citas ē fortior passua hūiditas atq; debilior ē. Inue nimus ē calorē citius & fortius facere in nostris corporibus q̄ frigiditatē: q̄a frigiditas nō facit i nostris corporibus nisi post aliq̄ t̄pis spaciū p̄inde plus patimur frigiditatem nūis q̄ ignis calo rē. Siccitas at̄ dicit̄ eē fortior passua q̄a reperim us eā duriorē & magis repugnātē ad recipiēdū calorē vel frigiditatē q̄ sit hūiditas, hoc testat̄ ser rū & lapis q̄ sūt duriora & inobediētiara ad reci piēdū calorē uel frigiditatē q̄ aqua: q̄a hūiditas partē rei dilatat & mollescit, nō inuenit caliditas viā ad p̄forandas ceteras corporis partes veloci ter. Siccitas aut̄ coadunat partē rei & eā indurat. vnde caliditas in eo velociter nequit penetrare. Actiones iterum qualitates in quodam cōcor dant & in quodam discrepant, inuenimus enim actiones caloris cū humiditatis actiōe esse cōue nientes ad mouendas partes rei ad exteriora, vi demus. n. dilatari & expandi a p̄iri corpora cū ipse ad exteriora eā dilatauerit. Actio. n. frigiditatis dicit̄ cū siccitatis actiōe esse conueniens q̄a coadunat res & monet eas ad centrum, & appo pinquant partes eorum adinuicem. Quod si qui dam philosophi nos in humiditate & siccitate re prehendant dicentes, quare siccitatem & hūi ditatem nō dixistis esse actiuas cum dixeritis q̄ humiditas partem rei dilatat & eam ad exteriora extendat, siccitas & frigiditas coadunat rem & eam facit ad centrum mouere & in superiori bus ex dictis Aristo. dixerat actiones ab eis esse ablatas & esse passiuas. Respondemus Aristo. non absolute ablutit eas actiuas esse nisi in calo re & frigiditate, sed inter se adinuicem uidemus habere actiones, quia videmus humiditatē rē hu mediare & dilatare & siccitatem coadunare ean dem, ergo Aristo. non humiditatem & siccitatem actio nem ablutit nisi i calore & frigiditate, licet cali ditas & frigiditas sint eorum actiuæ. Inuenimus enim calorem humiditatem minuere & siccita tem augmentare & frigiditatē decrefcere siccita tem & humiditatem esse augmentatiuā: & minui tur frigiditas quia calor humiditatē desiccet. vnde qualitas eius est coadunatiua. vnde crescere facit cū. humiditas aut̄ & siccitas nihil faciunt in calore & frigiditate. Palā ergo intelligimus quia in elemētis calor est fortior actiua & siccitas for tior passiuā: eodem modo intelligimus quia calor & humiditas dilatant & mouent rem ad exte riora: & frigiditas & siccitas coadunant & arcent eam ad interiora ipsius corporis patientis. quod

cum ita sit necesse est vt quęcunque materia fue rit cōposita de actiua fortiori & passiuā debilio ri sicut est sanguis: febris quę ab ea nascitur cōti nua est: verbi gratia: inuenimus in sanguine for tiore actiuā. i. calorē & debiliore passiuā. i. hu miditatem, & quia proprietas caloris & humiditatis est dilatare & mouere rē ad exteriora fit mo tio & dilataciō huius feb. ad exteriora facilis & inuenit locū cal. vt eis actio semper fit: quia ca. sanguinis est febr. adunatius humiditas eius de secta est ad repugnandū calori: est ē dilataciō nē & ad exteriora motiōē adiunat: proinde fe bris quę fit de sanguine est cōtinua. Et quoniā in cholera rub. est fortior actiua. i. calor: & fortior passiuā. i. siccitas & proprietas caloris est dilata re & mouere ad exteriora & siccitas coadunat & mouet rē ad interiora huius feb. motio naturali ter idurat necessarios & dilataciō eius ad exte rio ra aggrauat. vnde calor impeditur ad continuan dā actiōē suā: proinde at̄ ipse eū suo calore ope ratur & eius materia circa suas extremitates egre dit̄ per vnum diē repugnāt eis siccitas ut nō has feb. cōtinuat & tardat eā vsq; ad tertiū diem, & quia in phlegmate est debilior actiua. i. frigiditas & debilior passiuā. i. humiditas & frigiditas est coadunatio humorū & motio humorū ad ex teriora, & humiditas proprie dilatat & cōmouet eos circa extremitates faciliorem necesse est hec fe. habeat motū & dilataciōem & ad extremita tes est debilis. & q̄a cho. rub. debiliorem habet a ctiua. i. frigiditatem & fortiore passiuā. i. siccitatem & utraq; cōcordant ad cōstringendū & re tinendū materiā i ntrinsēcus hūmōi se. materia ne cesse est indurā & tardā ē dilatatū se circa ex tremitates, p̄inde eius irrepulatio fit lōgiōr sua accessione, quia non habet i cholera nigra ulla res calorem adiunat, ut ad exteriora dilataet & q̄ uis nō inuenimus i cholera nigra nisi ntrāq; qua litatem eā ad interiora cōmouentem i sui tñ gros situdine ac grauiter motus feruens diu moratur nec cito extinguit. Ideoq; tempus suę exacerba tionis ad comparationem aliarum putridarum febrium est lōgisimum & ad cōparationem suę tranquillitatis est breuissimum. hoc testificatur uidemus enim lapides & ferrū licet tarde calo rem ignis recipiat, tamē susceptus difficile extin guitur, igne uero extincto nihil caloris in eis per mansisse reperit̄, carent enim humiditate in qua calor adherere se ualeat. Quod si quidam sophis tæ nos reprehēderint dicentes, si utraq; qualitas cholera nigre i ntrinsēcus se cōmouet, quō calor circa corporis exteriora dilatur? Respondemus diximus quia febris non nascitur de materia melancholica nisi cum i sua natura egreditur & putrefit, substantia enim eius est liquida licet sicca sit in natura. vnde propter suum liquorem putre fit & febrem generat. Sed tamen febre circa exte riora corporis apparente si natura eius naturali

er sit calida, sit motus eius velocior ad exteriora quam ad interiora. Sed si materia fuerit frigida, sit motus e conuerso.

De diuersitate interpolatarum febrium propter qualitatem & quantitatem. Cap. XLII.

Diuersitas interpolatarum febrium propter qualitatem & quantitatem materię multiplex est. Est. n. febris cuius materia multa est in quantitate & temperata i liquore, & fortiores habet calorem naturaliter & accidentaliter propter sui bullitionē ad putrefactionem sicut febris quę nascitur de putredine sanguinis. Est & alia cuius materia subtilē & ignem habens calorem quemadmodū feb. quę generatur de sanguine. Est & alia materia cuius est subtilissima & siccissima in natura & calidissima sicut febris quę fit de putredine cholę rubeę. Est iterum alia cuius materia est multa & grossa & humida accidentaliter habena calorem propter ebullitionem & putrefactionē sicut ea quę fit de putredine phlegmatis. Rursus est altera quę est pauci in quantitate grossa & sicca naturaliter liquida turbida habens accidentaliter calorem & propter bullitionē & putrefactionē nō tamen eam sui natura quemadmodum febris nascens de putredine cholę nigre. Vnde tum feb. de multa oritur materia temperata in liquore & cal. naturaliter sicut synocha feb. adhæret se materiei multo in liquoris humiditatem, quā de re accensio eius sit continua nullam faciens remissionē ab initio usq; ad materię cōsumptionem, sed tñ huius febris consumptio plurimum brevis est propter suam materiam quę est facilis & obediens actioni & cōtioni unde hæc febris plurime in septem finitur, quę si septem transierit fit propter aliam materiam quę est sanguini cōmixta cum ingrossans & aggravans, hæc de causa prolongatur usq; ad 12. aut. 14. diem. Causa uelocitatis hanc febrem dissoluens est propter sanguinem qui licet velociter possit sua tamen essentia temperata est. vnde si accidentaliter est putrefactus naturaliter tamen est temperatus, proinde cito in suam conuertitur naturam. Sed alij humores non sunt huic similes, sumunt enim putredinem & calorem in quantitate & qualitate, sed sanguis nō est eis similis, non enim putredinem inspicit nisi cū sola qualitate, qualitas enim eius calida est & humida & calida cōplexio ceteris cōplexionibus est temperatior. Quod si quidam arbitrantur ut augmentatio caloris & humiditatis sanguinis sit causa qualitate eius corruptiens, peccant, hoc enim nō est aliud nisi sue quantitatis augmentatio nō qualitatis corruptio. nā sua qualitas non corrumpitur nisi cum solus cal. augmentatur & egreditur a natura sanguinis sit; cholericus aut augmentata eius humiditate fit phlegmaticus. Si calor eiusq; humiditas æqualiter fuerint augmentata fit augmentatio quantitatis nō corruptio qualitatis. Quæcumq; aut feb. de

materia subtili fuerit & sicca & igneum habuerit calorem, naturaliter festinat calor in materia & facit quasi cinerem: & mundat corpus a calore quia calor nō inuenit humiditatem cni adiungere se valeat. hoc testat quod uidemus in siccis & nigris lignis, sicca. n. cito vrunt & ad cinerē cōuertuntur, sed in viridibus alligatus ignis diu seruatur. Quod si quidā sophistę nos reprehenderint dicētes, quō calorē seruatur humiditas cum utraq; sint cōtraria: & omne cōtrariū temper suo repugnat cōtrario. Respondemus hūiditas repugnat calori priusquā calori operetur in ea, sed cū humiditas incipit pati calorem custodit ac seruatur eum, quia regit materiā in qua calor operatur ne cito p eū cōsumatur, proinde quęcumq; materia feb. fuerit sicca & subtilis sicut cholerica incidit ac cōsumitur velociter sitq; quasi cinis & cito eius calor extinguit & tardat sua reuersio, quia nihil priora materiei in corpore pmanet, ut velociter calorē incipere valeat, sed materia feb. si fuerit humida & grossa sicut phlegma suā tardat vñtionem, quā uero cū pati incipit diu sustinet eā & tarde calor extinguit p materię ei repugnātem, quo tñ extinguit oīno corpus ea calore mūdificat, quia hūditas & grossitas materię regit calorem in corpore. vñ cito in secūdā conuertit accessionē. Calor n. primę exacerbationis alterū adiuvat qui est de secūda accessione ut cito frigidescere incipiat, p hoc mora huius fe. triplex q̄ sua dimissio. eius. n. accessio. 1. 8. horis morat, sed triquillitas scilicet. Materia iterū si grossa fuerit & sicca sicut melancholia repugnat calori cū sua grossitudine, q̄ tñ vñ incipiens materiā cōsumens cōuertit eā quasi ad cinerem & mūdificat corpus ab illa, calor. n. caret hūiditate qua custodiri valeat p siccitatem naturalem materiei. Idcirco huius feb. reciprocatio tardat, quia frigiditas materię sui; grossitudo non obediunt calori ut cito in ea annexi possint. corpus iterū de priora accessione est mūdificatū, vnde nō permanet aliquid caloris per quod calor secundę exacerbationis adiunetur, hæc de causa tempus triquillitatis huius feb. est bis tantū quā tempus sue exacerbationis, exacerbatio. n. 14. horis permanet, sed dimissio. 48. Quod si sophistę nos reprehenderint & dicant, quomodo feb. in materiā operatur & consumit eā, & aliqui cito & aliquando tarde finitur p subtilitatem & grossitatem materię, cū nos uidemus naturalem calorem materiā digerere & eā extrinsecus expellere. Respondemus oīs cal. natural. vel accidentalis necesse est habeat materiam qua nutritur, quod si non habuerit cito extinguitur. vnde nutrimentum caloris naturalis est humiditas sanguinis in arterijs existens sui; in vñuosis & caloris naturalis materiā i qua operatur sunt ciberia ea. n. excoquit & digerit & laudabilem dimittit chimum a non laudabili, & laudabilem mandat per totum corpus ut eo nutriatur. Illaudabili

Jévero exterius expellit. Sed calor febris nō est huic similia. eius enim nutrimentum est in quo facta materia per quam febris generatur sed subiectione ubi operatur est materia unde febris nascitur, quia nisi hoc esset naturale incenderet humiditatem & eā consumeret, quā impossibile est ineniri calorem absque materia in qua operatur. Ideoque materia cessante & ipsa cessat, & materia adhuc permansente & febris permanet. Palam ergo intelligimus quia actio caloris naturalis in humoribus corporis secundum quod oportet & prout necesse est ad corporis regimen operatur, quodammodo in alijs locis diximus. inuenimus. n. calorem naturale cibum subleuare & digerere atque mūdificare eiusque fetores expellere per loca quę natura ad hoc preparauit, sed calor febris operatur cum sua natura in materia quę est putrefacta per unāquāque exacerbatōnem, ut eius humiditatem per unāquāque exacerbatōnem, consumat. Ideoque cessante materia transit febris hic testatur quia videmus febre periodicā quiescere & incipere multis modis exacerbatione & interpolatione, & nulla actio nature in ea appet neque in urina neque in alijs suis partibus. Rursus si solutio materiei facta per unāquāque accessione esset ex actione nature, non fieret in prima nec in secunda accessio, quia natura prius attenuat diuidit & digerit materiā, deinde eam expellit. Iterum quia natura nō facit accessione nisi in die non clausa aut cretica ergo dissolutio materiei a phlegmatiz tertianæ facta quacūque actione in prima exacerbatione vel in secunda nō est ex actione sed ex calore febris nō est nisi secundum ordinem ut prius attenuet & digerat materiā & etiā diuidat, deinde expellat in die non clausa aut cretica. Quod si festinat ante tempus aut tardatur nunciat malū eius. n. festinatio innuit acumen materiei suęque qualitatis persimilitatem naturam inuadentis ut festinet operari ante suum tempus, tarditas vero significat materiei grossitatem & nature pigritiam. Sed differentia actionis horū calorū est hic, quia calor naturalis prius digerit materiam, deinde eā per congrua loca expellit aut cum sudore aut cum vomitu aut cum solutione aut cum urina, sed calor febrilis depascendo consumit materiā cum suo nutrimento neque eā digerit aut expellit unde materia cum fuerit expleta & finita febris quia caret nutrimento extinguitur donec alia inuenerit materiā & eā orat, propter hoc in initio morbi interpolatio febris eiusque dimissione patiens nullam sentit requiem nisi quiescente febre, quia natura nondum excoxit materiam neque eam digerit.

De duplicatione & compositione febrium. Cap. XLIII.

Febri quę sit de putredine humorum componitur & duplicatur multis modis, aut secundum complexionem aut uiciniam, aut secundum compositionem, aut secundum perfe-

cutionem quia aliquando miscentur duę febres in una die & in uno tempore nerbi gratia, duplex tertiana incipit in una hora & die & in una dimittit, quemadmodum si in prima hora diei incipiat & in fine diei dimittat, hæc enim febris ut multum. 12. horis mouetur. Et aliquando componitur duę febres ex diuersis materijs, una uidelicet cholera, & altera phlegmatica, quę utraq; incipit in prima hora diei, & dimittit cholericā in fine diei, & phlegmatica in media nocte. Vnde si hæc fuerint commixtę, & una materia fuerit intra uasa & alia extra, sunt significationes faciles ad cognoscendū quę utraq; si fuerint intra uasa aut extra, sunt significationes earū durę ad cognoscendū & obscurę præcipue si vniuersa fuerint materie, & in uno inceperint tempore. Sed tamen quę intente & assidue in hac arte laborauit & in secretis antiquorū exercitatus est earū significationes eos nō latent, quia si bene inuestiget nūquid cuiusque materię proprias significationes, & eas quę plurimę & modicę cōtingūt oīno potest cognoscere. verbigratia, quis duas patiatur febres, vnam cholericā & aliam phlegmaticam, quarum si phlegmatica fuerit maior sit rigor febris frigidior, extremitates corporis manus uidelicet & pedes in frigidantur, & augmentum atque febris acumen venient dantur, neque patiens habet acumen aut sitam, sed licet propter choleram sitim habeat, parua tamen sitis est, minori etiā molestia febris ueniat, quā si utraq; materia fuerit equalis in quantitate. Hęc itaque species febris cuius materia phlegmatica est maior nō facit urinā multū tinctā aut multū acutā, nec patiens sudat nisi parū in fine actionis & uomit phlegma. Quod si cholericā pars fuerit maior, sit rigor fortior & frigiditas leuior sitis & incensio maior, & accessus febris citior sudor maior & urina tincta & acutior, & uomit cholera. Quod si utraq; materia fuerit equalis in quantitate, hæc significat oēs equaliter erūt, quodammodo si rigor & frigiditas fuerint equalia. Augmentatio febris inter uelocitatem & tarditatem mediocri & vomitus mixtus de phlegmate & cholera. quę utraq; materia si fuerit intra uasa caret rigore atque frigiditate ceteras tamen habet significationes febris sicut continua cuius significationes ac diuersitates poterit quis discernere sicut diximus. Quod si vna materia fuerit intra uasa & altera extra rigor est ablatior ab ea quę constat intrinsecus & permanent illarum significationes prout ostendimus, sicut febris quāsi continua, sicut uidemus in hemipterico quę est de phlegmate intra uasa existente & de cholera quę est extra cum fuerint equalis in quantitate & qualitate, proinde est quāsi continua sicut hippocrati in prima particula epidemij epimicticus inquit nunquam dimittit, quod gloriosissimus hippocrati sapienter & oere dixit, quia materia cum fuerit intra uasa, licet naturaliter sit interpolans, non tamen quies-

scit. que se. quia de phlegmatica & cholericâ cōponit materia & secundum phlegma fit cōtinua secundum cholera uero una die dimittit & una minime si fuerint significationes diei ad tritē p̄tinet cōposite de tercio in tercio & amphimerino, fitq; sua molestatio sicut ea que fit de diuersis materijs In die aut̄ amphimerini significationes simplices apparet & se. leuis. Hoc itaq; mō oportet itelligi duas se. de vna materia uidelicet cholericâ & phlegmaticâ, quia significationes ostendunt eas duplices esse demonstrantes. Eodem quodam modo cognoscimus si quidam habuerit tertianam cōtinuam & quartanam interpolatam, quia necesse est ut à tertia rigores ablati. Est enim intra uasa cum sanguine mixta, & à sensibilibus membris longinqua & cetera significationes permancnt commixtę cum quartana, unde de signis tertianę urinx apparet vltio sitis cholericus uomitus actio urinx pulsus fortitudo & uelocitas & cita febris accensio. De signis autem quartanę ostenduntur tremor nimia frigiditas grauitas & fragmentum carniū & osium, quia grossities & grauitas materię frangit membra & permanent lingua tertianę. 13. horis. deinde signa quartanę sola apparent sine illorum cōmmissione & morantur quousq; eorum tempus finitur quod est. 34. horis. hac itaq; dect mensura inuestigari significationes febris, ut in propatulo eius certitudo appareat, & omnia ab eo dubietas transeat. Complexio autem est coniunctio duarum materiarum diuersarum in una febre, sicut est liparios que est commixta de cholericâ materia cum uiscido phlegmate, aut cum melaucholica. Compositio uero sicut eum duę febres componuntur secundum uiciniam & persequutionem in duobus temporibus una sequens aliam, horę tamen earum sunt commixtę. cum prima cedit altera incipit, & earum significationes ordinatim apparent, proinde hęc febris non habet obscuram significationem. Aliquando tamen materia utriusq; febris in diuersis locis corporis permanet, sicut cum materia est in splene dicitur quartana, & ea quę constat in stomacho dicitur amphimerina. Præterea aliquando utraq; materia est in uno membro sicut materia tertianę & quotidianę in stomacho exstensa. Nonnunquam duę febres sunt de una materia, sed tamen propter eius duritiem & grossitiem partim minime. Partis itaq; quę putrefit eius calor ostenditur, sed ea consumpta secunda incipit putrefieri, & calor eius apparet. quę utraq; febris ex suorum accidentium facilitate cognoscipotest. Sed tamen nonnunquam tres febres coniunguntur sicut diximus, quę sunt aut secundum cōmmissionem aut secundum cōpositionem. Quatuor autem febres impossibile est coniungantur, nisi eū duę unius fuerint materię &

duę alterius. verbi gratia, sicut si fuerint duę febres de cholera & duę de phlegmate, tertia de cholera, quarta de melaucholia. Sanguinis autē significatio impossibilis est cum aliarum signis appareat, sanguis enim plus ac abundantius in corpore est toto quā omnes alij humores, qui si putrefit & febrem generat operit omnes febres quę cum ea sunt commixtę propter multitudinem suę quantitatis & obscurat earum significationes, quia de omnibus rebus fortis debilitat denigrat & multum paucum, quod testatur lumen solis lumen ignis operiens, unde Hippo. in apho. duorum dolorū in uno loco factorū unus denigrat alterum. Intendit Hippo. ut maior obscurer minorem ut sensui non appareat, & dicit nnum locū propter uiciniam locorum utriusque doloris qui sunt quasi unus locus, sicut tēpora oculis & caninis dentibus uicinantia. Palā ergo intelligitur, quia sanguis ceteros humores putrefactos si cum eo mixti fuerint obscurat, neque sanguis est causa alterius febris, licet aliqua febris sit causa alterius sanguine febris, quia aliquando putrefit cum propter alios humores putrefit & calcet, neque ipse alios calefacit humores, eius enim complexio temperamento uicina est, proinde si putrefit & calcet non multū à temperamento egreditur, sed ceteri humores in naturali eorum cursu existentes sunt ultra temperamentum, quātomagis cum eursum egrediuntur suum.

*De febre accidente propter dolorem hepatis splenis
uel alterius membri. Cap. XLIIII.*

Aliquando est febris propter hepatis dolorē aut splenis cerebri lateris pulmonis renum & similia, & cessante morbo qui est causa febris cessat & ipsa, unde utilis est eius curatio ut certissime causa eius curetur. i. sanetur membrum cuius occasione febris generata est. Sed prius oportet intelligi quia febris quę alios morbos cōcomitatur, aliquando est debilis sicut si fuerit propter splenem renes aut uescicam, & aliquādo fortis est & molesta sicut cum fuerit propter hepar cerebrum & latus, & nonnunquam est debilis & aliquando fortis, fortis autem cum sit propter pulmonem. dolorem pulmonis si fuerit propter sanguinem aut choleram febris erit molesta. Si autem sit propter phlegma aut choleram nigram febris erit lenis, molestatio autē febris quę fit propter hepar quia materia eius est sanguis, lenitas autem eius quę fit propter splenem est propter choleram nigram quę est eius materia, molestatio febris quę fit propter cerebrum est propter neruos & sensus acumen, lateris autem molestatio sit propter cholera quę est eius materia & propter uiciniam cordis.

SERAPIONIS.

S E R A P I O N I S

D E F E B R I B V S

L I B E R.



De causis febris ephemera.

Cap. I.



AVAS quidem febris ephemeræ sunt quatuor quia quædam ex eis sunt quæ occurrunt exteriori, sicut frigus, & calor, quando sunt fortes seu vehementes: aut balneatio cum aqua aluminis, aut aqua sulfuris. Et quæ

dā ea eis sunt quæ ingrediuntur corpus, sicut cibis, & potus, & medicinz, & quæ sunt illis similia. Et quædam ex eis sunt quæ inferunt passionem, sicut motus, qui sunt aut corporales, sicut labor cum ambulatione multa, aut equitatione assiduus: aut sunt motus animales, sicut vigilie, & mestitia, & tristitia, & ira. Et quædam ex eis sunt quæ accidunt ab ea, sicut dolor qui accidit in aliquo membrum: (vel secundum aliam litteram, Et quædam ex eis est dolor accidens in aliquo membro, sicut dolor accidens ex apostemate emundiorum causato à causa extrinseca.)

De febre ephemera accidente ex calore solis, & ab aere valde aestuoso. Cap. II.

SCIAS quoddam illis quibus accidit febris ephemera ex sole, & ab aere valde aestuoso, igniuntur seu inflammantur capita eorum, & cutes ipsorum, plus quam igniuntur seu inflammantur in speciebus alijs febris ephemeræ. Et capita illorum qui ambulant in sole tepore longo, igniuntur seu inflammantur plus quam corpora ipsorum. Et accidit sordiditas, & rubedo in oculis, & caliditas, quoniam huiusmodi febris ephemera laedit spiritus animales proprie: (vel secundum aliam litteram, Et accidit in capite sordiditas, & pulsatio vehemens, quoniam in huiusmodi febre laeditur spiritus animales proprie, & oculi eorum rubescunt & inflammantur.) Quapropter oportet ut effundatur post resolutionem febris super capita eorum continue, aqua tepida dulcis, in quam decocta sint chamomilla, & viola sicca, & flores nenupharis, & rosæ: & iungatur caput cum oleo violato, aut oleo de nenuphar & rosis: & fac eos dormire in

domo frigida, in qua strata sint folia alchalestis: & ciba eos cum cibarijs & portibus frigidis humidis. Quoniam redierint ad consuetudinem post resolutionem febris, oportet ut caueant sibi ab omnibus rebus quæ calefaciant.

De febre ephemera accidente a frigore. Cap. III.

FEbris ephemera accidens ex frigore, caecat corpus, & a refacit, & solidum efficit, sicut illud quod fit ex balneatione cum aqua aluminis, & cum aqua sulfuris: (vel secundum aliam litteram, & solidum efficit, & simulat febris ista febris ephemeræ quæ fit ex balneatione cum aquis stypticis.) Et patientes hanc febrem ea frigore, sentiunt gravitatem in capitibus suis, & in reliquo corpore eorum. Et sunt vrinæ eorum albæ declives ad citrinitatem parum, quoniam caliditas quæ est in eis, non complevit tincturam vrinæ. Et pulsus eorum sunt parvi, veloces, frequentes: parvi quidem propter frigus, velocitas vero & frequentia ipsorum pulsuum est, quoniam caliditas est iam submersa ad interiora. Et propter illud confert eis post resolutionem febris, balneum cum aqua calida, in qua decocta sint chamomilla, & melilotum, & maiorana: postquam sub infirmo posita fuerit hæc aqua bulliens, ita ut fomentetur cum vaporibus eius. Et iungatur patienti cum oleis resolutivis & scdatis, sicut oleum camomellinum, & oleum anethinum, & oleum alcheiri. Et administratur oleum postquam sudaverit patienti, quia non oportet administrare oleum ante sudorem, ut non oppitentur pori propter viscositatem olei. Quam autem patientes hanc febrem egrediuntur ex balneo, ciba eos cum cibis calefacientibus parum, sicut sunt assidibegis, id est, ferculum ea carne elicta, (vel secundum aliam litteram, sicut brodium carnis elictæ,) & bibat modicum aque calide: (vel secundum aliam litteram, & sorbeat modicum olei cum brodio carnis.) Et ponantur coram manibus eorum prunæ ignis, & ante ipsos accendantur ligna tamarisci sicca. Et confortetur spiritus animales ipsorum cum odoriferis, & cum speciebus aromatis. & cum odore liqui aloes, & citri, & maio-

rang, & narcisci, & alcheiri, & si symbeij, & quæ sunt illis similia.

De febre ephemera accidente ex balneatione cum aquis stypticis. Cap. IIII.

Significatur super febre ephemeram accidere in ex balneatione cum aquis stypticis, sicut cum aquis aluminis, & cum aquis sulfuris, ex tactu, quoniam cutis est dura, filtrata, solida, extenuata, sicca, arida, plus quam cutis illorum quos inuasit febris ephemera ex frigore, & simulatur, illis qui manus suas submergunt in aqua gallarum, aut corticum granatorum, & quæ sunt illis similia tempore longo. Et quando ponis manum tuam in quacunque parte corporis, sentitur in primis diminutio caliditatis, & post illud quando expanditur cutis sub manu, manifestatur caliditas, & sentitur vehementia eius plus. Et est urina declinans ad albedinem, aut ad citrinitatem, & hoc accidit quoniam superfluitates aquosæ quæ consueverant euacuari, retinentur propter soliditatem cutis. Et oculi eorum non sunt submersi, & quandoque sunt inflati. Etiam & pulsus arteriarum ipsorum non est parvus, sicut in illis in quibus accidit febris ex cogitatione, & mœstia, & vigilijs, & labore, quoniam virtus in hac febre est remanens, & caliditas est profunda, & non resolvitur neque finitur. Et oportet, ut scias quod non semper accidit febris ephemera in corporibus, quando inspissatur cutis eorum, sed illis corporibus accidit febris ephemera ex induratione & inspissatione cutis, quando ab eis resolvuntur vapores humidi sanguinei, quia propter prædictam inspissationem retinentur, unde fit aggregatio ipsorum vaporum. Et invadit etiam febris ephemera in illis corporibus quorum vapores sunt calidi & siccæ, & non est materia quæ in eis putrefiat. Et si est illic materia quæ putrefiat, invadit eos febris putrida. Et curatio quidem illorum quibus accidit hæc febris ephemera, fit etiam cum rebus eiusdem quibus curatur febris ephemera quæ est ex frigore, verum isti tardant plus in balneo quam illi, quoniam indigent resolutione, & non tardant in tina mollior. Et oleum quod ipsi administrant, sit parum, & frictio sit multa, lenis, ita ut levietur cutis, & resolvantur superfluitates retentæ in corpore. Et oportet ut stantur cibis velocis digestionis in quantitate moderata, & ut bibat parum de vino, si durities seu inspissatio cutis fuerit multa. Si vero durities seu inspissatio cutis fuerit multa, non utantur vino omnino, quoniam de proprietate vini est expandat superfluitates & excitet caliditatem.

De febre ephemera accidente ex cibis calidis. Cap. V.

Hæc febris plus accidit in spiritu naturali qui est in nobis, quoniam cibi & potus ledunt hæc par plus quam alia membra. Et propter hoc sunt urinae eorum declives ad caliditatem, & patiens hæc febre sentit caliditatem in hepate. Et propter hoc oportet ut exhibeantur ea quæ conferunt hepati, & provocant urinam, sicut syrupus acetosus factus cum zucchero, & aqua granatorum acetosorum & quæ sunt illis similia. Et ponatur super hepate externus epithema factum cum duobus sandalis, & rosæ, & camphora, & aqua chales, & aqua rosata.

De febre ephemera accidente ex labore corporis. Cap. VI.

Illorum qui laborant in ambulatione aut equitatione aut in pugna, ignovunt seu inflammantur iuncturæ omnes, & similiter spiritus vitales etiam, & proprie spiritus animales, quia ad cor & ad cerebrum ea hoc quod ipsa sunt superius elewantur vapores plus. Et secundum communitatem corpora quæ laborant, sunt arida, extenuata, sicca. Secundum proprietatem vero si non est labor vehemens in corporibus, tunc siccitas appareret in eis tempore parva tantum, deinde egredietur ex eis humiditas quæ est sicut ros, & vapor calidus quando resolvitur humiditas humorum, & humectatur siccitas corporis, quod in hora declinationis febris efficitur roridum. Si vero labor sit multus, tunc corpus efficitur siccum in declinatione egritudinis etiam, & est pulsus tunc parvus. Et si labor non fuerit multus, tunc pulsus est magnus cōsequens seu frequens, quia febris indiget attractione aeris, propter caliditatem & siccitatem quæ comitantur ipsum, & urina est subtilis, acuta, propter laborem & resolutionem. Et eius quidem subtilitas est propter resolutionem multam, eius autem acuitas est propter motum qui ignovit seu inflammavit corpus. Et sentitur aliquid de dolore in iuncturis, propter coactionem earum ad invicem apud motum. Et oportet ut curentur isti in primis cum quiete & tranquillitate, & post resolutionem febris (vel secundum aliam viam, & post declinationem febris) sedent in tina aque tepidæ donec humectentur. Et non oportet ut tardent in balneo isti, neque illi quos invadit febris propter aerem valde æstuosum, quia egritudo amborum simul est siccitas. Et iganantur corpora eorum si tempus est calidum siccum, & complexio infirmi est declivis ad hæc duo, cum oleo violato & neno farino aggregato cum aqua pauca. Quod si isti dispositiones sunt e converso, ex parte aeris & ætatis & complexionis invigilantur

gantur cum oleo de cheiri & oleo chamæmelli
no, & sit fricatio lenis valde temperata in mul-
titudine sua donec humectet eos. Et post oleum
etiam facimus eos sedere in tina aque tepide, do-
nece humectetur corpus, & acquirat humiditatem
loco illius quæ ex eo fuit resoluta. Et post tinam
administramus oleum etiam, & conseruetur hu-
miditas quam corpus acquisiuit ea aqua. Et præ-
cipiamus eis ut caueant sibi ab eis quæ eiciant
corpus, & proprie coitu, quoniam ipse eiciat
corpus & debilitat ipsum. Et nutriamus ipsos
cum cibis humidis, paucarum superfluitatum,
facilis digestionis, & accipiant eos uicibus mul-
tis (uel secundum aliam litteram, Et nutriamus
eos cum cibis humidis facilis digestionis, & hu-
iusmodi cibi fumanter uicibus pluribus,) non
uice una, & bibat uinum non antiquum, permix-
tum, ut humectetur corpus.

De febre ephemera ex ira. Cap. VII.

In illis quibus accidit febris ephemera ex ira,
est velocius motus oculorum suorum, qui egrediū-
tur & eminent calidius, quoniam caliditas inna-
ta mouetur ad exteriora, propter vindictam faci-
endam ex nocentibus. Et rubet facies ipsorum
propter motum sanguinis ad exteriora corpo-
ris. Et uidetur corpus ipsorum plenum, pingue,
propter ebullitionem sanguinis & ipsius feruore-
m. Et quandoque fit color citrinus ex timore
permixto cum ira. Et vrina est citrina & acuta,
(uel secundum aliam litteram, Et vrina ipsorum
est citrina non acuta.) (Alia littera habet, Et vr-
na eorum est citrina paucæ acuitatis,) & pulsus
eorum est velox, magnus, propter motum, & pro-
pter augmentum caliditatis. Et ingenium qui-
dem ad istos febrientes, est in primis sedatio iræ
ipsorum, & bonificatio anhelitus ipsorum cum
delictis, & post illud regimen ipsorum sit cum ci-
bis bonis in complexionem suam frigidis & humi-
dis. Et non oportet ut exhibeatur eis vinum do-
nece sedetur caliditas, quia de proprietate vini est
excitare iram. Et similiter oportet ut prohibeā-
tur etiam a balneo, quoniam balneum adiuuat
materias quæ sunt in corporibus eorum ad put-
redinem, & facit euenire febrem, & facit resuda-
re & easperere illas materias ad quædam membra,
unde facit accidere apostema. Et oportet
etiam ut intendatur studium circa eos, quoniā
hæc febris non oritur & non incipit nisi ex corde.

De febre ephemera accidente ex cogitatione & tristitia. Cap. VIII.

In patientibus quidem febrem ephemeram ex
cogitatione & tristitia, motus oculorum suo-
rum & eminentia ipsorum ad exteriora, quan-
doque augetur, & quandoque quiescant oculi, &

videntur quasi submersi. In illis autem qui cogi-
tant, quandoque est eorum cogitatio in eo quod
contristatur. Quæ ergo solliciti sunt de eo quod
ipsi timeant ut eis accidat, submergiuntur caliditas eo-
rum innata, & sequuntur eam spiritus, & sanguis
& membra quorum motus est facilis ad interiora,
unde apud illud profundantur oculi eorum.
Et quando cogitatio eorum est de euasione, seu
est in spe euasioneis à timore & periculo, tunc ac-
cidit eis contrarium illius, caliditas enim natu-
ralis tunc egreditur ad exteriora, & sequuntur
eam spiritus, & sanguis, & oculi eminent & mo-
uentur motu veloci. Pulsus autem eorum quan-
do caliditas submergitur ad interiora, est paru-
us: sed quando dilatatur ad exteriora, est pul-
sus magnus. Et vrina eorum est acuta, ita ut mor-
diat membrum per quod transit. Et oportet
ut curentur isti cum e contrario illius quod eis ac-
cidit, & ingenietur ut ipsi lætentur & gaudeant
& sperent, cum omnibus speciebus ingeniorum
diuersorum, quæ solent inducere gaudium & læti-
tiam & spem eorum quæ desiderantur. Et inge-
nietur etiam omni ingenio ut remoueatur ab eis
multitudo cogitationis, quoniam multitudo co-
gitationis debilitat seu infestat animam, sicut di-
xit Plato. Post declinationem vero febris, oportet
ut infirmus sedeat in tina aque dulcis tepida,
donece humectetur corpus parumper, deinde
vngatur cum oleo cui est virtus infrigidandi
& humectandi, sicut est oleum violatum, & oleum
nensarinum. Et non sit fricatio continua, ut non
eiciatur corpus. Cibatio autem istorum fiat
cum cibis humidis laudabilis humoris, sicut caro
pullorum, & franculionum, & caro hædo-
rum, & pisces petrosi, & brodium leguminum
frigidorum, & attrita, & cucurbita, & his similia:
nam passionibus animales proprietatem habent
eiciendi corpus valde. Et signum huius est, quo-
niam videmus plures eorum qui non cogitant,
& non patiuntur tristitiam neque mœstitiam,
digerere totum illud quod comedunt ea cibis. Il-
li vero qui cogitant & patiuntur mœstitiam aut
tristitiam, non digerunt quod comedunt ea cibis,
etiam si sint facilis digestionis paucæ quantita-
tis. Et oportet ne exhibeatur in potum vinum per-
mixtum non antiquum, in quantitate pauca, ita
ut non eiciatur corpus ex multitudine eius quod
de eo administratur. Nam quando uinum exhi-
betur eum mensura, remouet vigilias, & facit e-
uenire somnum, & propter illud humectat & læ-
tificat tristes, & sedat iracundiam & tristitiam. Et
vniuersaliter dico quod oportet ut sit regimen
totum infrigidans & humectans, & sit elonga-
tio à rebus exieccantibus. Ipsæ enim nocent val-
de, & proprie coitus ut non permuetur seu per-
ducatur febris ephemera ad febrem hæticam.

De febre ephemera accidente ex vigilijs.

Cap. IX.

SCias quod patientibus febrem ephemeram ex vigilijs, accidunt istæ significationes, scilicet citrinitas coloris propter motum cholerae accidentem ex vigilijs. Et propter paucitatem digestionis accidit corpori thebegi, id est, tumefactio similis cachexia & profundatur oculi propter multitudinem motus qui resoluit, & gravantur palpebræ & motus ipsarum. Et pulsus est parvus propter debilitatem virtutis. Et urina quamvis sit acuta, tamen est indigesta, turbida: (vel secundum aliam literam, Et urina est paucæ quantitatis, acuta, non digesta, turbida. Oportet autem ut isti febrientes curentur cum rebus que contrariantur vigilijs, & sit ingeniatio in attrahendo somnum cum embrocis super caput factis cum aqua, in qua decocta sint camomilla, & rosæ, & violæ sicca, & folia nenupharis, & bordeum escorticatū, & pauper. [] Et fricentur manus & pedes, ita ut attrahatur materia ad inferiora, & descendant vapores retenti in capite. Et cibatio eorum sit cum cibis humidis uelocis digestionis. Et exhibeatur eis in potu unum permixtum non antiquum. Et prohibeantur isti ab omnibus rebus que exiccant corpus, & proprie à coitu. Et regitur isti cum huiusmodi rebus, donec redeat corpus ad dispositionem primam cum somno nocturno, quoniam somnus nocturnus attrahit tranquillitatem plus propter consuetudinem primo, & secundo quia caliditas naturalis propter humiditatem noctis & frigiditatem eius, profunda tur ad interiora, unde est causa completæ digestionis. Et tertio, quia tenebræ noctis attrahunt sensibus quietem, somnus uero diei propter contrarium harum rerum efficit contrarium illius. Et somnus quidem qui est inter mane, seu inter horam matutinam usque ad quatuor horas, est medius inter istos.

De febre ephemera accidente ex dolore inguinum.

Cap. X.

DOLOR inguinum, est dolor emnæteriorum & lacerorum qui sunt in radicibus coxarum. Nam quando accidit aliquod ulcus in pedibus & ernibus, tunc natura properat ad ulcus ut restituet ipsum, & sequuntur eam spiritus & sanguis. Quumque huiusmodi in transitu suo perveniunt ad inguina, replent ipsa propter eorum raritatem & spongiositatem, unde fit in eis apostema. [] Quod si principium huius apostematis fuerit causa primitiva, sicut nclus in pede, tunc facit accidere febrem ephemeram. Et si apostema fuerit ex causa antecedente, sicut ex repletione, tunc ex eo accidit febris putrida. Et significatur super hanc febrem etiam ex pulsu, quia in fe-

bre ephemera est pulsus magnus valde frequens, & ex profundo corporis eleuatur post ebullitionem rostritas quædam calida mordicativa, & rubet facies secundum plurimum, & inflatur, verum tamen rubedo eius sequitur colorem sanguinis, & inflatio ipsius plus. Et urina est declinans ad albedinem. Et oportet ut patientes hanc febrem, curentur incipiendo cum introitu eorum in balneo, & sciendo eos tardare in eo. Et administrentur eis fricatio cum equalitate, & non ungantur oleo aliquo, quoniam oleum humectat corpus, & oppilat poros eius. Deinde cibentur cum cibis subtilibus & prohibeantur à potu vini.

De febre hætica. Cap. XI.

FEbris hætica, quæ est febris fixa, stabilita, diuiditur in duas species, quarum una est quæ accidit ex aduisione caliditatis, & ad eam sequitur febris dach continua, vel secundum aliam literam, ex aduisione caliditatis, ad quam sequitur febris sublevis continua. Altera uero species est quæ accidit in corporibus senum absque febre, quando extinguuntur caliditas naturalis quæ est in eis ex multa resolutione, & accidit absque dolore, & hæc nominat Pylagrus medicus, & senectam ex ægritudine. Et iam nos vidimus multos, quos inuadit hæc ægritudo, ex senibus & pueris & adolescentibus, absque quod finita fuerit caliditas eorum naturalis, & extincta ex multitudine ægritudinis, & aduisione dolorum. Istæ igitur sunt duæ species primæ febris hæticae. Species autem prima diuiditur in tres species, quia humiditates quæ sunt in nobis, sunt quatuor, scilicet illa quæ est in uasis seu in uenis, & illa, quæ est in locis uacuis quæ sunt in nobis, & illa quæ est in carne propinqua temporis suæ coagulationis, & illa quæ continentur membra. Quom autem calefit illa humiditas quæ est in uasis, id est, intra uenas & arterias, calefit corpus etiam. Et si calefiat & putrescat illa humiditas, tunc ipsa facit accidere febres, ex putrefactione eius quod est in uenis & arterijs. Et quando calefacta fuerit humiditas quæ est in locis uacuis, tunc accidit prima species febris hæticae quæ est facilis curationis. Quidam uero calefacta fuerit illa humiditas, quæ est in carne proxima temporis suæ coagulationis, tunc accidit secunda species febris hæticae mediocris, quæ nominatur Marasmus, id est, debilis seu extenuatio, quæ est difficilis curationis. Si uero calefiat humiditas quæ continentur membra corporis omnia, tunc accidit ex ea species tertia hætica, & nominatur Charagmus, & eius intentio est extinctio & confractio. Harum autem speciesum prima est facilioris curationis & magis sperabilis, secunda uero est difficilior & media in specie, tertia autem species non habet curationem. Si enim resoluta est hu-

miditas

miditas per quam membra continuantur, quomodo est possibile ut permaneat corpus? Hæc igitur est opinio quorundam de febre hæctica. Secundum vero sententiam aliorum, diuiduntur istæ tres species sic. Dicunt enim quod quando cordis complexio naturalis alteratur seu inflammatur & non finitur humiditas quæ est in eo adhuc, sed est in ipso sicut ebullitio, nominatur tunc prima species hæctice. Et quando accidit in ebullitione eius consumptio humiditatis & finiseus, tunc accidit species secunda hæctica. Et quando læduntur membra similitum partium, seu membra radicalia, scilicet, venæ & arteriæ & velamina, ita ut in eis dominentur caliditas & siccitas, (vel secundum aliam literam, ita ut sint obfessa seu oppressa à caliditate & siccitate), tunc est species tertia hæctica. Signa autem quæ significant unamquamque istarum specierum, sunt ista quæ nunc dicemus & cætera. Alia litera à principio huius capituli vsque ibi. Species autem prima diuiditur in tres species &c. sic iacet.

De hæctica seu de aldach. Cap. XI.

Intentio huius nominis hæctica, seu huius nominis aldach, apud Arabes est dispositio seu qualitas sua seu stabilitas in corpore: & est genus quod diuiditur in duas species: quarum una est dispositio febrilis fixa, quæ accidit ex aduersione caliditatis, seu ex caliditate adurenti. Altera vero species est dispositio fixa dominans & fixa, quæ accidit in corporibus senum absque febre: & hanc nominat Phylagrus medicus senectû ex ægritudine. Et iam nos vidimus multos, quos inuasit hæc ægritudo ex senibus & pueris & adolescentibus, absque quod finis fuerit caliditas eorum naturalis & extincta ex multitudine ægritudinis, & assiduatione dolorum. Istæ igitur sunt duæ primæ species huius nominis generalis, quod dicunt hæctica seu aldach. Species autem prima diuiditur in tres species &c.

Signa autem quæ significant unamquamque istarum specierum, sunt ista quæ nunc dicemus. Si incipit febris ephemera ex ira, aut tristitia, aut mæstitia, aut cogitatione multa, & remanet usque ad diem secundum & non quiescit penitus, & non addit super illud in quo incepit & apparet in colore & forma nigredo seu obscuritas, & extenuatio, & ceteri vitæ: & tangendo infirmum, & venas, & arterias ipsius semper sentitur caliditas: tunc scias quod hæc est prima species febris hæctica. Si autem augeatur caliditas, & vehementior sit cum istis significationibus, quando datur infirmo cibis in quacunque hora fuerit, ita ut existimetur quod ipsa caliditas iam sit magis ad data quam prius, & habeat periodos, tunc oportet

tet ut scias quod febris iam peruenit ad secundam speciem hæctica. Et tunc oportet ut cibetur infirmus, duobus aut tribus diebus cum cibis moderatæ quantitatis laudabilis humoris, & in horis diuersis, ita quod cibis uice una in mane, & uice alia in meridie, & uice alia in uesperis: & si quacunque hora cibetur, semper augeatur caliditas, tunc indica confidenter quod ista est species secunda hæctica, & non febris putrida.

Significationes autem speciei tertiæ, sunt istæ: quod oculi sunt submersi quasi positi in profundo, & nidentur spatula uideæ carne, & apparet in oculis lippitudo sicca, & color iustissimi est cineritius quasi iam super ipsum sit proiectus puluis, & cutis faciei & frontis est terrea, arida, sicca: & eleuantur supetiora superciliorum & palpebrarum cum grauitate. Quam ergo iacent, arescunt, & clauduntur oculi eorum absque quod ipsi sint dormientes, sed clauduntur oculi ex debilitate quæ eis accidit. Et applanantur tempora, & sunt absque carne, & detumescunt seu extenuantur ventra eorum, ita ut uideantur ac si sint uacui ab intestinis & à uisceribus: & cutis corporum ipsorum est arida sicca. Et quando cum digitis tangitur, seu comprimitur, tunc nider quod sit sicut cutis coriata, nec sicut corium præparatum, siccum. Pulsus autem in eis est paruus, debilis, frequens, durus sicut corda. Parui-ras autem eius, & debilitas ipsius, est quia uirtus est iam debilitata. Et durities eiua est propter ipsius siccitatem. Frequentia uero ipsius pulsus est propter caliditatem. Et eorum nris est oleagina, in qua apparent quædam similia laminia seu squammis, propter liquefactionem membrorum radicalium, & resolutionem eorum. Et quando effunditur urina in uase, tunc auditur uox eius sicut uox olei effusi in nase: & causa illius est propter uiscositatem urinæ. In aqua nero effusa in uase, ex quo non uiscosa, non sentitur nisi sonitus fortis. Istæ igitur sunt significationes hæcticae causatæ ex caliditate adurenti: & huiusmodi hæctica, est hæctica febrilis quæ diuiditur in tres species, sicut iam prædiximus. Signa autem speciei hæcticae quæ est ægritudo accedens ex domino frigiditatis & siccitatis, nominata hæctica senectutis, sunt ista. Pulsus enim in huiusmodi ægritudine est paruus, debilis, rarus: & urina est alba, subtilis substantiæ.

Cura febris hæctica.

Cura autem hæctica quæ est absque febre alia putrida, & absque materia præparata ad putredinem, est in primis exhibitio lactis asinæ. Et eligatur asina iuuenis, flauæ coloris, propinqua tem-pori

pori partus. Et sit lac eius lene, album, temperate substantia, ita ut quando distillatur super unguem aut super speculum, non expandatur ad alia. Et oportet ut nutriatur asina cum herbis frigidis humidis, sicut coriandrum humidum, & alium planum, id est, & herba graminis quæ nascitur super flumina, & endivia, & hordeum album: & detur in potu aqua dulcis, bona, clara: lac enim generatur ex huiusmodi asina sic nutrita, est magni iuvamenti. Et nutriatur infirmus cum mes excoctum, decocto cum attriplice, aut spinachia, aut lactuca, aut cucurbita. Et detur in potu aqua granatorum dulcium, & aqua cucurbitæ (vel secundum aliam litteram, Et detur in potu aqua granatorum mizour, & aqua cucurbitæ.) Et facimus infirmum sedere in tina aque, in qua decocta sunt folia cucurbitæ, & hordeum excoctum, & nenufar & uiole, & quæ sunt his similia. Et post eius egressionem ex tina, inungatur enim oleo nenofarino, & cum oleo seminis cucurbitæ dulcis, aut oleo uiolato permixto cum cera alba dissoluta, uel cum cera abluta: quoniam huiusmodi oleum humectat corpus, & conferuat humiditatem quam acquiritur ab aqua tingit. Quod si uirtus est debilis, tunc permisceatur lac cum aqua tinxit, quam diximus, & non sedeat infirmus in tina multum, ut non debilitetur uirtus, neque prosteratur, neque mollescat. Et non ungatur infirmus ante introitum eius in tina, ut non oppileat porositates corporis eius ex viscositate olei, & ut non prohibeatur humiditas aque ingredi ad interiora corporis eius. Et sedeat infirmus in tina uice una post lac in mane, & uice alia post cibum & potum in uesperis, donec caliditas aque in tina attrahat humiditatem acquisitam ex cibis & potibus, ab interiori corporis ad exteriora ipsius, (vel secundum aliam litteram, donec attrahat caliditas aque in tina humiditates acquisitas ex cibis, ab interioribus ad exteriora corporis,) & redire faciat illas humiditates super corpus, & spargi in membra ipsius. Si autem caliditas hec fuerit diminuta, & corpus fuerit mundum à materia præparata ad putredinem, tunc exhibeatur infirmo machid uacuum mundum à butyro, & ab unctuositate. Et in principio exhibeatur ex eo pondus drachmarum decem: & addatur in eo secundum gradationem usque ad drach. 30. Et si consentit uirtus & digestio, & addis super hanc quantitatem lactis, non erras. Et exhibeatur lac supra scriptum cum illis trochiscis, quorum descriptio est hæc. Recipe spodij drach. 4. rosarum drach. 6. seminis portulacæ, seminis cucurbitæ dulcis omnium ana drach. 3. boli armeni drach. 4. charabæ drach. 3.

terantur, & cribellentur, & conficiantur cum aqua plantaginis, & fiant trochisci, & exicentur: isti enim trochisci prohibent ne fiat febris. Quod si in infirmo sit febris putrida, aut corpus eius non sit mundum à materia præparata ad putredinem, tunc oportet ut caueat à generibus lactis, & locupletius lactis exhibeatur aqua hordei decocta cum cancris fluuiabilibus, aut aqua cucurbitæ. Modus autem præparandi & rectificandi caneros supra dictos est iste. Recipe caneros fluuiales (recen-tes in vita,) & abscondantur pedes eorum, & dentes ipsorum, & ablue eos cum aqua frigida & cinere & sale communis tribus uicibus, donec remoueat ab eis fætor seu alia mala qualis ipsorum: deinde lauenter eorum aqua frigida sola, & contendantur, & decoquantur cum aqua hordei excocti, & detur in potu ex hac aqua libellum. postquam exhibitum fuerit infirmo ante istos trochiscos, qui conferunt febri beatæ, & physis, quorum descriptio est hæc. Recipe plantaginis drach. 3. boli armeni drach. 3. papaueris albi drachmas quinq; spodij drach. 4. rosarum drach. 6. seminis cucurbitæ dulcis excocti, & seminis portulacæ, & seminis citruli excocti, omnium ana drach. 6. seminis cytoniorum excocti drach. 7. succi liquiritiæ drach. 10. gummi dragacanthi, amyli, omnium ana drach. 3. seminis melonis, & cucumeris, omnium ana drach. 7. Summa medicinarum est numero. 10. terantur, & cribellentur, & conficiantur cum mucillagine psyllij, & fiant trochisci, & exhibeatur eis autem unum cum aqua granatorum, & aqua cucumeris in ieiunio. Et detur post horam aqua hordei decocta cum cancris secundum præparatum. Et bibetur ex cucurbita cum attriplice & portulaca, aut cum mes excoctum in ferculo cum oleo amygdalarum dulcium, permixto cum oleo de semine cucurbitæ dulcis. Et inungatur corpus in uesperis cum oleo nenofarino, & cum oleo seminis cucurbitæ dulcis. Et sedeat infirmus, si est tempus calidum, in domo frigida stratus cum folijs chalef, seu falcis & rosæ, & myrtho, & nenufari, & faciefran, id est, basilicone. Quod si accidat eis syncope, tunc pone super membra eius linimentum factum ex aqua myrthi, & aqua rosarum, & sandalis, & camphora, & rosæ tritis, & ligno aloes crudo: & roretur semper super faciem eius aqua rosata in frigidata. Et ingeniatur omni ingenio, ut non resoluatur ex corpore eius aliquid. Et exhibeatur uicellus oosforabilis, aut medulla panis cum vino non antiquo plurimum permixto. Et da ei etiam ex hac forbitione hora post horam, & eius modus est. Sumatur caro rubra ex collo beedi, & ex costis eius, & incidatur in partes paruas, & decoquatur in olla nona leniter seu suauiter cum modico sale, donec egrediatur aqua eius: deinde coletur illa aqua, & fundatur super ipsam quantum est medietas

dietas eius ex succo pomorum, & quantum est decima pars omnium vini odoriter, & exhibetur infirmo ad sorbendum: hoc enim facit aduenire infirmo virtutem multam. Quod si uides virtutem iam debilitatam, & membra iam exicata & resoluta, & uideris uenas vacuas a sanguine, & costas subtiliarias & expoliatas à carne, & arundines seu facilia manuum & pedum iam subtiliata, tunc oportet ut caueas à curatione istorum, quoniam tunc est labor vanus. Et ingenia omni ingenio ut non soluantur natura in eo qui patitur hecticam neq; in eo qui patitur phthisim. Quod si natura ipsorum fuerit soluta, tunc loco aque hordei exhibetur sauch hordei, decoctum cum milio excoctato torrefacto parumper, & quandoq; puluerizatur super ipsum gummi totrefactum. Et conferunt etiam isti trochisci, quorum descriptio est hæc. Rec. boli armeni drac. 5. castaneorum totrefactorum drac. 4. spodij drac. 3. seminis acetosæ excoctati, drac. 1. betberis, drac. 3. rosarum, drac. 4. charabæ, drac. 3. Summa medicinarum est numero. 7. terantur, & commisceantur cum aqua cytoniorum, & aqua pomorum, & fiat trochisci, & exhibeantur in mane cum aqua pyrorum, aut aqua cytoniorum. Et in uesperis exhibeantur sem. psyllij totrefacti aut r. t. cancerorum adoltorum, drac. 1. gummi totrefacti drac. sem. boli armeni aut sem. permisceantur omnia, & exhibeantur cum aqua pomorum. Et cibetur cum herba acetosa eluata, seu frisa cum amygdalis torrefactis, excoctatis. Et etiam lente excoctatæ torrefactæ, iam decoctæ duabus uicibus, à quibus effusa fuerit aqua prima, & decoctæ uice secunda cum aqua granatorum, & aqua sumach, & aqua cytoniorum. Et exhibetur sauch de gobera, aut sauch de nabach, aut sauch granorum granatorum, & sauch pomorum absq; zucebaro. Et si coegeris, da suffus granorum granatorum cum charad, & tharathit, & granis myrthi, si infirmo non est tussis. Si uero cum eo fuerit tussis, da gummi Arabicum, & bolum armenum, & psyllium, & castaneas, & granam myrthi & syrupum myrthinum purum. Si autem accidit in intestinis excoctatio, tunc curamus cum clystere prædicta in capitulo excoctationis. In cura autem speciei secundæ hecticæ, quæ nominatur scæctæ ex egitudine, oportet ut ingenietur in primis in calefactione corporis, & incipiamus cum rebus temperatis, deinde cum rebus fortibus in calefactione. Et propter illud oportet ut exhibeatur primo mel citri conditum, & mel zinziberis conditum, & fecacul. Et cibetur infirmus ex brodio carnis arietum castratorum, & colombinorum. Et exhibetur in potu uinum non ualde antiquum, quoniam uinum antiquum proprietatem habet inducere sudam, & exicare corpus. Et infirmus sedeat in tibia, in cuius aqua decocta sit camomilla, & maiorana & quæ sunt illis similia. Et confortetur cum odoratione odo-

rum delectabilium calidorum, sicut narciscus, & citrum, & iatiminum, & maiorana, & lilium, & quæ sunt illis similia. Et fiat eis suffumigium assidue cum lignis aloes. Et si debilitatur corpus parumper, damus ei in potu theriacam, & diamusculum & mithridatum, (vel secundum aliam litteram, cum ligno aloes.) Et in fine si corpus fuerit parumper fortificatum, damus in potu theriacæ, & diamusculum, & mithridatum. Et oportet ut infirmus caueat à coitu. Quumq; uirtus corporis redierit, & confortata fuerit, tunc oportet ut curet eum hoc clystere. Recip. caput arietis cum pedibus suis, & projiciantur in uase mundo, & effundatur super eos libr. 10. aquæ, & de frumento confuso, & ex ciceribus confusis, omnium ana pugillum unum, anethi, camomillæ, & tribulorum, omnium ana vnc. 1. sicuum alborum & nigrorum pinguium numero. 10. decoquatur omnia donec remaneat ex eorum pars, & coletur, & fumatur ex eo lib. sem. & misceantur cum eo butyri uaccini vnc. 1. olei sisamini vnc. 3. & olei de ben vñ. 1. & misceatur totum, & clysterizetur cum eo tribus diebus. Et expectetur quinque diebus, seu quiescat quinque diebus, deinde reueratur etiam ad hanc curam cum hoc eodem clystere, donec humectetur corpus, & impinguetur. Et inungatur corpus in nocte cum oleo de narcisso cum cera alba, & in mane exhibeatur ad sorbendum uitellum oui cum modo dicto uini, deinde ingrediatur balneum & non dimittatur infirmus morari in eo. Et post egressum nem à balneo cibetur cum brodio carnis aromatato cum zinzibere, & spica, & cinnamomo, & galanga, & quæ sunt eis similia, deinde dormiat. Et regatur hoc regimine donec redeat corpus suum ad naturam suam.

De febre synocha, quæ est febris sanguinea.

Cap. XII.

Febris quæ non incipit cum periodo, sed ipsa ab inceptioe sua usq; ad eius consumptionem, est sicut periodus unus, generatur ex sanguine, qui quando calefit calefactione tantum absq; putredine, facit accidere febrem ephemeram, vel secundum aliam litteram facit accidere febrem si milem ephemeræ. Quando autem sanguis putrescit propter in uasis, seu in uenis magnis, tunc accidit febr. acutior illa, & nominatur synocha. Et huic eidem sunt tres species, seu, hæc feb. synochos diuersificatur, quia aut ipsa incipit cum quiete seu cum remissione, deinde augetur paulatim paulatim, quoniam illud quod putrescit de sanguine, est plus quam illud quod resoluitur. Aut incipit cum fortitudine seu cum intensioe, deinde diminuitur paulatim paulatim usq; ad eius consumptionem & huic fit quando illud quod resoluitur est plus quam illud quod putrescit. Aut incipit cum dispositione cum qua remanet à principio usque ad consumptionem.

sumptionem illius dispositionis, & illud fit quando quod ex sanguine putrefit, est quale ei quod resoluitur. Signa autem huius febris sunt rubedo faciei, & oculorum, & inflatio temporum & repletio turis corporis, & pigritia, & grauitas, & sorda cum inflammatione vehemens, & corpora eorum sunt calida & humida, sicut illa quae egrediuntur ex balneo. Et pulsus est magnus, fortis, plenus, lenis. Urinae uero substantia est subtilis cum colore alargiuani, id est, cum colore purpureo. Et quandoque accidit infirmo asthma ex multitudine sanguinis in omnibus superioribus, scilicet in hepate & corde, & propter multitudinem vaporum qui ascendant ad pectus & pulmonem.

De cura febris synochi.

Febris autem quae fit ex calefactione sanguinis tantum, absque eius putredine, curatur curatione simili qua curatur febris ex putredine sanguinis, incipiendo in primis cum phlebotomia uenae: & si consequitur virtus, & extrahemus de sanguine donec accidar synocopi, quoniam ista euacuatio coovertit iuuamento magno in huiusmodi febre. Et quandoque sequitur ad illud solutio naturae, & euacuatio cholerae, & oritas totius corporis, & sudor unde sedatur & quiescit febris. Et non oportet ut aduertatur de numero dierum &c.

Alia uero à principio curationis huius febris, videtur ad hanc particulam. Et non oportet ut aduertatur de numero dierum &c. sic iacet ut infra.

Febris sanguinea si sunt ex calefactione sanguinis tantum, propter priuationem euationis, & fuerint paucae oppilationes, oportet ut curentur curatione febrium sanguinis putredinalem. Et si humores fuerint furiosi ualde, tunc necessaria est cura fortiori ista, & tunc si non festinetur ad curam, perducitur sanguis ad putredinem, & sic febris ex putredine sanguinis. Et propter hoc oportet ut fiat euacuatio cum apertione uenae, & extrahatur de sanguine donec accidar synocopi, quoniam in huiusmodi curatione est iuuamentum magnum, si cōsentit uirtus; quoniam corpus reuertitur ad temperamentum cum frigidityte accideote ex synocopi. Et quandoque sequitur post illud expulsio naturae cum solutione uentris. Et quandoque euacuatur cholera cum uomitu. Et quando ad istas euacuationes subsequitur oritas & sudor in toto corpore, & febris extinguitur statim. Quod si non fiat phlebotomia in huiusmodi cura perducitur res ad timorem magnum, nisi uirtus fortificetur & crumpatur sanguis ex aliquo loco, & currat sudor multus, unde infirmus liberetur a morte. Et non oportet ut aduertatur seu consideretur de numero dierum à principio agritudinis, quoniam uirtus

est remanens, quia quum ipsa fuerit fortis, tunc non oportet ut sit continens phlebotomare in sexto & in septimo tantum, immo in reliquis diebus alijs. Si autem cogeris in aliqua hora prohibere exactionem sanguinis, administra regimino iuuatum quod aperit oppilationes, & [incidit, & sedat ebullitionem] sanguinis & caliditatis. Et quando apparuerint signa digestionis, & non est in aliquo membrorum principalium apostema, neque durities neque macies corporis, &c. q; uides in aliquo membrorum corporis aliquid, per quod timetur quod noceat ei potus frigidus, tunc conceditur potus aquae frigidae, & proprie si infirmus fuerit consuetus potare illam quoniam membra radicalia quod fuerint fortificata cum temperamento, quod eis aduenit ex hoc potu, attrahunt ad se humores laudabiles conuenientes, ut cum eis nutriatur, deinde expellunt quod non conuenit eis per cessum, & per id quod egreditur ex cute. Quod si natura non expellit per se, & oportuerit emendicare illud cum medicina, tunc oportet exhibere in potu decoctionem prunorum, & tamarindorum, & passularum mundarum ab acillis, cum casia fistula & tereniabin, post mensurationem quantitatis istorum secundum uirtutem & secundum aetatem. Quod si cum hoc non obedit natura, tunc oportet administra re glysterem lenem factum ex camomilla, & uolis siccis, & tribulis, & scabestis, & hordeo excoctis, & althea, & succcharo rubeo, & peridijis cum oleo violato, aut oleo sisamini, & sale communi, & modico baurach. Postquam autem lenitas fuerit natura, oportet ut debeat in potu aqua hordei. Et si natura fuerit decliuis ad siccitatem, datur in potu ipsa aqua hordei cum aqua granatorum dulcium, aut cum iubei aut cum zuecharo: & si uo fuerit decliuis ad siccitatem, cum aqua grauatorum mazorum, aut cum syrupo acetoso uuecharino. Quod si fuerit coouenies ut infirmus assumat cibum, tunc oportet cibare ipsum in maie post asumptionem aquae hordei in frigore aeris quoniam in hac hora sedatur caliditas parumper cum aspiratione aeris frigidi, & fit appetitus cibi. Quando enim aer fuerit calefactus, & patientes fuerint infirmati, & caliditas eorum fuerit uehementior tunc non oportet in hac hora exhibere eis aliquid de cibo. Cibus autem eorum sunt lcores excocti, & spinachia cum mes excoctis, aut cucurbita cum oleo amygdalarum dulcium, aut cum oleo ompbacino abluto, quoniam hoc oleum est frigidum ex hoc, quod est factum ex oluis crudis. Si autem non potest comedere panem cum oleribus quae diximus, tunc oportet exhibere eis sauch hordei iam infusum in aqua calida hora una, deinde ablutum cum aqua frigida permixtum cum anecharo, ut non inflet uentrem & non generet in eis rugitum: (vel secundum aliam litteram, sauch hordei iam infusum in aqua calida per

da per horam, ut non generet rugitum & Inflationem, deinde ablutum cum aqua frigida, & permixtum cum modico zuchari.) Et secundum hunc modum exhibetur etiam fauich filiginis, & fauich tritici, quando abluatur cum aqua calida, deinde abluatur cum aqua frigida, & datur cum zucharo in potu. Et dantur eis ex fructibus pruna recentia, & granata muza, & poma, & medulla citruli, & cucumeris, & ginnar palmar, & vua alba, & quæ sunt illis & similia. Et si natura fuerit decliuis ad siccitatem, sit potus eorum aqua prunorum, seu in fusio prunorum, & aqua cucurbitæ cum zucharo, & iuleb, & aqua granatorum mazorum, & aqua citruli. Si autem natura fuerit decliuis ad lenitatem, tunc exhibeatur sechaniabin, & rob agrestis prunum, & rob de ribes. Quod si natura fuerit vehementer soluta seu lenis, tunc exhibeatur aqua fauich hordei cum trochiscis de spodio costrictinis, & elonga abipso iuleb & zucharum, & da in potu rob granatorum acetosorum, & rob malorum, & cytoniorum purum. Et si accidat febrienti soda, tunc funde super caput oleum rosatum tepidum, (vel secundum aliam literam, tunc vehementer inungatur caput cum oleo rosato tepido, permixto cum modico aceti fortis), ant cum oleo de chalef cum aqua rosata, quoniam hoc prohibet materiam, & reprimat eam. Si autem volumus extinctionem tantum absque repercussione, tunc ponemus super caput aqua portulacæ, & aquam chælis, & aqua rosatam & oleum rosatum, & niolatum, & oleum nenufarinum. Et ex eis quæ conferunt iuuentum magno, est succus nigræ pastoris, & semperuiæ, quando miscetur cum oleo rosato, & oleo niolato & oleo de semine cucurbitæ dulcis, & modico aceti potentis & camphoræ. Quod si necessaria est emplastratio, tunc fiat emplastrum cum extremitatibus chalef recentibus contritis, & portulaca, & rasura cucurbitæ, & musco aquæ, & semperniua, & farina hordei; quando conficitur cum aqua rosata, & sandalis albis, & aceto pauco, & linitur frons cum linimento facto ex sandalis albis, & camphora cum aqua cucumeris, & aqua rosata, & modico aceti. Si autem febrienti accidit nigilix, tunc confice hoc linimentum cum aqua foliorum papaueris, aut lactucæ humidæ, & emplastrum etiam cum emplastro ex folijs niolarum humidis, & nenufare humido, si reperitur, & lactuca, & papauere, contritis contritione bona cum modico farine hordei, & althææ, & conficiatur cum aqua cucumeris, & cucurbitæ, & oleo uiolato. Si autem non quiescit soda, & existimatur quod in capite sint retenti vapores acuti, fici, tunc oportet ut administraretur embroca cum aqua, in qua decocta sunt flores camomillæ, & violæ sicca, & rosæ, & hordeum exornitatum, & flores nenufaris, & quæ sunt illis similia. Si

autem succint nigilix, tunc misce cum istis medicinis papaner cum cortice sodo, & semen lactucæ. Et si non quiescit soda cum embrocis etiam, & non sit febris in infirmo, aut cum eo fuerit febris lenis quæta, tunc super caput mulgeatur lac mulieris, si fuerit uirtus debilis. Si uero fuerit fortis, mulgeatur lac caprarum. Et post administrationem lactis emplastratur caput cum emplastris, quæ diximus ante, & expectetur hora una donec quiescat infirmus, deinde fiat ei caputpurgium cum oleo uiolato, aut oleo nenufarino, & lacte mulieris lactantis puellam. Quod si non sedatur dolor cum hac curatione etiam, tunc emplastratur caput cum emplastro facto ex camomilla, & violis siccis, & farina hordei, & althææ, & oleo uiolato, & aqua frigida. Et si sit illic uigilix, tunc oportet ut addas in emplatri cortices papaueris, & semen lactucæ, & poma mandragoræ recentia, si inueniuntur, & conficiatur emplastrum cum aqua lactucæ loco aquæ. Et non oportet ut cures cum istis curationibus, nisi quando soda est ex vaporibus calidis siccis. Quando autem caput est plenum vaporibus grossis humidis, oportet ut caueatur lac & caputpurgia, quia iste modus sode duplicatur cum huiusmodi curationibus. Et significatur super hunc modum soda, ex granitate quæ est in capite cum dolore, quoniam si fuerit cum dolore grauitas in capite, significat quod in ipso sunt uapores humidis multi. Quare tunc oportet ut enretur cum uapore aquæ, in qua decocta sit camomilla tantum, donec resoluantur vapores per resolutionem, quam acquirunt pori capitis ex aqua camomillæ. Et si indiget embrocatione, facimus eam ex illa aqua camomillæ post uaporationem factam cum eo. Et oportet ut elongetur ab oleo, quando in capite est grauitas aut subeth, quoniam retinet materiam intus & prohibet eam a resolutione. Et effunde super pedes & manus aquam calidam, in qua decocta fuerit camomilla, quoniam hæc attrahit materiam ad inferiora, & facit descendere uapores. Quod si fecit infirmus apud effusionem huius aquæ, materiam & uapores descendere in dorsum & spondiles, tunc soda quiescit. Et si non sentit illud, non quiescit soda, quoniam materia adhuc est sursum retenta, & tunc oportet ut stringantur manus & pedes strictione forti, donec lædatur & doleant. Et si tibi necesse est stringere testiculos, fac illud. Si autem accidat infirmo angustia & inflammation, & syncopis, tunc oportet emplastrum stomachum & ventrem cum emplastro facto ex cinere cannarum, & althææ, (uel secundum aliam literam, ex cinere foliorum cannarum, & althææ), & sandalis albis, & camphora, confectis cum aceto. Et confert etiam rasura cucurbitæ, quando teritur & permiscetur cum farina hordei, & althææ, & aqua rosata, & aceto. Et similiter

ter portulaca, quando teritur & miscetur cum rosis tritis, & sandalis albis, & aqua rosata, & folia chalef recentia. Et uirga pastoris cum aqua rosata, & aceto. Et alra haleb, id est, muscus aque quando permiscetur cum sandalis albis, & camphora, & aceto. Et iaceat infirmus in domo frigida, quæ sit strata cum folijs chalef, & extremitatibus uitis, & myrtho humida, & sahesefram, id est, basilicone habente folia minora, & rosis recentibus si inueniuntur, & floribus nenularis, & curibis aquarum frigidarum quæ per mutantur quotiens calefiunt. Et ponatur super stomachum & uentre rem cerotum factum ex oleo rosato, & aqua cucurbitæ, & niue, huiusmodi enim extinguitur extingitione ultima. Et iuuantur etiam cum clystere factio ex aqua portulacæ, & aqua foliorum psyllij cum oleo rosato, (uel secundum aliam literam, cum clystere factio ex portulacæ, & aqua psyllij, & oleo rosato,) & aqua cucurbitæ decocta, & aqua cucumeris, & oleum uiolatium. Et similiter aqua uirgæ pastoris, & aqua chalef: huiusmodi enim conferunt iuamento efficaci ad catinguendum inflammationem, & casacan, & synopim causatam ab ea. Et si accidit in lingua siccitas rehemens & asperitas, tunc oportet ut extrahatur mucillago seminis cytoniorum, & psyllij & seminis alihæ, & miscatur eum ex oleum seminis cucurbitæ dulcis, & auctharo: & lambat ex eo infirmus assidue: & fricetur lingua, quando ipsa denigratur & ea asperatur, cum istis seminibus prædictis ligatis in petia lini, donec rubeat color eius: (uel secundum aliam literam, & fricetur etiam lingua si fuerit nigra, cum petia lini infusa in istis mucillaginibus, donec rubeat & fiat lenis.) Et accipiat infirmus in ore suo aquam cucumeris assidue, & oleum uiolatium, & aquam granatorum mazorum uehementis saporis, cum oleo seminis cucurbitæ dulcis. Et si accidat infirmo subeth magnum, ita ut non possit aperire oculos suos, neque loqui tunc non ponas super caput eius oleum, neque emplastrum factum ex farina hordei, sed embroca super ipsum oleum rosatum & acetum: quoniam hoc confortat caput, & remouet subeth. Quod si accidat infirmo inquietudo seu angustia, ita ut ipse permotetur à deatris & lini stris, & proiciat seipsum huc atque illuc, & inflatur uenter eius, & quum manu percutis super ipsum, sentis uocem sicut tympani: tunc si soluitur uenter eius, seu natura ipsius & non remouetur illa inflatio, scias quòd infirmus moritur, præcipue si appareat in eo bothor seu maculæ violacæ: (uel secundum aliam literam, si appareret in eo mortuilli uirides, præcipue si sunt amplæ latæ,) & currit ea corpore sudor multus: (uel secundum aliam literam, præcipue si sunt amplæ latæ, existentes in pluribus locis corporis. In huiusmodi ergo dispositione, oportet ut fugias à curatione eius,

Si autem accidit infirmo fluxus sanguinis narium secundum semitam crisis, tunc oportet ut gaudeas de leteris ea hoc, & non abscindas eum. Quod si huiusmodi fluxus foris fiat adeo ut debilitetur uenter, tunc oportet ut cures eum curatione descripta in capitulo fluxus sanguinis narium.

De cura febris causata ab almeslere, seu ab erysipelate.

Si causa huius febris est apostema nominatur erysipelas, quæ est almeslere oportet ut curetur primo almeslere cum phlebotomia uenæ deinde cum medicina solutua facta ex speciebus myrobalanorum, & ea prunis, & tamarindis, & fumoterræ. Et si est nobis necesse, damus etiam aquam foliatæ, & aquam endiuivæ, & aquam lubleb cum cassia fistula. Et damus post illud aquam hordei cum aqua granatorum mazorum. Et liniatur apostema cum sandalis rubeis, & faufel & sic meminitur, & bolo armeno cum aqua solatri, & aqua coriandri humidi, & camphora.

De cura febris causata à variolis, (uel secundum aliam literam, De cura febris causata ex planta diei, quæ est variola.)

Si hæc febris fuerit, propter causam variolarum, & uirtus & ætas consentit, tunc non aliquid magis iuuatiuum quàm phlebotomia uenæ. Et si aliquid prohibet phlebotomiam, tunc oportet ut administrentur uenose. Et custodi oculos ita ut non egrediantur in eis variolæ, seu ulcera variolarum, & distilla in eis ambobus assidue aqua rosatam, & aquam sumsch. Quidam autem exprimunt ea semine & ex pulpa granatorum, & distillant in oculos: (uel secundum aliam literam, Quidam autem linunt oculos eo quod exprimitur ea semine & ex pulpa granatorum.) Quum ergo apparent ulcera in oculis, oportet distillare in eis cohol, seu antimonium dissolutum in aqua coriandri humidi, aut coriandri sic ei infusi in aqua pluuiali colata. Et damus in potum hanc medicinam, ut egrediantur uelociter ulcera seu variolæ absque constrictione peccatoris, & absque angustia, & casacan, & absque nausea, & descriptio medicinx est hæc. Recip. laccæ mundatæ drach. 5. lentium non excorticatarum neque ablutarum drachm. 7. (uel secundum aliam literam, lentium excorticatarum ablutarum drach. 7.) dragacanthi drach. 3. decoquantur ista cum libr. una aquæ donec remaneat tertia, & coletur, & exhibeatur. Deinde detur in potum omni die aqua hordei, postquam decoctæ fuerint ea ipsa partes, 2. & paræ una lentium: (uel secundum aliam literam, Deinde exhibeatur aqua hor-

hordei omni die, & decoquat cum duabus partibus hordei par. 1. lentum: & comedant mes, & lentes, & atriplices, & olus iamenum cū oleo abluto. Quod si infirmus indiget lenitione naturę, tunc oportet ut ipsa leniatur cum decoctione iubarum, & prunorum, & tamarindorum, & casia fistula, & tereniabin, usque ad diē septimum: deinde post septimum oportet ut caueatur ad medicinā solutiuis, quoniam de consuetudine huius egritudinis est, ut accidat ī fine eius solutio dentris, quia materia quando remā sit intus, & non egressa fuerit ad exteriora, expellitur a natura, & facit accidere diarrhæam aut excoriationem propter acuitatem suam. Et propter hoc oportet ut post septem dies, exhibeantur in cibo lentes iam torrefactę & decoctę cū aqua granatorum minorum: & loco cucurbitę ponantur cum eis giumar palmę. Et ex fructibus exhibeantur vva alba, & granata mra, & poma, & pyra, & cytonia. Et si tempus est hyemis, accendantur eorum eis ligna iamarisci, & sarmēta vitis. Quoniam ergo incipiunt nlcera exiccati, liniatur super ea cum penna linimentum factum ex farina rizi perfici, & farina milij cum radicibus cannarum exiccati, & croco, & amylo permixtis cum aqua rosata. Et quidam alij liniunt corpus infirmi cum sale contrito dissoluto cum oleo sisamino. Quidam alij faciunt sedere infirmum in aqua in qua iam decocta sint ficus, & sal, & [et] furfur rizi. Et oportet ut sternatur sub eis stratum impletum milio, & panico aut rizo: quoniam hoc exiccat nlcera uelociter. Et si egrēditur in paribus aut in ore aliquid ex ulceribus seu ex uariolis, oportet ut innogantur nares cum oleo niolato permixto cum cera alba dragacantho. Et extenuatur illud quod ex eis accidit in ore, cum mucillagine seminis cytoniorum, aut mucillagine psyllij. Quod si natura fuerit soluta, tunc exhibeatur in potu suffus de seminiibus, cum trochiscis de spodio factis cum semine acetosę, quorum descriptio est hæc. Rec. spodij drac. 4. rosarum rubearum drac. 5. seminis acetosę excorticati drac. 6. gummi parum torrefacti, & balauustiorum, omnium ana drac. 5. boli armeni drac. 3. terre sigillate, berberis, omnium ana drac. 5. granatorum myrthi alborum dra. 4. amyli, & croci, omnium ana drac. 3. castanearū drac. 5. terantur, & cribellentur, & conficiantur cum aqua cytoniorum, & fiant trochisci, & excentur, & dentur ex eis in potu cū aqua pyrorum lypycoricorum. Et cibetur infirmus cum milio excoctico torrefacto iam decocto cum hordeo torrefacto, aut cibetur cum sauch hordei. Et si indigent clystere, cōrnam eos cum uno clysteri prædictorū in cratione excoriationis. Et nō comedāt dragag, neq; pullos, donec exiccent nlcera seu uariolę, & mōdificetur corpus a feb. Quod si patietes febrē sanguinis, post eradica-

tionē feb. indiget eo quod extinguat illud, quod iam remansit in corpore de acuitate seu de impresione febris, damns in potu istos trochiscos. Rec. spodij drach. 3. seminis portulacę dra. 5. seminis cucumeris excorticati. drac. 4. seminis cucurbitę dulcis drac. 6. gummi dragacanti, amyly, omnium ana drac. 3. succi liquitię drac. 7. terantur, & cribellentur, & misceantur cum mucillagine seminis psyllij, & fiant trochisci, & dentur cum aqua granatorum, aut cum aqua citrulli, aut cum aqua endinij, aut cum aqua culcnę.

De febre tertiana, que causatur ex putredine cholera. Cap. XIII.

Super hanc febrem tertianam sumuntur quidem significationes ex rebus naturalibus, & ex rebus quę non sunt naturales, & ex rebus præter naturam. Et cognoscitur ipsa febris tertiana ex causis præter naturalibus, quoniam ipsa incipit cum rigore difficili, si fuerit materia eius putrescens extra uenas & arterias: si est intra uenas & arterias, tunc est febris tertiana continua, aut febris adustia seu caupon. Et in nulla istarum duarum febrium est rigor seu tremor, quoniam materia ipsarum est comprehensa in uenis & arterijs. Sed differentia inter febrem tertianam continuam, & inter febrem adustiam, est hæc.

Alia liera habet principium huius capituli usque ad istam particulam, Sed differentia &c, sicut infra.

Scias quod quando febris tertianę materia est extra uenas & arterias, tunc ipsa incipit cum tremore difficili: & si est intra eas, incipit absq; tremore, & accidit febris tertiana astidua. Sed differentia inter tertianam astiduam & comburentem seu adustiuam, est quod cholera faciens febrem tertianam continuam, est in omnibus uenis corporis æqualiter: sed in adustia, est inflammatio & ebullitio cholera, seu putrefactio cholerae proprie in uenis quę sunt in circuitu cordis. Et quandoque est febris adustia ex putrefactione phlegmatis falsi, sicut dixit Hippocrates in libro epidimij. Quod si materia faciens febrē tertianam putrescat extra uenas tunc feb. incipit cum rigore seu tremore, quiescit sicut punctura acuum, & sicut horripilatio quę causatur ex effusione aque ebullientis super corpus subito. Et hoc quidem accidit, quoniam cholera citrina habens partes subtiles igneas, mouetur ad superficiem corporis exteriorē, quumq; pertransit super membra sensitiua, mordicat ea, & lædit ipsa, unde caliditas naturalis fugiens nocuentū mordicationis, profundatur cum sanguine versus profundum corporis, quia [accidit ex hoc] tunc tremor propter frigiditatem membrorum extrinsecorum, & propter mordicationem &

nocumentum accidens in membris sensitiuis. Et quandoque fit tremor etiam propter humorem frigidum effusum super membra sensitiua, sicut tremor qui accidit in febre phlegmatica, & in febre melancholica. Verum ille tremor qui accidit in febre phlegmatica, non fit secundum plurimum in principio febris phlegmaticæ, nisi propter grossitudinem phlegmatis & viscositatem eius: sed in fine quum subtiliatur humor, augetur tremor paulatim paulatim, ita ut fiat vehementis. In quarta autem seu in febre melancholica, tremor in principio est debilis, quoniam illud quod effunditur super membra ex humore melancholico, est res parua, quia est humor grossus: & in fine fit tremor fortis, quando subtiliatus est humor, & fit currens: & tremor quidem fortis accidens in fine, est significatio bona in hac febre melancholica. Et tremor quidem qui accidit in febre tertiana, ex hoc quod accidit in ea mordicatio sicut punctura acuum, ideo nominatur tremor simplex: (vel secundum aliam litteram, nominatur tremor absolute.) Tremor autem accidens in febre phlegmatica, est cum frigore sicut nix, & nominatur alchamie, seu nominatur frigus. Tremor uero qui accidit in febre quarta quia ex eo accidunt dolor membrorum, & grauitas, & dolor in ossibus, nominatur tremor faciens laborare ossa. Et ad febrem quidem tertianam sequuntur uomitus cholera citrina, & solutio ventris cholericæ, & paroxysmi eius longiores sunt circa duodecim horas, quando febris tertiana fuerit pura, & quies seu interpolatio inter paroxysmum & paroxysmum sunt .36. horarum, & periodi eius sunt septem, & terminatur in quatuordecim diebus, sicut dixit Hippocrates. Et in febre quidem tertiana accidunt sitis, & inflammatio, & foda. Et patientes hanc febrem non desiderant ut cum eis aliquis loquatur, aut moneat eos. Et accidunt eis vigilie, & non sentiunt granitatem in capite. Et quandoque infrigidantur manus & pedes ipsorum, aut propter declinationem caliditatis naturalis & sanguinis ad profundum membri, in quo est putredo: (quando sanguis attrahitur versus illud membrum, propter caliditatem generatam in eo ex putredine) aut quoniam febris est composita ex febre quotidiana, & ex febre interpolata, cuius materia est extra venas, & effunditur ad membra sensibilia, sicut dictum est. Et in fine paroxysmorum febris tertianæ sequitur sudor, &c. (Alia littera habet, Et fortasse infrigidantur manus & pedes, & sequitur ad resolutionem periodorum, seu in fine periodorum, sudor: quoniam humor est subtilis facilliter resolubilis, & expellitur ad superficiem corporis, & liberat infirmum à paroxysmo particulari: & illud non est in febre phlegmatica, propter grossitatem humoris phlegmatici, & viscositatem eius.)

Et trina est subtilis ignea, propter permixtionem cholera cum aquositate sanguinis & propter multam caliditatem igneam. Et pulsus eorum in principio paroxysmi est paruus, quoniam caliditas non expanditur adhuc in corpore toto: & quum status est propinquus, fit pulsus magnus, uelox, frequens. Fit autem magnus & uelox, propter firmitatem: & fit frequens, propter caliditatem cholera quæ causat necessitatem. Et non est in pulsu diuersitas, nisi diuersitas quæ appropriatur febri: quoniam non est illic materia quæ debilitet uirtutem. Illæ igitur sunt significationes super hanc febrem tertianam, sumptæ ex rebus præter naturam. Significationes autem sumptæ ex rebus naturalibus super hanc febrem, sunt quia ipsa secundum plurimum fit in statu adolescentiæ, & in complexionem calidam cholericam, & in tempore æstiuo, & in regionibus calidis ficiis: & secundum plurimum accidit corporibus extenuatis, & habentibus corpora macra sicca. Et significatur super hanc febrem cholericam ex rebus non naturalibus, quoniam plurimum accidit eis qui uidentur multitudine ciborum calidorum, & potibus calidis, & exercitijs multis laboriosis, & coitu supra mensuram moderatam. Et iam uidimus multas gentes, in quibus nesciamus esse eis accedisse hanc febrem tertianam, ex significationibus sumptis à rebus non naturalibus. Et oportet nescias, quod hæc febris tertiana est febris acuta, uerum ipsa est salubris, & eius acuitas est propter subtilitatem humoris facientis ipsam: quoniam huiusmodi humor digeritur & resolutur cum facilitate. Salubritas autem eius à timore, est propter acuitatem, id est, propter breuitatem temporis eius: quoniam ipsa separatur à natura: (vel secundum aliam litteram, quoniam dimittit naturam, & facit eam quiescere, & non debilitat ipsam.) Et si natura laborat in hac febre die uno, quiescit in die secundo qui est post ipsam, propter leuitatem materis seu cholera: quoniam ipsa non est grauis super naturam, uel quoniam ipsa non grauat naturam. Est et sciendum quod ex cholera citrina quædam est quæ generatur in hepate, & sunt quatuor species eius, scilicet pura citrina, & etia rubra clara, cuius generatio est in hepate, & est tennior quàm pura citrina: quoniam ipsa est ex permixtione humiditatis aquosæ cū illa cholera rubra. Est et alia species quæ dicitur uittellina, & est similis uittello oui crudo: & hæc species est grossior quàm illa prima, & eius generatio fit ex permixtione humiditatis grossæ phlegmaticæ cū cholera rubra clara, quæ quidem cholera rubra similatur sanguini subtili: & spissitudo quidem cholera, aut est ex resolutione aquositatis, aut ex permixtione nirulentæ sanguinis. Et ex cholera est quæ generatur in stomacho, & sunt tres species eius, scilicet cholera porrina, quæ similatur porris: & cholera zinaria, quæ similatur uiridi æris: & cholera nil, quæ similatur colori

colori nigro. Et istę tres species generantur in stomacho ex cibis calidis acutis, sicut piper, sinapis, & allium, & cepe, & mel, & quę sunt illis similia. Febris autem tertiana non generatur ex istis tribus speciebus cholerae, maximo ex cholera porrina & ziaris, quoniam natura expellit ipsam uelociter per superius & inferius, & non moratur in corpore donec faciat accidere febrem iam mortuam sit ex cholera rubra, & cholera citrina, & reliquis speciebus cholerae quę generantur in hepate supradictis. Et oportet etiam ut sciatur quod febris tertiana, si non est tertiana pura, non sunt in ea istę significationes, quas diximus, manifeste, sed sunt diuersę secundum mensuram diuersitatis humorum, (vel secundum aliam litteram, secundum mensuram diuersitatis: permixtionis humorum,) quoniam ipsa febris prolongatur non tantum in quantitate temporis paroxysmorum, quę est circa 24 horas, immo etiam in numero paroxysmorum, quoniam fiunt plures paroxysmi quę septem. Et proprietas huius febris tertianę est, quod patientes ipsam sentiunt in hepate suo inflammationem & feruorem vehementem. Restat autem inquirere quomodo sit possibile, ut cholera citrina & cholera nigra putrescant, quod ambę duę sint sicca. Pro decisione huius dubij, sciendum quod aliqua sunt sicca in complexione & in substantia sua, sicut lapis, & ferru, & quę sunt illi similia: aliqua uero sunt sicca in complexione & in uirtute sua, & sunt humida seu fluida in substantia, sicut acetum, mel, pinum uetus, cholera citrina, & cholera nigra, & quę sunt illis similia. Huiusmodi enim sunt sicca in uirtute & in complexione, & in substantia sua sunt humida fluida. Et propter hoc istę duę cholere, scilicet cholera citrina, & cholera nigra, putrescunt & corrumpuntur propter humiditatem seu fluxibilitatem substantię suę, & propter solabilitatem seu fluxibilitatem corporis sui & non propter complexionem & uirtutem ipsarum siccam.

De cura febris tertianę.

Quia illud ad quod intenditur in hac febre, est duę res, scilicet mala complexio calida sicca, & materia, ideo oportet contrariare istis duabus rebus simul. Male enim complexionem calidam siccam contrariandum est cum his quę infrigidant & humectant, & materię contrariandum est cum his quę ipsam euacuant. Et quoniam mala complexio est magis dominans in hac febre quam materia, ideo oportet magis declinare ad humectationem & extinctionem quam ad euacuationem. Quare oportet administrare post lenitionem naturę factam cum aqua prunorum, & tamarindorum, & iniubarum, & terebinthin, aliquid de aqua hordei, quoniam ipsa est ex eis quę infrigidant & extinguunt febrem, & humectant & mundificant materiam facientem ipsam, per uirtutem abstersiuam quę est in ea, & ipsa cum hoc etiam nutrit & conseruat uirtutem. Et oportet ut detur in potu aqua hordei per tres aut quatuor horas ante paroxysmum, aut post eradicationem febris, ut stomachus in hora paroxysmi sit uacuu. Quod si aliquid prohibet exhibitionem aquę hordei, detur in potu aqua cucurbitę, & aqua grauatorum mororum, aut secernabitur saccharinum. Et cibetur infirmus cum cibis infrigidantibus humectantibus, sicut lactuca, & atriplex, & olus iamenum, & malua, & cneurbita, & citrulli, & quę sunt his similia. Et quando apparet in urina digestio, tunc oportet ut euacuetur materia ex locis ad quę ipsa declinat. Si enim ipsa plus declinat ad stomachum, seu ad os stomachi, euacuabimus eam per uomitum cum secernibin & aqua calida. Et si declinauerit plus ad intestina, tunc euacuabitur per clysterem lenitiuum. Et si est declinatus uersus superficiem corporis tunc euacuabitur per sudorem. Et si est declinatus ad uenas & ad hepar, tunc oportet euacuare ipsam cum his quę pronocant urinam, sicut est decoctio apij, myrobalanorum, & absynthij, in tertiana pura post digestionem. Absynthium enim est calidum, quare non oportet exhibere ipsum ante digestionem, ut non sit causa inflammationis febris: sed ipsum est exhibendum post digestionem, ut si aliquid de materia remanserit, subleuet & leniat ipsam: quia in absynthio sunt duę uirtutes, scilicet uirtus styptica, & uirtus solutiva. Quotiens ergo exhibetur absynthium ante digestionem humoris, non securatur quia in grossius materia, & ipsa retineatur sua stypticitate, quare necessarium est ut accidat angustia. Et cum uirtute solutiva quę est in absynthio, mouetur humor ad euacuationem & cum uirtute styptica ipsius, fit illud quod euacuatur difficius euacuationis, & propter hoc laborat natura, & lęditur à duabus uirtutibus simul. Si uero absynthij exhibetur post digestionem, & postquam materia fuerit iam subleuata, tunc facilis fit euacuatio eius, quia duę uirtutes quę sunt in absynthio adiungunt ad illud. Virtus enim solutiva ipsa iungatur cum uirtute eius styptica, quę aggregat & exprimit ad uirtutem expulsiuam, ita ne expellatur humor, & moueatur etiam ad expulsionem. Si autem febris tertiana fuerit pura, tunc oportet ut precipiatur infirmum balneari ante quàm appareant signa digestionis, quoniam illud extinguit per uaturam propter aquam, & cum hoc humectat & extinguit etiam per accidens, quoniam balneum euacuat materiam facientem febrem. Et ad ministrandum quidē ipsum balneum ante digestionem, quoniam qualitas in hac febre est magis dominans quā materia, & materia est est facilis resolutionis, & non timeatur quod ipsa

De 3 inspille.

in spissetur & non resoluatur, & faciat accidere oppilationem. Et si infirmus magis diligit ut infundatur seu sedeat in aqua, tunc concedatur ei illud, quoniam uone est ex eis quæ nocet, immo iuuat, quoniam lenitur & rarificatur corpus eū huiusmodi aqua, & per eam fit resolutio superfluitatum, & acquisitio eius quod acquiritur ex uirtute aquæ. Et si infirmus fuerit confectus balneo, oportet ut infirmus ingrediatur balneum uicibus duabus in die, & fiat balneum primo propter ægritudinem, & secundo propter consuetudinem. Si uero febris tertiana fuerit non pura, aut fuerit febris quotidiana aut quartana, tunc oportet ut infirmus non balneetur, aut digestionem, quoniam materia in istis est dominans difficilis resolutioni: & non oportet ut præcipiatur eis balneum ante digestionem, ut non effundatur seu non moueatur materia, & non faciat accidere oppilationes & apostema, & non corrumpatur ex permutatione materię effusa, illud quod prius non erat aptum corrumperī, Quom uero apparuerit digestio, & facta fuerit facilis resolutio, tunc præcipiatur patientibus has febres, ut ingrediatur balneum.

De cura tertiane non puræ.

In cura tertianæ non puræ sunt due res, quarum una contrariatur alteri, scilicet uirtus & multitudo materię quoniam multitudo materię indiget ieiunio, ut natura euacuet & subleuet humorem, & facili sit ei resolutio uirtus uero indiget cibo, ut non prosteratur & debilitetur. Quare ille qui intendit curationem bonam & perfectam, oportet ut incedat uia media seu mediocri, & exhibeat cibum die uno, ut conservetur uirtus: & dimittat cibum die alio propter materiam, ut non multiplicetur materia, & grauet, & ut non prosteratur uirtus propter ieiunium, quoniam sicut ieiunium eōfert multitudini materię, similiter nocet uirtuti: & sicut cibus intenditur uel exigitur à uirtute, similiter cibus non conuenit multitudini materię. Quare oportet (sicut diximus in his quæ præcesserunt) ut restituatur illi quod ex eis est magis difficile, & magis proficuum seu necessarium. Si uero uirtus fuerit permansens, præcipiatur infirmo ieiunium. Quod si uirtus non fuerit stabilis, tunc fiat e contrario. Ex istudium nostrum circa uirtutem proprie, non in hac ægitudine tantum, immo in omnibus ægitudinibus quæ sunt ex repletionem. Et oportet ut infirmus assidue administrationem uonius, post cibaria subtilia quæ abstergunt. Et si natura fuerit sicca, tunc oportet ut administretur clyster acutus, quoniam faciens hanc febrem, est grossus, viscosus compositus, difficilis euacuationis, propter commixtionem eius cum phlegmate. Quod si prohibeat aliquid à

elystere, & uolumus euacuare ipsum per suppurum, & uirtus fuerit debilis, & caliditas fuerit uehemens, tunc oportet euacuare eum cum syrupo rosarum, aut cum geleniabini aut tereniabini asperitis cum aquis, aut cum aqua lubic, & cum uolis siccis. Si uero uirtus fuerit fortis, permansens, & materia fuerit dominans fortis, tunc oportet euacuare infirmum cum pilulis facis ex aloë, & masticæ, aut cum pilulis de eupatorio. Illa autem quæ iuuat iuuamento magno, sunt pilule istius descriptionis. Rec. hircæ pitæ dr. ʒ. succi absynthij, & succi eupatorii, omnium an. dr. 3. seminis apij, myrobalsuorum citrinorum, & myrobalsorum nigrorum, omnium ana drac. 4. salis indi drac. 3. trochiscorum de rosis dr. ʒ. turbith drac. 7. Summa medicinarum est numero 8. teratur, & cribellatur, & misceatur cum aqua apij, & hant pilule, & exhibeantur eis, drac. 2. cum aqua tepida in nocte. Quod si natura fuerit lenis, & non indiget medicina solutiua, tunc damus eis in potu aquam cum syrupo acetoso. Et si indigent aqua hordei, tunc decoquantur radices apij & feniculi cū aqua hordeij, quoniam ipsa confert istis febribus per illud, quod est in ea de absterione & de frigidiitate & de humedatione, ita ut expellat febrem. Ex hæc quidē aqua contrariatur complexionī phlegmatis, & qualitas frigida aquæ frangitur permiscendo cū ea radices apij, & radices feniculi. Gale. uero permiscebat eam ea pipere. Et cibentur febrientes si materia fuerit grossa, cum aqua cicermi. Quod si caliditas fuerit magis dominans, tunc cū sicca, & asparagi: quoniam ista quæ muli sunt subtilia hauriunt, tamen prouocant uisum. Et post septimum diem exhibeatur decoctio absynthij, sicut dixit Gale. in libro ad Glaucōem, quoniam subtiliat materiam, & confortat stomachum, & post diē. 14. &c. (uel secundum aliam litteram, Et post septimum diem exhibeatur decoctio absynthij, sicut dixit Galen. lib. ad Glaucōem, quoniam materia est grossa & caliditas pauca: & propter illud exhibetur absynchiū, ut subtiliet materiā, absque quod timeatur quod ipsa moueat materiam sua caliditate, sicut diximus in tertiana pura. Et exhibetur etiam absynchiū ut confortet stomachum, qui secundum plerumque debilitatur per hanc febrem, quæ est causa generationis phlegmatis, sicut facit in febre quotidiana. Et post diem quartum decimum) detur in potu aqua feniculi, & aqua apij cum geleniabini & trochiscis de rosas. Quod si prolongatur hæc febris, detur in potu decoctio eupatorii, & caueatur infirmus cautela uehementi, ut in eo non prolongetur febris, sicut prolongata est febris quæ dixit Gale. in libro ad Glaucōem. Incipit enim ista febris in autumno, & non est eradica uel que ad tempus ueris, & paroxysmi eius in principia erant. 14. horarum, deinde prolongati sunt, in

ut perdurarent vintiquatuor horis. Et oportet ut caueatur infirmus à balneatione ante digestionem, quoniam si fiat illud, tunc accidentia inuicementa, quorum unum est quod materia facit hanc febrem, ea hoc quod permixta est cum humore grosso phlegmatico, si facit commota seu effusa, & non fuerit resoluta, generat oppilationem & putredinem. Secundum nocumētum est, quia materia putrescens retenta in membris, quando calefacit balneo, & effunditur permiscetur cum humiditate quæ est in corpore non putrefacta. Tertium uero nocumētum est, quod quando euacuatur illud quod est subtile de materia, tunc diffunditur resolutio eius quod remanet de materia propter suam grossitatem.

De febre quotidiana, seu de febre phlegmatica.
Cap. XIIII.

Hæc febris fit ex phlegmate quod putrescit à caliditate præternaturali, quoniam hæc caliditas quæ egerit in humiditatem aggregatā in corpore, calefacit eā & putrefacit ipsam aut intra venas & arterias, aut extra ipsas, scilicet in stomacho & locis vacuis qui sunt in nobis extra venas & arterias. Et illa quidem materia phlegmatica quæ putrescit intra venas & arterias, non facit frigus in membris, ex hoc quod ipsa non effunditur ad ea. Materia autem phlegmatica putrescens extra venas, facit febrem cum periodis, in quorum principio causatur & sentitur frigus in membris, propter causam quam infra dicemus. Et oportet ut scias quod hæc febris cognoscitur, seu discernitur à reliquis alijs febribus putridis ex causis præternaturalibus, & ex causis naturalibus, & ex causis quæ non sunt naturales. Significationes vero super hanc febrem sumptæ ex rebus præternaturalibus, sunt secundum quod dicemus. Nam patientes hanc febrem, sentiunt in principio eius frigus, propter illam partem phlegmatis quæ adhuc non putrescit, & in fine sentiunt horripilationem, propter illud phlegma quod iam putrescit & calefit. Et ascensio quidem caliditatis prolongatur in statu, quoniam phlegma est difficile digestionis & calefactionis, propter suam frigiditatem & humiditatem, & propter grossitatem suam. Et caliditas habentium hanc febrem, est calida humiditas cum acuitate pauca. Humiditas autem eius est propter humiditatem phlegmatis & multitudinem ipsius. Acuitas autem eius est ex putredine, quia eleuatur ex hoc humore putrido cum sicut eleuatur ex lignis uiridibus. Et non sentit illa caliditas quoties ponit manus super corpus, nisi postquam morauerit tempore longo super corpus, quoniam caliditas multiplicatur in profundo corporis, propter grossitatem humoris phlegmatici & viscositatem eius. Quæque ratificatum fuerit corpus, & subleuatum

fuerit materia, tunc eleuatur caliditas & apparet eius essentia. Pulsus autem patientium hanc febrem, est paruus multum quæm pulsus habent febrem quartanam, quoniam humor phlegmaticus non dissoluit virtutem suam frigiditatem tantum, immo cum sua multitudine, quoniam humor phlegmaticus addit supra humorem melancholicum additione multa, seu quoniam humor phlegmaticus est multo plus quam humor melancholicus. Et pulsus etiam istorum est spissior, quia diminutio ipsius pulsus à magnitudine cum inflammatione, seu putrefactione humoris phlegmatici multi, attrahit seu causat spissitudinem in pulsu. Et urina istorum febrientium in principio est subtilis alba, propter eruditatem humoris phlegmatici, in fine vero eius febris, & in hora declinationis, fit rubra grossa, & hoc quod recipit humor digestionem & euacuatur. Et quando prolongata fuerit hæc febris, apparet in facie patientis febris trebel, id est, turbatio similitudo cachexie, & magnitudo splenis, & illud propter grossitatem materię. Et color corporis fit deuius ad uiriditatem propter frigiditatem phlegmatis. Et paroxysmi istius febris secundum plenum sunt in uespere, quoniam ista hora est hora digestionis. Et egestionem istorum sunt humida ualde permixta cum phlegmate, si non fuerit complexio infirma calida. Et tempus paroxysmorum huius febris est decem & octo horarum, & eorum dimissio est 6. horis. Et non eradicatur paroxysmi eradicatione completa propter grossitatem materię, quoniam corpus non mundificatur ab his paroxysmis, sicut mundificatur in tertiana, quoniam materia eius est subtilis. In hac aetate febris phlegmatica caliditas est conculcata in interiori corporis, & propter grossitatem materię corpus non mundificatur ab ea. Et accidit istis febrientibus dolores stomachi, & uomitus multus phlegmatis. Et non est in declinatione febris sudor, immo est eradicatio paroxysmi absque sudore, propter grossitatem humoris & viscositatem eius, & propter hoc non mundificatur ab eis corpus, sicut mundificatur in tertiana & in quartana. Et os ipsorum est humidum plenum salua, & minoratur sitis eorum. Et sitiunt non sitiunt propter phlegma immo propter caliditatem & putredinem eius, sicut accidit eis qui comedunt pisces recentes, & sicus, & batracas, & quæ sunt illis similia, quoniam sitis accidit istis non propter naturam comeditorum, quæ diuisas, sed propter caliditatem existentem in stomacho. Similiter etiam accidit sitis in istis febrientibus, non propter naturam phlegmatis, sed propter caliditatem & putredinem quæ est in eis. Isti igitur cum quibus cognoscitur hæc febris, sunt ex eis quæ sunt extra naturam. Ex rebus autem naturalibus cognoscitur hæc febris secundum hunc modum, quoniam ipsa secundum plenum

rimam

rimam accidit habetibus complexionem phlegmaticam, in ætate pueritiei & ſenectutis. Et non accidit quidem pueris proprie niſi propter guloſitatem eorum, in lenibus uero propter multitudinem phlegmatis dominantis in eis, & propter paucitatem caliditatis in ipſis. Et poſt iſtos accidit etiam eis qui ſunt multum guloſi in regimine ſuo, & illis qui ſunt humidę complexionis. Et plurimum accidit in hyeme, & in regionibus: & in partibus frigidis humidis. Et hæc quidẽ febri cognoscitur etiam ex rebus nõ naturalibus, quoniam ipſa ſecundum plurimum accidit eis, qui nũtur malo regimine, & ocio multo, & eis qui non digerunt cibum ſumum frequenter, & eis qui multiplicanſ balneum proprie poſt cibum. Et proprietas huius febris eſt dolor ſtomachi & ventris, & tumefactio cachectica manum & pedum, & quandoq; faciei etiam, & color habentiũ hæc febrem eſt deſcluiſ ad albedinem. Et oportet ut ſcias qd hæc febris prolongatur, & non ſecuratur patiens eam à perditione. Prolongatio autem eius eſt quoniam phlegma quod eſt cauſa ipſius, eſt groſſum, frigidum, viſcoſum, tardę digestionis, difficultis reſolutionis. Et in ea eſt magnus timor, quoniam natura laborat omni die, & non permittit eam quieſcere die vno integro, & quoniam os ſtomachi ſecundum plurimum eſt læſum, ita ut ex læſione ipſius accidat ſyncopis, & prohibitio à cibo, & malitia digeſtionis. Cauſa autem propter quam huiusmodi febris non facilius eradicatur, immo prolongatur tempore, eſt multitudo phlegmatis, & groſſitudo, & viſcoſitas, & frigiditas eius.

De cura febris phlegmatica.

Curatio quidẽ huius febris, ſi uerſaliter in principio ſuo, poſt tres aut quatuor dies, eſt cum rebus que ſubtilianſ & incidunt, ſicut ſe canabin & quę prouocant urinam. Et oportet ut exhibeantur in hac febre ea que ſeniunt uentrem, & ſit ſtudium ad os ſtomachi. Iam enim diuimus qd proprietas huius febris eſt, ut ſit cõ dolor ſtomachi, nam plurimum quod in eo aggregatur eſt iſte humor phlegmaticus. Quare oportet ut ſit ſtudium in eo, propie in hora difficili febris, (uel ſecundum aliam literam, proprie in hora ſtutus), quoniam in hac hora quando materia eſt digeſta neceſſaria eſt euacuatio eius cõ uomitu & ſolutione nentis, & cum emplaſtris confortantibus. Et hæc omnia quando non admiſtrantur ſecundum quod oportet, tunc emplaſtra & alia, lædunt & contrariantur ſtomacho. Curatio autem bona ad hæc febrem, à principio uſq; ad diem ſeptimum, eſt cum geleniabum cum aqua calida ſolum. Sed poſt hũc diem, ſcilicet in octauo, oportet ut miſceatur cum geleniabum aliqua ex medicinis, quę confortant ſto-

machum & uentrem, & prouocant urinam prouocatione forti, ſicut maſtis & aniſum. Aut exhibeant iſte medicina ſingulariter, aut decoquantur ipſę, & exhibeatur decoctio ipſa cum geleniabum. Et oportet ut ſit quantitas geleniabum & medicinarum ſecundum ætatem & complexionem. Et eſt neceſſe ut ipſi prohibeantur à potu aquę frigide, quoniam ipſa ingroſſat materiam, & auget quantitatem eius, & propter hoc prolongat hæc febrem. Immo loco eius adminiſtra aquam calidam, proprie in principio paroniſmi, quoniam ſedat frigus accidenſ in hac hora, & ſubtiliaſ materiam, & ſedat ſitis ſi accidit eis, præcipue ſi accidit ſitis ex phlegmate ſalto. Et ſi patientes hẽnt febrem indigent leuitatione naturę, exhibeantur eis geleniabum & tereniabum cum aqua calida, aut cum aqua luble non bullita cum penidiſa, (uel ſecundum aliam literam, aut cõ aqua luble non calefacta cum penidiſa). Et ex hominibus ſunt, qui uolunt ut ponatur cum aqua luble medulla carthami, quoniam medulla carthami euacuat humorem phlegmaticũ. Et ex hominibus ſunt, qui exhibent uiolas ſiccaſ & zucharum. Et melius iſta eſt elyſter lenitius in principio, & poſt illo delyſter acetosus. Et ſi indigent aqua hordei, tunc decoquantur in ea de corticibus radicum apij, & radicum ſcniculi, pondus vnc. i. & exhibeatur cum tantumde ſecaniabin factũ cõ melle bono. Quod ſi aqua hordei accideſcit in ſtomacho eorũ, tunc oportet ut loco cuius exhibeatur aqua mellis decocta, quę nominatur Melicratum. Et ſi accidat patienti hæc febre uomitus, non oportet ut abſcindatur propie in principio paroniſmi, quoniam alleuiat materiam, (uel ſecundum aliam literam, quoniam reſoluit hæc febrem, & eradicat eam.) Quod ſi multiplicatur uomitus ita ut reſoluat uirtutem, ſeu debilitet uirtutem, oportet ut abſcindatur dãdo in potu miuũ cytomori & ſyrupũ granatorũ factũ cõ menta. Et ex quę conſerunt iuuameto maximo eſt iſte ſyrupus, cuius deſcriptio eſt hæc. Rec. grauiorum granatorum acetofũ panç acetofitatis dracũ. ouluris albi, & maſticis, mençana dra. 7. decoquantur cum dnabual libris aquę donec remaneat medietas, & coleatur, & ſetur ex eo in potũ parumper parumper, in hora poſt horam. Aqua autem prouocũ, & tamandorum, & rob̃ agteſte, & quę ſunt ſiſimilis, non oportet ut exhibeantur, propter ſuam frigiditatẽ in hæc feb. Quod ſi nõ accidat uomitus ab eapoliſione naturę, tunc oportet ut prouocetur cum arte, cibando infirmũ cum raphano inſuſo in ſyrupo acetofũ, & poſt dãdo ei in potũ aquam calidam, in qua decoctũ ſit anethũ, & calamenum, & aliquid de ſale petmẽtũ cum ſyrupo acetofũ, in quo iam fuit inſuſus rapha-

nus. Quumq; uomuerint, tunc masticeent aliquid de mastice, & aniso, aut menta, ut confortietur stomachus eorum. Quod si accidat eis post unum diei loda, tunc oportet ut detur eis in potu post unum diei, calamentum, ut resoluatur materia, (vel secundum aliam literam, tunc oportet ut fomententur seu embrocantur cum uapore aquae, in qua decocta sit camomilla, ut resoluatur materia, deinde ponantur manus & pedes ipsorum in illa aqua calida.) Et si oportet, stringatur crura cum strictione uehementi, ut attrahatur materia ad inferiorem. Et non oportet ut administretur oleum nisi cum hac materia permixta fuerit cholera. Nam si non fuerit illud, uel si non fuerit ita, & administretur oleum & res bumefactantes, tunc prolongatur febris, & augetur soda, & ingrossetur materia, & prohibetur eius resolutio. Et post hoc non potest considerare qualitate agnitudinis, & quantitate uirtutis. Si enim uirtus fuerit fortis, tubiliabimus cibum eorum, proprie si iam appropinquat hora status. Quod si uirtus fuerit debilis, & non expectat statum agnitudinis, tunc oportet ut isti cibentur post diem septimum, & ingrossetur regimen, & quum appropinquat hora status tunc ponatur regimen entium subtile, ut non occupetur uisura in digestione cibi, & ut ipsa non impediatur a pugna agnitudinis, seu a pugna contra agnitudinem. Quod si uirtus fuerit debilis, & status agnitudinis fuerit longinquus, tunc oportet ut administretur cibis mediocriter inter subtilem & grossum, & administramus ex eodem principio plus parumper, & in statu aliquid modicum, nisi si uirtus debilis, & status propinquus, tunc enim oportet ut resistatur ei ad quod magis exigit necessitas, uel ut resistatur ei quod est fortius & difficilius duarum rerum. Et ut studium in conseruando uirtutem. Si enim uirtus est debilis, & status agnitudinis est longinquus, tunc oportet ut incedatur uia media, ut non prosteratur uirtus, & non ingrossetur materia ex multo cibo. Post statum uero oportet ut augetur cibis, secundum quod ex eo est facta minnatio ante statum, & ut fiat permittatio ex paucio cibo ad multum parumper parumper, (uel secundum aliam literam. Post statum uero oportet ut augeat cibis, secundum quod ex eo est facta minnatio ante statum sicut. n. à principio agnitudinis cibis paulatim paulatim minnatur, procedendo ex multo cibo ad modicum cibum, uersus statum, similiter post statum oportet ut augetur cibis, paulatim paulatim procedendo ex paucio cibo ad multum cibum. Et oportet quidem ut sit hora cibi ante eradicationem febris, aut ante paroxysmum per tres aut quatuor horas, ita ut quando superuenit febris necurat stomacho mundo, (vel secundum aliam literam, ita ut quando superuenit febris, inueniat stomachum vacuum,) quoniam febris quando super-

uenit, & in stomacho fuerit cibus, tunc ipsa fortificatur & augetur ualde. Virtus enim debilitatur à mala complexionem febrili, & non alterat cibum, & quum non alteratur seu non digeritur cibus, tunc ipse efficitur materia febris. Cibus autem pauciorum hanc febrem sit aqua ciceris, & sicla, & asparagi elixati cum oleo abluti, aut muri. Potus autem eorum, si materia non fuerit multa grossa, sit secaliabin. Quod si materia fuerit congelata grossa, tunc secaliabin est nocuum malum, quare oportet ut potus sit aqua mellis, & aqua zuchari. Et si agnitudine prolongata fuerit, & pertransierit dies. 14. tunc detur in potu aqua endiuiae, & aqua feniculi, & aqua apij cum geleniabin, & trachelici de rolis cum aqua endiuiae, & cum melle colant. Et conferunt eis semper pilulas de aloë, & mastice, & pilulas de eupatorin, & pilulas alexandrinæ, aut pilulas bulis descriptionis, quæ cõserunt febribus phlegmaticis, & mûdicant caput & stomachum. Rec. biere picre dra. 7. turbit albi mûdi dra. 10. myrobalanorum nigrorum dra. 5. trochiscorum de rolis dra. 4. salis indi dra. 3. fucaba, bedauard, nomium ana dra. 4. anisi dra. 3. berbe eupatorii dra. 4. Summa medicinarum est numerus. 9. terantur, & cribellentur, & misceantur cum aqua apij bullita, enlata, & fiant pilulas, & dentur uni cuique bonini secundum quantitatem uirtutis. Quod si eradicator febris cum hoc, exhibetur hæc decoctio. Rec. radices apij, radices feniculi, radices, liquiritiæ rasæ, nomium ana dra. 10. radices squinanti dra. 7. anisi dra. 3. mastice, rosarum berbe eupatorii, absinthij, omnium ana dra. 7. bedauard dra. 5. fucaba dra. 4. passulorum euulatarum dra. 2. myrobalanorum citrinorum mundatorum à suis ossibus dra. 10. corticum myrobalanorum mundatorum nigrorum dra. 7. decoquantur cum lib. 4. aquæ donec remaneat lib. 1. enletur, & detur ex ea in potu tertia pars libæ cum vnc. 1. geleniabin aut setaniabin. Decoctione alia ad febrem antiquam. Rec. eupatorii dra. 20. fucaba, & bedauard, absinthij, & granorum seu seminum cappari, coriandrorum siccorum, omnium ana dra. 7. corticum myrobalanorum citrinorum, sumiteræ, omnium ana dra. 10. decoquantur cum lib. 3. aquæ donec remaneat libra, & enletur, & detur in potu tribus diebus. Quod si frigus fuerit uehementis, exhibetur hæc decoctio, cuius descriptio est. Rec. berbe eupatorii dra. 5. amens dra. 3. seminis feniculi, apij omnium ana dra. 4. corticum radicum tribulorum, radicum squillæ, omnium ana dra. 7. cherchean dra. 6. rosarum rubearum dra. 5. origani dra. 3. decoquantur cum lib. 4. aquæ donec remaneat libra, coletur, & detur in potu ex ea tertia pars libæ in ieiunio dum est tepida. Decoctione ad febrem longam cum qua est fe-

gus uehemens. Rec. origani, & amei, rofarum, omnium ana drach. 3. coriandri sicci drach. 4. calamamenti fluuiialis drach. 5. paffularum enucleatarum drach. 7. zinziberis drach. 3. decoquantur cū lib. 3. aquæ donec remaneat libra, & coletur, & detur ex ea in potu tercia pars libræ dum est calida. Et ex eis quæ sedant frigus uehemens in hac febre, est ut ponatur sub ipsis febricitantibus a qua bullieus, in qua decocta sint chamemilla, & melilotum, & maiorana, & quæ sunt his similia. Et quando inungitur corpus etiam cum oleo de secha, & alchaisum, aut oleo de costis & sedatur frigus. Et non oportet ut febricitantes cibentur cum pullis, neque cum frangulinis, donec declinet febris, & minoretur, nisi prosternatur & debilitetur uirtus. Quod si accidat in facie & in pedibus tumefactioni cachecticæ, tunc oportet ut dentur in potu ex istis trochiscis. Trochisci qui conferunt tumefactioni cachecticæ, accidunt in facie, ex febre phlegmatica cum frigore. Rec. anisi drach. 5. amygdalarum excoctatarum drach. 4. florū squinid. drach. 3. lacæ ablute drach. 5. reubarbari drach. 6. croci drach. 3. hieræ picæ drach. 7. succi eupatorii drach. 3. seminis apij, & feniculi, omnium ana drach. 3. mentæ siccæ drach. 4. spicæ, rofarum ana drach. 6. Summa medicinarum est numero. 13. tetantur, & cribellantur, & misceantur cum aqua solatri, & fiant trochisci, & dentur in potu cum aqua calida, aut cum decoctione radicum. Et si exigat necessitas, dentur in potu confectiones quæ sunt sicut diacurcuma, & omoriza, & diacostū. Et ex eis quæ conferunt iuuamentum magnum, sunt trochisci quos scripsit Gal. in libro decem tractatum, seu in libromiamir. Descriptio trochiscorū ex decem medicis, qui cōferunt febri phlegmaticæ antiquæ, & frigori accidenti, & tumefactioni cachecticæ accidenti in facie & manibus & pedibus. Rec. anisi drach. 4. succi eupatorii, folij indi, assari, spicæ, absynthij, amygdalarum excoctatarum, mastici, omnium ana drach. 3. seminis apij drach. 2. aloes drach. 4. terantur & cribellantur, & misceantur cum aqua apij, & fiant trochisci, & dentur in potu cum aqua repida, aut cum aqua feniculi, aut cum syrupo aceroso. Ex oportet ut scias, quod si hæc febris fuerit non febris phlegmatis puræ, & fuerit ei permixta putredine cholericæ citrinæ, tunc oportet ut caueas ab omni quod est uehementis caliditatis, seu ab omnibus ualde calefacientibus. Et in summa dico, quod oportet nitentur curatio uersus humorem qui dominatur. Si enim fuerit permixta cholera nigra cū phlegmate, & ingrossauerit ipsum, tunc oportet ut ceterum cum his quæ calefaciunt calefactione sufficienti sicut cum trochiscis de absynthio, cum aqua radicū, aut confectione de caulibus, (uel secundum aliam licentiam, aut confectione cū sulfure, aut confectione diapipeleon, aut theriacis,

aut diacymino, & quæ sunt illis similia.

De febre quartana. Cap. XV.

Super hac quidem febrem sumitur etiam significatio ex rebus præternaturalibus, nam ad ipsam præcedit aduentum aliarum febrium putridarum secundum plurimum, erraticarum seu permixtarū. Humor enim faciens accidere hæc febrem quartanam, non fit secundum plurimum, nisi ex aduisione aliorum humorum, scilicet ex aduisione sanguinis, aut cholere aut phlegmatis, aut melancholie naturalis. Vnde quicquid, noster humorum dum putrescit in febre putrida, adurit, & incineratur a calore febrili, unde ex putredine febrili maxime chronica, alicuius istorum humorum paulatim generatur & congeritur humor melancholicus, non naturalis, adustus, qui post aliquam istarum febrium multiplicatus mouetur ad porcedi nem, & causat febrem quartanam. Et si dubitatur, qualiter humor adustus, incineratus, a calore febrili putrido, possit post aliquam febrium prædictarū de nouo putrescere, & causare aliam febrem quartanam putridam, quum sit humor siccus, adustus, & incineratus, aptus resistere putredini? Dicendum quod in capitulo de tertiana, declaratum est, quod licet humor cholericus, & humor melancholicus, sint sicci in complexionem & in uirtutem suam, tamen in substantia sunt corpora fluida apta putrescere. Similiter dicatur quod licet humor faciens febrem quartanam, secundum plurimum, sit humor non naturalis, adustus, & incineratus a calore putrido febrili, & habeat complexionem & uirtutem siccam, tamen quia substantia huiusmodi humoris incinerati est corpus fluidum aptum putrescere, sicut humor cholericus, & humor melancholicus, naturalis, ut dictum est, ideo uerificatur quod febris quartana succedit secundum plurimum post febrem putridam, sanguineam, aut phlegmaticam, aut melancholicam naturalem, aut post febrem cholericam. Ex rebus igitur præternaturalibus sumitur significatio super febrem quartanam interpolatam aut continuam, quia huiusmodi febris secundum plurimum fit post alias febres putridas, erraticas seu mixtas, maxime post febres cholericas, & minus fit post febrem putridam melancholicam naturalem. Raro autem accedit quartana non post febres putridas alias, sed incipiendo ex putredine humoris melancholici multiplicati, aut ex egritudine & læsione splenis, qui non mundificat humorem melancholicum a sanguine, aut ex multiplicatione comestorum & potuum generantium humorem melancholicum, unde iste humor multiplicatur in omnis supra illud, quod est possibile spleni mandificare. Ex in principio quidem periodi quartanæ, accidit tremor fatigans corpus, & lædens ipsum

sum. Et tempus durationis paroxysmi quartanę si est pura, est. 24. horarum. Et sicum ea est permixta cholera citrina, minoratur tempus periodicius. Et si phlegma fuerit permixtum, augetur tempus periodi & prolongatur. Et oportet ut scias q̃ longitudo periodi: non est nisi propter grossitatem materię, & multitudinem eius quoniam ipsius resolutio est difficilis, aut quoniam uirtus est debilis, & non potest eam expellere, aut propter spissitudinem corporis, ita ut ab eo difficiliter resoluitur materia. Et quandoq; prolongatur paroxysmi etiam propter tempus, si cui contingit in febre quę sit in hyeme. Et quandoq; abbreviantur paroxysmi propter causas q̃ sunt istis contrarię. Et dimissio huius febris est. 48. horis. Et est corpus mundum, quia materia est sicut citius. Et est urina in inceptione sua subtilis, alba, cruda. Alba quidem propter humorē melancholicum qui non est digestus, subtilis vero propter siccitatem humoris melancholici qui non est digestus. In fine uero, & in hora declinationis, urina patientium quartanam, est urina nigra, quoniam ille humor melancholicus iam est digestus, & coarscitur per urinam. Et in summa dico q̃ urina istorum alteratur in hac febre ad spēs, diuersas secundū diuersitatē humorū generantium febrem, ita ut urina in eo in quo generata est febris quartana ex adustione cholę citrinę, diuersa est ab urina eius in quo generata est febris quartana ex adustione phlegmatis, & sic de alijs. Nam secundum diuersitatem speciei humoris melancholici, & secundum diuersitatem generationis eius & alijs humoribus, fit diuersitas urine in patientibus ipsam quartanā. Pulsus autem eorum in principio paroxysmi, est parvus, tardus, intersecus seu diuersus, & causa in hoc est frigiditas materię, & grossities eius, & hebetudo ipsius. In statu uero pulsus est magnus, frequens, & causa in hoc est uehementia uirtutis motus eius in illa hora. Et non inuenitur in hac febre æqualitas pulsus, nisi quando inuenitur aliqua quies. Diuersitas autem pulsus repetitur illic propter priuationem æqualitatis. Quando autem pulsus est uelox frequens, sicut fit in febre tertiana, tunc difficile est comprehendere modicum æqualitatis. Et in patientibus quidem hanc febrem, magnificatur spleen eorū propter multitudinem humoris melancholici, quoniam spleen est minera eius. Et color eorum declinat ad uiriditatem. Et cutis eorum est nigra, sicca, arida, propter siccitatem humoris melancholici. Et sudor in eis etiā minoratur. Hęc igitur sunt signa febris quartanę sumpta a rebus præternaturalibus. Signa uero sumpta ex rebus naturalibus sunt ista quę dicemus, quoniam hæc febris quartana secundum plurimum accidit habentibus naturam melancholicam, & igitur te consistenz, & in habentibus complexionem

frigidam & siccam, & etiam in habentibus complexionem calidam siccam, quando in eis aduruntur humores. Acrebus autem non naturalibus sumitur significatio super hanc febrem quoniam ipsa secundum plurimum accidit in tempore autumnii, & in regionibus & partibus frigidis siccis & in eis qui utuntur regimine sicco, & in eis qui assiduam cibaria generantia humorem melancholicum, sicut caro bouina, & pisces salini, & canles, & lētes, & caseus antiquus, & quę sunt illis similia.

De cura quartana.

CVra quidē febris quartanę in principio suo si sanguis fuerit dominans, fit cum phlebotomia basilicę manus sinistrę, aut uenę uigrę. Et si sanguis fuerit niger, oportet ut euacuetur sufficiens euacuatione. Si uero fuerit sanguis rubeus, clarius oportet ut abscindatur & nō moueatur, quoniam non securatur ab euacuatione huiusmodi sanguinis a casu uirtutis. Quod si sanguis non fuerit dominans, non oportet in principio euacuare humorem malum, indigestum, & inobedientem ad exitū & ad euacuationem, propter sui grossitatem. Si enim fiat illud cum medicina solutua uiolentando humorem prædictum ad exitum, tunc movebitur humor ille, & agitabitur, & non erit securitas etiam, quin medicina solutua bibita deficiat ab euacuatione humoris melancholici peccantis, & extrahat illud quod non oportet euacuare, unde legatur corpus duobus modis, quorum unus est quod euacuat illud quod erat conueniens corpori, secundum modum est quia approximat ei aliquid quod ipsi nocet. Post apparitionem autem signorū digestionis, oportet tunc exhibere illis febrientibus medicinas euacuantes humorem melancholicum sicut epithymum, & elleborus niger, & polypodium, & mirobalani nigri, & stoechas, & agarius, & lapis armenus, & sene, & quę sunt his similia. Et ei dantur isti cum cibis laudabilis humoris, ut ab eis uiuatur ille humor malus. Et quoniam humor melancholicus est frigidus siccus, oportet ut cibentur cum cibis calidis humidis, ut subtilient sua caliditate, & facilius faciant currere materias sua humiditate. Et cum hoc etiam oportet ut sint subiliatiui, resolutiui inflationum, lenientes naturam. Subiliatiui quidem, ut subtilient grossitatem humoris melancholici, resolutiui uero, inflationum ut resoluat inflationes & uentositates generatas ab humore melancholico in stomacho & splene. Sicut autem lenientes naturam, ut prohibeatur aggregatio superfluitatū in corpore. Si enim nō lenit natura cū cibis sicut oportet, administrabimus clysteres leues in principio, ad leniendum siccitatem humoris, & humectandum, & ad præparandum ipsum ad euacuationem,

tionem, deinde post illud administrentur elixires fortes, quoniam ad grossitatem illius humoris non sufficit operatio levis seu pauca. Et sit studium in eo quod facit humorem obedientem ad euacuationem, & administretur comestio altharich, & sinapis aliquibus diebus; non secundum viam cibi, sed secundum viam medicinæ subtilitatis sua qualitate grossitatem istius humoris melancholici. In substantia autem huius mundi comestorum non est iunamentum de quo sit curandum, quoniam humor qui generatur ex pisce salito, qui nominatur altharich, est melancholicus, quoniam piscis prædictus ex natura piscis est frigidus & grossus, & ex natura salis est siccus. Et secundum hanc semitam administrantur quandoque, sed raro, confectiones calidae, sicut cyminum, & diapipereon, ut sua caliditate subleuet humorem melancholicum. Et fiat illud non continue, sed diebus intermediantibus ut non resoluatur subtile & remaneat grossum, & etiam ut resoluatur residuum humoris melancholici, ita ut fiat fluidum & aptum effundi & euacuari cum lenitate seu facilitate. Et oportet ut istis administretur exercitium deambulationis & frictionis temperaturatum, cum huiusmodi enim regimine est possibile ut rareficetur cœcis, & subleuetur materia, & resoluatur pars eius. Balneum autem oportet ut caueatur omnino, aut minoretur ingressio in ipsum, quoniam accidit in balneo ut effundatur materia ad membrum aliquod, & accidet illi grossities & corrumperur, & etiam illud quod de ea est subtile, resoluatur in balneo, & quod est grossum lapidificabitur, sicut diximus. Et ille humor grossus perueniens ad porositates latas seu rarefactas ex balneo, oppilabit eas. Quando vero appropinquat status oportet ut administretur regimen subtile, & paucitas motus, ut non abscindatur seu impediatur propria natura. Et assidue ut administratio medicinarum quæ euacuam humorem melancholicum, quoniam ipse iam est digestus, & subtilizatus, & præparatus ad euacuationem. Et oportet etiam ut tunc exhibeatur theriaca, quoniam ipsa subtilizat, & si fuerint aliquæ reliquæ humores, resoluunt & euacuant eas. Exhibeantur medicinæ similes istis, sicut medicamen de assa foetida. Verum oportet ne scias, quod si erimus auri exhibere has medicinas antequam appareant signa digestionis, & antequam adueniat status agitudinis, tunc deficiet ab euacuatione humoris, & agitatibus materia solum, & effundetur & curet. Quod si effundetur, permiscebitur cum humoribus bonis, & alterabit eos, & convertet ipsos ad sui naturam. Et si fiet hoc in membro vno solum, tunc accidet magnum nocuentum, & fiet febris magna, difficilis, malæ speciei. Et si materia ista melancholica potest in duobus membris, tunc ex ea fiet inflammatio duarum

quartanarum. Et si potest in tribus membris tunc fiet res febris quartana. Et oportet ut in principio & in fine huius febris, sit sollicitudo proprie cum his quæ conveniunt hepati & spleni. Hepati quidem, quoniam ipsum est causa inflammationis & adustionis sanguinis, spleni vero, quoniam ipse recipit fecem illius quod inflammatur & adunetur. Et oportet ut exhibeatur in principio continue secaniabin, quoniam ipse confert istis duobus membris, scilicet hepati & spleni. Post hoc autem, scilicet in fine quum digesta fuerit materia, exhibeantur isti trochisci, qui conferunt hepati & spleni, in febre quartana facta ex adustione cholere citrinæ & sanguinis.

Rec. succi eupatorij drach. 3. scolopendriæ drach. 5. raucedeni, & laccæ, omnium ana drach. 4. spodij, drach. 5. feminis citrulli, feminis portulacæ, omnium ana drach. 4. rosarum, berberis, omnium ana drach. 7. spicæ drach. 4. feminis cuscute drach. 6. anisi, & feminis apij, & feminis feniculi, omnium ana drach. 3. radicis capparium drach. 4. croci drach. 2. granorum alben drach. 4. feminis endiuivæ, feminis cucumeris, omnium ana drach. 2. terantur & cribellentur, & commisceantur cum aqua apij, & fiant trochisci, qui exhibeantur cum secaniabin, aut cum aqua feniculi & cadinæ & cuscute. Et quandoque iuvantur isti etiam cum trochiscis absynthij, & cum administratione vomitus. Et precipue infirmo ut utatur ieiunio in die paroxysmi, & proprie ei cuius febris est ex adustione phlegmatis, & ei cuius febris est ex adustione sanguinis. Quandoque confert ieiunium quoniam sanguis propter suam humiditatem indiget ut subtilietur cum ieiunio, & cum his quæ sunt illis similia. In eo autem cuius quartana est ex adustione cholere citrinæ, non oportet ut administretur ieiunium nisi prolongetur aliunde. Si enim prolóngatur & apparuerint signa humoris frigidi grossi, oportet exhibere in potu istam decoctionem, quæ confert febre quartanæ factæ ex adustione phlegmatis, & datur in potu post digestionem. Rec. feminis apij, anisi, cordonum, omnium ana drach. 5. ameos drach. 4. origani (sylvestris) drag. 7. radicis theribeeam drach. 3. passulorum enucleatarum drach. 30. eupatorij, drach. 10. calamiti montani drach. 10. (vel secundum aliam litteram drach. 5. decoquantur cum 3. libris aque donec remaneat libra, & detur in potu ex ea tertius pars librum est tepidum, non in die paroxysmi, immo administretur in die paroxysmi vomitus, & ieiunium post ipsum. Et quandoque iuvantur etiam iuvamento magno in hac febre quando prolongatur, cum hoc medicamine, cuius descriptio est. Rec. ameos drach. 10. carui drach. 7. piperis drach. 3. assæ fetidæ drach. 5. zinziberis drach. 4. calamiti montani drach. 10. cassiæ lignæ drach. 5. spicæ drach. 10. terantur

terantur, & cribellentur, & commisceantur com-
melle, & exhibeantur ex eo pondus drach. i. com-
aqua apij & fœniculi. Et post hoc etiam exhi-
beantur istæ pilulæ in qualibet hebdomada qua-
rum assumptio valde confect quartanæ, quan-
do exhibentur post digestionem, quarum de-
scriptio est. Recip. epithymi drach. 10. ameos
drach. 8. anisi, feminis apij, feminis fœniculi,
omnium ana drach. 3. turbit drach. 10. salis indi-
dra. 5. polypodij dta. 7. hieræ picræ dta. 10. aga-
rici dta. 8. terantur medicinz, & misceantur cū
hiera picra, & conficiantur cum aqua mentæ, &
fiant pilulæ, & detur in potu ex eis. drac. 1. sem-
cum aqua calida, in principio noctis. Et qui-
dam sunt qui administrant piper nigrum solum
& quandoque administratur hoc in hora decli-
nationis. In principio autem ægritudinis, opor-
tet cauere ab administratiōe medicinarū calida-
rum, ut nō duplicetur febris, sicut diximus ante.

De febre hemitritæa. Cap. XVI.

Hæc quidem febris non nominatur bemi-
tritæa, nisi quoniam eius medietas est febris ter-
tiana, & altera medietas est febris phlegmatica,
quare efficitur hæc febris composita ex illis dua-
bus febribus. verum una ipsarum est exterius,
scilicet tertiana, & altera interius, scilicet phleg-
matica. Et hæc hemitritæa est vera, puta. Et non
nominatur bemitritæa pura, nisi quando una
illarum duarum febrium est interius, & altera ex-
terius, quæcunque ambarum fuerit, tertiana aut
phlegmatica. Quoniam si omnes simul fuerint
exterius aut interius, tunc ista febris quando
componitur secundum hunc modum, non nomi-
natur hemitritæa, sicut dixit Hippocrates in
primo libro epidimix, quod hæc febris non tol-
lerat periodos seu dimissionem febris, inquan-
tum ipsa est continua, secundum uero modum
alium ipsa tolerat periodicationem seu dimis-
sionem febris: (vel secundum aliam literam, si-
cut dixit Hippocrates in primo libro epidimix,
quod hemitritæa febris non separari penitus,
id est, quod ipsa in quibusdam dispositionibus
est continua, & in quibusdam alijs dimittit, &
non est continua.) Huius autem febris, scilicet
hemitritææ, tres sunt species. Aut enim in
ea dominatur cholera citrina: & apparent in ea
istæ significationes cholæræ, scilicet tremor ac-
cidens habenti eam subito, & vomitus cholæræ
citrinæ, & vena cholerica, & amaritudo vehe-
mens, (vel secundum aliam literam, & calidi-
tas uehemens.) Aut phlegma dominatur in ea,
& apparent signa phlegmatis ita ut manus & pe-
des infrigidentur, & pulsus est tardus diuersus.
Aut duo humores in ea sunt æquales, & ap-
parent signa, quæ ad se inuicem non superantur in
significando magis unum duorum humorum

quam alterum. Et hæc est hemitritæa pura. Dux
autem aliz species, scilicet illa species in qua do-
minatur cholera citrina, & species altera in qua
dominatur phlegma, non sunt ambæ hemitritææ
purae. Et hæc quidem febris die uno est difficilis
uehementis, & die altera est quæta. Et causa in hoc
est quia in die primo sunt duæ febres, scilicet feb-
ris quæ est ex cholera, & febris quæ est ex phleg-
mate. In die uero secunda est febris una tantum,
scilicet phlegmatica, & ex causa huiusmodi feb-
ris, phlegmatica est leuior illa quæ fuit in die
primo, in quo erant duæ febres. Et si quæretur,
quare hæc febris nominatur media tertiana, &
non nominatur media phlegmatica. Dicendum
quod nomen quando est compositum ex duo-
bus nominibus, scilicet ex eo quod est notum, &
ex eo quod non est notum, tunc denominatur ex
illo quod est occultum, sicut dicitur de compo-
sito ex morbo accidentali & homine, quod ip-
sum est ægrum secundum medietatem, & denomi-
natur à nomine morbi occulti, non à nomine ho-
minis noto. Similiter etiam hæc febris non de-
nominatur media phlegmatica, quoniam febris
phlegmatica continua est manifeste nota, tertia-
na uero quia est cū paroxysmis, nō est ita mani-
festa. Et propter hæc causam hæc febris nomina-
tur media tertiana, ab illo quod est occultum,
non ab illo quod est manifestum.

De cura febris bemitritææ.

Oportet ut curetur hæc febris bemitritæa se-
cundum humorem dominante in ea. Si enim ista fe-
bris fuerit pura, in qua non dominatur humor chole-
ricus, neque humor phlegmaticus, tunc curabi-
mus eam cum rebus permixtis. Quod si in ea cho-
lera citrina fuerit dominans, & infirmus indigeat
lenitione naturæ, tūc oportet lenire naturam cū
aqua prunorum tamarindorum, & tereniabini,
& castia fistula, & dare in potu post lenitionem na-
turæ, aquam hordei, & syrupum acetosum zuc-
charinum. Et cibentur patientes cum mense
& cum attriplicibus, & spina chijs. Quod si phleg-
ma fuerit dominans in ea, & necessaria fuerit le-
nitio naturæ, oportet ut dentur eis in potu aqua
labieb cum geneliabini, & post illud exhibeantur
geneliabini cum aqua masticis, & trochisci de ro-
lis etiam cum aqua fœniculi & apij. Quod si duo
humores fuerint æquales, tunc oportet ut sit cu-
ratio cum curatione media, non accidat infla-
matio ex rebus calidis, & non fiat ingrossatio
cū rebus frigidis. Quod si dominatur una duorū
humorum, tunc oportet ut curentur cum
his quæ conueniunt illi humori.

De febribus quæ nominantur empialæ & lipariæ.

Cap. XVII.

Phlegma quidem nitrum, quod est frigidus
E e de

de specibus phlegmatis, quandoque dominatur in toto corpore, aut in aliquo membro. Et quod ex eo dominatur in toto corpore, aut totum putrescit, aut non putrescit aliquid ex eo, aut putrescit quædam pars eius, & quædam pars eius non putrescit. Quod si totum non est putrefactum, generat in corpore frigus uehemens & patiens ipsum non calefit absque febre. Quod si totum iam est putrefactum, aut est putrefactum extra uenas & arterias, & tunc facit febrem phlegmaticam periodicam: aut putrescit intra uenas & arterias, & tunc facit accidere febrem phlegmaticam continuam. Quod si pars eius putrescit & pars eius non putrescit, tunc facit accidere febrem quæ nominatur empialos, & patiens hæc febrem sentit in interiori corporis sui frigus, & extra corpus sentit calorem. Et causa in hoc est, quoniam calor quoniam putrescit, facit accidere caliditatem & inflammationem, & pars phlegmatis quæ non putrescit, facit accidere frigus. Urina autem habentium hanc febrem, est minnris caliditatis quam utina habentium febrem quotidianam phlegmaticam, & est urina grossior quam illa: quoniam materia faciens hæc febrem, est grossior quam materia faciens febrem quotidianam. Et pulsus ipsorum est tardus, diuersus plus quam sit illa febre. Et quandoque paroxysmat omni die, & quandoque omni tertia die, & quandoque omni quarto die. Et non significatur super has febres, nisi ex significationibus earum, & non ex paroxysmis ipsarum. Et similiter etiam dicendum de reliquis febribus, ignorantes enim significant super febres ex paroxysmis earum. Et quandoque est paroxysmus huius febris scilicet empiales quatuor horis, & quandoque septem horis, & quandoque 24. horis, & quandoque pertransit hunc terminum secundum grossitatem materię & multitudinem eius, & spissitudinem corporis illius infirmi, & raritatem eius, & debilitatem nutritis, & fortitudinem eius, & secundum tempus anni est longitudo & breuitas paroxysmi. Et hæc quidem febris scilicet liparia, non prologetur tempore, quoniam natura secundum plurimum nunciat eam, & destruit ipsam. Et quandoque moratur .30. diebus, aut minus aut plus. Febris autem quæ sit in omnibus quinque diebus, aut in omnibus septem diebus, aut in omnibus decem diebus, sit ex phlegmate grosso, aut ex cholera nigra, & periodi eius præcedunt aut postponuntur secundum grossitatem materię facientis ipsam febrem, & urina & pulsus sunt secundum materiam ex qua accidit hæc febris. Feb. aut quæ dicitur liparia, sicut dicitur a Gal. est febris in qua infirmitas extremata est membrorum, & quod apparet de corpore, & profundum corporis & uiscera aduruntur cum sit uehementi, & asperitate linguæ. Et pulsus istorum est paruus, debilis, secundum cali-

ditatem quæ iam est in profundo corporis. Et liparia quidem est contraria empialos, quia in empialos frigus est interius, & caliditas exterius: & in liparia est contrarium illius, & aduentus quidem lipariæ quandoque est ex cholera citrinis, grossa, non pura.

De cura empialos & lipariæ.

Oportet ut in hac febre solliciti sumus de stomacho cum vomitu, deinde cum potionibus quæ infrigant & mundificent stomachum, & prouocant urinam: sicut aqua sceniculi & apij cum geneliabin & secaniabin. Et detur in potu infusio aloes, & hiera picra, & pilulæ de eupatorio, & pilulæ de aloecum mastice. Et administretur clyster in quo sit quædam acuitas, ut abstergat humorem grossum, sicut clyster factus ex camomilla, & melliloto, & medulla carthami, & centauria minore, & fursure, & anetho, & cymino, & almuri, & melle. Et cibentur cum aqua cicieris, & almuri, & cymino, & oleo amigdalorum dulcium, & sicla, & asparago. Et confertur in principio lipariæ geneliabin cum secaniabin, & in fine exhibeatur infusio aloes, & hiera picra, & aqua sceniculi conditiæ & apij, & etiam trochisci de rosâ & mastice. Et uniuersaliter oportet ut illud quod administratur in hac febre scilicet liparia, sit minoris caliditatis quam illud quod administratur in febre empialos.

De febre quæ fit cum communitate membri dolentis.
Cap. XVIII.

SI accidunt febres ex dolore alicuius membri, sicut hepatis, & splenis, & lateris, & renum, aut cum læsione cerebri, oportet ut conuertatur studium totum ad membrum infirmum, ita ut mundificetur. Quum enim abscinditur causa faciens ægritudinem, abscinditur etiam effectus. Si enim non abscindimus superfluitates seu putredinem earum, non destruitur febris, quoniam causa faciens eam est sua permanens. Et in summa dico quod oportet ut sit resistentia & intentio nostra, ad causam facientem febrem plusquam ad ipsam febrem.

De syncope. *Cap. XIX.*

SYNCOPE est res una, & est resolutio spirituum uitalium subito. Cause autem eius sunt multæ, & unicuique earum est cura proportionata conueniens, quare nunc intendendum est in hoc secundum quod potest homo, ut quando accidit hæc syncope subito, sit possibile nobis resistere ei, uel succurrere ei. In illis igitur in quibus accidit syncope propter cholericam passionem, aut solutiōnem uentris, aut propter aliquam euacuationem superfluam, seu egredietem tertium

minum æqualitate, oportet rotare seu aspergere super faciem eorum aquam frigidam, & confringere osium eorum, & fricare os stomachi ipsorum, & mouere eos ad uomitum cum iotromissione digitorum aut peno, & stringere manus & pedes eorum strictura forti. Quod si fuerit euacuatio per inferius, stringantur manus: si uero fuerit euacuatio per superius, stringantur duo crura. Et quoadque iuuantur isti quibus accidit huiusmodi sinecope, cum potu uini permixti cum aqua frigida. Balneum autem est conuolens eis quibus accidit sinecope ex diarrhoea. Illis uero quibus accidit sinecope causa eruptionis sanguinis, aut causa sudoris supra mensuram, balneum est contrarium ualde, quoniam ipsi magis indigent in frigidatione, & stypticatioe magis quam calefactione & mollificatione. Erit uinum quidem permixtum confert eis ualde, præcipue quando fuerit permixtum cum aqua frigida. Et isti quidem non indigent ligatura seu strictura membrorum suorum, neque uomitum neque aliqua specie motus, sed oportet ut quiescant omnino. Et admioistretur res quæ infrigidant & stypticant, & sedent uel iaceant in domo in qua flat eorum frigidus. Et alteratur aer domus ad qualitatem frigidam stypticam, sternendo in ea myrrum humidam, & rosas, & extremitates uitis. Illorum uero quibus accidit sinecope propter repletionem, oportet fricare manus & pedes frictione uehementi, & calefacere eos, & stringere ipsos, & prohibere ipsos à cibo & uino & à balneo, & si isti contenti aqua mellis, in qua iam decocta sint calameorum montanum aut campestre, aut hyssopus, aut hæce. Et detur eis in potu etiam syncope acetosus. Et similiter etiam curetur mulieres quibus accidit sinecope propter matricem, uerum non exhibeatur eis syrupus acetosus, immo stringantur pedes eorum & fricentur, & applicentur uentose super duo crura. Illis uero mulieribus quibus accidit sinecope ex euacuatione multi sanguinis à matrice, ponantur oculoæ sub mamillis. Illis uero quibus accidit declinatio matricis ad superius, aut ad unum duorum laterum, applicentur uenose super inguina, & super coxas, & fac eas odorare odores scitridos, & fac suppositoria odorifera, ut perueniant ad matricem illud, quod cum odore bono est calefactum resolutum. Quod si accidat sinecope ex debilitate stomachi, oportet ut emplastretr membrum cum emplastro confortate ipsum, sicut emplastrum factum ex albas, id est, da dylis non complete maioris, & uino, & sauehbordei, & croco, & aloë, & masticæ, & inongantur cum oleo absinthij & masticæ, & cytonijs, & oleo nardino, permixtis cum cera & uino. Quod si acciderit in stomacho caliditas & inflammatio, tunc permisce cum istis quedam res quæ in-

frigidant, sicut rasura cucurbitæ, aut succus lactucæ, aut solatri, aut agrestis. Et quandoque confert eis iuuamento magno fricatio manuum & pedum, quoniam quando curantur hac curatione, bonæ sunt dispositiones eorum ualde. Quod si accidat eis ex his rebus inflammatio, oportet ut abluantur cum aqua dulciterpida statim. Illis autem qui sentiunt frigus, oportet ut exhibeat medicamentum factum ex tribus piperibus, & piper de per se, & syrupus de absinthio. Illa uero quibus accidit sinecope propter humores malos mordicantes, cogantur uocemere cum aqua calida sola, aut cum quibusdam oleis. Quod si uocemitus est eis difficilis, tunc calefant primas partes stomachi & manus & pedes. Quod si uomitus non est eis facilis cum hoc, tunc moueatur uomitus cum intromissione digitorum aut penæ. Quod si non possit etiam cum hoc uomere, tunc datur eis in potu oleum calefactum multis vicibus, quoniam hoc quoniam datur in potu, mouet uomitum & lenit oaturam, & lenitioratur & confert istis ualde. Quod si non lenitur natura, oportet ingeiri ad leniendum eam cum suppositorijs impositis inferius, & quum feceris hoc & iuuantur cum eo, tunc detur in potu aliquid de floribus absinthij decoctis cum aqua mellis, & ingenietur ad confortandum stomachum cum omni re ad hoc præparata, administrando eam iterius & esurieris. Et non oportet ut admioistretur res styptice in principio, sed post euacuationem malorum humorum. Quod si causa sinecopis fuerit phlegma multum frigidum, aggregatum in stomacho, tunc eius cura est cum embrocatione olei de absinthio, deinde post illud exhibeatur aqua mellis, in qua decocta sint hyssopus, & quæ sunt his similia, & detur eis in potu secaniabin & piper. Et oportet ut omnes species curatiois sint calefacientes, subtiliantes, & incidentes. Quod si accidat sinecope quibusdam hominibus ex frigore uehementi, oportet ut curetur cum omni specie eorum quæ calefaciunt, & detur eis in potu uinum permixtum cum aqua calida, & ebibentur cum cibis calide facientibus, & fricentur uis inungantur prope ignem, & curentur cum contrario cuius quo curatur sinecope accidens a calore uehementi. Et illi quidem cui acciderit sinecope uehementes ex aere calido, & angustis, propter longam moram in balneo, oportet ut succurratur dando in potu aquam frigidam, & cum aspiratione aeris frigidi, & cum extinctioe, & ut iceant in locis in quibus flat uentus frigidus, & fricentur stomachi ipsorum, uel ongaotur stomachi ipsorum, deinde post illud exhibeatur cibus & potus. Et si causa sinecopis est magnitudo apostematæ calidi, aut malicia, seu malignitas febris, & accidentia mala in principio periodi febris, oportet quædo manus & pedes infrigidantur ut calebant,

& fricentur fricatione uehementi, & prohibeantur eos à somno & à cibo & potu. In eo autem in quo timentur syncope ex siccitate complexionis sue, tunc præcedat cibatio ante paroxysmum cum pane infuso in uino, & sit illud modicum, quia si exhibeatur ex eo multum, aut comedatur aliquid difficilis digestio, tunc syncope augmetatur & fit fortior. Quod si cā syncopes fuerit neuentia lætionis in aliquo membro principalit, tunc detur in potu secaniabin, aut aqua melis decocta cum calamento montano, & cibatio eorum sit cum cibus incili uis, & fricentur etiam manns istorum & pedes eorum & stringantur, & administrentur etiam ea quæ prouocant urinam, & quando curantur cum hac cura & iunantur, tunc detur eis in potu uinum album antiquum stypticum in parua quantitate. Quod si accidat syncope quia causa temporis enacuationis subita, tunc confortetur infirmus cum odoriferis bonis, & cibetur cum sorbitionibus facili digestionis. Et si accidat syncope ex neuentia tristitiam & timoris aut ex delectatione & gaudio, & similibus animæ passionibus subito aduenientibus,

tunc confortetur infirmus cum odoriferis, & cum retentione anhelitus, & cogeeos uomere. In illis uero in quibus accidit syncope ex dolore colico forti & difficili, & ex punctione nentris, aut ex dolore membri alterius, tunc syncope sedatur cum emplastrationibus & fomentationibus, & cum fricationibus suauibus.

De illis quorum uirtus debilitatur cum sudore.

Cap. XX.

Oportet ut prohibeatur sudor illorum, quorum uirtus resoluatur ex multo sudore, cum rebus quæ exsiccant & stypticant, sicut lutum salsum, & merdæ fangi, & gallæ, & amyllum, (uel secundum aliam litteram, & gallæ & alumen,) & folia myrthi, quando teruntur & puluerizantur super corpus. Ant inunge corpus eorum cum oleo florum uitis, aut oleo rosato, aut oleo de cytoniis, aut oleo arboris masticeis. Et iunantur etiam cum minnto thoris, quando teritur & puluerizatur super corpus.

H A L Y A B A T I S

D E F E B R I B V S

L I B E R



De medela febris quæ fit ex calore solis.

Cap. I.



Quia quæ oportuit ostendimus & explanauimus de simplicium uirtute medicaminum ac uirtutis singulorum in unaquamque infirmitatem quidque in corporibus operentur atque hæc recta quæ sit semper à medicaminibus ad ea quæ conferunt in morbis iam nonne hoc in sermone incipimus uiam quæ ad curandos accedimus morbos & passionem eaque quæ profunt illis medicaminum regionibus & ciborum. Disputauimus autem de his secundum dispositionem & ordinem

quæ eorum signa sensui sunt manifesta & causas retulimus, principio namque de signis morborum communium, quæ & in manifesto erant corporis & intimo febrium, scilicet & apostematum disposuimus incipientes quæ à febribus, de febre proposuimus diei, deinceps alias quæ sequuntur febres. Dicimus ergo quoniam diuersitatum febrium diei communis medela sit rebus causis aduersantibus à quibus factæ sunt. Quod cum ita sit diei febris, quæ fit ex calore solis & uenenis medela est in frigidis scissione locis quæ cōbesserit aquilo ad odoratum quæ sandali aqua rosæ, cāphoræ, nectusaris, rosarum. Et quoniam maior quæ hæc patiente urget febris læsio in capite est aqua, rosæ, per caput eius fundenda est oleum rosæ, acetum quoque cum uine refrigeratum sit quæ acetum, aquæ quoque quartæ pars.

ea pars; oleum autem tanquam eius medietas, hæc funde super patientis capiti pedetentim pluribus & non semel vicibus utique dum hæc facias manus tua in capite illius subleuata: de hinc autem in hac proijcies aqua rosæ acetumque; & oleum saualum al. infundeque eatendes frigidum, quem & super caput plus eatendes frigidum, infundes autem panniculum hunc sæpius & appones nec cessabis donec ab eo febris cessauerit aut inclinetur. Cum autem inclinata fuerit medio illum inducas balnei aquamque super eius caput & omnia membra funde suauiter & temperata infusione interpolata quo corpus eorum humectetur & dissoluatur: ut vero si decoctionis in ipsa aqua violæ, ficcas ninfar & camomillæ perfectius erit & utilius corporis humectationi cum ex solis calore ac venenis siccitatem sit laceratum corpus, ideoque ergo oportet superfundere capiti parum olei violæ aut ninfar. sed & seminis cucurbitarum oleum post balneum quo humectatione corpus humectetur: egressus vero balneo quiescat hora accipiatque refrigerationem, aquam cum zaccara si quidem habuerit sinendum infusumque refrigerata cum niue aqua: panem tritici dabis illi siue infusum lotum aqua calida refrigeratumque uiue eum zaccara mundissima, aut acetum cum medulla conditum cucumeris & arfune gignant portulaca aut cucurbitarum mezanrum & masi sine omnibus condimentis calidis. Si autem perfecte alicui se fructum crediderit dabis ante prandium elelegi granata pruna, frigoris niue affecta. Somnum indocas post prandium quietemque, abibit enim omnino hoc febris regimine.

De medela febris diurna qua fit ex densatione & frigore. Cap. II.

AT vero quando diurna est ex frigore & niue & densatione feb. patientem in loco oportet esse secreto & parum humentii lenibusque operiri vestibus & amictu fricetur eius corpus frictione tenui donec inclinetur febris, qua inclinata introducat in balneo moramque in eo faciat, corpus eius temperatus fricetur quo dilatentur pori dissoluaturque qui artatus est in eius corpore, calor à frigore utatur post sudorem cum frictione thetri oleo modico aut arietis aut susanti aut acuan. Egressus operiatur calefactioris optimis per horam reficiaturque iam tunc subtilibus ut pollis tranquillinis similibusque cum epispadago conditis aut zirabago uel etiam coctis aut potellatis odoret marcesum & nemanion sibi, porrigitur illi rihani parum uini, si quidem parua est densatio ut aperiatur eius calor pori dissoluanturque inclusa. Si autem magna est nullo

modo nimum apponendum est, uinum enim ad aperiendum poros fortius densatos non sufficit. liquescit autem humores & dissolutos ad poros mittit nec potest emittere sitque opilatio. Si ergo patientem hoc regimine reueris eruntque alique febris reliquie appones solutionem in alias in secundo inducere balneo mane, disponasque omni ordine disposito regimine. At uero si quando fuerit pororum densatio de aluminosis uel alijs arctantibus aquis, hoc eodem regendæ regimine uis quod frictione anphiori oportet uti cum oleo plurimo uiolato aut ninfar oleoque seminum cucurbitæ & cacrelegæ in balneo plurimæque aquarum suauium ac superfusione tepidarum. Si autem hæc diffatur febris tempore, sitque principium eius tanquam continuæ febris, timeturque ne in putridam conuertatur febrem, huius oportet accelerare medelam ut ait Gal. ostendit enim huius sæpius in continuam fieri mutationem. accelerandum ergo phlebotomum si nirtus ætas, præsensque non prohibuerit tempus, auferatur sanguinis quantum opus est quantitas, & si quidem fortis erit uirtus eo usque educes donec defectus eius appareat, huius namque dominus febris magis eget phlebotomia quam ceterarum febrium eo quod conclusæ superfluitates dissolui prohibeantur. hæc uero cum feceris patientem cum aqua rescicia hordei in qua feniculi semen, corticesque eius radices decoctæ sint, tribus autem de hinc aut. 4. horis squingibin porriges aut absinthij sirop. & limæ quæcunque hoc præsens tempore sint. hæc etenim ad aperiendam opilationem incidendosque humores uiscosos uile est regimen qui in corporis inclusi sunt interioribus eosque purgandos. Non oportet autem patienti opilationem aperiendā aut euacuantia dari, non enim securus fieri potes dum pori aperiuntur educunturque meatibus humores educantur quod quidam humorum qui sunt in uenis insignanturque meatibus & ingereant aut sua copia aut grossitie aut uiscositate maximeque si per arctos sit transitus meatus: siquid forior opilatio ac difficilior, proculque dubio putredinem patiuntur febris. Agnosceas autem opilationis quantitatem ex febris uirtute & quantitate. Cum ergo patientem ut imperatorem est euacuaueris phlebotomo: & quæ dicta sunt porregeris die primo: secundaque squingibin propia aut limne, uel absinthij sirop. cibabis illum post hæc duabus aut tribus horis hordei aqua cuius ipsos faria aut rescicias illum eum mezzaro cum feniculo parato siue aqua hordei. deleabitur autem sorbicuacula de maraigne in alias muraze parata. Facto autem tertio die cum intellexeris febrem manifestissime minui nec potest tendere

Et 3 aliqua

aliqua putredinum signa pulsus: sed nec vrina opilationis geret significationem: priuationi sq; maturationis tunc oportet patienti ingressum imperes balnei: fricetque corpus his quæ elimât purgant & aperiuut vt hordei farina, & fabarum assunancem spahanicæ & neiranicæ. Si autem perpendens, feb. aliqua augmentari vori balneis ante illum impera minusque quod in tere-rit. 4. sint horz. Egreddenti squingibin propina à balneo aut limue vel abstinthij sir. cibusis que bis quæ hesternâ refecerat nec aliquid concesserit vinit confortat enim febris. vt dies fiet! quarta certumque erit expulsa & vrina quod aliquâ superint calorâ signa his cisdem regas regimibns. febris enim omnino cadet & deficiet. die vtro quinto squingibin porrigere & iuleb pul- lisque reficias & tranquilliois similibus que in consuetâ reducens illum cibaria pedetentim.

De diurna feb. medela qua fit ex cibis potibus vel acutis medicaminibus. Cap. III.

Sequitur de diuersitatum diurnæ febris me- dela quæ fit ex calore corpori ab interioribus su- peruenientibus. Diximus autem in octauo pri- mæ partis sermone libri huius nostri enim de cau- sis febrium signis que disputaremus ac ostendi- mus, quoniam quæ ex huius fuerit febris & aut ex qualitate eorum habent fieri quænamadmodum quæ ex ciborum sit & potuum acmine febris, quædam autem ex quantitate sicut quæ ex copia fit prandij quæ scilicet est febris ex ciborum etiâ stomacho putredine & diartia. Et febris quidē quæ fit ex ciborum porrectione acutorum me- dela est patientis accubatione in locis frigidis. Si quidem tempus hæc æstas est quibusque sit aquilonis uentus. fiatque cum flabello ventus la- halum seminis psilij dabis illi & sucum quoque seminis portulacæ cum contritum diligenterq; in aqua fricatum fuerit ac colatum cum iuleb & aqua granatorum ac aqua cum niue refrigerata propina quoque aquam bordei cum zaccara & amigdalâ oleo dulcium cibus sit mezarium cū cucurbitis paratum & spinachia attriticibusq; cum oleo amigdalâ dulcium & oleo sisami recē- ti & si uolueris bordei aut tritici suicū in osnum aqua fri. & zaccara & dimisis nocte in lababo seminis psilij & granorum granatorum citonio- rum & zaccara alba aut iuleb & oleum cucurbi- bitæ seminis aut amigdalârum duleiorem. Si autē sit hyems lætæneas in aliâ bulbolengetas come- dant conditas cum intiba ac hasbera sitque eius cubatio in temperati aeris loco. At vero si æstas portulacas dabis cucumeris citruli medul- las: granata sugat arfunega pruna comedat per- sica matura & lenia epithimet stomachum & hepar cum sandalo & aqua ro. & ceroto refrige-

ratio quod aqua ro. & aqua coriandi fit ac la- tuncarum & semperuiuæ & aqua portulacæ & uiol. & ros. & alba cera si iuxta quod opus est hu- ius domini febris non uinum tangat, balneum quæ non intret. Quando autem hæc febris ex vi- ni potu fortis facta est patienti granatorum a- quam propina mulorum aut heserem sir. aquam quæ niuis: extrema ipsius fricentur, quiescat & dormiat. Cum autem inclinata fuerit. f. balneū uisitet: super caput eius aqua roretur multa tem- pore. odoretque & trabat naribus uiol. oleum egressusque balneo temporis quiescat bora. iam tunc frigidis reficiatur & mezaris, pullis quo- que cum heserem aqua & granatorum plurimū quæ dormiat. Cessabit enim. f. ab eo uelocius. Eius autem quæ fit febris ex ciborum in stoma- cho putrefactione medela iam diximus: quo- niam quædam est cum emollitione naturæ: aut cum eius incarceratione: quæ & difficilior est & fortior. Et medella quidem eius si cum emolli- tione est naturæ talis est. Speculare sū quod egre- ditur est id quod est corruptum est in stomacho opus est cum quieuerit febris balneo patien- tem introducere, post quod reficiatur pauco pane infuso granatorum aqua: aut heserem aut inre pullorum cū his cisdem preparato po- nia sugat & pruna ante prædium aut hordeum dabis siue cum biscoto aqua infuso granatorum aut pomorum mizorum. quidō autem solutio superabundat in ratum ut accidat defectus, hūc defectum curatione medicari oportet qui fit ex euacuatione rosaribusq; refrigeratam rosarū aqnā super eius faciem, corpus fricabis. aliaq; non præ- termites quæ in subsequenibus dicemus in de- fectus cura. quod si & singulat refice illū his quæ dicemus, non tamen balneum introduces. Si autē adhuc perstat solutio dabis illi puluerē granorū granatorum, stomachūq; illius inunge oleo po- morum aut zurigendorum, bulliasq; olenm ro. cum citoniorum, aqua pōicorum aut aqua mu- zorum pomorū donec deficientibus aquis super sit olenm. emplastrices etiam stomachum empla- stris quæ de sandalo & rosâ & aqua quia ac sec- ceo aut raroeto in alias dragmecho succoque le- letelceis, & aqua miri & foliorum uitis aqua, & aqua uirgæ pastoris & similibus. ut autem de- fecerit solutio stomachum linies abstinthij oleo, & si quidem acciderit stomachum infirmas aut de- bilitas stomachum cataplasma mantilibus calefa- ctis siccis aut oleo, xerembabaci calefacto bu- mentibus, nel oleo cherelesi in alias heleli aut susani, aut msthefarase alijque amenis oleis ca- lefactis que. Sedata infirmitate amptata sol- utione, oportet patientem reficere pullis starnis assatis & fritis cum aqua heserem & granato- rum aqua, sed & piscibus lapidosi assatis aut fritis. Si autem defecerit appetitus diacitonium dabis pomorum electū & muscū cōdū electua- rium.

riomque nocum iuata qd̄ optus est, facto mane balneo induces oleisque linies amenis, nec vero sit illi in balneo mora. hoc ergo modo huius febris dominus regēdus ē si quidē emollita fuerit natura. Conspitata uero natura oportet ea quæ sub hypochondris sunt tractari, intuerique ntrum à stomacho nec ne cibus descenderit ad intestina subcilia, & ad intestinum quod colon appellatum est interrogari patientem in quo grauitatē aut morfuram sentiat loco nentris, quē etiā eructet saporem, hæc cū feceris & intellexeris quod cibus corruptus in superioribus est intestiuorū oportet patiēti mensescentū des marchemufum in quo est buraci duplum qd̄ in libro scriptum est, rorari; super corporeius aquam ca. interpollare. Si autem corruptus iam descendit ad inferiora intestina, cibus aquā rorari oportet ca. super nentris inferiora. Cum autē mouebitur ad inferiora manifestissime cibos subimitti oportet assuasum clisterizari; cum clisteri mollienti. & si quidē morfuram sentit infirmum oportet clisteri fieri de iuibis & sebesten hordeo touso & niol. ac oleo uiolarum & auatia adipe & anseris ac gallinæ. Quod si inflationem seuferit ac uetōsitate, clisterizari expedit illum clisteri quod sit ex eis quæ nentositatem extirpant, ut est semē apij aut feniculis similibusq;. Euscato cum clistere patienti, mezauro pascas illū ex blita facto cum espidabago, aut spinachijs siquidem morfuram inuenit. Si autem nentositatem ciceris aqua pascatur cum oleo uiol. aut oliuarum, aut cinamo. sequenti introduce infirmum balneo, sedeatque in aquæ concham. Si autem grauitatem in intestinis patiens sentiat rotulam da castigis, & calungemolin fricatum cum aqua calida emollita eius natra iure refice illum pollorum & zirebago, somnum in ducas. ut autem dormierit diuitius febrisque & infirmus sedata fuerit in cibum conuertes pedetentim consuetum.

De medela febris diei qua fit ex labore.
Cap. IIII.

Qui autem febrem ex labore patitur molestam quiete natur oportet in loco quem temporis dat qualitas aut somno plurimo, donec à defatigatione redierit, ceperitque febris inclinari. hoc ubi fiet balneum ingrediatur in media domo suani stet iofundatur aqua tepida, & siquidē cōchaderit cōtinua supfundatur aqua quo beneceat ab ea quæ acciderat ex labore siccitate illius corpora egressusque ionngatur corpus oleo uiol. & ninfare cum plurima fricatione, sed temperata, maimeque concatenationum loca plurimum supfundantur oleu ut emollescant membra, & cedat siccitas quæ acciderat extensio neque ex labore. Quod si manibus corpus frica-

neris sepius utilius erit tunc iterum in concham redeat, supfundatur illi aqua tepida, & si quidē labor fuerit plurimus & fortis bis hoc faciat aut ter aut certe quater. Si uero paruus semel sufficiet aut bis, de binc egressus balneo per boram quiescat plenam carnibusque cibetur pullorum hædorum ue extremis. Sitq; eorum paratio laudabilis lactuca comedat & intiba, & portul. feracula sepius multiplicet unum uero bibat quod conuenientes & concurrentes dabunt causæ quæ sunt. scilicet corporis complexio, ætas, institia tēporis regio & cōsuetudo. Si ergo erit eius complexio frigida & plura aliorum ac patientes plurimi cōsuetudo uiui oportet utatur uino temperata qualitate, sed quantitas quidem maior sit quā temperata. Si autē hic calida fuerit aut plurima aliorum, nec multum ei in consuetudinem est uiui, aut equidem paucum sit eius potus paucus & nimum album subtile multum temperatum, plurimum dormiat, plurimum quiescat, febris enim facile cessabit. Si autem superstit post hæc aliquæ eius reliquæ, apponatur hoc idem quod dictum est regimen balnei & fessiois in aquæ concha & unctio oleorum, aliorumque.

De medela febris qua fit ex ira. Cap. V.

Cui accidit hæc febris quæ ab ira est, mausuefcere oportet & sedare ipsumque quiescere ac seipsum iocundare & mitem facere. Cunque febris declinare ceperit ingrediatur aquæ plenam suauis ac tepidæ, concham, in qua etiam perfectueret temperata mora egrediat quæ & si quidē ætatis est tempus fundatur super corpus eius aqua fri. māsuefcatur seipsum & quiescat, proxima sit illi sandalum aqua ros. campbora. nige turque corpus eius, bibat de iuleb modicum & aquam granatorum mæzorū cum uiue. Cibetur frigidis escis & humidis ut acetum oleum oliuæ frigidisq; paratis cum aqua heferem & granaturum & piscibus lapidosi parum cum sale cōditis. Non autem accipiat unum, auget enim iracundiā. Iam tunc plurimum utatur somno & requie, hoc etenim hanc omnino annullat febrem & extirpat.

De medela febris qua fit ex tristitia. Cap. VI.

Cui uero hæc ex tristitia contingit & cura tristitie eius mitigationem molliri expedit, eiusque exhilarationem, lartificantesq; audiat canileuarum diuersitates ut cytharæ & lyra, sed & tonos dulces & immitigantes, corpūque eius tenuiter frica. Ingrediatur balneum, sit in domo, prima. inmergatur conchæ aquæ temperati caloris ut eo educatur calor corporis ad exteriora modo competenti cibis reficiatur tēporis uti carni

caribus hedorum agnorum ac gallinarum, pul-
birumque piscibus quoque lapidis & cueur-
lotis ac citrolia omnibus his ut humectetur cor-
pus. Nec uero semel multam ciborum accipiat
copiam, nimum propinetur ei temperant cum
aqua fri. secundum consuetudinem & etatem,
tempus istis anni & si quid est tempus anni æstas
est in frigida sit loca. Si uero hyems locis sece-
ris temperatisque, nec plurimum faciat somnū,
his diebus continuatis usque dum calor omnis
deficiat corporis.

De medela febris qua fit ex uigiliis. Cap. VII.

CVi autem hæc sit febris uigiliarum causa
patientium soporacione mollienda est. concipiant
ergo anhelitus narium oleū uol. aut oleū
cucurbitæ seminis conditum cum niol. cataplas-
mentur eorum capita aqua decoctionis uiol. &
ninfar, papaueris corticisque eius tritarum hor-
dei quoque tritisi donec plurimum consumpse-
rit somnum cerebræque eorū humectentur. Cū
ergo ab eis cessauerit febris mediam introduca-
tur balnei domum. super eorum capita funda-
tur aqua tepida suauisq; & omne corpus cum
oleo fricetur diligenter, ingrediatur concham
aquæ tepidæ & dulcis fundaturque super eorū
corpora interpollate, induantur uestibus & quie-
scant hora cibo reficiantur laudabili & subtili
ut sunt pulli turdi nec plurimum accipiant. Et
si quid est qui confueuerit potum nini, pini-
nes illi parū plurimū miasū ut acceleret eorū
ciborum digestio, cum sit uigiliarum extenuare
digestionem ut eorum humectetur corpora,
uinū & enim plurimum mixtum humectat cor-
pora. sic ergo expedit humectationem mollii
corporum. Illis quibus hæc febris ex accidenti-
bus animæ contingit prohibeatur ac coitu, desic-
cat enim corpora.

De medela febris qua fit ex apostemate. Cap. VIII.

CVi hæc autē febris diutna acciderit ex apo-
stemate glandoso alijse apustematibus calidis
oportet sanguine minuatur nenas membro co-
petiti in quo est apostema & cataplasmetur epi-
thimate opportuno, ut epithimata simplicia &
stringentia sint ac extinguentia quæ & prohi-
beant & repellant materiam suam bibat ex-
tinguentia & refrigerantia, ut priscanā gran-
atorum aquam, iuleb psilij semen & portulacæ,
mezauris cibeæ ac cucurbita masso, spinachij at
triplicibusq; factis cū aqua granatorū & hederæ
simili busque. Quæ in locis natorum frigidis do-
pec omnino sedatur dissoluaturque & maturet-
ur euacneturque quod in eo est. Caveatur au-
tem balnei iutroitus uini potus donec consu-
metur morbus. hæc ergo sunt quæ oportuit de

diuersitatum diei febrium medela commemora-
re. Iam nunc autem de medela febrium ex pu-
tredine incipientium præponemusque eam quæ
communis est omnibus putredinibus.

De cōmuni medela febrium & putredine. Cap. IX.

Dicimus oportere in medela febrium ea pu-
tredine minimè communium tribus uti, primū
febris caloris extinctio ac aduersari ei. Secun-
dum autem euacuare humorem putridum. Ter-
tium uero regimen ciborum ac purus electio.
Et extinctio quidem caloris febris facienda est
cum refrigerantibus & humectantibus cibis. &
& medicaminibus. Et quoniam morborum mede-
la communium fit febris ipsi aduersantibus feb-
ribusque est complexio calida & sic. medela eius
& cura in rebus est refrigerantibus & humectan-
tibus, nisi quæ minime utendum est his quæ refri-
gerant & humectant simpliciter, sed secundum
quod morbi exierit cōplexionis quantitas, & secū-
dum complexionem corporis naturalem patiē-
tisque etatem ac anni præsens tempus, sed secū-
dum complexionem regionis, & secundum quā-
titatem morbi complexionis, quoniam cum erit
fe. calore fortis & acmine, oportet uos multa
facere ea quæ refrigerant & extinguunt, utar-
isque refrigerantibus secundum egressiorem cor-
poris à temperantia in calore, hoc autem com-
mune quidem est quod oportet æquilibrari in
omni morbo uenienti ea mala complexionem.
Nec tamen lateat medici notitia utriusque tra-
ctari non posse subito lutum, sed artificio ex ac-
te. Si enim posset medicus morbi qualitatem
quantitatem diligenter percipere, medicaretur
aliquibus quæ sufficeret repugnationi eius fieret
que sanitas. Sed cognoscimus ea subitane quia
approximando usus longitudinem exercitij in
morborum medelis. Oportet quoque ipsam se-
cundum complexiōem corporis naturalem ef-
fe medelam. ut si quidem complexio corporis
naturalis frigida, egemus in febribus rebus quæ
sortiter refrigerant eo quod corpus hoc frigi-
dum à complexione naturali plurimum elonga-
tum est. quod si corporis est ca. complexio, ne-
cesse est huiusmodi medicaminibus uti refri-
gerantibus minus, non enim corpus à naturali
plurimum elongatum est complexione. Sic er-
go se res habet in omni morborū medela quæ
diuersitatibus fuerit malæ complexionis, mede-
la namque infirmitatum communis est corpo-
ris egrotantis in naturalem reductio complexio-
nem. Vimus & refrigerantibus secundum infir-
mitatis anni temporis præsentis regionemq;
quam inhabitat, quoniam si hæc omnia ca. aut
plura, necessum est maiorem esse refrigeratio-
nem caloris febris extinctionem. Si uero frigida
sunt omnia commodum est minus extinguenti-
bus

bis uti & refrigerantibus. Ad hunc modū oportet diuersitatem omnium ea mala complexione morborum esse medelam. i. f. & humidorum ac siccorum atque hanc quam proposuimus regulam ministra.

De euacuatione humoris putridi. Cap. X.

Humoris euacuatio putridi his moliēda est medicaminibus quorum sit illum euacuare humorem qui febrem parit, ut siquidem febris fuerit tertiana fiat euacuatio medicaminibus quorum est cholericum exinanire humorem. Si uero quartana his quę humorē attenuat nigrū. Quod si quotidiana phlegma euacuantibus. Si uero sanguinea febris ē phlebotomo. At uero si composita est febris utendum est certe medicaminibus laxatiuis quę dominantem in compositione humorem euacuent quemadmodum explanabimus. Oportet autem de omnibus dari medicaminibus tantum quod quantitatem ex corpore morbum generatē euacuent. Dictum est autem hoc quidem esse quod medici non possint notitia certissima teneri. Cognoscat hęc autem quantum consideratio monstrat & artificium quantum proprius accipere poterit. hic autem cognoscat qui plurimum in arte exercitatus est medicinę & expulsiōe morborum frequentationeque infirmitatum longo tempore. Nec uero laxatium in morbis oportet dari principio cum humor maturus nō est nisi sit humor quidem excitatus. Si enim medicamine uarias laxatiuo & humor crudus est euacuabis quod in eo subtile est & tenue super ritque grossum eritque simpliciter nihil habens secum quod illum subleuet ac muret, unde & difficilius sit eius maturatio & labor ad excoquendum illum natura, sicque morbus prolixior. Cū autem uideris infirmitatem tumultuantem & de loco ad locū transseantē, leditque infirmū & concutit, tunc iam in principio euacuandum tibi humor nec sustinendū donec maturetur ut quiescat egrotans. Et sciendum quoniam non oportet quantitatem eorum intueri quę euacuatur sed maxime necesse est qualitatem speculari & siquidem euacuatur humor morbum generans oportet eius tantam exinanire quantitatem quanta opus est siquidem patientis perferat uirtus, quod si id quod euacuatur humori morbum generanti contrarium est ampuetur solutio, prohibeaturque euacuari, nisi sic fiat morbus augmentatur, nec egroti perferret uirtus. Quod enim educetur humor est quo maxime corpus eget, ergo intuscat in eorum quę euacuanda sunt exinanitione quin & infirmi uirtutem ac gratiam anni tempus quam inhabitet regionem & consuetudinem euacuationis & inclinationē humoris, & uirtus equidem egroti consideran-

da est, quoniam si fortis fuerit & sufficiens euacuandum est iuxta quod exigit necessitas semel. At uero si debilis minime euacuatur, sed nōdum est refrigerariis & refrigerantibus donec uirtus redeat & tunc adhibenda est euacuatio eorū quę oportet. Quod si uirtus debilis ē medicina nō forti sed paulatim quę oportet euacuabimus pluribusque uicibus ne forte immutata uirtus deficiat. In quēda quoque infirmitas tepus p̄sens ac regio in euacuatione. quoniam, si etas iuuenis est & tepus anni uer, aut autumnus & aer teporatus & regio similiter, semel euacuari purganda oportet. Si autem etas sit pueritia uel senectus & tepus quidem est aut etas aut hyems torpor, aer calidus graui calore aut frigidus regioque frigida ut septentrionalis, aut calida ut est australis nō euacuetur infirmus, quod si urget necessitas exinanatur parum pluribus uicibus, hęc quoque in loco oportet intueri tepus quo euacuare necesse est. Et si quidem etas est superius uomitu egrotum euacuet. Si autem hyems laxatiuo medicamine sicque cū propius medicamē in estate dū aer est frigidus tepore quo naturalis calor per omne dispersus est corpus. Quantitas quoque euacuationis intuenta est ex consuetudine patientis, quoniam si infirmus est qui laxatiuo consueuerit etęque euacuatione euacuetur quantum opus est omni postposito timore. at uero si non consueuerit cum timore euacuetur, quod si uomitum prouocanti consuetus ē purgari medicamine & nō laxatiuo aut laxatiuo & non uomitu, eo quo consueuit euacuari oportet modo. Conferentius enim est & illi uilius. Si quoque in euacuatione quę phlebotomo fit intelligendum est, hęc est sit phlebotomo purgari consueuit, est quoque qui egerat sanguinem minui, sanguinem iuxta quod opus est suberhas. Si uero minime consueuerit pedetētim educas minusque quā est opus. Intuenta est quoque materia inclinata in euacuatione celebranda, quoniam quidem si materia longa & in parte hepatis est inclinata & est in gibboso latere euacuabimus medicaminibus urinam prouocantibus. Si inclinatur in profundo latus masetia, exinanimus medicaminibus laxatiuis. Quod in stomachi partes atque ad superiora eius uomitu euacuetur, si uero ad inferiora laxatiuo. At uero si ad intestina clisteri purgandus est humor. His collationibus euacuatione libanda est in omnibus morbis & passionibus cum euacuandum quid erit.

De regimine se. per nictum. Cap. XI.

Per nictum regimen oportet secundum morbi esse naturam ac tempora eius, sed & secundum infirmi uirtutem & ac consuetudinē, sed & secundum corporis figuram appetitusque inclinationem

tionem, sed & secundū q̄ acceditur, ac iuxta q̄ accidit ægroto signa accidentia a porrectiōe prohibentia ciborū. Et natura quidē morbi, quoniā enim febrium ceterorūq̄ morborum, quædam quidem sint acutæ, quædam autem diuturniores & longæ. Oportet infirmi regimē secundū morbi disponi in cibis acumē ac eius dilatationem. Et quoniam acutorum morborum diuersitates multæ sunt & quædam quæ peracutæ sunt in ultimo acuminis atq̄ hæc quæ 1. aut. 3. aut. 4. aut 5. finiuntur die, quædam uero simpliciter acutæ, quæ ad 7. 9. 11 extenduntur diem. quædam quoque ad quartūdecimū. sed & quædam acutæ sunt, sed est in eis mora, atque hæc sunt quæ 14. transgredientes ad 20. pertingunt, quædam autem his tardiores quorum omnium ordinem exponemus loco quo de morborum tractabimus naturis & temporibus eorū. Si quidē in ultimo fuerit morbus acuminis & digram quoq̄; i ultimo subtilitatis esse expedit ut aqua pura cū iuleb mixta, aut niolato syrū, aut aqua mellis, aut squingibin. Si autem morbus est qui ad 7. perueniat, huic aqua hordei conuenit cum zaccata & iuleb, aut uiolarum syrū. Quod si ad nonum perueniat & quartūdecimū aquam dabis hordei cum sua farina, aut aquam eius colatā bis in die, aut aquam quidem hordei in diei principio, eius autem transuentem medio meaurum cum eucurbita & spinachij alijsq̄; similibus quæ præsentia tuerentur, sic se res habet in morborum regimine qui minus acuti sunt his scilicet, quæ grossiores sunt. quantūcūque autem morbus acutior est cibum subtiliorem esse cōuenit, quā 10 autem minus acutus & cibum grossiorem esse decet. Dabis etiā quibusdam in morbis aquā hordei subtilē in longioribus aquam eius cū purgamento suo. Porro in morbis prolixitatem habentibus ut tertia non pura quotidiana, quarta similesque his morbi prolixi grossiorem desiderant digram & non subtiliari, augeaturq̄; eius quantitas donec ad statum morbus perueniat. Si etenim in huiusmodi morbis subtilia acris dictam, fortassis esse securus nō poteris quin cadat uirtus in statū morbi, nec erit fortasse infirmitati uirtus qua resistat passimni cū sit morbus circa statum fortior quā fuit. Idem ergo expedit diætæ subtilitatem & diminutionem in prolixioribus morbis circa statum fieri, quo uirtus occupetur tunc temporis in aduersando ægritudinē quatenus superatam effuger. Comparauerunt autem antiqui medicorum infirmi uirtutem expensis, morbum peregrinationi medicum peregrinanti, peregrinans namque expensas extimat illucis secundum uirtutem & longitudinem. Sic & medicus uirtutem morbo resistentem compenfat secundum ipsius breuitatē & longitudinem, & si quidem niderit morbum breuē esse spatij statūq̄ne propinqui, cibum sub

tiliat & imminuit. Sicut peregrinans cuius est peregrinatio proxima, unde & expensis eget breuioribus. At uero si morbum prolixiū aduersat uirtutem à principij conseruat ægritudinis, ne forte uirtus deficiat ueniēte ergo status tempore uirtus fortis est sic & peregrinans si longū est iter longiores apparat expēlas, ne forte eius deficiat expensæ antequam ad locum attingat propōsitum debiliteturque ac deficiat uirtus. At uero diætæ regimen secundum morbi tempora sic oportet esse. Commōdum est in morbi principij cibum ad grossitiem inclinari, ne forte infirmi fiat transitus de grossia ad subilem semel digram, necesse est ipsū amplius dilatatūque eius uirtus & debilitetur. Dehinc autem eius imminnat grossities paulatim, & per dies donec morbus ad statum perueniat quo quidem oportet diætā tempore in ultimo esse subtiliari, ut est prandij dimissio ac inniti iuleb, aqua mellis uiol. syrū. ne uirtus in ciborum occupetur digestionē, conuertatque omnem sui curam ac morbo resistendum expellendūq̄. Ut nero ceperit morbus declinare, cibis quoq̄ grossari incipiat regendumque resurgendum ab infirmitate regimine ægroti. Diætæ porro regimen secundū infirmi uirtutem contemplari oportet & siquidem patientis fortis est uirtus. peracutus morbus siquidem ad statum peruenit reges hanc subtili plurimum ciborum dimissione & iuleb ac uiol. syrū. cum aqua temperata. q̄ si debilis est uirtus nec morbus acutus, status quoque remoratus infirmum hōc diætā reficiat ad grossum inclinanti sarpis & paulatim. quo uirtus conseruetur ad statum usque morbi tempora. At uero & si uirtus fortis & status longius positus hanc cibo reficiamus infirmum temperato semel tantū. At si uirtus fortis & status morbi proximus subtilem dabimus cibum, atque hoc est ut omnino nichil amputato sola utatur mellis aqua ac iuleb. q̄ si temperatā sentimus uirtutē statūq̄; remoratum tēperato reficiatur infirmus cibo semel tantū. At si uirtute tēperata status istat proximis cibis erit infirmo subilis & sarpis. Augmentū etenim & grossities cibi uirtutē quidē auget pariterque morbum cōtraq̄; subtiliari cibi & imminutio uirtutē imminuit, ipsam quoque extenuat morbum. At uero cibis in sublestatia temperatus sua & quantitate uirtutem suo tueretur loco. sic quoque oportet si ex repletionē morbus fuerit ac uirtus fortis subtiliari cibū eiusq̄; imminui quantitatē. Cū nero ex euacuatione sit morbus est uirtus, est debilis cibū uile esse grossū, sed eius imminuenda est quantitas, hisque indiem sepius apponendum & non semel. Cum autem est fragilis uirtus ex repletionē morbi, aut cum uirtus quidem fortis & ualens, & morbus exinanitionē cibū esse in substantia ac quantitate conuenit tēperatū. Obseruandum est etiam regimen

regimen secundum anni tempora ciborum. Si etenim ætas fuerit ansequam meridies trāseat prandēdum ea hora. si quæ naturalis ualidus est calor, sint quæ omnia quibus infirmus reficitur frigida actū, ut anima uoluntarie illa suscipiant & in quibus quiescat. Quod si sēps hyems est, circa meridiem cibi sit hora cum naturalis calor foris est & in omnes diffusus corporis partes. si quæ quod ciborū sumit nec medicamina actū calidam si quæ hoc modo in omnibus faciendū est morbis. Aestimatio autem ciborum secundū consueitudinem talis est. Intusdum si fuerit infirmo in sanitate sua consuetudo ciborum copiosa, hunc non oportet prohiberi à cibis tam & si morbi nō expectet natura. Si enim prohibueris illi cibos uirtus dissoluitur ac deperit, quæ si ciborum illi consuetudo est paucitas, hunc omnimodis arcēdum subtilibus refice. Si enim grossiora appones uirtus nō sublinebit, & grauata debilitatur & debilitata perit cum qua & infirmus est si morbus minime sit acutus. At uero ciborū pōderatio secundū corporis figurā, si quidē corpus rarum fuerit plurimum hunc à cibo arcēdū minime iudicamus. pascendū quæ secundum quæ morbi expectet uatura. At si spissum ægroia uis corpus asperis cibis hunc imminuendū ac subtiliandū est, quin etiam prohibendus si quidem iudicaueris. Sequitur ciborum in diuinum secundum accessum uis tempora. Considerandum. u. si febris fuerit immobilis & minime variabilis nec mixta prohibendus erit patiens accessum tempore & ante sex horas donec induratur calor & actio deficiat. Attamen si nō patitur infirmus donec febris omnino deficiat non oportet illum refici dū calor in superioribus uel interioribus est corporis aut in omnia diffusus membrā, sed cum à pectore ardor cessauerit & à uentre & in his leuiatns locis ad extrema contēdet. In continuis autem febribus patiens cibo arcēdus est dum difficultas urget feb. hæc enim conferentius & uilius magnis digestionē corū quæ sumuntur descēsum accelerās ciborum propter caliditatis leuitatē. Si est actiois & difficultatis seipore patiens, reficiatur, occupatur à resistendo febris uatura à ciborum digestionē, sed & stomachus cum non naturali fuerit calefactus calore cibos non digerit & alterantur in febris materiam, qua augmentata morbi tempus producit & opilatio uenis superuenit. Quando autem febris est accessus uariis & incertus & minime ordinatus, tunc cū necesse fuerit infirmum refici disponendum est regimen ciborum secundum appetitum infirmum, eiusque ad aliquam inclinationem. Considerandum namque est si infirmo multi sunt uiles & conferentes cibi uti quæ quidam minoris sunt utilitatis si infirma anima ad minus inclinetur utile appetitus ægroti sequendus est, dabisque quem desiderat

cibum. Conferentior enim est illi & utilior & corpori eius melior eo quæ libentius suscipit, sic etiam in omnibus alijs faciendum ratio approbat quibus curandus est morbus aliquis. In mēsurando autem cibum secundum accidentia quæ infirmum à cibo prohibent intusdum in stomacho superfluitas est ciborum aut in uisceribus & intestinis crapula omnimodo reficiendus non est nisi stomachus purgetur & intestina crapula uacuentur. Sic si quando euacuandi fuerit necessitas infirmo ac laxatio aut clyster aut à stomacho aut denique phlebotomo alijsque cibum non oportebit dari nisi post euacuationem corporis ac purgationem. Potus autem regimen in tria diuiditur aquam medicialem potum & uinum aquæ quidem est refrigerare & humectare, & si quidem febris est de continuis & urentibus nec causam maturitatis aquæ signa iam manifesta sunt & uirtus ualida & infirmi consuetudo aquam potare frigidam, nec principaliter aliquod mēbrorū debile, nec apostema huiusmodi ab aquæ potu frigidissimo minime arcendum. At si maturitatis minime signa apparent uirtus est debilis excellentiam aliquod membrorum apostematicum, nec infirmo aquam bibendam frigidam consuetus hunc omnino frigidioris aquæ potationem prohibeas. Sed & si tempus est æstas & febris in acuminis ultimo & maxime stomacho & hepate debilibus arcetur quinimodo aquam temperatam frigoris propina. febre autem constantiam tenente periodicam aquam oportet patienti propinari frigidam accessionis eius medio tempore. At uero in principio nullo penitus modo aqua frigida est permitteuda. Si sit autem febris minime acuta, sed humor erudus prohibenda aquæ frigida potio. Si enim plurimū sumatur multas sonet, ut & apud Hipp. ægriiudines in libro acutorū morborum. Immoratnr eis per membra infusio, ac descens difficilis sit, matratio differtur & prolongatur eis mora in stomacho, facitque in pluribus infirmitatibus nentri uentris ositate, & si quidem eontingerit stomacho dominante esse choleram contumptur aqua & in choleram conuertitur. Cumque post tempore longitundinem ad intestinum descenderit reium non facile ab illo separatur & mittitur ad hepate & renes, pectus & pulmonem. Quæ cum ita sint nec uirā prouocat nec sitim extinguir in hac habundantia. Nō enim facile à stomacho mittitur nec ad profunda mergitur corporis. ideo ergo cū quibusdam dāda est syropis aut inlebe aut squingibin. Medicinales autem potus quidam quidem squingibin & est potus febricitantibus opportunus, aut simplex & est conferens causam patientibus & cholicis febres, refrigerat enim & extinguit & incidit humoris uiscositatem, subtiliat immittitque ad uenas, oppilationem aperit,

bitudinem naturalem his quæ refrigerant & humectant, pueri autem humidioris iuuenibus sunt complexionis mulieresque humidiores viris, quare in febribus humidioribus egeat ut ad naturalem tedeant statum. Oportet autem cum his quoque si tempus estas fuerit cibos eorum cum uide refrigerari, hoc autem cauendum in his quoque stomachus & hæpar debiles sunt. Facta non est accipiat aliquid, siropi heferem aut aquam granatorum & spodiõ, potulacæ semel lehabit feminis pilul, de vnoquoque iua quod opus est eum aqua frigida. Accessionis vero die febris, aquam hordei minime dabis, differet prædium donec omnino finituri accessio, erit in tempore alleviationis eius. Si nimis erit diei tempus in alia typus eius non incongruum erit tunc diei principio aquam propinare hordei ad subtilitatem inclinante, nec cessabis infirmum regere rebus refrigerantibus & extinguentibus donec signa maturitatis afferat urina. hæc enim febris si pura fuerit septem tantum in pluribus circulis absconditur. Ut autem signa uideris maturitatis apparentia patientem temperati calor inducas balneo, quem sedere in media facies domo balnei. Rorabisque super eum dulcem ac temperati caloris aquam, ut & dissolvatur eius materia & compleatur eius maturatio. Sed nec quidem peccaueris si huius febris puræ dominum post. 7. induxeris balneum diem etiam si non maturitatis signa appareant cum sit hac in febre materia subtilis & pauca, id eo quæ facilia est dissolutioni, magis autem si consuetum ægrotanti est intrare aut omni die aut secundo uel tertio balneum. Quod si appetitus inclinatur eius ad balneum iam conferentius erit. Sit autem qua ingreditur dietæ post febris uacuum & stomachus eius cibis omnibus. Ut autem induceris plurimum patientem fricare noli ne forte fiat illi fatigatio. Sed sit omnis tua inuentio ut intraverit aquam temperati caloris super effusionem facere ut materiam foluantur reliquæ, humecteturque siccitas corporis, super effundes autem aqua cal. eor pori paulatim. Sitque primo aqua tepida, dehinc ad calorem paululū inclinans. Dehinc vero aqua temperati caloris cum sit contrario ad contrarium trāsitus semel malus in omnibus. Egressum autem balneo componas assignato regimine, & si quidem animus ipsius inclinatur ad quosvis lapidosos pisces aut pullos paruos non incommodum erit illis cibari, humectant enim corpus. Oportunt autem sunt illi pisces cum sequebago & polli cum heferem, aut aqua granatorum hisque similia. Quod si patienti accidat subuersio sentiatque in ore choleras non inuile erit ut uomitu cum squingibin & aqua calida ac stomachū mundare, cui post uomitum dabis sirop. gra. aut heferem sirop. cum aqua

fri. Cauens autem illum ab omnibus cibis quibus inest acumen ac punctio, medicamentibusque utatur quiete & uacuitate. nec ad irā adducatur & tristitiam. Confortantur & eum hec cholera ru. Si ergo dominus febris tertianæ, si putare hoc utatur regimine, septimū uero transgredietur febris eius diem. terminabitur autem quarto aut quinto sextone circulo.

De tertiana non pura febris medela. Cap. XIIII

Tertiana porro non uera febris & lōgiotatē poris, accessionesque eius horis. 12. lōgiotatē, nec est cum calore eius acumen aut morfura, sicut in loco in quo signa descripsimus dictum est. Hæc etenim febris maxime ea phlegmaticis est & cholera rubeg admixtione, maiorque est solidæ materię, quare plurima adhibenda humoris euacuationis cura. Omnino autem & in omnibus urina consideranda est, palpareque & cōsultende arterię, & siq dem urina uideris tinctam, & in arterijs celeritatem oportet patienti dare primo quidē hordei aquā tribus deinceps horis aut. 4. squingibin. & aquā frigidam & pillul. reficiat aut aiebari iure, aut cum aqua heferem, aut granaris hoc autem die quo febris non accenditur. Cum & enim habet hæc longitudinem febris non accenditur. Cum & enim habet hæc longitudinem febris oportet custodire uirtutis adhibere diligentiam usque infirmitatis statu. Accessionis uero die macaro rebe, aut cucumeris, aut xiri in alia circuli medela. Refrigerat. n. hæc & hūctant urinę, puocat. Si hæc accessioe finit. Inuenis quoque naturam oportet quæ si dura & sicca fuerit mollienda & cal. rotula & tergebino aut tamaria india quæ teperat natura. Non. ne bonē comodū est huius in se. magnam principijs facere, donec materia maturetur, dehinc dabis hordei aquam post quā squingibin hæc qui de die quod tipus se. cessat. Accessionis uero die squingibin. ppina solū quē oportet mazauros plus accessionis sine refici. Veniente uero infirmi septimo die, si aliqua uideris maturitatis signa apparere iā tūc curare incipies aut laxatio aut uocit aut urina puocatione. Et laxatiuum quod erit absinthii decoctio, quā absinthij hac in febre utilitas manifesta est modis quibus pluribus, uno quod quā i eo ē poticitas ideoque sibi cōfortat cū hac in febris debilitetur phlegmatis cōmoditate quā cōfortatio illi oportet ut est cibus perfectius digestus phlegma non generet. Pluria nāque phlegmatis gñatio ex debilitate puenit sibi cū non ad bonā ualet ciborum digestione. Sed uero quā urina puocat uel excitat absinthii sus phlegmatici humoris subtiliatione & apriendo meatus Tertio quoque quā in eouirtus & arrahens cholera ru. quæ est humorum est radia hæc gñatio febrem. Non oportet uti absinthio, nisi post ma-

terē ematurationem, si etenim ante uteris lēſio fiet manifesta. Abſinthio nāq; due ſūt virtutes cōtrarię, altera ſtringēs, altera vero ſoluēs, q̄ ſi vtaris añ maturitatē arctatiōe ſua cruditatē auget materię & duritię, diſtictiliſq; fit eius diſſolutio. At vero laxatiua vult humorē laxare virtua nec p̄ualeit eius rep̄ſiſſa cruditate qua ex re natu rē fit lēxio laxatiua & attractiōis alia labor & alteratio debilitaturq; virtus eius. Ar vero cum poſt maturatiōnē quis utitur abſinthio, pōtica quidē q̄ in eo virtus cōſtringēs mēbra cōfortat ac ſolidat quibus ē eſt auxiliū ad expellēdas educendasq; materias q̄ ſua ſubtilitate obediē tes cito exēūt, et ſine lēſiōe aut naturę moleſtia. Oportet multis etiā t̄pibus lebelabo vti cū tur bit modico & beſaigo in alia beſargo vti zaccara aut caſiſ. rotula iuxta q̄ imperabit neceſſitas trochiſcis etiā vtere benelegi quorū hęc eſt aſſi gnatio. Sumūtur violarū rectūtiū. dr. 2. turbita l. bi. dr. 1. ſcam. oboli. 5. ſucci liqui. dra. 5. terātur oīa diligenter & ſubtiliſſime cribentur p̄āno. ſu manturq; cū his zaccara ru. dr. 5. bibāturq; cum aqua ca. eſt. n. optimū medicamē huic febrī, eſt. n. huius trochiſci choleram ru. laxare & phleg. Nec vero vtrūq; v̄ ſape iā diſtū eſt laxatiuo ni ſi prius hūor maturua fuerit eiusq; videbuntur ſigna, niſi qdē tumultuoſa ſit paſſio, de loco trā ſitura ad locū. tunc et. n. euacuatiōe vtrūq; nec expectādū amplius, cū vero nō tumultuat hūor nec ſigna apparēt maturitatis nullo mō laxatiuo vtaris. Si. n. feceris qd̄ ſubtile ē in hūore enacuat groſſūq; remanet ſolū, cōius & diſtictiliſ maturatio, humor nāq; ſubtilis ſi cum groſſo ē illum maturat & ſubtiliat, vñ & eius facilis ſit maturatio & poſt maturatē ē exitus. Oportet et ſi materiā ad hepatis latus videris p̄fundum in clinari & ad venas & inteſtina elifteri vti, & ſi humor fuerit phlegmaticus elyſtere fac callidū q̄ inteſtina lauat & phlegmate. Qd̄ ſi humor do minās fuerit cholericus diſticti vtaris inter lene tēperato & acutū. q̄ ſi inclināt ad ſuperiora hu mor atq; in partes oris ſtomachi, inuenitq; in ore amaritudinē & morſurā ac ſubuerſionē in firmus, euacuatio per vomitum celebranda eſt poſt prādium, facilior eſt nēpe eius exitus cōm. plurimorum ſit expulſio leuior ea quæ pauco rum eſt. Sed & qm̄ humor immiſceatur cibo ac facilius cū eo aggreſcit. Porro ſi hac in febre do minās humor eſt phlegmaticus admiſceſci cibis ſubtiliāta oportet & incidētia vt ſaute negum ſaturegiā fugiles. Qd̄ ſi dominās ē cholera q̄ſcū infirmo da hordei, piſces recētes acetum in alia acutū ſtiba & ſimilia. vt ſi euacuaueris illū vomitu oportet mūdare ſtōm cū vomitu dato ſq̄ngi bin & aqua calida nec p̄mitras in ſtomacho qd̄ ciborum vel aliud. Quē vt purgatum intelligis oportet ſiro. alioquem de pomorum ſimpliciū. Si vero humor ad gibboſum latus hepatis incli

nari videris illūq; inuenis hypochondrijs dextris granitatē facientem medicaminibus urinā p̄uo catibus utere ſimiliturq; cibis eadē facientibus. Si ſit quo uteris urinā p̄uocans medicamē nō fortiter calidū, ut apij decoctū & ſceniculū. Me dulla granorū melonis ſeniculū ſemē acapaltina eē ſilueſtris hæc æqualibus p̄tibus ſumpta tere & bibe de eis. drac. 2. cum iuleb aut ſq̄ngibin ſomni t̄pe cum aqua frig. Quod ſi videris febrē prolōgari ſpeculārē, & ſi quod videris ſan guinis dōnationis ſigna manifesta ut corporis ruborē pulſus magnitudinē aliaq; q̄ diximus ſigna in alio loco, uenā minue aq̄helā & educaſ ſanguinis q̄ritatē ſecundū q̄ eſt virtus reliqua oīa q̄bus euacuatio p̄ phlebotomiā neceſſaria ſi gnificat. Vtaris ſit reſtaurantibus & ciba pullia aut ſrāquillinis & trochiſchos ſpodij da emolliē tes omni die exagru. 1. cum. 5. dr. ſq̄ngibin cū aqua fri. Si nero minime dñationis ſanguinis ſi gna appuerit oportet utaris medicaminibus q̄ phlegma euacuent tū laxatiuis tū vomitu ſicut iā dictum eſt. Si ſit temporis inter euacuatiōnē, & euacuatiōnē tā q̄ritas qua poſſit cōforta ri corpus & humorem maturare nec cōtinuetur euacuatio debilitare et. n. uirtua. In hac oportet ſe. cum enacuaueris ſi amplius p̄elabit ſola rum nri trochiſcis cum ſpodij ſactis exagrum. 1. ſumens cum ſq̄ngibin. vn. & 5. mixta aqua hor dei. Qd̄ ſi cū phala erit tinctura & in pulſu velo citas utaris aqua hordei in qua decoctum ſit ſe inē ſeniculū cū ſpodij trochiſcis & intibz aqua, cibaq; ſuini carnis ſubtiliū, ut pollis & tran gllinis cōditis cū zirabago aut eſpidabago aut frixis ita ē cibo poſt diſmiſſionē accenſiois. Die ſit quo accendit cibos deſerat quos & ſubtiliet poſt t̄pi terminatiōem ut die qdē quo nō accē ditur virtus ſeruetur. Die ſit accenſiois virtus oī no aduerſat morbo occupet & cōſumatur ma teria. Quod ſi infirmi nō patitur virtus cibi di miſſionem accenſionis die, nec eſt ei cōſuetudo prādii dimitte accenſionis paſcat die ſorbiciū cula quæ cum ſurfure ſit & zaccara & amigdal. oleo & q̄ſſito hordei cū zaccara aut tritici ſiue cū aqua fri. iuxta q̄ egrotantis inclinabitur aia ſitque hęc poſt accenſiois finem declinatiōnēq; caloris ad inferiora ad p̄ctore & vētre. Cauenda ſūt oīa que tardē ſit digōnē. hæc. n. fatigāt vir tutē & debilitāt i altera uōe cibi in ſanguine ſiūq; phlegma, augetq; morbi mā. Vno ſit oportet vt cū manifesta fuerint maturitatis ſigna in vna p̄p̄netq; poſt borā vnā cibis ſitq; album ſubtilē nō vetus aut nonū aqua mixtum frigida. p̄de rie nanq; manifeſte, diſſundit. n. cū cibo ad mē bra quæ cōfortans vrinā p̄uocabit & ſudorēq; pabit cōplexiōnē, digōnē, pcurabit. Si vero utat quis ante maturatiōnē vino calor augetur & cō foratip̄us calore eiusq; augmentatiōne chole ra auget cōfortatur. liquet ſic hūor i oē corpora diſſunditur

diffusū, opilationē facit, misceturq; illi hū oēs
 quā ac corrūpū. quare nō oportet vti hac i fe
 bre vino nec in alijs nisi post quā maturitati si
 gna manifestabunt. Oportet & hac in passione
 stūm emplastrare calefacienti illū emplastro &
 cōfortati ac maturati q̄ i eo ē hūioris phlegma
 tici eiusq; phibeat gñationē, & hęc eius descri
 ptio. Sumatur laudani, dr. 2. & liquefiat cū oleo
 sīlami & oleo ro. addasq; illis hęc medicamina
 rosę rubę purgatę, dr. 5. lecci ramaci vniūscu
 iusq; dr. 1. teratur diligēter cū laudano miscē
 tur liq̄facto cū oleis & emplastra stōm cibo va
 cuum vtaturq; balneo aque cā. i qua decocta sit
 camomilla, aqua lilēmelec, marcemscū maxi
 meq; qm̄ hūiorē animaduertēris ad tutē incli
 nati exteriorē cū morsura s. prurigne pustulis
 quę manifestis. Rorāq; super stōm vt calefiat
 aquā. Nō it oportet vti balneo proprie i hac &
 phlegmaticis febrisbus ac quartana nisi post ma
 turitatē, s. n. vtiar ante i his febrisbus i quib; ma
 teria qualitatē earum supat & materia entum
 grossa nec subtiliatur, tres fiant lēiones. Prima
 est qm̄ humor cum liq̄et nec dissoluetur, decur
 rit & opilationem exagērat, ideoq; et pūredo
 eius augetur. Sēda qm̄ humor putridū cum li
 q̄factus fuerit balnei calore diffunditur p cor
 pus bonisq; miscetur humoribus quos & putre
 scere vt ipse est facit. At vtero tertia qm̄ materię
 subtilitatem balneum soluit remanetq; eius
 grossities, quare eius difficultas fit maturatio &
 dissolutio. oportet aut huius se. incommodum
 ferentem quiete uti q̄ sit humor suo quietus in
 loco donec maturetur. Cauet ergo & motum
 & laborem, hęc enim liquēfaciunt humores, &
 diffundunt dissoluiuntq; opeimi humores
 quos & corrumpit & in putredinem transmi
 nit, quā ex i febr. augetur materia & mora eius
 prolongatur. G. refert hāc iuueni cōigisse viro
 febrem ac sex i eo durasse mensibus. vidi quo
 que ego cui hac accidit ēstatis ultimo. febris du
 rauique vsque in vteris principio tempore, &
 tamen eius erat probatum & opimum regimē
 quare hac expedit in febre his quę dicta sunt vti
 cauere autem contraria.

De quartana feb. medela. Cap. XXIII.

Quartana feb. fit ex humore cholere vi. gros
 so & sicco & maturari tardanti ideoque &
 longę est perseverantiz & temporis diuturnio
 ris aliq̄ forte æstare eam fieri cōingat, secundū
 maiorem etenim partem i hoc anni contingat
 tempore finitur uelociter nec eius prolongatur
 tempus. Quando ergo hanc in ēstatem uideris
 febrem tempore ulsimum eius breuē nō om
 nino cui inest aliquibus cōmoueas medicami
 bus, sed cibum subtilia dabisq; ius pullorum tā
 gorum paratorum cum epidabago aut ciraba
 go aut paratorum prohibeasq; grossis cibis le

guminibus piscibus lacte, quoque & fructibus
 omnibus & quę uentositatem generant. Satis
 ergo tibi sit dare illi gelengebin vno quoq; die.
 drach. 7. deinceps squingibin & fructus quales
 vuz passę corrosanę granis mndare quales
 gillatis in alias stoxigilatis amigdalis duleibis
 & pistachijs, hac etenim febris hūc in patien
 te traris regimine citius tollitur. Quando au
 tem ēstatis ultimo hac febris cōtingit aut autū
 no aut byeme longioris est spatij. Principio er
 go cum congingit inuēri oportet si quidem
 uideris in pulsu magnitudinē & in eo celeritas
 non multa, vrina ru. & grossa ætas plena & iu
 uenilis, oportet accelerare sanguinis minutio
 nem de basilica aut aque hala vena de sinistra
 manu, & cōsidera sanguinis colorem quem si vi
 deris nigrū & turbatū aufer de sanguine quātū
 opus est si quidem virtus adiuenit. Quod si ru
 beus est claudi venā oportet nec aliquid omni
 no educas, qui. m. sanguis est talis bonus est quē
 si euacuaueris uirtus debilitatur munda, & pu
 ra, nec deinceps habet resistere morbo, amplius
 si euacuas sanguinem mundum & purum in cor
 pore solus remanet humor malus pessimus, au
 geturq; uirtus turbati sanguinis nec superest
 corpori quod ei resistat. quod si recte factū est
 aliquo mō phlebotomia patiētē chimorū resi
 celaudabiliu cibis vt pullis, frūquillinis, gallis,
 castratis piguibis, ouis sorbilibus, hædorū &
 agnorū carnisbus. laudabiliter preparati cum
 zerebago, thurabago tab hago, hēpidabago patel
 latis in quibus & anisū in alia clarusani. c. i. m. i.
 carni, anetū, prohibeas illum tā cibis grossis ge
 nerantibus chimorū aut melācholicis vt sunt ca
 nes equorū carnes zerecarum maiorum cōple
 tēlētūcū oia q; legumina mala & similia. Cum
 uero sanguinis dominationis signa nō inuenis
 nō oportet minui, sed nec euacuare patientē me
 dicamē aliquo laxatio i morbi principio quā
 diu crudus est humor. Si. n. hoc rpe vtiaris laxa
 tiuo humorem si non poterit euacuare pp eius
 grossitiem difficultatēq; decursus eius, sed euac
 uat bonus humor & vtile remaneatq; malus i
 corpore solum, vñ & hęc cōfortat se. difficultat
 que sit eius expulsio. his itaq; de causis nō opor
 tet i picipiis nti medicamine q̄ nigrā euacuat
 cholera. Sed oportet naturā esse temperatā iell
 nantēq; ad molliem emolliētium ventrē uls
 ut olerum cōdiorum cum miri & aceto & oli
 ua, oleo sicut etiam blitō corrosanica spimachij
 semina cogalorum iuribus & carniū cum ze
 bibo corrosanico, fallagisq; in alia si cubus pu
 nis duleibis siccis cum medulla cartami. Si uo
 tem suspensa est natura laxa es prunorum aqua
 dulciū & uis pasas fene, ca. s. h. terēgebino aq
 ca. s. aqua cū zuccaro et similibus, et si nō emolli
 his natura, clisteri utere emolliēti cū aqua blitis
 & sīlami & oleo & muri. Et oportet hac i febrē

bū tēperare nō vtaris grosso digestiōis iobediē
ti, augētq; feb. materia sed nec subtili peccatq;
in seruanda virtute, debilitetutq; hęc. n. feb. de
longioribus est morbis remotiq; status. Si ergo
subtiliaueris cibū imbecillis sit virtus in infir
mitatis tēporis status. Cū status ceteris sit for
tior, morbi tēporibus, ideo egro oportet manu
tenere quo cōfuet ad status morbi tēpus infir
mitas, imminuatq; cibipēdetēim grossitū. Cū
ergo ad statū puenit febris, iā tūc subtilies ci
bū expedit, quo oīo cōseruata occupet ad resi
stēdū morbo vitus, sic & i oībus facies morbis
sicut aliquo iā dictū ē loco, dabisq; singulis cha
lēgebin diebus, & squigibī diebus cōtinuis, p
habeasq; cibo actiōis feb. die vt natura iō resistit
do morbo potius occupet, nec vero omnino ut
oportet hoc in feb. balneo nisi cū status eius ad
uenerit de clinatioq; ceperit. Est. n. balnei bu
mores euacuare subiles, porro huius materia
febris grossa est. Si ergo euacuaueris qd subtile
est in ea augēt remanētis grossitū & vigor, &
difficilio r sit maturatio. Quibus it utēdū ē deū
bulatio & tenuis fricatio leuis moderata quāta
te ut poris fiat dilataio tenueturq; materia, ne
cessaueris hoc vt regimine. donec maturitas si
gna appareat. Quo ubi emergent laxatioo ut
re choleram purgāt ni. vt ē hęc decoctio cuius
hęc ē assignatio. Sumāi lebelachi f. selēbi in alia
mirabolani chebuli & idi. vniūscuiusq; dr. i o.
bellitici. f. blicci. cuiusq; dr. 5. vuz passē corrofa
nice granis purgatē. dr. 20. f. eue. dr. i o. abfiothij
gregi. dr. 4. lingue bouis foliorū badernebine.
besaigi tonfi vniūscuiusq; dr. 2. 4. f. uanti radicū
dr. 5. elta cobi. dra. 3. coquas omnia medicami
na in 4. lib. aquę donec ad vñ redeat. super ad
des epithimi. projicias intus, dr. i. 1. eretici i alia
cartami & purgati & ab igne sublatū ita dimi
tas, dehinc fricabis cū poteris epithimū diligen
ter colabis fumesq; de hac. vnc. i o. projicias de
sup agarici exagium dr. i. aloes hępat. dra. 5. fa
lis nalle. 5. dra. eltebori nigri subtilissime triti
obol. 2. bibesq; & sit tepidum. Vtaris it hoc me
dicamine die ab accessione sed o, hic cum vsua
fuerit oportet patiēti date post accessiōē tro
chiscorum gaseri exagium vñ cum duabus vn
cijs squigibin zaccare duabus mixtis aq part
bus. Die it accessiōis utaq; squigibin in quo
infuse sint radices cū aqua decoctionis aucti, &
puocet uomitus, hior et eum accessiōis die ru
meduotus ē. calorq; illū liquefacit feb. vñ & fa
cile euacuat. hęc it collerati se. oportet post ma
turationē vnaquaq; septimana hoc vt medica
mine cuius hęc ē descriptio. Sumāi mirabolani
indij, & chebuli. vniūscuiusq; dr. 5. i. a. l. 7. besaig
i epithimi cuiusq; dr. 3. aeranē oia diligētē cū
sanuodem zaccare se hmanicę bibaturq; post
hoc aqua calida sitq; hoc materiz accessiōis
die. Cum it differret huius feb. tēpus eiusq; spa

tiū peruenit in hyemis incōmoda, apparebit
qūe maturitatis signa & vestigia, oportebit ali
quibus vt electuarijs calidis, vt ē electuarium
heltici aut eius pillule omni die. 3. exagium su
mes didimū & sq. dr. aut aliquid electuarij pi
perei cuius hęc ē descriptio. Sumatur piperis al
bi ni. & lō. cuiusq; dr. 20. r. lob. dr. i o. zint. apij
seminis felichet. affari. rasseni. vniūscuiusq; dr.
1. felcheli. emane. vniūscuiusq; dr. 4. aeranē oia
diligētissime distēperentur cū melle dispuma
to. Dabis quoq; singulis hebdomadibus de ele
ctuario metrocidi vel metridati & tyriacade
vnoquoq; iuxta q; opus esse videris & quāto
natura ferre poterit morbi vt humor subtiliē
& hęc ē descriptio electuarij vel metridati qd
post maturationē quartanę vtile est. Sumatur
pipis n. 3. cuiusq; dr. 3. helthite dr. 7. nachue
seluchet. dr. 8. spic. dr. i o. faute negi mōitiani
si. dr. 5. aeratū oia diligētissime & subtilissi
me cribentur pāno, distēperenturq; cum apum
dispumato melle, vini medeaminū parti tres
adens mellis. eius potus. dr. sit. r. cum feniculi
aqua & apij, hoc utetur post humoris maturita
tē. Oportet. n. diligētissime hęc cauere electua
ria sumptūq; formidare eorum ante maturita
tem, afferent. n. non paucas lēssiones, quia eu
acuare nō poterunt humorem ppter eius rudi
tatem & grossitū turbabuntq; eum fortiter
& fluere cogent, vñ & bonis mixtus humoribus
alterabit eos i suā naturā, ideoq; & cōfortabun
tur & maior fiet febris. Sepe quoq; hęc materia
in duo desinit corporis loca, suntq; gemine se
q; si in tria fluunt tres sunt quartę. Oportet
quoq; vt caueat ea calidę vir cōplexiōis & iu
uenis, sed & rpe est iyo. q; si necessitas ad fumen
da coegerit modicum, & cum diligētia accipiat
sitq; illi satis hoc incōmodo & qualitate, trochi
scos sed m minorem accipere partem gaseri cū
squigibin & calengebin. Et uomito accessi
ōis die uti oportet porrectionē cum aqua i qua
decoctum sit faute negi stouiale & epithimum.
Quando vero est hyemis tempus patientisq;ue
xtas senectus cōplexiōq; eius frigida & humi
da, cū hūor quoq; maturari ceperit nō incōmo
dū erit hęc dari electuaria calida. Arceasq; pa
tientem ab omnibus frigidis inedicamentibus &
sic generantibusq; cholera ru. grossiq; subtili
tiq; Oportet it huius dominis se. vinum propi
nari post humoris maturationem siq; viuum
nō vetus, sed nec nouum parum mixtum. Cum
it febris ad statum peruenit. patientem ar
cta, subtili regimine ut pullis franquillinis tau
gis. meaurisq; statu tempore, aurumq;ue al
lis ac collis similibusq; quo ad resistendū
morbo omnino natura occupetur & materiam
eius possit expellere, utaturq; quiete parū mo
ueatur ut i morbū vires cōuertat naturā, nec ali
quo impediatur morū ā resistendo. Oportet

autem

autem hac in febre hepatitis & etiam splenis curā gerat, hanc namque humorū est generator, quare oportet curā exhibere ne forte humorē generet melanolicū. Splē autē huius humoris est locus, curetur ergo ne forte debilitetur accidatque illis opilatio & grossities, dando patietī berberis trochiscos, aut gesserit ne squingibin in hora in orbi & sine eius post murationem, ante autem in principio morbi usus squingibin ex utilioribus est.

De quotidiana febris me. Cap. XXV.

Quotidiana febris quoque difficilis est & longa, maxime si autumno causa moueri cōtingit, hancque cū sit cinis ex phlegmate putridi generatio. Cura autem eius sit ut & omniū febriū extinctio est calor is & humoris euacuatio, & quoniam hac in febre minor est calor quam materia, oportet euacuationē phlegmatici amplius curari humoris quam super extinctionem caloris: principium igitur hanc patientis febris regiminis .i. quotidianam, cum primum mouetur squingibin. vnc. 2. parum mixtum clarę zaccarę. drac. 7. dabisque; tribus transactis horis. tribus autem abeuntibus diebus calēgebin cum squingibin. vnc. 2. parum mixtis. Si uero fortis in eo sit calor & punctura ac morsus, urinaque tincta simulque est cum bis fuculosus eprotus. Oportet tē dare summo diluculo calengebin. drach. 5. ut aurortus est fol. drac. aquę bordei da. 40. in qua decoctū fuerit feniculi semē aut eius radicē cortices. 4. debinc horis squingibin. vnc. 2. dabis cum aqua fri. & obseruandum ut hordei aquam ante accessiōem horis. 6. non paucioribus autem. 4. v. cū accessiōis uenerit hora descēderit stomachusque; uacuus sit hęc facies usque quo omnino calor deficit. Si autem nō sit illic acumen & ardor non nō sit hordei aqua nec calengebin ut diximus donec maturitatis incipiant apparere signa. sitque; prandium cum mezauro condito cum blito & spinachij aceto. & muri. & carui. ac cinamomo, & si quidē astas est dabis acetum & carenulem oleum cum succara paratum menta & simbrio, & carui. Et si uirtus debilis est tranquillinis pascē & tan gis patellatis uel assatis, sitque condimenta eius piper ciminum darationm. Ut autem maturitatis uideris signa oportebit euacuare infirmum aliquo phlegmatici medicamine laxatiuo ut turbit, agarico, cartami, medulla, & hęc assignatio medicaminis phlegma laxatiui. Sumatur turbit. dra. 1. agarici. obolus. 4. salis in di. obo. 2. terantur omnia diligenter & cribrata distemperentur, & distemperata pillolentur & in umbra siccent utarique; summo diluculo cum aqua tepida. Laxatiuum aliud, sumat turbit albi, cartami, medulle cuiusque; dra. 1. agarici. obol. 4. fa-

lis naste. obolis. 2. seminis apij anisi; cuiusque; obolis. 1. & 5. terantur omnia diligenter & cribrata distemperentur ac pillulata siccantur in umbra bibantur diluculo & forbeat post aqua calida, prodest enim utaris autem hoc medicamine unaquaque bebdomada semel eiusque; in medio uomitu adlube cum squingibin. cui infusę sunt fugiles & comestis radices squingibin bibat, postea cum aqua ca. pauco sale herisso. hoc .n. phlegma incidit & subtiliat & fluxum faciens exitum faciliat, & si hęc fecerit accessiōis hora utilissimum erit. Quod si uomitus uacuo nō cōfert stomacho reficiat piscibus salis & fugilibus & viat uomitu cum fugulum & sermac, semine disteperato cū squingibin melio & oleo & aqua qua coctum sit anetū cū sale besiro. oportet et aliquādo hac in febre rinā prouocantibus ut ut apio feniculo recenti boe medicaminibus misceat radicūque; accipiat ferula cum calengebin, diuinijsque; in eo calēgebin. ducatur & coletur hoc scilicet modo. Sume radicū feniculi cortices & radicū apij cortices seminaque; eorum anisum hestā, de vnoquoque; quātum opus ēē extimaueris, decoques in aqua diligenter & cola fricabisque; in ea calēgebin sumaturque; tepidum. Et alterius seculi hęc est assignatio quod sumit cum calengebin. Sumantur feniculi radices apij, & radices susani. cuiusque; dra. 7. sechabe da nedi. cuiusque; dra. 4. feliche. malti. spic. nardi. vniuicuiusque; dra. 1. & 5. mirchebulorum citrinorum & indorum vniuicuiusque; dra. 5. vna pulle corosanie optime purgate. dra. 20. coquantur .i. 4. li. aque donec ad vnā redeant & coletur & sumatur de eo vnoquoque; die vnc. 4. cum 7. calengebin. zaccarę. dra. Si uero distictur hęc febris extendunturque; eius dies & ram adhibeas opus est stomachi ori confortē que illud emplastris in quibus est laudan. ros. ramecum seccum, emplastrizando stomachi et tenim ox. in hac febre debilitatur & conuiscatur phlegma, porro si stomachus fiat debilis amplior sit phlegmatis generatio. quare oportet etiam ori stomachi medellā exercere. utarique; que calefacientibus illud ad hęc confortantibus medicaminibus. Et hęc emplastri assignatio illi utilis est. Sumatur secci optimi. drac. 3. laudeni. dra. 2. ro. 1. clerice cuiusque; dra. 1. q. in alia. 5. zafra. dra. 1. terantur omnia diligenter & subtilissimo cribrentur panno & distemperentur cum samuco & nufene & aqua maceusi & nemani, & his similibus. demur quoque ea quę ori stomachi confortant phlegma subtiliant ut hij trochisci. nardi. drach. 1. mastic. obolis. secundo silqales obol. 2. terantur omnia diligenter & distemperentur cum eis calēgebin diligenter quo eius acceleretur digestio meliorque; actio fiat desque; trochiscos gase. cū squingibi utādm nāque; ē. At si phlegma multū sit

laq; alba fit quod dabis fquingibin melleū . Cū autē fiat stomacho opilatio extimesces refrigetur eius complexio trociscos helbe in alia ab finchij aut lacce cum fquingibin propinabis pro hibeasq; potus ab aqua, copia maxime nero quē cum niue refrigerata est, hęc etenim stomachū refrigerat & hepār augetq; quod huius est febris materia flegmatis. fignationē. At si plurimū proteletur febris tempus & cum urina alba tempus hycem aut . f.etas fenectus infirmi complexio frigida & hūmida aut horum plura fit oportebit patienti magnam te dare tyriacam diebus interpollaris, dabisq; de ea obol. 3. n. q; drac. 5. cum aqua decoctionis cimini & helle cū asaro, q; si de electuariis deberis illi calidis ut pipereos & matrocidi quantum est auellana utilem erit. At nero q; tps xstas & infirmica. cōplexio eiusq; xtas inuētus nullo modo de tyria ca des, sed nec electuariorum borū quidem calidorū . Sufficiatq; tibi quos diuimus trociscos cū fquingibin zaccareo aut melleo aut calengebin iuxta q; morbi uideris virtutem & debilitatē omniaq; reliqua quibus oportuna sunt minuātur. Expedit aut omnino hęc patientē febrē omnibus abstinere fructibus hūmidis omnibusq; quorum est flegmatis generatio la & piscibus alijsq; similibus defq; illi uvas passas albas in quibus est modica ponticis zaccara & mel cum medulla cartami & pistachijs ac medulla helbe uiridis aut aliquādo etiam aac care in heferemin, prodest. u. illi prohibe quoq; balneo donec maturitatis signa apparent nec febris declinata incipit, malum etenim est ut posterus dicemus. ut autem apparuerit illi balneum permittit . Roraq; super illum aquam in qua decoctum sit camomilla aqua lilel melch, marcemurum nemann, herēgsum siue in alia similiā & similia hia calefaciētia & subtiliāia.

De continuarum fe. me. Cap. XVI.

Continue febris ab humorum putredine qui sunt intra nasa & neuas sunt ut in prima huius nostri libri parte ostendimus. & quoniam quia amplius est humorum in uenas sanguis est, fit ne quā continua est febris amplius, sanguinea fit quā dicitur sinochus, quā etiam acutus est morbus. quod ergo i huius febris principio maxime necessarium est causā curā. hoc est primo secundo & tertio quo mouetur die ne omnino vitatue sanguinis minutione aquehale & basilicę uenarū si uirtus & grās & tēps adiuuerit propens, educa sōne de sanguine plurimā quātitatē ut et defectus fiat. Si enim hoc feceris aut omni no extispabis aut proculdubio febrem leuiabis eiusq; breuiabitur tēpus nec deinceps patientis puerbis mortem . Si quando autem nec nirtus nec uirtus nec patientis complexio, sed nec tem-

pns suppeditat plurimi educationem sanguinis semel, educas tamen statim paulatim aut pedetentim iuxta quod hęc subministrans, febris etenim hoc modo fiet lenior . Post sanguinis uero minutionem necesse est nearis granatorum dulcium & acerborum aqua cum fquingibin puro aut tamarindorum aqua cum iuleb aut robo heferem aut robo prunorū mazorum aut robo hemmaceae etegi in alia hemmazean tegi similibusque cum aqua frigida & niue. & si quidem xstatis fuerit tempus cibabis enim die minutionis sanguinis si quidem uirtus est ualida mezanro facto acetari spinachijs aut lactuearum radicibus aut portulacę nigulis aut liligis in alia cucumeris & citruli medula cū aqua heferem aut granatorum aqua aut aqua acerborum citoniorum aut berberis succo, & masso . Cum autem debilis erit uirtus patientis die phlebotomiz pullorum oportebit apponere iusculum aut tangorum aut franquillorum & horum similitum . Mane facto post sanguinis minutionem intueri si morbus hic de peracutia est aut de acutis continua quibus mora est immiata . Ex si quidem de morbis est in ultimo positus acuminis quē minime diem transgrediatur quartum ualidatque nirtus abstinetur patientem cum solo iuleb aut benefegi siropo & granatorum aqua mazorum aut robo heferem . Quod si debilis fluctuat uirtus aquam propina hordei cum mazorum aqua granatorum aut si de morbis est acutis qui diem non transcunt septimum & uirtus ualida sufficiat patienti diei principio mazorum aqua granatorum cum zaccara aut iuleb aut aqua emeae citrini cum zaccare & robo heferem in quo nihil sit ponticis . dehinc autem duabus horis aque hordei. dra. 40. dabis cū zaccare albe & optime dra. 10. iam aut ad hoc horis transseuntibus. 4. fquingibin. dra. 15. dabis zaccare simplicis cum aqua fri. Sufficiatq; ei habuum feminis psilij & citoniorum feminis cū iuleb aut aqua granatorum . Si autem hanc dederis illis siropum manifestissime proderit. A fignatio eius. Sine pruna dalia magna triguita tamarindorū. l. 5. decoque utrunq; in. 3. li. aque donec ad librā redeat . Colabis & mites desuper granatorum aquam mazorū & aquam acerbam citoniorū cuiusq; mediū lib. & temperato decoque igne donec ad dimidiū redeat tunc superadde zaccare mandisimē libram & quā drantem . I. aqua rosa optime bullies spumam quę separabit ut frigescat ab igne dimittas . Du bis autem ex eo una quaque nocte dragmas 15. & ab eis usq; 20. cum portulacę semine diligenter terito. Quod si & calor fortis est & sitis grauis, oportet tunc addere feminis psilij 12 habi, dra. 5. & spodium. Quod si infirmus debilis est aut dum sanus est copię comestitionis defu-

suctus,

fectus, & bis in die comedere oportebit te bis ei hebeheili in alia hordei a quam in die bis dare. Qd si hec illi nō uidebis sufficere cōmodū erit in fine diei biscozū diligēter tritum cū zaccara dare & aqua ru. vel tritici succum & papaueris aqua lotum ca. deinceps refrigeratum cum zaccara alba. Quod si & hec non placent aut defuit dabis acetum & oleum cum citroli medulla & cucumeris ac amig. oleo zaccara optima & alba defuper comminuta cum niue & similia. Si quando autem est morbus cuius sit ad 14. uel 7. vsque 10. attingere oportebit patienti ut dictum est aut solis ortum melonis a quam dare & granatorum. aut de siropo quem assignauimus cum citrolo & indico meloue & post solis ortum hordei a quam cum zaccara. 4. autē hora potum dabis quingibū simplex cum frigida & cibo reficies pauco cum mercuris ex his quae diximus factis oleribus scilicet cum hescere aqua aut alia. Si quidem uirtus debilis est & egro to bius in die comestio sit. Quae uero in longius quam dictum est extenduntur infirmitates ampliori hoc reficiantur & grossiori cibo quemadmodum iam alias assignauimus morborum regimina. Scrueris autem cum his pariter naturā & si siccam uideris emollesce cum cassi. rotula & terengebino ac tamarindis iuxta quoddā necesse uideris dabisque infusa uiolarum siropo. pruna haec si non patitur praepara ei assaifum de cathemia. & buraco. & zaccara factum ru. Sumatque aliquid rechabini quod est machalum corrolani ca faciatque ex eo assaifum & subimittat sibi & si non obedit horum cuiquam natura clysteri utere molli de zaccara & oleo sisami ac muri factio, aut & de hordeo tunso & uiol. blitorum solijs sebestem uiolarum oleo zaccara ru. aut blitorum aqua expressa zaccara sisami oleo muri & similibus. Ex si quidem carcerata est natura patienti hordei a quam dare caueas. nec reficias nisi postquam quae emollescit adhibueris naturam. Sic quoque quando aget phlebotomia infirmus a quam non expedit dare hordei si non adhibueris sanguinis mutationem. Sic quoque si infirmus in quouis membro dolorem inuenient interiori non oportebit aut aquam hordei aut cibum nisi cum sedatus dolor fuerit dare. Ex si lingua asperatur aut nigrescit panuo lino in lababū pilisj feminis infuso extergatur & oleo amigdal. dulcis ac zaccara munda. Quod si grauis est sitis lababū seminis pilisj dabis & iuleb & amigdal. dulcium propinabisque cucurbitae esse aquam cum granatorum aqua & melonis indi.

Quando autem cōtinua est febris ex cholerg ru. patre die & est acuminis fortis calorq; ingrauescit tertiana vi est febris quae causon uocatur & incendium, tunc multiplicare necesse est quae refrigerant & extinguunt quantum po-

teris, hoc n. regimen utilius omnibus quae in hac facere poterit feb. & siquidē immoratur maturitas & crisis nō inest ei lesio. Si qñ uero breuius sit sub in alie sine hoc regimine fallax est patienti. Ideoque oportebit diei principio cucurbitae aquam assate dare quantum 30. sunt dra. cū drach. 10. iuleb. & drach. 5. abefari. quoddā si & sitis comitatur morbum & turbatio grauis oportebit cum cucurbitae aqua camphorae trochiscos dare & post pusillum aqua hordei cum grauis porrigenda erit eunti ditum aquam citrulli & pepontis propina cum iuleb & cum papaueris sirop. quem antea diximus cum spodio, drac. 5. & portul. seminis. drach. medullae citrulli drac. & seminis cucurbitae. drac. 5. hoc totum sit si qui dem tempus est aestas aut ver, & refrigeratū cū uiue refrigerabis et hepae & stomachum cū pāno lineo cōditu in ceroto & refrigerato de intiba & coriandro & portul. facto & aqua ro. percussa cū cera alba liquefacta cū ol. ro. & oliuo. ac modico aceto uini refrigeratū cū niue siquidem est aestas tempus. Si uero hyemis est tempus sit cerntum tepidum & oportebit si tempus est estiuum odorare nigisar & uiol. recentem & sand. aquam ro. & camphoram & sit locus eius frigidus aut quem perurat aquilo, aut infusus aquis & aquilioni patus sternaturque calefo. & ros. pomorum floribus citoniorum sitque eius in circuiu uasa fictilia aqua frig. & uiue plena proiecianturque in ea lapilli ut condelectetur eis & resulgeat infirmus. Oportet autem locum quo iacet frigidum esse ex pannis frigidis permittasque illi aerem trahere frigidum quo calor extranaturalis extinguatur & calor confortetur qui in pectore est naturalis & corde prohibeaturque opērimēta intra corpus calorem ardeare qui dissoluatur, nec decet infirmum uerborum producere copiam clamoribus in domo & secretis. Nec desistas huc illum disponere regimine donec ad statum morbus surrexerit & p̄sens creticus sit dies, tunc enim cibum subiliare ultima subtilitate satutque sit iuleb & granatorum aqua & pomorum mizorū & siropus uiol. donec compleatur crisis & declinet morbus tūc intueudum est si crisis sudore sit nec in nulla est dubietas educas frigidū patientē loco ad minus frigidum. quoddā si hanc uideris crisis speciem eodem permittas loco completa crisi declinante. huc morbo infirmum regimine a morbo surgentem rege ut alias dictum est. Si quando autem morbi aliqui supersunt reliqui in corpore quae non dissoluantur & in uenis humorum resstant reliquiae quae subeliatione egeant & emissionē aqua intibe egroti dauda est aut aquesuū succus decoctus & dispumatus de una quaque dra. 20. cū uic. 5. quingibū femine tribus aut quinque diebus, hoc enim grossas subtiliat reliquias & emittit & meatibus hepatis congruum est, uel

nam prouocat suntque in eo contra febrium reliquias utilitates plurimæ, quod si natura in hæc est licet habitudine ante perscorum danda est infusio, purgat enim ventrem & educit humorum reliquias calidiorum facile & sine molestia, & hæc est assignatio infusionis. Sume prunas. 20. & totidem iuiubas. 30. scabellum pomæ, vñz passæ cor rosanice & purgæ à granis. drach. 20. tamatin doris. dra. 20. ros. r. dra. 7. viol. optimarum. dra. 4. senememuti in alia senemecie drac. 7. sumiterra. drac. 7. feminis iotibæ a quessuti cuiusq; dra. 4. feniculi leminis ani. drac. 2. miro. citri. dra. 1 5. mitte hæc omnia in 7. vel aq; dulcis & bullias lento igne & mitte in phiala die ad solem cuius os latum sit. nocte autem in domo non humida fumaturque de eo post. 4. dies, vno quoque die. vnc. 4. cum. vnc. squingibiu. & vnc. sirop. viol. Oportet ergo huius dominum feb. hæc arctare regimine: caueasque infirmo peccare. minima namque transgressio in morbum patientium acutum magnum facit nocumtum siue in cibo sit siue in potu: aut si non suo vtaris tempore. in morbis autem prolixioribus paruum non apparet peccatum, nisi aut multiplicetur aut frequenterur,

De medicamine febris composita. Cap. XLII.

Compositarum vero febrium medelam compositam esse oportet ex simplicium medelis febrium. Necesse est enim hanc intueri febrem & habitudinem eius vtique diligentia discrepationis & perceptionis ac regularum artis & inde poteris utrum febris ex duobus composita sit humoribus cognoscere vel tribus aut pluribus, & si ex duobus utrum cõtemperatis & commixtis simul aut quisque horum separatus in corporis est parte. Hoc quoque cum ita sit utrumque febres compositæ æquales virtute sint aut altera fortior altera & magis fallax. Si quando etenim æquales sunt oportet in earum cura regimen cõtemperare per medicamina & cibos cuique conuenientia alterum cum altero æquali teratione. Quod si altera fortior est altera erit regimen huius conueniens ut sit causa febris fortioris maior fortior & amplior, debilioris autem minor debiliorque. Si quando autem duæ sunt febres & altera fallacior oportet adhibere causam & regimen, febris que magis fallax est & periculosior quo securior fiat ihermus. Sic quoque necesse est facere in omnibus compositis febribus. Compositæ namque febres plures sunt numero & specie compositione diuersæ secundum augmentum & diminutionem nec possibile est earum unicuique compositæ & puræ tractatum ponere segregatum. hoc enim librorum longitudinem & explanationem faceret, sed oportet harum dispositionem febrium exerceri plurimum

in febrium simplicium medelis & agnoscere cuiusque separatim formam & causam. Si enim perfectius hoc nouerit possibile erit ei mederi omnibus que ex his componuntur collationis uelocitate & bonitate. Exempli causa. Febris que dicitur hemitriteus composita est ex quotidiana continua & tertiana fixa: & est difficilis febris fallaxque plurimum. patientis etenim hanc corpus nō dimittit feb. propter continuitatem. quod uero tertianæque repetitionis sue accestionis temporibus. hoc ergo die difficilis est & generatur in ea casus confortatur calor uirina tingitur, corpus turbatur & fatigatur fortiter propter duarum coadunationem febrium in corpore. Sæpe autem sit hanc in hecicam transire febrem nimia corporis debilitatione & humidiatis cõsumptione. Huic ergo in principio oportet patienti aquam hordei cum zaccara dare, dehinc tribus completis horis squingibis & iuleb cibabis illum accestionis die mezzurofacto de eucurbitis massa atriplicibus spinachij, aliquando zirabago aliquando cum aqua granatorum. die autem quo sit accestio pullis & tangia cum elpidabago aut zirabago. reficies autem affatis cum aqua romaniarum & heferẽ, dabis autem accestionis die succum portulacæ feminis tritici optimæ sineai cum iuleb. & aqua frigida ac medullâ feminis citroli. & si quidem uideris hac in febre patientis corpus bene se habere nec accidere illi maciem & siccitatem. uale erit emolliri naturam quibusdam temporibus cum modico castig. listu. & tamarindorum adijciatque parum turbit quandoque autem elysteri emollienti, sitque regimen tuum in hac febre secundum virtutem alterius passionis feb. & si quidem tertiana fuerit fortior feb. & grauior & magis lædens sit tui ad exingendum calorem propositum & euacuationẽ cholerae rui maius. Si uero sit quotidiana fortior & robustior sit tibi maius accuratiusque subtiliare humorem euacuareque phlegma propositum. Quod si uirtute æquales sint, sit tibi propositum medelam aptare & cõtemperare ex duobus. quod si prolongatur se. trochiscos dabis spodijs molles cum squingibin diebus continuis, & si quidem uideris calorem fortem urinam rui. & in pulsatenuitatem & duritiem ac celeritatem corpusque consumi & deficari oportet camphorę trochiscos dare. post quos hordei aquam regesque illum quibus hecica gubernetur, mollarisque & refrigerationem corporis & homestationem quantum poteris quemadmodum in febre hecicæ causa dicturi sumus.

De medela febris qua dicitur epileas & lipareas. Cap. XLIII.

Medela autem epimalos atque ipsa est febris qua

qua sentit simul febricitans frigoris & caloris accessum, & sit ex phlegmate grosso & vitreo hac autem enim acciderit febris, videndum est regimine phlegmaticæ festim ab eius medela à calengebin usq; vnoquoque die. drach. 8. accipiens & diligenter masticans post quod aquam bibat tepidam, duabus abstinere horis squingibin zacchar. 3. dabis. vnc. cum seminiibus. quod si frigus est grane & vrina cruda sit: & calengebin & squingibin fumantur cū melle, sitque cibis eius pullos paratos cū espidabago aut cirabago, aut patellatus cū cinnamo & caruihisq; similibus. Transactis. 7. diebus hoc illi medicamen dabis cuius hæc est confectio. Sane herregi in alia heyregi. drach. 1. agarici. drach. 2. arienies aloes hepatic. drac. 5. tere & criba subtilissimo panno. distemperatumque cum squingibin porriges diluculo: sorbebitque post illud aquam calidam cum calengebin, & si quidem stomachus eius debilis est xilo aleos & mastic. modicæ addice. Sin autē, sed est in eo ardor trochiseos cū squingibin dabis. Introduceas autem illum omni die balneo nec tamē sit in eo diutius ne forte liqueat humoris subtilitas, remaneatque eius grossities. Utatur autem simul subtili & temperata fricatione per totum corpus dehinc reges illum omni quo phlegmatica. febr. regitur regimine. Hoc quoque modo reges liparcon patientem & febrem quoque æstuantem. hæc etenim ex crasso phlegmate fiunt & viscoso febres, vnde etenim phlegmaticæ feb. cutādæ sunt regiminæ ac secundū q; maturitas humoris & cruditas indicabit. Si ergo humor est crudus subtiliantibus rege illum ut calengebin, & masticæ, cum aqua decoctionis seminis feniculi & apij ac anisi, dabisq; squingibin melleum, & squingibin hanfali enim aqua hesse, aut fautenegi montani aqua absinthij cum trochiscis zurizedam: aliquādo cum squingibin. dabis quoque electuarium helshii quandoque non videtur esse necessarium electuarium etiam pipereon, sit hoc post maturationem & enacuationem per medicamen laxativum compositum deturbat. agarico, antiali adipē, hyera, granis lini, alijsq; quoru est phlegma laxare. Quod si non patitur tempus nec complotio nec ætas decoctione illum enacuet quæ sit ex mirro eheb. & indis, inductoque balneo supertorabis corpus eius aquam decoctionis babunegi aquam lilicem elect. hesse. fautenegi, fricabisque corpus eius oleo in quo decoctus sint camomilla. fibna, quæsumum sebeni aut costi oleo.

De medelis feb. quæ aut. 5. aut. 6. accenditur dis.
Cap. XIX.

Cæterum feb. quæ aut. 5. aut. 6. accenduntur.

tardie, quoniam semper fiant ex humoribus cholera. n. nimium grossis in earum necesse est medela regimine uti quo quartanis medetur subtiliatione scilicet humoris euacuatione eius per medicamina cholera n. laxantia & subtiliatione ciborum commestitionis dimissione, vsu quoq; gusti trochiscorum cum squingibin aut calengebin. Aliquando cum ieiunus est in alia dum rem virtus est accessionis die vomitum cum squingibin quo infusus sint fugiles incise & anetum & sal indicum ac mel, omnibusq; his similibus quibus in medela utimur quartanariorum si tempus eorum proteletur.

De accidentium medelis quæ febres sequuntur.

Cap. XX.

Febres moleæ & diuersa sequuntur accidentia quorum quædam similia sunt febri complexionique eius consonant, horumque medela eadem quæ & febri, quemadmodum accidit cephalæ in feb. vaporum causa calidorum qui in capite ascendunt, eritque medela feb. & cephalæ eadem species regiminis. Quædam autem ex habitudinibus sunt morbo dissimilibus quorum etiam medela dissimilis est. & si quidē proposuerimus aliterius causam magis alterum augmentatur. Quare oportet quod natura eorum fortius sit & dominantius intueri infirmo, & ad id nostrū conuertimus propositum, eritque nostra maior cura in morbi medela consumanda, & siquidem morbus erit fortior & maioris periculi erit nostrum maxime propositum ad morbi medelam, nec tamen omnino prætermisso accidenti. Quod si accidens fortius & ab eo eo maior urget timor eminentior ma sit in medendo accidenti causa non tamen neglecta causa morbi. verbi gratia. In quouis hominum febri est sanguinea eiusque medela ut non minus sanguinis est minutio nisi quod stomachus eius debilis est fastidiosus quæ accidit causa aut eiborum in stomacho eorum corruptorum. unde & morsura ac defectus illi accidit & antihæ conturbationes ideoque virtus eius debilis facta est, in hoc ergo phlebotomiam non oportet antepone. Si enim huius passionis uir phlebotometur eius virtus augeat dedilata. dissoluturque minutiois causa caloris naturalis quæ sit sanguinis eductione, præponenda ergo stomachi medela & confortatio eius ut quæ sunt illius redificentur, dehinc patientem sanguinē minue. aliud exemplum. patitur quis acutam febrem, sed & defectum urget non necessitas huic patienti dare vinum ut nutrit illum ut quæ calefacientibus eo quod defectus timeatur virtutis talis, tam & si vinum febrem augeat defectus nanque maioris est periculi, hac ergo oportet ratione curare feb. & accidentia illa sequentia oportet

oportet omnesque cum quibus sunt accidentia morbos, quemadmodum in colicæ sit dolore si plurimum fuerit grauis necessaria sunt quæ dolorem mitigant & tranquillat quâvis morbi augeant materiam. Accidentia autem quæ febres sequuntur multa sunt & varia. est enim rigor & horror & cephalæ vigilæ, iustus, appetitus ciborum corruptio, nimia naturæ molles, & siccitas vomitus defectus sudor nimius. Et rigoris quidem ac horroris medela est vt de sillis aquamca, sorbendam stringatque lacertos crucium latis panqulis, fricabitque plantas pedum & quiescat ponatque sapius manus & pedes in aqua cali, plurimisque operietur. Quod si hæc accidunt sæpius & plurima, oportet corpus manibus plurimum fricare, temperatque ut communis fiat omnibus membris corporis ipsa fricatio tempore quo non insunt accidentia, & inungatur oleo in quo decocta sit hessa camomilla, sautenegum montanum costum & similia. Ex siquidem feb. phlegmatica fuerit frigusque multum & forte, oportet hæc olera misceri cum modico pipere & gendebadaston, & agarico si enim bibatur de eo, drach. i. vsque essigium prodest rigori qui ex humoribus sit phlegmaticis, & grossis viscosisque, sic quoque sautenegum fluuiale si eum aqua mellis bibatur idem facit. Cephalæ quæ sit cum febre medela est vt super caput fundatur aqua ro. acetum vini & oleum racheloi in alia ro. si quæ acetum pari una, olei duæ. aqua. ro. 3. Quod si aliquid addideris portulacæ & aqua citroli semper iug aqua aut aqua rasuræ cucurbitæ manifestissima vilitas sequetur. Si autem cum his aliquid sandali miscueris ro. vio. nifas, vilius erit. & si quidem his sedatur cephalæ sine. Sin. sume de opio obolum idest, farinz hordei & cashemie cuiusque. drac. i. aña sum memite corticem papaueris cuiusque. dra. 2. acras omnia diligenter & cum lactucarum di stemperabis aqua & portul. & modico vini acet. emplastrizabisque his caput. Naribus quoque oleum trahat nifas factum cum cucurbitæ semine, odoret nifas & uiol. recentes eiusque extrema ligentur fasciculis fricturque diligenter dabisque patienti cum aqua hordei aquam granatorum muzzorum. Quod si aliqui di intellesis choleraræ esse in stomacho cuius vapor ascendat caput squigibin & aqua ca. rere inducatque vomitum patienti & stomachus purgetur sequetur quæ syrop. helerem, & syro. tamarindorum granatorum quoque aqua & his similibus.

De appetitus defectu ciborum cum febre.

Cap. XXI.

APpetitus aut ciborum casus in febribus curandus est cum iocundorum odoratu ciborum ut pulis assatis in camino qui circumducti pasta

fuerint, eorumque scissione in facie & ore insuami odoratu quoque suic decocti & calidi panis optime compositi. odoratu quoque vini ribani ac froctuum ponticorum & redolentium ac eos suggendo materia proiecta, corpus fricetur ac oleo liniatur iocundo emplastrizetur os stomachi enim rameco & sandalo pomorum aqua & citoniorum ac aqua talcha in alia talba, & uleo calefi. Oportet autem ordinari patienti cibum ac dari ab eo quem diligit & quem veretur cuiusque suscipit orationem, nec negligatur huiusmodi accidens cura & diligentia. Relinquere enim cibum debiliat virtutem & dissoluit. Si autem acciderit appetitus ciborum defectus, his quos dimisit febris, scilicet a morbo surgentibus corpora eorum aliquo euacua medica mine laxatiuorum & emollientium quantitate qua eorum patitur virtus, aut quæ autem euacuari & purgari desiderant ut facilius sit illis naris. quæ in eorum cura regimine quod diximus exercitio pascu ut deambulatione, lectione & similibus & exercitijs, utatur fricatione, ante cibum sit. abtinthij modicum summant quasi sorbeant parū acetum hamsali. prodest namque plurimū prius autem apponantur iocundi odoris cibi ut calidis panis & assata calida ut pullos perdecis. cibi quoque muzi, sed & hij quos desiderat cibos in sua sanitate quos & commemoret, hoc enim appetitum confortat ipsorum adiuarque ad appetendum cibum.

De tussis & siccis & sternutationis medelis quæ insunt. Cap. XXII.

AT vero si febrem tussis comitatur in hordei aqua iuiuias mitte & sebestem & gilabi radicem rasam & tunsam. decoquantur hæc cum hordei aqua cum aquam patienti propinaturus es: viol. conditas in ea diligenter confrica. aut desuper uiol. syro. frigi. dabisque ei citoniorū seminis lahahum & seminis pitilij cum zaccara alba munda. & amigdalarum oleo dulcinem. sorbitionem quoque quæ ex aqua sit forfuriis dabis, aut quæ ex fabia siccis tritis cum zaccara amigdalarum oleo. heiregorumque reficies. Etiam cum spinachiorum mæzauo & farmaci & cabegi eum masso excoctato & coriandro recenti, & sicco, cum amigdalarum oleo dulcinem dabisque illis de hoc pnuere. Confectio eius sume eucurbitæ seminis medullâ cucumeris & citroli. vniol. cuiusque. drach. 4. spodij gumme arabicæ amilli, quæthire cuiusque. drach. vnam & 5. medulle citoniorum seminis. drach. 2. tere omnia diligenter & subtilissimo cribra panno. & propina de eo. drach. 2. cum inleab. aut dabis cum vortantundem zaccaræ mundissimæ. Porro sternutationio quæ in febre accidit si exuberet caput replet nirtatem debiliat corpus concutit, & aliquando etiam

etiam sanguis excitatur. Oportet igitur hæc prohibere oculos & nasum & frontem & collum fricando, et fluctuationem vero multiplici spiritali &que suppressionem extrema fricet corpusq; totum, maxime autem collum oleis humidis vt viol. aliquid; de eo infunde tepidum antibus & cataplasma ceruicem de super cum passo calefacto aut lana. & caueat huiusmodi fumum & puluerem. Si quando autem moratur sternutatio, eaque desideras pronoca cum lignorum immisione in uaso & ex caris extensioneque colli & oppositione narium radio sol. aut conculca odoratu, statim etenim fiet sternutatio.

De me. vigiliarum & obstupefactionis in feb.
Cap. XXIII.

SI quando autem uigilie febres comitantur patienti papauer recens dare expediat cum zaccara & propina illi viol. oleum & cucurbitæ seminis oleum conditum cum renentibus viol. caput cum recentibus emplastriza nioi. cataplasma illud aqua decoctionis hordei excoctiati & tnsi ac papaueris propinaque illi sit. papaueris & in aqua hordei mitte papauer cum corticibus suis & viol. recentem ac ros. camomillam cucurbitæ rasuræ eiusque semen tnsium & similia, & oportet te hoc facere siquidem non erunt uigilie ex crisis signis. Si quando autem sunt crisis causa patientem nullo modo mouere nec eius aliquo faciliare naturam oportet modo nec omni no infirmi caput laæi appropinques, affert enim. lesionem magnam: timetur enim ne turbet cerebrium, est enim in lacte dissolutio fortis, cuique ionenerit materiam dissoluit & dispargit. Quod si stupor patienti acciderit medeberis his que in causa obstupefactionis dicemus.

De medela mollitie natura siccitatis uomitus, sudoris multi & aridati qua sunt cum febre.
Cap. XXIIII.

QUANDO autem incarcerationa est natura patienti dabis castæ fil. & terengebin. tams rindorum prunorum, zebibi. viol. siccatum, rosarum, vniuf cuiusque suscipietem decoctionem. iuxta quod opus fuerit, dabisque ei lababum prunorum & cast. fil. aut aute prandinam pruna appones dulcia sine corijs insula inleth. aut viol. lris. & lebelabi cum zaccara rubea, & aquam duorum granatorum cum adipibus suis. Si non placent hæc & lædunt patientem medicaminum porrectiones transijce inclusioni naturæ. iam quatuor dies clystere vtere emollienti, ut est clystere quod sit ex blitis aqua expressa & zaccara ru. & silami oleo & muri, aut clystere in quo cadunt hæc. hordei tnsi excoctiati. drach. 30. sume. in. 3. aque si bria cas bulire donec ad libram redeat, tunc cō-

fricabis in ea casti. fist. rotularum drac. 30. & colabis ac projicies in illam olei viol. drach. 10. in alia. 20. & totidem muri. Aut etiam utaris aliafo. cathemie & buraci & zaccaræ. r. aut asiafo. na rengebin quod est massallum & ciber illum mezauro labelabi cum oleo amigd. cspidabago. fa. & o cum oleo oliuæ & muri. Cum autem in febre nimia erit uex mollities aquam suic ei cum gumma ara. & terra ciprina. dabis uno quoque die. drach. 1. sitque in ea decoctus fructus mirti aut citoniorum frusta. Dabis etiam seferengel in alia. fergedi sirop. & ribesi, dabisque puluerem factum de psilij semine, & semine safatemi in alia sciferemi frizo suauiter cum modico cimi no arabico & terra ciprina semen quoque meum & spodij partem. Cibabis autem illum mezauro & zirabago cum uis passis & granis granatorum, ac vngul. portul. aut pauco acerborum condito cum sumac aut heferem aut zeraquia aut biscoito cum aqua citoniorum aut aqua pomorum vel etiam pitorum. Si autem non conuenit aqua suic hordei propinari, propina saltem spodij trochiscos stringentes cum citoniorum syrupo. Quod si est mollities naturæ cum sanguine dabis illi in potu puluerem tami aut puluerem carabe cū sumac aut portul. aqua similibus que admodum hac in infirmitate separatim dicturi sumus. Si autem cum morbo etiam vomitus cōtingit granatorum, dabis siro. factum cum menta & ribesi robo aut citoniorum aut robo hese rem propinabis quoque. saccum pomorum & aquam eorum que muza sunt cum corticibus pstatiorum exterioribus emplastrizabisque stomachum cum sandalo. aqua ros. aqua pomorum aqua mirti. aqua quoque ros. & aqua calci. cum modico laudano & rameco. Simul autem insuedum si huius ventris effusio causa crisis facta est minime amputanda, sed permittenda iudicamus quandiu patiatnr oirtus nisi modum trāsgredietur & ultra vires fiat, & quod si fiet utaris his que naturam constipans ut dictum est.

De sudore. Sudor autem si exuberet nimiusque sit timeturque nutriti ne eo subruatur corpus patientis oleo iungi oportet helalech dato uel halembacho & aqua mirti & tutia trita cum aqua ros. nngaturque corpus oleo calci. aut pulueriza super illum rosam siccam coitritam & intueret si locus patientis calidus est amoue illum in frigidum quem aquilo combussit ut confortetur corpus eius & sudor retineatur.

De m. defæctus cum febre. Cap. XXV.

CUM autem febriam patienti molestiam subuerbis acciderit oportet quare contingerit speculari, & si quid est causa cholera ru. ad os stomachi defluens aqua rorabis frigida super patientis faciem os stomachi frica & nentrem, ligatus

ga eius manus & pedes cum fasciculis fortiter ut ad inferiora trabatur materia, apprehende os & nares ut calor ad interiora redeat naturalis, propina illi uinum tenue & aquosum aqua misce, sed & sir. Squingibin eua quaca. ultimus est in his ut choleram ab ore cogant descendere stomachi, aut cum uomitu educatur, quod si effusionis uentris causa defectus hic acciderit omnibus quae dicta sunt curabis excepto squingibin cum aqua ca. odore aquam ros. sandalum camphoram. fiat illi uentus cum aliquo irrorabisq; aqua ro. plurimum refrigerata uultum eius. dabisque ei panem oino infusum propinabisque pomorum siropum & siropum hespanicorum & citoniorum lincisq; stomachum succis stringentibus ut aqua citoniorum & miri aqua quoque astis ligaminibus. Quod si acciderit nequitia febris humorum malorum defectu, oportet hora qua febris ascendit ligari crurum lacertos, uerberaque manus & pedes. & talos quo educatur ab interioribus corporis ad exteriora materia & ab eminentibus atque à dignioribus ad minus digna membra, prohibebisque illum somno. Somnus enim materiam ad interiora deducit corporis, immergitque calorem naturalem. Prohibe etiam cibo ne forte occupetur in ciborum celebranda digestionem calor & non in inuratione materiae, sed ne & repletioni ad darur extinguaturq; naturalis calor. Si quando etiam siccitatis causa in principio accessionis defectus acciderit oportebit ante accessionis horam cibum apponere, sed cum iudicio, ut siquidem qui acciderit defectus difficilis pannum infusum in nino ueteri dabis ram tili enim uinum febrem augeat, sed tamen uirtutem adiunget utraque, ac corpus pascit, dabis quoque sir. pomorum & eoru aqua ac citonioru & eoru aqua, pedesque illius & manus liga & frica uirumque, trahitur enim materia ad extrema & declinatur fricatione ad exteriora. At uero si defectus minime fortis est cibabis patientem ante accessionem pomis, piris, granatis, quo his stomachus confortetur & uirtus feruetur uitalis. Quando autem iam inceperit febre defectus acciderit oportebit patientem pane cibare uino infuso calefacto quo eius ad membra acceleretur misio & humectet ea prohibebitque desiccari. Hoc ergo regimine oportet eum regi ac curari cui in febris defectus accidit. Omnes autem defectus species commemorabimus inferius & medelas earum cum de passionibus cordi dicemus accidentibus quoniam defectus ex morbis fit qui cordi contingunt.

De hectica febris medela. Cap. XXXI.

Febbris hectica si fiat in aliquo usque ad marcoris & consumptionis terminos, apparentque

omnia signa quae supra diximus, extenuatio & siccitas cutisque ossibus inhiementia, delicatior humiditatis complexionis uentris tennitas & consumptio decoris faciei & frontis. Aliaque quae disimus cum de hectica febris signis loqueremur, non oportet eius sanationem sperare. In morbi autem principio dum adhuc uirtus ualida est membra quoque carnosae, corpus optimū febrisque mollis, pulsus non tenuis durus, & omnia adhuc signa dubitabilia non manifesta adhuc sanari potest & espelli si regimine quo oportet regatur. Primum ergo quod in hac facie dum est ut sit eorum in aestiuo tempore in locis frigidis habitatio in quibus septentrionales perflent uenti aquaeque percutient. Sint in circuitu posita uasa fictilia in quibus aqua sit frigida & suavis, odorataque frigida, ut rosa, ninfar, uiuio, pomorum flores & citoniorum pirorumque, folia quoque calcis extra uinum & miri recentis sandali, aqua ro. & camph. laeant in loco stratisque leuibus similibusque. Si uero sit hyems sit in locis aeris temperati in quibus non horrescat, prohibeatque illum à labore motu, uigilijs, famae siti, coitu, nec sedet irae & tristitiae. Dabisque illi hordei aquam in omni die cum zaccara mundissima iuxta quod opus esse intelliges. postquam autem hordei aqua acceperit dabis ei iuleb aut papaueris tyro. aut iuiubarum. uoc. circiter duas cum aqua fri. Introducas illum etiam in aquae tepidae concham, eductumque refice pulvis humidis eductis conditis cum espidabago cum curbitis & lactucarū radicebus spinacijs atripli cibis. Quandoque autem fac illi forbionem de heneri latina & cum zaccara & amigdalaru oleo dulcium & atria. Nonnonquam uero cibabis piscibus recentibus optime conditis cum espidabago aut frictis cum oleo amigdal. aut assatis desuper proiecta aqua & sale. Quandoque etiam refice lacte à quo boryrum eductum est caprarum recentium grate corporibus sanarum. Aestiuo adhuc sit manifesta febris, sed est mollis lacte illum dulci refice maximeque assine lacte & ouis forbitibus. refice enim illi uile, medulla quoque, cucumeris & citroli lactucarum radices & intibae medulla condita ac similibus sitq; eius cibis, in diebus paulatim iuxta quod digerit stomachus eius uelociter & membra suscipiant. De fructibus autem illi dabis granata optima persica nabatica bene matura poma quoque similiter iuiubas recentes, non tamen multifacere oportet has, sicut quoque & uiz landabiles sunt si porrigatur earum quae oportet quantitas maturarum & musa de dulcibus & zaccara quoque cum humidis amigdal. & medulla feminis citruli & his similia. Non arceas illum aqua aye. reter in alia aqua frigida. reprimas autem illum ab omnibus calidis & siccis & projice super pedes & hepar eius infusum aqua r. & sandalo p.

nomina aut cerotum cum aqua. factum & aqua portulacæ, & queffare humidæ super niue cum oleo ros. & violaræ, oleo. ut autem in caluerit pannos frigidus immutat: odoret autem oleum violatæ & cooditum cum cucurbitæ semine, oleum quoque onifar: sitque eius uestimentum uctes lineæ molles & suauis: & si fieri potest q̃ cum sandalo & aqua ros. eius tinguatur uestes: anime eius uirtus augeat & membrorum. Hoc ergo regimine hecicam patientes febrem regendi sunt in quibus signa non appareat consumptionis. hæc enim habitum eorū confortant & ad sanitatem reduciunt. In quibus autem consumptionis iam incipiunt, apparere signa & febris manifesta est os cauere frigidum oportet aerem de forte cathartici accidant denturque illis quotidie ante solis ortum camphoræ trochisci cum aqua granatorum & aqua melonis iudi & cucurbitæ aut citroli, ut autem sol ortus fuerit hordei aqua dabis in qua decoctæ fuerint iuiubæ, & papauer & pionice desuper parum amygd. olei dulcium: aut seminis cucurbitæ olei quantum est exagium. Tribus autem dieocephis horis parum dabis syrup. papaueris aut iuiubarum, aut iuleb introducasque eos in concham aque suauis: in qua decoctum fuerit ninifar, niola cucurbitæ cortices sitque in media balnei domo, & in loco qui temperati sit calor & aeris. Nec omnino calidam ingrediantur balnei domum. nec locis in quo anxiantur sudentque: parum sicut in concha & temperatæ, egressisque corpus eorum inungatur oleo uiol. aut seminis cucurb. & odore trahant expectent paululum & reficiantur carnibus ruzzedatum condiciis cum espidabago cum amygd. omnino: sed & atria in qua sint cucurbitarum frustra aut lactucarum medula & reliqua que diximus. Vespere autem introducantur in aqua tepida concham quemadmodum in principio diei factum est & eodem tempore cibos: nec uero sumant: denturque eis dormituris iuleb, aut iuiubarum syrup. cum seminis psilij lahabo aut seminis citoniorum aut succo portul. seminis tritici & fricati cū aqua dulci, cum drach. i. dulcium amygd. utarisque in illo regimine refrigeranti ut diximus & humectantibus, & ceroto refrigeratio. Et hæc est assignatio trochiscorum camphoræ. Summe medullam seminis cucurbitæ & melonis in al. floxi galferi & medullam cucumeris, & citroli sefergeli, cuiusque drach. 5. ros. r. purgat. drach. 3. guin. ara. sandali albi, amili que thire. cuiusque drach. 3. liquiritiæ succi, spodij, cuiusque drach. 4. feniculi seminis. drach. 1. camphoræ. drach. 5. si que exagium dimidium. terantur omnia diligenter & distemperentur cum lahabo seminis psilij. Si sit autem cum hac febre naturæ mollicies hos dabis trochiscos patienti quorum hæc

est confectio. Summe papaueris albi medullæ colorazæ in al. semini. cucurbitæ medullæ seminis cucumeris & seminis citoniorū fricti unus cuiusque. drach. 7. guin. ara. spodij seminis hermaræ terre cipricæ. cuiusque drach. 3. amili. drach. 3. ros. r. mundati. drach. 5. camphoræ. drach. 1. tere omnia diligenter & cum lahabo seminis psilij. distempera & trochisca fac. ut quisque trochiscus exagij sit unus: propinabisque cum pomorum aqua ac cum citoniorum summo diluculo. Post solis ortum suicum hordei dabis cū aqua in qua decoctæ sint grana mirti aut citoniorum frustra, & prociues desuper gumma arab. & terram cipricam iuxta quod opus fuerit. Confectio utilium hecicæ febris si sit cum ea uentris solutio trochiscorum. Summe cucumeris seminis medullæ citoniorum cucurbitæ. frictorum cuiusque. drach. 5. terre armenicæ castanearum. cuiusque. drach. 4. rosa. foliorum r. granorum mirti, seminis emaze. carabe. cuiusque drach. 3. spodij. gummi arab. cuiusque. drach. 2. tere omnia diligenter & cum citoniorum distempera aqua: & trochisca quemque trochiscum exagij unius & bibatur cum robo mitti & aqua frig. summo mane. Sitque cibis patientis massum excoriatum & fruxum decoctum aut milium tuosum decoctum cum espidabago. In quo autem consumptionis appareat manifeste iam signa non tamen eo usque res deducta est ut sauari non possit: hunc quoque hoc eodem regimine concedet regere quo diximus utanturque camphoræ trochiscis summo mane cum lacte asinæ uel mulieris in quo aliquid bō bacis prociuum sit quoque eius spuma & pinguedo sit abstracta. hoc quidem si non fuerit febris valida illis & acuta: debine autem concha tepidæ aque introducat in loco largo & in media balnei domo & prope ianuam: sitque ibi temperatæ & egrediat in immergatur aqua frigida dulci siquidem tempus estas fuerit. Si autem sit hycas aqua sit tepida. deinde autem nogatur corpus eius oleo uiol. puro: & si fuerit factum cum cucurbitarum semine utilius erit. Propinetur hordei aqua cum papaueris syrup. tribus deinceps horis apponat aque tepidæ conchæ introitum in qua decoctæ sint uiol. ninifar. cortic. cucurbitæ & papaueris. & hordeum tunsum & excoriatum mesani flores & semen cathemig & cabezi & folia eius & folia lañca: rum semperuig & similia: sit in ea temperatæ egrediaturque & immergatur aqua frig. dolci. sed non multū: ut non percutiatur corpus eius ea & hispidum fiat. Qua egressus ungetur oleo uiol. & ninifar. uestes induat: reficiatur pullia & tangis piscibus quoque lapidosi aliis que cibis digestionis facilibus: nec impleatur cibo: sitque elicarum quantitas que cito digeratur. Facto autem uespere cum stomachus purgatus

est & cibo uacuus: tunc uti sorbitione oportebit que hac utilis est in infirmitate. Alsignatio. Sume arfugenz in al. lenticulz excoriatz. drac. 30. fabarum albarum tunfarum. drac. 10. masi sine corticibus: papaueris albi cuiusque. drac. 7. amygdalarum dulcium sine corticibus. drac. 5. coque omnia in tribus libris aque donec perfectę cocta sint & cola ac projice desuper aquam cucurbitę mure, & amygdalarum dulcium, oleum & fricabis desuper medulam panis simile quantum opus fuerit de qua forbeas. 4. unc. usque. l. 5. & in ea espedet aliquantulum & ingressus balneum conche faciat quę admodum in diei principio: ut autem egressus fuerit stomachusque eius uacuus est & omnia que fuerant porrecta diligenter digesta sunt & a stomacho descenderint. dentur eis que diximus hababa & iuleb: aut granatorum aqua aut papaueris syr. p. Cum autem febris non fuerit non incommodum erit lac suggere mulieris à mammis, aut lac asine accipiat cum mulgatur. Si sit autem calor & febris patiens omnino lacti non approximet: & dabisque lac uaccę à quo butyrum eductum est, sicut alio loco dictum est emplastreretur: pectus eius cum ceroto refrigerato. Si autem constituta fuerit natura quousque tempore detur ei cast. si. & manna aut lababum prunorum: sed & pruna nabatica infusa syrup. uiol. & similibus & caue naturam emollire: illa uisibile nanque est in hoc morbo. Si autem mollita quandoque fuerit puluerem tam dabis cum myrti syrup. & succo hordei cum gümma arab. & terra ciprina. aut dabis trochiscos spodij stringentes sed imminues eorum zafranum cum myrti syrup. dabis etiam hos trochiscos. utiles enim sunt ad huiusmodi. Al. signatio eorum. Sume medularum seminis ca. crelegi. cucumeris citruli. frizarum cuiusque. drac. 3. gummi ara. amygd. spodij. cuiusque. dra. 5. & s. seminis portul. & seminis emaza frizarum. drac. 4. sandal. al. drac. i. castanearum. dra. 2. camphorę. drac. 5. terę omnia diligenter & cum seminis pilulij lababo distempera & trochiscos unius fac enagij usque. drac. 6. bibaturque cum myrti robor: & pascatur lacte à quo butyrum eductum est in quo proiectum sit biscotum aut mezauro facto cum maslo excoriato aut lacte eiusmodi in quo decocta sint cytonio

rum frustra & pulueris desuper parum polueris glandium & misceatur cum castaneis & gaira & zafrano & benaco secco. Si autem peruenierit huiusmodi patiens ad consumptionem & marcorem: & certa est corporis siccitas & extenuatio consumpta que ex humiditas & celsit ab eo uenustas & decor nulla est curę spes: aut ad eius sanitatem uia nisi ut custodiatur uirtus: ut superfit aliquo tempore. Oportet ergo ad hoc illi lac mulieris dari, quod etiam de mammis eius sugat stilleturque super illius corpus lac dulce quod statim eductum est & si fieri potest in coucha, que lacte hoc plena sit, sedeat egressusque corpori eius icturatur aqua suavis in qua feceris bullire uiol. & uinifar. dehinc corpus eius oleo inuagatur benefegi puri. & ci betur pullorum carnisbus ac franquinis & salanis tritis in qua proiecta sint cytoniorum frustra & pomorum sirorum. parumque uini & loco cinnami frustum ayloaloes crudę, sorbeatque ioscolum: hęc quoque illi aqua carniui eduli subtilis: aut aqua pullorum cum aqua pomorum & citoniorum, & proiciatur desuper aliquid biscoti, hęc enim quędam cõseruant uirtutem custodia. sit autem aqua carniui hoc modo. Sume carnem & minutatim incide: & in uas lapideum uel lebetem projice ac sub eo ignem succende leuem: & cum ceperit aqua glutinosę esse coletur in uase & iterum igni apponatur. & quandoque glutinari incipit coletur & sic utatur cum opus fuerit eis quos. Ne uerò prohibeas illum ab his que appetit & proponas iocundos odores ut sandali aquam iteramazarataram, in al. meza. tam, camphoram, uaporetur cum sandali frustis & ayloaloes crudis, & camphora eius camisia tingatur cum sandalo & aqua rosa. & camphora. & sterneretur locus quo iacet odoribus & asfereno ninfar & ulol. & col. & fructuum floribus. & calefo. & siquidem est xestas in circuius eius uasa cum aqua frigida ponatur & lethaltrum iocudum. suque conuersatio loco quo est uenti transitus frig. quandoque etiam irroretur eius facies aqua ros. refrigerata. Utaris ergo in huiusmodi uiro hoc regimine & simili. Si enim feceris uix eius prolongabitur spatium aliquandiu nec accelerabit mors.

F. I. N. I. S.

A C T V A R I I

FILII ZACHARIAE

DE FEBRIBVS

LIBER.



De agnitione febrium.

Cap. I.



VM nihil aliud sit febris, nisi ob antecedentes causas, extenuationis caloris incrementum, multa variaque particularium febrium genera oboriuntur. alia enim diariae, Graecis *ἐπιεικῆς* aut *ἐπιεικῆς*, alia continua & continentes, illas *ἐπιεικῆς* Graeci nominant: nonnullae intermittentes, & aliquae quae in habitum iam transierunt, *ἐπιεικῆς* appellantur. Ex diariis quidem ex solo spiritu plus satis excoactio: continua vero ex putribus quibusdam humoribus, ut hecica, quae in habitu cordis febrium vitium abiecit, committuntur. Harum omnium maxime moderatae sunt quae diariae nominantur, quippe quae mediocri quadam occasione enascuntur. quaedam enim ex ambientis frigore aut calore, aliae rursus ex ira, aut dolore, aut cura, quem admodum nonnullae ex cruditate, vel lassitudine, vel alio quopiam eiusmodi gignuntur. Vocatur autem diaris, & uno fere die desinant, sunt tamen ipsarum quaedam, quae in quartum usque extenduntur. Atque haec orinatur, cum corpus non est impurum. Quod si cacochymia quopiam, aut alia incendio apta materia latuerit, ea seu originem, diarias calorem nascas, affectum in febrem quae ex putredine constat, commutabit, nec amplius iam ut diaris, sed ut febris ex putredine finietur. Neque id mirandum est, quando etiam diarias nonnullae in hecicas, vel postea pluribus docebimus, delabuntur. Ac diarias febres facillimeque curabis: verum quas putredo genuit, non ita prompte, eas tamen procedente oratione dignoscere etiam discas. Proinde diarias complures causas habere evidentes, frigore nimirum, vel calore, aut dolore, irae, aut lassitudine, atque id genus reliquis antecedentibus. Vrius in his ut plurimum non carent coctionis indicibus. Pulsus celeriter dilatatur, nec praepropere intro momentum differtur tamen

inter se, pro antecedentium causarum discrimine, quarum principia si non ignoraueris, modos quoque quibus alterari consueverunt iniectione manu dijudicare commodè poteris. adhuc egri in tolerando lenitas, solutionis in diariis celeritatem tibi ob oculos proponer. Ceterum febres quae ex putredine fiunt, aliae continue & continentes, reliquae intermittentes vocantur, atque illarum quaedam eundem servant tenorem, vigoremque, *ἐπιεικῆς* aut *ἐπιεικῆς* Graeci occupant, quod una eademque sit febris vis: aliae *ἐπιεικῆς* dicuntur, utpote quae una cum febri robore usque ad solutionem progrediuntur: nonnullae *ἐπιεικῆς* nominantur, quarum usque dum desinit vigor paulatim se remittit. Porro continentes (Graeci, ut dixi *ἐπιεικῆς*) peculiari nomine appellamus, quae ex sanguinis nimio fervore accenduntur. Continuae vero, Graecis *ἐπιεικῆς* nominatas, eas potius dicimus, quas humorum rariorum putredo committit. Ex intermittentibus autem aliae quotidie, quaedam tertio, aliae quarto quoque die reuertuntur, et nonnullae tardius quoto aut septimo redire feruntur, sunt quoque quae inordinatis accessionibus repetant, quas illi *ἐπιεικῆς*, nos vagas atque erroneas nominare solemus. Quae singulis diebus accedunt, quotidianae appellantur, atque ex pituita quoque extra venas putruit, consistunt. In ijs vrina circa initia cruda est, seba candida, aut pecturata: pulsusque contractionis velocitate, materiam quae succenditur indicat. Horror ergo eas primum prehendit, pulsusque inaequalitas ac tenuitas: deinde succenditur febris, & decem & octo horis, aut paulo plus minusve per accessionem occupat, nec illo plerumque cum iudicio sensibili desinit. Quarum autem accessio tertio quoque die accedit, ea ex flava bile, quae & ipsa extra venas vagatur, consistunt. Haec cum rigore ut plurimum inuadunt, dehinc febris usque ad boras fere duodecim extenditur, licet nonnunquam plus minusve perduret, pro humoris uideletis causa.

G g 2 fine

litie ac copia, & virium ægri robore, cutisq; perspiratu facili. Nullæ hic in vrinis coctiones sub iniuria apparent, & colore flauz rufæze visuntur, superque illæ calidiores, quæ liberaliori tinctura inficiuntur. Quædam earum sudores desistunt, aliz bilis flauz vomitu, ac eius per aluum egestione, & sanguine è nare erumpente desinunt. Pulsus in harum inuasiuibus non sentiuntur, vi in quotidianis, parui ac inæquales. Atqui quæ post quartum exacerbanitur, & quartæz nu cupiuntur, ex succo melancholico constituuntur. In his extrema primum refrigerantur, & deinde ita febris viginti horas perdurat. Vrinæ tenues sunt & albæ, quæ postea perturbentur, & pulsus, qualis in diariis. Cæterum febris vix quæque, ex anni tempore, loco adhuc temperamento, viuendi ratione, ætate, atque illis quæ singulos humores augere solent, discernitur, nam si quis ex his comitantibusque symptomatibus eas rite conicit, esiguum, ni fallor, aut nihil, quod ad exquirisimam dignotionem pertinet, cum lalebit. Atque hæc sunt simplicium intermittentium febrium notæ. Verum igoorare non licet, nonnullas ipsarum aut sibiipsis, aut alijs permixtas, multa intermittentiū febrium discrimina gignere. nam quæ tertio quoque die sceudent, duplicatæ, falsam quodam quotidianæ imaginem præbent, quod iam singulis diebus repetantur, sed ab ijs qui rectè iudicare nouerunt, ex accessione specie, & comitantibus symptomatibus arguuntur. nam qui rectum potest de simplici tertiana iudicium ferre, is facile duplicem quoque discernet. Quæ post quartum reuertuntur, si duplicantur, duobus continetibus diebus redeunt, vnoq; intermittunt. quæ admodum rursus, si forte fortuna quartana increuerit, triplexque è simplici euaserit, quotidianarum more singulis diebus accessione infert. Verum harum singular, enim qui accurate simplicem diiudicare nouit, siue duplices, siue triplices fiant, latere non poterunt. Quod si interdum quintanas, & sextanas, & septimanas, aliasque eiusmodi, & præterea uagas nominari audieris, ne has quidem, seu fieri nequeant, nullas esse arbitrare. nam cum quatuor in nobis humores reperiantur, ipsorum quisq; ubi immutatus est, multis uariisque succorum corruptorum species generat. quare pro corrupti quoque humoris quouis dominio, etiam accessiones repetunt. Porro vagæ & errantes, è turgenti quidem materia nascuntur, sed quæ inordinato atq; alij nondum confecto alio accumulato cibo compescuntur simul & incrementum. Cæterum quemadmodum duplicatæ secum febrium differentias constituebantur, & cum inter se permiscerentur, alia febrium genera oriuntur. nam quotidiana modo cum tertiana, mo-

do cum quartana miscetur, adeo, ut tres fiant inter se consistentes coniugationes, & vnaqueque pro humoris in corpore redundantis natura, sibi peculiaritèr parit accessione. Atque hæc ad febres interpollantes spectant: sed alia præterea est continuatum & interpollantium complicatio. nam nonnulli ex ijs quæ continuè accessione videntur, aut quotidie, quando videlicet pituita in veois corrupta compositur, aut post tertium, cum venæ bilioz humore abundant, aut quanto quoque die, cum atrabilis humor in venis infestat, cum prædictis intermittentibus complicatæ, aliis febrium differentias constituunt. nam modo quæ quotidiana accessione continua est, cum quotidiana intermittente, aliis cum ea quæ post tertium interpellat, quam etiam semitertianam, Græci *intermittens* priuatiim appellant: & demum cum ea quæ quarto die intermitit, implicatur. Sic & cum ea quæ post tertium exacerbatur continua, interdum quotidiana, aliquando tertiana, nonnunquam quartana, & intermittentes commiscerunt. eodem modo & continua, quæ quarto quoque die accessiones obtinent, cum tribus his intermittentibus permiscetur, quarum si singulares simplicesque agnoueris, in complicatis quoque discernendis haudquaquam aberrabis. Sed quia interdum *intermittens* & *interpollans*, ac *intermittens* audire contingit, harum etiam causas & discrimina cognoscito *intermittens* quam nostri *ardentem* vocant, è bile nimis effervescente, est, quando & è sanguine feruido originem trahit, ac vehemensissimo calore urget, & omnium facillime ad id quod res toleret propendit, quod tantum ardorem natura non ferat. nam aut iudicis causas molestias abigit, aut intanto alieni caloris impetu natura defatiscit. *interpollans* vero sunt dictæ, quod *intermittens* & *interpollans* hoc est blandè mitèr tepesciunt. non enim febrem vehementem accendunt. habent quidem horrorem evidentem, sed febris succedens horrori proportionè haudquaquam respondet, interdum uterque simul, & calor & horror perferuntur, frigidi & lenti succi modicè purres, hunc morbi faciunt. Denique *intermittens* satis magno horrore innadit, verum evidens calor ei non succedit, velut ex ipso quoque nomine patere potest. nā *intermittens* *intermittens*, hoc est igne, quod est calore deficit. nam oppidò quàm frigidus succus summa ante innatus, in accessione significationibus ab extrinsece facultate propellitur. quare horror committatur, verū calor nullus accedit, quod ne putredo quidem ei succo, qui satis ægrè corrupti sua natura potest, aduenit. Atque hæc sunt febrium quæ intermittunt, & quæ secus, genera. Superest etiamnum aliud febrium genus, quod *intermittens* nominant, omnium deterrimū, quodque prope-

propemodum curationem respuit. Vocant autem *invenio*, quod ex in habitum cordis recipiantur. nam cum affectio (ita nunc *dicto* interpretor) quædam afficiens cum affecto sit familiaris ac consuetudo, quæ haud difficulter commutari potest: & habitus, quod est *invenio*, sit cõstis & quæ ægrè elui potest affectio. non in inia febris, quæ cor afficiunt, eius calorem per affectionem immutasse dicuntur: quæ verò effecerunt, vi calorem in habitum admitteret, *invenio* peritioribus appellabuntur. Gignuntur hæ aliquando quod diarii succedant, ubi nimium vehementiori ira exarsimus, vel mœrore curæque iugi intabescimus. eas si quis principiis obsteri, curare facillimum est. Verum quæ ob partium præcipuarum inflammationes, & scirrhos, & tabem, ac reliqua magni momenti visis committuntur, omnium sunt longè pessimæ, quod natura duobus grauissimis malis relictari, propulsareque nequeat. Nascuntur quoque haud segniss ex inveteratis malignisq; febribus, cum cor iam ob præeuntem facultatis evolutionem vitium excipit. Inter has deteriorationis sunt notæ, quas *invenio* & *peritioribus* nominant Græci, in quibus vitalis vis emarcuit contabuitque, à quibus ægri ut euadant fieri non posse putantur. Itaque in omnibus hæticis febribus calor in toto corpore successus est, verum etsi nunquam intermitat, enim tamen ferè æger minimè sentit. At verò ubi cibum assumpsit, aut excitatus alicui studio obnixus incumbit, fe calidiorem fieri animaduertit. quod cum nonnihil difficiliss sustinuerit, deinde in pristinum statum redit. Pulsus iis parui semper sunt & densi, atque ut plurimum duri. Urinas reddunt quales in hæticis enumeravimus, proportionem generi morbi excessuque respondentem. Quod si malum progreditur, oculi cavantur, collabuntur tempora, frons mirum in modum aëret, palpebræ tardè attolluntur, oculi fordibus opplentur, & tabe defluxionibusque tentantur: & tandem in ipso hominum cæto, aut alijs quibusdam vitæ muniis, non secus quàm qui animo linquunt, emoriuntur. Porro illud quoque omnium postremum ignorari haud decet, quod ijs qui hætica febre corripiuntur, varie interdum ex quas putredo facit, implicantur.

De ratione vitæ febrientium. Cap. 11.

Quoniam febriem aliz sunt, ut diximus, diariz, quæ ex mœrore, aut iracundia, vel cruditate, lassitudineve, aut vigilia, vel alicuius partis inflammatione gignuntur: quædam verò in plures dies porrigitur, atque earum nonnullæ sunt continuæ, & aliquæ intermittentes, & continuarum hæc ex sanguinis serore co-

piæque, quemadmodum continentem, quas *invenio* vocant, constans: aliz ex eius reliquorumque humorum putredine creantur, ut nonnullæ sunt quarum calor in habitum abut: diarias sanè quæ vi longissimæ interdum quarum diem attingunt, ac magna ex parte eodem solvuntur, ubi primo atque altero die iam declinare ceperunt, haudquaquam amplius suspectas habemus, sed hominem boni succi nec admodum crasso cibo nutritum ablegamus, ac causa inspecta, ei aliquid quoque medelæ adaptamus, quod cum victu permiscemus. nam si ex refrigeratione, diaria originem sumpsit, ægrum, ut par est, calidis fovemus: si solis ardor eam genuit, refrigeramus. quod si cruditas peperit, cibo modico, eoque stomacho aptiori ac concoctu faciliorem nitimur. noxam item ex lassitudine contractam, quiete, ac moderatis quibusdam fomentis avertuncamus: eam verò quam vigilia creavit, somno sedamus, at quam mœrore excitavit, solando compescimus. sic diarijs quas inguinum tumores, *invenio* dicunt Græci, ut vulnere ictusve commiserunt iis quæ inflammationes leniunt, & medicamentis mitigandi vi præditis, ac dolore sedantibus est opitulandum. Verum ne ignorata ciborum facultate, ijs tempestivè, & ut decet, uti non possis, nunc paucis, prout maxime dabitur, eos potissimum qui febricitantibus & febribus iam liberatis conveniunt, proponam. Ac si gillatim quenque quo facultatem eius perfectam habere possis, explicabo. Atqui in quæ acutissimis ægritudinibus & præcipiis universi morbi, ægrum citra cibum potumque prorsus continere studemus: illic, ne naturam utpote à maximis affectibus oppugnatam, duobus vacuare permittamus, & hic, quia ab antea ingestis universis cibo etiamnum repletum ægrum denudò alio onerare, inutile iudicamus: quod non genus cibi, sed privatio potius iure vocari posuit. Prima porrò cibi oblatio dicetur, siquis modicum aque, cui saccharis quippiam admixtum fuerit, propinabit, eo nanque loco antiquorum mulsæ, ut nosti vimur, quod non ita, ut hæc, conspicuo calefaciat. Post id tenuis cibis nuncupabitur, amygdalarum expressarum succus, & pistillæ cremor, & si quis malo panico, aut cotoneo, vel appio commanducato, socum tantum degluterit. Inde sequuntur integri fructus æstivi devorati, & hordeni decorticati atque accuratè excoctum, & ex oleribus portulaca & atriplex, & si quod evidenter non exalfacit, ac ciceris cocti cremor. His verò plenioribus est, panis purus, & pisces saxatiles, atque ex iis magis qui duriori sunt carne. Post hos collocant pulli gallinacei & agni extre-

ma. Cæteri cibi validi iam sunt, atque exquisitè sanis præcipuè accommodati. Porro ex prædictis cibis vinum maximè calfacit, eoquè impensius, quo fuerit coloratius. nō quæ aquosa sunt, & parum dilui suffinent, (*χολερίαι* nominant Græci,) sunt ignava: quæ sanè cum eo quem postremo loco recensuimus, cibo æquiparari possint. Verùm quia ex numeratis cibis, alii ad succi bonitatem magis, alii minus declinare videntur: morbi corporaq; erunt spectanda. nam si copiosiores adesse cacochymiam si gnificabant, probioris succi alimentis erunt reficienda: sin morbus qualitate calidus magis erit, reliqui cibi sunt præponendi. Sed enim quoniam explicatæ sunt alimentorum facultates, quod qualesiq; ægris satis esse censetur: ea etiamnum, quæ quibus morbis magis congruere putantur, sunt subdividenda. Quare ubi quæ morbis superflui, vires expoluerimus, de accommodato eorum singulis cibo loquemur: ut in vnoquoq; ea quæ debent exequi, valeas.

De vitiis febrium continuarum. Cap. III.

ITaque ij qui febre continua corripuntur, alii morbis qui acutissimè moventur, consistantur, alij iis qui tardiori moru cidentur, ac in plures dies protenduntur. Qui acuti admodum sunt, ad quartum vsque pertingunt, qualis est angina, & pulmonis inflammatio, quam *myxema* appellant, ac febres vehementes, quos in inedia potius tenere oportet, aut modicum tantum aq; concedere. Qui minus sunt acui, vsque ad septimum perveniunt, cuiusmodi sunt febres ardentes, & pleuritis acutior. in quibus hordei decorticati coctiq; & amygdalarum cremorem ægros assumere permittere licet. Simpliciter acuti dicuntur, qui decimum quartum diem attingunt, quos iisdem etiam nutrire oportet. & si vltra progrediuntur, poterit aliquid ex iis qui ordine succedunt exhiberi. Attamen qui ad vigesimum aut vigesimum septimum accedunt, ita minimè cibabimus, sed cibos post illos facultate valentiores, præbebit. In omnibus enim virium modus, & noxii humoris copia inspicienda primum est, & coctionis signa, ac morbi acumen, ut advenibus vel dementibus nobis victus illis pro portione respondeat. nam si acute monetur motus, coctioque apparet, & vires sic satis validæ, ut spes sit illico solum tri, æger pleniori cibo non est onerandus, verùm modicè ac pro portione roboris morbi nutrimentum, futurum iudicium operiri oportet, quod ubi advenit, ac fidè, & ut decet, iudicavit, iam vires sunt reficiendæ, ad validiores cibos paulatim transeuntibus, nō autem inestigio, ne iis ægrius aggrauans alterius morbi auctorem evadas. Sin autem ægritudo

tardè monetur, necdum coctionis indicia existunt, neque magnopere cum tenui victu vsq; ad perfectum iudicium sufficere posse constat, paulo valentiori cibo viribus est succurrèdum liquidè in morbis omnibus in quibus vires dominantur, quæ prava malignaq; sunt evincere haud solent. Porro iam dudum didicisti, quomodo virum mensura exploratur, & humorū coctiones cognoscuntur, & morbi motiones discernuntur: quare tibi eeu hæc omnia edocto, seduloque præmeditanti, pro portione ciborum familiarium genera illis respōdentia erunt præscribenda. Atque hac ratione victus est imperandus, nisi recens aliquod insectans symptoma obstitit. nam si quoddam repentinum alius profluvium, aut sanguinis fluxus, vel perpetuus sudor vires defatigaverit, ut periculum sit ne iā æger in syncopen habetur, eum pro symptomatis portione reficere oportet. & si pulsus fuerit exiguus aut ablatas, aut æger etiam refrixerit, vinum ac reliqua calida sunt exhibenda: quippe hæc symptoma, totum victus modum ad se trahunt. Porro accessuum significationes si apparuerint, hic non secus quàm in intermittētibus, observare decet: adhuc iudicia, si quæ forte suspicamus, animaduertenda sunt, nec quicquam dandum: sed vires, decertantes iam, ac eeu excitatas opem aliquam ægro ferre nitentes, ab omni externo pondere liberas, sincere oportet. ubi iam eius tempus conspiciendū præterit, eas defessas recreare convenit, ita tamen ut neque alimentorum vim, nec quantitatem ante perfectum iudicium augeamus. quod ubi adest manifestum, inrepide iam nutrire possumus. Verùm ubi morbus citra rationem leuatur, neque inconsideratè alere, nec ita ut antea tenuiter victum insitueres: sed nonnulli cibi quantitati adicere, ac vires reuocantem reficientemque, morbi residuum expectare decet: utique si antea neque uacuatione fueris opitulatus, nec validum satis victum præbueris. nam si prius liberalius nutruisti, ac si opus fuit, purgasti: fortassis ab altera morbi invasione liberaveris. Nam quemadmodum ex ingenti succenso igne, ubi flamma emarcuit, ac contabuit, quædam in cinere scintillæ relinquuntur, quæ si denno nutrimentum naçtæ fuerint, magnum rursus excitant incendium: necum si quis eas arte exemerit, is quo minus secundo accendatur, impedit: ita sanè iis quoque qui non ex ratione iudicantur vsu veniunt. Nec ignorari oportet, quando, & quibus cibis sit utendum, quoniam etiam dies quibus morbus exacerbatur, hic cavere oportet, ne adveniente significationum tempore, cibis aliquis in ventriculo reperitur. ita namque morbus niget magis, ac malignior evadit. Adhuc uenit tendenda est, sanguis quæ quando, & quantum, & unde oportet, eeu

ceum iam antea docuimus, pro plenitudinis portione, ac febris modo, est extrahendus. Præterea alius antea enema in iunctis ablucenda est. expedit enim in omnibus febribus ut alius secedat maximè, nisi æger puris aliquid eduxerit, uelut in pleuritide ac peripneumonia & tunc contingit, tunc etenim non est laudabile, ut plerumque egerat, nam eo deterius isthuc censetur, quo plus excreuerit, neque priuatiim capite de lateris inflammatione dicemus. Insuper refrigerantibus potionibus ætus magnitudo minuenda est, cuiusmodi sunt, quæ ex uiolis, ex floribus nymphaeæ parantur, præcipue si calor caput obsidet ægerque insomnis degat, sic si in ore ventriculi, aut in cæcibus cæteris, mordacior quispian humor obfirmatus hæret, quæ ex aceto & facchar, quæ item ex acidorum malorum puniceorum succo potio conficitur, est accommodata. Atque alia aliis magis conueniunt, quemadmodum de iis sigillatim postea agemus. Cæterum ei qui ciborum facultates nouit, & morborum discrimina dignoscit, esse obscurum nequit, qui quibus congruant. Oportet tamen febrientibus semper exhibere, quæ refrigerando pro portione respondent, neque minus, inutile est enim, neque plus quam par est refrigerare, nocet etenim: sed in animo habere, num os ventriculi promptè à frigidis, neuue, aut alia quæpiam pars lædatur. quinetià, num thorax aduentitij cuiuspiam humoris pondere oneretur, & an pus languinem æger reiciat. tunc enim frigida sunt fugienda, & maximè, quæ tactu talia persceniuntur. Nam nerisimile est, quoddam quod potentia sit frigidum, etiam febres magnitudini posse auxiliari, præcipue nisi manifesta quæpiam offendens qualitas fuerit coniuncta. Quod tactu egelidum sentitur, ijs partibus quæ frigidis non indigent, quodammodo innoxium, nec molestiam inferre uideri possit. Cæterum, quia solo decocti hordei cremore par est ægros minimè acquiescere, sed nimio febris incendio ardentes, aliis quoque refrigerantibus quibusdam indigere: danda est, nisi aliqua, ut dictum fuit, causa prædierit, etsi anni tempus largietur, lactuca, & potissimum si squalidi uigilesque fuerint. præterea crudi cucumeres sunt concedendi, atque ex iis magis qui teneri sunt & copioso semine abundant. nam exterior pars quæ asperiuscula est, et durum succum gignit. quinetiam punicea dulcia acidis admista, nisi aliud obstitit, ac mala dulcia & uuas exhibebimus, quæ ninoz non sunt. his enim utimur, cum temporis spatio multam suam humiditatem exuerint, ac calor earum nimis in habitu abierit. Intubum quoque domesticum, (quod *σπινθ* Græcis dicitur,) si quod aliud, utique in calidioribus iocinoris affectibus idoneum est: cum aliqui diu os sit stomacho gra-

uatum. nonnulli uel folius succi eius usum plus profuerunt: quod refrigerando ac meatum infarctum liberando facit sit. Verumenimvero non omnia omnibus sunt exhibenda, sed qui alni profluvio tentantur, & os mentriculi imbecillum est assidueque uomunt, danda quæ nonnihil astringunt. At ea quibus alius est astricta, & ali quid, quodcumque tandem illud sit, è thoriace educunt, uitanda sunt: & ijs dulciscula potius conueniunt, quod lentorem quandam obtineant. Acidum uero quibus impacti sunt humores, ceu incidendi nim habentia, sunt præbenda: ut & ijs quibus alius supprimitur, quod natura sunt bilioli. nam in ijs qui non sunt eiusmodi, ea supprimendi nim habere uidentur. Atque hac ratione qui continua febre conflantur, sunt nutriendi: fecus uero quibus febris intermittit. quoniam neque eodem modo incendit, neque intermittens sibi mutuo sunt similes.

De uisâ febrium intermittentium, & primum de tertiana. Cap. IIII.

Tertianæ itaque, sine simplex, siue duplex fuerit, cum uehementer monetur, ægrique uires robustæ sunt, pissanz cremor pro uisâ conuenit: potissimum si copiose in accessionibus euacuationes uires non exoluerint, ut idcirco cibo opus sit ualentiori. Verum si mediocri motu cietur, atque ad decimumquarium duriora putatur, oleribus & saxatilibus piscibus est utendum: iis præcipuè diebus, quibus febris intermittit. Alius quoque: si sua sponte non secedit, clysmatis est excitanda, & nisi quid impedierit, sanguis est detrahendus. etenim in omnibus propemodum febribus sanguinem mittere, nisi adit quod interpellet, præstat. nam cum is post spiritum primum feruorem excipiat, & totum corpus afficiat, si eius quispian effluerit, multum caloris non detrahitur. Et quanquam à flaua nonnunquam bile febris per totum corpus deducitur: attamen hic, quippe qui promptè succenditur, et materiam subministrat: ac cum uniuersum permeet corpus, uniuersum quoque calfacit. quare si quid eius euacuat, multa quoque febris portio non diffatur. nam si ex latentibus & materie expetibus perspirationibus febrientes opem sentire est persuasum, febremque astricta ac densata cute uehementius accendi constat: an non, quæso, multo melius ægri degent, si humoris qui eam in uniuersum corpus distribuit, sensibilis fiet euacuatio? Quare cum neque ætas, nec anni tempus, neque alia quæpiam obstat uacnatio, nec mulier utrum gestat, in omnibus febribus cum uires patiuntur, ad renz sectionem est profugendum: ac bis ter pro febris magnitudine sanguis detrahendus, atque interdu, cum multis

multus ardēnsque sanguis ægrum aggravat, ad animi vsque deliquium vacuandus: adeo febriculis vtilis est sanguinis missio. Caterum nec alius quidem est negligenda, sed glandibus clysteribusque; est irritanda, atque eius cura habenda ne supprimatur. febre iam leuiori facta, modicè quoque purgantibus refrigerantia ac humectantia medicamenta permiscendum, quo purgantia quæ magna ex parte calida sunt, & turbandi vim obtinent, minus offendant, vacuare oportet. Ea tamen in morborum incrementis fugienda sunt, & maximè si materia sursum vergit, & cruditas adesse videtur. Quod si materia turget, ea, habita prius ægri virium ratione, est vacuanda. Porro altera post eam quæ de purgantibus pertractat, methodus est, diætæ, quæ medicamentis contemperantibus vitur, nam in quibus ob aliquem interturbantem scopum conferas uacuationes moliri formidamus, iis temperantia medicamenta sufficimus, partim coquentes, partim refrigerantes, aut detergentes, vel exobstruentes, vel omnia simul iuxta humores ægrum lædentes, seu priuatim post explicabitur molientes. Itaque tertiana simplex & duplex, eo quo dictum fuit modo, est curanda. Si uerò non secundum rationem soluitur, aut decimum quartum diem transeat, atque ita in eam abeat, quæ spuria non copatur, hæc quoque purgantibus est, tenuatis prius humoribus, & meatibus obstructione uindicatis, confodienda ac penitenda. Viētisquæ eò spectet, ut sit boni succi, & subfrigidus. nam quæ impensè frigida sunt, materiam cogere, ac meatus ferè obstruere solent: & calida, cum qui antea delitescibat, calorem excitant ac enocāt. Atque hoc propè pacto, uictus ratio & curatio in tertiana exquisita & sporia se habet.

De cura quotidiana & quartana. Cap. V.

Quotidianam, quæ à pituita ortum duxit, ne refrigerantibus medicamentis compescere oportet: sed alium astrictam glandibus & clysteribus inanire præstat. Viētum boni succi nec crassum eger sumat. Permiscenda autem cibo sunt, quæ incidere, tenuare, & meatus obstructionibus afferere, possunt, non tamen admodum calida esse creduntur. Vino potandus est tennior, & paucifero, in morbi quidem principio: at ubi iam tennior humor dissipatus est, etiā rufiore ac, si licet, tota uictus ratio in calidiorè migret. Tunc pastilli quoque, qui amarus nuncupatur, usus probatur, & si quid aliud hic opem ferre censetur. sed de ijs priuatim suo loco dicetur. siquidem medicamenta methodis admiscere, nec ea ceu exempli loco inferere, eorum est qui nullum in tractando ordinem obseruāt

Porro eodem ictu quartana laborantes sunt continendi, nisi quod humor qui hic infestat, crassior sit ac terrestrior, atque hic idcirco calidioribus quodammodo ac incidentibus magis opus habeat: cuiusmodi sunt, quæ ex reliquis acerbis concitantur. Caterum in omnibus accessionum significationibus ne aliquis in uentriculo sit cibus, qui mali pondus ingerat, studendum est. nam cùm natura, tempore accessionis, ad propellendum ea quæ affligunt exurgat, si quis intempestiuè nutriendi illi obstitit, dubio procul quominus ualidè noxios humores adoriatur, præpedit. Verum quia humorum species quæ uariarum accessionum sunt causa, ac ciborum medicamentorumque, & reliquorum quæ ad diætam pertinent, discrimina, prout alia antè explicata fuerunt, & alia postea docebuntur, non ignoras: iam ægri vires, & anni temporis dominium, adhuc locum, ætatem, & consuetudinem inspicere: atque ita ex omnibus commodatam atque in eadem ægritudinis serie collocatam cibi quantitatem qualitatemque colligere & coniecturare oportet. Namque ipsam perquam exquisitam distictamque rationem, in corporibus quæ ita temerè mouentur, aut quisquam vnquā, (quod sensum nostrum, antemque ea lateat,) assequatur. Atqui ad id quod fieri debet quàm proximè accedere, eorum est, qui omnia accuratè ac diligenter expendunt. Porro ex iam dictis, in complicatis quoque intermitentibus febribus medicamenta, cibum, & reliquam uniuersam diætam coniectura consequi, eamque pro portione inter se commiscere licet. nam qui literarum syllabas propè colligere didicit, is & uersus totos, & integras paginas perlegere ualet. Quare in simplicioribus & facilibus exerceri quare oportet, deinde ad complicata properare.

De febre hectica. Cap. VI.

IAM ordine ex febrium species succedunt, quæ hecticae sunt, quas, quod solidas partes attingerunt, omnemque nitalem humorem epotarunt, ac in marcorem concierunt, hand facile est curare. at tamen præuenientè antè quā solida occupent, subuenire conandum est. Itaque cuiusmodi ægri perquam tenui uictus ratione, quomodo eos qui continua febre conflictantur, habebamus, non sunt curandi, quoniā nullum hic iudicium expectatur, neque potius humorum materia subest, sed nec pleno quidem uictu opus est, quod is concoqui nequit, atque insuper febris inde incrementat. Quare medius, ceu optimus est præferendus, qui modicè refrigeret, cibusque boni succi ac concocti facilius dandus, cuiusmodi sunt pisces qui in saxis stabulantur, puta galei, & gobij, & id genus alij,

alij, quique ex minoribus duriori sunt carne, quales sunt scorpij, philomelæ: aut friabili, quali nullius constare videtur. Ex carnibus verò domesticarum gallinarum pulli, & quadrupedum pedunculi. Quòd si vires conuelluntur, vinum quoque tenue, album, & quod parum dilui possulat, est exhibendum. Cæterum familiaris ac accommodata iis potio fuerit, quæ ex fructibus æstiujs, & floribus refrigerantibus cum saccharo paratur, quemadmodum libro de medicamentorum compositione docuimus. Balnea porro iis sunt idonea, quæ corporis squalorem humectant: verum tepida esse decet, nec ullam resipere qualitatem. Nec tempus in ijs trahere conuenit, sed ubi modicè fuerint immorati egredi, ne quod ex nativo humore superest euascat & exhalet:gresso sorbitio quæpiam refrigerans dabitur. Non est vestium copia excalescendus æger, ne copiosius distilletur. Posthæc conuenienti cibo reficiendus. Quòd si solum exeuntem, melino, aut rosaceo, aut omphacino saltem oleo inunctis,

& meatus præcludis, & ne maior fiat diffusio humiditatem, intrò compelles, atque hoc quoque pacto opem homini tulisse videberis. Somnus cõtilandus est à cibo, ac querenda animi oblectamenta & relaxationes, ac quodcumque tandem cum refrigeratione humectare putatur. Denique hædicas refrigerationes, quæ & ipsæ plerumque non carent siccitate, & veluti ex morbo senium esse videntur, cõtrariis curare oportet, calfacientia & humectantia dantes, idque boni succi & cocti facilibus cibis, exercitationibus mediocribus & vinis odoratis, ac subfultis, atque in summa omnibus calefacientibus, sed non exiccantibus procurantes. Atque ut vno verbo complectar, in omni habitu affectioneque morboza, contrariis est pugnandum: hoc interim examinantibus, qua proportionem ac intervallo, corpora quæ nutriuntur, quæque offeruntur medicamenta, à commoderata temperie abscedunt. Hæpes & qua vitij morpia febricitantes corriguntur.

AVRELII CORNELII CELSI

DE FEBRIBVS

LIBER.



De febrium generibus.

Cap. I.



ENVS februm & in toto corpore, & vulgare maxime morbi genus est. Ex his una quotidiana, altera tertiana, altera quartana est. Interdum etiam longiore circuitu quædã redeunt. sed id raro evenit. In

prioribus & morbi sunt, & medicinz. At quartanæ quidem simplices sunt, incipiunt ferè ab horrore, deinde calor erumpit, finitaque febre biduum integrum est. ita quarto die reuertitur. Tertianarum verò duo genera sunt, alterum eodẽ modo, quo quartana, & incipiens, & desinens, illo tantum interposito discrimine, quod vnum diem præstat integrum, tertio redit. Alterum longe perniciosius, quod tertio quidem die reuertitur, ex octo autè, & quadraginta horis ferè sex, & triginta per accessum occupat, interdum etiam, vel minus, vel plus, usque ex toto in remissione desinit,

sed tantum lenius est. Id genus plerique medicis *intermittens* appellat. quotidianæ vero uariæ sunt, & multiplices. Aliæ enim protinus à calore incipiunt, aliæ à frigore, aliæ ab horrore. Frigus uero ubi extremæ partes membrorum inalescunt, horrorem ubi totum corpus intremittit. Rursus aliæ sic desinunt, ut ex toto sequatur integritas. aliæ sic, ut aliquantum quidem minuatur ex febre, nihilominus tamen quædam reliquæ remaneant, donec altera accessio accedat, ac sæpe aliæ vix quidquam, aut nihil remittant, sed ita ut continent. Deinde aliæ feruorem ingentem habent, aliæ tolerabilem, aliæ quotidie pares sunt, aliæ impares. atque inuicem altero die leniores, altero vehementiores, aliæ tempore eodem posttridie reuertuntur, aliæ vel serius, vel celerius, aliæ diem, noctemque accessum, & recessum implent, aliæ minus, aliæ plus, aliæ cum decedunt sudorem mouent, aliæ non mouent, atque alias per sudorem ad integritatem veniunt, alias corpus tantum imbecillius redditur. Accessiones etiam modo singulæ singulis diebus sunt, modo bi-

na, pluresve cōcurrunt. ex quo sepe evenit ut quotidie plures accessiones, remissionesq; sint, sic tamen ut uox quæque alicui priori respondeat. Interdum nero accessiones quoque confunduntur sic, ut neque notari tempora earum, neque spatia possint. Neque uerum est, quod dicitur a quibusdam, nullam febrem inordinatam esse, nisi uel ex vomica, aut ex inflammatione, aut ex ulcere. facili enim semper curatio foret, si hoc uerum esset. Sed quod evidentes causæ faciunt, facere etiam abditæ possunt. neque de re, sed de uerbo controversiam mouent. qui cum aliter, aliterque in eodem morbo febres accedant, non easdem inordinate reddere, sed alias, aliasque subinde oriri dicunt. quod tamen ad curandi rationem nihil pertinet, etiam si uere diceretur. Tempora quoque remissionum modo liberalia, modo uix ulla sunt.

De curationum diuersis generibus. Cap. II.

ET febrium quidem ratio maxime talis est. Curationum uero diuersa genera sunt, prout auctores aliqui habent. Asclepiades officii esse medici dicit, ut tuto, ut celeriter, ut iocunde curet. id notum est. sed ferè periculosa esse nimium, & festinatio, & noluptas solet. qua uero moderatione utendum sit, ut quantum fieri potest, omnia ista contingant, prima semper habita salute in ipsis partibus curationum considerandum erit. & ante omnia queritur, primis diebus æger qua ratione continendus sit. Antiqui medicamentis quibusdam datis concoctionem moliebantur, eo quod eruditatem maxime horrebant, deinde eam materiam, quæ trahere videbatur, ducendo sæpius aluum subtraherebant. Asclepiades medicamenta sustulit, aluum non toties, sed ferè tamen in omni morbo subduxit. febre uero ipsa præcipue se ad eius remedium uti professus est. Conuelliendæ enim vires ægri putauit, luce, uigilia, siti ingenti, sic, ut uel os quidem primis diebus elui timeret. Quo magis falluntur qui per omnia iocundam eius disciplinam esse cōtendunt, & iam enim ulterius quidem diebus eubantis etiâ luxurie subscriptis, primis uero tortoris nicem exhibuit. Ego autem medicamentorum dari potiones, & aluum duci non nisi raro debere concedo. & id non ideo tamen agendum, ut ægri vires conuellantur existimo, quoniam ex imbecillitate summum periculum est. minui ergo tantum materiam superantem oportet, quæ naturaliter digeritur, ubi nihil noui accedit. Itaque abstinendus à cibo primis diebus est, in luce habendus æger, nisi infirmus interdum est. quoniam corpus ista quoque digerit, isque cubare quam maximo conclusi debet,

Quod ad sitim uero somnumque pertinet, moderandum est, ut interdiu vigilet, noctu, si potest, conqueiescat. ac neque potest, neque nimium siti crucietur. Os etiam eius elui potest, ubi & siccum est, & ipsi faciet. quamois id tempus aptum potioni non est. Commodèq; Erasistratus dixit sæpe inferiore parte humorem non requirente os, & fauces requirere, neque ad rem male haberi ægrum pertinere. Ac primo quidem sic tenendus est. Optimum uero medicamentum est, oportune cibus datus, quando primum dari debeat, quæritur. Plenique ex antiquis tarde dabant, sæpe quinto die, sæpe sexto. & id fortassis, uel in Asia, uel in Aegypto cæli ratio patitur. Asclepiades ubi ægrum triduo per omnia fatigarat, quarto die cibo destinabat. At Themison nuper non quando coepisset febris, sed quando desisset, aut certe leuata esset, considerabat, & ab illo tempore expectato die tertio, si non accesserat febris statim, si accesserat, ubi ea, uel desierat, uel si assidue inhaerebat, si certe se inelinanerat, eibum dabat. Nihil autem horum utique perpetuum est. Nam potest primo die primus cibus dandus esse, potest secundo, potest tertio, potest non nisi quarto, aut quinto: potest post unam accessionem, potest post duas, potest post plures. Refert enim qualis morbus sit, quale corpus, quale cælum, quæ ætas, quod tempus anni. minimeque in rebus multum inter se differuntibus quod iniermittendum non est. perpetuum esse præceptum temporis potest. In morbo, qui plus uirium aufert, celerius cibus dandus est, itemque eo cælo, quo magis digerit. Ob quam causam in Africa nullo die æger abstineri recte uidetur. Maurius etiam pueror, quam iuueni, æstate, quam hyeme dari debet. Vnum illud est, quod semper ubique seruandum est, ut ægri vires subinde assidens medicos inspiciant, & quando supererunt, abstinentia pugnet, si imbecillitatem ueteti coperiri, cibo subueniat. Id enim eius officium est, ut ægrum neque superuacua materia oneret, neque imbecillitate fami prodar. Idque apud Erasistratum quoque innenio, qui quamois parum docuit quando nenter, quando corpus ipsum exinaniretur, diceo tamen hæc esse nescenda, & tum cibum dandum, cum corpori deberetur, satis ostendit dum vires superessent, dari non oportere, ne deficerent, consulendum esse. Ex his autem intelligi potest ab uno medico multos non posse curari, cumque, si artifex est, idoneum esse, qui non multum ab ægro recedit, sed qui quæstui seruiunt, quoniam iam maior ex populo est, libenter amplectuntur ea præcepta, quæ sedulitatem non exigunt, ut in hac ipsa re. Facile est enim dies uel accessiones numerare his quoque, qui ægrum raro uident.

ille afsideat necesse est, qui, quod solum opus est, uisurus est, quando nimis inbecillus futurus sit, nisi cibum acceperit. In pluribus tamen ad initium cibi dies quartus aptissimus esse cōsuevit. Est autem alia etiam de diebus ipsi dubitatio, quoniam antiqui potissimum impares sequebantur, eosque, tanquam tunc de ægria iudicaretur, *periculosos* nominabant. Hi erant dies tertius, quintus, septimus, quartusdecimus, uigessimus primus, ita ut summa potentia septimo, deinde quartodecimo, deinde uni & uigesimo daretur. Igitur sic ægros nutriebat, ut dicrum imparium accessiones expectarent. deinde postea cibum quasi leuioribus accessionibus instantibus darent, adeo ut Hippocrates si alio die febris desisset, reciduum timere sit solitus. Id Asclepiades iure ut nanum repudiaret. neque in ullo die quia par, imparue esset, his uel maius, uel minus periculum esse dixit. Interdum enim peiores dies pares sunt, & oportunitus post eorum accessiones cibis datur. Nonnunquam etiam in ipso morbo dierum ratio mutatur, sitque grauior, qui remissior esse consueuerat. atque ipse quartusdecimus par est, in quo esse magnam vim antiqui fatebantur. Qui cum octauum primi naturam habere contenderent, ut ab eo secundus sepienarius numerus inciperet, ipsi sibi repugnabant non octauum, neque decimum, neque duodecimum diem sumendum, quasi potètiorem. Plus enim tribuebant nono, & undecimo. Quod cum fecissent sine ulla probabili ratione, ab undecimo non ad tertiumdecimum, sed ad quartumdecimum transibant. Est etiam apud Hippocratem ei, quem sepius dies liberaturus sit, quartum esse grauissimum. Ita illo quoque auctore in die pari, & grauior febris esse potest, & certa futuri nota. Atque idem aliò loco quartum quemque diem, ut in utrumque efficacissimum apprehendit, idest quartum, septimum, undecimum, quartumdecimum, decimumseptimum, in quo & ab imptati ad paria rationem transit. & ne hoc quidem propositum conseruauit, cum à septimo die undecimum non quartus, sed quintus sit. adeo appareat quacunque ratione ad numerum respicimus, nihil rationis sub illo quidem auctore reperiri. Verum in his quidem antiquis tunc celebres ad modum Pythagorici numeri fefellerunt, cum hic quoque medicus non numerare dies debeat, sed ipsas accessiones inueniri, & ex his coniectare quando dandus cibis sit. Illud autem magis ad rem pertinet scire, num oporteat dari cum tam bene uenit conquieuerunt, aut etiam num manentibus reliquiis febris. Antiqui enim quàm integerrimis corporibus alimentum offerebāt. Asclepiades inclinata quidem febre, sed adhuc tamen inhzrente in quo uia ratione secuta

tus est, non quo nō sit interdum maturius cibis dandus, si mature timetur altera accessio, sed quo scilicet quàm sanissimo dari debeat. Minus enim corrumpitur quod integro coporti infertur. Neque tamen uanum est quod Themisoni videbatur, si duabus horis integer futurus esset æger, satius esse tunc dare, ut ab integro corpore potissimum diducereur. Nam si diduci tam celeriter posset, id esset opimum. Sed cum hoc breue tempus non præslet, satius esse principia cibi à decedente febre, quàm reliquas ab incipiente excipi. ita si longius tempus secundum est, quam integerrimo dandus est, si breue, etiam antequam ea toto integer fiat. Quo loco uero integritas est, eodem est remissio, si qua maxime in febre continua potest esse. Atque hic quoque queritur utrum tot horæ expectandæ sint, quot febre habuerunt. an satis sit primam partem earum præterire, ut ægris iocundius inlidat, quibus interdum non vacat. Tutissimum est autem ante totius accessiois tempus præterire. quamuis ubi longa febris fuit, potest indulgeri ægro maturius, dum tamen ante minime pars dimidia prætereatur. Idque non in ea sola febre, de qua proxime dictum est, sed in omnibus ita seruandum est.

De febrium speciebus, & singularum, curationibus, & primo quando cibis febricitantibus dandus sit. Cap. 111.

HAEC magia per omnia genera febrium perpetua sunt: nunc ad singulas earum species descendam. Igitur si semel tantum accessit, deinde desijt: eaque uel ea inguine, uel ea laesitudine, uel ex alio, aliave simili re fuit sic. ut interior nulla causa metum fecerit: postero die cum tempus accessiois ita transijt, ut nihil mouerit: cibis dari potest. At si ex alto calor uenit: & grauitas uel capitis, uel præcordiorū secuta est: neque appareat quid corpus confuderit, quamuis uanam accessionem secuta integritas est: tamen quia tertiana uimeri potest, expectandus est dies tertius: & ubi accessiois tempus præterijt, cibis dandus est, sed exiguus, quia quarta, quoque timeri potest. Et die quarto demum: si corpus integrum est: eo cum fiducia utendum. Si uero postero, tertio, aut quarto die secuta febris est: scire licet morbum esse. Sed tertianarum, quarinarumque, quarum & certus circuitus est: & finis integer: & quia liberaliter quæta tempora sunt expeditio ratio est. De quibus suo loco dicam. Nunc uero eas explicabo. quæ quotidie urgent. Igitur tertio quoque die cibis ægro commodissime datur: ut alter febrē minuat: alter uiribus subueniat. Sed his dari debet si quotidiana febris est, quæ ex toto desinat: simul atque corpus integrum

regum factum est: si, quâvis non accessiones, febres tamen iunguntur: & quotidie quidem incrementum: sed line integritate tamen remittunt: cum corpus ita se habet, ut maior remissio non expectetur. Si altero die grauior: altero leuior accessio est post grauiorem. ferè uero grauiorem accessiorem leuior non sequitur. quo fit ut grauiorem accessiorem non quoque trillitior antecedit. At si continuatur febris: neque leuior unquam fit: & dari cibum necesse est: quando dari dabit, magna quidem diffusio est. Quidam, quia ferè remissus matutinum tempus ægris est: tunc putant dandum, quod si responderet, non quia mane est: sed quia remissior est æger: & dari debet. Si uero ne tunc quidem ulla requies ægris est: hoc ipso peius id tempus est: quod cum sua natura melius esse debeat: morbi uisio non est simulque insequitur tempus meridianum: à quo cum omnis æger ferè peior fiat: timere potest ne ille magis etiam quàm ex consuetudine irgeatur. Igitur alij uespere tali ægro cibum dant. Sed cum eo tempore ferè pessimi sint, qui ægrotant: verendum est: ne si quid tunc mouerimus: fiat aliquid asperius. Ob hæc ad mediam noctem decurro: id est finito iam grauisimo tempore, eodemque longissime distante: secuturis uero ante lucanis horis, quibus omnes ferè maxime dormiunt: deinde matutino tempore, quod natura sua leuissimum est. Si uero febris uagæ sunt: quia verendum est, ne cibum statim subsequantur: quandoque quis ex accessione leuius est: hunc debet assumere. At si plures accessiones eodem die ueniunt: considerare oportet, pares uel per omnia sint: quod nix fieri potest: an impares. Si per omnia pares sunt: post eam potius accessiorem cibum dari debet: quæ non inter meridiem, & uesperum definit. Si impares sunt: considerandum est quo distet. Nam si altera grauior, altera leuior est: post grauiorem dari debet. si altera longior, altera breuior: post longiorem. si altera grauior, altera longior est: considerandum est utra magis affligat: illa uel, an hæc tempore: & post eam dandus est. Sed planè plurimum interest: quantum, qualesque inter eas remissiones sint. Nam si post alteram febrem motio manet: post alteram integrum corpus est: integro corpore cibo tempus aptius est. Si semper febricula manet: sed alterum tamen longius tempus remissionis est: id potius eligendum est: adeo ut ubi accessiones continuatur, protinus inclinata priore dandus cibum sit. Et enim perpetuum est, ad quod omne consilium dirigi potest: cibum quàm maxime semper ab accessione futura reducere: & hoc saluo dare quàm integerrimo corpori. quod non inter duas tantum, sed etiam inter plures accessiones seruabitur. Sed

cum sit aptissimum tertio quoque die cibum dare: tamen si corpus infirmum est, quotidie dandus est: multoque magis si continentes febres sine remissione sunt: quanto magis corpus affligunt, ut si duæ, plures uel accessiones eodem die ueniunt. Quæ res efficit, ut & à primo die protinus cibum dari quotidie debeat. Si protinus uenæ conuiderunt: & sæpius eodem die, si inter plures accessiones subinde uis corpori deest. Illud tamen in his seruandum est: ut post eas febres minus cibi detur, post quas, si per corpus liceret, omnino non daretur. Cui uero febris inflet, incipiat, augeatur, consistat, decedat, deinde in decessione consistat, aut si natiuræ seire licet optimum cibo tempus esse sebre finita. deinde cum decessio eius consistit, tertium si necesse est, quod aduocum decessit, cetera omnia periculosa esse. Si tamen propter infirmitatem necessitas urget, satius esse, consistente iam incremento febris, aliquid offerre: quàm incrementum. Satius esse instante, quàm incipiente: cum eo tamen ut nullo tempore is qui deficit, non sit sustinendus. Neque hercule satis est ipsas tantum febres medicum intueri: sed etiam totius corpora habitum: & ad eum dirigere curationem, seu supersunt uires, seu defunt seu quidam mali affectus interueniunt. Cum uero semper ægros securos agere conueniat, ut corpore tantum, non etiam animo laboranti tum præcipue ubi cibum sumperunt. Itaque si qua sunt quæ exasperata eorum animos sunt: optimum est eadem ægrotandum notitiæ subtrahere. si id fieri non potest & sustinere tamen post cibum usque somni tempus, & cum expectati sunt, tunc exponere.

Quando potiones febricitantibus dari expedit. Cap. IIII.

SED de cibo facilius quidem cum ægris ratio est: quotum sapie stomachus hunc respuit etiam si mens concupiscit. De potione uero ingens pugna est: eoque magis, quo maior febris est. Hæc enim sitim accendit, & tum maxime aquam exigit, cum illa periculosissima est. Sed docendus æger est ubi febris conquieuerit, protinus sitim quoque quietura, longior remig: accessiorem fore, si quod ei datum fuerit alimentum. ita celerius cum definire sitire qui non bibit. Necesse est tamen quanto facilius etiam satiem famem, quàm sitim sustinent, tanto magis ægris in potione, quàm in cibo indulgere. Sed primo quidem die nullus humor dari debet, nisi subito sic uenæ conuiderunt, ut cibum quoque dari debeat. Secundo uero, cæterisque etiam, quibus cibum non dabitur, tamen si magna sitis urgebit, potio dari potest. Ac ne illud quidem ab Heraclide Tarentino dictum

dictum ratione caret, ubi aut bilis ægrum, aut eruditas male habet, expedire quoque per modicas potiones miseri novam materiam corruptæ. Illud videndum est, ne qualia tempora cibo leguntur, talia porioni quoque; ubi siue illo datur, deligantur, aut cū ægrum dormire cupiemus, quod fere sitis prohibet. Satis autem conuenit, cum omnibus febricitantibus nimius humor alienus sit, tum præcipue esse formis, quæ ex partu in febres inciderunt. Sed cum tempora cibo, potioni quæ, febri & remissionis ratio det, non est expeditissimum scire, quando æger febricitet, quando melior sit, quando deficiat, sine quibus dispensari illa non possunt. Venis enim maxime credimus fallacissimæ rei, quia sæpe istæ leniores, celestiores sunt, & ætate, & sexu, & corporum natura. Et plerumque satis sano corpore si stomachus infirmus est, nonnunquam etiā incipiente febre subest, & quæscunt, ut imbecillus is uideri possit, cui facile laturo grauis instat accessio. Contra sæpe eas concitat, & resoluit sol, balneum, & exercitatio, & metus, & ira, & quilibet alius animi effectus, adeo ut cum primum medicus uenit, sollicitudo ægri dubitatis quomodo ille se habere uideatur, eas moueat, ob quam causam periti medici est, non protinus ut uenit apprehendere manu brachium, sed primum residere hilari uultu, percontari quæmadmodum se habeat, & si quis eius metus est, eum probabili sermone lenire. tum deinde eius corpori manum admoovere, quas uenas autem conspexit medicus mouet, quam facile mille res turbant. Altera res est, cui credimus, calor æque fallax. nam hic quoque excitatur æstu, labori, somno, metu, sollicitudine. Igitur intruere quidem omnia etiā ista oportet, sed his uō omnia credere, ac protinus quidem scire non febricitare cum, cuius uenæ naturaliter ordinatæ sunt, teporū; talis est. qualis esse sanis solet. Non protinus autem sub calore, motu quæ febre scilicet concipere. sed ita si summa quoque arida inæqualiter cutis est, si calor, & in fronte est, & ex imis præcordijs oritur, si spiritus ex naribus cum serore prorumpit, si color, aut rubore, aut pallore nouo mutatus est, si oculi graues, & aut persicci, aut subhumidi sunt, si sudor cum sit, inæqualis est, si uenæ non æquis interuallis mouentur. Ob quam causam medicus, neque in tenebris, neque à capite ægri debet residere, sed illi stri loco aduersus eum, ut omneis notas ex uultu quoque cubantis perspiciat. Vbi uero febris fuit atque decreuit, expectari oportet non tempora, partes uero corporis aliæ paulum madescant, quæ sudorem uenerunt esse testentur, ac si quæ nota est, tunc demum dare potui calidam aquam, cuius salubris effectus est, si sudor per omnia mēbra diffun-

dit. Huius autem rei causa continere æger subueste satis multa manus debet, eademque crura, pedesque; cōtegere, qua male plerique egrossi in ipso impetu febris, pessimeque; ubi ardens ea est, male habet. Si fudare corpus capiet, lintheū tepe facere oportet, paulatimque; singula mēbra detergere. At ubi uideri omnis finitus est, aut si is non uenit, ubi quāmaxime potuit, idoneus esse cibo æger uidetur, sub ueste leniter uingendus est, tū detergendus, deinde ei cibis dandus. Cibus autem febricitantibus humidus est aptissimus, aut humori certe quāmaxime proximus, utique ex materia, quā leuissima, maximeque; sorbitio. eaque, si magnæ febres fuerunt, quā tenuissima esse debet. Mel quoque; despumatum huic recte adijcitur, quo corpus magis nutriatur, sed id, si stomachus offendit, superuacuum est, sicut ipsa quoque sorbitio. Dari uero in uicem eius potest, uel in trita ex aqua calida, uel alica elota. Si firmus est stomachus, & cōpressa alius, ex aqua mulsa. si uel ille languet, uel hæc profluit, ex posca. Et primo quidē cibo id satis est. secundo uero aliquid adijci potest, ex eodem tamen genere materię, uel olus, uel conchiliū, uel pomū. Et dū febres quidē incrementum, hic solus idoneus cibus est. Vbi uero aut desinunt, aut leuantur, semper quidem incipiendum est ab aliquo ex materia leuissima, a diiciendum uero aliquid ex media, rōne habita subinde, & uiriū hominis, & morbi. Ponēdū uero ægro uarij cibi sicut Asclepiades præcepit, tū demum sunt, ubi fastidio uirgetur, neque; satis uires sufficiunt, ut paulū ex singulis degustādo famē uiret. At si neque; uis, neque; cupiditas deest, nulla uarietate sollicitudinis egerne plus assumat, quā cōcoquat. Neque; uerū est, quod ab eo dicitur, facilius cōcoq. cibos uariis: eduntur. n. facilius, ad cōcoctionē autē materię genus, & modus ptinent. Neque; inter magnos dolores, ut neque; incrementum morbo tutū est, ægrū cibo impleri, sed ubi inclinata iā in melius ualētudo est. Sunt alia quoque; obseruationes in febribus necessaria, atque; id quoque; uidendum est, quod quidam solum præcipiunt, an astrictum corpus sit, an profluit, quorum alterum strangulat quod continet, alterum digerit. nam si astrictum est, ducenda alius est, mouenda uirna, eliciendus omni modo sudor. In hoc genere morborum sanguinem etiā misisse, cōcoxisse uehementibus gestationibus, corpus in lumine habuisse, imperasse famem, sicut, uigiliam prodest. Vtile est etiā ducere in balneum, prius demittere in solium, tum ungere, iterum ad solium redire, multa; aqua fouere inguina, interdum etiā oleum in solio cum aqua calida miscere, uti cibo rarius & serius tenui, simplici, molli, calido, exiguo, maximeque; oleribus, qualia sunt, lapatium, urtica, malua, uel iure etiam cōchatum, musculorum uic, aut locustarū, neque;

danda caro nisi elixa est. At potio esse debet magis liberalis, & ante cibum, & post hunc, & cum hoc ultra quàm sitis coget. Poteritque a balneo etiam pinguius, aut dulcius dari uinum. poterit semel, aut bis inter poni græcū salsum. Contra uero si corpus profuerit, sudor coercendus, quies adhibenda erit tenebris, soni noque, quandocunque uolet, utendū. nō nisi leui gestatione corpus agitandū, & pro genere mali subueniendum. Nam si uenter fluit, aut si stomachus non cōiinet, ubi febris decreuit, liberaliter oportet aquam tepidā potui dare, & uomere cogere, nisi aut fauces, aut præcordia, aut latus dolet, aut uetus morbus est. Si nero sudor exercet, dutanda cutis est, uel nictro, uel sale, quæ cū oleo miscemur. At si leuius id uitii est, oleo corpus unguendum est. si uehementius, rosa, uel melino, uel myrteo, cui nimum aulterū sit adiectum. Quisquis autem fluore æger est, cū uenit in balneum, prius unguendus, deinde in soliu demitiendus est. Si in cure uitium est, frigida quoque, quæ calida aqua melius uetur. Vbi ad cibum uentum est, dari debet is ualens, frigidus, succus simplex, qui quā minime corrumpi possit, panis tostus, caro assa, uinum asperū, uel certe subausterum, si uenter profuerit, calidum, si sudores nocent, uomitusque sunt, frigidum.

Quomodo pestilentes febres curari debeant. Cap. V.

Desiderat etiam propriā animaduersionem in febribus pestilentiz casus. In hac minime uile est, aut fame, aut medicamentis uti, aut ducere aluum. Si vires sunt, sanguinem mittere optinum est, præcipueque si cum dolore febris est. Si id parum tutum est, ubi febris, aut tenuata est, aut leuata est, uomitu peccius purgare. Sed in hoc maturius, quàm in alijs morbis ducere in balneum opus est, uinū calidū, & meratius dare, & omnia glutinosa. inter quæ quoque carneum generis eiusdem. Nam quo celerius eiusmodi tempestates corripitur, eo maturius auxilia, etiam cum quādā temetitate tapienda sunt. Quod si puer est, qui laborat, neque tantum robur eius est, ut sanguis uiciti possit, sicut ei utendū est, ducenda aluus, nec aqua, uel pitisanæ cremore, tū de mōm is leuibis cibus nutriendus. Ex eo toto nō sic pueri ut uiri curari debent. Ergo, ut in alio quoque genere morborum parcius in his agendū est. Non facile sanguinem mittere, nō facile ducere aluum, non cruciare uigilia, fame, aut nimia siti, conuenit. Vomitus post febrē eliciendus est. deinde dandus cibus ex leuissimis, tū is dormiat, postero quoque die, si febris manet, abstineatur. Tercio ad similem cibū redeat. Dandaque opera est quācum

feri potest, ut inter opportunam abstinentiam cibosque opportunos, omisis cæteris, nutriatur. Si uero ardens febris extorret, nulla medicamentū danda potio est, sed in ipsis accessionibus oleo, & aqua refrigerandus est, quæ miscenda manu sunt, donec albescant, & conelauit tenendus, quo multū, & purū ærem trahere possit, neque multis uestimentis strangulandus, sed admodum leuibis tantū uelandus est. Possunt etiam super stomachū imponi folia nitida in aqua frigida tincta. Ac ne siti quidē nimia uexandus est. alendus maturius est, id est a die tertio, & ante cibū. idē perungendus. Si pituita in stomacho coijt, inclinata iā accessione uomere cogendus est, & tunc dandū frigidum uinum, aut pomū ex his, quæ stomacho conueniunt. Si siccus manet stomachus, protinus, uel pitisanæ, uel alicæ, uel orizæ cremor dandus est, cum quo recens adeps cocta sit. Cū uero in summo incremento morbus est, utique non ante diem quartū magna siti antecedente, frigida aqua copiose præstanda est, ut bibat etiā ultra facietatem, & cū iam uenter, & præcordia ultra modū repleta, satifque refrigerata sunt, uomere debet. Quidā ne uomitū quidem exigunt, sed ipsa aqua frigida, tantū ad facietatem data, pro medicamento utuntur. Vbi utrum libet factum est, multa ueste operiendus est, & collocandus ut dormiat. Fereque post longā sitim, & uigiliam, post multā satietatem, post infractum calorem, plenus somnus uenit, per quē ingens sudor effunditur. idque præfectissimum auxilium est. Sed in bistamē, in quibus præter ardorē nulli dolores, nullus præcordiorum tumor, nihil prohibens, uel in thorace, uel in pulmone, uel in faucibus, nō ulcus, non deiection, non profusiuū alui fuit. Si quis autē in eiusmodi febre leuiter tussit, is neque uehementi siti cōsistatur, neque bibere aquā frigidā debet, sed eo modo curandus est quo in cæteris febribus præcipitur.

Curatio semiteriana febris, qua hemitritica dicitur. Cap. VI.

A Tūbi id genus tertianæ est, quod *semiteriana* medici appellant, magna cura opus est, ne id fallat. Habet enim plerumque frequentiores accessiones, decessionesque, ut aliud morbi genus uideri possit, porrigitque febris inter horas 24. & 36. ut quod idē est, nō idē esse uideatur. Ex magnopere necessariū est, neque dari cibū, nisi in ea remissione, quæ uera est, & ubi ea uenit, protinus alui, plurimūque sub alterutro curatū errore subito moriūtur. ac nisi magnopere aliqua res prohibet, inter initia sanguis mitti debet, tū dari cibus, qui neque incitet febrē, & tamen longū eius spatium fultineat.

Curatio

Curatio lentarum febrium. Cap. VII.

Nonnunquam etiam lentæ febres sine ulla remissione corpus tenent, ac neque cibo, neque ulli remedio locus est. In hoc casu medici cura esse debet, ut morbum mutet. Fortasse enim curationi opportunior fiet. Sæpe igitur ex aqua frigida, cui oleum sit adiectum, corpus eius perfricandum est. quoniam interdum sic evenit, ut horror oriat, & fiat initium quoddam novi motus, eaque eo cū magis corpus incaluit, sequatur etiam remissio. In his frictio quoque ex oleo, & sale salubris videtur. at si diu frigus est, & torpor, & inactio corporis, non alienum est in ipsa febre dare mulū tres, aut quatuor cyathos, uel cum cibo uinum bene diluere. Intenditur enim sæpe ea eo febris, & maior ortus calor, simul & priora mala tollit, & spem remissionis in ea curatione ostendit. Neque hercule ista curatio noua est, quia nūc quidā traditis sibi egros, qui sub cantioribus medicis traherantur, interdum contrariis remedijs sanāt. si quidem apud antiquos quoque ante Erophilum, & Erasistratum, maximeque post Hippocratem, fuit Petro quidam, qui febricitantem hominem ubi acceperat, multis uestimentis operiebat, ut simul calorem ingen tem, suūque excitaret. Deinde ubi paulum remitti coeperat febris, aquam frigidam potui dabat, ac si mouerat sudorē, explicuisse se ægrū indicabat. si non mouerat, plus etiam aque frigide ingerebat, & tum uomere cogebat. Si alterutro modo febre liberauerat, protinus fuillam assam, & uinum homini dabat. Si non liberauerat, decoquebat aquam sale adiecto, eamque bibere cogebat, ut mouendo uentrem purgaret. & intra hæc omnis eius medicina erat. eoque non minus grata fuit his, quos Hippocratis successores nō refecerant, quā nūc est his, quos Erophili, uel Erasistrati æmuli diuturnos non expedierunt. Neque ideo tamen non est temeraria ista medicina, quia plures, si protinus à principijs exceperit, interemit. Sed cum eadem omnibus conuenire non possint, ferē quoque ratio non restituit, temeritas adiuvat. Ideoque eiusmodi medici melius alienos ægros, quam suos putant. Sed est circumspecti quoque hominis, & nouare interdum, & augere morbum, & febres accendere, quia curationem, ubi id quod est, non recipit, potest recipere id, quod futurum est.

Remedia in febribus ad capitis dolorem, & præcordiorum inflammationem, & ariditatem, & scabrietem lingua. Cap. VIII.

Considerandum etiam est febres ne solæ sint, an alia his quoque mala accedant. id est nū

caput doleat, nū lingua aspera, nū præcordia intenta sint. Si capitis dolores sunt, rosam cum aceto, miscere oportet, & in id ingerere, deinde habere duo pittacia, quæ latitudine frontis, longitudinemque æquant. Ex his inuicē alterum in aceto, & rosa habere, alterū in frōte, aut intinctā ipsæ lanam succidā imponere. Si acetū offendit, pura rosa utēdū est. Si rosa ipsa ledit, oleo acerbo. si ista parū iuuant, teri potest, uel iris arida, uel nocces amaræ, uel quælibet herba ea refrigerantibus. Quorū quilibet ea aceto impositum dolorem minuit, sed magis aliud in alio. Iuuat etiā panis cū papauere iniectus, uel cum rosa, cetussa, spumæ argenti. Olfacere quoque, uel serpillum, uel anethū non alienū est. At si in præcordiis inflammatio, & dolor est, primo super imponenda sunt cataplasmata reprimentia, ne si calidiora fuerint, plus in materiam concurrat. Deinde ubi prima inflammatio se remisit, tunc demū ad calida, & humida ueniendū est, ut ea quæ remanserint, discutiant. Notæ uero inflammationis sunt quatuor, rubor, & tumor cum calore, & dolore. Quo magis erauit Erasistratus, qui febre nullā sine hac esse dixit. Ergo si sine inflammatione dolor est, nihil imponendū est. Hunc. n. statim ipsa febris soluit. At si neque inflammatio, neque febris, sed tantū præcordiorū dolor est, protinus calidis, & succis somētis uti licet. Si uero lingua sicca est, & scabra, detergenda primū penicillo est ea aqua calida. deinde rēgenda mixtis inter se rosa, & melle. Mel purgat, rosa reprimat, simulque siccescere non sinit. At si scabra non est, sed arida, ubi penicillo deterfa est, ungi rosa debet, cui ceræ sit paulum adiectum.

Remedia contra frigus, quod febre præcedit. Cap. IX.

Soleat etiā ante febres esse frigus, idque uel molestissimū morbi genus est. Vbi id expectatur, omni potione prohibendus æger est. hæc. n. paulo ante dara multū mali adiucit. Item maturius nescit multa tegendus est. admonenda partibus his, pro quibus metuemus, sicca & calida fomenta, sic, ne statim uehementissimi calores incipiant, sed paulatim accrescant. Perfricanda quoque eque partibus manibus unctis ea uetere oleo sunt, eique adiciendum aliquid ex calefacientibus. Cōtenti; medici quidam nūa frictione etiam ex quolibet oleo sunt. In harum febrium remissionibus nonnulli tres, aut quatuor fortitionis cyathos etiam nū ultra manente febre dant. deinde ea bene finita reficiunt stomachū cibo frigido, & leni. Ego tum hoc puto tentandum, cum parum cibis semel, & post febrem datus prodest, sed curiose percipiedum est, ne tempus remissionis decipiat. Sæpe enim in hoc quoque genere ualitudinis iam minui se

bris uidetur, & rursus intenditur. itaque ei remissioni credendum est, quæ etiam immoratur, & iactationem, scetoremque quandam oris, quem *scæ* græci uocant, minuit. Illud satis cõuenit, si quotidie pares accessiones sunt, quotidie paruum cibũ dandũ. si impares, post grauiorẽ cibum, post leuiorem, aquã mulsam.

Curatio horroris in febribus. Cap. X.

Horror autẽ eas ferẽ febres antecedit, quæ certum habent circuitum, & ex toto remittuntur. Ideoque, tutissimæ sunt, maximeque curationes admittunt. Nam ubi incerta tempora sunt, nequealui ductio, neque balneum, neque uinum, neque medicamentum aliud recte datur. incertũ est enim quando febris uentura sit, ita fieri potest, ut si subito uenerit, summa in eo perniciẽ sit, quod auxilij causa sit inuentũ. Nihilque aliud fieri potest, quam uti primis diebus bene absterneatur æger. deinde sub decessu febris eius, quæ grauissima est, cibum sumat: at ubi certus circuitus est, facilius omnia illa tentantur, quia facilius proponere nobis, & accessionum, & decisionũ uices possumus. In his autem cum veterauerunt, utilis famis non est. Primis tantummodo diebus ea pugnandum est, deinde diuidenda curatio est, & ante horror, tum febris discutienda. Igitur cum primum aliquis inhorruit, & ex horrore incaluit, dare ei oportet potui tepidam aquam subfalsam, & uomere cum cogere. nam ferẽ talis horror ab his oritur, quæ biliosa in stomacho resederunt. idem faciendum est, si proximo quoque circuitu eque cessit, sæpe enim sic discutitur. iamque quod genus febris sit, scire licet. itaque sub expectatione proxime accessions, quæ instare tertia potest, deducendus in balneum est, dandaque opera est, ut per tempus horroris in solio sit. si ibi quoque senserit, nihilominus idem sub expectatione accessions quartæ faciat. si quidem eo quoque modo sæpe id discutitur. si nec balneum quidem profuit, ante accessionem alium edat, aut bibat calidam aquam cum pipere, si quidem ea quoque assumpta calore mouent, qui horrorem non admittit. Deinde eo modo quo in frigore præceptum est, auctquam inborrescere possit, operietur. Fomentisquẽ protinus ualidioribus totum corpus circumdare conuenit, maximaque inuolutis extinctis testis, & elicionibus. Si nihilominus horror pertruperit, multo oleo calefacto inter ipsa uestimenta, perfundatur, cui æque ex calefacientibus ali-quid sit adiectum. adhibeaturque frictio quantam is sustinere poterit, maximèque in manibus, & pedibus, & spiritum ipse contineat. neque desistendũ est etiam si horror est. Sæpe enim per-

tinacia iuuantis multũ corporis uincit. Si quid euomuit, danda aqua tepida, iterumque uomere cogendus est, utendumque eisdẽ est, donec horror finiat. Sed præter hæc, ducenda aluus est, si tardius horror quiescit, si quidem id quoque exonerato corpori prodest. Vltima quoque post hæc auxilia sunt gestatio, & frictio. Cibus autem in eiusmodi morbis maxime dandus est, qui mollem aluum præstet. Caro glutinosa, uinum cum dabitur, austerum.

Curatio quotidiana febris. Cap. XI.

HÆC ad omnes circuitus febrium pertinent. discernendæ tamen singulæ sunt, sicut rationem habent dissimilem. si quotidiana est, triduo primomagno opere abstinere oportet, tũ cibis altero quoque die uti. Si res inueterauerit, post febrem experiri balneum, & uinũ, magisque si horrore sublato hæc supereff.

Curatio tertiana febris. Cap. XII.

SI tertiana uero, quæ ex toto intermitte, aut quartana est, medijs diebus, & ambulationibus uti oportet, alijsque exercitationibus, & uinctionibus. quidam ex antiquioribus medicis Cleophrantus in hoc genere morborum multo ante accessionem caput ægri multa calida aqua perfundebat, deinde uinũ dabat. quod quauis plerique eius uiri præcepta secutus est Asclepiades, recte tamen præterit. Est. namque incepti ipse, si tertiana febris est, tertio die post accessionẽ dicit aluum duci oportere. quinto post horrorem vomitum elicere, deinde post febrem, sicuti illi morerat, adhuc calidis dare cibũ, & uinũ. sexto die in lectulo detineri. sic enim fore ne se primo die febris accedat. Id sæpe fieri posse uerisimile est. Tutius tamen est, ut hoc ipso ordine utamur tria remedia, uomitus, alui ductio nis, uini potus per triduum, id est die tertio & quinto, & septimo tentare. nec uinum nisi post accessionem die septimo bibat. Si uero primis diebus discussus morbus nõ est, inciditque in uetustate, quo die febris expectabitur, in lectulo se continueat, post febrem perfricetur, tum cibo assumpto bibat aquam. postero die, quo cibo uacat, & ab exercitatione, uinctioneque aqua tãtũ cõtētus cõquiescat. Et id quidẽ optimũ est. Si uero imbecillitas urgebit & post febrem uinũ, & medio die paulũ cibi debet assumere:

Curatio quartana febris. Cap. XIII.

EAdem in quartana faciendæ sunt: Sed cum hæc tarde admodum finiat, nisi primis diebus discussa est, diligentius ab initio præcipiendum est, quid in ea debeat fieri. Igitur si cui eũ horrore

horrore febris accessit, eaq; desijt, eodem die, & postero, tertioq; continere se debet, & aqua tantummodo calidam primo die post febrem sumere, biduo proximo quantum fieri potest ne hauc quidem. si quarto die cum horrore febris reuertitur, uomere sicut ante præceptum est, deinde post febrem modicum cibum sumere, viui quadrantem. Postero, tertioq; die abstinere, aqua tantummodo calida, si fuerit, assumpta, septimo die balneo frigis præuenire abstinere, continere se debet, & aqua tantummodo calida, si fuerit, ac tunc ita nouo die balneo frigis puenire, si febris redierit, ducere aliu. ubi ea eo corpus coquieuerit, inunctione vehementer perfricari, eodem modo sumere cibum, & uiuum, biduo proximo se abstinere frictione seruata. decimo die rursus balneum experiri, & si postea febris accessit, aq; perfricari. vinum copiosius bibere. ac si proximum est quies tot dierum, ut abstinentia cum cæteria quæ præcipiuntur, febrem tollant. Si uero nihilominus remanet, aliud ea toto sequendum est curationis genus, idq; agendum, ut quod diu sustinendum est, corpus facile sustineat. Quo minus etiam curatio probari Heraclidis Tarentini debet, qui primis diebus educendam aluum, deinde abstinendum usque in septimum diem dixit. Quod ut sustinere aliquis possit tamen etiam febre liberatus, uia refectioni ualebit. adeo si febris sæpius accesserit, concidet. Igitur si tertio decimo die morbus remanebit, balneum neq; ante febrem, neq; post eam tentandum erit, nisi interdum tam horrore discusso. Horror ipse per eadem, quæ supra præscripta sunt, expugnandus. Deinde post febrem oportebitungi, & uehementer perfricari, cibum, & ualidum, & fortiter assumere. viuo uti quantum libebit. postero die cum satis quieuerit, ambulare, caeroceri, ungi, perfricari fortiter, cibum accipere sine uiuo, tertio die abstinere. quo die uero febrem expectabit, ante surgere, & exerceri, darique operam non oportet, ut in ipsam exercitationem tempus febris incurrat. sic enim sæpe illa discutitur. At si in opere occupauit, tum demum se recipere. In eiusmodi ualitudine medicamenta sunt, oleum, frictio, exercitatio, cibum, uiuum. Si uenter astrictus est, soluendus est. Sed hæc facile ualidiores facient. si imbecillitas occupauit, pro exercitatione gestatio est. Si ne hanc quidem sustinet, adhibenda tamē frictio

est. si hæc quoq; uehemens onerata, intra quietem, & inunctionem, & cibum sistendū est, dandaq; opera est, ne quæ cruditas in quotidianam id malum uertat. Nam quartana uenem jugulat. sed si ex ea facta quotidiana est, in malis æger est. Quod tamen nisi culpa, uel ægri, uel curantis nunquam fit.

Curatio duarum quartanarum. Cap. XIII.

AT si duæ quartanæ sunt, ueque hæc, quas proposui, exercitationes adhiberi possunt, aut ex toto quiescere opus est, aut si id difficile est, leuiter ambulare, considere diligenter inuolutis pedibus, & capite. Quoties febris accessit, & desijt, cibum modicum sumere, & uinum. reliquo tempore nisi imbecillitas urget, abstinere. Aut si duæ febres penè iunguntur, post utranque cibum sumere. deinde uacuo tempore, & moueri aliquid, & post inunctionem cibo uti. Cum uero uetus quartana raro, nisi uere soluat, utique eo tempore attendendum est ne quid fiat, quod ualeitudinem impediat. Prodestque in uetere quartana mutare subinde uictus genus, à uino ad aquam, ab aqua ad uinum, à lenibus cibis ad acres, ab acerbis ad lenes transire, esse radicem, deinde uomere, iure uel pulli gallinacei uentrem resolvere, oleum ad frictiones adijcere, calefactientia ante accessione sorbere, uel aceti cyathos duos, uel unum sinapis cum tribus græci uini falsi, uel miata paribus proportionibus, & in aqua dulata, piper, castoreum, laser, myrram. per hæc enim similiaque corpora agitandum est ut moueatur ex eo statu quo detinetur. Si febris quieuit, diu meminisse eius diei conuenit, eoq; uilitare frigis, calorem, cruditatem, lassitudinem. Facile enim reuertitur, nisi à sano quoque aliquandiu timeatur.

Curatio quotidiana febris, quæ ex quartana facta sit. Cap. XV.

AT si ex quartana quotidiana facta est, cum id uitio inciderit, per biduum abstinere oportet frictione uti, aquam tantummodo uesper potui dare. tertio die sæpe fit uel febris accendat. sed siue fuit, siue non fuit, cibum post accessioneis tempus est daudus. ac si manet, per biduum abstinere, quanta maxime imperari corpori potest, frictione quotidie utendū est.

M E D I C O R V M

VETVSTORVM LATINORVM

D E F E B R I B V S

Tomus tertius.

Q. S E R E N I

D E F E B R I B V S

C A R M I N A.

Subitaneo dolori, febri, atque ostocopo.



Nonnunquam existit subiti una
causa doloris :
Cuius origo latet, ueris reprimenda medellis.
Nanq; chelidonia mixto sale:
nectere prodest.

Velleraque iofuso recalcotia sulphure sauant
Ostocoppon lento conduxit melle perungi.
Sin autem calide depascent corpora febres,
Tunc apij succus leni sociatur olivo:
Membra lines; totuq; ferus mulcebitur ignis.
Nec igne dusa adeps, dederit quæ bestia Melus.
Semine; in cerui lacrymam miscere liquiori
Conuenit: atque artus illinc mulcere calêtes:
Febribus at longis galli des iura uetusti.

Ad typum quartana.

Nec tu crede, licet dilato tempore febrem:
Quæ spatio sibi dai magis, ut cessâdo caleat.
Lenigatoque crassatur quartana calore
Ni medicas adhibere man' discarnas & herbas,
Allia noo pudeat terno cum cimicetrita,
Ex diluta mero medijs haurire diebus.
Aut facilem incoria muniq; ducere fibrâ.
Quatuor & duri iugantur scrupula bacchi:
Mira est absinthij eum simplicem potio lymphæ.
Sume tribus digitis apprehesum semen anchij,
Tantundem marachri, nullum nec defis acetæ,
In cuius cyathæ prædictæ salubriter hauris,
Ilia quinæciam spartum suppoce tumenci,
Aut leporis trepidi diluta coagula trade.
Prodest & potus sed nullus doridis humor.
Quidam etiam mirâda ferunt ueniente calore
Iura toros ludum voceris, munusque petendum.
Sed prius est oleo partus feruescere raux

In triuijs, illoque artus perducere succo.

Ad typum tertiana.

Es et etiam alterius febriæ diuina diebus
Tempora discernens quasi iuste pondera libras:
Vi possis igitur talem prohibere furem,
Tu volues cera sine caudis grana cumini,
Paniceæque indes pelli, colloque ligabis
Pulci ramus lanæ velatus amictu
Tempore suspecto medicos præbebit odores.
Præterea elmeæ potatur tritici in ouo,
Horridus atraçin, sed gustu commodus apte.

Ad typum quotidiana.

At qui continuis non cessat adire diebus,
Sed totum certas morbus discriminat horas,
Triticum metuit granu (si credere dignu est)
Quod laetis fractu fuerit sub paue repertum,
Nec non ossa iuuat sepius iuuenta domorum,
Conuenit hæc reteri pondentia subdere collo.
Multaque præterea verborum monstra silebo.
Nam febrem vario depelli carmine posse
Vana supersticio credit, trementuq; parentes

Hemorrhæoæ depellendo.

Moviseru magis est, quod gratias hemorrhæoæ
Vulgatur verbis: hoc nostra dicere lingua
Non potuerit vili: puto nec voluere parentes.
Inferbis obstruere quod dicitur abraça cobra
Sæpius, & subter reperi, sed detrahe summa.
Eamagis atque magis de sunt elementa figuræ
Singula quæ semper rapies, & cætera figes.
Donc in angustum redigatur hætera eorumq;
His lino nexis collum redimire memento.
Nonnulli memorant adipem prodesse leonis:
Corallum vero, si collo nectere velles.
Ne dubites illo veros miscere smaragdos.
Talia languentis conducunt viocula collo:
Letalesq; abiget miranda potentia morbor.

FINIS.

MEC

C. PLINII

C. PLINII SECVNDI

DE FEBRIBVS

LIBER

Ad febres calidas intercidendas. Cap. I.



MEDULLA ceruina, adipe asferis, adipe porcino recenti, & exiguo ceræ perungesfero, ac fluxum de linco lini seminis. Idemq; affine læ tepidum facit. Cotonia item matura, &

rosam siccam, & papaneris capita sicca in olla rudi cum aqua decoques, & ex hoc dabis biberere. Item portiagla & apium tulum cum arungia collata, & oleo rosato, & lactuæ folijs, & rasura cucurbitarum, & ouis crudis permittit, & in modum ceroti pectori impositum, ardores ac subitos dolores hemitritæ, & febres emendat. Ad ardorem stomachi febrientis. Rossecum in aquam calidam mittes, & agitabis inter carbonibus, quo platnam lineam infundes & stomachum superpones. Mellis libram unam, adipis porcini recentis colat vnam, olei rosati vnam, ceræ vnam, argenti spumæ uncias duas, teres autem spumam & simul decoques, deinde de croci trini mittes uncias duas & teres in lintecolo, inductum super stomachum impones. Ad hæc ambrosia. Recipe olei rosati libram unam & semis, ceræ vnam & semis, croci vnc. duas, succi rasuræ cucurbitæ quantum sufficit, medullæ ceruinæ uncias quatuor, feruesfacies autem ceram & medullam cum oleo tepesfacto cerotario, addes succum per partes & teres diligenter, postea addes crocum & diutissime teres, permiscebis & facies pastillos, seruasq; & cum opus fuerit teres cum ouorum vitello. Cuiusque vnum corpus fuerit, linteam illud impones super stomachum. Ad ardorem stomachi in febribus quæ non declinant ex lini seminis farina cum albo oui facies cataplasma, & frigida super stomachum impones. Lactucas autem in calida coques, & teres cum albo oni, & stomacho superpones. Itemq; rasuræ cucurbitæ & vix acerbe cum albo. oui imponuntur. Rasura itidem cucurbitæ & crocum æquale cum albo oni imponitur. Confectio ambrosiæ. Ceræ lib. vnam, olei rosati vnc. sex, olei camomillæ sex, arunginæ recentis lib. vnam, croci vnc.

unam, lithargyrii vnam, meliloti vnam & semis. Iniectio ad febres calida. Succos lini seminis cum oleo rosato seu camomillæ bene faciet. Si vero nimium febris astuauerit. Plantaginis folia viridis & caules simul tundes, succoque eorum corpus perunges. Ad ardentissimam febrem, herbam quæ dicitur Iouis barba, conteres, ac succum eius exprimes, & miscebis cum cinere aquatilis lanæ, & addito oleo rosato perunges, tunc ægrum conperies, inde somnus irruet, & ardor conspescitur. Item ad febres. Arungiam leoninam manu subiges, & totum corpus perunges. Rota item cum oleo subacta totum corpus perunges. Lilij radices tres aut quinque, croci den. v. macerabis in aquæ quartario uno, & ouorum tribus, vitellos teres bene, & adijcies olei rosati quantum sufficiat, & inde totum corpus perunges, præter manus & pedes. Vt febrem tollas. Nucleos tritos ex aqua calida dabis bibere. Itemque ut febres fortis ejicias. Siliginem in aqua recentem macerabis, & teres in mortario cum tribus ouis duris, & panno inducto ad stomachum ligabis. Si quis vero febres patitur & fatigatur aut angustias patitur, dactylos quàm plurimos & adipe aut recentem aut uetustum in rectis aqua macerabis, donec exaltescat, deinde in mortario teres ut vnum corpus fiat, & panno indues quasi cataplasma, & stomacho impones nocte, sed prius dactylos tritos in creneo aut sapa macetabis. Vt febrem tollas, & ut ex infirmitate pallidum ad bonum colorem perducas, ciuaria & lupinos dulces ieiuno in cibum dabis. Succum item calamenti & oleum rosatum æquis ponderibus commiscebis, & sic perunges. Itemque herbam quæ vocatur canis tingit, mens lunio tundes & vnam exprimes, succoque eius ægrum perfundes.

Hemitritæ depellendo. Cap. II.

RANULAS paruas uides capies, & aperto ventre uiuam harundine intestina auferes & projicias, illas uero mittes in stagnatum notum & frigis quibus sublatis, mittes in oleum ceram & facies cerotum molle, & ab auribus vsque

Soluta uero resoluens in olla, & sic mittes sicca, trita & cribrata, & sic omnibus permixtis uteris. Ad quartanas expectum. Recipe castorij sex, panacis regij sex, opij sex, iusquiami duas, mellis quantum sufficit, dabis aut horam dimidiam accessione ad magnitudinem fabæ Aegyptiacæ cum uino mixtum. Caput clauis quo aliquis in cruce fixus est alligatur paco. Fimi bubuli cinis spargitur. Vrius pueri illiniuntur primi digiti in manibus & pedibus. Leporis cor alligatur, coagulum quoque eius bibitur ante accessione. Leonis quoque in cibo datur. Vipera etiam caput abscisum in linteolo alligatur. Muri uino rostellum primū & auriculæ summæ præciduntur, & in roseo panno alligantur, & ipse mos uiuus dimittitur.

Ranz in trinio decoquantur cum oleo carnisbusque earum proiectis & oleo utuntur ad uocionem. Allij elixi caput vnum cum lasare tritum obulo in uino austero bibitur. Hirundinis item fimi drachma vna trita ex lactis caprini aut ouilli aut pasci cyathus vnus potui accessione propinatur. Rubet ranz cor uel iecur alligatur in panno leucopæo. Semen anethi tribus digitis comprehensum & feniculi tantundem, & aceti multo cyathus vnus potui datur. Pauem & salem in linteolo de lyco liget, & circa arboris licio alliget, & iuret per terram & salem: Craffino mihi hospites uenturi sunt, suscipite illos. hoc ter dicat.

F I N I S.

G A R I O P O N T I

D E F E B R I B V S

L I B E R.

*De febris definitione & generibus eius. Cap. I.*

FEBRIS est calor in naturalis præter naturam cordis & arteriarum principaliter ledens operationem uirtutis. Tria autem sunt genera febrü, nnum in spiritibus, alterum in humoribus, tertium in solidis. In spiritibus uero ephemeræ dicuntur. Ex humoribus uero, ex phlegmate quidem intra nasa putrefacto, à calore præter naturam à cor de procedente, amphemerina siuocha fit. Si uero extra uasa phlegma putrefiat, amphemerina intermittens. Ex rubra uero cholera putrefacta in uasis, fit tertiana indeficiens, quæ & caufon & siuocha dicitur. Si uero extra uasa eadem cholera putrefiat, fit tertiana intermittens. Si uero melancholicus humor in uasis putrefiat, fit quartana siuocha. Si uero extra, fit quartana intermittens. Sanguis si putrefiat intra uasa, siuocham facit, quæ caret intermissione, eo quod humor maxime amicus naturæ periclitatur. Proportionaliter enim est in aliis tribus humoribus. Phlegma enim quod post sanguineum magis est amicus naturæ, si putrefiat amphemerina fit, quæ duodecim occupat

horas, duodecim tantum intermittens. Quæ uero ex cholera rubra fit, quoniam humor iste minus est amicus naturæ, duobus prædictis, si putrefacto, tardius in tertia die fit passio. Nā quæ ex quarto humore, id est, melancholico fit, quoniam humor, iste est naturæ minus conueniens, putredine facta fit tardius, id est, quarta die passio accidit. Ephemeris uero quæ ex spiritibus præter naturam calefactis, id est, ex animali qui est in cerebro uitali, qui in corde est physico, qui in hepate, fit ex ira, aut ex timore, aut ex cupiditate aut aliquo huiusmodi. Et quia subtilis est materia quæ patitur, facilius ex solo lauacro soluitur. Tertianæ uero, uel quartanæ, uel quotidianæ, si putrefacta intra uasa, fit siuocha & caufon continua, ut supradicitur. Quoniam et si ad tempus cessare uidetur, eo quod aliquantulum minus laborant patientes, tamen tunc patuntur etiam non adeo Frigus autem & rigor in febris uidetur fieri humoris superfluitate, calorem naturalem superante & quasi extinguente. Qui dum paulatim conualescit, ipsam superfluitatē succedit, & per singulas accessiones periodis eam ex parte consumit. Dum uero per interualla febris uidetur cessare, natura uires resumit ad inimicam superfluitatem rursus accendendam & siccandam, quod tandiu fit, donec euacuetur, id est,

id est, bona temperantia restituat. Sciendum vero quoniam sicut sol exortus primo mane facilius aerem calefacit propter substantiam eius subtilitatem, quam aquam, aquam uero quam terram, ita calor prorumpens ex corde facilius calefacit spiritum, quam humores, humores quam solida. Febris uero quæ ex solidis fit præter naturam calefacti, hæctica, id est, consuetudinaria appellatur. Solida uero dicuntur carnes, pinguedo, uenæ, arteriæ, nervi.

De diuersitatibus febrium. Cap. II.

QUæ uero, uel quantæ sunt febrium diuersitates, maxime dicticos medicos conuenit nosse, ne per ignorantiam non intelligendo contraria adhibeant, & periculum faciant mortis incerto, aut macronotiam, id est, longam, & grauem ægitudinem de modica & leui faciunt. Debet etiam scire medicus quatuor esse tempora omnium causarum, maxime febrium, initium, augmentum, statum, & declinationem, quod nisi optime intellexerit, graniter lædit, nesciendo quid in his temporibus debeat ægroto adhibere, uel auferre, in quo tempore curet, in quo potum uel escam det. In quo ab his abstineat febrientem, aut quando æger dormire debeat, uel in quo uigilare, & in quo cubiculo iacere debeat. Nam lucidus nimis, & calidus locus relaxat corpus, frigidus & obscurus constringit. Medioeriter ex his temperatus paragorizat, id est, mulcet, & oblectat, & temperat. Intelligere ergo manifestissime clinicus debet pulsus uenarum, & indicia urinae prænosceret: quam maxime enim in his duobus intelligitur genus febris, & origo causæ, & temporum ratio, uix mortisque professio. Pulsus etiam ostendit qua hora declinatio, & qualis sit. Hæc utique maxime duo signa considerando poteris manifestissime intelligere quæ sit febrium species, an ephemerina sit, id est, febris simplex, & non molesta, an sinochus, id est, spissa, uel acuta, & ingis, id est, sine indicatione, uel intermissione, uel sine requie ulla, an amphimerina, an triticea, an hemitriticea, an quis hemitriticeus sit, an tetrarticeus, an pentheus uel hexeus, uel hebdomæas, & harum quæ sunt generales, & quæ sunt speciales, & quæ græcè genicæ, uel hydicæ, & quæ aliæ, & nothæ, id est, ueræ & non ueræ dicuntur. Quæ omnes febres quas supra memorauimus, aliquoties innicem sibi, uel alijs febribus geminantur, & duplices fiunt, & tunc maxime periculosæ sunt. Ut duo amphemerini, id est, duæ quotidianæ, aut duo tritici, id est, duæ tertianæ, aut duo tetrartici, id est, duæ quartanæ, aut cum amphemerino tetrarticeus accidit, id est, cum quotidiana quartana adiungitur, aut cum hemitritico mi-

nori, uel medio maior adiungitur hemitriticeus, ex quo difficile quis poterit euadere, aut cum motus amphemerinus, id est, non uera quotidiana mouetur, aut cum nothus triticeus, uel tetrarticeus, id est, cum non uera tertiana inuenitur, aut non uera quartana, sed sordida quæ & difficilis ad curandum.

De periodicis febribus. Cap. III.

PERIODICÆ sunt febres quotidianæ, diurnæ, nocturnæ, tertianæ, uel quartanæ. Diurna est quotidiana, quæ diem tenet totam, & noctem habet liberam. Nocturna est quæ noctem tenet totam, & diem habet liberam. Tertiana est quæ diem & noctem habet liberam, & die & nocte tenetur. Si quis duodecim horis febre graniter, & alijs horis 12. lytopericæ, id est, minutz, febres cum retinet, & alijs 24. horis apyretos, id est, sine febre habetur. Quartana est quæ post duos dies, diem noctemque tenet, & ita declinat. Nam quosidianæ, tertianæ, & quartanæ possunt esse singulæ, & binæ, & ternæ, & quaternæ. Sed omnes in die & nocte, si duplex est, bis tangit. Si triplex est, ter, si quadruplex, quater. Quia omnes typici etiam quadruplicem unum morbum habere possunt. Sunt horum nothæ, id est, non ueræ, periodicæ febres. Periodicæ enim dicuntur quæ eo quod certo quodam statuatque tempore, in circulo mouentur, uel tumescunt habentes certas commotiones in certis diebus, atque declinationes.

De acutis febribus. Cap. IIII.

Acutæ uero sunt febres sinochus, & sinochæ, & causon, & tripartitæ, hemitriticeæ. Si nothus uero est continua febris sine intermissione, aliquoties & cum augmento. Sinochæ uero & causon semper modicam habent, & matutinam, non quidem plene mundam remissionem atque quietem. Quo quidem tempore debent rehci qui patiuntur hemitriticeus uero est, mediam partem habens declinationis tritici, unde si minor est hemitriticeus mouetur horis 18. & quiescit horis sex. Si uero medius est hemitriticeus mouetur horis 36. & quiescit horis 12. Maior uero hemitriticeus mouetur 66. & quiescit horis 6. Nec tamen omnes cum quiescunt sine febre sunt. Nam maxime maior hemitriticeus proprie sinochæ similis est. Nā sunt hemitritici tres, medius, maior, minor, medius est, qui tertianæ coniungitur. Maior uero quartanæ, & minor quotidianæ. Unde & acutæ febres dicuntur, eo quod magis ad mortem quæ ad uitam properant. Unde nalde opus est artificii has omnes diligenter curare. Nam maxime hemitritici diuina manu quam humana curari

rari possunt quâvis & ipsi cura competens deesse non debet. Quibus hoc antidotum con-
ficiendum est, quod aptum scimus hemitri-
teis nniuersis, & à Basilio medico probatum
est neraciter: Recip. costi, carpobalsami, cel-
tice, gariopholi. ana scrupul. 1. croci scrup.
2. nardostachij, melliloti ana. unc. 2. cal-
sice folij, semperuiuz foliorum ana. dtach. 3.
mellis lib. 1. aq. lib. 1. & s. aut 2. his infusis
dabis bibere ex quo sunt duæ commotiones,
aut mox ab initio permittis utrique.

De febrium diuersitatibus. Cap. V.

Multa sunt genera febrium quæ nascuntur
in homine, id est, ex mutatione temporû
& ætatis, ex labore, & ex ebrietate, & amari-
tudine, & ex alijs multis causis. Quarum no-
mina sunt quotidiana, tertiana, quartana, si-
nocha, causon. Hæc duæ ex abundantia sangui-
nis sunt, & cholera. Sunt & aliæ febres mi-
nutes, quæ uocantur ephemeræ, quas dicit Hip-
pocrates simplices febres, eo quod non mul-
to tempore nutriuntur: sed subito contingen-
tes ex nimia uigilia, ex cogitatione, ex tristiti-
a, ex ieiunio, ex mala uoluntate, ex timore,
ex parabola, ex ebrietate, ex labore, ab æstu, à
frigore, ab amantitudine, quam maxime in au-
tumno tempore, non sunt longiores, in tertia
nero die, aut in quarta dimittunt, si negligen-
tia non fuerit. Febris quotidiana est quæ quo-
tidie accidit. Fit autè ex phlegmate congrega-
to in stomacho, ideoque quia phlegma frigi-
dum est, & ipsa febris frigida succurrere ei de-
bes calidis argumentis. Febris tertiana est,
quæ à tertia in tertiam diem accidit. Nascitur
nero ex cholera rubea. Quæ quia ipsa febris ca-
lida est & sicca, succurrere ei debes, frigidis &
humidis argumentis. Febris quartana est, quæ
à quarta in quartam diem accidit nascitur ue-
ro ex cholera nigra, ex sanguine nescido, & ca-
lido, ubi fit gravior acutius, quia ex frigi-
do humore melancholiz & calido humore
sanguinis creatur. Ideoque nimium calida, &
& nimium frigida.

De curatione singularium febrium. Cap. VI.

Dicamus ergo medicinas earum generali-
ter, id est, tales medicinas quæ per singu-
las febres proficiant, & homines ad sanitatem
perducant, sed quia contraria contrarijs curân-
tur, id est, frigida calidis, & calida frigidis: ta-
men interim dnm febri non apparet qualis
debeat esse, impendimus ipsas curationes fe-
bricitantibus, ut elementa eorum in melius
temperemus. Hoc est si nimius calor fuerit,
ad frigiditatem reuocamus: si nimium frigus,

ad calorem retrahamus, hoc est, in primis die-
bus nel in prima hebdomada ponamus super
stomachum eius cataplasma, habens lini se-
men, & hordium, & scenogracum, ablinthij
anethum, apium, petroselinum, leuisticum,
& lupinum. Hæc erunt in cataplasmate, seni-
culi semen cum aqua bulliat, quam bibat. Su-
pra dictis autem seminibus farina facta, mit-
tis desuper oleum uel auxungiam neterem, &
facto cataplasmate induc in linteolo, & cali-
dum super stomachum impone, per dies pluri-
mos, mutando omnibus diebus, & calefacien-
do, postea facies ei unguentum quod dicitur
marciaton, aut pentamiron, deinde dabis eis
antidotum istud: quod Recip. piperis nnc. 2.
cymini nnc. 5. mellis quod sufficit, sac electua-
rium, & dabis sero coctæ r. aut mane ieiunio.
Si hæc diligenter feceris, anxiantem domi-
no, subuenies contra omnes febres.

De natura febrium. Cap. VII.

Febricula à seruire ueluti seruicula noncu-
patur. Febricitantem nero apprehendi-
mus totum tactui nostro occurrere, ueluti ex al-
to ascendentem feruorem plurimum, atque
actiorem naturali senserimus, qui lipotho-
niam, id est, defectum per totum corpus exha-
lantem irrigat. Mutatio enim pulsus, febricu-
la signum confert. Sed secundum ueteres nō:
Hippocrates enim & Eugenius, & Phlstoni-
us solum feruorem naturalem moderatione
excedentem, signum febrium posuerunt. Sed
& ceteri successores eorum de pulsus mutatio-
ne dispares in sententijs sunt. Alij enim con-
tra naturam effectas mutationes sine extæ
cause aduentu, signum febrium uocauerunt:
ut Actisius. Alij crebriorem pulsus ultra na-
turam, ut Eleotates, Erasippus, & Sosistratus.
alij uehementiam & duritiā pulsus, ut qui-
dam nouelli inuentiones: ex quibus aliqui so-
lius pulsus mutationes, & aliqui etiam non
naturaliter calorem superuenientem, signa fe-
briculæ posuerunt. Nos autem quoniam in
infirmis mutatur pulsus, aut causam irru-
entem, aut suæ proprietate facilitatis,
suas mutationes etiam propterea febrium
passioni tribuimus. Nam naturalis feruoris su-
perantia non solum ex febre, sed etiam sola uo-
poratione exercitationis, nel motu, nel acris ei-
bi usu (alias esu) efficitur, ut per totum corp-
us ex alto atque acrior naturali, & plurimū
exhalans feruor, sentiat, quod Græci apy-
retos nancant. Funt multæ febres ex cholera
humore, quarum species sunt quatuor: Sino-
chus, amphemerina, tritæus, & terræteus. Si
nochus est continuus. Nascitur à plurima cho-
lera, & acerrima, & dimissionem habet in exi-
guo

quo tempore. Corpus enim non refrigerat ullo tempore, sed inflamatur scerrime à multo calore cholerū. Amphemetia, id est, quotidiana, & ipsa à cholera nascitur, & transit celerius quam illa longissima sinocha, quoniam ex parua efficitur cholera, & habet requiem corpus. In sinucho autem febriens non habet requiem ullo tempore. Tertia autem, hoc est, tertiana longissima ab amphemetia, ex cholera rubea & parua nascitur, & propterea multo tempore non retinet tritea. Tetrarte autem, id est, quartana secundum istam rationem tardior est, à tritea, quia quantum habet ebolicum, tantum à cæteris febribus distat, & propterea acredinem multam habet, quia uetusta est ex cholera uigræ abundantia, propterea difficile curat à supradictis omnibus. Quomodo apprehendimus quatuor tempora febriculæ, id est, initium, augmentum, statum, & declinationem. Initium apprehendimus ex primo patui motu feruoris in actiorem qualitatem transiuntis. Augmentum nero excremento qualitatis & quantitatis supradictæ significationis. Statum uero ex quantitate. Declinationem ex diminutione, id est, nascitur, crescit, stat, & minuitur, scilicet, quomodo & crescit, & scire nos conuenit species febrium, non amplius esse quam tres. Tipicā quam quidem periodicam Græci uocant, hemitriteam, & sinocham. Tipica est biformis, si bene tamen hoc uomen translatus est, quæ quotidie laxamentum, uel quotidiana, uel ternis diebus, uel quartanis facit, quas uulgus quotidianas, uel tertianas, uel quartanas uocat. Hemitritea est quæ duplum habet tertianæ. Sunt autem hemitritearum generatritia. Minimus, medius, & maximus. Minimus est qui post diem & noctem hypodexim, id est, relaxationem habet. Relaxatio est dum declinat febris, & laxamentum, aut paræ intermissionis, aut sordidæ facit, & rursus fit. Medius est, qui una tertia quaque die laxamentum quod supradiximus tribuit & adiunctionem facit. Maximus quamuis declinationem facit, ut cum febricit triduo iuncto, & quarta die quasi quasdam iudicias tribuat, tamen mox etiam acius incalcescit. Hoc genus morbi quoque etiam accidentia habet, graue & periculosum est. periculosior tamen omnibus sinocha febris est. quæ laxamenti nihil dat, aut ita dat ut modicum fiat, & uix possit intelligi. Semper enim assiduus est febrium color. Continuo ut incipit hæc febris, fit tremor corporis, & nolidum frigus ut in typicis febribus. Solet autem in tritaicis apparere circulus ante oculos, inhorrescunt membra corporis, nondum plene oppressa frigore, ita tamen calefcere incipiunt, quia in alio sunt posita, & per totum

corpus uapor iugis fit. Post hoc cum ceperit declinare estus, tunc incipit calor, & naturalis paulatim temperatur, & corporis iactus blandior redditur. Item febris accidentia sunt, quæ Græci sythomata uocant, id est, aut capitis dolor, aut uentris, aut stomachi, aut uomitus, aut uentris nimia solutio, aut strictura nimia, aut uigilia iugis, aut somni turbariones, & his similia. Ex quibus quanta sit uis febri cõttemplari potest. Sed iam de ipsarum febrium specie aliquanta dicta sunt, quo facilius cognoscas eas, quarum quasi cõttemplaria aliquanta autem oculos tuos sunt posita, & quæ reliqua sunt promemus. Quomodo apprehendimus febrium dimissiones? Limpdam ex tranquillitate, sordidam ex mitigatione. Quæ sunt febrium differentie? Sunt febres strictæ, solutæ, complexæ, celeres. Sunt & tardæ, id est, temporum differentias habentes, secundum solam solutionem febricula esse potest, cui nihil stricturæ admisceatur. Aliqui hanc fieri negant. Stricturam enim effectum febriculam dicunt. Nos autem manifeste hanc fieri probamus, cum plerisque cardiacos nihil stricturæ patientes febrile ostendimus, atque hos solis constrictionis reuoluamus. Quomodo complexam intelligis? Ex accessibus & dimissionibus eiusdem febriculæ. Si enim sese cum cæteris in stricturam extulerit, aut tranquillauerit, eidem adscribenda erit passio, uel eius contrariæ, atque communis utriusque. Quomodo apprehendimus febricitantem in sudorem ceticum aduenisse? Ex pulsu magno, celeri, totiusque corporis superficie uaporatione, cum pruritu cutis, & quodā tactu in similitudine rigoris per totum corpus. De hinc ab ipsis poris ueluti humidificatione, & laxatione tanquam mox ex lauacro uenientium. Aut sicut in continuationibus febrium frigus membra pertractans irruerit.

Detypicis febribus. Cap. VIII.

Omnēs typicæ febres siue strictæ siue solutæ, siue permixtæ, quandiu sunt in frigore in principio non possunt dignosci ex uenarum pulsu, & ex compressione manus. Sed ex lineis calidis patientes cooperiantur donec rigores leniantur, at ubi ceperint incallescere, paulatim amouenda sunt operimenta, donec sudoris tempus adueniat. Sed tamē detypicis minus laborandum est, quod etiā natura adiutorium nobiscum facit. In hemitritæis causa grauis est. In quibus & subtilitas ciborum & temporis cauenda sunt. In sinochis autem quoniam iugitas febrium est, minime latet quanta sit perturbatio, placeat nobis ita ab eis uicariis primo mane curari, & cibari

cibari & semper calidam potare. Neutrum tamen ante declinationem. Nam quicquid ante hoc tempus fuerit appositum, perturbatis corporibus in stomacho accescit, ac propter hoc infirmitatis fit nō corporis cibis. Quibus stulticum, ut est frigida onctio olei rosei atque calastichi ut est olei vitidis, aut dulcis recentis, pro ut necessitas cōmonis iusserit, admonedū est.

De cognoscendis febrium causis, Cap. IX.

Sollicite considerandum nunc, & etiā illud sciendū est, quod sæpius diximus, mox a principio causas cognoscendas, & origines, & species, & genera ut sciamus quæ sunt generales, quæ speciales, & quæ ueræ, quæ non ueræ, & quæ typicæ, & quæ non typicæ, & quæ acutæ, & quæ prolixæ, & quæ simplices, & quæ duplices, sibi an alijs geminatur, & harum quæque quomodo accedant, aut quomodo recedant, qualiter moueantur, aut qualiter declinent, etiam quibus horis diei, nel noctis, & quod horas paroxysmus, id est, commotio teneat, quod ve anthesis id est, declinatio, quidve significet, aut quo ægrum ducat. Quamuis ex his multa dicta sunt, considerandum est illud, uirtus ægroantis, impetus ægritudinis, qualitas & quantitas, ex hoc enim uitæ mortisque iudicia cognosces. Maxime ex pulsu & consideratione urinae genus febris considerare poteris, si fuerislectionis usu perdoctus assidue. Nec non & ex alijs signis quæ noster Hippocrates in prognosticis probat, & futura ante prædicat. Indicant enim tibi, & quasi tacita loquuntur. Hoc est ægroantis color, oculi uultus, uox rauca, taciturnitas, habitudo corporis, quæ omnia diligenter consideranda sunt in ægroto, ut sciamus manifeste quid teneamus, uel quid fugere debeamus, ne forte hæc ignorantes aut ægroto ladamus, aut nosmetipsos deludamus. Nec non illud moneo, ut consideres in omnibus ægritudinibus regionum qualitatem, locorum quæ positionem, aut aerum temperantiam, rem potum rationem, ætatem & consuetudinem ægroantis, naturam corporis, nirtutesque, uigorem animi, causas & origines. Item animi aut corporis uitio nata sit ægritudo an extrinsecus uenit ex cibo uel potu, an ex corrupto aere erit. Cum hæc considerat a ratione & perpensatione bene cognoueris, optime scies quid facere ad hæc conuenis. Nam si causam ignoras, quomodo curas? Si enim nescias an periculosa an sine periculo sit causa, quid nisi temere facis? Quicquid feceris nescis si sanas: an potius occidas. Vnde fit; ut siquis curatus a te euaserit æger, non tui muneris, sed fortunæ sit. Proinde doctorum est nosse, prouidere, & intelligere causas & quid ex his futurum est predicere,

& anticipare quæ periculosa sunt congruis beneficijs medicinæ, quamuis sæpe uincantur beneficiis, etiam cum bene offerantur, quia mala fortiora sunt bonis, quia humorum impetus fortior est. Tunc maxime uincuntur beneficiis à malo, cum nō in tempore suo offeruntur, quia mala fortiora sunt bonis aut natura à malo fatigata beneficiis non sentit. Aut quantitas boni maliue ignoratur id est, quantum offerendum sit bonum iuxta modum mali. Vnde fit. ut non omnibus possit mederi medicina nec semper auxiliari, quia rarorum est intelligere causarum qualitatē, id est quanta est nunc, & qualis & quanta futura sit causa, uel quo tempore factura sit statum, nel qualem habitura crisin, id est, digestionem uel iudicium. Nata enim causa mouetur, crescit, uenit ad statum, & stat pugnat physis com causa, id est, natura resistit ægritudini, & spectatur quod uincat. Succurre medicina laboranti, natura se feropem uince ægritudinem, libera periclitantem. Vtique fit crisis tempore suo, hoc est necessario: cum sit quo ægero naturæ periclitanti obtuleris. Sic ergo subuenis medicina. Si uero auxilium medicinæ apte adhibueris naturam iuueris, & ex malo bonum faciens liberabis ægroto. Aliter uero si feceris, & non in tempore competentem bene medeberis, hostis malus naturæ eris & bonum malum feceris, ægritudinem nutris, naturam deiicies, ægrum occides. Si in paroxismo, uel in ipso statu causæ ignorando tempora ægrum facias potum, nel escam accipere, aut incongrua curatione & non licito tempore cures, natura duplici in bello erit, & laborans. Nec sufficit hostem pugnando uincere, dum festinatam escam imponis sibi ingestam coquando non ualet digerere. Vnde sunt omnia diligenter perspicienda, & præuisa & cognita oculis his, suis curis, suisque temporibus uniuersa esse curanda scito.

De cognitione creticorum dierum in febribus, Cap. X.

Sinero creticum diem futurū senseris, & præuideris fluxum sanguinis ex naribus, aut cecce uomitam, nel urinę, uel nentris copiam aut sudoris manifestum remedium, ne follicitus aliquam adhibeas cū hæc signa futura sunt curationem, quia nō symptoma erit hoc, sed uile & salubre signum, & futuræ sanitatis iudicium. Nam quoties natura corporis ad crisin se præparat, perturbat insolito more ægroto & totum grauius fatigat corpus. Et cum ex naribus per fluxum sanguinis, & per uomitum futura est crisis, capitis antecedit dolor. Quæ res multat hoc ignorantes perturbat & desperare facit, quia relaxatur & perturbatur corpus appro-

pinquante crisi, & ideo ante omnia diligenter cognoscendum est nobis quæ sit febris, vel cuius generis, cuiusque speciei, vel qualiscunque uirtutis, quotumque diem habet, & an sit calida satis, atque acuta, uel æstuosa, quia hæc talis febris amat crisin facere per meatum, id est, aut per fluxum de naribus, aut per uomicam, & uentris urinæque nimium obsequium & non diu permanere, aut certe per sudorem, sicut mollis febris, & sine impetu facere solet. Quæ etiam ægrotantibus diu apostema facit. Attendendum etiam si ipsa febris est sine periculo, & si bona crisis speratur, etiam in ægrotantibus periculosis uidentum est. Considerandum est & tempus totius ægritudinis & aduertendum ualde etiam quale principium sit, qualeque augmentum fecerit, & ex hoc statum & futuram declinationem tunc poteris intelligere, & prædicare salutis periculique imminuentia. Nam in principio, aut in augmento si urinx multæ fiant, uel uentris obsequia, uel nimius sputus, & uomica, aut fluxus uariorum, non bona speranda est crisis futura, neque sine periculo, qui ista signa si in tempore suo & in statu fiant, tunc prospera sunt, & utilia crisis indicia. Nam cum futura est crisis, subito ante diem quo fieri debet, uel ante noctem æger incipit se grauius habere, & uehementius angustias patitur, usque ad desperationem, & cum uideris fieri id, inquire quotum diem æger habet ex quo cæpit ægrotare, & inuenies creticum diem, sicut in alio loco tractauimus. Quia si septimus dies erit, nihil est uerendum. Si uero sextus, grauissime fatigat, frequenter etiam nec crisin, uel nõ sine periculo facit. Si ergo ex hoc & reliquorum dierum contempleris naturam & signa quæ solent suo tempore procedere, & futuram crisin nunciare, quæ si mox in principio ægritudinis fieri uideantur, non signa crisis, sed symptomata ægritudinis sunt, id est, capitis dolor, fluxus uariorum, uomica impetus, urinx uentrisque nimietas, sudoris solutio, & alia quæque talia. Ex ne terrearis si ante creticum diem æger dicat subito sibi colicam, uel uerticem dolere, & præcordia tensiora, uel calidiora habere, & dispnoia ei sit, id est, constrictio, & difficultas anhelitus, quasi constrictum & angustum habet thoracem, & si super his omnibus turbati subito pulsus cadit in paruitatem, nec ualde tamen imbecilles fiunt, crisin sperato ex his omnibus signis iam appropinquare, & magis iam adesse si ipsi pulsus erigantur altius, & uirtutem cito accipiant. Videris enim naturam nunciare. Attende mox uultum ægri & si aliquam eius particulam uideris in uultu salientem, uel si pulsauerint uenæ temporum, aut genæ, aut oculi rube-

buerint, magis manifestam futuram crisin scito, & si sicut inuiri, aut eis nolentibus fluunt lachrymæ, aut si quasi circulos, uel si quid simile aliud ante oculos uersari sibi uiderint, & si manus ferunt digitosque ad nares frequenter fricantes uel scalpentes quasi pruriant eis, tunc iam non sperabis, sed mox fieri crisin uidebis fluendo de naribus sanguinem, quia solent frequenter hi tales alienari, & non sane loqui, & quasi excutere se & subleuare, ne terrearis, & ne metuas super hoc quia hæc talia signa sunt bilium ex inferioribus locis ad superiora repentium. Hoc quidem ad cognoscendam crisin sufficiat diuise. Sed considerandum in his, atque animaduertendum, ut ætatem ægrotantis, & naturam corporis eius attendamus, in quo futura crisis speratur, & ipsam ægritudinem temporis aerisque rationem, quia si iuuenis erit qui ægrotat, & calidus natura, & abundans sanguinis, magis in his talibus per fluxum uariorum futuram crisin speramus. Inquirendum etiam illico est, ut si sano arque ægro ipsi est consuetudo per nares fluere sanguinem, aut si tempus æstiuum est, uel aer calidus, & id considerandum quod maneat, ex hoc fluxu sanguinis fieri crisin ægritudinis scito, & si ipsa ægritudo pectoris generis sit, & si solite purgationes relictæ cessauerint, omnia (ut diximus) obseruando, & animaduertendo poteris prænocere, & prædicere, & scire quæ ubi sunt capienda, arque curanda, fugienda uel abneganda, atque frequenter sunt facienda.

De creticis diebus. Cap. XI.

Opportet etiam de creticis diebus non silere, quia hoc maxime memorie commendandum est, ut cognitis creticis diebus possis congrua beneficia offerre, quia si non suo tempore adiutoria adhibeantur, lædunt potius quam iuuent. Vnde necesse est ualde creticorum dierum cognitionem optime nosse medicos, ad cognoscendam febrium rationem, & eius qui ægrotat an ad salutem, an ad periculum, ut possimus ex hoc dicere quod futurum est. Ideoque inquirendus primus dies est manifeste, quo cæpit quis ægrotare ita & si non iacuit in lectulo, sed ex quo sensit sibi ægritudinem fuisse exortam, ut certum numerum sciens medicus, uerum creticum sciat inuenire diem, siue arcium, siue quem diximus perysion. Quia hæc species crisis, arcis, & perysion dicuntur. Nam arcij sunt pares numero dies, ut 3. 4. cæteri similiter pares dies ut sex, perysion uero impares, ut 1. 3. 5. 7. & cæteri impares dies eodem modo. Quia si hoc bene cognoueris, siue in sequenti etiam manifestabo & ordinabo, & si

& si qualitate creticeorum dierum inuenieris attendas, & scias qualiter futura sit crisis. Nam melior est ad crisin faciendam perysso numerus dierum, quam arcis. Amat enim superius aris, id est, creticus superscriptus pari numero factus dierum reciditare, atque commouere easdem agitudines quod perysso facere non potest. Sciendum ergo est ante omnia emmorationis infirmi primum manifestum diem ut disimms. Ex hoc enim, ut et ceteros dixerunt, nobiles, & cretici dici inuenies rationes, quæ faciant scire an bona sit futura, an mala crisis, & si in cretico die symptoma, id est, ac cident natum fuerit, & ipsum prævidendum diligenter quale est, quia neque minus neque minus agitudine esse debet, sed congruens agitudinis generi, & quantitati, & qualitati, & virtuti, & in ipso cretico die adueniente symptomate, si fit uuliter, & congrue, soluit agitudinem. Nam si ante tempus creticum innotatum fuerit, id est, sudor, & cetera quæque talia quæ crisin faciunt, iam non crisin, sed in macroniam significat pergere agitudinem. Nam quod quod medioeriter in ipsis creticis diebus uelintur, nullo cretico symptomate præsentem uel innot, hi difficile enarrantur Hippocrates dicit. Illi uero qui non, creticis diebus cretica symptomata patiuntur, uidentur ad hanc esse liberati, sed postmodum recidant, & uir eundem non sine periculo. Sed si in arcis diebus patiosimos fieri uideas non bonum scito futurum, si in ipsis creticis diebus commouentur, & multo peius si in his crisis fiat, uel symptomata aliqua importunius accedant. Quia ualde graue erit, ut ea que solum prodesse atque iuuare, & suo loco uel tempore uenire ad utilitatem agri, si inordinate contingant, aut non suo tempore. Nam melius est si ante creticum diem uox, aut dies præcedens grauior fiat. Quod quidem eruntis & pulsus potius cognoscere, si diligenter attendas, & consideras, & alijs signis ab Hippocrate dictis in prognosticis. Ergo creticeorum dierum (quos diamus arcios) exordium facimus ab arcio. Arcii uero dies sunt in quibus periodicæ febres faciunt crisin in 4. & 6. 10. & 14. & 24. & 40. & 60. & octogesimo, & centesimo. Sed sciendum est ea his diebus qui bonam faciunt crisin aut malam. Vnde quantum diem firmum uideamus ad faciendam crisin, & frequenter dicimus. Sextum uero rarum atque infirmum reciduum, quia nec ualde congruus est ad faciendam crisin, & raro innotuit in periodicis ut uideatur creticus, quia neque ab Hippocrate est confirmatus præter in una tantum, id est, non febrientem hyemericum. Similiter decimum diem Hippocrates omnium periculosissimum in uno tan-

tum inuenit creticum diem, & ideo etiam ipsum incertum obseruamus. Quartum decimum diem firmum frequenter accepimus ad faciendam crisin. Viciesimum autem diem iuxta Hippocratem non arcium, sed perysion recepimus. Sexta tetrasteti, id est, quarta de sexto. Tertia enim hebdomada in hoc erat & transcendit, & ideo firmum congruè quæque obseruamus. Similiter etiam uiciesimum quartum, & tricesimum quartum, & quadragesimum quartum, & sexagesimum, & octogessimum, & centesimum, firmos & creticos scito. Sunt etiam cretici dies, quos diximus perysios, id est, septimus, aut nonus, aut undecimus, aut septimus decimus, aut uiciesimus primus, aut uiciesimus septimus. Sed non tam creticus & firmus, ex his uiciesimus primus, quam ceteri. Amat enim reciditare in 1. die facta crisis. In alijs firma causa & stabilis est & frequens, in illo tantum rara & instabilis. Typicatum febrium, id est, periodicarum experimus creticeorum dierum rationem.

De creticis diebus acutarum febrium.

Cap. XII.

Nunc de illis creticis diebus dicamus qui in acutis febribus attenduntur. Vnde oportet ex his creticis diebus, quos diamus arcios & perysios præuidere, atque inuenire acutarum febrium manifestissimos dies creticos, & certos, & firmos, ut Hippocrates dicit ac docuit sic. Acute febres in 14. die faciunt crisin, non sic intelligendum scito, ut quidam putant in 14. die omnino acutas posse solui febres, sed in 14. die, qui usque in quadragesimum protenditur. Est enim uetus creticus dies in acutis febribus 3. & 4. & 7. & 9. & 11. & 14. & 17. & 20. & 24. & 27. & 30. & 34. & 37. & 40. Præter enim hos dies facta crisis in acutis febribus reciduum pro certo significat agitudinem, & non sine periculo. Si uero aliquis nos interroget, quomodo arcii & perysii dies possint esse cretici communiter? respondebimus sic: Arcios & perysios dies communiter creticos esse in periodicis dumtaxat febribus innotat suam rationem ut supra diximus, perysios autem proprie in acutis febribus tantum facit crisin, dicente Hippocrate: Febres acutæ quæ in arcis diebus faciunt crisin recidunt uerabuntur febribus. Quæ uero in perysio, manent firmæ ad salutem. Sane ipse uoluit nos obseruare sic: Viciesimum creticum dixit esse diem, quia unus dies medius qui communiter crescit, ad perysion numerum magis pertinet, ut permaneat simul eius dogma. Et ideo reliquos septimum diem ad octauo rursus incipit numerare. Obseruauit autem maxime

Hippocrates ista duo in his symptomata, uicissimoprimo die sit firmissime crisis si fiat cum frigore, ut in alijs ceticis diebus. Viceſimo autem die sola crisis facta cum frigore reciduum manifestissime significat febrem, & aliam sperandam erisim, talemq; finem quale reciduz principium uidimus. Hæc ergo est ratio atq; obseruatio de ceticis diebus febrium, siue periodicarum, siue acutarum.

De distantia ceticorum. Cap. XIII.

Quanquam multa de ceticis dixerimus diebus, tamen placuit exponere quid in utrisque dissimile sit. Nam cetrici ueri sunt perysii dies, ubi iam adest, sive dubio febris solutio, cetrici ueri non sunt arcii dies, ubi dubium aliquid speratur. Deinde & hoc prætermittendum non fuit in notitia humani corporis dicere quemadmodum dies cetrici debeant computari, & ideo ordinandum credidi diligenter, ut in hoc numero horarum quidem accedentium, aut minuendum non fallaris incerta ratione, quia dies unus cum nocte sua 24. horas habet. Vnde si unusquisque hora tertia utputa tangatur, uidetur ipsius diei tres horas perdidisse. Sed non pereunt, quia cum cæperis computare, largis eis ex nocte horas tertia quibus per diem minutus est, ut possis 22. horis completis computare plenissime. Simili modo uerſa uice si nocte sit computata, ut si quinta hora noctis tactus est quisquam, quinque etiam diei horas nocti largiaris. Ad hanc rationem omnium ægritudinum noctes & dies, ut non dierum magis numerum, aut noctium quam horarum secundum numerum constitutum compotes, ut puta sicut in triduum uinum, quemque discuti posse monstrabimus, quia unus dies & nox 24. horas habet. Computa ergo ex hora qua cecide in ægritudinem typum horarum 72. ut tridui compleas numerum pro dimissione horarum. Tunc enim cum bene computaueris, dies & horas discussionis potetis prænunciare. Similiter enim & si amplioris numeri dies cetrici sunt, computandi sunt ut superius demonstrauimus. Supputare debemus ueram discussionem aut periculū horam, ne reciduum febrium possit rationes inuenire.

De febrium speciebus. Cap. XIII.

Febrium igitur species discernere nemo potest, & usum ipsarum præuidere, quæ harum curabiles, & quæ incurabiles sint, uel quæ breui solui possunt, & sine periculo, & unde nascantur, & in quibus ætatibus, & in quo tem-

pore sint, nisi fuerit intentus usu doctissimorum lectionibus. Ephemeræ uero, id est, simplices febres scito nasci, aut ex calore aeris subito & spisso, & nimio, & inconstitute, aut ex frigore, aut ex mœrore, aut ex gaudio nimio, aut ex sollicitudine, aut ex cogitatione, uel timore, uel amore, aut dolore, aut ex iracundia, aut ex indigestione ciborum, uel ex nimietate uini seu potionis, uel uigilijs multis, ex labore ingenti, & insolito, aut ex nimio dolore cum sine uulnere aliquo sit, aut ex alia huiusmodi occasione sit. Hæ febres in omnibus ætatibus, & in omnibus temporibus fieri solent, quæ tamen ex proprijs signis discerni & cognosci possunt. Harum enim febrium pulsus simplices sunt, & non nalde inæquales, aut sordidi, aut difficiles, aut duri. Urinæ etiam non longe à sanitate distantes, nec calor grauior, aut acer inuenitur, sicut in alijs febribus inuenitur. Post commotionem & impetus paroxysmi primi, id est, primæ motionis impetus in pulsu uenarum, & urinæ non sinceræ. In ephemeris uero febribus, id est, simplicibus nihil tale cessante paroxysmo primo, id est, prima commotione inuenitur, sed omni impetu, sedato, cuncta proficiunt ad meliora. Plurimum etiam eorum quasi humor corporis calidus cum uapore, aliquibus sudor mox in principio utiliter apparet. Dolor etiam capitis si fuerit in principio mox cessat & omnino recedit ante diuturnum primum, quod in alijs febribus non fit, & ipsius quidem qui febricitans, & tolerantia, manifestat genus & iudicium febris. In his etiam ualida, in alijs uero mox imbecilla inuenitur uirtus, & cum balneis lauamus ephemeræ, nullus horror, uel frigus corporis in folio, uel in ipso balnei aere sentitur, ut in alijs febribus fieri solet. Sed si animi ægritudo febrem commouerit corporis, id est, tristitia, aut cupiditas, pulsus perlassus, & tenuis inuenitur, mox in principio, ut multis temporibus putet eum ægrotasse ex longinqua ægritudine. Urina sicut in cæteris rubea est, sed in his rufior, & acrior, & modica, & non tam frequens sicut in cæteris, econtrario uero sitim patiuntur, qui ex commotione uel ira animi februnt. Nam his qui ex tristitia ægrotant, uel cupiditate desiderij, exilitas corporis, & oculorum dimersio & pallor in facie euidentior apparet, hæc cogitatio diurna & sollicitudo continua facere solent, etiam uigilijs cōtinuè patijsta solent, sed vultus subtimidus in illis non est. Nam graues luminum palpebræ perardigilantibus inueniuntur, & quasi humidæ & uix oculos leuare possunt. Nam tristitium & cogitantium siccæ & mœstæ cernuntur lymina. Concaui uero oculi commune prope omnium indi-

indiciū est, id est, morientium, vigilantium, cogitantium, sed non iracundiz indicium: Nā huic nec pallor accidit, nec concavi efficiuntur. Sed calor ardentior & amplior de profundo pectoris exire modus procedere ostenditur, & magnitudo, & immanitas pulsus, non minuitur, atque desijdet, sicut his qui ex tristitijs uel uigilijs uel cogitationibus laborant. Ex hoc ergo indicio iratum uel indignatum ab his discernere poteris, & illos a se inuicem ex suis signis dixeris. Qui uero ex labore aliquo fracti fessique februnt, cutis corporis eorum magis tenior & sicior, quam in alijs ephemeris febribus innenitur. Aliquibus autem perseuerans siccitas usque ad paragma, id est, usque ad statum iam declinantis temporis. Fitque illis maxime siccitas qui plus quam fert phylus laborando deficiunt & infinitum laborem sustinere persequuntur. Etenim in his pulsus minuitur & lassior innenitur. In his autem qui minori labore lassati februnt uastior & maior est. Ita ergo & hos qui de maiori labore, & minori ægrotant, nisi discernere poteris, utriusque urine croceæ vel rubeæ sunt, sed magis turbulentiores horum qui maioribus plūs laboribus lassati sunt. At uero hi qui constrictione uel densitate & tensione cutis februnt, ita habitudine corporis sui sentiunt, qualiter illi qui aluminosis lauerint se aquis, constructa exicataque cute stringi omne corpus sentiunt, & quali contrahi. Hi soli ex omnibus febribus constrictionis causa laborant. Hi styonosi, id est, constrictionem patiuntur, quos quidem & visu & tactu facile cognoscimus, sicuti & illos qui nimio labore siccitati ægrotant. Si in his feruentior morus caloris est, & primo ictu pulsus mitior sentitur, acrior uero procedenti tempore fit, & difficiliora ventris atque urine obsequia sequuntur. Urine non penitus rubeæ, nec habitudo corporis minuitur, neque oculi in his concavi ac sicci videntur, sed magis quibusdam horum eminent foris, neque pulsus venarum in his minui atque pusillus, sicut in his qui mororibus, uel curis aut solitudine aliqua, aut uigilijs, aut laboribus, aut exercitatione nimia exauiati ægrotant. Illis uero qui ex causa inguinum laborant ephemeris, id est, simplicibus febribus, pulsus fit magnus & grandis ictu atque uelox & spissus, & calor uoluentior & plurimus & post temporis statum mox ex profundo emergit calor uel humor quidam sudoris non multus, & calidus, & delectabilis, & uultus in his rubeus conficitur, & maiore habitudine, & urina eorum subalbida. Sed magis commune est omnibus ephemeris febribus, id est, simplicibus æquales pulsus habere. In paucis autem harum febrium inneniuntur inæquales fordenes uel asperi, non in uno tactu ictum habentes.

Talis itaque est cognitio in ephemeris febribus, id est, simplicibus & diuersis generis harum.

Cura.

Cura eorum facilis est ijs qui eas aduertunt & certissime intelligere possunt. Nam qui eas pro certo cognoscere non possunt, difficiliore & periculose efficiuntur, si ab ignorantibus curantur quia grauiore omnibus sunt, & in maiorem croniam veniunt. Unde consideratis & illis duntaxat signis, quæ in cunctis febribus, id est, habitu corporis, color, oculus, uultus, mens, animus, anhelitus, aspiratio, loquela, lingua, manus, aures, frons, cutis, sebena iacentis, motus iactatio uel quies & silentium, patientia languentis, obsequia ventris atque uescæ facilia, & difficilia, & ipsa uniuscuiusque phylus, id est, domina corporis natura, si calida uel frigida, sicca uel humida sit, & in quibus maxime delectabatur rebus in sanitate, sic facilius curabitur, contraria contrarijs curantur. Nam si ex calore nimio feruentis aeris (ut diximus) natam febrem intellexeris, frigidis medeberis beneficijs. Si uero ex frigore, calidis, si ex sollicitudine & cogitatione, securitate & consolatione uerborum consolaberis, & amputabis. Si uero ex furore, uel ira, blandis & mollibus affectibus placabis. Si ex amore, aut ex concupiscentia, promissione sedabis. Si ex morore, gaudia vincet. Sicut ea moror exuperat, & famem esca & sitim potus & labore requies, & indigestionem abstinentia, concupiscentiam uirtus sapientie sedat. Ergo postquam cognoueris ephemeram febrem non expectabis ut in ceteris febribus diacritum primum, uel secundum uel tertium ad cognitionem febrim, sed mor securus lauacro balnei & cibo reficias, quia in his febribus ægrotantes si abstineant a lanaero uel cibo, peiorat. Est enim in his tantum febribus usus balneorum utilis, alijs uero contrarius, & inimicus, præter tertianas. Sed quia alijs horum qui ephemeram ægrotant, diutius in aere balnei morari conuenit quam in solio, alijs magis in solio quam in aere, discernenda est inter hos ratio diligenter, ne forte, quia (ut diximus) ualiter omnibus his ad recuperandam sanitatem usum balnei conuenire, non intendendo quibus & qualiter sit adhibendum, hoc ipsum incongrue adhibendo, noceamus. Non enim lenis res est, aut sine periculo febrientem uti balneo, & hoc ad haberi mox in principio, sane cum non manifeste cognoueris genus febrim. Illis itaque qui ex inguinum indignatione februnt sine uulnere, nec non etiam illis qui constrictione & cutis ducta labore uidentur, diutius in aere balnei quam in solio esse conuenit. Ceteros uero omnia memoratos in solio magis quam in aere quam diu noluerint uel poterint continere, etiam si natare in ipsa aqua uoluerint,

dabis potestatem, imònt reficiant hortaberis. Quos omnes ingredientibus tepido & plurimo oleo mollibus & planis manibus sufficienter perunges. Plurimum eos qui ex labore aliquo februnt, & eos qui ex constrictione, uel duritia cutis, & eos qui ex inguinum indignatione februnt debere sæpius eos & diutius lauacro uti, & maxime scito cibo refici plurimo & frequenti, qui digestioni sufficiat. Eos qui ex labore aliquo februnt, etiam uno reficies sufficienti. Non tamen illos utile esse ita cibari ut istos qui ex constrictione cutis uel inguinum indignatione februnt. Sed utriusque his subtilis & peruenis conuenit adescatio, & refectio ciborum, abstinendos à uino autem maxime illos scito, qui ex indignatione inguinum februnt tandiu quandiu inguinum indignatio sedetur. Attendenda uero in his est ut in cæteris omnibus uirtus animi eius & ætas & habitudo corporis, etiam februm genus & species & physis eius qui ægrotat & consuetudo, & tempus & regio, & situs locorum, & cætera quæque talia. Horum uero qui ex constrictione febricant, illos quidem qui leuius & minus patiuntur minimeque plethorici sunt, scio non penitus prohibendos esse à uino. Qui autem amplius id patiuntur, & manifeste plethorici sunt, omnino abstinendos esse à uino. Eos uero qui insomniatate & uigilia, uel etiam animi causa uel passionibus februnt, cum laueris, humidis & succosis cibis refice non duris & corporatis, uel digestionis contrariis, uinum tenue & album, & maxime illis qui non dormiunt indubitanter dabis, si tamè capitis non patiuntur dolorem, nel temporum pulsus nõ erit, quod quidem in alijs omnibus censeo obseruandum. Sed neque eos qui ex ira, uel furore, uel ex solitudine, aut nimia cogitatione februnt, à uino abstinendos scito. Sed & illos qui ex furore aliquo ægrotant, tam diu à uino abstinendos esse noueris quam diu penitus furo sedetur. Si uero ex uulnere aliquo, uel pustula calidus seruo inguinum indignatione commouerit, & ex hoc causa fuerit orta, sanato prius uulnere uel pustulâ mox etiam febris calorque sedabitur. Sic ergo origines causarum cognitas amputaueris, nec causas amplius inuenies quæ opprimat hominẽ, sed maxime ad pristinam redibit sanitatem. Tu ergo si sapientia præuidere, atq; mente cognoscere sategeris, omnia manifesto consilio undiq; quæ facta sunt, & quæ futura sint, & quæ sint, id est, præterita, præsentia & futura cognosces. Hæc cum præuiders, scies quæ fugienda sunt, & quæ amplectenda sunt, nec causam ignorare poteris, nec incongrue curando in peius prostrahere ægrotantem ut multi faciunt indocti, causarum originem ignorando.

De acutis febribus, uel sinochis. Cap. XX.

Nunc uero incipiamus dicere de acutis febribus, & periculosis sinochis, id est, quæ non faciunt anesim, id est, declinationem inducunt, sed in uno eodemque motu perseverant, aut in peius crescendo non desinunt ante criticum diem, id est, ante tres, aut 4. aut 5. aut 7. aut 9. aut 11. aut 14. aut satis 17. quia difficile est, ut ad 19. aut ad 20. diem perueniant isti critici non faciant, aut uitæ, aut mortis. Aut enim in istis taliter febricantibus, aut uincit, aut uincitur pugnando phylis, & maxime in istis febribus sinochis, id est, tam acutis & asperis arthritices medici probantur, peritos autem medicos congruis medicinæ armatus beneficiis succurrat, & auilietur antequam labatur & vincatur perpetuis febribus repugnando natura. Sinochum ergo sic cognosces, primum quidem in 24. horis diei & noctis non facit anesim, id est, non declinat, nec desinit, sed in eodem motu permanet, aut magis acrior inuenitur, & si inæqualem, aut turbulentum fecerit augmentum, scito longinquiorẽ esse futuram febrem, & non sine periculo.

Cura.

Sinochis autem medebitur sic: Est præuidendum augmentum, & status febris ipsius non longe à 7. die, sed circa ipsum nec tardiorẽ futurum. Et si uirtutem egrotantium uideris validam atque sufficientem contra vigorem ualitudinis ad statum, nec non etiam ætatem idoneam, quæ possit sustinere impetum huius febris & uehementiam, hos tenui atq; exili diætã mox à principio curandos obseruandosque scito. Illos uero quibus longinquior à 7. die status, id est, post febres futuros, & nirtutes minus sufficientes erunt, mox à principio ægriitudinis usque quo statum febris incipiat facere, largiori eos & impensiori diætã curandos obseruabis. Prope autem ipsum tempus quo statum futurum febris uideris, abstineto à cibo, & præciori atq; tenui diætã hos curabis. Tam itaq; in ipso statu positos magis abstinere per parnam atque exilem, & permodicam ualde diætã offerendo inuabis. Deinde transacto iam statu, & fracto vigore febris, reficies atque resumes ægrum paulatim addendo impensiorẽ diætã & longiorẽ. Sed quoniam anesim, id est, requiem hoc genus febris non habet, ideo tempus reficiendi eos optimam eligimus horã prandij, quæ sani soliti sunt cæpere escam. Quæ uis ante lucanum, id est, ante matutinum. Aliqui elegerunt tẽpus. Sanguinis in his detractio sit pro magnitudine febris, & maxime illis conuenit qui rubore sanguineo plenis naturalis & solito rubent, & quasi suffectum sanguinem, id est, plenum & sensum corpus habere videntur, nel etiã

venas impletas & tensas. His profecto talibus aufertendus est sanguis, si neque virtus, neque ætas, neque alia (ut supra diximus) causa prohibeat. Et quia liquidæ atque fluentes diætæ omnibus acutis febribus cõgruunt, & remedio sunt, rectè ab Hippocrate olim dictum scimus, succum prisanæ bene coctum illis quibus non acetat in stomacho, aut cholera generat, uel fastidium facit, offerimus & succû alicæ simili modo, & panem optime coctum per tenuem ex aqua calidissima damus, & alia quæque talia quæ sunt facile digerenda, & non contraria laboranti naturæ. Illos uero qui causon, id est, nimio igne laborant, & acerrimo igne iactantur, quibus os siccum, & lingua arida & aspera est, oculi igne pleni, & quasi ardentes sentiuntur, mox ut primum uideris signa digestionis, id est, statum temporis, uel uigoris, frigidam aquam da bibendum securus, & modum bibendi æstibus, & metieris, consideraas tempus, ætatem, naturam, consuetudinem. Talis itaque sit cura sinochorum uel causon, id est, acutissimarum febriû, eis quæ sine symptomate, id est, sine accidentibus febrium extrinsecis scilicet capitis, uel stomachi dolore, uigiliis, singultatione, & alijs quoque talibus.

De tribus speciebus sinochi. Cap. XVI.

Tres sunt sinochorum species. Homothenus, agmasticus, epagmasticus. Quarum ab homotheno exordium facimus, qui omnium periculosior est & maior. Cui quidem nisi fuerit cito arte succursum, sunt grauiores febres, & sordidi pulsus, & geminata ægritudo, quam sic cognosces. In initio huius febris spissus pulsus, grauiores & sordidi inueniuntur, lingua siccior, sitis acerrima, lipothomia non deest, id est, malefactio & animi angustia. Cui quidem declinatio nulla poterit inueniri usque in 3. uel 7. diem quem in uno diatrito poteris recognoscere. Cumque recognoueris auxilio salutari succurrere, sicut in sequenti diligenter est ordinatum.

De Homotheni cura. Cap. XVII.

Prima die usque in tertiam cum homotheni signa intellexeris, id est, ut nullam habeat declinationem intra 4. diem, id est, in primo, aut 2. aut in 3. phlebotomandum est, si nel eius ætas, uel fortitudo permiserit. Si autem ætate breuior, aut senior sit, aut ex ipsa febre exagitatior deficiat inuenitur, phlebotomum non adhibebis. Quorum ætates & causas in phlebotomo nosse conuenit, ut à 18. anno, uel 20. usque 40. si talis ætas fuerit reperta, phlebotomandi sunt. Si uero plenioris fuerit corporis,

nel sanguinis abundantiam dum sanus fuerit habuisse cognoueris, aut genere suo habuit qui sanguine abundauerit etiam à 16. anno usque in 45. annum eos poteris phlebotomare. Cui si phlebotomo adhibito, declinationes fuerint, nihil adhibebis. Si uero declinatio non erit, post triduum explicito phlebotomo 4. die talia adiutoria adhibebis, si tamen fortis fuerit. Nam & ad balneum deducendus est æger, cui solum paranscum abundantissimo oleo, ut embrocas facias, quod solum tepidissimum esse debet. Aer quoque similiter procurandus est, quem cum ibi miseris usque ad guttur descendas, & tandiu manibus torum corpus fouere debes, quam diu ipse poterit ferre. Quem cum eieceris de balneo, diligentius inuoluas, ne frigus sentiat. Quod si fortior non fuerit, ut balneorum usus sustinere possit simili modo sicut in balneo demonstrauimus, in cubiculo calido uirgis adbibitis, uel ex tegmine in lecto laxius constricto uelut balneum facias, & ibi eum ex eadē embroca diutissime foues, quandiu tolerare potuerit, & cum foueris diligentius cum sabanis calidis extergis, ut frigus non sentiat, quem cum reficere delectaueris, reficiet ouis sorbilibus, & succis prisanæ, uel lactucis elixis sic solutis, sine aliquo condimento, nel mistura, quæ in uiscellis (alias iuscellis) sunt, qui & si hoc minime sentit, & febris grauior fuerit, nel nulla declinatio & si in firim exarserit, nel si recentem desiderauerit, primo ei negando cupiditatem bibendi incita, deinde aliquoties promitte, ut se promissionis exardescat. Quæ tandiu differt, quandiu eum senseris nimia siti perurgeri, uel bibendi habere ardorem. Tunc ei nas magnum & leuicidum, in quo aquæ splendor appareat, plenum recenti lymphæ offeres in tanta capacitate, ut qualiscunque fuerit sitis maxima febrientis satiari possit. Sed aqua fontanea eligenda est, & leuior, & in die erectio danda. Hos autem scias ex tantis etiam adiutorijs necessarijs ad crism esse uenturos, id est, discussionem uel saltem percipiendam.

De cognitione agmastici. Cap. XVIII.

Agmasticum, id est, secundum sinochum ita cognosces. Ab initio grauioribus agitur febribus cui quidem per singulos dies, uel etiam horas augmenta conrescunt, tunc etiam intra diem tertium quam causam habeat cognoscere te conuenit. Si enim ad primum diatritum nenerit iam eo reperies febres, & signa certissima, quæ quidem signa habent hæc: Cutis eorum aspera est, & asperior inuenitur, & urina rufam habent, quibus etiam uenter per singulos dies constringitur, est illis pulsus ingens & spissus, sine intermissione sordidus. Et quod grauius

gravius est per singulos dies, uel etiam horas augmentantur, quibus nec status, nec declinatio, sed tantummodo augmenta inveniuntur. Sudor nullus, qui nisi 7. die discusserit, aut non euadet aut difficilem uitam percipiet.

Cura.

Hi maxime phlebotomo curandi sunt, quos cum in diatrium recognoueris, adhibebis eis clystera auster, ut squibales relaxare possint, quod conficis sic: Mittis oleum & aquam, in qua elixata est blea, aut aquam de qua coctum est fursur triticum & silium, aut lixiuum, aut aquam simplicem, cui admisceas mellis coclear. 4. & aphroniti coclear. 4. & niiri seminiunciam, & salis treti coclear. 1. & ex tepido clysterizas. Et postquam fuerint squibales relaxate, tempera aquam cum hydroleon calidissimo quod tolerare possint, & diligentius uapora. Vbi intingens plagellas duas sic humidas ad stomachum impones, unam leuadam, alteram ponendo, & subinde oleum calidum, aut aquam calidam mitte, & diuinus uapores, & iandiu uapora, donec ei humidam linguam inueneris, aut frontem humectari. Quibus etiam potiones simplices dabis tales. Seminis apij triti coclear. 2. li ga in linteolo mundo, & in aqua coques, & ex ea aqua quando potum desiderauerint dabis. Catharticum etiam molle quod choleram tubeam deponat, dabis: Recip. mastiches unc. 3. cymini alsi coclearia 3. piperis grana 30. diagridij in pane cocti, scrup. 1. & cum melle ueluti electuarium tempera, exinde temperatum dabis coclear. 2. Quibus etiam omnibus noctibus caput fomentandū de aqua papaueris agrestis, uel hortiaui uiridis, siue aridi decocti, sine cum semine, uel siue semine eius, cum caput fomentaueris obuoluendum est linteamine calido, ne infrigidet.

De epagmaslici cognitione. Cap. XLX.

Epagmaslicus agnoscitur sic: Ab initio grauioribus febribus pulsatur, in tantum ut quisque cum uiderit medicum, nehementer de eius uita desperet. Secunda uero die, uel tertia declinatio inuenitur, cui etiam signa propemodum discussionis futurę inueniuntur. Aut sudor emititur, aut sanguis de naribus fluit. Nam prima die sitim patiuntur, secunda uel tertia suis ipsa refrigerabitur, & post minuzior inuenitur. Qui si signum discussionis in tertium diem non habuerint, securus esto 3. nel 7. die crism habituos. Quos cum diligenter cognoueris, sine aliquo auxilio medicinę sanitatem promittas. Istis enim nihil adhibetur, quoniam adhibita talibus medela agrotantibus contraria est.

Cura.

Oleum roseum frigidum tantummodo ca-

piti imponatur. Quibus etiam esca uetanda non est. Nam indeclinatione etiam uinum licet & aquatissimum dandum est. Quibus si aliquid adhibueris, adiutorium aut escam negaueris, facis sinochum homothenum.

De distantia inter sinochum & sinochen. Cap. XLX.

Vo sunt sinochus, & sinoeche. Inter sinochen, & sinochum quanquam sit a pertissima similitudo, tamen inter eos ista separatur atque distinguatur intellectus. Nam sinochus non habet anelsum, sed magis augmentatur. Sinoeche uero dum simili agitudine retineat caput tantum, tamen horarum, sed non plene munda-rum remissionem. Nam sinochus ex sanguine & felle rufo commixtis nascitur. Sinoeche uero ex fellis rufi abundantia concreatur.

De cognitione febris qua dicitur causon. Cap. XLX.

Sinoeche uero simili modo ut sinochus, aut causon curari debent, maxime phlebotomo, si tamen ætas, aut tempus, aut fortitudo permiserit, aut si nihil aliud e contrario occurrens prohibeat. Et si tempus & ratio in omnibus istis phlebotomiam adhiberi prohibeat, tamen pro causa faciendum, est ei cubiculum temperatum, si ætas, aut fortitudo permittat, ita ut medietas sanguinis deducatur, quam postulat causa, ut causa sanguinem deducendo subuenias, & temporibus dum non satis deducitur, seruias. Quamquam hæc causa sinochis, neque in senibus, neque in pueris uenire poterit. Memineris aut in ipso impetu febris intra tertium diem, aut quartum phlebotomum adhiberi, quia si cepertit causa fatigare, non poterit adhiberi phlebotomia, ne sit contrarium. Sed si phlebotomus pro certa ratione non poterit adhiberi, dimittenda est physis cum causa pugnare, aut certe sinochorum cura adhiberi debet. Etenim sinochus, aut causon, & sinoeche quamuis habeant dissimilitudinem, tamen simili modo curantur.

De eadem passione. Cap. XLX.

Causon febris est denuntiata ab Hippocrate, ut in acutis febribus fiat, & in prolixioribus quartanis. Nascitur autem ex cholera nimium licca circa subtiliores uenas, quę in hepate sunt.

Cura.

Mederi debet phlebotomo in principio curationis, & frigida potatio & frigida adiutoria in his necessaria sunt adhibenda. Viscera autem oleo & aqua calida & unctioibus quę hanc mediare & refrigerare possunt, restaura. Frigidę similiter infusiones capiti sunt applicandę. Item febris quę dicitur causon, siue cognos-

cognoscitur quando sunt: Sitis est grandis, & insomnietas, & alienatio prosequitur, & surdi sunt, vel muti, tamen hæc alia signa habet, tunc antequam febris fiat, dolor capitis sentitur & in bacino aurium ipse dolor cum forti idu & tremore configitur, deinde prosequitur febris cum supradictis signis. Item cura sit ut euacuetur cholericus humor, & extingatur, & dissolvatur. Euacuetur autem per sudorem, aut per uomitum, aut per ventris solutionem. Certissime autem extinguatur si bibant aquam multam, & nimis frigidam. Etiam hidroleon bibant aut lauacrum intrent ut sudet sed non descendant, nec diutius morentur. De eczima vero nihil aliud nisi pitamam mādudent, & abstineant se iuiuo.

De cardiacis quos diaphoreticos dicunt.

Cap.

XXIII.

Veteres hæc passionem præcipuam dixerunt. Indeque eam cardiacam dixerunt. Nam græci cardiacam dicunt cor, Verum ipsa indicat res nihil aliud esse, quam febrem acutam cum nimio sudoris fluxu per totum corpus manantis, cum paruo pulsu venarum, quæ signa produunt cardiacos. Hæc passio plerumque ætatis tempore facile lædit. Aduenit autem in calidiora tempora, vel corpora, & innens boni corporis, habitudinis, & ætatis. Præcipue hos lædunt lauacra post cibum, post cenam uomitus, frequenter corpus in sudorem uertunt cum animi defectu. Ex hac ualitudine sunt cardiaci 5. uel 7. dies incumbenibus febribus, & urentibus uelut flamma ignis. Ut autem coeperint esse cardiaci, refrigerant eis summitates manuum atque plantarum, plerumque usque ad cubitum, uel genna, siue etiam totum corpus. Venæ pulsus est uelox, & ueluti eleuatus, paruus, rarus, inanis. At ubi coeperit crescere passio, vibrans est pulsus, atque rarus cum tremore, & formatione, incognitus atque se subducens. Sequitur eos defectio animi, & subductio & nunquam dormiunt. Quibusdam eorum sudor nimius, & per totum corpus se diffundit, multum pinguis, & glutinosus, quem græci glytton dicunt. Atque si eum teneat, vis produciuntur. Post hæc grauitudo corporis, & virium, & sensus, & tremor, & debilitas, facies pallida, concaui oculi eos subsequuntur, suræ illis grauiantur, ubi desinit accessio, lingua liuida inuenitur. Si quando per epiploem laborant, uel eia ipsa passio dominatur, tincta est lingua eis, tunc frigida desiderant. At ubi coeperint passionem uergeri, tunc visus hebetatur, liuescunt eia manuum summitates, plantæq; gibberosæ fiunt, & ungues, & non in uno loco iacent, sed cum palpitatione huc atque illuc. Primum quidem

pulsus est densior, postea uero defectior. Cuius eorum corrumpatur plerumque in modum uix passæ. Accidentibus illis ventris solutionibus, malum signum est & aliquando plorat nulla præcedente causa. Ob quam causam oculorum pituitatem gignunt. Apparet in eorum oculis signum, quod onichior appellatur. Item anide conantur sæpe cibos sumere, tamen escam denotatam non digerunt. Subinde cibis delectantur. Hæc autem omnia signa sunt mortuorum. Aliquando fastidium patiuntur. Aliquoties per insaniam labia & linguam submordent putantes escam mordere, tunc nec potum, nec varios cibos dare debemus. Item malum signum cum post acceptum cibum & uinum, cum molestia, atque febre, & cum lassitudine corpus soluitur. Oculi rubescunt, lingua fit sicca, & aspera, præcordiorum sudor agit, plerumque autem & sine sudore dissoluuntur. Ut autem ad melius coeperint venire, pulsus venæ apparebit. Aliquando enim anidi sumunt cibum, & dormiunt, uelut quandam lassitudinem patiuntur. Fuit autem dissensio inter medicos, quæ pars corporis maxime in eis laboraret. Et nobis placet totum corpus in passione expeditius implicatum esse, quam scrupulose querere utrum cor in causa sit, an membranam quod cor tegit, aut stomachus, aut pulmo, uel iecur. Nō enim hæc particulariter passio curatur, sed toti corpori medicatur. Quomodo discernitur sudor ille qui febrium solutionem significat, ab eo qui innadit cardiacos? Istorum sudor satis erit calidus, in cardiacis autem sudor est frigidus, & pro amplitudine eius passionis, & paruitate naturæ paruus pulsus, atque obscurior, & densior est. Thorax eis grauiatur, frequenter inspirant, neque est animus. Sunt autem ex his quibus omnia uiscera sudant calidum, pulsusq; æqualis est, atque in summa cute, venæ inspirant. bono animo sunt, atque releuationem corporis sentiunt. Quomodo separamus passionem cardiacorum à passione stomachi? Si stomachus in seruire fuerit, sequitur debilitatio, angustia, compunctio, ac dolor, & quædam duritia in præcordiis inuenitur, uel in dorso, uel in pressura sunt post cibum. Quod si imbecillitas attigerit stomachum multum expunt, & os humidum habent stomachi, nauseam patiuntur, humores reiciunt, nonnunquam & cibum sumptum, manus infrigidantur uel pedes, & plerumque recalescunt. Cardiaci uero multum sudorem sentiunt, neque grauantur post cibum, neque reiciunt, rigorem summitatum manuum atque plantarum æqualem habent, sudorq; eis plerumque crassus adest, mali odoris. Eis autem qui pressura stomachi sudant, tenuis sudor oboritur, semper fit autem subductio animi, uel stomachi cum incipiat accessio fieri.

fieri. Est autem cardiaca passio defluxa, atque acuta, & ualida eo quod strictura quædam his non desit, & extensio præcordiorum & quibus est impetus.

Cura.

Hos autem corare oportet cum magna discretione, tamen generis curæ quod adhibemus sic operemur ut his adiutoriis utamur quæ expediunt. Multi autores dicunt eos incurabiles esse, sed tamen aliquando curantur sic: facere debent loco refrigerato, & umbroso non satis lucido ut constriuantur. Tunc & flabella apponantur, & aqua subinde aspergatur, & odores boni ad nares adhibeantur, & folia uitis, mirtæ, quercus, pinæ, lentiscai, malignanati, & rosarum, uel his similia stramententur. Item operiantur laqueis quæ non habent floccum calidum solvunt corpus. Stratos non strictus, sed latus fiet, ut subinde uoluant, & deinde fricare debemus pedes, ac plantas, quæ frigide sunt. Non debent aliquid tædiosum cogitare, in ipso impetu accessionis foueamus ex oleo frigido, & melle, & flabellemus, & spongiam frigidam intinctam expressam ceruicibus applicemus. Post hæc foueamus totum corpus & stomachum spongijs frigida intinctis, aut lacte, aut aceto. Subinde pannos in succis herbarum cinctor, aut arnoglossæ, uel polygoni, aut portulacæ, uel ayzo, uel myrtæ, uel rubi mollis, uel malignanati, cauliculorum decoctione lam infundata, apponimus & succum hypoquistidos uel acaciæ ea fusca solutam, uel omphacium, uel etiam in oleo uiridi, aut lentiscino, & uentri, & pectori, & stomacho, & uentris orificio appone similiter. Quod si sudor perueraverit, simplasma adhibeatur, quod sit ex poluere gallæ, thuris, myrtæ sicæ foliorum, & aluminis sicci, & omphacii sicci, plumbi nigri & loti, gypsi, & cretæ samæ & malleorum caulicorum, & malignanati, quem in nocte bis uel ter succum corpori aspergis, & sic fricato corpore, de istis emplastris, uel omnia adiutoria sicca & frigida adhibebis. Item manna, thuris, cum oui albugine ad mellis spissitudinem mista corpus uogatur, & cataplasmata adhibenda sunt. Vbi minuitur cariorum iram cum oleo uiridi, uel myrtino uel lentiscino, aut rosaceo uel potentam iram similiter cum posca admixtam adhibemus. Item mala cytonia cocta cum palmolis, & mista acaciæ, aut alumine, aut hypoquistidos succo, uel rore syriaco. Item de superascrips herbis cum pane sicco cataplasmas. Sic cataplasma imponatur, ut spisse subinde reuouemus. Item palmolis, & polline seminis lini cataplasmentur. Ponamus etiam odoramenta uariis; pania assisifamum, mala cytonia, myrtam, & his similia. Recentem uero damus non satis frigi-

dam, mellis partem unam, aque partes 2. ad mellis spissitudinem redactas, damus per tri-duum coclear. singula. Ut autem ad declinationem uenerit passio, mulsam damus coctam in modico uino, pulkes, oua forbilia. De pomis uero pyra, aut cytonia. De auibus, pollos columbinos, palumbos, perdicæ, anseres, hæc saginata omnia stomacho indigestibilia sunt, de quadrupedibus, rostrum porcellinum, aut cerebella; aut hœdina caro uel caprina. De mari uero, locusta, mugiles, purpuras, lupos. De uerbis uero, intybam, plantagines, sparagos. In declinatione autem damus uinum album, leue, de uase in uas transfusum. Bonum signum est quando pulsus uenæ surgit, sudor minuitur, frigus acriatur, somnus sequitur. Quando ista omnia sunt, uinum accipiant, & post epithematis confortentur constrictiis, & cucurbitis in ore impositis uentris. Quod si aliquid remotum fuerit, clysteria iniiciantur, maxime si perniciosus est fluxus uetris. Id si fuerit, succus lenticulæ per clysterem iniiciatur. Viantur post tertium diem lauo.

De iisdem cardiacis. Cap. XXXIII.

Cardiacos etiam heleni diaphoreticos appellamus, licet quam plurimorum sententia ita diffinierunt: Sicut in hac eiusdem professione nominis attestatur, cordis uictio hanc agitudinem fieri, quibus in hoc non dabo assensum. Nunquam enim clariuit manifestum quod indicium tentari in aliquo natura cordis intelligatur. Est autem totius corporis & uirum plena resolutio, quam in cardiacam diaphoresin appellamus, quæ cum sudoribus uiscosiss, & frigidis perseverare inextemptis uiribus manifestatur præcedentibus acutis febribus, & flammæ rum interiorum ardoribus quos aliqui causon appellantur. Hæc igitur passio frequentius in iuuenibus, quam in cæteris ætibus euenire consuevit in augmento ægritudinis, id est septima die septimum, & hoc quædam maxime tempore quo ætas, & ætatis calidior incandescit.

Cura.

Licet in omnibus passionibus generaliter præmonetur ad malorum ægritudinem necessitates gubernandas temporibus ferre debere attramen magna uir, & periculo interposito, dum sudoris illius emerit iniquitas, cum uirum defectu, & ex eo præsens est uitæ periculum, tunc confusus prætermisissæ temporibus rationabilibus adiutoriis circumstantibus simineamus. In cubiculum frigidum, nunc lectum stramioibus ueteribus lineis disponamus, nunc flabella, nunc pannos cum nardo & uino infulos præcordiis ordinare preponamus. Cataplasmata uero frigida & stupida imponenda sunt.

da sunt eorum præcordijs, ex frigido, & conia, nel rubo, aut marrullo, & dactilis, & caducis mali granati, uel inantis. Certissimum enim est singularum specierum quæquam medicum merita cognoscere, etiam temperiæ, aut commestionem adiutorij posse dispoere. Faciem ergo illorum ex pulsa frigida, uel uiuo stupido fomentabis, & puluere aspergis membra sudantia myrtæ, uel rosæ folijs succis tufis & cribratis, & manna thuris, galla, omnibus tufis singulariter, & commistis cum uiuo stipico, & eius fecibus simul mistis. Omnibus uero odoribus bonis, uel thymis matibus vires labentes, & membra deficientia reparabis. Articulos quoque eorum oleo eucimnetario, uel nimis uetusto, misto puluere nitri, uel piperis, pyrethri, adarcis, aut urticæ seminis defricabis, infundens calore ignito, morientem calorem reparete quatenus valeamus, nutriemus succis modicis, & frequentibus, frigidis tamē, quibus sudoris facilis nimietate vires emorientes exsiccantur. Nutriendi sunt eibus præ omnibus ratione ministratis, & nutriendi sunt similiter ex alicæ, uel pisanæ succis, in quibus ungulas porcorum in plenam usque eorum coctionem coqui fusdeo, aquam frigidam subinde per interualla subministrabis. Et si ætatis adhuc uapor calidior coegerit, etiam niuatias non aspernabo.

De typicis febribus, id est quotidianis. Cap. XXV.

Nunc dicamus de typicis febribus, quæ cum frigore atque tremore, & rigore accidunt, & cum calore recedunt. Quotidiana uero febris, siue per diem, siue per noctem fiat, hæc indicia habet. Nunquam cum tam acri uel ingenti rigore incipit, ut tertiana, & calor subhumidus inuenitur in quotidiana febre, & quasi cum uapore aliquo, & continuo, & diu manente, tactu manus, pulsus præuocatur ictus, quia pulsus venarum minor inuenitur in quotidianis febribus, quam in tertianis, in tantum quantum quartanæ minores pulsus patiuntur tertianis. Et quantum quotidianæ febres minorem situm habent à quartanis, tantum quartanæ à tertianis. Alio iudicio quotidiana differt à tertiana, quia in tertianis os, lingua, & omne corpus sicum est. In quotidianis habetur humidum corpus, & quotidiani uomunt phlegma, & itaque per uenientem egerunt frigidiora, & indigestibilia, & aquatiora, & sunt phlegmate plena. Quia corpora eorum qui quotidianam patiuntur febrem, phlegmate & indigestis humoribus plena uidentur. Nam in ætatibus, & natura frigidis, & temporibus, & locis humidis ac frigidis quotidianas febres maxime nasci uidemus. Iuncum calidum & sicum cor-

porē à quotidiana febre nunquam uidi correptum. Quia aut pueros paruos ætate, aut senes pigros, ociosos, & inercitatos, à quotidiana uidemus proprie corripi. Vnde nec sudore iuuantur, nec cum declinantur omainus sine febre sunt. Vrina uanque eorum qui quotidianis febribus laborant, aut candida & tenuis uidetur, aut spissa, aut turbulenta. In tertianis uero crocea satis, aut rubra, & quasi sanguinea. In quartanis diuerso colore, maxime pallida, uel fusca, aut indigesta apparet.

Cura.

Curabis ergo quotidianam sic: Osmel dabis post primam diem, id est, cum medium causæ tempus uideris, & dabis & diuretica quæ urinam prouocent, etiam escas, & cibos calidæ virtutis, & qui phlegma incendant, & deponant, & temperent ventrem frequentiori obsequio. Maxime dabis quæ os ventris purgent, deinde facis de radicibus vomitum, quæ dantur cum osymelle, & alia quæque talia simili ratione facies, & media ipsius viscera embrocabis & cataplasmas, medicina calidæ uirtutis: quod Rec. croci, melilori, floris camomillæ, seminis liui, ana drac. i. pollinis hordei vnc. 2. Itē adipia recētis porcini drac. 3. vitelli ouorū 5. cerę libi.

Item de cognitione ipsius. Cap. XXVI.

Item ad quotidianam febrem: si negligentia medici non fuerit, hac ratione curabis: Quotidiana febris (ut diximus) ex phlegmate fit, quia nimis est frigida. Ergo indoctus medicus dum putat omnes humores esse calidos, dabit eis frigidis cibis dicens: Extinguere uolo febrem. Quam quidem non extinguit, sed spiraculum uine dat, mittens calidam super calidam, & frigidam super frigidam. Ergo doctus medicus ista non facit. Sed cum febris quotidiana fuerit, dabit ei cibos calidos, sicut est piper, ruta, cyminum. Dabit in potu autem accessionem uinum subtile, albi coloris, & modicum temperatum, & calidum, generaliter autem in accessione nihil ei dabit, sed ante accessionem, & post accessionem. Et cum manducare uoluerit, dabis ei pullum habentem piper, & cyminum. Dabis & pedes laetentis aceto coctos, & pulgionem. De pecudibus dabis lac bibendum bene coctum, & siliginis buccellas, habentes oleum modicum. Quod si sitierit, facis aquam coctam cum radice feniculi, & apij seminis, & anethi, petroselinis, & uisii. Similiter omnia feceris, in paucis diebus liberabis ægrotum, quia (ut diximus) calida dantur in quotidiana.

De tertiana uera cognitione. Cap. XXVII.

Tertiana aliquando est uera, aliquando non uera

uera febris. Vera enim si est, mox à principio cum ingenti horrore nascitur, & frigore, & tremore, sed non tandiu tenet rigor quam calor. Nam cito frigus uertitur in calorem, & tenet calor diutissime. Pulsus erit ingens, uehemens, citatus, & creber, ætas hominis iuuenis, & fellitid est, rufi fellis abundantis, tēpus calidum & siccum, & locus talis & aer, litis uehemens, uomica fellita & erocæa, & sudor, & motio iterum talis ut prius erit, & post triduum congruentibus horis, ex his omnibus tertianā poteris cognoscere ueram.

Cura.

Curabis uero lauacri frequenti, & tēperato, cum olei abundantia, & aquis dulcibus non salis, & ideo nee nigro, nec sapone cum lauante utantur, talia enim desiccant, sed dabis ea quæ humectant & infrigidant diutius, & frequentius, quia contraria contrarijs curantur. Rursum enim fel calidum est & siccum, frigidis, & humidis delectatur rebus. Ergo & obsequio uentris, & urinae purgandos est hic humor talis. Quod quidem à se frequenter facit, quia commouet uentrem & urinam, si uera est tertiana. Ergo molli clystere curabimus uentrē; urinam uero dato apud decoctione, aut anethi, prouocabimus. Et cum uideris signa digestionis post tertiam, commotionem, etiam abinthij potici decoctionem addito melle modico dabis bibere. Nam maxime stomacho hoc etiā utile est, & si naturaliter satis balneo delectatur, his etiam lauent in die. Erut nantem sudelectentur, hortare. A uino autem omnino abstinere, quandiu uideris digestionem fieri causā, tunc dabis uinum alhum tenue, aquatam. Cibos uero dabis quibus possit humidari, & refrigerari corpus eorum qui in tertiana laborant febre, id est, ex oleis, bietas, atriplices, & succum maxime persanæ & alite sorbitiones. Pisces etiam aspratiles, & non assios, neque friscos. De uolatibus dabis ea maxime quæ facile digeruntur, molli & tenui carne, gallinaceorum etiam ascellas, & cerebella, & testiculos, & ungulas porcellinas dabis & oua apala, & horum similia quæ facile digeruntur. Dabis etiam poma quæ digestionem disfacilia sunt, a melle omnino abstine & dulcibus, & sinapi salsa mentis, & ab aerimonijs omnibus, à leguminiibus, & à uino ualde ueteri, & calidiori natura.

De non uera tertiana cognitione,
Cap. XXV III.

N Ochus citreus, id est, non uera tertiana in hoc discernitur ab illa quæ uera est. Nam uera tertiana ut multum, in septem periodis, id est, septem horis morionis suæ digeritur,

sed periculo est. Hæc autē non solum cito non digeritur, sed etiam si non diligentissime mox à principio cognita curationibus congruis obseruetur evidens periculum est, nec facile quibullibet remedijs postea artifex continebit eam, si eam diligenter non prouiderit. Vnde ualde attendendum est, ut ex proprijs signis eam ueram & non ueram tertianam cognoscere possimus, quantum intra fe signis discernant, et in cura distant. Hæc autem non uera, neque impetu, neque calore ueræ tertianæ simili est, nec pulsu, uel sudore, nec facit uomere choleram sicut illa quæ uera est, sed sudor paruus inuenitur in hac, & quædam humectatio & cum uapore raro, & lente exhalante, & diu tenente, & eum iam uidetur declinare, non tantum purus, aut sanus inuenitur pulsus, sed fordens & adhuc aliquid in se retinens febrium quæ paulatim addendo, in peius crescendo, inaptum durefcit, ut intra septem dies putetur esse si ipsi febrienti tantummodo credamus multorum mensium causa. His itaque & talibus signis ueram & non ueram tertianā discernendo proprijs curis diligens, & doctus medicus curabit sine periculo. Nam maxime obseruabis, ne iucōgrue æger tractus in peius & in longinquum, & non sine periculo protrahatur. Nam quantum causa creuerit, in tantum uirescit qui patitur minuitur. Amissa enim uirtus ualente causa non sufficit uiuere æger. Ideoque opus est ut respicias semper ad ægritudinem, & impactum causæ, & ad quantitatem nerium eius qui ægrotat, & ad qualitatem morbi, & lapsus non rescindendo ciborum rescitione, sed forte nimis in initio abluendo ad periculum ducas. Sed ita fac, ut congrua collatione beneficiorum medicinarū assiliter ægro gaudente natura fruatur. Hunc non solum in hac causa modum considerando tradimus, sed in alijs semper omnibus causis. Scio enim quendam incipientem autumno à notho tinea corruptū, uel quæ ad primum ueris tempus non posse curari, & in tantum extenuatum, ut dubitaremus de eo, quia & ipse non consentiens præceptis medicinarū, aliter quam conueniebat, se habebat, & tempus hyemis causæ contrarium, ægritudinem in peius protrahebat. Nam & splen ipsius in magnitudinem excreuerat, uisceræque protensa stomachi indignatione, & grauiore ægro easus minabantur. Nam uultus pallidus, tumore mutatus, uirides oculi, cerurum tumor, pigrum hydropem ostendebant. Cæterum corpus exilitate & ex longinqua ægritudine confectum macies lassauerat. Cuius exemplum inde proposuimus ut sciamus cuius periculi sit non uera tertiana, si à principio cognita, & congrue curata non fuerit.

De duobus tertianis. Cap. XXIX.

Cura.

ERgo nothum tritum, id est, non ueram tertianam qui patitur, mox à principio abstinendus à lausacro est. Et tam diu abstine, quam diu signa digestionis causæ uideantur. Neque quotidie cibetur, sed alterno die sufficit ut reficiatur succis optimis, & forbilibus beneficiis, & digestorijs. Quiescat silentio, & molli lectulo iaceat. Media eius uiscera fricentur, id est, stomachus, & præcordia cataplasmentur, & embrocantur. Clystere utantur non facis molli, & si sanguinis detractionem uideris necessariam, & considerabis mox à principio indubitanter unde putaueris utile esse auferes quantum conuenit. Omnis ratio dietæ ipsius non sit perfrigida, & humida sicut supra diximus in ueris tertianis. Sed hic quidem habeant calidum aliquid, & quod incidere possit originem causæ, id est, succum pitæsanæ pipæratum. Sed etiam interiectis diebus hyssopum, origanum, uel etiam spicam nardi insusam in melliterato decoques, mellicratum sic confice, melis partem unam, & duas uini coque ad spissitudinem, & adiecto pipere dabis bibere, & alia quæ urinam possunt mediocriter mouere. Præter illa quæ uehementissime, & nimium siccat uirtutis sunt, & nimij caloris, id est, quæ nimium calefaciunt, & siccant, sed quæ mediæ uirtutis sunt dabis. Vnde maxime absinthium ponticum transactio in septimo die, ex aqua calida dari conuenit. Multis etiam osymel datum profuit. Nec non etiam utendum est illis medicaminibus hypelatis, id est, solutius, quibus non frequenter uti sumus. Vtilissimum his probauimus, ut uomant post cibum. Quo facto multos mox scimus sanatos.

De quartana uera. Cap. XXX.

Quartanam uero febrem non tam difficili ratione cognoscimus, quia euidens est. Nam duos integros dies paros & quietos habet. Quarto die semper mouetur, & pulsus eius rarior, & leuior, habens inæqualitatem. Calor non longe minor est à supradictis febribus, quia melancholici quartanarij sunt, & tempore autumnali, & ære mutato & inæquali, id est, non salubri naturali ratione, & ex quo hic humor in corporibus moeueretur, & spleen maior & crassior sit & extra naturæ modum. Fie quartana frequenter ex febribus non bonis, & indigestis, & male curatis. Nam istis febribus sicut in tertianis quomodo fellis rursus non inuenitur. Id enim proprium est tertianis, & cum declinaueris, adhuc pulsus inueniatur sordens, lassus, leuior, & rarus, & tardus etiam ad opera faciendum.

Curabis ergo quartanam sic: Mox à principio diligenter præuideas, ut mediocriter & quiete ac patienter agas, neque medicamentum aliquid temere des, neque purgationem uentris, uel detractionem sanguinis facias, nisi forte uideris nimium sanguinis esse abundantem & cum ferrieris uenam, statim respice intente fluentem sanguinem. Qui si erit niger & spissus securus auferes quatenus causæ putaueris conuenire, uel ætati, aut uirtuti eius qui patitur. Rursus uero & tenuis, id est, liquidus si fuerit, mox retine, & stringe uenam: non enim conuenit in huiusmodi autem. Tangenda uero est in hac causa uena in brachio sinistro, quæ est mediana, cum opus fuerit, & digesta sibi debenda est utilis, & digestoria, quæ non inflet, uel tendat stomachum, sed quæ temperet uentrem, & prouocet. Nec non etiam interdum clystere in initio utendum est molli, postea acriori, ad depouendum humorem. Abstinendos eos scito à porcina, & caprina, & carnibus his similibus quæ grauant digestionem, & ab omnibus frigidis quæ grauant superachum. Pro qua re nolo ut existimes hanc superduam esse dietam, quam uos regulam uiuendi dicimus. Dieta enim medicina est, & pars medicinæ. Nam cum dicimus digestibiles cibos dauidos, & non incongruos, nec non etiam dum offerimus cibos frigidos, aut calidos, humidos, aut siccos, necesse est ut sint congrui ut contraria contrarijs dum medentur medicinæ præbeant auxilium, quoniam contraria contrarijs curantur. Ex his quia hæc causa frigida, & sicca est, calidis & humidis delectatur rebus, & quia ad dietam nobis redeundum est, ideo obseruare debebis sic, ut ab omni iracundia, uel alia qualibet animi commotione, sic & ab omnibus cibis qui melancholiam nutrire uidentur abstineas. Nephastum enim est augere malum. Nam cum difficillima certis & probatissimis medicaminibus adhibitis hæc causa curari possit quanto magis non curatur, si quartanarij ea quæ melancholiam nutriunt adhibeantur. Vnde ipsa causa nascitur. Si requirant, ex melancholia diximus illa esse. Et diligenter illud caue ne patiens frigus feniatur, & ideo obseruare debes à constrictoribus cibis, quia anathymiasin faciendo ex constrictione, in peius existentem causam faciunt. Obseruabis etiam ab omnibus frigidis & humidis cibis. Vino autem utendum est tenui, albo, & mediocriter naturali uigore calido. De uolatilibus uero uel auibus dabis, sed quæ tenuiorem & sicciorē habent carnē. Utendum illis maxime quæ non aquosis uel palustribus gaudēt locis, & piscibus qui facile digerantur & nihil fluidum habent, sed siccioribus carne. Salsamentis quoque, & sinapi, & alij calidis digestorijs rebus. Dandū etiā

Kt his

his interiectis diebus antidotū diatritonpipe-
recon, & diaspoliten, aut certe piper tritū ex cali-
da aqua. Hoc etiā si quotidie detur, ut bibant,
recte datur: deambulatio & perfrictio blan-
dæ manus fiat, & si aliud aliquid est consuetu-
dinis, non penitus prohibendus est, & si inde
utendum. A lauacro autem si non omnino po-
tuerint abstinere sine tædio sui, sola perfrica-
tione aut deambulatione utentes, non medio-
criter iuuabuntur. Et si non ualde uehemens ip-
sa quartana est, etiam si exercitatione consue-
tudinis utantur utiliter faciant. Hæc talia uti-
que fieri conueniunt in principio causæ eius, ut
que dum ueniat ad statum causæ. Cum uero
status erit, tunc abstinere ab omnibus his & dicta
uere quam subtili, & petreui, & quietem adhi-
be, & ociositatem prolixiorē, & mediatunc
corporis partes cura cataplasmatæ, & embro-
cis calastis. Deinde necesse diureticis, & cum
manifeste uideris fieri signa digestionis causæ,
tunc etiam dabis purgatorium quod melan-
cholicum purget humorem nō semel, sed quo-
ties putaueris conuenire. Vetandus est ab esca
uel a cibo contra risu: nomitus uero sæpius adhi-
bitus, si nihil sit quod e contrario prohibeat, el-
leborum album utiliter dabis primum radice si-
xum & abstractum. Deinde si sic datum nihil
profuerit, etiam ipsum elleborum (ut ipse nos-
sti) dabis. Qui uero uomere non libenter ha-
bent aut non possunt, hos fortiori purgatione
purgamus, & resectis interiectis diebus panis,
theriacam diacides accipere suademus, & alia
quæque talia, quorum ad has febres laudantur
beneficia, ex quibus omnibus probatissimum
est nobis hoc antid. quod opim quirinatum
recipit. Qui uero mox in principio aliquid tale
dederit, nō proderit, sed maxime oberit. Nam
ex una quartana duas facit, & ex duabus tres,
aut ex leui fortiores, & ita in summum pericul-
um hominem deducit, & facit ut non possit
uita esse copiosa. Id etiam in alijs typicis fe-
bribus obseruabis, ne quid tale mox in princi-
pio des antequam uideas person fieri causæ, id
est, digestionem, antequam in statu ueniat cau-
sa, tunc enim proderit datum, ante uero obe-
rit. Nam scio ego quendam medicum hoc
ignorantem, dedisse homini tres quartanas ha-
benti, antequam statum faceret causæ, uel signa
digestionis ostenderet, medicamentum quod
dicitur diacides, & ab ea hora in peius tractus
est, in tantum ut mitteretur in sinocnem, nec
ei postea potuit succurrere, sed ita occidit.


G A R T O P O N T I

MEDICI VETVSTISSIMI

De typicis febribus

LIBER.

PROLOGVS.

 Vanquam typicarum febrium signs,
curationesq; rationabiliter quidem,
& non confusæ omnia dicta sunt, me-
lus est tamen diuisiones & coniunctiones di-
ligenter ostendere, quare omnium causarum
supra scriptarum febrium, quæ netæ, & non
ueræ, uel quomodo sibi iungantur breuiter
pandam.

Qui, & in quo tempore fiant. Cap. I.

Quotidianarum causæ uerarum hyeme te-
net, & in principio ij cum febre cepe-
runt, & cutis eorum sudorem emittit, & sic ut
sudor uideatur, non tamen amplius effluat.
Nam secunda die typum patiuntur, post nero
typus recedit, & accedunt leues horrores. Sunt
alij qui nec frigus, sed nec horrores habent.
Aliquibus etiam nec secunda die frigus acci-
dit, sed leuem sentiunt typum, quibus horia
uariando in ascensum pergunt. Vipita non
in uera quotidiana, sed in prima hora tenuerit
aliquem. Secunda uero die hora 2. tangi-
tur. Similiter 3. uel 4. die, uel cæteris incre-
mentis dierum, horæ ascendendo uariantur.
Siquidem & alio indicio, nel signs possunt
agnosci. Quia in quotidianarijs (sicut supra
dixi) agnoscuntur, ut horis suis nascantur, sci-
licet non immutatis. Quia quidem post fri-
gus typicum calore purgentur actiori, & post
febres sudorem in capite, & in pectore habent.
Aliquoties & per totum corpus sudant, sicut
tertianarij pati solent, aliquibus etiam siccis
accidit: urinam uero albam habent, stercore
uero phlegmate mixta egerunt, quæ subalbi-
da aliquoties, & pingui iuueniuntur. Nam
hæc causæ nascitur ex phlegmate, his etiam fa-
cies sobremidiores sunt, & ambarum partium
laterum inflatio sequitur. Pedes etiam tumi-
diores sunt, sed non omnibus intumescunt. Hi
uero qui hoc morbo laborant, frigidioris & hu-
midioris naturæ sunt, maxime si tempus partium
dum, aut frigidum occurrerit. Nam & in uerno
tempore quamuis calidum & humidum sit, ta-
men possunt homines hæc causæ teneri, propte-
rea quod habet humiditatis partem. Sed quia ma-
xime hæc causæ confurgit hyemis tempore, quod
ea frigida & humida sit. Hic ergo obcurrēbus,
cum tempus, & aer, & humores corporis uirus
malum

malum miscent, quotidianarios faciunt, quibus uisi medicinarum arte succurreris, tunc quotidiana ipsa in macronoxiam uertetur. Quod cum contigit, necessarium quatuor facit. Ergo ante succurrendum est, ne ad tantum malum quartana ueniant causae.

Cura.

Quotidianarius uero in initio causae oxymellis simplicis dabis ex melle & aceto per triduum bibere, per singulos dies coctear. 4. quibus utiliter & radiculis oxymelle infusus pridie ieiunio edendas dabis, ita ut eis continuo uomitus prouocetur. Quod si minime profuerit, oxymelli addis piperis grana 20. & sic per singulos dies utantur. Quibus per singulos dies potio-nibus acceptis simplicibus, uirinam prouocabis sic: Mitte in calidam radices sparagi, aut ipsos ramulos, similiter apij, & anethi, aut si omnia non fuerint, uel unam mittere, & tandiu coquantur donec color aque prasinus fiat, & quoties bibere uoluerint, potant. His etiam uenter depouendus ex cathartico phlegmatico, quae si minus ualuerint, philonium, aut adrianum in modum fabae, si uires permiserint, cum mulla dabis. Si autem ex ipsa causa lassior fuerit, uel aetate senior, aut puerulus, ne uirtutes adriani, atque philonii sustinere non possit, pro modo uirinam antidota sunt deducenda, & in breui tempore curabis. Quorum stomachus curandus est fomentis calidis, id est, ex oleo calido, cui admiscendum est dum coquitur abinthium ponticum, & anethum. Hi salsum, & crucam comedant, aut raphanos, aut radices. Quibus conditum nilirer datur, ita ut in calida superscripta conditum miscas. Melius si condito addas spicam natdi, piper, & semen apij, & sic bibant, qui quidem a lauacro abstineri sunt. sed in hac causa plus cathartica adhibita assidue profunt, nehelementis, & si semel in hebdomada, aut duabus uicibus, si uires, permiserint, sumantur.

De quotidiana non uera. Cap. 11.

Quotidianarius non uerus sic intelligitur, quia cum horis per singulos dies uariis descendat, & ascendat, ut puta si 5. hora aliquem tenetur, alia die 4. horateneat, tertia die in 3. hora. Et subinde per singulos dies alijs horis ascendat. Norhi enim quotidianarij in 24. horis diei, noctisque, uix hora una, aut duabus, aut multis tribus requiem patiuntur, quia quotidianarij nothi non ex phlegmate dulci hoc morbo tenentur, sed eorum phlegma acrius inuenitur, ideoque & frigus non patiuntur, quod ueri quotidianarij habent, sed habent lenes horrores. Caetera signa praeter horarum ascensum, aut descensum, omnia communia habent. Sed hi maxime in autumno, aut circa autumnum

tenentur, quamuis quolibet tempore hoc morbo teneri possint.

Cura.

Quos fomentis curabis, sicut supradictum est, & caraplasmate, quod sit ex polline feminis lini, & hordei, scennugraeci, & melle, & aqua, & inde stomachum calidissime per triduum uaporabis. Quibus cathartica adhibenda sunt, quae phlegma depouant, & cholera rufam. Ex his oxymel necessario datur, cui admiscendum est piper, pulegiam, & hyssopum, origanum, & thymus, & exinde coctear. 3. ieiunio per singulos dies dabis. Radices etiam dadas sunt, sicut supra monstrauimus, & uomica pronocabis. Urina quibus ut supra mouenda est. Sed hi conditi non accipiant.

De cognitione duarum quotidianarum. Cap. 111.

Quotidianas duas cognoscere, quod bis in die tangant, sed utrum uerae sint ambae, an non uerae, vel si una uera, & altera non uera, ita intelligi potest. Si ambae uerae sunt, horis suis non mutatis typo ipso, uel febre patientes tenentur. Quod si ambae uerae non fuerint horis ipsis typicis uariatis tanguuntur, & non illis horis quibus solent. Quod si una uera, & non uera mixtae sunt, uel quod est uera hora sua cognoscitur. Non uerae autem accessionibus horarum natiuntur, ut si quando tenuerit hora tertia, alia die, aut secunda, aut quarta tenent eum.

Cura.

Quotidianarum duarum curationes superius ostendi, id est, uerae & non uerae. Ergo si ambae uerae sunt, earum adiutoria adhibebis. Si autem ambae uerae non sunt, similiter earum impende medicinarum auxilium. Si uero una uera, & alia non uera fuerint, singulis sub hora ipsarum accessionum sua offeres adiutoria, & etiam succum hunc, quamuis omnibus quotidianarijs necessario datur, uidelicet ex succo pitaeae calice implebis unum, cui admiscebis piperis grana 50. & feminis apij drach. 2. & salis tritici cyathum 1. Hoc accipiat quousque causa accedat in melius. Post uero ex omnibus speciebus istis quae succum accipiunt: mediam tamen supradictorum partem mittis, & quomodo causa requirit, subiunde paulatim deducis ex omnibus superscriptis, & sic usque ad perfectionem sanitatis datur.

De tertiana simplici, & non simplici. Cap. 1111.

Tertiana aliquando simplex, aliquando uero simplex, aliquando uera, aliquando notha. Tertiana uero quae uera tertiana est, sic intelligitur: Ab initio frigore nimio exagitantur febrientes, ut

ijs horis quibus aguntur de frigore complicentur & tenentur frigore & febre horis 12. Quibus recedentibus, sudor consequitur, & litopetia alijs 12. sitis nimia non deest, lingua sicciore, ut loqui pene non possint. Urina rufa cōsequitur, nentrem facilem habent, & insomnietatem patiuntur, & tantam assuationem, ut nudare se uelint, & in recentem submittere se desiderant, & hoc maxime est inuendum, ut tempus & corpus intendant. Nani æstatis tempore hæc causa consurgit, & maxime iuniores, & calidiores, & corpore sicciores tenet. Nam hi cum sani essent peraciores fuerant in quolibet exercitio, & calidiores animo (alijs omnino) solliciti, cogitantes assidue, choleeram rufam nutriunt, unde hæc causa nascitur. In die inter diē tanguntur nō immutatis horis.

Cura.

In primo, nel secundo, si fortes fuerint phlebotomandi sunt in uena brachij dextri, quæ est iofana, quæ ad hepatis pertinet. Dabis ptisanæ succi lib. cui admiscenda sunt hyssopus, origanum, pipere, mel, & aceti parum. Et hæc catapotia dabis post 7. dies: quæ Recip. aloes, scamoneæ, colocynthidæ, succi absinthij æqualia pondera, confice cum succo caulis ad modum cicentis, & dabis secundum uirtutem, prima uice 7. secunda 13. tertia 21. Quod si neglexeris, mutantur in quartanarium. Quibus quotiescunque bibere uoluerint, dabis mulsam, in qua decoxeris spicam indicam, & pipere. Item potandum semen apij & anethi decoctum in mulsâ dabis. Item post 7. dies absinthium ponticum in calida coctum utiliter dabis bibendum. Osmel etiam ieiunus cum calida, & pipere datum, mirificè prodest. Catharticum etiam lene adhibendum, quod choleeram rufam deponat. Vomitus etiam post escam prouocandus est, unde maxime molto curatos constat. Nascitur hæc causa ex putridis choleribus rufis.

De signis tertiana non uera. Cap. V.

Tertianæ nothæ signa hæc sunt: Autumni tempore hæc causa tangit ambarum partium hypochondria, id est, iecinora inflata sunt cum dolore. Quibus cum in accessione dierum creueris, naltu sub tumidiori efficiuntur, nulla accidente siti. Urinam habent subalbidam, uentrem sine solutionis obsequio, non mutant etiam assidue phlegma choleribus mistum. Quorum signa præcipue inteuenda sunt. Qui cum die inter diem febrem patiuntur, tamen non horis suis quotidie commouentur, sed rariando aut horis descendit, aut ascendit. Hi sicut ueri tertianarum non sudant: neri enim tertianarum sudore aguntur. Nascitur quam plurimum hæc cau-

sa in infantiibus, & declinantibus ætate. Hæc enim causa si autumnii tempore quencumque tenuerit, & non ei medicinz auxilium succurrerit, in macronoxiâ uertitur, ut omni hyemis tempore ex hac ægritudine carere non possit, exinde in accidente moritur tempore.

Cura.

Tertianarum notharum in initio, uel usque ad declinationem ad lauacrum sunt abstinenti, quibus etiam si signa bona futuræ digestionis cognoueris, lauacrum tamen raro offeres. Hi etiam dum in causa sunt non quotidie reficiendi sunt, sed reficiantur anethica die scilicet calidis, & pepsicis, id est, digestilibus. Vtere succo ptisanæ cum pipere, & melle cum aceto paruo. Quorum uiscera calefacienda sunt ex oleo, in quo anethum & absinthium decoctum est. Quibus clysmata nimis fortiora adhibenda sunt, sicut frequenter scripta sunt. Qui si iuuenes fuerint, aut sanguine abundauerint phlebotomandi sunt, ita ut magis uena eorum enectur, quam plorimum sanguinem educat. Quibus si phlebotomus minime profuerit, clysmata etiam adhibebis tale hydroleon, & mellis modicum, & aphronitri, scrup. 5. Urinam eis conuenit prouocare, ex petroselinis, & feniculi femine, & anethi femine elixis, quorum aquam bibendam dabis. His etiam carburtica danda sunt, quæ choleeram rufam & phlegma deponant, & nomitus prouocandus est: Olei partem unam, aquæ tepidæ partes duas, salis coctæ 1. in simul misce, & dabis ad bibendum quantum satietatis fuerit, & mittis pennam in ore, ut reicere possint. Quod si hoc adinorinum nomitus non prouocauerit, dabis calcucecameni unc. 3. tritæ cum lacte caprino calefacto calicem 1. ut post deambulationem ex se reiciant. Præterea cum febre cœperint, & sitierint, dabis eis frigidam bibere. Qui quotidie recedentibus febribus balneo utantur dulcis aquæ, sed maxime in solio plus fricentur quam in aere. Utantur etiam ptisanæ, & cum causa ex parte refrigerauerit, ut non tam grauiter ex eadem causa grauentur, aquam calidam in qua absinthium decoctum est ieiunant bibant, quibus dare debet cationes, id est, atriplices bietas, aur malus, uel lactucas, aur cucurbitas, oua apala frigida, & poma diuersa, celsa, & cætera his similia. Vinum album, & leue, nec miretis quod typum diximus frigidis esse curandum. Celerato enim malo accenso, frigore perungentur. Hi enim ex coleribus rufis hanc causam patiuntur.

De signis tertiana uera, & notha. Cap. VI.

Tertianarum duarum, uera scilicet, & notha, si sese cōiunxerint, his signis cognoscuntur. Quia uera diebus suis tangit non immutatis horis:

ris: notha uero suis variatis: Verbi gratia, si una die tanguntur hora nona, & altera die hora 6. tertia die sicut prima die tangitur hora 9. Quarta iterum die quinta, aut hora 7. tanguntur. Sic ergo fit ut intermissa die, uona iterum tangantur hora, sicut tertianarii ueni, & si 5. die hora 6. nota tacti fuerint, intelligis hæc signa non ad ueram tertianam pertinere. Vnde intelligere conuenit ex uarietate signorum feb. duas tertianas esse coniunctas. Si uero quotidiana tertiana se coniunxerit, sic intelligitur, ut tangantur sicut quotidianarii, ut diem intermissum non habeant.

Cura.

Cum duæ tertianæ commistæ fuerint, ita curanda sunt, ut in diebus suis secundum disciplinam feb. unicuique sua adhibeas adiutoria, ut die tertianarii ueri suū adiutorium adhibeas, & die tertianarii nothi, suas offeras curationes, quia quædam modum per singulos dies diuersarum signa uariando monstrantur, ita etiam & curatio non una adhibenda, sed utrarumque causarum diebus suis conueniunt adiutoria.

De signis uera quartana. Cap. VII.

Tetratæ nigris coloribus abundant, unde hæc causa contingit, maxime eos tenet qui medium habuerint ætatem. Nam senes & pueros si tenerit, non diutius laborant. Quæ si uera & integra quartana sit, his signis cognoscitur. Primo de quo tentatur, nimium tremorem, & febres aciores patiuntur. Sitis nulla, pulsus ingens, fortis, spissus, qui cum decem periodos expleuerint, declinationem eiusdem frigoris patiuntur, & febres augmentantur. Ventrem contractum habent. Quorum urinam suscipere conuenit, & cum tesciderit, inspicienda est, cuius colorem subnigrum inuenies. Tumidum etiam splenem habent, uultum & oculos subhumidiores, hi etiam recedentibus febribus sudant.

Cura.

Sive in initio, siue in quolibet tempore, si nulla grauantur lassitudine, phlebotomandi sunt, quorum sanguis tandiu currat, donec niger colorum rubrum conuertatur. Quibus post tertium diem clysterium austere adhibere per triduum debetis, & escæ calidæ, & calidam uirtem habentes, uel quæ ventrem deducant, offerenda sunt, ut est lappathium decoctum in patina, siue malus, uel bleza, quibus ut uirtutē calidā facias, piper adhibebis, conditum etiam piperatum offeres, à porcina, & bubulina abstineant, uino albo & leui utantur. Pisces aspriiles, & salsamenta comedant, & sinapi, & cætera talia. Quibus ieiunium piper cum calida dabis, abstinendi sunt à balneis. Quibus manus defricari debent manibus puris, quorum splen oleo calido primū fomentandus est, in quo decoctæ sint caparis

radices, & absinthium, & anethum, cataplasma etiam splenis tale facis, quod Recip. aristologie rotundæ & corium radices hederæ, sinapis ana unc. t. caricas, 10. conficitur sic: Caricæ die & nocte in oxymelle infundantur, & sic extra terantur, & cum puluere admisceantur, dehinc in eodem oxymelle omnia mittantur, & usque ad sufficientiam decoquantur, & ita cataplasma impones, ut duritia splenis soluatur. Quod si minime profuerit cathartica adhibenda sunt, quæ nigram choleram deponant. Hoc frequenter facias, & post cathartica diatrioticon pipercon, & philonium uel adrianum, frequenter ieiunium dare debebis. Qui etiam calidam aquam si in usu habet, bibere si uoluerint, bibant. Epithimum, & cyminum, & hyssopum ereticum in coctura addes calidæ, & sic bibant, & post escas uomicam prouocabis, & radices in oxymelle infusas per triduum ad satietatem comedant. Et post comestionem, oxymel ipsum cum aqua calida bibant, ita ut potu satientur, & sic uomicam prouocabis, quibus helleborum album sic dabis: Tolle raphanum, & perunges ex helleboro, ita ut helleborum intra radices coniunctum una die nuaueat & eo soblato ad satietatem dabis radices, ut manducet, & uomitum prouocabis, quibus etiam oxyporum adhibebis, & maxime calida frequenter danda sunt.

De quartana non uera. Cap. VIII.

Quartana notha maxime pueros & senes retinet. Nam urinam habent albam, & post febribus & frigore perurguntur quarum horæ suum ordinem non seruant, & per singula lustra horas deducunt & adducunt. Sitis eos tenet. Hæc causa nascitur ex phlegmate, & choleribus nigris.

Cura.

Si fortes fuerint, in manu sinistra de uena splenis phlebotomandi sunt, quibus etiam apophlegmatismata adhibenda sunt sic: Mitte taquilagiam tusam in dulcoribus calicibus duobus, & aceti uno, ubi fundis etiam hyssopum, & thymum, per triduum coquens, & dabis ut gargarizet in sole, aut in balneo, ad heminæ dimidium modum, quia satis iuuatur. Carbaricum etiam dabis, quod phlegma deponat. Reci. pulegij, piperis, drach. 4. cymini drach. 3. cocogundij, lacteridos, ana. drach. binas euphorbij drach. 1. mulsam quod sufficit, & cætera quæ phlegma depouant. Vomica etiam ieiunium, & post cibum est prouocanda. Ieiunium etiam semen apij, & piper cum calida aqua bibere dabis. Quorum splen si in tumore fuerit, curabitur sicut supradiximus. Quibus etiam autid. dipolisten dabis. Si uero hæc adiutoria

minus profuerint, theriacam eis dabis in ipso impetu. Philonium similiter dabis & adrianū, ut supra. Quibus succum pisanæ quotidie dabis, & piper admistum. Ventrem etiam per singulos dies per clysterem deduces. Et si hæc omnia minus ualuerint, helleborum album per triduum in aqua infundes, & cum eadem aqua philonij, drach. 2. dabis.

De quartana duplici. Cap. IX.

Quartanarum duplices cum in quartana simplici sanos duos medios habent dies: primo etiam & nouissimo februnt in duplici quartana biduo ab initio februnt, in medio habent unum diem sanum, & biduo iterum februnt. Sic duæ quartanæ coniunctæ veræ, per typos ipsos & horas suas agnoscis. Si ueræ non sunt, in horarum accessione variantur. Quod si una cardinalis non verè misceatur, una die & una hora non agnoscitur, sed in alia varia commotione, hæc duarum quartanarum sunt diuersa indicia. Si quartanæ veræ notha se coniunxerint, aspicias secundum disciplinam superscriptam, ut scias quæ dies sit quartanæ veræ, & non per, ut horis accessio suarum, uel dierum, sua adiutoria adhibeas, ut si in die horas suas seruauerint, catharticum des, uel adiutoria ueræ quartanæ. Si non seruauerint ordinem a adiutoria quartanæ nothæ adhibebis, ut eodem die talem des medicinam, prout est causa, aliud in crastinum, quia quædam modum quartanæ subiungunt. Ita etiam adhibenda est duplex curatio, ut in die uniuscuiusque febris ei adiutoria offeras.

De planetis. Cap. X.

Planetarum febres quotidiano typo similes sunt. Nam frequenter medici in his falluntur. Quanquam signa planetarum interdum diligenter ostenderit, tamen rem nimium necessariam credidi adiiciendam. Scire te conuenit planetas esse febres, quæ nullis febribus, nec typi habuerint indicia. Vnde si super signis, nullam periodicam febrem comprehenderis esse, recognoueris esse planetas. Nam quæcunque febres variando se, suum genus aut speciem non ostendunt, profecto febres erraticas, quas greci planetas appellant, se esse demonstrant, & qui pro certo eas intelligere non possunt, existimant amphemerinas esse, id est, quotidianas. Nam planetæ febres quotidie bis tangunt, ut poterint duæ quotidianæ esse coniunctæ. Sed inter quotidianas coniunctas & planetas, hæc habetur distantia, quia quotidiana pariter necessario typum patiuntur, planetæ sine typo sunt. Sed maxime hæc signa habent, quæ aliquos bis, & ter, & quater, in die tangunt, &

non diu ipsæ febres retinent ægotantem, ut possunt habere inier se interuallum sanitatis, aliquoties habent & diem anethicum, id est, sanum. Dum enim tangunt & bis, & ter, & subito semel in die tangunt, & in tempore redeunt, ut bis, & tertangunt. Sunt etiam quibus typus levis accidit, sed non semper, nec omnibus accessio nibus, sed ut typo ipso accedente medius fallatur. Ex tanta uarietate accessio num intelligis planetas esse febres, quas latine erraticas diximus. Quæ febres diuersis humoribus infestantur, quia quemadmodum ista febris uaria & instabilis est, ita etiam corpus eius de omnibus uariis humoribus infestatur. Vnde necesse est ex ægritudine hac ut quartanarius efficiatur, nisi ei auxilio medicinæ fuerit succursus. Dum enim cholera nigra & rufa, & phlegma inter se contendunt, & exuberant, tunc planetæ febres nascuntur. Sed dum humores hominum in corpore exuberant, qui uicerit, obtrinet causam. Sed quia paulo cholera nigra obtusior & fortior est cæteris humoribus, quoniam eandem choleram cæteros humores obtinere necesse est, quartanarium cum uicerit facit. Ergo ne ad huiusmodi tam leuæ quartanæ ueniat causam, auxilio medicinæ congrue succurre.

Cura.

Præcipuum & magnum auxilium est catharticum dare, diuersam choleram & phlegma depuens, quod etiam tu medicus qui naturam pigmentorum nosti, colligere poteris, ut intelligas quæ pigmenta phlegmatica, & quæ diuersos cholericos soluant, ut ex diuersis pigmentis unum catharticum facias, ita ut temperatum sit. Quamuis cathartica tamen stomachica danda sunt. Quibus utiliter detur succus pisanæ, cui admiscebis diagridium modicum & piperis grana 20. & epithemi, quod sufficit. Quod si epithemum non fuerit agaricum mitius, melius si addas semen balsami, sed ex omnibus modice mittis, ne aut plus faciens homines turbes. Quibus dabis piperis grana 20. uel si etas minor fuerit, paulominus ipsum catharticum, pro ut uires ætatis prospexeris, dabis. Omnia enim medici est præuidere & temperate utiliter conuenit, etiam epithemata adhibeantur stomacho ante horam accessio nis, quæ calido nigore utantur. Sed in omnibus nihil præponendum est cathartico, quod humores qui febres nutriunt deponat, & cum detrahi fuerint, necesse est ut etiam febres amputentur. Isti mane comedant, & ab omnibus quæ melancholicum nutriunt humorem, cibis abstineant.

G A R I O P O N T I

M E D I C I V E T V S T I S S I M I

De symptomatibus febrium,

L I B E R.

P R O L O G V S.



Nunc diligentius, & ualde consideremus, quantum possumus perpersemus, quale, & quantum ipsa febris iuxta suam speciem, uel quale iuxta suum genus symptoma asserat ægrotati periculum. Nō enim mediocriter laborat, neque periclitatur, qui ex febribus & symptomate, id est, dolore aliquo, & uigilijs consumitur, cum una res ex his per se tantum si sit assidua, sufficiat extinguere hominem. Vnde præuisa & intellecta utriusque virtute, hoc est, quales sint febres, & qualia symptomata earum, & si qua uehementiora, & peiora sunt, ad ea magis attendas, ut cum omni diligenter cures, sicut doctus artifex, ne sis omnino piger, aut negligens, atque non curans. Vtputa si sit febrilis quidam plethoricus, quod est abundans corpus malorum humorum crassitudine, & ex eorum indigestione compungatur, uel commordestur, & ipsum os ventris quod dicitur stomachus, ex congestione indigestorum, uel pinguium humorum comprimat, & suffocetur, uel concludatur, ita ut nullam habeat exhalationem. Et si etiam plethoricus aliquos corruptos vomat humores, aut per humorum abundantiam laborans natura clausis horum meatibus non inuenit iter apertum, & liberum egestionis, & periclitetur angustia, quid in hoc facere conueniat nos videamus, utrum ad causam & ad impetum febris attendamus, aut tantum purgabimus nimietatē, ut diximus plethoris. Quod si fecerimus, non sine grandi malo faciemus, aut ante magis os ventris plenum, & laborans humoribus purgabimus, etiam cum id factum bene prius uiderimus, tunc melius totius corporis purgationē faciemus. Mihi uero sic fieri utile esse uidetur, ut antea id quod grauius est de pluribus obtrineamus, & sic postea id quod leuius est, facilius curabimus. Nam scimus multos medicorum ignaros, non ad hoc respicientes, & incongrua facientes, plurimos hominū extinxisse, multosq; grauissimo periculo subiecisse, aut certe in macrocoxiam misisse. Quia antequam laborantem, & plenum stomachum corruptis humoribus, & crassius purgarent, & corroborarent, ausi sunt, contra rationem totius corporis facere purgationem. Sed si cum fluxu uentris febrat, qui plethoricus est, non

est alia aliqua adhibenda purgatio extrinsecus, etiam si non illa purgatio tanta sit, quæ sit sponte per fluxum uentris, quantum causa postulat, tamen sufficiat, quia fluxus naturalis est, frequenter enim ipsa sibi physis medetur, quæ est domina corporis. Nam sæpe multi non intelligendo existimant debere eos qui talia patiuntur, pluribus & maioribus purgationibus iudicare, & ausi sunt, hi aut sanguinem detrachere, aut uentrem sponte fluuiem, dato medicamine amplius prouocare, grauissimisque eos periculis, magis lædendo affecerunt. Sed si quis etiam plethoricus ac corruptis humoribus contorquetur, & hunc purgari medicinali ratione necesse sit, nec tunc tantum demere uentris semel, aut sanguinis conuenit, quantum ipsa causa, uel plenitudo plethoris postulat, sed sint aliquid ex symptomate reliquentes, sudorem frequenter irreprehensibilem commouente, aut uigilia inferente, & uirtutem ægrotantis commouente. Ita ergo considerandum, & maxime cauendum est, si uigilijs continuis, uel etiam aliquibus laboribus æger afficiatur, alio quolibet symptomate non uehementer, & multa purgatione, uel sanguinis detractiones facere conuenit, non enim ad hoc sufficit æger. Arbitrandum etiam hic & quasi symptoma aliquod accipiendum ad curationem ægrotudinis, si sit aer uehemens, siccus & calidus, sicut præfenti anno factum uidimus, incipiente ortu canis, uel arcturi, atque syrii stellæ, quod tempus incipit à 15. calend. Augusti, & extenditur usque in nonas Septembris, & usque est numerus dierum 50. Vnde qui hoc tempore sanguinem detraherint, finem uitæ fecerint, eo quod medici ipsorum causas tantum attendentes, temporis rationem ignorantes, symptoma causarum non uiderant. Ita ergo symptoma sit ægrotudinis, sicut frigidum sat tempus sit & humidum. Ergo simili ratione nec tunc utile est detractionē sanguinis fieri, nec uentris quia non minima fient ex hoc pericula. Perierunt namque illi in sicco, & uehementer ignito, ut diximus temporis aere, ablato irrationabiliter corporis quo sustinebantur humore, siccati nimium & aresciti subitis angustijs animam exalarunt. Similiter & illi qui nimis frigido aere temporis, amiserunt per aliquā purgationem, uel detractionem sanguinis naturalem corpora calorem, subito ex nimio frigore constrikti mortui sunt. Quia pari ratione nimium frigus, ut uimus calor occidit. Ita siccitas multa, & multus humor necat. Quippe si in frigore nimio auferas sanguinem, aut in tempore calido exices satis, noue contraria, & in considerata ratione occides. Ita ergo & locorum positio, & regionum situs, & aer considerandus est à nobis, quia neque in nimio calidis, aut nimium frigidis locis,

lucis uel regionibus, auferendus est sanguis, aut ueter purgandus, sed temperandus ex hac ratione, ad utilitatem curationis aegroti. Nam si sit calidus locus, calidaque regio, calidum tempus, abstineamus à retrahendis humoribus, id est, per uenas, & per uentrem. Similiter & in frigido locu, & regione frigida, tempore frigido, quod minime facies. Consideranda ergo est & physis, id est, natura aegrotantis. Nam multi neque nimia in se ferunt exhaustiorem, neque ieiunium ferunt, id est, nec abstinere possunt à cibo longum, quia sunt aliqui, qui mox amittunt uirtutem corporis exhausti per uenas, id est, per uentrem, & aliqui ex ieiunio stomachum in uitium incurrunt, & fastidium incipiunt patiturorum, & si quid coacti & compelli acceperint, digerere non possunt, sed aut mox uomunt id ipsum, aut non digerendo grauius in peius, hoc incipit esse iam symptoma. Ergo in hac parte cognitionis physis ipsa, id est, natura corporis eius qui aegrotat, ponenda (ut dixi) & consideranda est. Quotquot enim calidi & siccis natura corporis sunt, hi omnes si uehementer, & uimium purgantur, facile & non mediocriter laeduntur. Quia & consuetudo non parua res est, decet ut consideretur, & in hoc, id est, in exhauriendo, & in alijs omnibus, & in ceteris rebus. Secunda enim natura est consuetudo. Nam illi qui plurimum utuntur cibo, & purgari soliti sunt, illos ne metuas, etiam uehementi purgatione uentris, & detractione sanguinis exhaurire, maxime si alia testentur, his purgationem fieri manifeste debere. Istos uero mediocriter exhaurias, qui autem lenius purgati sunt, nec dum uehementer pertulerunt purgationem uentris, uel detractionem sanguinis. Alios uero horum aut facile exhauriendos censeo, uisi prius diligenter omnia perspexeris & id fieri exposcere causam, atque postulare cognoueris. Ad hoc ergo ualeat uincem corporis, uel qualitatem considerabis quia alij spisso, & restricto sunt corpore, ac ualido, & non facile sentiunt molestiam. Vnde hos tales corpore non uerearis semel, & uehementer purgare, si erit necessitas, aut detrachere sanguinem, quantum causa postulauerit, & si nihil aliud de diuerso sit, ut solet, quod prohibeat. Illos uero qui fluido & molli corpore sunt, & imbecilli quidem, & facile uincuntur ab omni re, nec ferunt molestias, hos minime exhauriendos censeo, etiam si id fieri manifesta causa postulauerit, non solum detractionem sanguinis, sed & alijs etiam quibuscumque purgatorijs, uel medicaminibus mediocriter, & non semel, ut diximus, & uehementer in his utendam censeo, quia mox uicti malefiunt, atque deficiunt. Vnde partim paulatim melius utimur, & sine metu atque periculo. Simul considerandum eadem

ratione, & in illis est, qui aut nimia mole corporis grossi, uel pingues sunt, aut nimia exilitate perueniunt, & macilentis facis sunt. Quia in his detractione sanguinis de uena nimia, & purgatio uentris uehementis, nec facilis est, nec sine periculo fit. Est enim in his quasi symptoma, prohibet id fieri habitudine corporis, & aetas ipsa. Nec enim pueri, nec senes possunt hoc sibi fieri, nec gaudent, si facta fuerit, sed tristes & periclitantes erunt. Sed ut diximus uersus eos iuxta rationem causarum considerantes, diligenter exbauiremus, non semel, nec uehementer, sed partim & molliter abstineudo à cibo, mediocriter ieiunium utimur, in tempore suo cibum dautes, & potum. Curandus est stomachus cum fricationibus rationabilibus, & clystere non uehementi & molli, & congruo, atque temperato. Omnibus medicinaliter utimur embrocis, & fomentationibus, & lixoperitis, & cerotis, & cataplasmate salubri, calidis fomentis, etiam cucurbitis, lenibus, uel eum foco, uel scalpello, ut ratio causae postulauerit, nec non & lauacro utimur tempore competenti, nihil omnino incongrue facientes, ne laedamus potius, quam iuuemus. Phlebotomo uero utimur, si grauis & matura fuerit causa ex uitio sanguinis, & aetas, & tempus permiserint, & uirtus aegrotantis. Clystere uero utimur si uenter non obsequitur, & de cocta febrilibus uentris egestio, in his squibala costricta augmentant aegritudinem. Fomentationibus & embrocis ea loca curabimus, quae patiuntur, aut gargarismate simplici, uel electuarijs tunc utimur, cum tussis, aut singultatio aegrotantes infestauerit, & si phlegma collectum in stomacho senserimus, focum praefixum addito oxymelle dabimus, aut apium bene cucurbitum, si urina difficilis erit, cataplasma utimur, ad incidendas febres, id est, lini semine, ex aqua in oleo roseo tantum decocto, aut si senserimus medias partes stomachi indignas, & in seruire positas, ad dimis fœuugraeci pullines, & hordei, & tritici, & oleum dulcel, his addimus etiam & mellis quod sufficit, & sic utimur etiam cucurbitis sordidis, & paragoricis. Horum omnia tempora abseruanda sunt, ut quando declinent, & quando commoueantur cause, sciri possint, quia talia horum in declinatione fieri conueniunt. Cibus maxime leuibus, id est, succis praefixum utimur, cum febris accenditur. Deposita enim & transacta febre, paulatim addimus cibos bouos, & digestorios ad recuperandam seculum uirtutem aegroti, & ad confirmandam sanitatem.

De dolore capitis. Cap. I.

SI quis doleat capite sicut solet, & sit abstinentes à cibis, & cordis pulsus patitur, impera ut uo-

ut uomat. Qui uomet choleram, aut phlegma, aut utrunque nullo autem evidente signo, circa ventrem causæ alicuius existentis, unde possit per anathy. in asin dolor capitis commoueri, præ scire tunc demum, & considerare diligenter debemus, ne forte nimietas exuberationis alicuius humoris, enframæ meatus alicuius, aut feruorem fecerit locorum eorum qui sunt in capite. Id autem sic poteris cognoscere, si interrogas, an totum caput doleat, atque tendatur dolore, an nimia aliqua capitis parte nehemis infederit dolor. Deinde interrogabis, utrum ipse dolor cum gravitate sit, id est, quasi pondus aliquod grauet caput, aut tendatur, aut confingat, aut pulset. Nam si cum pondere capitis dolor erit, significat abundantiam humorum. Si uero cum confusione, uel compactione humorum feruentium, significat accerrimam exaltationem, uel uaporationem. Si uero cum pulsu, & quasi cum percussione, calorem & feruorem significat. Si cum tensione, id est, quasi tendatur doloribus caput sine pondere, & pulsu, indigestiæ uentositatis copiositatem significat, & tumens spiritus abundantiam. Si uero, tensio ipsa capitis cum pulsu erit, feruorem atque indignationem significat, & membranarum quibus cerebrum inuoluuntur. Si autem cum pondere tensio erit es pituitis, abundantiam significat humorum infra ipsos sinus membrorum congestam, atque constrictam. Cum ergo omnia ista definita ratione manifeste cognoueris, inquire, & considera, rursus causam, id est, originem quæ id facit. Ipsa enim causa uniuscuiusque passionis, curationem sui ostendit, id est, si abundantia & nimietas exaltationis, uel uaporationis feruentium humorum erit, præuide & cognosce, ne per nimietatem febrium ebullierint humores, uel biles, qui à stomacho effusi, uelocius caput cerebrumque petierint, aut propter infirmitatem partis capitis, aut propter nimietatem & abundantiam humorum in toto corpore, qui totum corpus pondere suo grauant, & hanc quidem non difficile curabis purgatorio, & euacuatione totius corporis. Illam uero causam quæ per imbecillitatem in parte capitis sit, cursibus non tantum in ea parte, sed etiam per antipasmum congrue facies, si acriter elystere, & ligaturis constringas pedes, & blandis confricabis manibus, & necesse erit aliquid detrahas sanguinis ea alia contraria parte. Ipsam uero partem sic curabis. In eodem tempore quo. antipasis sit, embroca capitis utaris, quæ possit abigere & repellere causam à parte capitis, deinde à his adiutorij, quæ possint purgare & euacuare, sic etiam postremo quæ possint confirmare & corroborare. Repellit & abigit oleum uiride recens, & nouum, nec non & oleum roseum idem facit, & per se ipsum, & cum

aceto mistum, & quæcunque sunt sibi uirtute similia, id est, oleum in quo papauer fuit infusum, & frondes, uel summitates oliuæ tenerimæ & per quàm molles, & hederæ grana, nientia, & sisimbrium tenerum & uiride. Viendum est uero bistepesactis, si a quosus, uel frigidus humor in capite abundans sentitur. Si uero calidus & cholericus, frigidis embrocabimus caput. Euacuat uero & purgat atque detrahit humores, calens oleum, ipsum per se tantum, id est, purum & magis id facit si sit uetus, aut si anethum in eodem oleo bulliat, aut radices cumeomeris agrestis. Nam isto tali oleo fomentantur curabis mediocriter, & non ualde spissos & acres humores. Cum ergo crassiores & satis spissos humores uolueris purgare, des quoque infusum serpillum, de super oleum vel palegiu, aut nepiam, uel mentham, aut sisimbrium, quia hæc talia & uehementer purgant, & uirtutem tribuunt, & laxata reficiunt membra. Unde oportet uti his continuatim usque ad sanitatem completam, & si necesse erit caput purgari, per palatum & nares id faciemus, & sternutationem prouocabimus, & in balneis aere siccis caput sabanis diutissime perfricabimus non utentes oleo, nisi sale, & nitro, & sinapi. Hæc ergo cura dicta est capitis agrotantis. Nam quia ex nimia febre dolor capitis fieri solet, frigidis effectus, atque uirtute embrocabimus, id est, hydroleon, uel oxyrhodino, hoc est aceto & oleo roseo, uel ex papauere confecto oleo.

Designis doloris capitis.

Cap. II.

PER quantitatem febrium capitis dolores esse diuimus, maxime in qua parte incubuerit febris. Venas ergo eius in quo ascensio eius febris est, extendit cum dolore capitis, unde Græci symptoma dicunt. Quoniam & augmentum febre, augetur dolor capitis, & laxante, laxator. Quamquam eam passionem ab ipsis audiamus, qui eam patiuntur, tamen manifesta hæc eius passionis sunt signa quod in initio eius sæpe grandis grauedo est. Et cum passio grauis esse cœperit, manifestum est tunc magis caput commoueri à febre, & dolorem reddere. At ubi augmentum eius uires acceperit fit manifestus dolor, atque grandia maxime temporu. Deinde totius capitis sequitur dolor, tamen ostenditur quædam agnitio in facie, quam Græci pyrofin prosofum nominant, quia nonnunquam oculi eorum rubescunt, & genæ. Palpebræ uero tardius moentur. Tacent plerumque & tumescunt uena, piget eos loqui. Oculi quoque eorum non clare cernunt, uia audiunt, naseant, albumen quoque oculorum foris uersum ostendunt, uel intumescunt ubi dolor cœperit minui. Nonnunquam subito & sine ratione, desinit

definit dolor capitis, ex quare suspensio esse debet, ne fiant illa quæ Græci paracopen dicunt, aut obliuio mentis, id est, lethargia, uel cataphora, quæ alienationis signa sunt mentis, id est, phrenesis.

Cura.

Oportet his hæc adiutoria adhiberi, id est, mollibus manibus, atque calidis caput continere, atque frontem, nec sine valde costrictæ manus, ut eadem res hæc passionem possit augere, vetandusque erit valde aer luminosus. Locus enim lucidus si erit oculorum acies percussus irritat dolorem capitis, cui cum in statu erit, oleum calidum adhiberi iubemus, nec satis calidum, nec satis frigidum, quia intemperantia lædit. Quod si se addiderit dolor, oleo camomillino caput perungatur, aut mulsam gargarizent. Quod si perdurauerit dolor, foueatur caput ex elixatura seminis lini, aut maluz. Si uero increuerit dolor maximus, acacia, aut creta ex aceto, aut cum aqua trita, frontem, & tempora perunges, aut apponito uermes terrenos cum pipere. Quod si febres interiores erunt, & magnus increuerit dolor, sanguinem de uena emittere debes, aut cataplasmas adhibere, ut accipiant elixaturam anethi, aut absinthii pontici. Quod si adhuc perdurauerit dolor, pressus erit caput tendendum, & cataplasma adhibendum capiti, ex lini semine, & bordei polline, & sœnugræco. Si uero omnia contempserit, cucurbita erit adhibenda, cum hypolaupadio, non satis iugita in medio capite, scarificatione moderata adhibita, id est, ut non minus aut amplius incidatur. Post hæc cerotario uti debent. Quod si hæc omnia obseruaueris, ad plenissimam eum sanitatem perduces. Sane si febres non sunt, chirurgia est adhibenda. Quod si inter est nausea, oxymel accipiant, & uentrem prouocent.

De parotidis in febribus. Cap. III.

IN febribus parotidæ nascuntur, propter eorum magnitudinem febrium, vel quia in ipso impetu frigidam aquam vel bibant vinum plurimum, aut ex perfricatione, vel si immoderate se abluant, uel si plurimum loquantur, uel si dura assidue manducant, aut frangant, aut multū dispuent, ex his enim omnibus causis phlegma fit. In febre plurimæ gignuntur parotidæ circa aurículas, unde & parotidæ sunt dictæ.

Cura.

Plures uero harum modos diuersos dicunt, & uarias adhibent curas. Nos autem communes quoque impetus communis curatione curabimus. Nam quamdiu in impetu est causa, regimus lana munda & molli. De hinc cum ceperit impetus febrium diminui, fouemus oleo

dulci & calido aures, & ex eo oleo ibi aliquid infundimus, nec fasciamus lana foramina aurium. Extendit enim dolores aurium eonstipatio, & tandiu fouemus oleo ipso, donec mitigentur. Quod si non mitigaueris, cataplasma adhibendum erit, id est, mulla, vel hydroleon, siue decoctio sœnugræci, uel lini feminis, aut maluz comitione. Miximus & oleum calidū, & pollines hordei, & ex eo cataplasma mus, ita tamen ut oleum & mel misceas. Tunc si durius dolor permanebit, opponamus ei pannos lineos tinctos in calida & oleo. Quod si impetus & dolor permanebit, pinasis erit illis adhibenda, id est, spongia in aqua calida, intincta, & expressa. Deinde cucurbitas adhibemus, ut non satis cunstringant. Vbi non declinauerit duritia, cataplasmas ex farina hordei & mulla. Vbi autem minuitur duritia, creta argentea, aut succo de immaturis prunellis, id est, acacia ex aceto conspersa de penna linimus. Vbi duritiam inuenimus, cerotum est adhibendum ex oleo dulci limido cum achanti radice, vel adipe porcino recente. Post hæc apponendum erit malagma diaquilon, uel diasanfucū. Quod si duritia permanferit, dissoluere debemus humorem ut remollescat, & corrumpatur, apponentes triduo nasciturij semen tritum & bordei in mulla coctum, quousque duritia illa ut superius diximus, ad maturitatem humoris ueniat. Et tunc chirurgia erit adhibenda in rotundo, & locum incisum curamus sicut in omnibus uulneribus exigit. In omnibus autem temporibus curare debemus, ut cibos omnes molles, & sordiles accipiant, & alicam ex mulla gargarizent.

De lingue asperitate. Cap. IIII.

Propositum est dicere de sicca, & aspera lingua & uita in febribus. Differuat equidem febres a se, quia alia magna est, & alia leuis. Nā quando leuis est siccaturque lingua, sed quando augetur, asperatur. Quando ceperit in statum erescere, inflammatur, atque uritur lingua, quam causon Græci dicunt.

Cura.

Ergo hæc prima causa collutione oris in tempore adhibita, soluitur, & si siccitas, aut asperitas permanet, signum est hoc quod ex intimo lingue incedum seu siccitas, uel asperitas uenit, id est, ex interioribus membris quæ lingue sunt connexa unde impetus nascitur, & cū ipsa sunt in impetu, necesse est quoque quod nexum est signa impetus gerere: ex hæc enim causa quam uidemus, illam quam non uidemus ratione perspicimus.

Cura.

Lingue autem asperitatem ita humentari oportet:

oportet: Dabis aquam continere in ore, uel lini semem, aut plinum in linetolo ligatum decoquitur, & cum eodem linetolo ut est ligatum linguam fricabis, & sic semper infundes aquam mundam, & lauas, spongiaque detergis, sen ex oleo roseo cum melle misto infundis, uel portulacæ succum dabis in ore tenendum, & libanoidos in mella decoctum, necnon & damascena, maximeque ossa eorum, cum lactuca uel caulis succo.

De periculis. Cap. V.

Periculosam passionem latine possumus dicere nimiam sitim, cum ardore febris. In initio hanc passionem his signis comprehendimus: Primum quod phlegma pectoris eorum uritur, talique anhelitus redundat, hi quoque uehementer sitiunt. Accidit hæc passio stricis febribus, uel illis qui epistole laborant, quibus maxime respicere debemus, si cū strictione coperit augmentum habere, tunc debemus in oleo calido, uel decoctione scenugræ, non tamen spissa, uel multum aquata, uel decoctione maluarum intingere pannos laneos molles, uel lineos, aut spongas molles, & eas opponere præcordijs & thoraci, & si possibile erit etiam per dorsum eas immutare assidue & dare operam oportet ne frigescant.

Cura.

Tunc conspicias quod contrarium habet corpus, deinde adhibebis hæc laaamenta superficiiei corporis, id est, plagellas in calida, & oleo incinctas, in qua calida immittis rosam siccam, aut lini semen. Et iterum post hæc aqua calida labia, uel os, & linguam ægri lauas, adhibebis eucurbitas uacuas, & loco iaceat æger ludo, & pensili lectulo. Cataplasma erit adhibendum: quod Reri. palmulas pingues, & oleum, & aliquid mellis, atque aquæ, & pollines hordei, lini seminis, scenugræci, altheæ radices, aut folia, & cõficitur sic. Palmulas bene trita, oleo, melle & aqua fetueant, & sic althea optime trita, & pollines omnes commisceantur, & ita calida per triduum stomacho imponatur. Post hoc cucurbitæ tractus adhibeatur, nausea prouocetur, & uenter subducatur. Vbi lauari fuerit ardoris, obseruari debet à stipticis uel frigidis, quod si imperus maior fuerit ardoris, frigidam accipiant, & sic bibant pro siti, accipiant rhodomel, aut omphascamel, aut eliaurum apij uiridis, aut rose sicca, cibum accipiant tenerum, & paruum.

De fastidio cibi & potus. Cap. VI.

Fastidium est cibi ac potus recusatio, aliquando nehemtius in toto recusant, aliquan-

do non ex toto accipere summo opere recusant ægri, aliquoties molestam, & contrariam solent desiderare causam. Quando hæc patitur, stomachi est præcipue uirum. Aliquando cum fluxu, aliquando cum strictione, & non tamen in febribus, sed sine febribus hæc accidit passio. Ergo si constrictura laborant, stomachus laxari debet, si per fluxum constringi, & dari quod demonstramus, atque monemus his quædam odoramenta quæ odorem ferant, & si passio permittat, id est, si faciat declinationem, gestare debemus illos cum equis, & planitiis, & narios cibos & separatos in declinatione dare, & leue quod dabimus uariis sit. Inuitant enim uarietates animum infirmi, & repente quædam oblata eaciant, & in extremo odoratos damns cibos, ut gustent de plurimis paululum. Tunc enim si hæc fecerimus, lætabitur infirmus. Deinde introducatur sermo qui irriter ad cibum inducendum. Quod si non acceperit cibum, clyster iniiciatur, & cataplasma uti debent de pane sicco, & palmulis, & malis cytonijs. Quod si omnem cibum auertat æger, & contrarijs sibi delectetur, sermone atque ratione utendum erit, sed primo quæ sunt recta contra uoluntatem ei debemus. Quod si omnia contempserint, & contraria uoluerint, accipiant. Si uult constrictoria, ut fluxa utenda sunt, tamen qualia accipere ualeat, eoque modo deficientem sustinebimus, usque in declinationem quasi propter remissionem.

De singultu. Cap. VII.

De ualido singultu sermo est: accidit aliquando febricantibus, nonnunquam & sanis plerumque euenit, & acute febricantibus. Huius rei signum est stomachi concussio, seu uibratio cum quodam sonitu proprio atque huius rei solitario, & ueluti asperitate quadam resonante, & in tantum ut singultus cogat plerosque uomere quæ accipiunt, nec simpliciter uomere, sed cum quadam præfocatione: aliquando validior est. Nam tunc & uersa quæ accepta sunt rejicere cogit.

Cura.

Adintoria diuersa ad hanc ualitudinem adhibemus quæ superius in stomachi impetu diximus. Quod si frigus est in stomacho calefactoriam curam adhibemus, dicente etiam Hippocrate: Singultus aliquoties fit aut ex repletione, aut ex inanitione. Inanitione repletionem, & iterum repletio inanitionem soluit. Si per longum tempus fuerit, uomitum prouocamus ex raphano, & potum damus acrum squilliticum, aut castoreum ex mella, aut calidam, ubi coxeris cyminum, aut oxymel cum calida. Iuuat eos eurus & uectatio, & stomachus curetur, uel oxyptoria.

oxyporia accipiant plus theriaca, uel epithema. Cibos uiles & leues ex calida aqua accipiant, intervallo facto non plus, sed parum, & catamodicum glutinant, ne singultu prouocent.

De sicca & aspera lingua. Cap. VIII.

DE sicca & aspera lingua sermo est, quam uisu comprehendimus & tactu. Videmus autem illam siccam quam tangentes sentimus asperam esse, & quasi papulas quasdam in ea ceruimus: atque sentimus. At si encausum passa sit, est ruborata, uel subinericiij coloris, siue liuidi, aut nigri, uel rhadagias habere cernitur, sicca autem quasi pellicula pergamenorum similis. In se habet uulnuscule, nunc ampliora, nunc minor. Unde & uocem æger tardam uel obscuram reddit, quia os siccum, atque linguam ostendit. Oportet autem eos collutione oris uti, aut apponentes in mento, aut ante mentum, quod græce antereon uocatur, lanas molles intinctas in oleo calido dulci. Linguam uero fricamus cum spongia molli, & munda, & a qua calida intincta. Post hæc colluendum est os ex aqua calida, aut ipsum antereon, diamoron medicamento tangito, aut ex rosa sicca cum croco ex æquo trita, & cum melle mista de penna linito. Cataplasma ex pane & aqua calida, & polline scænuigræci, aquatam aut mulsam dari conuenit, & aliquando melle cum penniculo fricabis, & lini semine integro in linteolo ligato, & in calida tincto, aut foliis mentæ uiridis linguam fricabis & os. Quod si asperitas magna fuerit, & os & palatum uisum fuerint, gargarent elixaturam rosæ siccæ, ad tertiam decoctæ in aqua.

De diaphoretica. Cap. IX.

Diaphoreticos multi cardiacos appellant, quos ita cognosces. Ut ceperint nimis & acerrimis exagitari febribus, sudorem patiuntur incongruum, & non ceticum, ex quo uehementi periculo urgentur, qui sudor tanquam symptoma appellatur. Nascentur hæc eaulex sinucho, aut ex caufon, aut ex sinoehe.

Cura.

Cuius signa certissima cum uideris, & nimis sudantem, & sine intermissione repeteris, hæc curare debes sic: Phlebotomabis eum mense Martio maxime, & facies tenere myrtos subasellis, ne forte cum phlebotomias sudor incurrat. Si uero neglexeris, apoplexia, paralysis, epilepsis, synanche, eueniunt. Constitues eum in pauimento, aut in tascello, aut in tegestri, quas a qua frigida roras, & ponis pueros & puellas, ne cum mularijs flabellent, melibis si ex cana uiridi sint, quæ assidue in recentem intincta

præstare possint corpori æstuantem uentum frigidum & ex guttis humidum rorem. Hæc sine intermissione fieri iubet. Quibus etiam dandum est diacodion mane coclear 1. sero 1. His etiam similiter utile est rhodomum adhiberi, quamuis hæc duo adiutoria non solum diaphoretico prouident, uerum etiam causis unde diaphoresis descendit, id est, sinucho, & caufon, & sinoehe. Adhuc etiam myrtus super patientem debet spargi, & cataplasmata lixoperiton adhibenda sunt, maxime quæ sunt ex portulaca trita, & acinis acidis. Quod si acini iam maturi sunt, aut nondum nati, etiam ex portulaca sola cataplasma fieri potest. Quod quidem siue habeas acinos, siue non, trita portulaca, & indocta in plagella sic frigida imponenda sunt, ut sudor ille noxius reprimi possit, quamuis hoc cataplasma etiam omnibus causis istis faciat, id est, sinucho, sinoehe, & caufon. Item ut supra cataplasma lixoperiton, quod facis sic mittis semen lini in recentem, & cum mollior teris, & adde rasuram cucurbitæ uiridis, & sic frigido stomacho imponis. Omnia enim lixoperita in stomacho pouenda sunt, sed hoc lixoperiton facit & ad caufon, & sinochen, & diaphoresin. Sed in hac causa quam maxime obseruandum est, ut & locus, & flamma sit pica procurentur, id est, ut recens sparsa non desit, & frondibus hederæ, myrtæ, & granatæ, uel pampini, ac buxi cubiculum ornetur. Medicamen ad cardiacos: Foliorum hederæ terræque cum ramulis suis, quantum duobus digitis cingi potest teratur, & in uini albi phiala, id est, ita ut sub diuo moretur nocte una, infundatur & sero, in primo mane exprimis, & sic bibatur. Item ipsum uas foris sit tota nocte. Hoc facie debus nouem, & suabis hominem, & abstineat se æger ne coreo, medat undecunque aur carnem quæ cum corde cocta est. Item cœtra sudorem remedium optimum. Si ante solis ortum herbam quam appellant semperviuam legas, & ante solem teras, atque eum qui patitur ex eodem succo perungas, utiliter profectus dicitur. Etiam remedium est si in collo eius qui patitur uiridem unam, & album corallum, ita ut tota nocte in recente maneat ante solis ortum suspendas lino, scilicet inserta, sed melius est celari. Et uita, ne hoc remedium facere die solis incipias. Cui etiam pulvis recipiens umbilici maris, corallij, anacardi, cimini, piperis longi, ossis eboris, spinæ histricæ, panis fermentati, gladioli, ossis de corde cerui, opij nuconi, ana 1. cū calida aqua dandus, tamen spina, ossa, & panis combusta sunt, & iacent in silentio & secreto.

De sudoris distantia. Cap. X.

Quomodo discernis cretice sudantem ab eo qui

qui à diaphoresi soluitur, & creticus sudor est: Hic pari numero factus & calidus. Diaphoreticus uero est in pari numero & frigidus, & tenax. Non facile, sed satis necessaria questione proponis. Nam pluri medici ignari, salutaris sudori imminenti, ægotantibus resistere, & alii diaphoreticos conlazantes causam mortis extiterunt. Vnde eorum differentias necessaria suggeris ordinandas, quæ uaria ratione colliguntur. Primo ex præteritis diebus, dehinc ex generibus passionum, & magnitudine temporum, & sudoris ipsius ordine, qualitate, & quantitate. Significatio firmatur ex præteritis diebus, in qua consideramus, utrum signa sudoris diaphoretici, aut salutaris præcesserunt.

De iudicio eiusdem. Cap. XI.

EX genere passionum qualitates significationem attendimus. Si enim solutio inest, sudor etiam utilis diaphoreticus esse monstratur. Si nero strictura inest, attendenda est infirmitatis magnitudo. Parua enim passio diaphoresin facere non potest. Si enim magna fuerit, attendendum est tempus sudoris. In statu autem totius passionis, atque temporali accessione, limpida amissionem creticis maior sudor ostendit. In initio autem, & nel augmento perniciosus, æqualis bonus, inæqualis autem malus sudor indicatur. Ex quantitate signa accepimus moderationem considerantes. Modicus autem sudor bonus, immodicus malus accipitur. Denique non recte sudantes & sine moderatione, diaphoresin incurrunt. Ex qualitate significationem accipimus, cum tactu indicium adhibemus. Salutaris autem sudor calidus & tenuis, & nõ male olens probatur. Perniciosus autem frigidus atque acidus, a quatis carnibus similis inuenitur. Deinceps ex præteritis atque concurrentibus signis affirmanda significatio est. Non recte sudantibus magis parvus atque creber, imbecillis & inanis pulsus inuenitur. Thorax etiam grauatur cum respiratione frequenti, ac instantia animi nocis tenuitate attestante pallore. Recte autem sudantibus pulsus rectus, respiratio facilis, atque lenior efficitur. In somno enim prona deiectione, & omnium aduersariorum diminutio, cum animi atque corporis relevatione, & recto & salutaris ordine. Quomodo discernis à cardiaco eum qui ex stomachi passione sudauerit? Ex stomachi passione sudens cum dolore quadam parte corporis nexari uidetur, hoc est, sub pectore, aut inter spatulas, attestante aliquando singultu. Aliquando post acceptum cibum tenura corporis cum saluarum fluore, & nansæ, & uomini.

De sudoris præcognitione. Cap. XII.

SUDORIS præcognitio apud scientes non est in negligentia. Nam & salutaris sudor est, & mortiferus. Salutaris est creticus, cui credo nomen ex iudicio impositum, eo quod quasi iudicet hominem ex sententia sua, aut puniat, aut liberet. Hic calidus est, cui color rubeus est, & corpus est fortis, & ingens pulsus uenarum, & quanto plus his sudoris affluerit, tanto æger fortior fit. Aliter quippe exterminat, & subito fit frigus cum pallore ægri, aut defectione uenarum, aut penitus absque sensu, aut tremore potius quàm solutione febris. Sed creticum facile est calefactio nibus prouocare, cardiaco obfistere arduum est. Tamè hinc frigidis rebus obfistere placet ut nondum aceat æger. Si ita surget, aduentetur hinc atque inde sabanis, atque stibellis nentum inferentibus. Interdum ex spongijs in aqua frigidissima tinctis & expressis corpus eius refrigerandum est, & si nix affuerit, hac tendendum est magis quàm frigida humiditate. Cuius manus stringendæ sunt fascioli lineis, in eo loco ubi uenarum pulsus tentare consueuimus, & si ad sit sitis, frigida danda, & non nimia nec cum impetu hanc accipiat. Hæc res accidit plerumque illis qui cum strictura febriunt, scilicet ut habeant sicca stercorea per nimium febris ardorem.

Cura.

Hos oportet per clysterem foras deducere, sicut in secundo Metamaticò ostendimus. Subiecta erit rubrica de ijs qui in acutis febribus in impetu habent dolorem in præcordijs, in splene, & iecore. Singula hæc medicamina sine omnia in passionibus suis demonstrata sunt, quæ admodum & quibus signis comprehenditur quæ nos ocs scimus. Innetrantibus passionibus ea debemus adhibere quæ sunt dicta, & quæ ad curam eorum pertinent, omnia sunt adiuncta, quæquæ & ij cõmuniter ut cætera curantur. Propter quod in quibusdã febribus debemus, & si nõ grandis causa sit, sanis mollibus ac mûdis fomentare oleo calido ac dulci. Si amplius fortis sit causa, cataplasmatibus, & encubicis, & pyria si. Spongia debet intingi in liquore iã sape dicto. Postea cecrotario erit intendendum, si ubi declinare cepit passio. In impetu autem clysteriazabis in myrta, & in cantabris, & blezæ radicis decoctione mel, & sal, oleo mixtum, nel nitrum, aut affronitrum, ex mûlta & oleo, aut careno, salem & olenum ut tepneris, & ous dura mixta iniice.

De impetu nefica. Cap. XIII.

SOLET nefica in acutis febribus in impetu ac dolores venire. Sed quando assidue meiant, & paulatim intumescit membrum hoc facit dolore, & parere illa quæ comprehendit Græci

dicunt facit, quæ omnia soluentur, ubi accessio minuerit. Dehinc plurimum meiant. Quod si molestius ea passio accubuerit quo usque febris laxationem dimissionesque perficiat permanere solent ea signa.

Cura.

Ad curam eisd rei qualia nota sunt adhibere debes fouereque ex oleo dulci cum calida mixto. Omnia illa quæ supra & sub umbilico sunt loca, & cataplasmata, & cucurbitas adhibere debes, leues & encathismata calida, & hydroleon, nec non fœnugræci decoctionem, vel maluz, & per clysterem iniicere debes, laxatis enim his partibus refumitur vesica. Quod si aliquis mortuus erit in veretro pirioticum clystere, id est, oleum calidum erit iniicendum. Lenit enim atque moderatur passionem hæc, & augere debes omnia quæ huic passioni sunt utilia, etiam apozimas accipiant, & causas necessarias: quia omne quod bibit in vesicam confluat, & grauat id membrum. Vesica quoque fatigat ægrum multum mingendo non minus ventris solutio. Vnde adhibemus stiptica sub umbilico atque efsebeon & clunibus, ut sunt spongiz ex aqua frigida, uel pulsa, atque epithema frigida, & cucurbita staltica.

De uigilijs. Cap. XIII.

Vigiliæ aliquando propter aliquam causam fiunt, uel propter quasdam animi cogitationes, uel propter alicuius loci dolorem, raro quidem propter fluxum uentris & propter strictionem. Eadem dignoscimus si ex strictione sit aut ex fluxu, nostra interrogatione, quo sæpe interveniente nunquam ægrum dormire uideamus. Præcedit autem hebetatio mentis atque appressio quam græci paracopen dicunt: hanc uigiliam affert alsiduitas animi, quam græci catatorem dicunt. Nam debilitationem virium & corporis angustiam patiuntur. Hippocras quoque ait oculos & nares eorum in acutum procedere. Cui summas nares frigidastangimus & cutem, & summas manus & plantas & oculos quoque tenfos habent, sed sic intente & non palpebrantes quod græci quoque anthoman appellant. Dolent quoque eidem oculi atque non habiliter mouentur. Nonnunquam etiam in uenulis eorumdem oculorum rubor apparet. Pulsus quoque infirmus est eis, mox laxior fit, aut si intercessit aliquis dolor, exinde uigiliæ fiunt. Debemus ubi sunt strictiones mollires, & ubi sunt laxationes constringere, sicut in capitis dolore monstrauimus & oleo dulci, aut anethino caput foueatur & cataplasmetur, & pone cucurbitam vacuum in loco qui illo dicitur & lecto pensili gestetur, & spongiam cum aqua calida intincta expressam oculis sa-

pone & odorem pigmentorum naribus ut est myrrha & opium florace ex æquo in unum trita cum careno modico aut melle & punctione præstentur humidia, ut caput sensum recipiat, & somnus sequi possit.

De tremore in acutis febribus. Cap. XV.

Fit tremor in acutis febribus tam grauis ut plerumque mentes hebetentur. Est autem passio neruorum quam simforaneuron græci dicunt. Deprehenditur ea passio in strictione uel in fluxu hæmorrhoidæ uel sanguinis nomitu. Quando hoc fit oportet nos mitigare fluxum constringentibus adiutorijs, secundum quod sæpe demonstrauimus. Sed cum in omnibus talibus remissio secuta fuerit, utile est ægrum in oleo dimicare, aut stomachum curare & accipere uel diasanfucod aut diaquilon in oleo soluto totum corpus perungere, & bibant elixaturam absynthij pontici.

De malfactionibus. Cap. XVI.

Nunc conuenit dicere super his qui in ægritudinibus & per symptomata aliquod frequentibus augstijs, id est, alsidua malfactione laborant atque periclitantur. harum enim malfactionum diuersa origo est, quia nec una causa est unde nascuntur. Diligenter ergo singulorum inueniamus originem, uel causam unde fiunt & tunc demum indubitanter, harum unius cuiusque præuidebimus curam. Alij namque angustiantur, uel malfiunt per abundantiam cholerum. Alij per diarriam, id est, fluxum nimium. Alij per dysenteriam, uel lenteriam. Alij per nimium sanguinis fluxum, siue per nares, siue per uulnera aliqua, siue per fellâ, ut ille qui hæmorrhoidas patitur, & mulieres per nimiam mēstruam, aut per abortum, aut per dolorē matricis intolerabilē malfiunt frequēter & deficiunt, cū aut cōtorquetur, aut de locis suis excutitur, facit frequēter & indigestio ciborum nimis, & nō mediocrē malfactionē. Maxime cū per hanc corruptis humoribus fluxus uētris fit, & bulismus, quid aliud nisi malfactio est? Præuenit enim frequēter malfactio futuram apoplexiam ex sanguinis idu, & malâ epilepsiam: fit etiam in cōmotionibus febriū cum summa corporis frigescent, id est, manus & pedes, & cum ex causa icterici in femore positi uel stomachi febriunt quidē, & in his causis angustiz fiunt, & cum crudi & immoderati humores in aliqua insolita sibi niscerū parte infederint, uel meatus naturales cōcluserint malfactiones nō sine periculo ægrorantis faciunt. Frequēter & multæstuant animo, siue gadio, siue mero re, siue nimia cogitatione lassati angustiantur, & defi-

& deficiunt ita ut humor quidam sudoris in his non solum in nutu, sed etiam in omni corpore videatur. Maligni etiam illi quibus inualida, & debili uirtute apostemate rupto siue à se siue ab artifice extrinsecus sanies purulenta decurrit, & aut in thorace, aut in stomacho, aut in uentre coagulantur. Necesse est ut illi maligni, quorum nos ipsi secundo apostema aperimus, & totum semel quod inius est euacuamus cum partim id euacuari melius sit. Eadem ratione & illi maligni, quos uehementi data purgatione, uel clystere adhibito, & ualide semel euacuauimus, cum nec hydropici ipsi qui quamuis supersino humore abunde tubertim, ex toto tamen si subito semel purgantur, non sine periculo maligni. Quid nero de illis dicemus, qui dolore nimio tacti maligni sunt aut compunctionibus quibusdam aut stropho, aut ileon, aut qui coli subito & graui dolore conficiuntur? Nec minus illi qui confixi nel uulnerati in neruo aut in capite masculi maligni. Et in articulis grauius uniuersa, id est, chironia nel cancrene, uel etiam carcinomata, faciunt frequenter malfactiones. Sicut nimia frigora faciunt, & intolerabiles aestus uel calores, & uitalis uirtutis dissolutio, uel lassitudo, ex defensione & angustia malfactiones faciunt. Ergo sunt propriae causae malfactionum causae uniuersaeque earum.

De eadem & cura. Cap. XVII.

Per singulas causas ut dicatur curatio nunc in hoc libro satis est longum, quamquam breuissimè tibi (ut ipse petisti) disposuerimus dicere, si tamen breuitas ipsa efficiat, atque praestabit tibi, ut scias ex paucis, quae diximus, plura mederi. Nam siue ex choleribus nimis, siue ex diarris, siue ex hemorrhodia, siue ex alijs ut diximus causis deficit, atque malit aliquis, conuenit mox ne aqua frigida in facie roretur, manus & nares constringe, os etiam dentesque, apertis, ut tussiant, & impera ut exercent, aut aures trahat, aut capillos, & iuxta pectus stomachumque fricari manu, nomicamque prouocari digito in ore misso, uel tinctis pennis in hydroleon, & articulo uinciri, id est, summities manuum nel pedum colligari. Oportet autem ligaturas in extremis manibus & pedibus esse, sed plures quidem uehementiores in manibus tunc cum fluxus sanguinis nel ventris ex inferioribus partibus, & angustias nimie manando perfecerit. In pedibus uero tunc, cum ex superioribus partibus fluxus naxerit, usque ad angustias & necesse non solet narium sanguinis incessabilis fluxus molestare, aut stomachi relaxatio uomicae facere nimietatem. Ergo siue aegro, siue sano aliquid tale contigerit, & angustiarum uel malfactionum molestias fecerit, considerandum erit

ut per antiparistasin restringamus sanguinem qui manat, id est, contrario medicamine, ut inferiora colligando, uel constringendo superiora leuentur. Sic etiam menstrua foeminarum sedemus, ita ut superiora constringendo, uel colligando leuentur, inferiora cessare faciamus. in tuendum est etiam in his talibus & dicendum causis, qualiter debeat, nel quo schemate iacere qui patitur, ut si de inferioribus laborauerit fluendo partibus, pronus & decliuis capite iaceat, nec tamen nimie, sed temperate. Item de superioribus si fluxus fuerit erectior à capite leuolus eleuetur. Sic etiam mulieribus ex nimio sanguinis fluxu medeberis, ut abstineas rinulos matricis insolito more fluentes, si iuxta mammas earum calidas figas cucurbitas, ita ut & iecori atque spleni infigas & superponis cucurbitas. Cum ex utraque nare nimis & inabstinens manauerit sanguis, aut si de una ferret nare considerabis. Si de dextra erit, iecori superponis, si de sinistra, spleni. Necnon etiam medicamina quae sunt ad fluxum sanguinis restringendum, & ad mensuram uteris, uel in naribus, uel in potione adhibenda, necnon & ad uomicam, & ad choleram sedandam, & ad fluxum uentris, & ad mēstrua multa quae in pharmaceuticis scripta sunt, & per ora danda utilia intrinsecus, & extrinsecus diuerso modo adhibenda, scilicet uentri, matri, stomacho thoraci, capiti ac fronti. Balneo non utendum est illis qui fluxu sanguinis laborant, atque deficiunt, alijs uero non in congruum est, praeter illos qui nimio laborantes maligni, atque eclipsantur. Nec etenim & ipsius usus balnei. Oportet enim hos non calidis relaxare, sed frigidis constringi nel escis nel potionibus, uel unguentis stipticis, & frigidis, quia his calida contraria sunt, nec ligandos his, uel constringendos scito pedes, nec nomicam pronocandam omnino, nec aliter commouendos. Vinum etiam frigidum pane infuso dandum est, & status frigidus uentorum sunt adhibendi, & aer & cubiculum stipticum ubi iaceant ex artis scientia faciendum, id est, frondibus teneris panimentum sternamus, uidelicet myrti, salicis, & pampini, & malgranati, atque rose, & alijs huiusmodi uirtutis stipticis. Sed illi ista incongrua sunt, qui humoribus ore uentris repleto, sudore uel aegritudine laborant. Quibus balnei usus utilis est, & uentris purgatio, & uini usus. Vinum sit tenue, calidum, & natura calidum ut est siculum. Tale enim dare conuenit, sicut illis qui sanguinis fluxus, atque euacuatione laborant, quod non sit spissum nigrum, nel ruboratum, atque austerrum. Sic itaque hoc modo curabimus istos, qui per nimium fluxum atque euacuationem laborando maligni, uel angustias laxantur frequentibus. At uero illos quibus ex aliquo

nimio humore concreta abundantia, quasi em-
fraxin, id est, obiecta nimicrius mole occlusio-
nem meatibus facit, ita ut nitalis spiritus solius
naturalibus impediatur cursibus, & ob id mal-
factiones atque angustias patiantur, & non si-
militer, sed longe aliter curabimus. Nam his
caemas manuum pedumque partes diuissime
manibus perfricabimus blaudis & constringim-
us, atque colligamus, atque calefaciamus: &
si febris erit, abstinemus a cibo, & uino, & bal-
neo. Sufficiat namque his mellicratum tantum
decoctio thymo, uel origano, uel hyssopo. Utile
est etiam oxymel his dari cum pulegio, & iri
illyrica factum. Similiter medicaminibus his
& illas scito curandas, quæ & matrice laboran-
tes malsunt, præter oxymel, & noui, magis in
his manus quam crura cōstringenda sunt, sicut
illis qui profluxu matricis nimio ueuantur, &
istis similiter cucurbitas circa mamillas poni-
mus. Ita etiam his quibus matrix eacussa à na-
turali loco & conuersa, & resupusta sursum uel
transuersa deorsum renibus, aut laetibus, aut
inguinibus incumbens iacet, cucurbitas ex di-
uerso apponimus, id est, ut per antipasin in suo
matricem eandem deducamus loco. Nec non
naribus odores fœtidos apponimus, matri ue-
ro suffumigationes delectabiles, & perpulchre
olentes offerimus, atque suffumigamus, necnō
etiam medicamina, uel pessos calidæ uisitis,
quibus relaxari atque placari possint adhibe-
mus. Si nero infirmis aut nō bene sanis stoma-
chi initio lasitudo frequens fecerint malfactio-
nes atque angustias, utamur epithemate quo
possit confirmari, & corroborari stomachus, id
est, dominus corporis, quale est quod recipi-
cro cum, aloen, masticen, atque his similia. Et em-
brocabitur oleo nardino infuso modico nino
decoctionis absinthij pontici, uel oleo masti-
chino, aut melino, id est, de malis cytonijs. Et
si calorem sentiunt quasi ardeatis stomachi, mi-
scemus ijs aliqua frigida uirtutis de succis cu-
cubitar, uel lactuce, uel portulacæ, atque strin-
gni, necnon uiz viridis, uel immaturæ succum,
qui nō solum hic frigidus est succus, sed etiam
stipticus. Aqua etiam frigida ijs qui stomachi
nimio ardore & ariditate fatigantur, uel defi-
ciunt malscientes, opportune uel in tēpore suo
data ualde prodest. Aliter nero data ægotis,
maxime & grauior nocet. Et oportet magis
ægro stomacho nimum & calidam aquam dari,
si nihil aliud prohibeat quod sit contrariū. Pro-
dest maxime ijs salibus stomachi vexationibus,
etiam perfricatio manuum & pedum. Et cum
ex his iuuamentis ad melius profecerint, & sen-
serint beneficium, illos ilico qui calore stoma-
chi, & ariditate nexantur, utiliter dncis ad bal-
neum & laues. Et illos qui ex frigore nimio &
rigore stomachi laborant, potionibus eos cura-

bis, id est, antidoto quod dicitur diatriton pipe-
reon, & ipso etiam solo pipere, & absinthio
pontici in aqua coctum dabis. Iis uero qui cō-
gestionem malorū humorum os uentris repleū
habent, & ob id laborantes malsunt, & quasi
submordentur, dabis aquam calidam mulum
bibere, & hyroleon calens copiosum, & facies
eos uomere digitis uel pennis ori gutturiq; inie-
ctis. Si nero non possit uomere uel solet uome-
re, oleum optimum dulce calidū dabis bibere,
quia non solum facit uomicam, sed etiam nenu-
trem solnit, & prouocat, aut certe si id non ene-
nerit, clystere super his ueris, & ijs siue post uo-
mitum, siue post nentris depositionem absin-
thium ponitū in malsa decoctum dabis. De-
inde etiam uinum ex aqua calida, & epithema
aforis adhibe, quod confutare & corroborare
solet laxatos, & non in principio est hoc uten-
dum, sed postquam os uentris uideris ab humo-
ribus quibus uexabatur, purgatum. Non enim
expedit medicaminibus constringi, cum adhuc
humores intrinsecus, & nondum de ore uentris
educti atque purgati, sed sufficit confricari tan-
tum, & relaxari, ut supradictum est. Si uero in
ipso uentre cōgestum phlegma mole abundan-
tiæ suæ fatigationes & malfactiones fecerit, ut
ris fomentationem olei muli coctio cum eodē
absinthio. Deinde dabis mulsam decoctionis,
uel hyssopi, uel iris, & oxymel piperatum, nec-
non & antidotū, diatriton pipereon. Alia quæq;
taliam dabis quæ possunt phlegma incidere & de-
ponere. Dieta eorum sit calida & sicca. Si uero
ex nimio frigore malfactiones, uel angustia
sunt similiter, ut bulissecus curabis, omnino ca-
lesfaciens eos in rinsecus & extrinsecus escis ca-
lidis piperatis, & potionibus uini conditi, quos
cum aqua calidissima perfricabis toto corpore
contra focum, maxime manns eorum & pedes.
Si autē nimio æstu, uel calore fatigati malsint,
frigidis eos rebus refrigerabis, & corroborabis.
Euenit maxime illis qui in aere angusto & of-
focato, uel in balneo din, & plusquam oportet
morantur. Reficies ergo eos & resumens mori in
præsentem aquam frigidam in faciem rolando, &
stabello uentum facias frigidum, & abiges cir-
cumstantes, ut liberi aeris foueantur a pectus.
Mans etiam palpatu pectus stomachumque
perfricabis, & exclamabis interdum auribus, &
cum redierint ad se, micam panis ex uino dabis
frigido & congruis eos reficito escis. Illos uero
qui feruore alacris humoris uel dolore, uel ca-
lore nimio febris malsunt, & angustiantur, qui-
bus manus summx pederq; frigesunt uel gla-
cies, oportet fricari manibus calidis, & colligan-
do manus, & crura, facias uigilare, & ab omni ci-
bo & potu abstinere, & quæcūq; his faciēda pu-
taueris, festina ut ante paroxysmos, i. cōmotio-
nes febris omnia facias. Illos etiā qui ex nimia
siccitate

siccitate uel ariditate deficiunt, mox in principio paroxysmi prouidendum, & maxime cognoscendum est, ut ante duas horas, uel tres quam incipiat paroxysmus, cibo refici, uel potu, & stringi uel teneri pedes eorū & manus iubeas. Quod cum factum fuerit non deficiunt, aut pereunt. Oportet ergo escam etiam quam suscipiunt, facilem, leuem & digestoriam esse, ne grauato stomacho grauius uexentur. Si uero ex malsactione febrienti periculum senseris futurum, scilicet prouum ad mortem magis quā ad uitam, tunc & uiuum dabis, & maxime admixtam uino alicam coctam, uel grauatam offeres. Item proderit etiam panis cum uino datus, ubi periculum graue non est, non oportet ergo uinum dari, sed sufficit malsagranatis, uel piris, uel malis refici, & confirmari eos uel aliquibus pomis stipticis cum alio cibo admixtis offerre sibi uirtutē, & his adhibitis & sumptis fortiter eulere impetum paroxysmi, & non fuerit ualde fatigans, sufficit eorum tantummodo cibo refici, non intendo pomia. Hoc ergo age utiliter, cum cognoueris antea quæ futura sunt, ut modeste cures. Illis uero qui subito in hoc inciderint, periculum, quoniam dari, & panem calidum, & granata pariter utile est sed per parum modicumque dandum. Nam si plus dederis quam possint, eis non mediocriter officit. Qui nero eufrasin patiuntur, id est, conclusionem pori alicuius uel membri necessarii ac uitalis & ob id malsunt, atque angustiantes deficiunt, oxymel his dandum & scito, & portiones tales, hyssopum, origanum, & pulegium in malsa coctum, & cibos qui possint incidere & relaxare humores, & purgare atque aperire occultos & uitaes meatus. Prodest his frictio atque colligatio summitatum manum. Utile est etiam his uti diureticis potionibus, hoc est, urinam prouocantibus, id est, anetho, feniculo, apio, petroselino, dauco, ameo, spica nardi, & reliquis similibus. Ex quibus si uiderimus euidenter iuuatoa, & melioratos, uino postea reficiemus albo tenui perdigesto & uo-

reti. Quos quidem ex pulsus poteris manifeste cognoscere quia inæqualis & inordinatus maxime inuenitur in istis pulsus sicut in plectoricis ut in antelastatis diximus, nisi quod in istis frequenter etiam dialipon inuenitur pulsus qui mortem significat, quod quidē in ratione pulsuum amplius diximus, pulsus discernere possumus.

Item de malsactionibus.

Nunc uero transimus dicere & de alijs malsactionibus quæ eueniunt, aut de euacuatione subita apostematis, id est, si quando se ruperit apostema, aut secantibus nobis euenierit, nescit paracentesis hydropicis, uel si de cathartico totum semel euacuatum fuerit subito malsunt & deficiunt quasi morientes, & ideo non debemus in his talibus uehementer facere euacuationem sed de semel euacuare, sed partim & temperate. Proinde cum id congerit illico odoribus bonis & delectabilibus releuabimus. Nec post multum de hinc temporis succis bonis, & escis reficiemus. Si uero ex merore nimio, aut gaudio, aut metu, aut iracundia, aut ex aliqua his simili ratione malsunt odoribus primo adhibitis: De hinc narium occlusionem reconfirmabimus, mox etiam ut uomant imperabimus. Similiter etiam illis naribus ad præsens dumtaxat apponimus odores qui uulneri aliquo, aut dolore fatigati nimio subito malsunt, uel neruorum, uel musculorum compunctione. Nam neruus si incidatur totus non dolet si pungiur grauissimos dolores facit. Postea eos congrua curatione, & diligenti curabimus, non aqua sed oleo fomentantes, nam mox putriet neruus si aqua tangatur. Coli autem & ilij, uel huiusmodi cause ob grauissimum dolorem frequenter malsactiones atque angustias contingunt molestissimæ. Quas sedabimus fricando continuo loca quæ dolent, & pedum manuumque summitates blando more diutissime perfricantes.

CONSTANTINI APHRICANI DE FEBRIBVS

L I B E R .

De ephemeris febribus.

Cap. I.



PRIMERA febris ex calore nascitur simplici, & spiritus sine materia, vel putredine calefit. Unde fit, ut non duret nisi die una. Spiritus hi sunt: Vitalis spiritus, qui fundamentum est viue, & materia caloris naturalis: Animalis, qui fundamentum est sensus & voluntarij motus: Naturalis item spiritus, qui fundamentum est quatuor naturalium virtutum, quæ sunt appetitua, contentua, digestiua, & expulsiua. Hæc febris duobus diuiditur modis. Vel enim ipsa est morbus, vel accidens morbi tale quale ex alio morbo consequetur. Si ipsa est morbus, fit ex causis tribus: Una est qua corpus patitur extrinsecus, sicut calor est æstiuæ solis, & venenum, & frigus nimum, & balnea aquarum, exteriora corpora suis viribus desiccantium, & oppilantium, sicut vitrea aqua, uel aluminosa, uel sulphurea. Secunda, est motus corporis, sicut & labor & exercitia, ambulatio nimia, & similia. Vel motus animæ sicut ira, cogitationes, tristitia, angustia, & similia. Tertia est consuetudo ciborum & potuum calidorum sanguinem calefacientium. Ephemera febris quæ accidens est interioris morbi, est febris apostema sequens inguinis & ascellarum & colli, & similium. Sanguis enim collectus in apostemate nisi cito dissoluatur, necesse est, calefiat, & putrescat, & vitalem spiritum calefaciat. Deinde cor calefit propter coniunctionem arteriarum, & cordis, unde generatur ephemera febris. Hæc sunt causæ ephemeræ febris. Oportet vniuersalesque causas dicamus, & significationes, & planissimas curationes. Intelligitur ergo febris ephemera, quæ est ex calore solis, quia capita corporibus sunt calidiora, & nimium dolentia, & facies est rubicundissima. Aliquando patiuntur calidum rheuma, & incendunt narea. Febris propter uenenum, corpora magis quam capita calefaci,

exteriora desiccat, & incendit, quia calor uenerni desiccatur humiditatem corporis. Febris ex nimia frigidityte mutat colorem, & aufert pulchritudinem. Mutatur enim in liuiditatem & obscuritatem, & sic extrinsecus corpus refrigerat, & desiccatur. Et in capite cum frigidityte grauitas sentitur. Febris ex stipitiæ & desiccatione aquæ balneis, cutem duriores, & sicciores reddit, quæ quæ ex frigidityte fuerit. Quæ cutis si manibus tangatur, apparet quasi insula aliquandiu in gassa, & malignanti corticibus. Cum autem manus in corporis locis immoretur aliquibus, expositione calefit sentiturque sumus à corpore exiens acutus. Febris ex cibis & potibus calidis, incendit sanguinem calore sui, & spiritum naturalem, qui epar inhabitat, & ita calor cordis impeditur, & à corde per totum taliquam corpus diuiditur. Unde urina & sanguis rubicundior est quam in alijs ephemeris, quia urina & sanguis colamentum sunt ceterorum humorum, & quia calor est in sanguine, in statu sentiunt calorem in hepate. Febris ex labore corporis, corpus fatigatum, debile, & sicum facit, in articulis nimiam debilitat, & continuum dolorem. Sudor in statu minor est quam in cæteris ephemeris febribus. Hæc enim febris cum declinauerit, dissoluit humiditatem de superficie corporis, sicut in exueritibus à balneis. Alij sudant sudore laudabili, & si non sudauerint, fumus de interiori corpore, ascendit. Febris ex ira, intelligitur ex facie rubicunda, & egressionem oculorum, & velocitate motus eorum, ac desiccatione palpebrarum, & fortitudine, & magnitudine pulsuum. Aliquando color citrinatur, & tremorem patiuntur: Quod fit, eum ira tremori permixta sit. Febris ex tristitia & angustia, oculos concauat, & inquietat, colorem aufert, corpus debiliat, pulsum subtiliat, urina fit acuta. Hæc significationes angustiosæ & tristes sunt, in omnibus angustijs qualesconque sint. Cum ergo medicus intellexerit, unde ephemera sit febris, ad curandum erit facilis. Ex si ex calore sit solis, uel ex uenenis, balneandus erit in declinatione febris,

febris, neque tamen balneo debet immorari. Aqua tepida, & dulcis sit. Postquam balneum exierit, lecto flores frigidis, sunt apponendi, sicut violæ, rosæ, salicis, psyllium, myrtus, & similia. Humectandæ sæpe sunt nares eorum cum oleo uiolato, tempora ungenda oleo rosato, & aceto. Fumiganda capita post febris declinationem cum tepida aqua, ubi uio-
la & chamomilla sint coctæ. Si inquam rheuma non habeat, neque caput doleat. Si humores sint in capite, nimium caueantur hæc, & tantum nares fumo huiusmodi apponantur. Demus succum malignanati, cum saccharo, & sirupum album, rosaceum, & niolaceum. Nutriamus cum mica panis lota cum saccharo, & cucurbita, portulaca, cucumere lactucis, malis grauiis. Post ablationem febris, perdicibus, starnis, pullis, & similibus. Si ex frigidityte nimia sit, apponatur post declinationem febris aqua ubi cocta sint chamomilla, samfucus, sne-
thum, basilicum, capite inclinato super horum fumum. Post balneum in aqua tepida, & dulci. Moretur plus in aere balnei quam in solio, quia calor huius aeris sudare facit, humectationem dissoluit, poros aperit. Si catarrhum habuerit, caueat torretur balneari, nisi postquam catarrhum ad dissolutionem maturauerit. Odo-
ret odorifera, samfucum, sambucum, & similia. Calidis operiatur uestimentis. In usu habeat carbonum focum sine fumo, ut prohibeant frigiditatem aeris. Vngamus corpus cum temperatis unguentis, sicut chamomeleo, anetbileo, ireleo, & similibus. Si febris ex stipticis sit aquis, & defecatiuis corporis, oportet balneum prohiberi, nisi post declinationem febris. Cru-
ra ponamus in aqua ubi cocta sint chamomilla, anethum, samfucus, & similia: fumum eorum odoret. Post balneum faciamus, ubi eum suauiter fricemus, & eum aqua dulci & tepida fumigemus. Hoc enim cutem emollit, & poros aperit. Caueant vnguenta in balneis, quia poros claudunt corporis, & fumum includunt in interiora, temperata hanc adiuvant exercitia, corpus dissoluentia, & poros aperientia. Vite-
tur cutem refrigerantia. Nutriamus cum dicta facile digestis. Si hæc ex calidis sit cibariis & potibus, oxysaccharum demus cum succo malignanati, sirupum album, & rosaceum done-
mus. Post declinationem febris, demus trochi-
scos de spodio, uel de camphora cum sirupo ro-
saceo, uel uiolaceo. Cataplasma superponamus epati, de portulaca, lentigine, atque psyl-
lio, corticibus cucurbitæ, farina bordei, oleo rosaceo, camphora, & similibus. Nutriamus portulaca, endinia, chrysolocanna, cucurbita. Misceat aquâ si sitierit cû sirupo de psyllio, nel malignanati. Si de labore sit corporis, oportet studeam eins quieti, & suauitati. Fricemus

eum suauiter cum oleo niolaceo, siue rosaceo. Balneetur in temperato balneo, & cum exierit ungamus cum oleo rosaceo, & uiolaceo. Nutriamus cum humidis cibariis, sicut pullis, edulis, & similibus. Si febris ex animato sit motu, contrariis ei repugnetur, ut anima mitigetur, & deleatur sermonibus, & actionibus, & diuersis musicorum generibus, & uidentis rebus diuersis & odoriferis, & pulchris formis, uel formosis puellis. Studeamus in humectatione corporis cum temperatis balneis. Vngamus postquam balneum exierit cum oleo rosato, & uiolato, neque moretur in balneo, neque appropinquet coitui. Nutriamus cni pri-
sana, chrysolocanna, cucurbita, portulaca, bli-
tis. Febris discendente, demus pullos, perdices, starnos, phasianos, vinum temperatum. Odo-
rent sandalos, camphoram, rosam uiolam. Voi-
uerfaliter caueat delicatius. Vratur humectatiuis, secundum ætatem, & consuetudinem sui, & tempora anni, & regionem, & similia. Si febris ista sit ex apostemate inguinis, uel cuiuslibet alterius loci, studeamus in medicandis apostematibus, quæ causa febrium esse videntur.

De causis.

Cap. II.

Causon est febris, eius signa sunt hæc, sitis nimia, & continua, calor incensibilis, & molestissimus, naturæ repugnatiuis, & ab initio cor-
ruptius, propter acumen materiæ unde generatur. Materia enim eius acuta est, ignea & chole-
rica, in concuitate uenarum quæ cordi nica-
re sunt, adunata maxime in uenis oris stomachi, & concuitatis epatis, & pulmonis. Acci-
dentia hanc febrem comitantia sunt hæc, calor nimius, sitis continua. Causa fortitudinis cal-
oris in hac febre est cholera rubra intra uenas. Duricies & cōtinuitas ex plurima sunt cholera, in ueniscordi utcinis collecta. Quæ huius febris generatiua cum sit nenarum oris stomachi, & concuitatis hepatis propria, necesse est ut sitis conforrem & continetur. Hæc febris du-
bus diniditur modis: Vnus est purus & mole-
stissimus, alius non purus, & minus molestus, Purus & molestissimus, de choleta rubra incē-
sua, pura & acuta nascitur, & plurimum in iu-
nibus, quorum complexio naturaliter calida &
sicca est, & maxime in æstiuo tēpore, Aestiuū
enim tempus hanc confortat naturaliter, &
augmentat. Alter modus non purus, neque
adeo molestus, est ex cholera rubra citrina, cū
humiditate mixta, & fumo nascitur. Quæ mo-
derata sunt utraq. Cum hanc febrem mole-
stissimam timor comitetur, oportet ab initio
non negligatur. Sed studeat medicus ut qua-
tor eius tempora perfecte intelligat, & imo
quoque operetur, secundum quod oporteat.

Si uiderit

Si uiderie in initio morbi, quia natura indiget ut purgetur & remoueat materia morbi, purget morbum & remoueat cum oxyfoenicia, prunis, iuiuibz, cassia fistula, manna, uiola, & similibus. Et si quid habeat contrarij, sicut defectio nem uirtutis & cruditatem, uel miscofitatem materiz, caueat quanto plus ualeat, ne in augmento morbi faciat, quia natura distrahitur & impediatur a regimento morbi. Sed oportet & uicioriam, motus initium, eum non effugere, ut adiuet naturam in regimento suz uirtutis, cum diata ad digerendum facili, & in substantia laudabili, sicut puiana perfecta, panis mica cum aqua frigida blia uel ter lota. Galenus ite in libro crifeos innuit quomodo in acuta agitudine infirmus debeat nutrir: In nutriendo, inquit, infirmo, intentio nostra triplex est in acuta agitudine. Vel enim consideranda est quantitas uirtutis infirmi, uel tempus infirmitatis, uel qualitas morbi. Quantitas uirtutis necessaria est, si bene custodiat: Virtus enim repugnatiua est morbi. Vnde aliquando plurimus datur cibus, cum defectio uirtutis ambigitur, neque tempus morbi consideratur. Quantitas temporis sciatur, & ut secundum uiciniam status cibum ordinemus. Verbi gratia: Si sit uicinissimus, diata subtilissima, & aliquando nulla dabitur: si remotus fuerit crassior, & paulatim secundum ordinem usque in statum subleuabitur. Qualitas morbi est scienda, quia omnis fabricitans liquida indiget digesta. Qui febre habet corporis consumptiuam, querit habere quantitatem ciborum plurimam, & aliquando in tempore accessionis. Quod si febris nullam quietem habebit, & infirmum nutrire necesse sit, eligenda est hora in qua sanus comedere solebat, & conueniens diei tempus frigidum, ut pote aurora in qua natura est exercitata, ac subtilis, & clarus, & febris mitigata, quia frigida aurora calori febris repugnat. Hi sunt sermones Galeni in ordinanda diata infirmi cum acuta agnitus ad sit (ij apponuntur causa eius autoritatis) quia autem causos ab initio usque ad finem est periculosa & molesta, oportet ad suae rei hanc diata subtili, pisanaz, micaz panis aqua lota ter uel quater cum saccharo. Si febris sitiat, aqua detur de saccharo, mulla, suggat malagranata, uas hyemales, molliciem cucumeris, uel cicroli, sirupum uiolatum, uel rosatum, & similia. In uespere demus, drach. 2. psylli in aqua frigida loti, & drach. 1. feminis portulacaz. Si autem cibum oportet dari, mica panis lota danda erit in uespere cum malagranatis, & hoc sit cum mitigatur febris. Custodiat autem quanto plus poterimus, ne detur cibus cum febris augmentetur, nisi necessitate maxima cogamur. Si digestionis sine stipitiaz, molliantur cum succo cucurbitaz, manna, uiola,

cassia fistula, sirupum uiolaceo, & similibus. Quod si non valeat, subpositura fiat de uiola, nitro, scammonio, licio, & similibus. Et si hoc non ualeat, clystere faciamus de succo bliti, surfure, herba circumdante arborem, sicut hedera, uiola, malua, & similibus. Et in augmento febris studeamus, inanitione stomachi quantum poterimus, nisi aliquid impediatur, sicut suspicio defectionis uirtutis in repugnatione morbi. Tunc enim aliquotulum recreandi erunt, cum diata subtili, sicut piana, & mica panis lota, & demus parum quantum sufficiat uirtuti sustentandaz, & non plus. Si dolor capitis superueniat, oleum rosatum cum aceto dandum, & succus portulacaz. Vngatur his frons & tempora. Si emutationes faciamus cum oleo uiolaceo. Calcaneus & crura infundantur aqua tepida, & dulci. Post vngantur plantaz pedum cum oleo uiolaceo. Ligentur crura mollibus pannis. Cataplasmetur frons, & tempera de sandalis, & rosa, hordei farina, cum aqua rosata, temperata, uel succo cucurbitaz, uel portulacaz. Vigiliis infirmo ingruentibus, iungendum est huic cataplasmati seminis lactuaz, & papaueris, quam temperanda sunt cum succo lactuaz. Si siccitas sit in ore, & asperitas in lingua, lenentur utraque cum psyllio, & semine citonij, & oleo uiolato. Si autem cor tremat, psyllium demus cum succo cucumeris, & sirupo de iuiuibz, uel sirupo de uis agrestibus, uel aceto de pomis citrinis. Cataplasmetur de sandalis, farina hordei, & succo cucurbitaz, uel aqua rosata, temperatis. Quod superponendum est stomacho exinanito. Nutriendus est cucurbita, portulaca, lentibus mundatis. Hec omnia coquantur cum aceto uarum agrestium, & amygdaleo, & similibus. Apponantur ei frondes myrti, salicum, & similia. Hanc febrem patientes, plurimum incidunt in phrenesim: Quibus medicandum sicut in prima particula diximus. Similiter tussim siccam, patiuntur ictericam. Quz sunt medicanda sicut diximus per singula sua loca.

De tertiana febre.

Cap. III.

Tertiana febris quam *tertiana* dicunt Græci, nascitur ex chymis cholericiis immutatis & putrefactis. Sed tamen si putredo sit extra uenas vel arterias, generatur tertiana interpolata cum rigore & tremore. Quod si putredo intra uenas sit nel arterias, conereatur nel tertiana continua, uel causos. Reprehendimus tamen à qui bnsdam nobis obicientibus. Vnde, inquit, tertiana uel causos conuenient, uel dissonant? Quibus respondetur. Conueniunt, quia materia una, id est, cholerici humores sunt, & intra uenas ac arterias concresecunt & continue sunt.

sunt. Differunt secundum locum, ubi humores non conveniunt. Infectiones enim caulis in uenis cordi sunt viciis, maxime uenis oris stomachi, & hepatis, & pulmonis, specialius quam in aliis locis corporis. Infectiones tertianæ continuæ in omnibus uenis totius corporis æquales, sunt. Intelliguntur autem tertianæ continuæ tribus modis uel de re naturali, uel de re non naturali, uel de re cõtra naturam. Verbi gratia, quæ plurimum in ætate nascuntur, maxime si aer sit calidior, & siccior, & complexiones regionis similes sunt, & exercitia infirmorum dum sani fuerint, in nimio labore, siue fagigatione. Vel de re naturali, quæ plurimum in nascuntur quibus cõplexiones calidissimæ, & siccissimæ dominantur, maxime si corpore sint macilentiores, pori rari, ætate annorum 22. usque ad 36. Vel de re extra naturam, id est, de cidentibus infirmo, & significationibus medico. Quia autem hæc febris de humoribus nascitur cholericis acutis, necesse est semper sequatur rigor nimius quasi punctura spiritus uel acus. Acuta enim illa materia sensibilibus membris est uicina. Quæ cum est uat & membra pungat sensibilia, acumine sua puncturam, & tremorem generat, cum non in usu habeatur, quod sit, cum hæc materia extra pullum & arterias sit. Proprium autem huic febrei cholericus uomitus, digestio tincta, maxime in tertia periodo, uel in quarta. Urina eorum rufa, nel ignea, subtilis. Sæpe quoque febrem acutam habent, & in hepate puncturam, propter cholera & sanguinis mixturam. Quod si sit nera, duodecim tenet horas, & dimittit horas 36. & in periodo finitur 7. id est, diebus 14. quod si 12. excesserit horas, neque die finitur 14. intelligitur non esse nera. Hæc ergo cum non sit nera, & cum alia sit mixta, transit prædictum terminum, & diutius durat. Aliquando in autumno incipiens, & in nere finiens. Quia in febribus molestissima est genus putredinis. Vnde oportet capere ne res dentur calidæ, ne forte cholera rubea cum acumine suo cerebrum ascendat, & apostema faciat, & inde infirmus phrenesin incurrat. Quæ febris timidior est & molestior, quia cholera rubea ex mobilitate sua, & uelocitate cum suo acumine non pariter peccare infirmum, nec errare medicum. Vnde oportet medicum morbi præuidere initium, ut si uirus infirmi sit idonea, humores furiosi, & mobiles, pharmacia detur de prunis, oxytencia, uiola, myrobalanis citrinis, cassia fistula, manna & similibus. Demus hæc secundum uirtutem & ætatem. Detur & succus malignanti, & quædam cathartica in libro nostro iam præscripta, quæ cholera rubea sunt purgatiua. Cauendum tamen ne in die accessionis dentur, ne forte natura impediatur, in morbi repugnationibus. Detur ergo in die ac-

cessionis succus malignanti cum sirupo uiolato, & psyllium cum sirupo rosaceo. Vitetur ergo cibis in accessionis temporibus, nec etiam detur aliquid tribus horis præcedentibus, sed sustentetur cum sirupo rosato, uel uiolato, usque post abscissionem febris. Deinde detur in uespere prunas, & papis cum saccharo lotus. Si sint stiptica, neque cathartica ab initio eis, sicut diximus, possint dari. Cum quædam nos impediant, utpote corruptio aeris, nel defectio uirtutis, demus in diebus dimissionis oxytencis, manna, cassia fistula, sirupum uiolatum. Si autem digestio non humectetur, subpositura conficiatur, cum uiola, scammonio, nitro, licio. Similiter & clystere faciamus de prunis, iuiubis, niolis, fursuse, hordeo mundato. Custodiamus diem 7. quasi die accessionis, ut inueniat dies 7. eorum corpora mundificata, & præparata ad obediendum naturæ, in morbi repugnatione, neque impediatur cibo, uel medicamine aliquo. Si autem infirmus in augmentatione febris murmuret de siti, & siccationibus labrorum, uel palati, demus psyllium in aqua cucumeris, cum oleo uiolaceo. Similiter succum malignanti. Misceatur aqua bibenda cum sirupo uiolato, rosato, iuleb, & similibus. Cessante autem infectione, & febris mitigata acumine, si murmuret de punctura stomachi, danda est mica panis, bis, ter lota cum saccharo. Nutriendus est autem chrysolocanna, portulaca, malua, cucurbita, & similibus. Quæ omnia coquantur cum amygdaleo. Ista tamen faciendæ, cum febris cessare incipiat. Si caput doleat, super frontem & tempora ponamus oleum rosatum cum aceto. Nares humectandæ cum oleo uiolato. Si uero capite deficcato phrenesin inciderit, iternuatio fiat cum oleo uiolato nel rosato, & lacte mulieris puellam nutriendis. Capiti raso infundamus lac, & aquam tepidam, uel papauer, & lactuca sint cocta, uiola, & similia. Pedes & crura ponamus in aqua tepida dulci. Deinde cum oleo niolato calcaneus, & plantæ pedum ungantur. Si uero septimo die uomitus, uel digestio superuenerit, sponte ex actione naturæ, non erunt stringenda, sed dimittenda quando uirtus id pati ualeat. Danda calorem stomachi mitigantia, & sitim extinguentia, sicut sirupus malignanti, uel rosatus, uel oxyaccharum. Ponendum in aqua bibenda spodium, sandali, semen portulacæ, & similia. Si enim egestio augmentetur, & de defensione uirtutis dubitemus, ad extinguendam festinemus cum sapa myrtina, uel citonia, trochiscis de spodio, & sicut diximus in diarrhæa, uel dysenteria. Similiter si istericam incidere, medicabimur sicut in suo capitulo diximus. Iungat autem siue muniat medicus, secundum quod ex necessitate cogetur.

De febre quartana. Cap. V.

Febri quartana de putrida nascitur cholera nigra, quæ si sit intra uasâ, generatur cum rigore quartana, quæ uocatur continua. Si extra uasâ, generatur interpollata. Vera tamen quartana uiginti quatuor tenet horis, intermittens quædraginta octo. Quæ signis tribus, sicut & tertiana intelligitur, id est, re naturali, & non naturali, atque extra naturam. De re naturali, quia plurimum patitur hanc qui complexionem habent frigidam, & siccam, ætate senes, maxime frigidi & macri, & sicci, subiles uenas habentes, & cauas. De re non naturali, sicut temporibus anni, si sit autumnus, & aer frigidus, & siccus tunc fuerit, & regiones similiter. De re extra naturam, ut in initio accessions cum materia incipiat putrefieri, nimis erit rigor, laboriosus corpori, frangitius ossuum. Cholera enim nigra quæ huius febris est materia, propter suâ frigiditatem & crassitudinem per sensibilia membra effluens, grauat, fatigat ea, & frangit. Color febrientis liuidus est, cutis sicca, huic febrî durities & dolor splenis propria sunt. Urina in prima febrî alba & aquosa, in declinatione & cessatione, materię digestionis fit nigra : Quæ de pura nascitur cholera nigra frigida est, & sicca : Et item cholera nigra quæ de incensionibus est aliorum humorum, sicut sanguinis, cholæræ rubæ & phlegmatis. Oportet suis proprietatibus uiam quancumque discerni, ut medicamina sua ordinentur singulis. Dico ergo : Si significationes dictæ de pura cholera nigra dantur intelligere, regatur infirmus cum cibis digestilibus, & diureticis, sicut fucus scariolæ, marathri, apii. Quæ omnia coquantur & colentur, cum oxymelle aromatico, & melle rosato. Apozema detur de radicibus, cum sirupo, de absinthio. Purgeturque materia cum uomitu paulatim. Incitetur sudor cum chamomeleo, anchileo, calamenthaleo. Non purgetur corpus in principio febris cum uirulentis in declinatione febris, & apparentibus signis coctionis, choleram nigram oportet purgari cum pharmacia, & clysteri huic humori proprijs. Deinde demus trochiscos de eupatorio, de rheubarbo, uel de aniso, sicut in quinta diximus particula cum sirupo de squinato, uel de calamenthaleo, uel cum apozemate de radicibus. Aliquando autem in fine febris uia demus theriacam maiorem, & diacyminum. Caueamus tamen medicinam hanc in ætate, calida regione, & iuuenili ætate. In hyeme ergo danda, & regione frigida, ætate uetula, atque complexionis frigida. Vitanda sunt & refrigeratiua, quia crudificatur materia, & prohibetur digerenda, unde diuturni morbi fit causa. Quæ quartanam si tertiana antecedit, & infirmus iu-

uenis existat, macer, & cholericæ complexionis, cui urina rufa sit, uel ignea, sitis nimia, & uigilia, tempore anni ætate, natura aeris calida, & sicca, intelligitur hæc febris esse de incensione cholæræ rubæ. Vnde in primis medicabitur cum refrigerantibus, sicut succo maligni nati, & oxysaccharo. Si sit stipticus, cum prunis, manna, uiolis, humectetur, & similia. Quæ si non sufficiant, clystere est faciendum. Si autem materia digeri incipiat, demus carbarum cholæræ rubæ incensæ purgatiuum sine labore, sicut pruna, oxyfenicia, manna, & similia. Demus malagranata, uuat, portulacam, blitum, chrysolocannam. Balnetur aqua tepida febrî cessante, & aqua ubi cocta sint chamomila, & melilota, uiola, & similia. Toti corpori post balneum epithima faciamus, cum uino uiolæ, & oleo. Si hæc febrem morbus sanguinolentus præcesserit, & complexio infirmi similis sit, uenæ quoque plenæ sint, urina rufa, crassa, sapor more dulcis, somnus multus, tempus uernale, intelligendum est febrem de incensione sanguinis esse. Danda ergo digestibilia, & materię suæ calefactione excoquantur, sicut oxysaccharum, pitana de bordeo cum saccharo, mel uiolatum, succus scariolæ. Infirmi pedes & crura, ponantur in aqua calida, ubi chamomila, uiola, sint cocta. Si moueatur uomitus in principio accessions, cum rigor inceperit, demus malagranata. Misceatur aqua bibenda cum oxysaccharo. Materia digesta & excocta, phlebotomemus de basilica, uel de media, ut sanguis, crassus & incensus eseat : Similiter & pharmacia est danda, sanguinis subtiliatiua, & suæ incensionis extinctiua. Si autem hæc febris 20. dies transierit, abstinendum est infirmo de cibis omni die accessions, in alio nero die parum comedat. Si hæc febrem morbi phlegmatici præcesserint, & infirmus senior fuerit, cum complexio frigida, & bumida sit, tempus hyemis, pulsus tardus, urina cruda, crassa, uel alba, sitis parua, intelligitur esse febris de incensione phlegmatis. Dandus est initio succus scariolæ, marathri, apij, quæ omnia coquantur, & colentur. Detur autem libris. cum 10. drac. mellis rosati uel uiolati. Si autem sint stiptici, moueantur cum pharmacia, sive clysteribus phlegmatis dissolutiua. Incitetur sudor cum calido epithima & diuretico. Abstinere a cibis in die accessions, nisi cum nirtus defecerit, neque pati possit. Deinde parum comedant, uinum bibant subtile, & clarum, & in calore temperatum. De uolatilibus comedat, quæ carnes habeant teneras, & ad digerendum facillimas. Manducent lotum eicer cum blito. Caueant omnia refrigerantia. Post cibum accipiant diacyminum, diatriopipereon, dianisum. Utiles autem uomitus cum radicibus, & frondi-

fiordibus, & anetho atque oxymelle, & aqua calida. Sæpe accipiant theriacam magnam, & diacostum, diatheimbarum, diasulphur, & similia. Febri cessante iam per tres hebdomadas, nutriantur cum pulvis phasianis, & perdicibus. Post dies autem quadraginta annualem comedant agnum. Sumantque medicinam semper diureticam & principalium membrorum confortatiuum.

De quotidiana febre. Cap. VI.

Febri uero quæ quotidiana uocatur, de putredine humorum phlegmaticorum nascitur. Antiqui uero concordant omnem materiam phlegmaticam, cholericam, siue melancholicam, putrescentem ebullire, & inde calorem & febrem concreare. Idem facit & phlegma. Si enim putrescat, & sit intra uasa amphemerina continuam generat, sine rigore. Si sit extra uasa, sit amphemerina interpolata, 24. tenens horas, & 6. dimittens. Quæ tribus ex signis intelligitur, sicut & cætera, id est, re naturali & non naturali, & de re quæ est extra naturam. Re naturali, quia plurimum nascitur complexionem frigidam & humidam habentibus, & ætate senioribus, uel pueris ex copia phlegmatis. Senioribus naturaliter; pueris uero, accidentaliter: De re non naturali, quia plurimum in hyeme fit, & in uere, & in regione naturaliter frigidis & humidis, maxime in suis sanitatibus quiescentibus, uel sauiet uiaerint. De re extra naturam, quia hanc febrem semper frigore nimis sequetur, ut totum corpus congeletur, maxime extremitates. Putrescentem aut phlegmatem, calor paulatim sentitur ascendere, & febrem lentam facere, sed tamen diuturnam. Hæc febris semper famulatur dolori stomachi, quia phlegma plurimum in stomacho regnat, maxime in ore eius. Unde & phlegmatici humores euomuntur, & infirmus subtiliatur, facies tumet, color plumbeus, uel linidus est, os humidum habet, non sitit. Unde oportet medicum inuestigare uisuram phlegmatis, unde sit ista febris. Quoddam enim phlegma neraciter frigidum, & humidum est, quæ species naturalis est, nascens de colamento sanguinis. Quoddam frigidum & grossum est, sed humidum minus, sicut acetosum phlegma nascens ex magnitudine frigoris, in calameutho sanguinis. Unde si quis uideat ægrotantem, sitim patientem, & siccum os habentem, de falso phlegmate intelligitur esse. Danda ergo sunt oxysaccharum cum aqua calida. In hora accessionis pedes & cætera eorum ponamus in aqua calida, ubi chamomilla, anethum, uiola sint cocta, fricemus pedum plantas cum sale, & oluo violaceo. Si uomitus ueniat spontaneus, in initio

morbi, leuitatem & subtilitatem materię portendit. Quod si non ueniat, non artificialiter fiat, quia morari nomen in principio morbi, crassitiem in ateriæ, & coagulationem denunciat, & ad digerendum tarditatem. Danda oxysaccharum cum aqua calida, quia multum ualet in febri ista, quia dissoluit materiam, & subleuat. Post danda pitfana cum oxysaccharo, ut digeribilis uenter fiat: uel artificialiter cum pharmacacia, uel chysteri. Si de inflatione, & gurgulatione intelligentur mormuret infirmus, & de stomachi abominationibus, materiam dissolutam, & subtilitatem ad eandem intelligamus. Unde natura cum leui cathartico siue pilulis est adiuuanda, in expellenda illa materia. In stomachi abominationibus uomitus cum leuibus est incitandus. Si autem in uirtute deficiat infirmus, ut catharticum non possit suscipere, laborandum est leuiter in subtilianda materia. Et ista faciendi sunt secundum materię naturam, & membri, ubi illa regnat materia. Ut si sit materia phlegmatica salia, & circa hepatis, tunc detur medicina mundificatiua, epatis propria, quæ cum urina superfluitatem eius expellat: sicut trochisci de spodio, de camphora, de saudalis, cum oxysaccharo. Si phlegma sit acetosum, dentur trochisci de tofa, de berberi, de aniso, cum scariolæ, matathri, & apij succo, & cum oxymelle. Sic medicandus est, per unam septimanam. Si autem febris diuturnior sit, daudum est apozema de radicibus, & sirupus de squinanto, sirupus de absinthio. Si materia sit in stomacho de phlegmate acetoso, detur in morbi initio mellicratum atomaticum, uel oxymel cum aqua calida. Nutriatur etiam pitfana, cum corticibus marahri, & apij cocta & cum oxymelle. In hora accessionis cum iam rigere inceperit, incitetur uomitus, cum oxymelle & aqua calida, ubi anethum, & radices sint coctæ. Pedes imponendi sunt aquæ calidæ, ubi cocti sint chismomila, anethum, meliluius, samscus, brotonum, & similia. Demum mel rosatum cum aqua calida, & materia iam digestionem immutata, demus apozema de aloem, uel de hierapi cra, uel de absinthio, siue de pilulis aureis. Quæ si uirtus infirmi pati nequeat, dentur trochisci de eupatorio, de absinthio, de rheubarbaro, cum apozemate de radicibus, & oxymelle. Incitetur uomitus in initio accessionis, neque comedat, nisi febris molestatio quiescat, ne subtilibus diazetur, ne uirtus infirmi deficiendo molestetur. Apparente autem signo decoctio uis in urina, calefaciamus, & fumigemus stomachum cum rebus calidis sicut uardileo, masticheleo, anethileo, absinthileo, & similibus. Fumigemus cum aqua calida, ubi cocta sint chamomila, spica, mastiche, absinthium, & similia. Cataplasmata ponenda sunt super stomachum

cham calida moderate, & odorifera. Aqnā bibendam miscemus odorifero uino, & mellificato aromatico. Demum stomachum confortatiua siue cibum seu potiunculam. Hæc enim febris propria est oris stomachi.

De synocha febris. Cap. VII.

Synocha febris ex multitudine sanguinis oritur, cum sanguis quantitate, & qualitate suæ naturæ inpergreddens, ab ea quasi derelictus, putrescit, ex cuius putredine febris synocha nascitur, i. continua. Hoc autē duobus modis est, alia ex putredine sanguinis nascitur, alia uero de nō putrefacto sanguine oritur. Quādo ex nō putrefacto sanguine, hæc signa habet, urina rubra est & nō purida, nullā habens hypostasim, nec faecorem, clara. Vultus ægri inflatus, uenæ plenæ, oculi quasi sanguinei, pulsus plenus, sapor oris dulcis, homo pilosus, crassus, niger, rubens tempore ueris, diæta calida, & humidā. Si uero de putredine fiat, urina eius turbida, spumosa, rubicundissima, pulsus plenus, sapor oris dulcis, pulsus maior in contractione, quā in dilatatione, & oculi tumidi, nullam habent requiem, angustia, siua nō magna cutis quasi humidā, gravitas totius corporis. Hoc & omni die melioratur, aliquando autem peioratur quotidiē, aliquando eodē morbo nūq; in finē manet. In primis sanguis detrahatur de vena mediana, aut hepatica, dextri brachii, secundū uirtutem, si tepus, & ætas, & uirtus permiserint. Deinde super latus dextrū impone epithima, de succo solatri, farina hōrdei prius assati, & puluere rosæ, aut sandali rub. & albi, cāphoræ, & aqua rosata. Mane & sero fomentabis pedes & crura in aqua calida, in qua cocta sunt uiolæ, rosæ, lactuæ, maluæ, papauer, & hordeū, post fomentum, ungantur plantæ, pedum, ex oleo rosaceo. Si nō dormiant, pannus infundatur in oleo rosaceo, & aceto, & capiti, & tēponibus imponatur. Vel hoc: Rec. psyllij unc. 3. opij, drach. 3. trito opio, adhipe pyllium, & moueat cum pistillo, deinde mitte tantundē acetī, quod tribus digitis supereminet, & moue donec coaguletur. Iterū secundo moueat cum aceto ut coaguletur, ad iunctio pauco oleo rosato, uel uiolato, cū pāno aqua infuso, & cataplasmate ei inducto, fronti imponatur. Hoc sæpius fac. Si siñs aderit, detur aqua cucurbitæ, cum psyllio, uel mane accipiat de elæcterio prunorum, cum syrupo acetoso, & aqua frigida, aut ex oxycenini, aut succo solatri, aut pēisana. Cibum eorum sit mica panis lota, in aqua frigida, per uel quater de cōdita cū saccharo pruna, mala sicca, uix mediæ maturæ, melagranata, pisces aspriles in aceto cocti. Hoc tantum in aurore & extremitate diei

comedatur. Si uenter est constrictus, soluiatur, cum electuario, & scammonia.

De synochis. Cap. VIII.

Synochi ex sanguine, & cholera uasuntur, ergo phlebotomari debet, prima uel secunda die aut multū in tertia. Si masculus, de dextro brachio; Si femina, de sinistra, & si uenter est constrictus, clysterizabis ita: Cātabræ, & maluæ cū oleo, & aqua coquant, & colatis per linteū utantur. Si deliderauerint balneare, permittantur & utantur fomento superiori. Cibentur succo pēisanz, & molli farz, malia mazianis, uel siciacis, & pane in aqua. Potionē rosatā quā in tertia sctibemus, sub lingua teneatur, & succū eius liquefactū trāslutatur. Ungamus frontē oleo rosato, epithima pēordijs imponamus. Rec. oli bani, miltichis, ana. unc. 1. croci hortulani, unc. 1. vitella ouorum assatorum, prout uideatur. cum oleo rosaceo, & modico aceto, confice & utere. Item oleum rosatum cum succo portulacæ, aut cucurbitæ, aut berberis, pēordijs inungimus. Detur succus oryzzæ, uel alicæ. A nino omnino abstineant, multa tamen melius attici detur.

De causone.

Cap. IX.

Causone est acutissima febris ex cholera rubra, quæ non differt à tertia acuta, quæ intra uasa est, nisi quia acutior est, & breuior. Siua continua, lingua sicca, in quibusdam nigra, urina nigra, pulsus uelocissimus, nigilæ, & syncopis. Purgentur cum cathartico, & non cum phlegmatico, cum tamarindis, prunis, & castafistula. Sed quia calor in causone acutior est, eo quod sic in synocha, laudo hoc dari debere: Recip. tamarindi, unc. drach. mittantur in aqua melonis palestini die acnotæ, deinde manibus fricatis colentur, & bibantur. Si deest aqua illa, mittatur, in aqua prunorum rubeorum nigrorum, uel in aqua solatri. Si siñm habuerint, bibant psyllium, ter lorum in aqua, utantur succo maligranati, & cucumero palestino. Si patiantur ardorem & cardiacam, da cum supradictis succis, uel aqua, trochiscum de cāphora, uel de sandalis. Apponantur in stomacho cataplasmata de sandalis rubeis, rosis, farina hōrdei, & aqua rosata, uel succis semperuiuz, & portulacæ, olei rosacci, solatri, ana. unc. 1. acetī, unc. 3. farinæ hōrdei, unc. 3. rosæ, unc. 1. sandali, drach. 3. Aliud: Cum aqua rosata detur psyllium, si siñm habent maximam, & intolerabilem, detur aqua cucurbitæ cum succo psyllij, uel cum syrupo uiolato, uel rosaceo, uel cum psyllio, uel sine eo. Si habent tremorem in corde,

accipiant aquā tamarindī, cum psyllio cocto cum saccharo. Si tūsum non habent, uel solutionem, da eis quod utilius est. Recip. pruna sicca, misceantur die ac nocte, in aqua calida, & fricentur manibus. Si uenter sit solutus naturaliter, uel artificialiter, & febris non minuatū, mortalis est.

De tertiana febre. Cap. X.

Tertiana feb. alia continua, alia nō cōtinua. Continua in hoc differt à canone, quia calor eius unoquoq; die tertio, in eadē hora qua incepit, accipit, & in 2. a. finitur, & calor eius quous uideatur descendisse, tñ manet, licet non fortis existat, usq; in diē tertium. In tertio uero die ad eandē horā incipit ascedere, & manet in femore usq; ad 2. horā. Hæc curatur sicut causom. Si uero sit cōtinua, cum uomitu curatur facili Rec. seminis atriplicis, unc. 1. & 2. Tutum in raro panno missum, & in aqua calida mollificetur, fricetur in cypho. Lac uero quod egrediū, fumatur cū syrupo acetoso, nel semē intundatur in aqua, in qua cōdē sint radices cucumeris agrestis, uel cū oymelle, uel si tēpus est cōtrariū, purgetur cū aqua in qua nocte & die posita fuit unc. 2. mirbalani citrini, & pnc. 2. tamarindī, si difficilis sit, unc. 1. & 2. uel secū quod nides. Si autē febris permaneat, da rubeam. Si priores purgationes, secūdū uomitū facere nō potueris, purgatur cū laxatio pruporū cum scāmōnio aut mirbalani citrini succo, & tamarindī. Cibetur quotidie panis, & aqua, aut mica panis loca in aqua & saccharo. Accipiant fructus quos diximus in synocha, & dantur supra dicti scariolā cū aceto. Cibus autē det tribus aut quatuor horis, ante accessionē. Omni die inter arora, dabis elect. de prunis, cū syrupo acetoso, aut cū succo solatri. Rubrica tertiana probata Rec. opij, unc. 4. croci, anisi, cardamomi, storacis, hyoscyami, baccharum lauri, an. unc. 1. Cōfice autē cū melle, da 2. uel 3. horis, ante accessionē, in modū fabæ cum farina, q̄ acceptū in intima, mox febricitē liberat. Si autem propter hoc nō liberat, & tertiana notha fuerit, & uomitu egerit, misce mel, & acetū, quibus admisceatur semē atriplicis, drach. 3. potuiq; dentur. Si constituta fuerint, puluerem niolæ, drach. 4. bibat, interpolata die, cū frigida aqua, & utatur hoc epithimate Rec. farinæ hordei, drach. 2. & sicce rosæ, unc. 1. sandali al. unc. 5. spodiij, drach. 2. cāphoræ, scrup. 1. tēperetur cū succo solatri, & quasi unguento utatur & de super cum panno ponatur. Bibant autē quotidie succum maligranati, & mane & post 7. dies, si uenter fuerit rufus, & turbida, & nihil superiora profuerint, balneo utatur, & somnetur ex aqua &

oleo & post fomentum phlebotometur media uena dextri brachij. Tertiana si duplex fuerit, utatur hydrocypion cum balsamo & rubea & musa, ut potione una. Dixta utantur ut supra. Prodest & tertiana triandali, & rosata simplex, quæ recipit rosæ, pnc. 4. seminis melonis, liquiritiæ, dragagati, succi liquiritiæ, an. pnc. 2. seminis citroli, unc. 1. croci, unc. 5. mel. rosæ & aqua rosata. Cibus dabis succum oryzae, aut alicuius galle, pisces saxatiles, poma frigidissima. De oleribus, lactucas cum aceto, portula lacas, solatrum. Omnes cibis frigidis, parum salitis dabis, post aquam frigidā & mullam de rhodonelle, & si solutus fuerit, citonij mel cōfictum ita Rec. succi mali citonij, partem 1. melius, partes 2. coque lento igne ad epithimidinē mellis, & cinde mullam dabis. Epithima ad idem Rec. masticis, scenugracum, thas, li ni semen, farinā hordei, & croci æquali pōdere, trita, ita distemperentur, cū uicello ouum, & oleo rosato, qđ hoc modo cōficitur. Oleum & rosæ cum humore suo, in uas uitreū simul mitte, & in puteum, aut in aquā uiuā pone per dies 30. postea sustollens inde, pone ad solē, diebus 9. & sic in umbra reponē, hoc oleum frigidissimum est. Si ignis febrē hoc oleo uixeris amputare suler. Si autē tertiana in autumnū uenerit, purgabitur cum diatellaron, distēperato cum uino calido & cū rubea æq; nulla. Cibi dandē sunt temperati, ut far & similia, & granum bonum bene coctum, acryplices, spinachia, pisces squamosi.

De quotidiana febre. Cap. XI.

Quotidiana ex phlegmate nascitur, & hæc intra uas, & extra uas. Quādo est intra uas, facit calorem cōtinuum, sine frigore. Quæ autem extra, calorem facit cū frigore. Quādo uero oritur ex phlegmate falso, calor, ex eo erit maior, frigus paruius, si eis magna, & cito curatur. Quādo autem sit ex acetoso, & contra conpingit. Quādo autem ex dulci phlegmate somnus ex ea erit longus, stupor, si pauius, urina grossa, media inter citrinum & rubicundum colorem, uulcus humidus, uenæ grossa, pigritia, sapor dulcis, & fastidium. Si igitur curanda, detur aliquid maxime pro materię ratione. Si acetosa contingat materia, dia costum, nel diatiron, pipereos, cum syrupo acetoso, cum aqua diuretica facta, & cum eadem bibito, & hoc 4. uel 5. diebus. Deinde dabis uomitū, si facili sit ad mouēdū, & tempus, & uirtus cōueniat, q̄ his moueatur Rec. thapsij, partē 1. croci, partē 2. cinnamomi, unc. 3. da cum oymelle, scrup. 2. Si deest thapsia, da eleuariatū cū oymelle, pōdus, scrup. 2. nel secundū uirtutē, uel da pterid cū scāmōnio. Si nec sic definit

definit febris, da ei mulfam. Si uero fuerit ex phlegmate falfo, da eis picrā mixtā cū triphe-
ra, uel cū diadamafeno, & fcāmonio, aut cū pi-
ra, & fcāmonio, & fero capriuo. In fiti tollēda
da ei mulfam, mel rofarū, aut firupū cū calida.
Quotidie mane fumat firupū acetofū, aut oxy
mel cū fucco fcariolæ aut folari, aut cū fucco
forniculi, coctis, & defpumatis a ute tres horas
acceffionis, uel fumat de rubea in modū fabæ, cū
frigida. Digta ſint piſces faſatiles, marini, rubel-
læ, & ſquamofī cocti cū aceto, cymino, ciuna-
momo, & paucō adipe: poma, pruna nigra & ru-
bea, granata, pira, poma matura, vix duracina, &
eucurbita cocta cū cymino, & ſpica. Nō come-
dāt niſi 6. horas ante acceſſionē. Si autē de phleg-
mate acetofō, uel ſanguineo quotidiana fuerit,
magis habebit frigus æger, cū pauca febre, do-
lorē in ſtomacho & uomitū. Hanc itaq; curabis
ita: Purgetur cū picra, uel theodoriton. Sumat
quotidie mane aut diacalamenthū, aut theriacā
magis, aut noſtrā, aut mithridatum, aut rubicā,
aut adrianū cū oxymelle ſcillitico, cū fucco ſce-
niculi, & apij, coctis, & defpumatis, & colatis,
aut oxymelle ſcillitico cū aqua in qua cocta ſūt
radices ſeniculi, apij, petroſelini, ſcariolæ, & ſe-
mina cori. Cibi cori ſunt ſcariolæ, borrago, ſce-
niculū, laſuca, cū eruca, paſtinaca, porri cocti,
ius ciceris, uinū rubcū, aut citrinū, aut aureum,
hordeum, far, piſces marini, petroſi, rubellæ, &
ſquamofī, cocti cū uino, & aqua, aueſtho, apio, cy-
mino. In tēpore acceſſionis pedes mittantur in
aqua calida, in qua cocta ſunt pulegium laurus,
& nepita, plantę pedū fricentur cū oleo, & ſale,
& aqua calida. In balneo fumāt rubricā cū oxy-
melle ſcillitico, & fuccis ſcripſitæ, aut aqua præ-
dicta, aut theriacā in modū auellana. Si magnū
ſit frigus, ungātur renes cori iuxta ignē cū oleo
in quo coquatur ſemen ſinapi, piper, ruta, & ra-
dis cucumeris agreſtis, hoc hat aliquēculū ante
tēpus rigoris. Vel aliud, pyrethrū tritū cū foriſ-
ſimo uino, coque ad tertią partē, & poſt tātū-
dē olei adde. Si ſine frigore ſit, detur picra ſa-
pius. Si cū typo fuerit quotidiana, de tē potio ru-
bea mixta cū hydrotopion ante 1. horā uel 2. ac-
ceſſionis, poſtea bibat aquā frigidā. Si uero fri-
gus magnū fuerit, niſi num mel aquā calidā. Si
hæc nō pſunt, accipiant mulfam. Si ſtomacho
plenus humoribus fuerit, ut uomant, detur oxy-
mel, quod ita fit: Rec. acetū phiala 2. mellis unā,
ſemina radices, rafani triis, ſemina atriplicis,
ana unc. 3. coquātur ad mediū & bibant a ute ac-
ceſſionē, & ieiunēt hora una poſtea. Si uero ſic
nō uomuerint, accipiat aquā calidā. Cibus de-
tur iua gallinæ aut far cū oleo: hæduli dētur, pba-
ſiani, turdi, perdiceſ, fiſcedulæ, aſpratiles piſces
aſii, aut elixi, mala citonia, vix, mala granata,
uinū leue & albū. Si in æſtate acuta fuerit quoti-
diana, & habuerint urinā turbidā ex ſanguine p-

cedentē, primo uel tertio die, uel uſq; ad 7. ma-
ne phlebotomeut. Cibus datur ptilana ſuccus,
q̄ coſcitur ſic ex hordeo purgato: Hordeū pur-
gatū miſſum in aqua nocte una tundatur, & ad
menſurā unius phialæ, mittat in aquæ phiala
16. & coquant cū lento igne ad tertią partē, &
p̄ liuteū coleantur. Vtiantur molli farre, malis ſy-
riacis, aut dulcibus amygdalis, & pane in aqua.
Si quotidiana admifceat tertiana, detur rubea
& hydrotopion in potione unā, & utatur. Si nō
pſuerit, theriaca magna detur. Si quotidiana in
tēpore ueris fuerit, curabitur potione rubex. In
cibo accipiat gallinas, & omnia uolatilia, uiſū
albū, & leue, far, cicer, betas, ſceniculū coctū, pi-
ſces aſpratiles. In æſtate eadē in oibus, obſeruet
curatio. In autumno ſi ſine typo fuerit, ſimiliter
turabitur. Si autē cū typo, uomitus, puocetur ut
ſupradictū eſt, aut cū aqua calida & oleo, aut cū
oxymelle ſimplici, ut mel, & acetū. Et ſi fuerit
cōſtrictus, oſymel catharticū dabis, quod ſit ita:
Mel & acetū, & elactery, unc. 1. hoc deſ ſecundū
uires ægri. Cibus ut ſuprà utantur. Si autē ſolutus
fuerit, damus cibos ſtipicos, & potū ſimiliter,
ut uinū græcū coctū. Si uero ſuo tēpore uenerit,
aut cū typo, aut ſine typo, primo catharticū da-
bis, ppter phlegma deponendū, & oēs potiones
calidas, ſcdiacalamētbū, picrā, adrianū, mulfam,
athanaliā, hydrotopion, & calida. Cibus autē ſu-
pradictos pānos uero impone extra, oxyra cro-
ceū mixtū cū ceronio. Cataplaſm a uero quod
recipit hæc: Micas panis, fel terræ, æquali pēde
re, coſice cū ouo molli cocto aſſo, & oleo cypri-
no aut laurino, & pāno inductum ſuper uiſcera
imponē, pbatum eſt. Experiendum ad quoti-
dianas: Recipe zingiberis, unc. 2. cinnamomi,
unc. 1. laureolæ, unc. 3. mellis quantū ſatis eſt.

De quartana & cura eius. Cap. XII.

Quartana fit ex melancholia, aut cū frigore,
aut ſine frigore. Hanc calidus & acutus pcedit
morbus, atq; cholericus, ut cauſon, uel tertiana.
Aut ſanguineus, ut ſynochas aut phlegmaticus,
ut quotidiana. Similiter & poteſt cōtingere in
quotidiana, & tertiana. Vnde ſi hāc febrē chole-
ricus morbus pceſſerit, dietā & frigidā curā da-
bis, cū aqua calida mixtā. Si autē ſanguinolētus,
curet cum eis q̄ conueniunt ſynochæ, mixtis cū
eis medicinis quæ conueniunt quartanæ. Cauſa
uero quā tertiana uel cauſon præceſſerit, ita cu-
rabis, purgentur cum picra, aut cū mirobalanis
citronis, uel ſero, cum mirobalanis, & ſumulo.
Vtatur ſirupo acetofō cum mirobalanis, uel
cū ſucco apij, & forniciuli, aut cum aqua quam
ſcripſimus in quotidiana. Si aut quartanā nul-
lus morbus præceſſerit, in principio tribus die-
bus iunctis dabis theriacā magua in modū auel-
lana cū oxymelle ſcillitico, & aqua quā ſcripſi

mus in quotidiana: Aut cū succo fœniculi, & apij, coctis & colatis, postea dabis laxatiuū picram, aut theodoron, aut hieralogodion, aut drach. 3. epithymicū sero & scismonio, drach. s. aut nomitū superius scriptū, aut uinū in quo prius infusum est elleborū albū, drach. 1. & s. Purgato corpore, fac tinā aqua plenā, in qua sunt cocta anethū, nepita, pulegiū, laurus, & abūnthiū. Ineretur in ea sequenti die quartanę, & intus bibant theriacam magnā cū oxymelle scillitico, & succis supra scriptis, aut aqua præfata. Si non habes theriacā magnam, da nostrā, aut diatesaron, aut adrianū, aut elethariū diatrion pisceron, aut dyspyrethū. In die accessions nil manducet, sed duabus horis ante tempus accessions intrēt balneū, & in eo accipiant theriacam magnā ut dixi, aut rubeam cū nino odorifero. Exiens autē ungat renes cū oleo in quotidiana scripto. Si uult manducare in nocte, uel transactis 6. horis, post accessiōē maoducet. Si cū typo fuerit quartana, & in æstate, ante accessiōem, dabis potiōē musam. Si fuerit in hyeme, utantur emplastro paulino, & potiōe dialysylo, & unguento dialthea. De cibis utatur rapis coctis, porris, tarre, cicere, carne porcina, agoina, gallina, & pedibus porcinis, malis cironijs, & uino medioeri. Id duplici quartana, da adrianū temperatū cū balsamo, dixta uero ut suprā. Si quartana uenerit in tempore ueris, curabitur cū potiōe sancti Pauli potiōe, & cū musa znea. Vngatur dorsum ex sinapi ante accessiōē. Cibus damus duros & sriptiros, autut lepores, phasianos, perdices, anates, anseres, cicer bene coctū, granū, fabas bene fractas, sceniculū, capta raparū, cytas agrestes coctas, porrū, uinum rubetū, & forte nimis. In æstate uero corabitur cū potiōe rubea mixta cū theriacā mundissima, & cū uino bene temperato. Fumigiū faciamus ex spolijs serpētis, & pelle nituli marini. Vngamus autē totum corpus de unguento marciaton viridi ante horam accessions ad ignem donec fudet, & præterita hora accessions, cibus damus ut suprā. In autumno curabitur cum potiōe musæ mixta cum hydrotopiō, cū nino forti tepido, & ante horam accessions dabis aquam calidā cōdicam cū pipere, cymino, ruta, & uino forti, & melle. In hyeme corabitur cū potiōe musarū, adriano, diacala metho, & trochiscis, q ad quartanariū dicitur esse probati, quos in fine huius libri ponemus: petroleū etiā bibere dabis, & ungamus dorsū, & stomachū eorū, cū unguento dialthea. Quo tidie calidā bibere dabis, & cibos prædictos.

De hæmorrhoidibus febribus. Cap XIII.

Hæmorrhoides fit ex media tertiana, & media

ephemerina, & ideo grande frigus. Acredinē enim cholera retinet phlegma. Pigritia autē phlegmatis retinet & excitat cholera, & ideo si cōmisceantur multas accessiones faciunt, & dicitur fractus hæmorrhoides. Nam si esse integer hæmorrhoides, tunc cholera & phlegma sunt æqualia. Vno die fit una accessio, alia altero. Hi hiera purgentur. Quod si negligatur, hydropici fiunt: At si cholera incenditur in synocham conuertetur, uel herbariam. Amplius. Hæmorrhoides fit secundū quosdam ex materia cholerica extra uasa, & phlegmate intra uasa, utriusque unius quantitatatis existētibz, ideoque hæc febris curari debet cū medicinis inter calida & frigida existentibus. Vnde si materiam sū sunt eiusdem quantitatatis curetur cū rebus ætenuatibus & dissoluentibus, nec frigorem nec calorem facientibus, sicut cum lupulo, succo marathrij, apij, māna, uiolis, saccharo, pifana, oxymelle. Quod si cholera sit maior, sit febris faciliors & leuiors curationis, & cū mundificatiuis curetur, & modice refrigeratiuis, sicut endiuia, & rodosaccharo, niola, saccharo, manna, prunis, pifana, & cū xyssaccharo. Si autem phlegma dominet, hæmorrhoides erit molestior, curetur cū medicinis dissoluentibus, & aliquantulū calefactiuis, sicut melicerato cū calida, sirupo abūnthij, pifana, in qua cocta sit radix apij, marathrij, anethij, calamechij. Oaymel quoque prodest, & trochisci de rosis, uel de berberis cū succo marathrij & oaymelle. Mel rosatū cū mastiche, aniso, marathro, & aqua calida. Cūque materia ceperit attenuari, & moneri, & signū decoctionis in urina apparuit, da suauē pharmaciā. Vomitu prouocabis post cibū, dabisque diuretica, sicut trochiscos de abūnthio, uel de lacca cū succo marathrij, eodiuiz, & apij, ana drach. 2. cum tepida. Pilulæ ad hoc ualent: Rec. hieræpicre, calamenthi, ana drach. 5. anisi, marathrij, apij, ana drach. 2. tēpera cū succo apij, cū tepida da. Aliudi Rec. hieræpicre, calamenthi, ana drach. 5. anisi, marathrij, apij, ana drach. 3. succi eupatorij, ana drach. 4. fac trochiscos cum succo fumuli, da drach. 2. cum calida.

De hæctica febre. Cap. XIII.

Hæctica si sit simplex, & corpus est humidū, immundū humoribus, maxime putredini præparatis bene curatur si causa p cōtrariū expellatur, sicut tristitia cū læticia, ira cū paciētia. Similiter & ea est in corporibus mōdis, cū cōtrarijs curetur. Sed in priori postea quam causa sit expulsa, per cōtrariū pellatur materia putredini præparata, cū medicinalibus herbis & mundificantibus, absque calore, & siccitate sicut cū succo lupuli, & rodosaccharo, uel uiolasacchara, mirbalano, māna, cassia fistula, uiolis & similibus mixtis.

mixta. Purgata materia ordinetur aer, locus, indumentis, cibis, & potus, odor & cataplasmata. Aer frigidus constitutus est. Locus septentrionalis. Indumenta frigida, sicut lana uetusta infusa rosas, sandalis, & aqua rosata. Cibi frigidi calorem extraneum extinguentes, & confortantes naturales, sicut pitana, panis ter lotus in aqua frigida, uel infusus in uino albisimo, & bene comestus. Lactuca cū oleribus dentur, portulaca, cucurbita, betes, & triplices cōditū cū amygdaleo. De fructibus ista, utraq; malagranata, melones palestini, cucumeres, mala maciana, mala citonia, pira, uae passae, hyemales, & similia. Sirupus granatorum uel albus. In aqua cocta quā bibituri sunt, mittant, spodiū, & bolus, uel semen portulacae. In pauimento sternant frondes, & flores frigidi, ut salices, myrtus, uiolae, & rosae. Dabis trochiscos de spodio, & bolo cū praedictis sirupis, & aliquando psylliū. Si egestio humida sit, dabis quae caueant solutionem. Si hyems fuerit non mouetur, nisi forte nimis sit frigida: Pannis igitur operiant. Si uero sit aestas, infrigidetur aer & humedetur. Domus sit spatiosa, & septentrionalis portae, in pauimento sternant frondes & flores salicū semperuiua, rhānus, iuncus, rami uitiū, & similia, & aqua paulatim super ea fundatur. Non autem habentibus humores putredini praeparatos, ungatur cutis cum succo lactucae, portulacae, succo uuae acerbae, uel solati, cum oleo rosato non tamē super pectus ponantur. Quod si mixta sit cū putredine, aut cum morbo in nobili membro existere, ut in diaphragmate, & pulmone, cū diuturna tussis, sit, hepatisq; dolore & similibus, malū signum. Cauca aqua frigida & uictiones, nisi apostema habeat, propter quod est febris calidissima. Si apostema uero non sit calidissimū, cauca aqua frigida, quae omni hectica nocet. Virtus reparatur cum cibis & potibus, facile digestilibus, & uelociter nutrientibus, & multum. Vnde Hippocritus. Facilius est repleri potu quā cibo. Non tamen potum accipiat neque tenuis uinum, neque sumatur multum, & subito, ne cito eaeat, neque nimis sit grossum. Cibus sit mediocris, faciliq; nutritius, aliquantulum grossitiei partem ipsam, ut penans in membris nutrit, & confortet, ut uinum aliquantulum grossum, lac, pitana, & similia. Cumq; hectica febris & cessauit, & non indigent alio, nisi ut corpus augmentetur, sumatur mane lac caprinum, uae: Lac statim emulsio cū tantundē aquae calidae mixta ad suauē ignē coquatur, quousq; tota aqua consumatur. Deinde potui datur calidus, addit ut ab uberibus multum fuerit. Quo biberito, expectent quousq; digeratur: deinde sumant, starnos, perdes, pullos gallinaeos, & similia, cum iure tñ coquantur. Vinum album & ponticum mediocriter mixtum dabis. Quod si non potuerint solum lac bibere, misceatur cū hordeo similia triticea, & similibus, secundum quod uides

inde digestum esse robustum. Hi uero quibus humores fuerint immundi, ab his se abstineant, & sumant solum pitana, panē lotum, maxime si egestio eorum sit cholericā. Nā febre praemouente, non cōcedatur perdes, starnos, lac, & uinum poticum. Cum autē febris discesserit, lauentur in balneo tepidae aquae temperatum aerē habente, & calor aquae sit quasi calor lactis cū ab uberibus egreditur. Balneum uero mansioni eius sit uicinum, in lectumq; ducautur ne deficiant. In fonte diu morari sint, eo quod aqua fontis bumentes eos, & uirtutē confortat. Fons autē sit speciosus, & uicinus ostio balnei, ut non laboret ad eū eundo, ne parua eorum humiditas deficeat. Aqua temperate sit calida, quia si calidior sit quod oportet, coadunat cutē & ea indurat. Si frigidior sit quod oportet, debili tribuet frigiditatem, & calorem naturalem extinguet, & cutem oppilar, cum & in his pori aperiri, & cutis debeat mollicari. At nil magis aperit poros, quā aqua temperate calida. Nā membra delectatione sunt in ea, natura cacitatur, seu per omnia membra diffundit, eo quod coagudet consimili, i. calori aquae. Eo uero agitur in contrariis, quā cum odio habeat nocua, fugit ad interiora corporis. Vnde cutis sanguinem & naturalem calorem amittens, patitur in cute rigorem, & oppilationem, & duritiā. Praeterea in balneo moretur, donec cutis rubea, & aliquantulum tumida coeperit fieri. Tunc extrahatur a balneo, postquam tumor discedat, ne ultra manentes deficiantur. Vigetur caro augatur, maneat in balneo donec cutis & tumescere & rubicunda coeperit fieri. Si autē aliquis uult attendere, post praedictum tumorem, ad eum moretur in balneo donec tumor praedictus, prius discedat, quia tempus istud est strictum, caue ne modus praetermittatur, maximē si caro fiat augenda. Verus igitur terminus erit tumor. Si aliquis magis morabitur, ad deterius ibit. Exeuntes balneū, ungantur cū frigidis unguētis, uel oleis frigidis & humidis. Balneent igitur mane prius quā accipiant escam, uel lac, uel pitana. Secundo die uespere, postquam haec sunt digesta. Lac uero prius quā in fonte ingreditur, super egrum emulgeatur. In aqua fontis mittantur lactuca, uiolae, & similia. Post balneū, sumant lac asinum, calidum ut emulsio fuerit. Cumq; lac fuerit digestum, iterum balneum ingradientur. Tercio etiam si usus eo fuerit, ingredietur balneum. Caueatur tamen hoc si febris adsit. Mora tamē unius balnei ab alio, sit quinque horis. Postea conetur perdes, pullos gallinaeos, & alias gallinas. Caueant tamen haec si febre habeant. Caue quoque ne coarguetur cibus. At quia lac solutionem facit, calidus lapis bis uel ter extingatur in eo, & ita datur. Confortata autem uirtute, da cancos cum similia uel hordeo coctos.

F I N I S.

M m 3

BER. GORDONII

DE FEBRIBVS

L I B E R.



Quid sit febris.

Cap. I.



FEBRIS est calor in-
naturalis mutatus in
igneum. Calor est ibi
loco generis, quia o-
mnes febres conue-
niunt in calore: Inna-
turalia dicitur ad dif-
ferentiam naturalia,
qui est cōservatiuus
Febrilis autē est cor-
ruptius mutatus in igneum. Istud est loco al-
terius differentia constitutiue: quoniam quā-
libet mutatio cum tensione caloris, non facit
feb. sicut patet in calore generato propter irā,
aut exercitium. Sed quando mutatio est ma-
gna, tunc laeduntur operationes sensibiliter, &
pro tanto dicebatur mutatus in igneum. Bene
igitur dicebat Gal. febris est calor innaturalis
mutatus in igneum. Nunc autem cūm feb. sit
propria passio cordis, corde superacceso &
indammato; spiritus, qui à corde procedunt
una cum sanguine, transeunt ad totum corpus,
& calefaciunt ipsum uniuersaliter superius &
inferius, exterius & interius, nisi accidentaliter
impediuntur, ut in hipparia, & similibus. Et quia
feb. omnibus morbis molestior est, sicut scribi-
tur à Gal. suo 8. de ingenio sanj. ideo à febre
dignum duximus inchoare. Nunc autem tri-
plex est feb. in genere: Ephimera, cuius subie-
ctum sunt spiritus: & putrida, cuius subiectum
sunt humores: & Hectica, cuius subiectum sunt
membra solida. Februm autem sicut aliorum
morborum 4. sunt tempora, scilicet principiu,
augmentum, status, & declinatio. Qui autem
differentia constitutionis generum, & specie-
rum feb. scire uolueris, & cognitionem tempo-
rum morborum, prout distinguuntur ex parte
digestionis & parasyssorum, uadat ad librum
nostrum de prognosticia. Ibi enim cum auxi-
lio diuino fideliter aggregauimus dicta Hip-
pocratis, & Galeni, & Auen. & aliorum. Nūc
autem intentio nostra est à febre ephimera
inchoare.

De febre ephimera.

Cap. II.

EPHIMERA est feb. ex distemperantia spiritus

procedens, ultra diem tertiam secundum sua
turam non se extendens. Circa istam materiā
quinque sunt intelligenda. Primum erit de cau-
sa ephimeræ: Secundum de signis: Tertium de
prognosticis: Quartum de curatione: Quin-
tum de dictorum clarificatione.

Licet enim secundum Auen. causæ ephi-
meræ sint multæ, sicut est fluxus superfluous, coi-
tus, ira, crapula, fames, uigilia, syncopia, & mul-
ta alia consimilia, omnia tamen ad quatuor cau-
sas reduci possunt. Prima igitur causa ephi-
meræ sumitur à causis extrinsecis actu, uel po-
tentia, ea lesacentibus, uel poros claudentibus,
sicut est caliditas solis, aut ignis, aut balneum,
aut stapha cum rebus calidis, aut balneum sul-
phureum, aut aqua frigida & breuiter omne illud
quod claudit poros & retinet uapores. Nunc
autem intelligendum est, quod secundum di-
uersitatem uaporum & corporum, diuersæ fe-
bres generantur: quoniam si corpus est pletho-
ricum, calidum & licum, & uapores calidi & sic-
retinentur propter pororum clausiōem, & si-
millium, tunc de facili ephimera generatur. Si
autem corpus sit cal. & humi. & uapores cal. &
hum. retinentur, tunc de facili febris putrida
generatur. Secunda causa ephimeræ sunt cibi,
potus & medicina calida. sicut est nimium po-
rum, forte, antiquum, allia, expe, piper, eu-
phorbium & similia, potissime in non consue-
tis. Tertia causa est motus animalis & cor-
poralis, sicut est exercitium & similia. Quar-
ta causa est apostema inguinum, ascellarum &
similium, & si hinc alie causæ, ad istas possunt
reduci.

Signorum ephimeræ quedam sunt genera-
lia, quedam specialia. Generalia sunt ista: ephi-
mera enim non uenit à causis antecedentibus,
sed à primitiuis, & ut plurimum non uenit cum
rigore: pulsus & urina modicum distant à na-
turali: calor in tactu non est pungitius, nec
mordacitius, nec multum lædens tactum, sed
est sicut calor naturalis, uel irati, uel illius, qui
multum laborauit, & ut plurimum terminatur
cum sudore humoroso naturali. Ex dicit Aui.
quod si ponatur in balneo, & non euenit aliqua
horripilatio, tunc est signum ephimeræ. Signa
autem specialia sunt ista. Si autem ueniat pro-
pter

pter solem & similia, tunc est caput calidum, oculi calidi tanguntur, facie & cutis, pulsus accedit ad uelocitatem. Si autem proveniat propter frigiditatem, motor pulchritudo coloris faciei, & transit in luorem. Si autem ex stypticis & oppilantibus provenierit, cutis sicca invenitur, calor ocellus, & si diu teneatur, sentitur calor acutus. Si autem venerit ex cibis & potibus calidis, sentitur caliditas in regione hepatis, & urina est tincta. Si autem venerit ex labore, fatigatione, debilitas est in toto corpore & dolor in iuncturis. Si ex ira, oculi sunt eminentes & facies rubicunda. Si ex tristitia, oculi sunt concaui. Si ex venenis, interiora inveniuntur calida, intensa & deficcata. Si ista signa specialia non sufficiant, recurramus ad indicia patientis. De causis primitiis non est multum curandum, quoniam ingenia curandi morbos non habentur ex causis primitiis, sed ex morbi essentia, membri natura & similibus, sicut testatur princeps medicorum Gal. 3. de ingenio cap. 3. licet aliqui magnam credant philosophiam inuenisse, si per signa corporis possint in causas primitivas deuenire, tamen ad curationem non faciunt, bene faciunt ad notitiam. Ut verbi gratia, ponamus nos, quod curis patientis ephimeram, est dura & aspera, frigida & oppilata: morbo igitur cognito oportet me calefacere, subtiliare, ex quacunque causa fuerit, siue propter fumach, aut gallas, aut alumen, aut balneum aquae frigidae, aut niuem & similia. Postquam igitur morbum cognosco, curare possum quacunque fuerit causa primitiva. Non igitur ualent ad curandum, licet ualeant ad cognoscendum: quoniam postquam scio, quod aliquis balneatus est in aquis stypticis, tunc scio quod pori sunt iam condensati &c.

Febris autem ephimera, secundum Auic. est facilis curationis & difficilis cognitionis. cognoscens igitur poterit praedicere, haec febris erit bonae terminationis & uelocis: quoniam ephimera de natura sua non durat, nisi per unam diem naturalem, & pro tanto denominatur ab ephimeron Graece quod est piscis Latine: ille enim piscis illa eadem die, qua oritur, eadem moritur. Ita est de ista febre de natura enim sui non durat, nisi per 24. horas. tunc terminatur cum sudore uaporofo non plurimo. Sed propter malitiam regiminis & naturam corporis, aliquando extendit se usque ad quatuor dies inclusive, ultra autem non est ephimera. ideo si post statum non quiescit, pulsus diuersus & urina indigesta, signum est irausus in putrida: potissime cum calore eorum quae egrediuntur a corpore. Si autem corpus est siccum & aridum in tactu, curandum est de hectica. Non autem febris ephimera negligatur, quia propagines malas gignit.

Patientes ephimeram quo ad curationem, in multis conueniunt. In primis quod deest cibis facilis digestio, sicut est hordeatū, pulvis parui, niuium album, cum multa aqua, & quod non utatur aliquo cibo donec in declinatione febris. Attamen aduertendum est secundum Gal. 8. de inge. quod in estenuatis, aliter est operandum. Si enim inueniatur cholericus extenuatus, qui laborauit, & fuit in sole calido, & similibus, & incurrat fenullo modo est triduanum ieiunium imponendum, sed statim cibus est exhibendus, aliter caderet in hecticam aut in mortem. Virtute igitur conllante, non cibetur nisi in declinatione. Conueniunt balnea, quoniam in declinatione febris. possunt omnes balneari, nisi quod cauendi sunt qui ad feb. putridas sunt parati, sicut oppilati, repleti, crapulati & patientes catarrhū, nisi esset catarrhus adustionis, sicut dicit Auic. quia in tali catarrho posset fieri balneum in declinatione. Cura tamen specialis potest esse, quia aliter in calidis, aliter in frigidis, aliter in oppilatis, aliter in non crapulatis, & ita de alijs. Si igitur aliquis incurrat ephimeram propter causas calidas, naturae frigidis potissime in capite, si uenerit propter solem, iram & similia. Si fuerit catarrhus, Recip. rosarum ru. electarum lib. omnium sand. ana unc. s. chamomillae. un. c. 2. aquae fontis lib. 4. aquae rosae unc. 3. aceti unc. 1. bulliant leui inundatione, & recipiat fumum. Si autem fuerit dolor capitis, calor & instantia uigiliarum; tunc Recip. se. papaueris al. drach. 3. olei rosae unc. 2. aceti, aquae rosae ana unc. 1. succi lactucae, portulanae uoc. s. misceantur lento igni sicut decet, & panni intincti fronti & temporibus applicentur. aer domus in frigidetur cum multa aqua, salicibus, aceto, nenuphare & similibus. locua autem sit subterraneus, non rheumaticus, & portae sint ex parte septentrionis. In declinatione autem febris balneetur in aqua dulci ubi sint rosae, chamomilla, nenuphar & mellocum, deinde cibetur cum bordeato, aut auenato, aut amydo, aut paruo pullo & similibus: naturae uero debilissimo cum multa aqua: & totum in frigidatum in medio profundo putei aquae haustibus, deinde dormiat & quiescat. Si autem fuerit propter frigiditatem & pororum clausione, ponatur in domo temperate calida, temperato modo cooperiatur, suauiter fricetur & in declinatione. Si est cum oppilatione, fricetur & sudet in aere calido, postea ponatur in aqua ubi sit chamomilla, mellorum: deinde cibetur ex auiculis minutis, aut pullis, & uino, uisi esset emendum de forti oppilatione cum plenitudine corporis. Et intelligendum est, quoniam ubi est fortis oppilatio & plenitudo, & timeamus de febre putrida, tunc est facienda phlebotomia. Regulariter autem in aliqua ephimera non com-

petit

petit euacuatio, nisi in crapula, aut fortiter op-
pilato, aut repleto. Si fuerit ephimera propter
cibus cal. ponatur frigida supra regionem he-
patis, si cum rheumate, suffumigetur caput cū
thure in plus, & rosas in minna. Si ex ira, inun-
guetur manfuetudo. Si ex tristitia, lætitia & simi-
lia indicantur. Si ex fame, detur cibustempe-
ratus, sicut oportet. Si ex syncope, conforten-
tur membra principalia, & infra de aliis per cō-
trarium reducuntur. Sed quia ephimera cum
opilatione frequenter ducit ad putridam, ideo
phlebotomentur, deinde friciuntur, postea stu-
phetur & fricuntur cum farina hordei, cicerum,
fabarum & niri. Et si accideret quoddam patere-
tur aliquam horripilationem in balnea, non
stet ibi scitu oculi, sicut dicit Auicenna. Si autem
aliquis fuerit crapulatus, & postea exercitet se
fortiter, aut stet in sole calido, si necesse sint stri-
ctæ & eructatio fumosa, timendum est de fe-
bre putrida, sed raro accidit in eructatione
acerola: tamen si cibus est in stomacho, fiat up-
pirus: postea si uenter non est laxus, fiant sup-
positoria aut clysteria: deinde in declinatione
balneetur, postea cibus detur: quoniam in ephi-
mera, longa abstinentia compescit eam ex crapula
nanscens. Materia digesta, potest fieri phlebo-
tomi: febre autem absente, confortetur di-
gestio stomachi cum diatrion pipereon: den-
tur sibi pulli & pisces petrosi. Crapulato autem
& nanscato, melior est medicina, si superue-
niat fluxus ventris spontaneus. Si autem fuerit
propter apostema emunctiorum membro-
rum principalium, aut furunculorum, aut scabiem
& similia, præcipiatur abstinentia, phlebotomi-
a, pharmacia, & curentur illa, sicut debent
curari. Curatio autem ponetur in suis locis.
Et quia rarissime uocatur medicus propter
ephimeram, ideo de curatione eius amplius
non curo.

Ad clarificationem eorum quæ dicta sunt &
dicenda sunt, oportet multa breuiter intelli-
gere, ideo intelligendum secundum intentionem
Galen. lib. de differentiis feb. In corpore enim
humano non sunt, nisi tria membra, scilicet so-
lida, humores, & spiritus, & secundum hoc suf-
ficientia feb. sumitur. Quoniam si membra so-
lida supercalefiant primò & subiectinè, sic est
hectica, & assimilatur calori patiens in balneo
secundum Auicennam. Si autem humores primò
& subiectinè supercalefiant, sic erit putrida: &
assimilatur a quo balneo. Si autem spiritus prin-
cipaliter & subiectinè supercalefiant, sic erit ephi-
mera: & quia non sunt nisi tria, ideo non sunt
nisi tres feb. Ad hoc sequitur quoddam nulla fe-
bre post se dimittit ephimeram, licet fiat ecō-
uerso, pro tanto, cum in qualibet quodlibet
elefias, tamen non subiectinè, ideo una non
est alia. Si igitur cesset, quod est in solidiori,

cessabit quod est in subtiliori. Si cesset superca-
lescentia membrorum & humorum, citò cessa-
bit & spirituum: ideo nulla febr. dimittit post
se ephimeram. e contrario autem bene potest
fieri: licet enim cesset calefactio spirituum subie-
ctinè, non tamen propter hoc aliorum. Relin-
quitur igitur, quod omnes feb. possunt sequi
ephimeram, ephimera autem nullam. Secun-
do intelligendum, quod licet febr. dicatur ca-
lor innaturalis, non propter hoc erit causa &
effectus, cum causetur ab innaturali quoniam
calor qui est in minera, est causa, & calor qui
est in actu inflammatus in corde, est effectus,
& per illum diffinitur. Tercio notandum, quod
calor naturalis & innaturalis in feb. possunt
idem, sustinentibus hanc uiam per hunc mo-
dum: quoniam sunt idem in specie: utrobique
enim est calor, & idem numero, quia in eo-
dem subiecto, sicut in calore flumens, quia à cor-
de procedit superaccessio: quoniam nihil aliud
est feb. quam calor innaturalis mutatus in
ingentem. Erunt igitur idem in numero, quia in
eodem subiecto: nec sunt contraria in eodem,
quia contraria sunt uel quasi, & ibi bene pos-
sunt esse, sicut sunt in quolibet misto, & pro-
tanto talia contraria contraria simul existen-
tia generant nouam speciem, sicut est febris.
Alij autem dicunt, quod differunt in se, & in radice
quia unus uiuificat & alter mortificat, & ita pos-
sunt stare: quia in quantum trahit ad dispositio-
nem naturalem, uiuificat & dirigit materiam
cibi & morbi: in quantum autem attrahit ad di-
spositionem innaturalem, corrumpit & mortifi-
cat. Et est quarto notandum, quoniam suppo-
sito quod calor & spiritus differunt, quoniam
forte non differunt, sed ponamus uerbi gratia,
quod differant, non propter hoc alia febr. erit in
calore naturali, & alia in spiritu, quoniam quo-
modo uque sit, utrunque: tamen est delatium
uirtutis, & ita non erunt quatuor feb. cum sint
simul, & simul inflamentur, & simul sint dela-
tores. Quarto intelligendum est, quod sequitur
frequenter ephimera apostema inguinis, axil-
larum & similibus, quoniam sequatur alia aposte-
mata magna, pro tanto, quia sunt emunctoria
membri nobilis, ideo de facili inflammantur spi-
ritus, & cū hoc causata est ephimera, quia illa
materia non est sic putrefacta. Alia autem aposte-
mata ut sunt foriculi, scabiæ, & similia genera-
tur magis de materia corrupta & putrefacta,
potissimè quoniam est in interioribus, ideo talia se-
quetur putrida febr. Et præterea dicebat Hippo-
crates in bubonibus, omnes feb. male præterquam
ephimera, quia materia cum qua est ephimera
uidetur magis peccare ratione suæ quantitatis,
quam ratione suæ malæ qualitatis. Quinto
aduertendum, quomodo ad nanscam, tristitia-
m, somnum, syncopein, & alia multa conse-
mitalia

milia sequatur feb. cum habeant infrigidare. Dico quod est per accidens: nausea potissimè fit in cholerico, ubi fumi cal. & sicci, acuti resoluntur, qui supercalefinnt, in alijs autem propter spirituum conculcationem, pororum clausuram, & similia. Sexto notandum, quod ne plurimum ephimera non est cum rigore, pro tanto, quia materia non est horribilis, putrida, insueta. Septimo intelligendum est, quod cum dicitur, quod in ephimera ex calore ponantur flores frigidi in lecto. Intelligo quantum est de presenti circa lectum ad alterandum aerem, non quod tangant carnem nudam, quia tunc esset timendum de clausione pororum, & ita de putrida. Octavo notandum, quod in curatione ephimera non competit coitus, quia timendum esset de spirituum inflammatione. In ista autem materia nolo aliter ratiocinari, timens prolixitatem.

De causone. Cap. III.

CAUSON est feb. continua de cholera intra uasa existente in membro nobili, aut loco proximo cordi.

Febris causonica causatur, aut de cholera rub. pura, aut de phlegmate falso, ita quod cholera aliquando peccat plus ratione quantitatis, aliquando ratione suæ qualitatis, aliquando ratione utriusque. Inflammatur igitur fortiter, eum chol. rub. sit inflammabilis: & plus, quia est in stomacho, aut hepate, aut locis proximis cordi: & in hoc differt à tertiana continua, quia tertiana continua est de materia putrefacta in uenis remotis à corde, sed causon in proximis. Ideo causon, incendium interpretatur, & ratio uenit senibus: si ueniat, est signum perditionis. Iuuenibus autem uenit ut plurimum: & si conueniant alia particularia, tanto fortius. Fit etiam de phlegmate falso secundum Auicem. putrefacto, & inflammato in eisdem locis.

Summum incendium & inflammatio in toto corpore cum inquietudine, malitia tolerandi & multis pernecabilibus accidentibus, sicut est phrenesis, instantia nugarum, aliquando somnus profundus, nigredo & ariditas linguæ, syncope, icteritia, tremor, fluxus uentris, & aliquando retentio egestionum, pulsus paruus & uelocissimus, urina rub. & subtilis. Tamen uidetur multipliciter diuersificari: quoniam aliquando est à principio cruda, propter multitudinem oppilationis: aliquando tincta, propter resolutionem cholerae: aliquando liuens & turbata, propter multitudinem putrefactionis. Et si sit causon de chole. citrina, aut phlegmate falso, omnia erunt remissiora: & affligit, & alia particularia proportionatur phlegmati, & quia

affligit 18. horis, & aliquo modo uidetur interpolare 6. quia tempus est hyemale, & dixit sibi conueniens præcessit, & talia consimilia.

Hæ enim ægritudo est brevis terminationis nalde, cum terribilibus accidentibus, & si omnia bona signa appareant à principio morbi, liberabitur in die quarta aut infra: si mala, morietur in quarta, aut infra. Aliquando autem extendit se usque ad 7. Ista autem ægritudo non potest prolongari, quia natura secundum Gal. non patitur morbi prolixitatem & molestationem accidentium. Signa autem bona & mala non oportet hic apponere: alibi enim à nobis posita sunt. Hippoc. tamen uoluit prognosticare. Quibus scunq; in causone tremores sunt, alienatio soluitur.

In curatione autem oportet considerare causam morbi, morbum, tempora morbi, & naturam accidentium. Quia igitur causa huius morbi est putrefactio cum furti oppilatione, in primis remoueat oppilatio, fricando pectus, ventrem, latera, & partem quæ magis dolet cū aceto albo, oleo de chamomilla, & aqua rosa. & hoc cum suauibus fricationibus & longis. Sed contra morbum, oportet infrigidare, flammam caloris extinguere, & nimiam subtilitatem materię ad quandam mediocritatem reducere: & hoc est contra maleficiatos & fascinosos, qui non opinantur ingrossantia subtilibus competere. Recip. lentiginis, aquæ fontis, portul. uingulæ caballine, ana unc. 3. rosarum rubicarum electarum, sandali muscatelini, spodij, storacis, ana vnc. 1. aquæ rosell. s. aquæ fontis lib. 1. & s. uini malorum granatorum nnc. 2. panis zucari lib. 1. fiat syrupus clarificatus, & condatur lento igne, sicut decet. Digesta materia, purgetur cum cascia fistula, aut thamarind. aut myrobalecitrini, & similibus. Si esset de phlegmate falso, addatur apinm, bruscus, asparagus, & similia: & in laxatione addantur myrobalani chebuli. Ordinatur cura secundum tempora morbi. Si enim ægritudo terminetur in quarta aut infra, nullus cibis penitus detur, si uirtus tolerare queat. Si nero ægritudo terminetur ante quartam, aut ultra, & uirtus non possit tolerare, detur sibi cibus iuxta conuenientiam particularium. Materialia autem sunt ista, succus malorum gran. syrupus iulep, pitfana hordei colata, aut non colata, lac amygdal. brodium cicerum, lactuc. portulac. panis lotus in aqua, brodium paruz pullæ cum multitudine lactucarum, hordeatum, auenatum, amygdal. Accipere autem hoc uel illud, industria medicis relinquatur, quoniam aliqui sunt fortes plus uel minus iuxta naturam ætatis, complexionis, temporis, regionis, consuetudinis, & officij quod exercent. Ex his enim & alijs, ingenium diziandi & regendi eligatur à medico sapienti, & forma

cholera à temperamento. Quarto intelligendum, quod causon est ægritudo magna & periculosa in senibus, quia tortis est ignis, qui in aqua non extinguitur, secundo in iuuenibus minus quàm in senibus, & plor quàm in pueris, secundum Auic. quoniam licet sit in iuuenibus eum conuenientia particularium, & in quantu est ex conuenientia causæ, & particularium antecedentium, tamen quantum est de particularibus subiequentibus & communicantibus, dissoluit corpus, uirtus, & ibi ægritudo multum periculosa. In pueria autem est humiditas malita, quæ resistit calori uehementer dissoluenti, quod quidem non est in iuuenibus. Quinto notandum est, quod bolusius potest esse in causone, quantum est ex stomachi debilitate, & corporis dissolutione. Sexto aduertendum, quod aqua frigida mirabilissimè potest competere in causone, cum istis particularibus, quod uirtus sit fortis, & materia digesta, & morbus sit in declinatione, & quod non sit oppilatus, nec sit cruditas materię, nec sit apostematus & quod uehementissimè sitiat, & quod aqua frigida sit dulcis, & consueuerit, & quod in una uice potest tantum, quantum poterit attrahere uos uice sine attractione anhelitus. Et hæc sunt quæ leguntur à Gale. in regimento supra illam partem. His autem qui pleui etici sunt, &c. Secundo intelligendum, quod phlebotomia consilio meo non debet fieri, ut uidetur: quoniam frænno aufertur cholæ, & igniretur, materia inflammaretur, & redderetur magis cursibilis, nisi forte corpus esset plerhoricum, oppilatio fortis, & similia. Etiam retineamus consilium Auicem. qui dicit capitulo de phlebotomia, quod tardetur quantum est possibile.

De tertiana. febrem moli. Cap. 1111.

Tertiana est febris putrida de incensione chol. generata. Intelligendum est, quod duplex est cholera: quædam est chol. rub. pura; quædam non pura propter phlegmatis admixtionem, & appellatur chol. natha. Primo cholæ aut putrescit intra uenas, & æterias, & generat continuam; aut extra, & generat interpolatam. Tertiana igitur continua generatur de chol. putrescena in uenis, & arteriis totius corporis; & in hoc differt à causone: quoniam causon, ut dictum est, causatur ex cholæ putrescena in uenis pulmonis, aut stomachi, aut hepatis, aut in locis proximis cordi: & omnia sunt intensiora in causone, quàm in tertiana continua: & ideo curatio feb. eadem utrobique. Tertiana autem interpolata causatur de cholæ putrescena extra: & ideo habet periodos, & interpolationes. Putrescit autem materia quando consculatur, & caret euentatione, & desinitur, & su-

percalescit cor: aut quia fumus putridus perit cor, aut quia calefacit para partem, donec ueniat à minima usque ad cor, aut utroque modo. Calefacto autem corde, sic non cum toto corpore generatur febris tertiana, igitur continua sub causone reponatur: quoniam hic magia intendimus agere de interpolata.

Signa tertianæ sumuntur ex naturalibus: ut quia iuuenis, cholericus: & ita de aliis, & sumuntur à non naturalibus ut quia aestas, & ætate, & comedit cal. & ita de aliis, & sumuntur à rebus præter naturam: ut quia incipit rigore, sicut cum acubus pungeretur: & est differentia constitutus: & à principio rigoris pulsus est oculus, & postea uelox, & semper æqualis: & urina citra & tennis: & terminatur cum odore plurimo. Sigos autem tertianæ nothæ sunt alia & alia; inxtra phlegmatis admixtionem & conuenientiam particularium.

Tertiana uera terminatur in 7. periodis, aut infra: & ita terminatur in 14. die, aut infra: & affligit 11. horis, aut infra: & interpolata 36. Prima autem periodus est debilis: & secunda fortior: tertia fortissima: & quarta est in ultimo: sibi enim est status, & nequissima accidentia. Quinta autem incipit debilitari: sexta autem plus septima autem modica; aut nulla. In princip. paroxysmi uenit notus, & io sine sudor. Et quia ista ægritudo uenit cum terribilibus accidentibus, & non patitur ignorantiam, nec stultiam infirmis, ideo ut melius futuris periculis obuietur, & honestas medici conseruetur, bonum est semper futura pericula prædicere. Ponamus igitur quod post tertium paroxysmum sit uocatus, & uidetur sibi quod phlebotomia debeat fieri, & syrupus administrari, & hæc totum quod debeat fieri secundum uiam rationis: sed tamen nihil prognosticauit: tunc ueniet quartus paroxysmus fortissimus. uerè tunc assistentes dicent quod phlebotomia intestificat, aut postquam sumptis syrupum semper deterioratus est, & ita factus erit ignominiosus. Sed si pericula in quolibet morbo prædixerit, semper medicus commendabitur, & mihi sibi imputabitur. Sit ergo regula generalis, quod nunquam operetur in aliquo morbo, nisi prius prognosticauerit: non est igitur prognosticatio negligenda.

In curatione igitur oportet considerare morbum & causam morbi, & naturam medicamentum, & naturam ciborum. Innotio igitur non est una, sed multiplex: quoniam in curando oportet considerare causam, & materiam morbi & dyscrasiam. Non est igitur intentio simpliciter, sed composita ratione igitur putrefactionis oportet subtiliare & aperire: ratione autem materię compertum medioeriter ingrossantia ratione autem dyscrasie frigida & humida. Sed

quia

quia accidētia sunt multiplicia, sicut est inquitudo & uigilia, & malicia tolerandi ægriudinem, ideo talibus competunt quodammodo stupefacientia: ideo uno solo ista compleri nō possunt: igitur in syrupo oportet multa apponere propter multitudinem eorum quæ dicta sunt. Et in tertiana, Recip. endi. scariol. lactucarum nouel. & summitatum papaueris: sif. uoc. ij. quatuor seminum frigidorum maiorū, & minorum mundatorum, & non mundato. ana. unc. x. rosarum ru. florum nenufaris, Boiū viol. ana. unc. i. & s. omnium sandalorum. ana. drac. 3. aceti al. unc. 3. panis rucari lib. i. fiat syrups clarificati quartarii 5. Digesta materia purgetur sic. Recip. florum borag. florum viol. ana. unc. i. prunorum 20. fiat decoctio; & in decoctione resoluetur cassia fist. mundz, thamarind. 20a. uoc. i. & detoriū aurora. Ratione autem accidentium, quæ totum est de uigiliis, incipiamus à leuionibus, Recip. olei rosa. olei nenufa. aquæ rosa. aceti al. albinumis ouoū. ana. unc. i. lactis mulieris quātū omnia, & panis madesfacti fronti, & temporibus applicentur. Si autem ista non ualeant, paulatim ascendendum est ad fortiora: quare posuimus addere papauer, cum sua enim narcoticitate dormiticius est, ut dicit Auic. Deinde ascendamus ad succum lactucæ, solarij, mandragoræ, iusquiamini, & similia: & similiter addamus opim cum croco, & requiem, & rubeam trochiscatam. Requies est species confectiois. Et si fuerint uigiliae cum capitis grauitate, oportet odorare camphoram, acetum, aquam rosa. sanda. chamomillam, melilotum, & similia materiam humidam desiccantia. Si autem fuerit ibi stupor, sicut fricationes extremitatum dolorosæ. Et si fuerit uomitus, inquietudo & clamor, & reuolutio, & malicia tolerandi, suffumigetur enim narcoticis. Sed gratia putrefactionis, & oppilationis fricetur ueter cum uiuo al. & oleo de chamomilla & aqua ros. De reliquis autem accidentibus fiat sicut dictum est in casione. Eleuaria autem possunt esse sacros. uiol. dia dragantum frigidum, tria sandal. diapapauer, & similia. Si autem fuerit tertiana non uera, addatur prædictis apium, braseus, asparagus & similia, iuxta conuenientiam particularium. Et si esset mulier, aut phlegmaticus, aut tempus hyemale, aut oppilatio multa, quod addatur radix fenic. petro. lactuc. spica. nar. scolopendria, lupulus, & similia. Et in euacuatione possumus addere myrobal. rhubarb. diagrid. & similia iuxta conuenientiam particularium, quæ non cito pertrahere gratia breuitatis. Si autem loquamur de curatione gratia temporum morbi, tunc intelligendū est, quantum est de nostra medicatione, & a principio datur aliqua leuia laxatiua, sicut est cassia fist. & thamarindi, cū de-

coctione prunorū, & uiol. & post tertiā accessiōem potest fieri phlebotomia, si aliqua particularia cōueniunt, ut fortitudo uirtutis, & plenitudo corporis. In statu autē nihil fiat, nec cibale, nec medicinale, nisi aliqd aliud obuiaret, ut fortitudo symptomatis, & multitudo resoltationis, & similia. De cibis autem demus plus uel minus, sed per cōparationē ad paroxysmos ante accessiōem per tres horas nullus datur cibus, nec in accessiōe, donec uenerit ad maiorem declinationē, nisi corporis liquefactio impeditur. Et prohibeatur somnus in principio accessiōis & potus, nisi mo lestatio accidentium impeditur. Cibus autem qui eis cōpetit est, ut dictum est in casione, s. hordeatū, auenarum, amygd. spiciachia, mica panis ter lota, lactuca, portul. melones, cucumeres, cucurbitæ, pruna, mora, pyra cocta, poma cocta, brodium ciceris, brodium pulli, lac amygd. pulli parui, pisces petrosi, & similia. Intelligendum tamen, quod cum olera & fructus habeant humiditates quas putrefactibiles, utile esset abstinere, sed quia ratio inuenitur aliqua iis obediens, ideo oportet multa concedere, & cum diuersis operari secundum diuersitatem particularem. Accedamus igitur ad ea quæ artis sunt, quantum erit uobis possibile: quia formæ regiminis ex concussu particularium consurgunt.

Si dubitare aliquis in qua febrim putrefactio esset maior. Dico quod si nos loquamur de maiortate putrefactionis, quod ad intentionem & acumen, & furā accidentis, tunc dico quod maior est in cholerica. Sed si loquamur de maiortate quod ad continuationē, & nullam interpolationem, sic maior est in feb. sanguinea. Sed si nos loquamur de maiortate quod ad continuationem, & difficilem eradicationem, sic maior est in phlegmatica & melancholica.

Secundo posset aliquis dubitare si competit uoluntus in tertiana. Dico, quod in tertiana & in omni febre interpolata in principio paroxysmi competit uomitus: quoniam sensibiliter alleuiatur totus paroxysmus, & potissimum si fuerit spontaneus, uel ex modo facili procuratus, & aliquid purgatur de materia antecedente, & natura postea melius potest supra cōiunctam. Et ista uidetur intentio Anic. cap. de quartana. Et hoc uidetur sapere Hipp. ubi quotidie rigores sunt, quotidie febres soluntur: quia ad rigorem cōsuevit sequi sudor, nimicus, regeſtio, & similia, & ita modificatur corpus, & ita febris cessat. Et uidemus sensibiliter, quod cum aliquis patitur interpolatam, & in paroxysmo nulla est euacuatio, tunc in tempore interpolationis est totus gravis & ponderosus, & cum modica alleviatione. Si autem in paroxysmo fuerit mundificatio, in die interpolationis uidetur sibi quod sit curatus omnino. Utile est ergo in principio rigoris mo-

ris moderatè modicum vomitum pronocare, sicut est multum utile in fine paroxysmi tolerare sudorem.

Tertio posset dubitari si oxyfaccara, & syrupus aceto, competant in tertiana, postquam ita subtiliant, & materia est subtil. Intelligendum, quòd ista materia fuit declarata à nobis per intentionem supra illum aphorif. Quibuscunque in causone &c. Breuiter tamen dico rationes prætermittendo, quòd in materia subtili non competunt subtiliantia quòd ad sui digestionem, secundum quod determinat Auicenn. cap. de curatione febrium putridarum in generali: imò competunt ingrossantia. Et dicit Auicenn. quòd ille qui dicit contrarium, non est audiendus. Hoc idem dicit Gal. 1. 2. de ingenio. In tertiana igitur, quòtum est de reductione materie & dyscrasie, non còpetit frigida & sicca, sed magis frigida & hum. Sed ratione oppilationis, & putrefactionis pos sunt competere oxyfaccara, & syrup. acetosus: & quia etiam cum istis ponuntur rosæ & spodium, & multa consimilia, sicut dictum est cap. de causone: & ideo consuetudo mea est quò in talibus ego addam syrupum uiol. Gratia igitur ætatis & sexus, aut temporis, aut complexionis, aut duritiei uiscerum & oppilationum: & similiarum, auctores concedunt oxyfaccaram, & syrupum acetosum. Sed quantum ex parte materie, & dyscrasie simpliciter non uidetur competere: opinionis tamen sunt de ista materia, & ideo conscientie operantis relinquo.

Quarto posset aliquis dubitare de chylo, si putrefiat ad feb. cum auctores non faciant mentionem de febr. putridis, nisi humoralibus. Dico quantum est de presenti, quòd chylus & humiditates tertie possunt putrefieri, cum putrefactio sit in humidis & liquidis, cum dissolutione caruerunt, & transiunt in naturam alicuius humoris inanimalis per uiam euissandæ ebullitionis, & supercalescentiis & aduotionis, & ita febres putridæ semper sunt humores.

Quinto posset fieri dubitatio, si uno humore corrupto alij corruptantur, propterea quòd sunt simul & simul generantur, quare simul corumpuntur. Dico quòd non est necessarium: quoniam humi. sunt distincti per proprias formas, & per proprios situs, & per proprios motus, & ita quilibet habet suum regimen, & proprietatem, & proprium temperamentum: & ita potest amitti temperamentum unius, & non propter hoc amittitur alterius: quare non est necessarium, quòd uno corrupto alij corumpantur.

Sexto intelligendum, quò si iuxta prædicta aliquis dubitaret, quò melancholia corrupta, & om-

nes alij corumpantur, cum resistat utraq; qualitate: & ita cum sit fortis uictoria ex parte melancholice, & tamen corumpitur, igitur & omnes. Dico quò solum est, quoniam uictio hoc temperamento, licet fortissimè repugnet, non tamen propter hoc temperamenta alia: quoniam particulana que concurrunt cum isto, non est necessarium quòd concurrant cum alijs: quare &c.

Septimo possumus notare, quòd humor còcorumpitur, & putrefit in carne, & in stomacho, & in hepate, & pulmone, & breuiter in quacunque concuitate fuerit præternaturam, si ibidem careat eucnatione, & de situatur à regimine, ibi dè corripitur, & ibi erit minera. Et iuxta hoc intelligendū quò chol. præsina, & eruginosa sunt tantæ putrecibilitatis, quò putrefieri nò possunt. Ante cuius ueniret mors. Et iuxta hoc intelligendū, quò tertiana uera de chol. rubra, naturali generata, magis in regionibus frigidis generatur. Sed tertiana notha de chol. naturali causata, magis in regionibus cal. generatur, quia ab agere præternaturam causata est. Et iuxta hoc intelligendum, quò in tertiana phlebotomia bene potest còpetere. post tertium nel quartum paroxysmum, aliter nunquam, quia sic redderet transcuribilis, & secret de simplici duplex, & de duplici continuus, sicut uidemus frequenter. Et licet non euacuet materiam coniunctam, antecedentem tamen euacuet.

De febre sanguinea. Cap. V.

SYNOCHE est feb. continua de sanguine putrefactio, intra uasa. Synocha est feb. continua, quæ ephimeræ proportionatur, de sanguine peccante ratione sue quantitatis.

Intelligendum quòd cum aliquis confectus est exercitari, & subito dimittit exercitium, et nititur multis cibis, et potissimè sanguinem generantibus, aut sanguinem aquosum, sicut est sanguis generatus ex fructibus: & tunc ex his & alijs sibi conformibus, multiplicator sanguis: & si peccet ratione sue quantitatis, generat febrem continuam ephimeræ proportionatam ex sanguine non putrefacto: in qua si fiet phlebotomia, non cadet in putridam, sicut scribit Galen. 9. de ingenio. Si autem abundet sang. & peccet ratione sue quantitatis, & esset malæ qualitatis, generat routinam de sanguine putrefacto, qui synocha appellatur. Et habet tres species, augmasticam, quæ semper procedit ascendendo & augmentando, quia maior est dissolutio quam resolutio, & est deterior inter omnes. Secunda species est epigastica, quæ semper procedit diminuendo & est alijs salubrior, quia maior est resolutio

Nō & con.

& consumptio quàm dissolutio. Tertia autem species uocatur homotonon, ubi omnia sunt equalia: semper enim est in statu: & qualis enim est dissolutio resolutioni. Et istæ tres species sunt in qualibet feb. sicut declarauimus supra librum Gal. de differentijs fe. Sanguinem autem opioatus est Gale. t. de crisi, quod non potest facere fe. solam simplicem singularem: semper enim est composita: quoniam quando putrescit, & altera eius pars conuertitur in chol. & altera in melancholiam, ideo feb. solas simplices singulares non ponit nisi tres feb. quæ proportionatur chol. & feb. quæ proportionatur phlegmati, & fe. quæ proportionatur melancholiz.

Signorum quædã sunt antecedentia, & quædam subsequencia, & quædam concomitantia. Signa autem antecedentia sunt grauitas capitis, inflatio spatularum, repletio uenarum, rubedo faciei, flagellatio totius corporis, & similia. Concomitantia sunt dolor frontis, apparitio lampadum ardentium, paraphrenesis, turbatio mentis, tenebrositas oculorum, plenitudo pulsus & undositas, & diuersitas, dulcedo oris, urina rub. & spissa & fetida & liuens. Subsequencia sunt tumor faciei, mollities totius corporis, & aliquando superueniunt morbilli & uariolæ, & carbunculi: & sunt mala signa ualde, quæ consequuntur in temporibus pestilentialibus euenire. Ista autem declarant sanguinem putrescentem. Ista autem omnia remissa sunt in sanguine non putrescente, quoniam ephemere proportionatur.

Si autem appareant pustulæ liuidæ nigre, mortem significant: similiter si in ventre audiatur sonus, sicut tonitruum, sicut dicit Axioc. Lachrymæ si appareant propter malitiam morbi, difficultas anhelans, & præfocatio, & apostemata in uia anhelitus, & si post somnum sentiat se grauatum, ista omnia sunt mortem significan-
tiam. Apparitio autem uelox uel tardæ digestionis uel indigestionis significat crîsum breuem uel longam, salutem uel mortem relata ad uirtutem: quia in omni morbo sunt diligentissimè consideranda, quia secundum eas scies ea prognosticare & dicere.

Tota fere curatio istius morbi consistit in phlebotomia. Intentio igitur fuit Gal. 9. de ingenio, quod fiat phlebotomia usque ad syncope: & redarguit homines qui fortè dolosi sunt in hoc: & uidetur mihi, quod tutius est facere phlebotomiam multis uicibus, donec deficiat materia, non patiens. Magis enim diligo quoddam ægritudo aliquantulum prolongetur, quàm si mors mihi impetetur: quia signa fortitudinis uirtutis, aliquando fallunt. Virtute igitur fortis com-
uenientia aliorum particularium, fiat phlebotomia mane, & sero, & multis uicibus: imò si fuerit neglecta, non solum in 7. die uel

in quacunque hora uenerit, secundum Gale. 9. de ingenio. Si particularia non conueniant, fiant uentose inter spatulas. Si autem crapula, fiant fricationes uersus eartrema, & fortis abstinencia, & fiant suppositoria & clysteria: quia talia multum compeunt in hoc casu: & cum crapula erit digesta, fiat phlebotomia. Utatur ergo tincto syrupo. Recieodi. scariol. ciehoze. s. s. unc. 3. quatuor seminum frigidorum. ana unc. 1. florum nenus. florum uiol. ana unc. 2. uini malorum granat. unc. 3. panis zucca. libr. t. fiat syrupus. Et si patitur insomnia, ponantur in syrupo se. pauperis al. & si tussim, tollatur uinum malorum granatorum, & addatur uix pastæ mûdæ ab arill. iuiuibz, sebesten. Et si pateretur cardiacam passionem, addantur rosæ, sandali, spodium, corianderum. Et si constipationem, addantur pruna cum castaia fist. & ita multa & diuersa debent apponi secundum diuersitatem compositionis accidentium. In uigiliis igitur fiat sicut superius, & in stupore sicut dictum est. Et in siti nimia fiant sacculi parui de psyllio, uel pilulæ tales. Recip. succi uic acerbz, succi acetosæ, lactuc. nini malorum gra. acet. albi. ana. t. & conuantur lento igni cum pane de zucc. & fiant pilulæ, & teneantur sub lingua & supra linguam. Laxetur uocet com castia fistu. mûnã, thamarind. prunis, uel com oyalaxatio, diaprunis, trisera farsecnica. Paretor aer, locus & domus, sicut dictum est superius. Cibus autem multus uel paruus, secundum longitudinem uel breuitatem morbi: si igitur hoc deatum, mica panis ter lota, lac amygd. cû mica panis, mala granata. Et potest administrari oxyfaccara, syrupus acetosus, iulep, syrupus uiol. syrupus nenusar, & hydromel, sicut aliqui uoluerunt: & si sic, sit hydromel aquaticus. Sed in his temporibus inueniuntur uiri & mulieres ita delicati, q. nihil horum sumerenti & tunc sicut in naufragio oportet cedere polli parui brodiu coctum in multa aqua cû fasciculo lactucæ aut feminibus frigidis. Et si eadẽ ratione cõcedatur nîu, accipiantur duæ amphoræ par uæ, repleatur una uino, & alia aqua, & coninn-
gantur in suis orificijs, & aqua tribatur: & cum erit aliquantulum tincta, detur patienti, & appellabitur uinũ sîcaratum uel frangatur cû multa aqua bullientiu uel detur talis potus. Recia. quæ fontis lib. 3. acet. albi lib. 3. panis zuccari puluerizati unc. 3. miscantur fortiter, & uidebis nîu albu gallicum. s. & quasi uiderata men quantitas acet. & etiã toxina miltionis, q. nō sit multu acetosum, nec parum, experimento probetur.

Si aliquis dubitaret, quod ingenium curadi sit fortius, uel sumptum à morbo, uel sumptu à uirtute. Dico, q. ingenium à morbo aliquando est fortius, & aliquando à uirtute, secundum diuersas intectiones. Vnde intelligendum, quoniam ingenia

ingeniis curandi sunt multae: quaedam enim sunt ad digerendum, & quaedam ad conferuandum, quaedam ad euacuandum, & quaedam ad dandum similia, & quaedam contraria: tunc ponamus quod gratia aetatis & virtutis & consuetudinis similia debeant dari in feb. sed sola feb. praecipit dari contraria. Dico quod in hoc casu ingenium sumptum ex morbo est fortius quoniam non obstantibus omnibus alijs particularibus contraria debentur. Et propter hoc dicebat Gal. octavo de ingenio, quod consideratio sumpti ex morbo omnes alias conditiones destruit & annullat. Si autem nos loquamur, de ingenio sumpto ex parte euacuationis, ita quod morbus praecipiat euacuationem, & virtus praecipiat contrarium, in hoc casu magis est credendum virtuti quam morbo. Ex secundum hoc dicebat Gale. in regimine, quod sublimior omnium considerationum sumpti est a virtute, verbi gratia, febris enim sanguinea semper est cum sanguinis multitudines, & ideo quantum de natura morbi, competit phlebotomia: sed si virtus est debilis, & non possit sustinere: in hoc casu magis est credendum virtuti quam morbo. tabulam enim ingeniorum ordinauimus, quam oportet cum studio pertransire. Secundo posset aliquis dubitare si sanguis putrescat, & si solus. Dico quod putrescit, cum habeat duas causas, scilicet humiditatem, quae est mater putrefactionis, & caliditatem, quae est causa. Ad secundum dico, quod solus sanguis putrescit in sui principio & fine: sed postea ratione sui temperamenti additur compositio propter alteram partem conuersam in choleram. alijs fecimus longissimos sermones de hoc.quare & cetera. Tercio posset aliquis dubitare, si febris interpolata posset ex sanguine causari. Dico, quod opinioniones sunt de hoc, iuuenio tamen Gale. ponentem quod de ingenio, febrem interpolatam de sanguine, & Viaticus ponit hoc idem, & satis est rationabile: quia possibile est quod sanguis putrescat in tanta distantia à corde, quod calefactio non possit continue venire ad cor: & ita non erit continua, & non erit etiam ita in remota parte, quin possit aliquando venire, & ita erit interpolata. Quarto posset aliquis dubitare uel dicere, quomodo distinguuntur tempora morbi propter diuersitatem specierum? Dico quod licet non distinguantur quo ad accidentia, distinguuntur tamen quo ad digestionem uel indigestionem. Quinto notandum, quod si phlebotomia fuerit neglecta in principio, fiat post uirtute stante, non obstante opinione Serapio. quia Gal. uult hoc.

De quartana. Cap. VI.

Quartana est febris putrida de materia me-

lancholice generata. *simob m*
Causa quartanae est illud quod multiplicat materiam melancholicam, & putrefacit illam, sicut dicit Auicenna. Intelligendum quod quaedam est quartana continua, quaedam interpolata, & quaedam est uera, & quaedam non. Vera autem quartana generatur de melancholia naturali cum convenientia aliorum particularium, quod sit melancholicus, & tempus autumnale, & quod comedat cibaria multiplicancia melancholiam, & similia. Notha autem est de melancholia causata per uiam adustionis, & ita potest aduri melancholia naturalis & phlegma & chol. & san. propter nimios labores & comestionem ciborum uim calidiorum, & propter agriuidines inestusas, & similia.

Incipit enim cum frigidityte congelante & horripilatione, osium contractione, & est pulsus occultus & parvus, & postea efficiunt uelox, & terminatur cum sudore plurimo: quia materia est sicca, & ita nec fumosum uel femiadustum remanet post paroxysmum, sed complete eradicator secundum Gal. in de differentiis feb. Vrina est remissa & tenuis in principio, sed postea post paroxysmum multum coloratur: & faciunt ad hoc, quia uenae sunt strigae, & habitudo extenuata, & tempus autumnale, & alia similia quae praecesserunt: & durat accessio 24. horis, & interpolat. 68. Signa autem notae remissa sunt, & uariatur secundum uarietatem humorum: quoniam si quartana sit de sanguine adulto, uergit pulsus ad pleuritidinem & nodositatem, & tempus est uernale, & praecesserunt agriuidines sanguineae, & similia. Similiter in cholerica sunt signa quae pertinet cholerae: quoniam praecessit agriuidine cholerica, & pulsus est uelox, & urina colorata & tenuis, & est tempus aestiuum, & comedit res calidas, & laborauit in sole, & similia. Quartana autem de phlegmate habet urinam remissam, & spissam, & molliem in pulsu, & longitudinem paroxysmi, & paruitatem sudoris: & secundum diuersitatem cholerae, & phlegmatis diuersificatur signa: & ita de melancholica. Considerentur igitur signa iuxta diuersitatem humorum & specierum.

Quartana de sanguine est salubrior & breuior aliarum, deinde ex chol. deinde ex phlegmate, deinde ex melancholia. Quartana autem durat regulariter per unum annum: quoniam sicut acutae sequuntur motum lunae, ita chronicae motum solis. Aliquando autem durat per 12. annos sicut dicit Auicenna. Omnes autem quartanae ut plurimum sunt salubres. Et quartanarius habet multas dignitates, quia raro incurrit maniam, melancholiam, lepram, & spasmodum de repletionis: quia purgatur & mundificatur tota materia in quolibet paroxysmo.

Nu 3 Quar.

Quartana autem de materia melancholica cum duritie splenis ac hepatis à proprietate membrorum est pessima, & ducit ad hydropisum. Erit igitur ægritudo longa, dato quòd bono regimine utatur: & si malo utatur regimine, erit longissima aut mortalis.

In curatione huius morbi oportet multa considerare. Primò, quòd non dentur nimis calida, quoniam adurunt sanguinem: & ita errant qui dant prasium & piper, nisi essent aliter repressa. Secundò, quòd non dentur nimis frigida, quia materiam congelant, & ita errant qui dant succum lactuce, & narcotica. Tertiò, quòd non dentur nimis sicca, quia materia est nimis sicca de se, & ita magis induratur, & ita errant qui dant assa & friza & acetosa & styptica, & omnia ista intelliguntur, nisi cum aliis fuerint bene proportionata. Quarto, quòd à principio non nimis euacuetur: nam materia non potest esse digesta, quia in digestionem quartanæ frequenter sumus decepti: quia homines qui utantur modico cibo & potu, & bene dormiunt, habent in principio quartanæ urinam satis bene coloratam, & hypostasum: & videtur quòd sit ex materia morbi, & non est, sed cibi. Cognoscimus igitur digestionem materię morbi ex mitigatione paroxysmorum, & alleviatione eorundem. Quinto oportet considerare, quòd cibus non detur nimis subtilis, nec nimis in magna quantitate: quoniam status multum remotus est à principio: & ideo videntur errare, qui auferunt omnes carnes & unum usque ad 30. vel quadraginta dica: quoniam virtus nimis debilitatur, & non potest resistere morbo. Sexto oportet advertere, quòd nullum incedans vel ingrossans materiam debet exhiberi, sicut sunt olera cruda, & fructus, & carnea grossæ, & ea quæ sunt duræ digestionis, aut nimia quantitate assumpta, & similia. Septimo diligenter aduertendum, quòd in die accessions cibetur, & parum ante paroxysmum per tres horas ad minus vel quinque, & postea cibetur in fine paroxysmi cum eradicatus fuerit. In toto autem paroxysmo nihil cibale detur. Octavo demum considerare, quòd ante paroxysmum, & in principio paroxysmi prouocetur uomitus facili, & in fine sudor. Nono intelligendum, quòd fortis digestio nec fortis euacuatio non debent à principio administrari: sed gradatim à debilibus ad fortiora ascendere. In primis digeratur materia cum oxymelle simplici, & postea purgetur cum euacuatione sibi proportionabili: & postea digeratur cum oxymelle diuretico, & postea euacuetur cum fortiori: deinde digeratur cum oxymelle squil. & euacuationes hanc cum fortissimo. In præmissis euacuetur cum diarsene, diaboragi, & postea

addatur cum his aliqua portio hiez Ruffini, & postea cum hiera Ruffini tantum. Decimo attendendum, quòd non dentur opiata nisi corpore mundificato, & in declinatione. Vnde decimo aduertendum, quòd diurites & opilationes, & apostema splenis & hepatis cum diligentia transiamus: quia magna pars curationis existit. Visus igitur de universilibus, & ad unguem obferuatis, ad particularia veniamus. Feb. igitur quartana una sola simplex singularis cum convenientia suorum particularium per hunc modum petraçetur. Digeratur igitur materia sic. Recip. radicem sam. petrole. brusci, asparagi, graminis, apij, mediani corticis ebuli & sambuci, fraxini, genestæ. ana unc. 1. concrantur fortiter, & temperentur per diem & noctem in aceto fortissimum tunc Recip. germanæ, utriusque stæchados, utriusque calamenti, eupatorij, ana drach. 30. foliorum ablinthij drach. 3. endiuiz, schærio, eichoreæ, scolopendrij, ana unc. 4. quatuor seminum frigidorum, lactuce capparis, spicæ nat. spicæ celticæ. ana unc. 1. mell. ros. lib. 1. & zucca. lib. 5. fiant syrup. lib. 2. large. fumantur igitur cum decoctione horum, & sumus terræ manè & serò tria parua cothlearia, & nouem de decoctione. Iste autem syrupus summè remouet opilationes splenis & hepatis, & ideo ualet in multis. Euacuatur igitur materia per hunc modum. Recip. florum boragi, viol. foliorum fenæ, epithymi, liquiritiæ mundæ, vuarum passiarum mundatarum ab arilla. ana unc. 1. fiat decoctio cum sero caprino, et in decoctione temperentur cortices myrobalindorum, bellicorum, et emblicorum, ana unc. 5. fricentur lento igne, et colescent, et dentur in aurora ante accessionem per unam diem vel quasi. Et cum multis vicibus, et paulatinè, et in parua quantitate digestium erit exhibitum, possumus cum fortioribus euacuare. Recip. igitur diarsenæ, diaboragi, hiez Ruffini, ana drach. 3. lapidis armenici nouies abluti drac. 1. misceantur et fiat pilule, et exhibeantur eunti dormientem stomacho vacuo in secunda uice post accessionem. Postquam autem uidemus ægritudinem declinare, stupetur, et in stupha ponamus ea quæ ponuntur in syrupo cum multa aqua præter zucca. et mel, sed in maiori quantitate, et ex eunti qualibet uice offeramus aureæ alexandrinæ, theriacæ. ana drach. 1. misceantur. Sed quia multum conqueritur de frigore et horripilatione, ideo in principio pnamus pedes et manus in aqua calida, vel applicatur latera calidi, uel fiant fortes fricationes, calsiant extrema cum pannis calidis: uel ponantur ista ut in collo pedum et manuum. Reci. fuliginis, salis communis, urticarum, et terantur fortiter, et distemperentur cum

aceto:

aceto: & quando corpus incipit calefieri, quod illud remoueat, uel quod ponatur in balneo aquæ cal. ita quod non sit nimis calida, nec stet ibi tantum quod fudet: uel inungatur spina docti, & extrema cum aragon & marciaton. Vel quod accipiat myrrham puluerizatam cum uino cal. uel theriacam cum succo mēthæ. Succus calamēti sumptus ante accessiōem curat quartanā. Quies igitur & omnia humectantia competunt in omni quartana, sed calfacientia & in frigidantia diuersificantur secundū diuersitatem specierū. Ad quartanam igitur sanguineam accedamus. In quartana de sanguine habet phlebotomia de basilica, & digeratur materia cū syrupo de borag. & de fumo terræ, & mūdisficetur cum decoctione borag. & polypodij, & ani. & calisiei. & thamarin. hæc enim species facillimæ curationis est. Quartana de chol. curatur sic. Rec. oxyfa. syrapi uiol. syrapi. de fumo terræ, ana lib. i. misceantur, & purgetur sic. Rec. florum borag. florum uiol. liquir. mundæ, epithymi, ana unc. i. fiat decoctio cum sero caprino, & in decoctione temperentur cortices myrob. citri. indorū bene gummosorum, ana unc. i. fricentur lento igne, & coletur & detur in aurora. Si autē fuerit de phlegmate, digeratur sic. Rec. oxyfac. cōpositæ, oxymel. diure. de fumo terræ ana. lib. i. misceantur. purgetur sic. Rec. florum borag. florum uiol. polypodij, turbit, anis, liquir. mundæ, uuarum passiarum mundarum ab aril. absinthij, agarici, laccæ, eupatorij, ana unc. s. fiat decoctio in sero caprino, & in decoctione temperentur cortices myrob. chebul. indorū. ana unc. i. fricentur lento igni, & coletur, & detur in aurora. Pilulæ quæ ualent in omni quartana. Rec. corticum omnium myrob. bene gummosorum, agarici turbit, hieræ Rufini, ana unc. i. succi menthæ, succi eupatorij, succi absinthij, ana unc. s. laccæ, amyli, spicæ nard. marathri, ana drac. 3. cōficiantur cum oxymell. squil. & fiant pilulæ, & possunt exhiberi drac. 3. & plus & minus secundum conuenientiam paricolsarium. Utatur pollis paruis, & auibz campestribus, & piscibus squamosis, & ouis fortilibus, & extremitatibus porcorum, & arietum, & hædolorum, & utatur herdoato & auenato, & breuiter omnibus illis quæ sunt facilia digestionis, & quæ non crudificant materiam, nec ingrossant nec consipant, sed magis subtiliāt, & laxant, & aperiant. Diuersificantur ista secundum tempora morbi in quantitate & qualitate & ordine. Competunt igitur boragineæ, fœniculus, petroselin. brodiū cicerum, pruna matura, spinachia, betæ, crocus, & similia. Et Auicē. mirabiliter commendat uomitum & ante cibum & post.

Intelligendum quod fortī ægritudiui fortis competit medicina: & secundum hoc in quar-

tana medicamina fortia uidentur competere: & ideo intelligendum quod quoddam est medicamen forte ratione suæ quantitatis, sed non ratione suæ qualitatis, sicut oxymel squil. & hiera Rufini. Vnde in quartana nō competit in principio medicamen forte ratione quantitatis & qualitatis, quia resolueretur quod est subtile, & remaneret quod est grossum. Sed bene potest ex altera parte tantum, ut si est debilis qualitas, quod detur in bona puritate: & si est fortis qualitatis, quod detur in parua quantitate, & hoc in principio, & in fine utroque modo. Secundo posset aliquis dubitare, si melancholia possit putrefieri, cum repugnet putrefactioni utraq; sui qualitate. Dico, quod licet melancholia sit frigida, & sicca in uirtute, actualiter tamen est liquida & fluida: & cum hoc cum coarctatur supercale fit, & humectatur propter uapores retentos: & ita quando putrefit multum moratur, & ideo fluxerūt 48. horæ antequam duæ qualitates sint inuicem, cum materia est extra uasa. Tertio possumus dubitare, si phlegma aduritur, cum repugnet adustioni utraq; sui qualitate. Dico, quod aduritur: quoniam frigiditas & humiditas non est absoluta, & ideo potest calefieri & adurui: aduritur propter admissionem partium calidarum adustarum, sicut est cholera, &c. Quarto posset aliquis dubitare de afflitione & interpolatione breuiori seu longiori istarum feb. Dico breuiter, quod afflitione est longior uel breuior secundum quod materia est aptior resolutioni uel non resolutioni, & interpolatio est longior uel breuior, secundum quod materia resistit putrefactioni parum uel multum. Melancholia igitur longo tempore affligit, quia materia est grossa, & non est apta resolutioni, & multum interpolat: quia utraq; qualitate resistit putrefactioni. Phlegma autem multum affligit: quia materia est uiscosa, & non de facili resoluitur, & parum interpolat, quia humor est paratus ualde putrefactioni ratione humiditatis: & ideo aut non interpolat, aut est in falsa quiete. Cholera autem parum affligit, quia citissime resoluitur, & interpolatio sua est inter quartanam & quotidianam, cum tardè putrefiat ratione siccitatis. Quinto intelligendum, quod balnea competunt in quartana in fine, quantum est in ratione morbi, sed in principio gratia accidentium.

De febre phlegmatica. Cap. VII.

Quotidianæ est feb. de phlegmate putrefactio. Si autem putrefiat materia intra uasa, generat continuum: sed extra, interpolatam. Et si fuerit ex phlegmatibus frigidis, incipit cum frigiditate cogelante, postquam est phlegma uitreum. Est ex calore, tunc est magna titis,

& tunc est es phlegmate falso. In phlegmate autem naturali est modicus frigus, & modica sitis.

Causa huius feb. est otium & repletio nauseatus, & ideo libenter venit in hyeme, & in senne, & in puero, & humidis, & phlegmaticis, & piscatoribus, & mulieribus, & habentibus eruptiones acetosas, & habentibus catarrhum descendentem ad stomachum, & breuiter omnia illa quæ generant chimum phlegmaticum: & sicut alie febres generantur generaliter ex multitudine suarum specierum, ita & hæc.

Incipit enim quotidiana vera cum modica frigiditate extremitatum, & cum pulsu paruo & occulto: & cum venit ad statum, calor non est intensus, sed lentus & occultus, & pulsus est semper diuersus: & terminatur cum modico sudore, & urina in principio est remissa.

Febris enim phlegmatica de difficili eradicator propter multitudinem materie, grossiusque & viscositate, & sicut cholericæ raro inuenitur continua, ita phlegmatica interpolata. Clausio pororum est fortis, & humiditas multa, quare putrefactio ut plurimum continua. Si autem in principio paroxysmi uideamus uomitum spontaneum, & in fine sudorem plurimum, bonum signum est: quia ægritudinem breuem & salubrem significant: quoniam ex hoc significatur, quod materia non est multum grossa, nec viscosa, & pori non sunt nimis densi: ista enim febris libentissime uenit cum uiscitationibus multis, & aliquibus alienationibus, & cum quodam stupore, & parua siti, & tumore faciei & liuore, & de facili cadent in subeth, & sunt cum dolore stomachi continuo. Medicus igitur ut de eodiuscula habeatur, dicat aliquando aliquid de prædictis præteritis, aliquando de præsentibus, aliquando de futuris.

Curatio igitur erit secundum diuersitatem specierum: sed cognito simplici, satis de facili cognoscitur cõpositum: & curato morbo uero, satis de facili curatur morbus nothus: & ideo ad neram quotidianam principaliter intendamus. In quotidiana igitur de phlegmate vitreo multum ualet pifana cum modico piperis: & quia materia est multum frigida, ideo alia exhibeantur iuxta proportionem materie. In quotidiana autem de phlegmate falso mirabiliter ualet aqua dulcis potata quāntuncunq; calidior poterit, sicut dicemus capitulo de siti, propter phlegma falsum. nunquam potui inuenire remedium in phlegmate falsum diligenter & frequenter laborauerim, nisi in potu aquæ dulcis calidissimæ. Fiant igitur alia secundum qualitatis proportionem, quia non esset decoctum omnia particularia ruminare. Si autem quotidiana fuerit de phlegmate naturali, tunc oportet aduerrere. In primis igitur hic, & in quolibet morbo intendamus ad causam: quoniam si

causam ignorares, quomodo curares? Secundo ad morbum. propter hoc Gal. 5. de ingenio, Semper ante mentis aciem, ægritudinis cognitionem habeas. Tertia oportet aduerrere ad accidentia, propter molestationem quam inducunt. Tollamus igitur in primis causam quotidianæ, & omnium febrium putridarum, cum deoppilantibus, & poros subtiliantibus, & intus & extra. Fiant igitur fricationes circa uentrem, & latera, aliquando suauiter, aliquando fortiter, aliquando cum manibus, aliquando cum panis alperis, secundum diuersitatem particularium. Recip. aquæ dulcis lib. i. uini albi nnc. 3. acet. albi unc. 3. radicem apij unc. i. olei de chamomilla unc. i. & s. bulliant simul exinde uenter fricetur, & latera & dorsum, quonia est mirabile in deoppilando, & fiat frequenter, & multis uicibus, & sit semper calidum. Secundo ueniamus ad morbum: digeratur in primis materia cum hyssopo bullito in syrupo acetoso, & pergetur cum ista decoctione. Recip. florum borag. polypodij, turbith, agarici, anisi, marathri, ameos, vnarum passarum mundatarum ab arill. liquir. mundæ. ana unc. 4. fiat decoctio, & in decoctione temperentur cortices myrobal. chebul. unc. 1. fricentur, & colesentur, & detur in aurora. Secundo digeratur materia cum oxyfaccara composita, & cum oxymel. distret. & purgetur cum hierapi. Tercio digeratur sic. Recip. radicem sæn. petrosi. apij, brusci, asparagi, ana unc. i. hyssopi, unc. 2. capil. nenel. lib. 3. endi. scario. cichoræ, scolop. en. lactucarum nouellarum. ana nnc. 3. quatuor semi. frigidorum minorum, se. niol. se. brusci, se. asparagi, se. endi. se. scari. ana unc. 1. lacæ, spicæ nar. liquir. nari. ana unc. 1/2. mell. ro. & panis focæ. ana lib. i. fiat syrupus. Materia digesta purgetur cum istis pilulis: sunt enim tanti ualoris, quod nulla febris chronica audeat stare ante cõpsectum earum. Recip. turbith, unc. 1. agarici, aloes, rheubarb. corticum myroba. citri. chebulorum bene gummosorum. ana unc. 1. foliorum menthæ, foliorum abstinthij, & eupatorij. ana drach. 3. zingib. lacæ, anisi, malliches, piperis, spicæ nard. vuarum passa. mundatarum ab arillis, liquir. mundæ, ana drac. 1. conficiantur cum oxymel. squill. & fiant pilulæ. Ex istis autem potest uti à drac. 1. usque ad 3. & possint acui causa esula, aut diagrid. aut utroque, & dentur post unum mensem sue cõfectionis. Dosis autem sup exhibitionis addatur, aut diminuat, iuxta conuenientiam particulari. Purgatione facta in declinatione morbi possunt stuphari, & in stupha ponantur ea que in syrupo, sed in maiori quantitate præter saccharum, & mel cum multa aqua, & exenti deorsum sibi qualibet nice theriacæ probatæ drac. 1. & in ultimis potest balneari. Quādo au-

do autem in quotidiana videmus urinam multam coloratam & spissam, si fiat phlebotomia cum uirtute forti, non erit malum.

Viso de causa & morbo, uideamus de accedentibus. In principio igitur paroxyfmi ponatur extrema in aqua calida, ubi sint chamomilla, & melilotum, & prouocetur uomitus facilis cum decoctione raphani in aqua, aut hydromelli, aut syrupo acetoso, aut oxymelli diure. aut de tur bibi unc. s. succi mediani corticis sambuci. In fine autem paroxyfmi prouocetur sudor: ponatur igitur uesica xenea, plena aqua calida, iuxta plantas pedum, & aer domus sit temperatus. Si autem uomitus erat nimis, confortetur stomachus cum mētha & similibus. Si autē patitur stuporem, odoret styracem calamitā, & fiant fortes fricationes in extremitatibus.

Et quia stomachi dolor est continuus, emplastretur cum mentha & absinthio, & pane asso, & aqua ros. & rosas omnibus simul tritis. Si autem fuerit constitutus, fiat suppositorium aut clystere, & in clysteri prater communia ponatur succus betæ & hieræpic. Viso de his, uideamus de dieta: & quia parum interpolata, non possumus bene perfectē cibum ordinare. Nullus igitur detur cibus ante accessionē per quatuor horas, & cibetur in maiori tranquillitate feb. Cibus igitur qui competis, est brodiat cicerum, mica panis ter lota, & postea de tur cū brodio cicerū, detur hordeatum, auenatum, lac amygdal. pullæ parux cum lactucis, & petro. coctæ, & similia, & paulatim & gradatim post uniuersalem declinationem astendat ad fortiora, ita quod paulatinē ueniat ad consueta, sicut in omni morbo debet fieri.

Intelligendum, quod uomitus facilis in principio quotidianæ potest significare digestionē, & est ad bonum, non inquit digestionem completam, sed occultam, & pro tanto dicitur significare digestionem, quoniam magnam indigestionem non significat. Nam materia non est multum grossa, nec uiscosa, nec frigida, nec metus consiliciti. sed materia uidetur satis parata digestionī: aliter enim non ueniret in principio paroxyfmi cum uomitu facili & spontaneo, & in fine esset sudor &c. Hoc ualde bonū est, quoniam totus paroxyfmius alleviatur, cū materia antecedens minoratur. Et potest esse, suo modo loquendi, quādam crisiū particularis, & est materia digesta suo modo, intantum quod obediens est uirtuti expulsiuæ: pro curretur igitur uomitus cum facilitate in omni feb. interpolata in principio paroxyfmi.

Secundo aduertendum, quoniam licet in febre phlegmatica debeat esse sudor multus, postquam materia est humida: nihilominus modicus sudor est in fine paroxyfmi, imò est differentia cōstitutiuā secundum intentionem Gal.

in de differentiis febrium. Et ratio huius est, quoniam phlegma naturale est frigidum, grossum & uiscosum, ideo materia non est apta ut couertatur in sudorem. Si ergo aliquando conuertatur, signum est remissionis eorum que dicta sunt, & ideo bonum. Tertio considerandum, quare urina à principio est tenuis, licet materia sit humida & multa, est pro tanto, quia est materia indigesta, & meatus sunt oppilati, & materia est grossa, & non est habilis ad expulsiōnem: sed cum incipit digeri, & natura incipit prauallere, inspiratur, & ideo significatur principium digestionis, licet occultum. Quarto intelligendum quod in quotidiana de phlegmate salso aut dulci, est sitis, in alijs autem non est. Vbi notandum, quantum est de presenti, quod in omni quotidiana cōpetit uinum, cum materia sit grossa & uiscosa, quæcunque fuerit, licet secundum plus & minus grossior: tamen oportet quod uinum sit debile, & cum multitudine aquæ, & quod detur post cibum, siue in mensa loco potus, cum habeat digerere, confortare, subulare, & non potest feb. intendere, quia feb. de se non est multum intensa, & cum hoc uinum est debile, & cum multa quantitate aquæ: & licet digerat, non tamen debet ante cibum administrari: quia cum sit penetratiuum, timendum est de lēione neruorum, & mentis. Sexto aduertendum, quod licet materia sit grossa, & ita parata euacuacioni inferiorum, tamen quia particula patiens est stomachus, & ut plurimū materia in stomacho continetur, & quod est in stomacho, facilius per uomitū euacuatur: igitur in principio paroxyfmi laudabilior est uomitus, quā feces. Septimo declarandum est, quod balneum aquæ dulcis competit in declinatione uera totius morbi ad mundificandum, in alijs tēporibus nō: quoniam nimis humectaret, & materia est humida, & cum hoc est uiscosa, & non dissolue retur per balneum. Et iuxta hoc uideudum quoniam aqua bullita in uia potus est melior: quoniam in ebullitione rarificantur partes aquæ, & ita partes terrestres cadunt ad fundum, & postea colatur, & est ita melior in omni feb. quæcunque fuerit aqua. Octauo declarandum, quod panis fermentatus, & cum moderata quantitate salis, melior est secundum Gale. in de cibis, quia frumentū est multum uiscosum. Si igitur talis panis est melior quā quicunque alter panis: & talis panis erit melior, si molitur in aqua, quæ quidem aqua debet exhiberi ut potus: nec sal retinet naturam salis: ideo enim intrauit compositionem sicut aqua, & iuuabit aquam ad penetrandum, nec habet acumen de quo sit curandum.

Nono intelligendum, quod humores mouentur in diuersis horis, & ratione radices superioris, & inferioris sanguis enim mouetur de ma-

ne sequens motum solis ratione conformitatis, & ipse est in oriente, ratione autem radiis inferioris: quoniam natura generavit de nocte ratione formi sanguinem multum: natura igitur sagax movet eum in ista hora post sui generationem, ut à fumositatebus non immundetur. Choletica autem movetur in tertiis sequens quadram calidam, & sicca ratione conformitatis, & ratione inferiorum, ut sanguinem non iusticiat. Melancholica movetur post in nonis sequens quadram frigidam & siccam, & ratione inferiorum, ut sanguis ratione motu sequentetur, & purgetur à superfluitatibus melancholicis. Phlegma autem in vespertis, sequens quadram frigidam & humidam, & ratione inferiorum, natura sagax, cuius sagacitati non est finis si cundum Gale. in de criticis, ut purgentur superfluitates suae, & sanguis remaneat mundus & purus, & ita de sequentibus intelligendum erit. Decimo intelligendum, quod humores grossi magis moventur de nocte propter calorem fortiozem, & quia fortiori motore indigent, ideo tunc moventur: subtiles autem de die, ratione conformitatis, &c.

De febribus compositis ut de septena, &c.

Cap. VIII.

Postquam actum est de febribus simplicibus, hic agitur de compositis: & inveniuntur quinque species febrium compositarum, quantum est de praesentis quarum prima appellatur septena, sexta, & ita de aliis: secunda vocatur erratica: tertia vocatur epiala: quarta caustionides: quinta hemitritica. Brevisiter & in summa intelligendum est, quod phlegma & melancholia componitur ad iuicem, & faciunt feb. compositam. Haec autem compositio fit aliquando ex phlegmate vitreo, aliquando ex acetoso, & ita de aliis. Ex secundum diversitatem compositionum, aliquando interpolat plura, aliquando minus: affligunt igitur aliquando de festo in sextum, aliquando de septimo in seprimum, aliquando de novo in nonum. Aliquando movetur materia de mense in mensem, aliquando de anno in annum: & quia curantur sicut suae relatiuae, ideo non plus dico. Erratica autem feb. causatur ex multis humoribus in diversis locis putrefactis & adultis: & quando simul conveniunt, generatur feb. quartana, secundum Hippo. potissimum nersus autumni in se autem non errat, sed quilibet sequitur morum suae matris. Nobis autem videtur, propter diversitatem suorum paroxysmorum, ad modum planetarum. Curantur autem compositae secundum naturam suorum simplicium. Febris autem epiala causatur ex phlegmate vitreo, cuius una pars putrefcit intra vasa, & cale-

facit interiora: alia autem pars, quae non est putrefacta, dissolvitur & in frigidat exteriora. Eodem versu est in hipparia, unde versus,

Semper in epiala calefactus interiora,

Exteriora frigens, hipparia vertitur illi.

Aliqui tamen nolunt quoddam aliquando hae compositio fit ex cholera, curatur autem sicut suae simplicia. Causae autem feb. caustionides ex sanguine & cholera putrefactis intra vasa: & si mistio sit aequalis, appellatur caustion synochica: & si cholera in plus, causatur synochides: & si sanguis in plus, synochus causatur: & curatur sicut suae relatiuae.

Hemitritica est feb. composita ex continua, & interpolata: & compositiones possunt esse multae valde: omnes tamen possunt reduci ad tres species tanquam ad magis notas. Causatur igitur prima species hemitritica ex quotidiana continua, & tertiana interpolata. Et secunda species ex tertiana continua, & quotidiana interpolata. Tertia autem species causatur ex quartana continua, & tertiana interpolata, unde versus.

Maiores hemitriticae in venis phlegma recondit,

Exteriora coleram medius committitur illi,

Pessimus humoris inest in venis, sed coquit extra.

Et quia omnes istae species raro accidunt, cum accidunt, curantur curatione simplicium, ideo nolo plus materiam dilatare.

De hectica febre.

Cap. IX.

Hectica febris continua, & uniformis, sine humoris vitio, cuius subiectum est cor, & membra solida. Intelligendum est, quod duplex est hectica: quaedam est cum feb. & quaedam sine feb. & appellatur hectica senectutaria, ita quod siccitas est multum intensa, & caliditas est aequalis, vel quasi aequalis, & frigiditas, ita quod ista duo non multum excedunt. Aliquando autem frigiditas, & siccitas multum excedunt, sicut in senibus, ita etiam quod aliquando accidit talis hectica senectutaria in iuuenibus aut pueris. Hectica autem cum feb. habet tres species. Prima est, cum consumitur humiditas cordis, & membrorum rorantis, & est similis oleo in lampade. Secunda est, cum consumitur cambium, & est simile de oleo in ellychnio. Tertia species est, cum consumitur glutinum, & est simile de humiditate substantiae ipsi ellychnio.

Causae autem febris hecticae sunt omnia illa quae calefaciunt, & desiccant, & inflamant cor, & membra solida: & ideo provenit aliquando febris hectica ex febribus praecedentibus, sicut ephemeris, & causae, & similibus, & potissimum quando praecipitur eis abstinencia in non suo loco, & quando aufertur potus aquae frigidae, ubi deberet dari tales enim de facili consumuntur,

tior, potissimè calidi, & sicci, & extenuati, quia pingues & carnosì non de facili neniunt ad talem consumptionem. Venit & hœtica sine febre præcedente, sicut ex nimia tristitia, & angustia & ira, & labore, & fatigatione cordis & animæ & ex carcere, & ex omnibus illis breuiter quæ corpus catenuant. Et neniit etiam propter uitia hepatis, & cordis, & pulmonis, & pectoria sicut in phthisi & empyemate.

Signum enim feb. hœticæ est quando maior calor est in arteriis, quam locis nicipinis: quando igitur feb. est æqualis & uniformis, & nulla cadit in eo diuersitas, quantum est de ratione sui, nec in prima die, nec secunda, nec tertia, & cutis nergit ad quãdam ariditatem, tunc est signum quod iam est in prima specie. Prima autè species secundò Auic. est difficilis cognitio, & facili curat oris. Et ratio dictorū est, quia primà species est, uel potest esse sine siccitate, sicut declarat Galienus de differentiis feb. In secunda specie hœticæ apparet siccitas notabilis, & cū hoc quacunque hora cibatur, magis inflammatur, & pulsus uelocitatur, sicut apparet in calce uirga cum aspergiunt aqua. In tertia autem specie sunt oculi concaui, & cutis tensa, & uenter adheret dorso, & pulsus est debilis, uacuus, & durus ad modum chordæ tensæ, & urina est siccut oleum, & si cadat super lapidem, raurè sonat. Signum autem hœticæ senectutis, est pulsus paruus & tardus, & urina tenuis & remissa. Prima enim species de facili curatur: tertia autem nullo modo nisi Deus bene uellet: quoniam sicut in ellybino est propria, & substantialis humiditas consumpta, quantumcunque olei apponatur, nunquā postea restificabitur: ita nec in hac tertia specie, quia substantiales humiditates corpora & membrorum consumptæ sunt, uel uicinas consumptis. Media autem medio modo se habet, ita quod si curatur, cū magna difficultate curatur. Quando autè ungues curuantur, tunc est in statu: quando autem capilli cadunt, iam nicipiantur morti: & si uenerit fluxus uentriculi, iam est proxima: hoc enim apertissimè deicit nocumentum eorum: quando autem tibiz incipiunt inflari, iam ulterius uinere non potest, imò ut plurimum infra tres dies moritur. Et patientes hœticam non bene discernunt de calore, quia mala complexio diuersa facta est æqualis, & non sentitur. Et quando feb. hœtica componitur cum putrida, est difficilia curationis.

Si hœtica nenerit ex calefactione hepatis uel ex apostematibus & similibus, curentur illa prius. In hœtica igitur competunt frigida & humida, non solum frigida aut nimis frigida, quia debescant, sicut dicit Auicenna. nec humida cum calidis, quia nimia calefacerent. & exemplificat Auicenna in nino, frigida & humida simul competunt, sicut est pituita saccharata. Et compe-

nit etiam lac unde extractum est butyrum. Lac igitur conuenit philosophis secundum Gale. 10. de ingenio, dum tamen febris putrida non sit admixta, unde lac quod magis competit, est lac mulieris, postea asinæ, deinde caprarum, postea nectarum. Lac autem quantum possibile, sumatur ab ubere: & si non est possibile, habeatur uas plenum aqua calida, & aliud uas uacuum ablutum cum aqua calida. Desuper apponatur, & ibidem colligatur, & uelociter hauriatur: quia lac citissime corrumpitur, sicut & semē. Et si timemus corruptionem lactis in stomacho, bulliat una inundatione, & ponatur in eo modicum aquæ, & modicum salis & mellis, & calculi fluuiales candētes, aut frustuli chalybis. Et ideo propter uelocitatem eius corruptionem cū magna cautela fumatur. Balnea etiam cōpetunt: ponatur igitur in tina bis in die, cibo digesto in stomacho, & aqua non sit multum calida, sed parum plusquam tepida: & non sudet ibi, nec diu stet, nec inungatur do, nec in exitu, & subito aqua frigida uel quasi frigida aspergatur: quoniam balneum aquæ calidæ, nisi sequatur frigida, nihil ualet, secundum Gal. nec aqua frigida competit, nisi calida præcesserit. Et qui illa duo, scilicet lac & balnea, diligenter fecerit, inueniet magnam iuuamentum, et animalia bonis pascuis debent nōtriri uergentibus ad siccitatem, sicut diximus capitulo de phthisi. Canceri fluuiales multum competunt, sed extrema debent abijci, et residuum fortiter lauare cum lixiuio facto de cineribus uitinæ, donec grauitas odoris recesserit, et postea fumantur. Hnrdeatum, anenatum et amygdum competunt, si coquantur cum lacte naccino, butyro remoto. Mica panis tritici abluta in multa aqua frigida, dulci, et postea mista cum lacte, multum ualet. Pisces squamosi de aquis mundis ualent. Et oua sorbilia, et brodiū carnum cōpetunt, et etiam carnes nolatilium omnium usualium, non tamē egentium in aquis, et coquantur in multa aqua cū hordeo et coriandro recenti et lactu, aut cū fructibus frigidis, sicut sunt melones, et consimiles. Vinū clarum subtile cū multa aqua cōpetit eis. Inungatur pectus cū isto unguento. Reci. medullæ cerui, et nitri, et butyri sine sale, æxingiæ gallinæ, æxingiæ porcine recentis, dragaganti, gnommi arabici insusorū, olei nenuph. olei uiol. olei de cucurbitis, olei de salicibus. ana drac. 1. ceræ quantum suff. & fiat unguentum. Item utatur isto electuario. Reci. puluerē receptorū istorū electuariorū, diapapaueris, diadra. frigidid, diapeni. sine cinamo mo, electuarij resumptini. añ. unc. 2. carniū testudinū bene præparatarū lib. 2. pulueris receptorū triasand. conseru. roset uiol. añ. unc. 1. panis zuec. quarū sufficit, fiat electuarium. Item utatur isto. Symplo. Recip. 4. se. frig. munda. & non munda. maiorum & minorum,

borum,

norum, sc. papaueris al. pinearum, pistacea-
sum, amygd. dul. iuiubz, febebz, caſſacarum,
umarum pal. munda. ab arill. liquiri, munda
succius, hordei munda. ana. unc. 1. florum
menſ. florum viol. ana. lib. s. panis. zuccz.
quantum ſufficit, & coadiatur cum aqua fon-
tis, & iuxta ignem lentiffimum. Et ſi feb. putri-
da eſſet admiſſa, poſſunt cum iſtis addiendi.
ſcari. lactu. ciccorez, & ſimilia. Et quod pur-
garetur parum cum caſſiaſſ. & ſimilibus. In
hectica autem ſenectutis competit lac, & mel,
& brodium carniū: mel autem in hectica, cū
feb. eſt, multum nocivum. Si autem eſſet in he-
ctica feb. fluxus uentris, detur lac coctum cum
lapidibus fluuiatilibus candentibus iniectis, aut
milio torrefacto, aut leuete excoctat & elixa-
te, aut ſe. citoniorum, aut ſumach, aut myrti-
li. De clarificatione huius materiæ ex uſo. me.
quia aliquid diximus in lib. de differentiis feb.
Gal. & ſupra 10. de ingenio.

De febribus peſtilentialibus. Cap. X.

Febres peſtilentiales ſunt illæ quæ adueniūt
in temporibus corruptis & ſterilibus: cum cor-
rumpuntur fegetes, & aer, & aqua.

Intelligendum eſt, quod quedam ægritu-
tudinē, quæ appellatur uariæ & diuerſæ, quæ
proveniunt ex inepta adminiſtratione ſex re-
rum non naturalium: & iſte ſunt communes
omnibus, & ſunt quedam ægritudines regio-
nales, ſicut phthiſis, & empyema in montibus,
& fluxus uentris & hydropiſis in uallibus. Et in
quibuſdam regionibus ſunt quedam arbores,
quarum fructus ſi comedantur, generant à pro-
prietate bocium golæ, & in quibuſdam à pro-
prietate aquarum generatur oppilatio ſplenis
& hepatis, & ita ſædus color. Et ſunt quedam
ægritudines quæ appellantur epidimiales ſeu
peſtilentiales: & ſunt illæ quæ generantur in
temporibus corruptis: & omnes tales ægritu-
dines ſunt peſſimæ, & malæ terminationis, pro-
pter læſionem membrorum principalem in ra-
dice. Corruptuntur autem ipſæ cauſatiue ſiue
effectiue à ſuperioribus, aut ab inferioribus:
quoniam licet aer & aqua & corpora ſimplicia
non corrumpantur in naturis ſuis in quantum
huiusmodi, corrumpuntur tamen ratione ua-
porum corruptorum, admiſtorum: & iſtis cor-
ruptis, corrumpuntur animalia, & fegetes, &
fructus, & item de aliis: & ita corrumpuntur cor-
pora humana, quia aer corruptus uadit ad eor,
& ambi totum corpus, nutritur ex cibis & po-
ribus corruptis. Reſoluuntur igitur uapores
ex uirtute ſtellarum, & portantur ad uentis ad
magnam diſtantiā, cum ſtrages magna fuerit
in aliqua parte mundi, & ſecundum diuerſita-
tem corporum, diuerſæ febres generantur, in

aliquibus ſanguineæ, in aliquibus cholericæ, &
ita de aliis, ſecundum diuerſitatem diſpoſitio-
nis: & aliqui etiam non læduntur, & aliqui
euadunt, & aliqui moriuntur, cum agat agenda
ſecundum diſpoſitionem materiæ.

Signorum quedam ſunt communia, quedā
febris propria. Signa autem peſtilentiæ ſu-
turæ, cum apparet ſtella comata, candela ro-
tunda & aſumpta: & cum modo eſt calor, mo-
do frigus, & iterum modo calor, modo fri-
gus, ſiue in eodem die ſiue in multis. Et cum
aer eſt caliginofus, ſpiſſus, & uidetur quod do-
beat pluuere, & non pluit: & cum æſtas eſt calia
& hum. & cum aues dimittere nidōs & oua: &
cum reptilia multa apparent ſupra terram: iſta
quippe ſunt ſigna epidimicæ futuræ. Propria au-
tem ſigna in febribus, ſcilicet quod feb. ſit peſti-
lentialis, eſt quod calor eſt lentus extra & in-
tus fortis, enim ſiti & ariditate linguæ, & cum
malitia tolerandi ægritudinē, & difficili anhe-
litur, & dolor præcordiorum, & ſector omniū
eorum quæ egrediunt à corpore, ſicut eſt anho-
lis, ſudor, egeſtio & urina.

Omnes ſunt malæ terminationis, & cum ter-
ribilibus accidentibus, & fraudulentis, ad quas
conſueuerunt ſequi uariolæ & morbilli, & ægri-
tudines uenenolæ, & ut plurimū deludent me-
dicos: quoniam urine uidentur laudabiles &
hypotaſteatæ, & non ex materia morbi, ſed ci-
bis: quia natura non audet morbum inuadere
propter malitiam morbi eui: & cum expecta-
tur criſis ad bonum, tunc uenit mors. Adnota-
mus igitur, diligenter, quod acutorum morbo-
rum non omnino certæ pronuntiationes ſiunt
neque uitæ neque mortis.

Præſeruari poſſumus à peſtilentiā, ſi tempus
eſt frigidum, odorando muſcum, & liguon
aloes, & garioſi. & ſtyracem, calamitam, & am-
bram, & ſimilia aromatica, ſeu comedendo;
ſeu odorando. Et ſi tempus eſt calidum, quod
ſit cum aromaticis frigidis, ſicut ſandalis & ro-
ſæ, & camphora, & acetofixas citri. Cura uo au-
tem poteſt talis eſſe in feb. quia rectificatur aer
iuxta temporum naturas, inſtigidando in æſta-
te cum ſolis ſalicis, & cannarum, & uitæ albe,
cucurbitarum, & cum multitudine aque frigida-
e, & acetii, & aque roſ. & ſimilibus. Odores igitur
camphoræ, roſas, ſandalos, & nenuphar.
omnia acetofa competunt, ſicut eſt lac acetofum,
& herba acetofa, & mala grana, & ſaccus
uix acerbæ, & acetofitas citri. & limonium, &
citragru. & acetum. Et uideatur uniuerſaliter
repletio cibi & potus, & in tempore peſtilen-
tiali coitus uniuerſaliter debet uitari. Si autem
ægritudo fuerit ſanguinea, ſit phlebotomia
cum conuenientia aliorum particularium. Et
ſi cholonica, digeratur materia, & euacuetur ſi-
cut decet, et ita de alijs. Poteſt igitur fieri talis
ſyru.

syru. Recip. succi borag. succi buglossæ, succi scario. ana lib. 1. ros. florum nenuph. ana unc. 1. sandal. muscatell. drach. 3. campho. drac. 2. acet. al. unc. 4. conficiantur omnia cum aqua ros. optima, pauis zucca. lib. 1. fiant syru. quartaria quinq; & clarificentur. Item uratur isto electuario. Recip. zucc. ros. trifand. diadrag. frig. ana unc. 4. pannorum auri puri. 20. margaritarum hyacinthorum, ovis de corde cerui. ana drach. 1. misceantur. Si autem in frigidarentur extrema, fiant frictiones fortes in extremitatibus, incipiendo ab interioribus, & trahendo versus exteriora: & si esset debilitas appetitus, confortetur eum aromaticis & acetosis. Clarificatio habet locum in primo regiminis acutorum.

De sudore.

Cap. XI.

Sudor est vapor humidus ab interioribus corporis resolutus, & iuxta corporis superficiem condensatus.

Causa sudoris, est omne illud, quod materiam resoluat in uaporem: & pro tanto intelligendum, quod duplex est vapor: quidam siccus, & iste est materia capillorum, sicut dicitur inferius: & est alter humidus, & est materia sudoris. Et ideo sudor provenit aliquando ab exterioribus, sicut est calor Solis aut ignis, aut ex vento meridionali, aut labore nimio, siue animali, siue corporali, aut propter nimias coperturas, aut propter balnea, aut similia. Aliquando provenit ab interioribus, ratione caloris dissolutis. Et ex hoc elicitur, quod quidam est sudor naturalis, & est ille qui fit ex bonitate virtutis regitiæ, qui est semper cum alleviatione, & bona tolerantia. Et est sudor innaturalis, qui fit à re non naturali cum aggravatione, & mala tolerantia:

Signorum quedam sumuntur à parte quantitatis, & quedam à parte sue qualitatit: à parte quantitatis quidam est multus, & quidam parvus: multus sudor fit nel à parte efficientis resolutiva fortiter: vel quia materia multa, aquosa, subtilis, calida, & porosa, humida: nel quia pori rari: nel quia contentiva debilis, & expulsiua fortis. Parvus sudor provenit, aut quia resoluens est debile, aut materia pauca, & pori densi, & contentiva fortis, & expulsiua debilis. Et ita uenimus in naturam sudoris ex parte sue quantitatis. Et ita uenimus etiam in cognitionē ex parte sue qualitatit, & hoc multiplicit. A parte coloris, primo, quia si panni intincti in sudore nergant ad rubedinem, signum sanguinis est: si ad citrinitatem, signum est cholera: si ad albedinem, signum est phlegmatis: si ad nigredinem nel liuorem, signum est melancholæ. Et sumitur signum ex odore, quia grauis & fonsidus significat corruptio-

nem. Et sumitur ex sapore, quia aliquando cadit una gutta mollis, & propterea sentit dulcedinem, & ita supra sanguinem: & aliquando sentit amaritudinem, & ita supra cholera: & aliquando salsedinem, & ita supra phlegma salum, & ita de alija.

Omnis sudor qui uenit post signum digestionis in die critica, & fit in toto corpore, & cum alleviatione, bonus: & si quæcunque estiarum conditionum deficiat, semper malus, & ideo in principio morbi semper malus, quia materia non est digesta: uenit igitur ut symptomaticus, non ut naturalis, iuxta illud, Nulla secundum naturam in principio bona est euacuatio. Debet igitur apparere post signa completæ digestionis, & hoc est in fine status. Et ideo in aliquo tempore morbi non est salubris, nisi in fine status: quia in declinatione uirtutem deijcit: quoniam crisis non fit in declinatione, sed in nequiore horarum, si fuerit crisis uera cum omnibus suis conditionibus, quod fit scilicet certa, salua, completa & indicata. Secunda conditio etiam est necessaria, quod sit in die critica: quoniam in omni bona erit si secundum Gale. concurrat radix superior, & ideo oportet quod sit in die critica, ubi natura expectat beneficium orbis, quoniam crisis fit semper in fine quadæ aut semiquadæ: & si ista non sint quo ad lunam, sunt tamen quantum ad signum Zodiaci. Tertia conditio est necessaria, quod sit in toto corpore, quia ex hoc fortitudo uirtutis significatur potens expellere ad omnes diametros: & ideo si in una parte tantum fuerit, debilitas uirtutis significatur, siue fuerit calidus, siue frigidus, siue intercisus, siue continuus. Et ideo sudor calidus in capite tantum in febris, continuus malum, & frigidus mortem significat, si feb. sit acuta: si lenta, proximitatem ægritudinis significat. Sudor autem confurgit plus ex loco ubi est minera, iuxta illud, Vbi sudor, ibi est ægritudo. Sudor qui modo uenit, & modo non, est malus: sudor cum debilitate pulsus, est malus. Quarta etiam conditio est necessaria, scilicet quod sit cum alleviatione: quoniam dato quod omnia particulatim conueniant, & patiens non poterit tolerare, sudor esset malus: & ideo sudor inuicem salter cum debilitate uirtutis est malus. Breuiter igitur de sudore per hunc modum poterimus prognosticare.

Aut enim intendimus sudorem prouocare aut auferre: si auferre, tunc intelligendum, quod nulla euacuatio naturalis, siue innaturalis debet auferri uique uersus tertiam diem, si uirtus possit tolerare: timendum enim esset, quod iret ad eor & membra nobilia: paulatim igitur abscindatur: remoueantur igitur panni, & euentetur cum stibellis, & citò desinet: aut aspergatur aqua frigida in facie, aut aceto & aqua ros.

rof. aut iungatur pectus cum oleis frigidis: sicut oleum rosa. & salcis, & nensaris, & similibus: aut emplastrum cum sandalis & camphora, & similibus. Et uidetur mihi, quod facile sit auferre sudorem solum cum stibellis, nisi forte esset syncopalis, & tunc oportet fugere. Si autem uolumus prouocare, aut est feb. aut non: si non est feb. iungatur cum arogon, marclaton, agrippa, & dialihza, & fiat stupha, & coopertimenta, & ignis, & similia. Si cum feb. accipe chamomillam, & melilotum, & semina frigida, & ponantur in sacculo, deinde in aqua cal. & exprimantur, & lateribus applicentur: aut fiat suffumigatio cum his: aut uelica znea plena aqua calida, in extremis apponatur, & similia.

Intelligendum est, quod postquam de feb. sub quodam copendio terminatum est, & feb. plurimum terminatur per sudorem, ideo uero nos sciremos quid sudor utilis, capitulum de sudore fuit hic appositum. Et ideo intelligendum auctoritate Dioclis, sicut narrat Gal. supra illum aphorism. Venit hyeme & vere. Quia omnis sudor est præter naturam, aut ex parte efficiens, aut ex parte materiz, aut alicuius particularis. Si enim uirtus esset fortis, & materia obediens, & pori, & aer, & alia particularia in debita proportione, aut euaporaret materiam insensibiliter: quod igitur apparet sudor alicuius, repugnat resolutioni insensibiliter: & ideo omnis sudor aliquo modo præter naturam uidetur: nihilominus eum comparando ad morbum, quia uirtus præualeat, & purgatur materia morbi, & alleuiatur passio, ideo dicitur naturalis, & bonus. Alter est innaturalis & symptomatikus, & ideo malus, sicut præcedens bonus. Secundo intelligendum, quod sudor materialiter ex secunda prouenit digestionem, effectiue autem ex tertia, quoniam uapores contenti in porositate membrorum expelluntur, & ita sudor potest esse superfinitas secunda & certæ digestionis, iuxta diuersos modos loquendi & intelligendi: Tercio intelligendum, quod si sudor ueniat ex causis intrinsecis, commouet ut plurimum magis uenit in nocte, & magis in hyeme, & magis dormiendo. Si autem ex causis extrinsecis, magis uenit in nigilij, & in æstate, & in die. De pinguibus & macilentis est intelligendum quod pingues magis sudant, uisi humorum grossities, & pororum densitas impedit, & etiam magis uenit in anteriori parte corporis, quam posteriori, cum pars illa sit calidior & rarior, & magis in motu, quam in quiete. Quarto notandum, quod si medicus uideat uersus finem status naturam negligentem & sopitam, & non potest expellere per sudorem, quod tunc est sudor prouocandus cum temperamento: excitanda igitur est natura, cum medicus sit minister eius. Quinto notandum, quod

in continui sudor est maior, quam in interpositis, considerando unicum sudorem tantum: sed si consideremus sudorem omnium periodorum, maior est in interpositis quia hic pluries, alibi autem non. Sexto aduertendum, quod si uolumus prouocare sudorem, abstergamus sudorem: & ita præcipiebant Gale, quoniam quando sudor moratur, & non abstergitur, oppilat poros & claudit, & ita temperata absterlio sudoris sine euentatione prouocat sudorem. Sanius autem semper debet abstergi, quia membra corrumpet.

De uariolis, seu pustulis, quæ dicuntur Græcè exanthemata. Cap. XII.

Variolæ & morbilli sunt quasi quædam apostemata seu pustulæ parue ferè supra totam carnem appatentes, de genere infectionum, & corruptionis sanguinis & humorum: ita quod uariola generatur magis de sanguine, & morbillus magis de cholesta.

Ista passio generatur ex sanguine menstruato retento in porositate membrorum factus: & natura fortificata expellit, & mundificat corpus infantia, aut pueritia, aut adolefcentia: raro autem in iuuentute, rarissime autem in senectute, & iste modus euacuandi est communis omnibus. Accidentaliter autem uenit ex aliis causis, ut si aliqua esset generatus in tempore menstruum, & iste modus est ualde malus: quia tales sic generati, raro effugunt lepram aut aliam quam terribilem ægritudinem. Generatur etiam ista passio ex malo regimine, & potissime cum utuntur cibis de facili, & cito corruptilibus: sicut est lac, & pisces in eadem mensa, & potissime cal. & hum. negligentibus phlebotomia. Quarto generatur ista passio in temporibus corruptis, & pestilentiis aëbus. Quinto conueniunt qui malas crises febris sanguineæ. Quæque igitur possunt esse causæ, & quatuor sunt eius species: quoniam quædam sunt de sanguine, quædam de cholera, & quædam de melan- cholia, quædam de phlegmate.

Signorum quædam sunt quæ prædicant uariolas futuras, sicut est pruritus narium, apparitio lampadum, timor in somno, rubedo in facie, pruritus ueniens in toto corpore: & cum incipiunt apparere, sunt sicut capita acuum, aut sicut grauium milij, aut sicut caput formicæ: deinde incipiunt multiplicari & magnificari, deinde faciunt crustam et sanem, deinde desiccantur et cadunt: Et si fuerint ex sanguine, uerget ad rubedinem: & si ex chol. ad citrinitatem: & ex phlegmate, ad albedinem: & si ex melan- cholia, ad quendam fuscenedinem & terre streitatem.

Si fuerint paucæ, & cito apparentes, & quod cito maturarentur, signum est bonæ crisi: quia quali

quasi per modum crisis eueniunt. Si autem nergant ad colorem uiol. aut liuidum, aut viridē, aut nigrum, omnes pessimæ & mortales. Si autem appareat sanies foetulenta, mortalr. Si modo appareant, & modo occultentur, pessimum est. Si autem fuerit difficilis anhelitus, pessimum: si autem fuerit cum debilitate anhelitus, & alleviatione feb. bonum est. Si autem in uariolis febr. fuerit fortis, & angustia magna, & sitis uehemens, & nritus debilis, & anhelitus constrictus, signū est mortis proximæ: ut plurimum enim moriuntur suffocati. Si superuenerit syncope, pessimum est. Et si urina fuerit nigra aut uiridis, ista sunt pessima & mortalia: fluxus enim nentris in uariolis est malus.

In primis si corpus est plethoricū, aut si sanguis dominatur, aut nritus est fortis. fiat phlebotomia de media, postea de summitate nasi. Cauendum est in hoc morbo, quod non ponantur percussio, quia materia repercutere tur ad membra nobilia, nisi in oculis, propter nobilitatem eorum. Secundo nerō aduertendum, quod cum oleis non iungantur. Tertio, quia frigida ab estra non applicantur: nec aer si ita frigidus, quod pori possint claudiri: nec de tur aqua frigida: & caueantur ea quæ infrigida ta sunt in nritu, aut in puteo. Omnia acetosa uidentur competere secundum Auic. & pro tanto competit succus acetosæ, succus malt grana ti, & succus nux acerbe, & succus citrangulo rum, & succus omnium fructuum acetosorum, & competit coriandrum, & nenufar, & campho ra, & sandali, & similia. Cibuseorum sit hordea cum, auenatum, amygdum, uua passa munda, caricæ, iuiubæ, sebesten, lentes coctæ in duabus aquis, & postea coquantur in alia aqua. Si igitur fuerit materia sanguinea, digeratur materia cum osyascara in plus, & syrupo uioui in minus, & syrupo de fumo terræ. Et si cholericæ, cū syrupo uinlin plus, & osyascara in minus, & syrupo de fumo terræ. Et si materia fuerit phlegmatica, cum osyascara composita, & syrupo de fumo terræ. Et si materia fuerit melancholica, cū oxymelli diure. & syrupo de borag. & fumo terræ. Et aduertendum in laxatiuis & mundificatiuis, quod sint multum debilia, si exhibeantur: quia ista ægrotudo libenter concordat cum fluxu nentris, & hoc est quod multum abhorremus: deinde inuoluatur totum corpus in panno rub. De inde fiant ista, ne trahatur materia ad exteriora. Recip. apij, fœnic, ana fasciculum 1. decoquantur in aqua cum lentulis multia: & cum tepidum fuerit, linteamen incingatur in illa aqua, & exprimatur, & patientes inuoluatur. Cum uerō maturantur, perforentur acu de auro, deinde totum corpus isto puluere aspergatur. Reci. farinæ fabarum, cicerum, lentium, lupinorum, orobi, lithargyri, cerusæ, aloë, fiat

pul. iste enim puluis desiccat & cicatrizat, & carne regenerat, & si fieret culcitra ex istis pulueribus, bonum esset. Ad custodiā oculorum, Recip. coriand. fumach, aquæ rosæ. albuminis ouorum, fiat collyrium, & frequenter oculis instilletur. Ad custodiā narium iungatur cum agrestia, & aceto, & aqua rosæ. Ad custodiā gutturis, gargarizetur frequenter uinum mororum cum aqua hordei cal. Ad custodiā pulmonis utatur diapa. Ad custodiā intestinorum, utatur trochiscis factis de samach, & corrian. & spodio conditis cum succo acetosæ. Ad remouendum mala uestigia, quæ in facie post uariolas remanserunt. Recip. lithargyri, cerusæ lotæ, cathimix lotæ, pulueris cannarum adustarū, pulueris cōchularū marinarum, & cū oleo de lilio, & cera quantū sufficit, fiat unguentum.

Si dubitaret aliquis de caricis, quomodo cōpetunt, postquā uergunt ad ca. & homi. Dico medica men bonum cōsuevit fieri de caricis, & de dragagathō in infuso, lacca & sem. fœni. & croco, & lentibus excoctis, istis simul coctis & tritis, & simul pistatis & cōfectis. Istud enim medicamen ualet in principio, & cōfortat nrituē & facit ad expulsiōem: ibi enim sunt caricæ & dragaganthū propter pectus alleuiandū, ad præcauendum stricturam pectoris, quæ libenter uenit in ista passione, & ibi ponatur sem. fœni. ad sperindum & ad subiliandum, & lacca ad remouendū oppilationē hepatis, & crocus ad cōfortandū cor. Et propter hoc uetnæ ex quodam instinctu nature quocidie dant in tali casu aquam, ubi est crocus, & lentes, ad confortandū intestina. Pater igitur quod talis mistio est utilis. Valēt igitur caricæ propter nias anhelitus conseruandas, & ad multa alia. Secundo posset aliquis dubitare, quare non competit fluxus nentris, postquā per illas partes sit fluxus criticus, & cum hoc illa membra sunt apta ad recipiendum superfluitates. Dico quod fluxus uentris non competit in uariolis, postquam manifestē aparet, & potissimē si fiat à natura: cuius ratio est, quoniam postquam natura incipit hanc materiam uenenosam expellere ad exteriora, si postea reuerteretur ad interiora, timendum esset quod hoc esset nī symptomatica, & ita esset timendum, quod tunc hæc materia uenenosa ad aliquod membrum nobile. Præterea ex alio ista materia est acuta & pungitiua & esset timendum de excoctatione intestinorum: igitur fluxus uentris prohibeatur quantū erit possibile.

Tertio intelligendū, quod uariolæ sunt magis cū sang. purus ebullitiōe: & si sang. cholericus ebulliat, nocent magis morbilli, & sunt minoris quātitatis & minoris acuminis: & si sang. cum phlegmate, erunt uariolæ phlegmaticæ, & ita de melancholia.

Quarto intelligendum, quod ex parte purioris sanguinis nutritior scetus, & quædam pars impura, & immunda remanet in porositate membrorum, & hæc est materia variolæ.

Quinto notandū, quod ad hoc, ut variolæ generentur, oportet duo concurrere, scilicet ebullitio, & fortitudinem caloris impellentis: & propter hoc non generantur in matrice, quia membrum frigidū est nisi esset per accidens, & sequeretur morbus sanguineus, nec in fetu existente in utero, nec statim post uterum, sed post eū calor incipit uigori, & confortari.

Sexto aduertendum, quod variola & morbillus possunt generari in membris interioribus, sicut in pulmone, & intestinis, & simili-

bus, sicut dicit Auicenna. & est valde malū, quia debilitas uirtutis expulsiue significatur.

Septimo considerandū quod ista passio magis generatur in nere, & quia san. magis abundat, & quia uirtus fortior est. Secundo in autūno ratione corruptionis: in æstate autem minus, quia materia exhalat: & in hyeme longē minus, quia pori sunt clausi.

Octauo intelligendū, quod in variolis postquam manifeste apparent, & expulse sunt per totum, non competit phlebotomia: quia tunc attraheretur materia ab exterioribus ad interiora. Sed quando materia adhuc est in interioribus, tunc bene competit, & hoc est in principio: & ista uidetur fuisse intentio Auicennæ.

PETRI DE ABANO

QUESTIONES

DE FEBRIBVS

Quæstio

I.



QVOD FEBRIS non sit calor ostenditur: quia aut erit corpus, vel accidet quod est qualitas, non corpus: quoniam tunc duo corpora essent in eodem ubi: quod negatum est 4. phys. & 2. de anima: ut calor naturalis & extraneus, quia enim ratione unus est corpus, & reliquus: cum sint contrarii? Non essent etiam agentia adinuicem & patientia situ distincta & subiecto.

Cuius oppositum primo de gen. & cor. diffinitum quoque; & diffinitionis genus non essent eadem prædicamentali coordinatione: ut sit matrum 4. topicorū: cum febris sit qualitas: puta dispositio uel habitus: neque qualitas, quia febrim substantia est in generatione caloris, qui præter naturam: primo febrim: & 8. theo. substantia uero qualitas non existit, qualitas enim non procedit vel mouetur, cum nihil moneatur: nisi corpus. 6. phys. In febris autem ratione dicitur quod sit procedens a corde per totum corpus in arterias. Amp. febris est dispositio uel habitus ut dictū, & calor, passio, & passibilis qualitas: sed eū diffinitū & genus diffinitionis debent esse eiusdem prædicamenti: ita & speciei, ut unum quodque per id quod sibi propriū & essentialiter inest notificetur. Rursus libro cōmenti

pulsuum 4. Febris est superabundantia caloris secundo in totum animal, & apboris. prima. Est uersio caloris innati ad ignitum. In secundo autem regiminis acu. Est mutatio uel declinatio caliditatis innatæ ad caliditatem igneam. Talia uero genera relationem uidentur & actionem uel passionis importare, non autem qualitatē, ut febris. Adhuc prima quarti de febribus sunt quædam frigida. Palin. Febris autem est calor naturalis, aut extraneus. Non naturalis, plures enim scribitur esse fore calorem innaturalem uel extraneum. Non læderet. u. s. tiones & passionis neque innaturalis: quia cum calori occurrat naturali duo contraria flarent simul, quod non fit: cum unus sit alterum natum interimere. Iacerent etiam actus naturæ corrupti omnino quod non fit manente natura. Etiam arguunt: sicut se habet bona complexio ad sanitatem, ita & mala ad ægritudinem, cum sit illi contraria, sed bona complexio non est sanitas, uerū ipsius causa: igitur nec mala ægritudo. Itaque febris calor non erit naturalis, ne extraneus, cum uel ratione contineat morbi. Ex quibus concluditur febre calorem non esse, neque naturalem, neque extraneum. Cuius oppositū dicunt omnes febre notificantes, ponentes illā fore calorem innaturalem uel extraneum. Adhuc illud quod calefacit, & eo pereunt actiones, est calidū & extra naturale, huiusmodi uero est febris, ut sensus certificat. Amp.

quæ

quaragunt & patiuntur inuicem communicare debent in materia, alia vero sunt caliditas naturalis & innaturalis, cum vnum alterum corrumpat, conuenient itaque in materia: quæ autem sic communicant, conueniunt saltem in genere, cum genus proportionetur materię differentia uero formę; quare febris calor erit extra naturalem.

Propter primū uero huius sciendū; q̃ febris plures habet notificationes, est enim totius corporis excedēs caliditas proble, prima. Februm quoq; primo. Calor est præternaturā a corde in totum trāsiciens corpus. Secundo uero de causa. Est calor quis iūmoderatus animalis; & erectio caloris in tantam immoderationē ut contristet hōiem, & opetationibus noceat. 8. quoque theoricę. Febris est morbus ex mala cōplexione calida omni cōmuni corpori. Et ibidē. Est calor extra naturalē a corde procedens; & per arterias missus ad omnes corporis partes, eiusq; nocens actionibus. Isaac qdem februm primo. Est calor præternaturā tot in initio petens per mediocritatem arteriarum, deinde se subito diuidens cum naturali per totū corpus, naturali nocet actioni. Joannitius. Est calor innaturalis cursū supergrediens naturę, procedens a corde in arterias, suūq; lēdens effectū. Quattu quoq; canonis initia. Est calor extraneus accensus in corde & procedens ab eo mediantibus spirito & sanguine per arterias & nō eas in totum corpus, & inflammatur in eo inflammatione quę nocet operationibus naturalibus. Colliget autem 3. Est calor compositus ex calore naturali & calore extraneo putredinali misso ad totum corpus, & lēdit oēs actiones & passionēs. Ex istis qdē notificationes ferre idem dicunt, sunt tñ earum aliis cōplexiores qdam. Cause autem febris sicut & aliorū quatuor existunt, materialis, formalis, efficiens, & finalis. Materialis uel subiectiua duplex. prima qdē vcor; vnde Simplicius. 1. cor. & mun. Cor semp a febre patiens primo corpori distribuit reliquo. Secunda sunt tria subiecta in qbus fundat febris calor, vt spūs & uapōr fumosus in qbus fundat ephimera. Et humor supercalescens, aut putrefactus, in quo feb. cōsistit humoris ac membrum quidem se. ethicę ac habitudinalis est subiectū. Forma autē ipsius & essentia est calor extraneus seu feruor a quo denotat; ceu pyretos feb. Gręce derivat a pyr quod est ignis. Vnde Gal. ad Glanconem & Aurelius. Febricula a feruore quasi feruicula. Efficiens vero duplex; uniuersalis & particularis. Vniuersalis qdē est triplex, primitiua, antecedens, & cōiuncta. Particularis est multiplex, sicut in libris traditur februm. Finis uero illius patet a cōtribus nocere, ac perimere. Secundum has quoq; causas diuisionē recipit ipsa, qm̄ alia vt apparuit est in spi-

ritu; quædam in humoribus, nonnulla uero in membris. Forma eius ut calor p̄ter naturam diuersificat secundum magis & minus. unde primo febrū. Differentie caloris sunt quæ ad magis & minus. Nam qdā est morbus manū; qdā, mitis; alia media; & reliqua primo epidimiārū, & februm principio. Sed an magis & minus febris diuersificet spēm, aut minimę; p̄sentis non existit inquisitionis. Adhuc quædā sit ex causis primitiuis, vt ephimera vera, qm̄ ephimera ex oppilatione nō vera existēs, accidit a causa antecedenti. 4. prima. & primo februm. Ethica quoq; pluries fit a causa cōiuncta complexio nis malitiā imprimēte, prout plurimum sequitur febris putrida. differentia. 93. Interdum tñ euenit a primitiua. Humoralis uero semper a cōiuncta, februm primo. Distinguitur ē secundum finem; cum quædam sint salubres vt tertiana, quædam mortifera, vt emittente, nonnullę medium obinētes. Realior autē ipsius diuissio est per formā eius secundum q̃ ipsa diuersificatur secundum tria nota subiecta. Separantē deniq; ephimerę, quia quædā sunt uerę, ut quarum terminus & finis est in prima die dicta ad similitudinē enthomi unius diei uiuentis tempore, historiārū. 5. effimeron nominat. & Isaac februm 2. & ipse sunt multiplices, ut earū causas. Nam qdam sunt animales; ut timor ira &c. aut corporales motiuz, ut labor, euacuatio, & fames cum reliquis, aut deforis occurrētēs, ceu adustio, frigus, constipatio, entis & reliqua. Quædā non uerę sicut quæ ex oppilatione cōsurgunt ex satietate naufragiua & apostematibus, quæ res cōcurrunt non motiuis. Et tales ueltra primum p̄tenduntur diē, ut interdum pertranscundo in quartum & quintum condescendant; & ut uoluerunt aliqui usq; ad septimū. 8. de inge. & p̄cipue. 4. prima. Februm uero humoralium qdam est eorum sup̄ inflammationē absq; putrefactione, vt synocha dicta inflammationē existens uere media inter ephemerā & putridā; ceu ephimera ex oppilatione medium obinet inter diligentem ephemerā & synochā. Altera ex putrefactione humorū duplex; simplex uidelicet & cōposita. Simplex q̃ ex uno cōsurgit humor; & ipsa quadruples sicut & quatuor sunt humores tertiana ex cholera quæ triplex existit; cetera tertiana, cōtinua, & causon. Synochas de sanguinis putrefactione; quotidiana de phlegmate, & quartana de melancholia. Vel cōposita; cuius cōpositio uel est generū remotorum, ut ephimera cū ethica; & putrida cū illis; aut a p̄pinq̃uo ut qm̄ duo aut plures cōiungunt putrefcētes humores, ut cholera & phlegma; & tunc causatur tertiana nota; seu duæ tertianę. Aut emittente; & hæc sapius euenit cōpositio, aut cholera cū melancholia, uel phlegma cum illa, uel oēs simpl. Febris aut sanguinis

cum alijs non ponitur componi saltem manifeste. differtia 90. Alterutra vtro harum sit aut intra venas, aut extra venas. Quæ autem intra venas continua existit: cum meatu sit apertus quo fulgus putrida in cor de mandatur: neque possit ex obstrukcione ac soliditate vasorum, ut venarum, & arteriarum proprie transpirare ad quæ foras. Et in qua materia fuerit mela, ut in syncho, & synocha non apparet sensibilibus additio neque diminutio: aut si fuerit in locis cordi vicinis & in visceribus, sicut in caustione. Si autem humor pueruerit extra vasa: cœ venas, & hoc trinus: quia sanguis extra illa, vel ventriculos cordis: cum rotulari seu lacuna sanguinis non reperitur. Febrem causat interpositam, cuius motus & quies existunt secundum euenationem humoris & superioribus corporum & quantitatem ipsius & qualitatem: nã phlegma quotidie monetur: cholera de tertio interitum: melancholia verò per quartum. In his quidem cessans paroxysmus reincipit propter reliquias caliditatis derelictas post resolutionem causæ coniunctæ: quæ paroxysmum induxit, & propter causam antecedentem adhuc remanentem quæ ponitur sub coniuncta. apho. 4. febrium. 1. & 4. prima. Concitaturque ad hoc non parum humoris euenatio prædicta. Modus autem generationis febris & proprie putridæ est: quia contingit obstruere ex causa exteriori, seu interiori cutis ad quam sequitur opilatio: & maxime quando fuerit multitudo viscositatis, & grossitatis materię ad quam quidē succedit prohibita transpiratio: & ad hanc putredinis minera & ad ipsam fulgus putrida corpetens: quæ à corde ad singulas partes delata febrem inducit. Exhibet autem digestio differentia notabitur. 93. Est & diuisio alia febrium accidentalis quasi & ambigua: quoniam quædam sunt agri tudines: ut quæ ex suis per se contingunt causis, alie sunt accidentes: cœ ex apostematibus confluentibus in generum quocunque febrium. quid autem sit calor. quomodo distinguatur qualiter etiam se habeat ad spiritum ostensum differentia. 49. Deinceps sciendum quod calor qualitativus triplex existit: quidam enim est naturalis omnino ut qui incolpat sanorum, alius præter naturam omnifariam: cœ membrorum corruptorum quæ in via mortis existunt, sicut in herpeticis morosis, & cæcrosis: ac cadaveribus: quidam vero horum medius velut declarabitur qui febrientium.

Propter secundum vtro sciendum: quod quidam dixerunt febrem materialiter esse calorem ut febris est calor id est, in calore consistit. Et hoc ne cogantur dicere duo corpora esse in eodem loco: calorem scilicet naturalem & extraneum: tñ Gal. apho. prima ponat ut afferunt calorem fore corpus: & maxime quia Hipp. videtur nil aliud p

calorem innatū quod spiritum intelligere qui est corpus, simpliciter pharmacorum. 5. Et ne agēs etiam & patiens loco remaneant indistincti & subiecto: quod quidem est falsum & contra sententiā ut apparebit Gal. sequitur etiā dicere quod omnis febris est in spiritu, & ita ephemera: si spiritus est id quod calor est & febris est calor. in calore: sed quod spiritus sit calor ostensum differentia. 59. vbi dictum quod extraneum & improprium valde est dicere quod calor sit corpus cum purā qualitate dicat & abstracta: licet forte minus caliditate. Ponentes tamen utrunque calorem esse corpus: dicitur quod in radice, vel subiecto differunt in processu autem unantur: sicut flamma duarū candelarū: quarū una sit de cera constructa, & altera de seuo: radice differunt & materiam unantur tñ demū flammæ: ita ut ex duobus corporibus fiat vnū nentio manere singulari. Hæc tñ nō est realis cōpositio & unitio cum vno corrupto ut accidentali, remaneat alter, cœ naturalis: neque etiā sic differunt calor extraneus in radice, & naturalis durante vita ne cœa & seuo, cœ calor naturalis minerat etiā calor is efficat extraneus cū nondū sit hic innaturalis omnino: tunc enim mors adesset. Dicunt etiā quidā in eorū subsidio quod nō oportet in omnibus actionibus agens & patiens sim fore & loco distincti, sicut in permixtis, quorū vnum agit in quolibet parte alterius & patitur. Cōsimiliter in calore naturali & humido radicali: & in his duobus caloribus corporeis: sed in illis quorū nū agentium extra aliud existit in quod agit. At forasais illud nō valet cū sermo Ari. sit vniverſalius sufficienter parlescientie naturalis. vnde & vniverſalior esse debet. Et idem, agit Ari. ibidē de actus & passivis sibi adiunctis permixtis ut apparet in augmento & missione. Propter quod dicendū quod series Ari. est vniverſalis: licet in quibusdam magis appareat huius distinctio actus & passivis, ut actus domesticationis ostendit, vel generatis. In quibusdam vero licet id adsit: latet tñ sicut in principiis generationis cū fuerint præſta. Virtus enim per quā generatio perficit ut informativa velut agens cū principaliori calido magis possidet illarum mediū: quæ aut circumſtat locū obtinent materię & patiens magis in & quā hi calores confranguntur: naturalis tñ possidet cor amplius, & proprie illius dignior pars tñ, ut dextrā. differentia. 47. Innaturalis autē ab hoc calido appellatur ad extra, ut ad superficialia magis pertendatur corporis. Et ideo alii dicunt quod febris est calor causaliter: a calore nāque causat febris: quod persuadent: quia si sanitas est calor naturalis, & agritudo innaturalis: tñ nō vident essentialiter differre: sed accide te solū: ut sottes albus & sottes niger: vnde sanitas & agritudo erit idē. Dicendū quod hi sicut prædicti in Gal. ut declarabitur peccant. Adhuc diffinitio febris

febris seu etiā notificatio esset imperfecta omnino, cū in ea non poneretur genus: dicendo febris est calor. i. a calore causata siue ē in calore fundata: ut dixerunt priores. Amplius qd erit febris aliud q calor, cū sit mala cōplexio calida p totū animalis corpus diffusa. Ad quod uero deducunt dicendū: q calor naturalis q stat cū sanitas, & calor extraneus q est febris vnitā in calore ceu spēs in genere: vt. n. hō & alius sunt idē in animali, sic & calor naturalis, & extraneus in calore. Contrahunt aut in specię per differentias calori essentialē, & nō accidentales: sicut hi dicunt ut p naturale & inuaturale, ceu animal descendit in hominē per rationale, & in brutum per irrationale: quod & actus inducant essentialiter differentes ut digerere, uiuiscare: sensibilibiter lādere ac corrumpere: neque est simile quod inducitur de Sorte albo & nigro: quia Sortes est substantia: album autem & nigrum accidentia: calor autem & naturalis, & extraneus accidens.

Propter tertium uero sciendum primum q febr. est calor extraneus. 2. qualis. Propter primum huius sciendū, q calor extraneus est ceu essentialis forma febris. Hic tñ calor duplex est. Vnus quidem est passio & passibilis quā aliter, prout talis calor infert passionē in talē sensum, & huiusmodi non est febris: cum ea sit dispositio uel habitus. Est & alius calor qui est impressio in aliquid trium subiectōrū induta, & hic calor est dispositio nel habitus, ut mala complexio, quā est febris cum fuerit extraneus procedens & c. quod Ari. indicat locans calorē & frigis in prima specie qualitatē & sanitatē & ægitudinem. unde febrium primo. Substantia febrium & essentia in genere est caloris quā prater naturam, & primo reg. acu. Non est natura febris ex substantia alia nisi ex substantia ignis. pyr enim dicitur ignis: inde pyretos: vnde latinis græcis non minus febrem a feruore (ut tacitū) qui est ignis proprietas. derinauit: quare Haly. cum febrem diffiniret ait. Hæc quidē diffinitio ex ipsa febris sumitur substantia scilicet ex calore extraneus non ex ipsum sequentibus accidentibus: quod ostendit nequa id est, forma alioquin quid in ipsius ratione ponitur, cū diffinitio detur per essentialia. hic autē calor existit prater naturam uel extraneus. Adhuc cum forma det esse exteris causis magis: potius per eā habet ratio perfici, quam per alias: cū licet res habeat esse, ita & cognitionē, perfici autem per calorem extraneū conditionatum vt quod a corde & reliquā. Palin. Actio in cognitionē perducit essentia, uelut signum & effectus in significatum & causam. Actio uero febris est excedere uel prater naturā calefacere: ita vt & actus omnes lædantur & passionē: propter quod febris essen-

tialiter erit calor & prater naturā. Propter secundum huiusmodi sciendū, quod huiusmodi calor extraneus qui est febr. est qualitas quā dā superexcedēs horribilis calori impressa naturali, mutans ipsum a dispositione sua naturali & suauī in oppositū: non autem est corpus: vnde, Isaac. Calore extraneo ad cor accedente, naturalis egreditur a temperamento. Cum autem per totius corporis partes diuidatur vt eis vitā tribuat: quia a suo egressus est: temperamento, necesse sit vt mēbra eum recipiant in ea qua est, qualitate quā re calefacit, & vrit ipsa, & generat fe, toti actioni naturali subito nocētem. In quam vici; sententiā concidit Auer. ita. Febris est calor naturalis missus cum aliqua qualitate calores putredinalis: sic itaq; calor extraneus calorem afficit naturalem. Hic autē differentia. 29. spiritū qualificat, quem si vehementer affecerit & ad cor puenierit, hinc abscedēs febr. generatur ephemera, si autē hæc tria humorem alterēt & corrumpant, febris inducitur putrida: si vero membra ethica. quod autem sit calor huiusmodi qualitas ostēdunt febr. notificationes per esse malā complexionem calidam & sic. Nosce quoq; quod huiusmodi calor: licet dicatur esse extraneus seu prater naturā: non tamen omnisfariā vt calor qui est in corporibus mortuorū secundum Auer. reperitur, sed magis naturalis, affectus tamē vt dictū qualitate putredinali: vnde cū sit medius inter calorem naturalem & prater naturā: sicut semiputredo est media inter saniem & pus, quā ad bonū simpliciter est in suo genere, & putredinem ad malū omnino febriū primo. Media namq; cum componantur ex extremis eorum sapiunt naturam: ita vt ad alterum comparata videantur altera. phys. 5. naturā utriusq; obtinent extremorū, ppter quod nō parū nominibus denotātur extremorū. apho. euides. 4. Et ideo Auer. mediū hoc referens in alterū extremotū quod minus verū, suū se. dixit calorem naturalem qualificatū putredinali qualitate. Et apho. prima. Febris est versio caloris innati ad ignitū. Alii vero respiciētes fe. vt declinat versus dēterius extremorū, dixerūt eam esse calorem extraneum, vel extraneam, seu prater naturam. Est igitur febris quidam calor compositus ex calore naturali & extraneo putredinali petens cor & ab eo mediantibus spiritu & humidis per vasa in totius corporis actum lēiones delatus.

Propter quartum uero ad primū dicendū q fe. vt ostensum, nō est calor qui est corpus cū calor sit qualitas: non autē corpus nisi improprie ualde pro corpore sumatur calido. Supposito etiam q sit corpus ostensum quō duo corpora erunt in eodem ubi & quō nō. Quō etiā agēia & patiētia sint distincta loco & subiecto. Calor itaq; erit accidens ut qualitas, & sic diffinitum

& genus eius erunt ex eadem egloga p̄dicamē talisq; si Gal. cum Haly. dicat febrium substantiam esse in genere caloris qui est præter naturam, accipit substantiam pro essentia, cen quando dicit. Complexio est substantia, & ægritudo est substantia, differentia. 7. In accidentibus enim reperitur essentia per additamentum, saltem. 7. metaph. & non substantia. Et deinceps dicendum quod licet se. non moueatur, neque procedat per se: mouetur tamen per accidentem ut mediante spiritu & sanguine: qui sunt corpora sicut in perfectiore tangitur ratione febribus: quod innuit Halyab. quando dicit. a corde missus. Et. a. procedens a corde mediamentibus spiritu & sanguine. Ad aliud quid dicendum apparuit, nam feb. est calor, prout hic est effectus caloris, qui passio existit, & passibilis qualitas. Ad alia dicendum, q; illa non sunt propriæ rationes febris, sed notificationes communes quædam. Aut superabundantia, uersio, mutatio & declinatio ratione caloris earum determinati ad qualitatem reduci possunt. Vel superabundantia licet ratione respectus quem importat sit ad aliquid, tamen ex parte illius cuius est respectus ut caloris in qualitate locatur, & sic motio & declinatio possunt aliquantulum qualitatem importare. Ad aliud dicendum, q; nullæ febres sunt frigidae per se: prout actu existunt, sed ratione typorum: non tamen de ratione febrim nunc saltem existentium ob regiminis lasciuia ut apparet de accidenti. 5. Ratio etiam ipsius pericitur ex refractione caloris à corde in reliquum corpus apho. 7. unde de febribus. Sunt frigidae habentes rigorem aut horripilationem vbi subiungitur. Aut propter materiam phlegmaticam sparsam super membra sensibilia: sicut euenit in empiala in qua calent extrinseca & frigescent intrinseca, uel contra ut accidit in lippiria & in febribus apostematum perniciosorum intrinsecorū in quibus propter calidum attrahens ut uentosa quæ intus ardent: & exteriora rigescunt: unde quando sitim cum hoc habuerit: apho. 4. pronuntiat mortale. Contingit etiam interdum propter debilitatem caloris naturæ non potentis se per totum expandere: Ad aliud quid dicendum pro parte apparuit. Declaratum est enim quomodo diuerso respectu feb. potest dici calor naturalis, non tamen simpliciter & qualiter innaturalis seu extraneus, neque inconueniens hoc apud aliquos aliquando duo contraria simul existere imo in quibusdam oportet, seu sanitas & ægritudo, cum ipsa absque sanitate esse non possit: differentia tactum. 71. qualia uidentur esse calor naturalis & innaturalis: Aut contrarietatem licet tandem unum expellat reliquum & corrumpat, simul tamen permanent durante inter ipsa pugnā, ut & mistio denotat elementa

torum ut tandem calor naturalis uincat calorem extraneum quando sanitas introducitur aut contra quando mors occurrat: neque etiam tantum febrilis calor corruptiuus est, ut semper omnes destruat actus. Ad aliud dicendum q; est quorundam fallimentum quo probare putant complexionem malam morbum non fore, dicendum, q; bona complexio est sanitas nõ quidem simpliciter & omnino, quia illa consurgit ex temperata complexionem cōsimilium; & eleganti compositione instrumentalium, & uatura utrorumque simul perfecta communis. Sed bona complexio bene est sanitas cōsimilium, & compositio iusta officialium: & ita mala complexio uel feb. est morbus & calor extraneus. Hæc autem dissolutio fundatur super illud quod ostensum differentia. 65. q; sanitas species existit specialissima: ægritudo uero subalterna.

Quæstio

11.

Quod humores non possint periodice confluere ostenditur: quia aut erit ab aliquo ipsorum intrinseco, uel extrinseco: sed neutro potest esse: nõ quidem primo: cum sanguis principalior existens humorum non confluat periodice: sed moueatur assidue potest factus, uel inflammatus, cum tamen uideatur præ alijs confluere, multiplicior enim exteris, & profundior: quod ad confluxionem cooperatur. Geofar introductorij. 3. Neque secundo: quia aut sunt elementa à quibus: non: cum motum habeant rectum: hic autem confluxionis est reflexus: uel a corporibus supercelestibus: sed neque ab his, cum fluxio humorum ipsis non ualeat coartari: quoniam octaua sphaera secundum Ptolomæum complet cursum suum in 30. annis. Iuppiter in 12. Mars in duobus. Sol Venus & Mercurius uno: & Luna in 27. diebus & 8. horis fere. Periodus autem humorum neptunum est trium dierum. Adhuc aut à natura superiori, aut inferiori, non quidem hæc, quia natura inferior à superiori gubernatur, omnis autem illius motus gubernatur inde. unde 3. ereticorum. Omne bonum pulchrum, & omne quod ordini uni adhæret & uult, & ostenditur in eo uestigium sapientie nõ est nisi desursum. Neque etiam à superiori: quoniam uigencia & patientia oportet in materia communicare, primo de generatione. Sed natura inferior nõ coincidit cum superiori in materia: cum colligat secundum Commentatorem materia alia sit ab ea quæ istorum materis. Amplius, illud non confluit periodice: quod est ut materia, & inesse continetur per formam, cum det esse, & manere sistat, quæ compositi huiusmodi uero sunt humores ad animam corporis informatiua

tiam omnis. Et si confluerent, cum sit motus quidam, & motus omnis à calido & spiritu, calidumque & uentositas requirantur: operatur enim secundum Albumasar ad confluxum, tunc cholera & melancholia magis fluenter phlegmate: cum melancholia sit uetusta. 30. probe. & cholera calida, cuius oppositum experimur. Palin. Melancholia non confluit cum sigilletur à terra: quæ immobilis extat de animalis motu, neque cholera, cum sit calida & sicca opposita naturæ aquæ, aqua confluxus seu accessio & recessio inuenitur. Humores igitur non poterunt confluere periodice.

Cuius oppositum experitur sensus. Adhuc illud dicitur confluere periodice, quod certis horis mouetur de circumfretu ad centrum, vel contra. Sed huiusmodi sunt hum. cum sint humidi currentes. Impelluntur enim a frigore intrinsecus sequentesque caloris motum expanditur extrinsecus illius expansione: quod & modus euentus interpolate deuorat: processus nauque sit primum à misera putredinis ad cor, & inde ad reliquas corporis partes. Quare humores ualent confluere periodice.

Propter primum quidem sciendum quod sit humor & quomodo distinguatur monstratum differentia 29. Confluxus autem est motus, quo natura cum calore & humoribus retrahitur à circumfretu in centrum, & demum ab hoc in illas expanditur qui sufficienter assimilatur accessioni & recessioni à luna causatur in aquam. Ipsa nauque expanditur à medio in quæ extra. Et accidit quando luna pergraditur à puncto orientis in cæli medium, & deinde restringitur ad intra: donec ad angulum permeat occidentis. Et ab hinc redit in expansione ut antea, quousque ad angulum permeat terræ à quo ut prius in se reducit, unde in circuloquo. Humiditates corporum accedunt in prima quadra, in secunda recedunt, & in aliis proportionabiliter duabus ut declarabitur differentia 168. Ad quem quidem accessum & recessum iuxta Geosar introductioni, 3. tria oportet concurrere: aquam, uidelicet. & locum profundum: longum & latum: asperum, durum, montibus altis constitum & reotosum. Aqua quoque cuius quantitas sit multa non fluminibus nouiter effusa: sed longo tempore prolixo aggregata, hæc enim deuota ac salsa efficitur uel amara uaporesque & uenti nascuntur hinc densi. Cuius uero locus & aqua sunt oppositi, influxum & refluxum suscipiunt minime. Sunt autem & aquarum quædam que mouentur à generante. Cum enim fuerint extra proprium locum ipsum earum expetunt gravitate cæuæque fluminum. Et Lunam oportet tertio interuenire, cuius dominium est super humida ut humiditates cerebrum, nucham, pinguedines &

medullas, criticorum & introductorij tertio. Ipsa nauque ascribitur aquæ, cæu sol igni: differentia 16. unde secundum ipsius motus diuersitatem permutationem suscipit huiusmodi aqua maxime. potiores enim aquarum ita mouentur attractæ à luna: sicut plura naturalium se concitant & attrahunt. Magne enim ferrum euellit ad se. Alnaph uero album bitumen quoddam iudaicum ignem ex distautia quàm multarum ut prauit eo sacerdotes decipiant plebem, & lapis quis acetum absque contactu, & alius oliualis oleum ac Karabe paleas, Dicum est autem sufficienter quod termini à quo & ad quem dicuntur hic & in confluxu aquæ differre, nam humores quædo incipiunt moueri, magis à circumfretu tendunt ad centrum, & hinc ad eandem: aquæ autem est contra. Est autem periodus in quod incipit circuitus terminatur cuius hic sunt duæ partes scilicet paroxysmus & declinatio, unde apho. prima paroxysmum oportet intelligere totius periodi particulam deteriore, quæ à prima immisione usque ad statum, sicut reliquam quæ declinationis, meliorem. Et eius quidam est situs eadem hora incipit & terminatur. alius præcapiens: & reliquus postponens, qui & proprie sit in febribus in quibus exacerbatio reperitur ac quies manifeste. Improprie uero in his quæ additionem & minorationem suscipiunt paroxysmi. Impropriissime autem in horum oppositis ut in febre sanguinis aut caustionibus certis, nisi quis uelit totam ægritudinem unum appellare periodum, cum à sanitate incipiat & ad ipsam tandem terminetur. Et ideo febrium quædam ponuntur continuæ, alteræ uero periodicæ. hic autem periodus non fit uel haud percipitur in corporibus sanis.

Propter secundum quidem sciendum quod id quæsitum extrinsecus difficile, unde. 3. criticorum, quare in morbis acutis per tertium ueniunt paroxysmi ut ad multum, in proliis uero aut diuturnis unoquoque, uel per tertium inuenire non est facile. Insuper nullum reperies de hoc quæsito modernum scriptorem ad antiquiores me conuertens eos inuenio utrumque dissonos, & causam in eo tangentes magis ex materis dispositionibus, quàm ex forma agente, & à fine, cum omnia recte causam hanc oporteat intueri. Necessitas enim ex alijs causis, & uo ex materia alicuius est sumenda, cæu. 2. physicorum. & primo de gen. animalium deservit Empedocles. Quidam nanque causam assignant ex parte substantiæ humorum quantitatis, & qualitatis, alij ex parte loci, non nulli ex calore naturalis alij uero extranei. unde colligit. 4. Causa propter quam circuitus febris habere est, quia humor qui putrescere debet non putrescit simul & semel: quia in eo putrefactionis præparatio

paratio non est cōpleta: sed paulatine in putrefactione procediunt. Et hæc sequitur modū ordinationis quia hæc operatio secundū aliquē modum est naturalis: quoniam natura in hoc regimen habet, eo quod est putrefactio cū digestionē. Et ideo uarietas ordinis in circuitibus signum est prauum, & non est hæc operatio attribuenta calori putredinali substantialiter: sed naturali, quia in materia non naturali operatur sicut in multis uis natura reperitur. Et radices Gale, quibus conatur attribuerē ordinē circuituum substantialiter calori putredinali hic infringuntur. Et propterea nostra sententia est in hoc penitus, quod natura istos circuitus cum calore operatur intrinseco, quamuis superuenit huic calori aliquid extra naturam in quantitate aut qualitate, eo quod est agens in materia non naturali ut in humore ægitudinem faciente. Et isti circuituum ordines diuersificantur secundum naturam humoris, & quantitatem. Et hic quidem sermo cum eo quod est communis non cōtra periodicæ coaptatus fortassis patitur alumnus in non paucis. Primitus quidē eo quod calor naturalis non est causa periodi, cum sit mouens motum conseruans & non incitans. Adhuc natura non monetur oīsi percepto læsio, & cum cholera sit magis est reuis & natura odiosa. Cholera quæ nigra secundum Alexandrum inimica, hæc deberent amplius phlegmate confluere. Rursus non semper in putrefactione fit digestio, imo non parum tmplior suffocatio uel immensior corruptio. Paulin. Varietas ordinis circuituum approbatur eius detestetur oppositum, unde apb. 4. Quibuscumque paroxysmi sunt quacunque dimiserit febris, in crastinum eadem assumpserit hora descripta, nisi nolit uarietatem ordinis circuituum ex debilitate naturæ: iuxta illud eiusdem quæritur si rigor inciderit febre non deficiente, iam debili existente uirtute, mortale. Sed quanquam id uerum eius hoc non patitur positio. Dicitur autem Gal. quod is accipit ex secundo febrium aliis eius bene dictis omīssis, amplius ualet suo: cum calor putredinalis remaneat habitus in mīora putredinis ex præcedenti quod si rigor inciderit febre non certissime occurrente superato cum modica euentatione forisfeca: mox quidem quod habitus sit æstus: seu calor sopitus in calce conurgit quādo fuerit aqua conspersus: quod autem de hoc magnorum sermones quamquam in medicina sufficiant non tamen causam simpliciter & diuissim euacuant hæsitatum: & io sequenti manifestabitur propositum: unde fit opus alia ipsis coniungere ut causa simplicius & præcisus habeatur.

Propter tertium quidē primitus præmittitur quædam necessaria. Et deinceps quod obrem

fe. efficitur quādo continua & alia interpolata cū diuersitate tēporis exacerbationis & quietis. Et tertio præcisus ut possibile ostendatur cur hic humorū continetur ille quotidie aut aliter certo tēpore moueatur. Propter huius primū sciendum, quod cū omnis effectus causetur ex actione agentis in materiam: confluxus equidē ita suscitabit in humores: qui enim tangit materiā omīssio agente, uel agens illa derelicta, insuscitans extat, cum materia seipsam non educat talem: neque per se agens in semet agat: cū actio in materiā conidat extrinsecam: seu negotiis de corpore anima neglecta nel contrahit quodam mordet. Ari. de anima primo. Materia uero in qua fundat periodicæ cōfluxus sunt humores talibus uel alijs proprietatibus insignitis. Agens autē est corpus cōleste natura mediantē elementari. unde de animalium gen. 4. Sicut mare & omnem uidemus humidorum naturam stantem, & permutatam secundum ventorum motum & stationem: etiam aerem secundū spiritus solis & lunæ periodum: ita & quæ ex his constituta consequi necessarium minam secundū rationem necessarium est cōsequi periodos in his principalium eorum quæ principaliora. Vita namque est spiritus quidam, & generatio, & diminutio. Cum igitur humores, sunt minus principalia sole & lunæ eorum periodus & confluxus sequat solis & lunæ & uerisualiter astroorum periodos: seu principaliores uelut mare & omne humidum ac aerem ex his natura stantem recipit ac permutatam. Hic namque motus siue mundus cōtinuus est superioribus latioribus ex necessitate ut omnis ipsius uirtus gubernetur inde meteo. primo unde Maschalach. Simile est opus planetarū in hoc mūdo magneti & ferro: & p. Iudices, omnis humane generis cōditio ex planetis, eorumque signis tanquā ferum ex lapide magneto dependet. Amplius nō scē periodos certos interpolatū hos esse. nā phlegmaticæ certæ. 18. quidē affligit horis: & 6. repetit. tertiana quoque 12. & 36. quiescit quartana uero 24. paroxysmat: & 48. interpolata. Indeficientes uero aliquādo extensiori prædicto affligunt tempore, interdumque: miniori quod & quietis consequuntur. Quorum quidē indefinitioationis triplex est causa: puta humor qui aliquando est maior aut minor, uisiosior uel incitior: grossior aut subtilior, calidior aut frigidior. Ac uirtus quæ fortis extat interdum, & aliquādo infirma. tertia uero corporis constitutio nam aliquando rara: porosa: leuiter commediabilis: & non rara huic opposita, in quibus quidem reperitur est modum conueneratum. Si ergo tria inuicem conueniant primū, initium postponetur periodi, & breuiter enim cum aciditibus molestis minime ipsius quietabitur paroxysmus. In reliquis uero tribus opposita

oppositis fecus eveniet, velut medioeriter in mediis, secundo febrium & 8. therapeuticarum. Rursus quoque advertendum quod huius gubernatur forma propria, eeu anima omnis quando in naturali fuerit corpus dispositione omni. Interdum vero magis ostenditur virtus superpetna, ut quando fuerit discretum non gubernatum: namque tunc perfecte ab anima motu agitur corporum superiorum ac elementorum: quod indicant corpora optima: in quibus nulla vel modica ab huiusmodi causatur impressio, in lapsis autem ovis omnifariam manifesta: sed in aegrotantibus apparet omnino et in anima secundum Geofar. quaedam nihil aut minime consonum: alia inapparenter: & terra manifeste usque quaque nec tamen contrarium id est, repugnans ei quod dictum est humiditates accedere in quatuor prima & reliqua: hoc namque euenit secundum quod extat possibile velut subiectum fuerit conparatum: tunc namque agentis in ipsum coneidit actus. Propter huiusmodi secundum sciendum, quod homines possunt ad duo comparari. Aut ad eorum intrinseca vel forinseca. Siquidem primo quadrupliciter euenit secundum quatuor in eis ad praesens reperta ut substantiam i. quantitatem qualitatem & locum. Ex his namque secundum Haly. 8. theo. & Isaac febrium. 3. conungunt congregationis humoris ad putredinem velocitas vel tarditas: facilitas putrefactionis aut difficultas, & ipsius euacuationis acceleratio aut mora. Si enim humor fuerit substantie mediocritas, multae quantitatis, calidus & humidus: & intra vasa ut necesse sit locatus, non potius diutius confluat, sed continue magis, velut san. omnia enim incidunt vna prima: propter namque ipsius substantiam fluxibilem, multam calidam & humidam putrefactioni paratam: & maxime propter locum intrancum adeo continue & notissime affliget: ut additio non perpendatur in ipso neque minoratio. Quod vniuersaliter omnis agit materia quando in corpore intrinseca fuerit situta: eeu canion ostendit phlegmaticus etiam. Enligo namque putrida eorū dicitur petiit & assidue non valens propter patetium obstruendum transpirare. Et propterea non ut in periodicis febrium sudor expectatur in talibus: enim id quod inflammatum extat ac putrefactum in una partem antequam residat: quod continuum similiter afficiat: haec quidem febres breues existunt: & in 7. ut multum diebus terminatur dupliciter: uno quidem modo propter eius materiam conuini obedientem de leui: alio vero propter eius subtilitatem & acumen. Causam quoque istius facti Insuetam Auer. huic superaddidit: ut quia id quod a membris dissoluitur sensibilibus non sentitur Quando autem materia fuerit extra vasa, non

continatur motus: sed anesis per oppositum eius quod dictum est euenit: quo quidem iterum superuenit interruptio. Quando enim caliditas finit materiam ad putredinem motam: cum non sit contenta in uasis, eogens expirare quod eius subtile, remanet incineratum & terream, quod uehiculum non extat caliditatis & febris: eeu apparet io stercoreum quando incenduntur cumulis. Quando autem itidem antecedens causa ex cibo non certissime superato ad mineram concurret putredinis & reliquias caliditatis inueoerit ex putrefactione praeterite, inflammatur nice aliacen calx conspersa aqua, quod perdurat quousque causa antecedens ad mineram poterit moneri putredinis in ea caliditatis praecedentis vestigia innuencis sufficientia paroxysmi. Gal. & 4. prima. Quia vero phlegma post sanguinem est adanctum: & quia humidum parumque frigidum secundum. A. corporis comparatione viscosum, & locum obtinens extrinsecum a sanguine putrefactionalis alijs reddetur aptius, propter namque quantitatem & humiditatem. Est enim secundum Alexandrum quotidiana diues materia grossa & viscosa, ne locius ad putredinem aggregatur, & putrefacti his facilius, propter vero viscositatem eius manet per amplius putrefactio. Non enim potest ut plures aliorum resoluatur: sed propter frigiditatem aliqualem & locum forinsecum delitescit putrescere, non per multum ita ut tempus putrefactionis eiusdem sit per amplius quietis hora. Melancholia quoque, quia grossa, parca frig. & sicretetis arduus putrefactioni subicitur: tamen quia est corpus humidum liquidum seu currens humor enim & quod ita le putrefactioni est aptum, & proprie quando calorem suscepit extraneum: Quando autem mota fuerit diutius eius perdurat exacerbatio propter impressionem in subiecto factam restrictioni: eeu quae in lapide ostendit facta non tunc potest ampliori interpolat quam paroxysma extat. Cholera vero subtilis medius inter hos obtinet humores, nec ita ad putrefactionem ne phlegma est apta, neque ut melancholia indispotita, miooris enim quantitas existens, quam phlegma & amplioris quam melancholia ne ostendit differentia. 3. 1. Et quia calida est & subtilis plus recipit passionem 4. prima & febrium. 2. celerius aggregatur ad putrefactionem quam melancholia. Sed quoniam sicca: amara putrefactioni resistit: & quia subtile celeriter dissoluitur ut eius paroxysmus non permaneat diu. Est namque in subiectum subtile facta impetussio, quod cito suscipit citoque susceptionem perdit, ut aer denotat autummita ut tempore minori affligat quatuor, minorique pauset. Praeter autem haec quae humoris, oportet attendere robur virtutis, ac eius oppositum cum habitu corporis

corporis raro nel denso, & dispositionem etiā particulz mittentis & recipientis febrium apparens. 3. Ea his itaque colligatur diuersitas paroxismi & quietis interpolatarum ex his quz intranea sunt humorum ostensa. Sed circa prædicta euenit dubitare; quia cōcessum est multitudinem ad putrefactionē disponere, & quod mouetur amplius putrescere. Quorum contraria quartus continet meteorum; ita multū quidem minus putrescit paucio. Similiter quod mouetur & fluit, minus putrescit quā uō motū. Dicendum q̄ uera sunt hæc, siquidem multum & motum transpirationem suscipiant; quia in his uirtus conseruatiua existit intensior, uō putrescunt. Si uero euentatione careant secus cōtingit, similiter & uerum sit cum multū & paucum & motum & quietum aequaliter fuerint apta uel indifferētia putrescere; ut sang. denotant & melancholia. Si autem humores referrantur ad extrinseca, dupliciter euenit sicut & ea duo existunt. Aut enim se habent per modum agentium principalium. Exita celorum corpora, uel instrumentorum, & tunc elementa quibus dupliciter appropriantur, aut ratione substantiæ, uel accidentis. Et id uel qualitate uel quantitate, uel etiam motus. Si quidem ratione qualitatis dicendum q̄ cum sang. ueti attribuitur, cui caliditas insunt & humiditas, sintque qualitates hæc motus & confluxus causatiue maxime expandendo se assidue a centro ad circūferentias. Calor enim mouet humiditatem, & ipsa tanquam celerius passibile dilatat se cum, & ad exteriora expanditur, ita ut motus hic absque periodo continuetur in finem. Et quia frigiditas est in phlegmate humiditati coniuncta motum eius impedit expansionem prædictam, uerum quia non multa & caloris susceptiua accidentis; ne ex oppilatione quam causa; licet motus eius sit ad intra, febrem interpolatam causat. At quia in cholera caliditas cōiuncta siccitati mouere habet ad extra. Siccitas uero contra motus impeditur calidi, ut interpolatio maior quā in phlegmate interueniat. Sed quia in melancholia frigiditas est siccitati admixta, cum utrique eoustringant & reducant ad intrinseca confluxus tardatur ipsius, ut quies sit maior exacerbatione quæ etiā protenditur amplius quā expectant qualitates propter substantiam terrestrem in qua facta erat impressio: sicut in cholera est minor quā exquirat propter substantiam huius oppositam. Ita uauq; huiusmodi qualitates nidentur operari in uniuerso. Si autem intendatur in motus elementorum, inueniantur humores ut cum qui sibi correspondentes: nam ignis secundum eius partem superiorem motu orbis agitur: & non totus ut ostendit cinis permanens sacrificiorum reperiuntur in anno sequenti. 6. proble-

ica & cholera sibi contributa minori tempore mouetur: quiescitque ampliori. Et quia aer in continuo extrat motu & turbatione ut denotat athomi in ipso comprehensū: nec appropriatus: similiter agitabitur postquam moueri inceperit donec cesset omni quaque continue. Sed quoniam aqua minus illo mouetur: motū enim habet refluxū accessionis & recessionis in quo quies intescit phyficorum. 8. Phlegma quidem illi ascriptum diutius mouebitur per parum quietatum: at quia melancholia proportionatur terre: quæ minime mouetur secundum totum: uerum secundum partes magis. uode Comment. phyficorum primo. Dubitatur de partibus quæ sunt apud centrum terre: utrum possit moueri, an nō, præ aliis cum difficultate mouebitur diutius quietata, motus tamen eius longius perdurat. Ratione quidem attributionis in substantia persuaderetur: quia quanto humor fuerit subtilior, tanto erit mobilior: seu cholera exceptio impressionis non retentiuat: & quāto grossior, tanto motui inceptio: ut melancholia designat: sicut in elementis euenit præter ignem: qui eius substantiæ subtilitate non omnifariam motus persequitur orbis. Ex parte quidem quantitatis in humoribus instantiam non recipit. Quanto namque augmentiores, tanto mobiliiores & contra, in elementis uero propter id quod dictum est in igne. Si uero humores reducatur simpliciter in celestia uel in lunam cum elementari materia sibi contributa, aut in planetas, ut dicat tunc inest alicui q̄ melancholia proportionetur. Saturno ratione frigiditatis & siccitatis motusq; tardus. Ipse namque ut testantur astrologi tarde mouetur secundum motum longiueidinis qui in oriens connaturalior est sibi. Similiter secundum motum retrogradationis qui sibi innaturalior est; uidetur nauque diu subire. Sic & melancholia longum habet interuallum, ac etiam proximum. Cholera uero datur Marti calido & sicco minus Saturno tardo in quo etiam motus longitudinis connaturalis illi est longior, retrogradationis autem breuior, quæ etiam in melancholia, quietis respectu. Phlegma uero lunæ ascribitur mutabiliori frigide & humide, cuius motus est præceps, laboriosus, modice quieti; ut declaratur coniunctus. Ideoque ipsum diutius mouetur per parum quietatum. Si quis quoque Ioui principaliter ascribitur calido & humido, ac cæteris planetis, cū ipse foueat alimentum, & totius existat natura, & quia eius motus est continuus. Sol enim nunquam retrocedit, neque alij una, ideo motus erat ipsius continuus. Propter huiusmodi quoque tertium & partem digestionis alteram præuentis immediate sciendum, q̄ hu. quanquam natura complexionali filij pronuntiantur ab Hathlyb. &

lyab. & Isaac elementorum, eorum enim qualitates his ascribuntur cholera calida, & sic ea igni proportionata &c. substantia tamen ipsorum coaptantur aquae amplius: quod ostendit corporis resolutio. Nam humiditates subleuantur & sunt vapores primo thes. vapor autem est humiditas aquae minutarum decia, simplicium primo. & febriū Isaac quito humores conuertuntur ad aquam. Quia igitur phlegma sit aqua propriae a luna ei ascribitur & proportionabiliter ipsum ceu aqua confluxum habebit. Et quia in hac concidit quies, accessus enim & recessus (ut praetactum) motus est reflexus in quo quies interuenit media: sine uaque; ea duo motus reddi nequeunt copulari: similiter euenit in phlegmate, quia motus eius est plurimus ceu. 18. horarum: quies autem modica ut. 6. Quod de articulat: sicut enim in luna propter paruitatem epicicli, & motus lunae in illo velocitatem: non percipitur statio, directio, neque retrogradatio: sed velocitas tantum quādo fuerit in parte inferiori epicicli, & tarditas quādo in superiori: sic etiam in phlegmate modica sentitur pausa & falsitudo. 4. prima. Phlegmatica non eradicatur quin ibi sint reliquiae occultae. quare febrium secundo. Non expurgatur finaliter in paroxysmi declinatione. Sunt autem. & 6. huiusmodi quietis horae: quia inundationes aquae & vniuersaliter humidorum, ut ostenditur differentia. 168. tāto completur spatio, in sex enim horarum spatio quartam peragunt caeli vnam. Et quia phlegma non poterat motum lunae ac aquae consequi omnino in una lunae caeli gyratione, quae tempore minori perficitur. 24. horarum & quinoctialium deficit ab illius motu in sex horis fere. Celerius enim ipsa sole orbem percurrit proprio motu. Et ideo velocius ad punctum peruenit praesum. Et quia melancholia minime comparatur aquae & lunae: ideo motum earum imitatur quam parū. Cum enim sit ad motum & ad impressionem suscipiendā indispōita: propter substantiam grossam, & qualitates motui obuias, nō solum vnam oportet lunae caeli circulationem praecedere ut agitur: sed & duas, ut tandem dispositione lunae diu affecta in tertia eius moueatur circuitione in qua concitatur omnino propter virtutē ipsius in subiecto terrestri impressionem. Eius autem Isaac quietem soli ascribit qui in 24. horarum spatio ad eundem reuertitur punctum. Et quia cholera medium inter hos obtinet humores: ipsa mediocriter mouebitur & quietabitur: quoniam post phlegma plus participat aquae substantia & lunae: vigore tamen propinquo est melancholiae quam phlegmati. Non solum sex horis quietatur ut id neque 48. ut melancholia: sed medium geometricum obtinet appropinquando melancholiae motui am-

plius quia 36. Non enim potuit vna circulatio ne moueri ut phlegma: neque duas postulauit ceu melancholia: sed sibi vna satis affuit cum dimidia. Neque tanto mouetur tempore ut phlegma cum minus concitari sit apta tanquam mouentium minus participans propitiae neque ut melancholia: sed medium obtinuit sicut. 12. horas. Ipsa namque subtilis impressionem susceptionis celerius derelinquit. Nosce siquidem quod neque in talibus terminis expedit omnino praecisus inuestigare: vnde de his febrium secundo. Diligentissima subtilitas videtur importuna: cum etiam aqua non praecisus omnifariam concitatur a luna. Motus enim & coniunctiones per amplius tempus effectum inducunt & maxime superiorū orbium & planetarum. Causae namque plurimum non semper tempore coniunguntur effectui. Quaedam uaque plurimum distat ab eo ut generentur a genito. Alia vero concitatur instantaneae. vi illuminationis illuminans: nonnulla quidē medium obtinens ut causa sufficiens calefaciens aliqua. Ad cuius separationem aliquādiu permanet calor: qualis est luna humorum concitatoria ac citis aquae. Quod autem fulcit amplius quod dictum est: quia concitatur humorum & pausa credo quod sit lunae periodo: ut ait 18. vel 6. vel 36. aut 12. seu 48. vel 24. semper enim sex horarum quadraginta morae seruantur illae. Sic itaque phlegmatis motus cum eius quiete & cholerae quies cum motu proportionē seruāt in numeris tripli: in qua diapente diapason locatur conuerso tamen modo: quia in phlegmate triplum est hora motus ad eam quae quietis in cholera uero contra. Motus uero melancholiae cum eius mora proportionem constituit duplex qua symphonia conuenit diapason. differentia 83. Quod autem praedicti motus non concidant ut distincti: euenit quia non directe consequuntur motum lunae, neque aquae proportionantur effluxum manifestum habentibus: sed alterius. At quia sanae aquae proportionatur fluxui: propterea in motu exiat: ut illa continue periodum non recipiens quiete distinctum. Accōmodatusque etiam est aeri: qui in grandi extat turbatione. tum propter planetas plurimos ipsum concitantes: tūque substantiam & qualitatem illius passibiles vehementer: cum id ut dictum sit difficile. vnde criticorum 3. Non facile sit causam assignare: cur in acutis morbis ut ad multum sit paroxysmus per tertium: in chronicis uero quotidie aut in 4. Sed dubitatio emergit impressat quia Cōmens. primo & 2. cor. & mund. dixit Ari. in lib. de animalibus quod natura lunae cōmunicans est, cum natura terrae propter luminis in se defectū. Cuius ser. 3. de ge. Terra videtur cōdicans quatuor substantiarum: sed aquae contributa est luna. Dicendū, quod utriusque principalis tamen aquae

aque proportionatur fortasse natura & motu quod eius ostendit actus, terra non sic ignobilitate & opacitate, sed non tantum actione.

Propter quartum vero, ad primum dicendum, quod licet sanguis non confluat periodicè, nihilominus alii humores possunt interpolare confluere. Causa namque particularis est, qua non sic sanguis potest confluere, licet etiam sanguis sit multus, quando iam peccat natura magis irascitur contra ipsum, cum grauior sit offensa quanto committens proximior extiterit. Neque locus eius est latus quod requiritur confluxui, secundum Albumasar, licet sit profundus & longus. Aut forsaisis hunc periodicare quis sentiet, non tamen propter maiorem motum ipsius percipietur, quia motus parui latent secus maiores, de somno & uigilia. & in de sensu & sensato. Motus maior semper minorem depellit. Dicendum etiam quod motus non est hic humorum proportionatus elementis prout habent ipsum à generante, sed ab aliqua uirtute superiore eis (ut ostensum) indita, neque confluxus humorum euenit motu orbis aut planetarum totali, sed ut uisum magis particulari ut lunæ per quadras quæ secundum Al. habetium dat dispositionem suis omnibus aliis planetis id est reddit se dispositam ad omnium planetarum suscipiendam uirtutem. Cui Saturnus in hoc aduersatur, humores etiam ut ostensum motibus & quietibus apparentibus particularibus & naturis simulantur utrunque. Et nosce quod huiusmodi confluxus & motus est naturalis natura uniuersaliori ut lunæ: licet uolentiam quandam importet ratione naturæ particularis ut aquæ uel humorum ut apparuit differentia. 15. Ad aliud dicendum quod sit a natura inferiori tanquam à natura disposita uirtutem superiorum recipere: ab his autem tanquam ab imprimente causa primordiali. Neque est quod superiora non agant: quia non communicent in materia, cum hoc uerificetur in his quæ agunt formaliter: non autem in illis quæ efficienter. Superiora namque non sunt ut hæc formaliter talis: sed effectiue. Non enim sunt composita ea elementis: sed est quinta per se altera essentia: primo cœli & mundi. Aut una est omnium materia per indifferentiam formarum. Ad aliud dicendum quod quando quis ægrotat sic humores ac eius complexio animæ instrumentum sunt distracta ut agentis non obediunt principali: sed sponte seipsis ab eius recedant principatu: & ideo alteri naturæ subiacentur ut superiori. Ad aliud dicendum, quod non solum calidum & uentositatis exquiruntur ad motum, uerum etiam plura tam materię attributa, quam agentis, ut ostensum antea. Melancholia etiam uentosa innaturalis est magia de qua sermo Arist. non autem naturalis ita. Ad aliud dicendum, quod ar-

guit difficultatem confluxus, non autem impossibilitatem: licet enim melancholia terræ proportionetur, non tamen est terra omni uisibilis habet humidum tantum ut sub natura collocetur humoris. Et namque corpus humidum curret. Similiter si non mouetur secundum totum terram, aut partes propinqua centro: alie tamē distantes successiue motu mouentur octauæ spheræ: ut dictum est differentia. 16. Neque cholera ratione saltem subtilitatis aquæ, ut declaratum exiit opposita.

Quæstio III.

Quod sanguis putrescens generet febrem sanguineam, & non cholicam seu aliam ostenditur. Hippo. contra Gal. introducto. 4. prima. Rursus Ioannitus. Simples quatuor sunt aque singulares putredinis modi: quorum primus ex putredine sit san. comburentis utranque partem interiorem & eteriorem, ut est synochus secundus &c. Eti. Aurelius. Species februm ea corrupto humore sunt quatuor: synocha: anserina: acria, & tetrata: humores autem sunt quatuor solum. Item tertio crisis corum. Febris est conclusa quam Græci nominant synochum: & est illa quæ moratur ab initio sui esse usque ad horam crisis secundum similitudinem dispositionis unius, in qua non est apparens additio neque diminutio, uerum in omnibus diebus æqualiter. Sed si san. conuerteretur in cholera, esset additio & diminutio manifesta, quia cholera mouetur per tertium etiam si faciat febrem continuam, præter forte causam qualis non est febris huiusmodi. Adhuc sanguis putrescens febrem generat uel sanguineam & ita quod intentum: aut aliam, non quidem phlegmaticam: cum san. non conuertatur in phlegma. Quod enim coctum est, aut assatum, in crudari non potest. theo. primo. & colligit. 3. Neque quaranam, eo quod ipsa incineratione humorum post putredinem relictæ causatur, sibi humiditate etiam adueniente eatranea. Quæritum autem actum putredinis importat, similiter neque cholicam uttertianam: etenim huiusmodi cholera causabitur, aut per superfluum in hepate sanguis decoctione, qua quidem sic febrem non inducit. Aut per putrefactionem generatur ex sanguine. Sed cum huiusmodi generationem præcedit putredo, & ipsa sit causa febris cōiuncta & immedie, aut erit febris sanguinis antequam sit eius conuersio in cholera, & quàm febris cholerica. & ideo. A. Putredo non habet tempus & conuersio sanguinis in cholera non fit nisi in tempore. Paliu. cholera cum facili sit motus & transiens in aliud, sui caliditate transmutationem inducens, & illam siccitate subleuens, uideatur quod eius putredo febrem non generet cholicam,

lericam, sed melancholicam magis. Cum igitur si quod minus uidetur adeste adest, & quod amplius. Sed cholera sit agilis & permutabilis febrem facit tertianam & non melancholicam, & san. continuam putrescens generabit sanguineam & non cholericam. Amplius illa uidetur feb. sanguinis cui cura adhibetur ægritudine sanguine libro Glauconi inscripto; distinguendi quidem synochæ species tres conditionibus existentibus in omnibus ad sanguinis euacuationem; maxime ex uirtute, & ætate sumptis euacuanda multitudine fore præcipitur sanguinis grauidissimo 9. therapeutica. inducitur duo iuuenes liber, scilicet & seruus, quorum unus patiebatur synocham inflammatiuam sine putredine, alter uero synochum cum putredine, quibus usque ad lipotomiam sanguinem præcipitur euacuari. Cum igitur ipsiuseductio tanta propria sit ægritudinis sanguineæ: non enim in cholericæ, aut melancholicæ, aut phlegmaticæ ut sic expedit san.eductio necdum tanta. Putrescens itaque sang. febrem faciet sang. & non aliam.

Huiusmodi quoque oppositum crîsum & febrium secundis capitulis secundis. Apparet enim superficiei nus quod sanguis cum putrescit: eius subtile conuertatur in cholera, ex quo quidem febris generatur cholericæ & non sanguineæ, grossum uero in melancholiam. Cû enim aliquod putrescit, duæ partes in ipso consurgunt grossum uidelicet & subtile: transcendit enim maxime sang. cum putrescit, hic subtile quidem cholera rubea fit, is autem nigra febrium 2. Et confirmatur quia crîsum prædicto. Addiscere oportet in sermonibus qui febrim quod tria uerua sunt genera earum quæ in putrefactis accenduntur febrium. Nam quedam quidem in rubea cholera: & plurimæ sunt hæc. quedam uero in nigra: & aliz in phlegmate consistunt. Rursus humores sunt filij elementorum. Cum igitur sang. filietur & proportionetur aeri, aut autem inter cætera elementa est altera bilis & permutabilis: differetia 14. & 16. Sanguis quidem præliis humoribus permutabilis existens putrescens in suis non permanebit terminis, sed in alios potius conuertetur huius. Et confirmatur, quoniam sanguis inter humores sicut iradunt solus est dulcis. Quod autem est huiusmodi quando supercalescit & inflammatur uelociter permutatur in cholera. Et ideo prohibet ne in febribus & maxime cholericis administretur dulcia. Amp. si sang. putrescens permaneret san. & non conuerteretur ad cholera, iam ægritudo eius curari non posset, cum ea reamus medicina san.eductiua. Refert enim Gal. de uirtute pharacorum libello se præfide induxisse oculis ligatis, ne aliis panderet illum suspendi, qui medicinam nouerat

sanguinis eductiua, propter quod sang. putrescens ægritudinem aliam seu febrem generabit & non sanguineam.

Propter primum quidem sciendum, quod quid sit sang. cum aliis hu. ostensum est differetia 33. & 30. quid nero putredo & febri differetia 159. & 87. Febri autem sang. siue sit ex inflammatione ut synocha, seu ex putredine ut synochus ipsius 13. sunt quidem 9. de inge. febrium 2. & colligit 7. Vnus quidem æqualiter extensus Græce dictus homotepicus, sicut enim incipit: ita usque ad statum permanet cum æqualiter resoluatur ei quod superbullit & putrescit cæteris maior & periculosior: ad Glauconem primo. Et alius augmasticus, siue augmentatiuus dictus à principio usque ad statum crescens continue. Minus enim euaporat in fumum quàm inflammetur & computreat. Et tertius peraugmasticus seu deaugmentatiuus oppositus in causa medio. Singuli tamen hi synochæ adaptantur de putredine sang. facti: quauis secundum Gal. synochæ conueniant consequenter ac cæteris putridis etiam secundum Ioannitium. Sicque percepi.

Propter secundum uero sciendum prius quid dixerunt de hoc moderni & antiquiores deinceps. Cuius quidem primi gratia, nosce quod nonnulli utrinque argentes in quæsto hæsitauere responsonem aliquid ob crimen, quod A. imponit Gal. nescientes uiam ueritatis fortassis. Aut non audentes eligere partem circa id quod hætenus diuile reputatum: sed se potius exultantes: non esse literatorum, uirorum licet ditimere: sed sopire & cum honore sepelire. Alij uero protulerunt semet non esse iudices inter Gale. & Auer. neque partem uelle, sed sufficere quod: ad utranque inducitur est partem. Propter uero, huiusmodi secundum sciendum, quod fere omnium medicorum sapienter sermones indistincte, quod sang. putrescens febrem generat sanguineam ut Serapion. Ras. Halyabba. Alexander Isaac & maxime A. quod & Gale. scripsit 9. de inge. inquit quod in iuvene seruo patiente nocte synochum de putredine sang. in tertia nocte, neque in alijs fuit factus parotismus per tertiam. minor tamen quàm prius aliqua facta febre fuit tamen peraugmastica siue declinatus. Non igitur sanguis conuersus fuit in cholera, febrem cholericam & non sanguineam causans. A. nescio contra Gal. hic grauitè proteruit, non enim sufficit ei hunc irrationabiliter reprehendere: uerum & sermonem eius mendacium continere ait purum. Et simile in ipsum adducit. 9. animalium cum inquit ollescit medietatem uniuscuiusque rei, & sciuisse multum de ramis: sed radice ignorasse sciunt. Cuius quidem series 4. prima opinatus

est Gal. non fieri febrem sanguinis ab eius putredine: eo q̄ san. quando putrescit fit cholera & non permanet sang. Fit ergo tunc febris cholericā & non sanguinea: fitq̄; causon & tertiana, & curat ipsam curatione causonis & tertianæ. Deinde hunc A. sermonem impugnauit dicit contrarium fore Hippoc. & veritati non conuenire. Assumit enim hanc orationem. Si quis quando putrescit fit cholera. Et dicit q̄ ex ea potest duplex capi intellectus. Quorū unus est, quod post putredinem iam factam san. conuertatur in cholera. Alter vero ut in ipsa fieri putredinis hoc contingat, sicut nomen sapit hic magis alterationis & putredinis huiusmodi, aut duplicem intellectum orationis præfatæ multipliciter impugnat, primum quidem tripliciter. Quoniam sang. quando putrescit non fit conuersio solum in cholera, verum eius grossum conuertitur in melancholiā: non igitur fiet febris cholericā tantum, sed etiam melancholica. Adhuc consideratio quam intendimus est in fieri putredinis: non autem in facto esse ipsius: quod fieri putrefactione contingit: putredo enim in fieri est causa febris: non autem in facto esse. Eū. non est necesse q̄ si cholera fiat post putrefactionem sang. q̄ sit putrefacta & febrem faciat, quoniam ex putrido generatur quod non est putridum: ut apparet in generationem uermium ex stercorebus. sic igitur falsus est intellectus denotans sanguinem quando putrescit id est post fieri putredinem, eō uerti in cholera. Dico quoque q̄ ipse Gal. hunc non habuit intellectum: cū febris sit ægrotudo siens putrida & non facta. Neque etiam ut dicatur ad primum grossum terrestre sic est natum gignere febrem melancholicam ut subtile igneam cholericam: quoniam parum est quid humorum fieri terrestre. Quod lignorum ostendit incensio, ubi per plurimum euaporat modicum autem subsidet: febrium 1. Est etiam terrestre modicū relatione eius quod effumat & in cholera conuertitur: plus nanque ualde distat cholera à melancholia, quàm hæc à sanguine. Intellectum uero secundum ut q̄ in ipso fieri putredinis, san. conuertatur in cholera tripliciter similiter deprauat A. Hipp. quidem primo dicentem febrem san. ex eius putredine fieri: & hanc ueritatem sanam existere. Rursus putredo est uia in corruptionem: putredo autem non habet tempus. Et conuersio sang. in cholera fit in tempore. Vult igitur habere q̄ cum putredo præcedat conuersionem sanguinis in cholera, & ipsa sit immediata causa febris & perfecta q̄ aut conuersionem san. in cholera febris erit sanguinea. Adhuc simile est de sang. & alijs hu. sed alij humores quando putrescunt permanent idem, & febres sibi generant proportionales, ut puta phlegma putre-

factum phlegma dicitur & febrem phlegmaticam induci: & sic cholera, & melancholia. Neque conuertuntur ad inuicem nisi post putredinis complementum: propter quod & san. putrefactus & erit sang. & febrem faciet sanguineam. Subtile quoque Gal. & Auer. hic eius fautoris quis consideras intellectum & magis ueritati attendens, quæ inducitur sunt per A. in destructionem intellectus secundi, propositionis præmissæ poterit breuiter remouere. Et primo quis ad auctoritatem Hipp. quid dicendum apparebit consequenter. Ad aliud quod dicit putredinem non habere tempus: conuersionem uero sang. in cholera habere: dicit aduersarius id non continere ueritatem: secundum perspicacem Ari. intellectum: eo q̄ putredo seu putrefactio est alteratio quædam, sicut & nomen indicat actionis. Alteratio enim & actio omnis manente subiecto fit in tempore. phisicorū 5. & de gen. primo. Neque etiam conuersionem sang. in cholera dicit antiquista habere tempus: sed in instanti fieri: eo q̄ illud est generari. generatio autem fit in instanti ibidem: cum sit formæ substantialis datio: impartibilis enim substantialis forma: & omne quod mouetur & alteratur fit diuisibile. In hoc uaque differt alteratio à generatione: quoniam alteratio fit in tempore manente subiecto: generatio autem in instanti hoc toto in hoc totū transmutato, de gene. & cor. primo. Hæc quoque quis adiuuiculator A. prohibere non potest uere nisi dicat A. improprie suscipere alterationem ut paruum tempus eius præcedens generationem uocet non esse, uel habere tempus: & etiam improprie generationem non pro datione formæ in momento accipit: uerum generationem appellat dationem formæ quæ alterationem etiam temporalem præuentem introductionem formæ in materiam. Adhuc in eo sic exposito ita & fulcito: quoniam si paruum tempus uocet non habere tēpus cum eius improprietate: in illo etiam exiguo temporis poterit esse aliquod tempus: in quo & febris erit sanguinea: & postea cum sit citi motus trās mutabitur in cholericam. Quod ex ipsius apparet terminatione multociens in quarta tertio cñsum: & 4. prima, ut manifestabitur ex dicendis. Ad tertium præinductum A. dicendum: q̄ non est simile de san. & alijs hu. Nam sang. cum sit temperatus filius & amicus nature indiuisibiliter magis & minori latitudine terminis angustioribus terminata alij hu. se habet ad naturam: simplicior enim est alijs. febrium secundo. Reliqui nanque hu. distemperati magis & quasi ipsius inimici ampliori latitudine habent ad naturam: & eos sub maiori latitudine dimittit peccantes. Sanguinem enim amplius corrigit, ut pater filium. Quod apparet,

paret. proble. 5. Mensurata enim corporum laborant multotiens & permutantur facile: eo quoddam temperatum propter partium homogeneitatem redactam ad quoddam fere punctale & contrarietatem quam habet cum extremis: plus paratum est & velocius permuari. Testor quoque A. minus sufficienter considerasse ac superficiteus sermonem Gale. & ideo magis gratis ipsum condemnasse. Quod ni appareat: denique sermones adducuntur ipsius ut elarius eius habeatur intellectus intentio. In secundo nanque febrium nulla deterior est hac inuestigatio: verum velut in aliis hu. accenduntur ex putrefactione febres: ita & in sanguine putrefacto: quam quidem questionem visus est determinare in alteram partem magis: ut quando sang. in aliqua particula contra naturam continetur, & non in venis, & corde, velut in apostemate phlegmatico. Inquit enim quando in aliqua particula animalis coaceruatur sang. amplior super virtutem oppilans propter grossitatem parua vasa vel obstructus propter multitudinem sicut coniungit secundum bubones & pustulas & vniuersaliter dicendum secundum omnes phlegmones. In talibus nanque dispositionibus duplici de causa corrumpitur sanguis quia non transpirat: tum etiam quoniam non detinetur a natura: hoc est in eius loco. quia sicut locus est, ita & natura operatur. Quæ enim hæc duo in se conueniunt: necesse est corrumpi & maxime velut in fructibus & seminibus apparet, & in sanguine extra locum suum situato. vnde apho. 6. Si sanguis in ventrem id est in concuitatem præter naturam effundatur: necesse est putrescere. Quod quidem hic Gal. determinat in pleuritidis. In his enim sang. transmutatur in choleram: ita quoddam analogiam per hoc parosis morum suscipiunt tertianæ. In quibus quantum sang. subtilissimum existit & pingue: in flammam transmutatur choleram quantum vero grossius in nigram. Secundo vero crissum. Quando sang. qui secundum naturam habet constitutus fuerit ut in rheumatico loco putrescit: phlegmon quidem passio est simplex, aut ab ipso febris accenditur similis maxime ephemeris: qui in bubonibus fontana bubo ex sanguine fit optimo, sed manifestum quoddam quando inceperit putrescere non vltra is permanet bonus, verum iam cholericus fit. Et constat ex hoc esse tria vniuersa genera simplicium febrium. Quæ nanque ex sanguine putrescente fit, iam qualitercumque cholerica: & reliqua. Non ergo simpliciter id esse asserit: sed cum modificatione quadam: apparuit quoque ex Gale. differentia 31. quoddam ipse artius suscepit sanguinem quam A. quare celebris potest in choleram permuari. Auer. quoque sententia huius licet occultius assimilatur

sermoni. In tertio nanque colligit. Febres sanguinis generantur propter eius exitum extra naturam in quantitate aut qualitate: sed eius exitus in qualitate debet esse paucus, quoniam quando exit multum, tunc debet agri-tudo attribui nomini illius agri-tudinis ad quod declinat, & illi cui dominatur manifeste: hoc est: quia quando nimis inflammatur debet attribui cholera. De hoc quoque quarto eiusdem. Febres sanguinis typum non habet: eo quoddam sanguis ipsam faciens est in venis. Excepto si fieret propter apostema nominatum phlegmon: quod in membrorum aliquo foret generatum principalium: velut in hepate & diaphragmate. Tunc enim in hac febre paroxysmi erunt tertiani: similes cholera paroxysmi quia quando sang. supercalefit, ad naturam cholera declinat, & ideo in tali febre non est differentia inter febrem cholicam: cuius materia est intra venas: & istam nisi in magis & minus. Dico ergo ipse quoddam magis & minus speciem non variet, quoddam febris sangu. erit tandem specie cum cholera: cum sanguis fuerit conuersus in choleram. Dicit & denuo. Et verba Gale. varia sunt in febre sangu. quia aliquando dicit quoddam est cholerica continua, & aliquando quoddam est aliud a cholerica, & quoddam non debet attribui cholerica nisi quia non habet putrefactionem perfectam: quoniam natura istius febris est media inter febrem diei & febrem putridam. A. autem ut apparuit solum alterum puta primum accepit extremum. 7. siquidem colligit: duæ sunt species febris sanguinis: una dum sanguis nondum est putrefactus, & alia dum sanguis iam putrescere incipit. Signanter enim dicit dum incipit putrescere: quia procedens in putredinem transmutatur in cholera & eius febre. Sic igitur vult quod sanguis non multum in putredinem mutatus feb. causet sanguineam. Quando vero vehementer in choleram conuertitur: febrem inducet tertianam.

Propter tertium quidem sciendum quoddam ex his diligens superueniens intellectus veritatem poterit animaduertere. Dico ergo ne restantur febrem sanguinis duplicem existere, vnam quidem ex ipsius inflammatione con-surgentem: quæ febris ebullitionis seu synoeha appellatur inflammatoria ex peccato eius: con-surgens quantitati principali, & qualitati minori sine illius putredine de qua non hæbitur. Est autem & altera febris eueniens ex sanguine peccante in qualitate cum quantitate, do nec putredinem adipiscatur: qui quidem ante continetur in locis propriis: in venis & arteriis: vel præter naturam extra locum suum in ventrem effusus. Si quidem prius cum ei non inie-

nisi una quasi causa putredinis: puta prohibita transpiratio. Manet enim in loco suo hic sanguis. cum uero vehementer impingatur ad inflammationem & putredinem. poterit aliquando in putrefieri modice & febrem sanguineam generare: absque eo quod in choleram transfundatur. unde secundum febrium. Quocunque sine periodis uisus in his patiens est locus præcipuus. Sed humores qui sunt secundum arterias & uenas uniuersas & maxime qui secundum maximas & calidissimas sunt, uel propter aliam quandam causam ut in ephemeris: aut propter putredinem ebullientes accendunt febrem unam synocham à principio usque ad finem indefinientem: usque intantum permanentem & comburentem hominem donec generantes eas humores eorum consumantur aut digerantur uel utrumque patientur. Apparet igitur ex hac serie quod non sentit sanguinem etiam corruptum in choleram permutari uelut in præmissis. Quod ostendit quia in talibus aliquando in prima dierum cognitione apparuerunt putredinis: interdu in tercia & nonnunquam in quarta. 9. therapeutica. Et sic diu remanet sub febre sanguinea antequam in cholericam conuertatur: imo per totum si signa non appareant putredinis: usque ad quantum cum plurimum ut tertiū terminetur in quarta. Sic itaque pono quod in huiusmodi dispositione puta in febre quæ debet terminari in 7. quæ pertinet dies aut quatuor sanguis ille putrefactus non multū sub forma adhuc lata san. remanebit & febre inducet sanguineam: In alijs uero diebus supercalefactus amplius & putrescens in choleram paulatine conuertetur & febre generabit cholicam. Quod si fortassis interdū motus non percipiuntur cholericæ tertianæ, hoc euenit: eo quod materia in locis propinquis existit eordiu in eausone apparet etiam phlegmatico. In quo additio etiam & diminutio esse non ponitur. Aut propter ipsius quantitatem sicut ostenditur in phlegmate etiam extra uenas existente quod & fere eius continuat afflictionem absque quiete. differentia priori. Itaque cum hic plures concurrant causæ: ut quantitas: siuis intra uenas & prope eorum non est mirum si motus sit continuus: Si autem san. putrescens continetur extra uenas: tunc cum sibi duæ prius occurrant putredinis causæ uidelicet prohibita transpiratio, & non à natura retentio, uel non in eius loco: sed in neutram effusio putrescens: amplius & citius conuertetur in choleram & febrem cholericam generabit. Et istum quidem modum situationis sanguinis in præhabitis uisus est Gal. intendisse cum Auer. & maxime febrium secundum. unde 9. de inge. Si putredo quædam uel ab initio cõfessim, uel posteriori innata fuerit: secundum uniuersas quidem uenas & maxime secundum magnas putredine existente:

synoche. i. continuæ generantur febres. In quibus equidē non apparet additio neque diminutio exacerbationis quod apparet sanguini iuxta sit. Phlegma enim omni die mouetur: cholera autē de tertio in tertium: melancholia uero de quarto in quartū: sanguis autē continuæ & æqui formiter propter eius continentiam intra uenas & grandem quantitatem quibus corpus continetur. differentia 88. Subdit autē denuo. In una uero particula animalis locatus. scilicet sanguis: eas quæ secundum periodum aliquam puta tertianam exacerbantur uidelicet febres cum sanguine propter causas prædictas hic magis & uelocius conuertatur in cholericam. In tali namque dispositione situatus in primo die aut minus uel parum plus putrescens conuertetur in cholericam: & demum febrem facit tertianam. Et quia Gal. ut prædictum magis in hoc loquebatur intellectus: dixit sanguinem supercalefactū & putrefieri incipientem in fluxu cholericam transmutari. Non tamen propter hoc negat quin etiam in tali possit febris sanguinis generari in principio principiantem putredinis maxime. Quod autē uoluerit febrem sanguineam fieri ex sanguinis putredine, innuit eius fidelissimus interpretū Haly. theō. 8. eo quod ipse cum Ioaninito etiam ait febres putridas fore quatuor ex quatuor humorū putredine factas, scilicet febrem sanguinis continuam synocham appellatam ex putredine san. fieri. Quod ostenditur. sicut enim in humiditatum prima locant febrem putridā secundum eius principium & terminum a quo: secundum autem ipsius terminum ad quem febrem ethicam, quæ sunt febres genere differentes: multo magis febres genere comunicantes poterūt in eodem humore consistere. si autem aliter permutatō & transductio. Sic igitur considerans subtiliter & Gal. quod feb. utroque modo disposito & situato sanguine non diu stat aut parum ualde quin in choleram permutetur: uel quia simplicissima sanguinea & uerissima febris non permanet penitus: dixit tandem sanguinem putrescentem in choleram conuerti & febrem eius. Sic itaque exposita est recta Gal. intentio quam Auer. imitatur. Et de febribus manifestatus est A. qui fortassis eius satyrico intellectu alteram solum respexit partem uolens eius dente leonino lacerare ueridicam Gal. licet in pluribus locorum ipsum se illius fatuor interpretem. consequens quoque committitur.

Propter quartum uero sciendum. Ad auctoritatem liquidem Hippocratis A. & cæterorum aliorum uolentium sanguinem putrescentem febrem generare sanguineam: dicendum ut expositum id non fore contra Gal. mentem aut amplius, & etiam citius permutari in aliam, quā ille, & maxime cum plus loquatur de a posteriori febribus sanguineis. Ad aliud dicendum quod

quod sicut caufon diminutionem & augmentum non recipit sensibiliter, eo quod materia fixata est in locis vicinis cordi, ita neque synochus propter eius quantitatem uirtutis aggrauationem, & putredinem fumum plurimum cor continue petentem, intantum ut diuersitas in ipso manifestetur minime. Ad aliud dicendum, quod sanguis putrescens & febrem generat sanguineam ut apparuit & alias. Nam putrescens potest considerari tripliciter: quia aut erit in principio principiante vel prope principium putredinis & sic febrem generabit sanguineam: aut in medio putrefactionis, & tunc cholericam faciet: secundum tamē prius: ut habitum, & posterius. vel in fine: & ita febrem inducet quartanam. Ad aliud dicendum, quod ipsa cholera licet sit facilius ad motum & maxime localem quam sanguis sui leuitate & calore: non tamē ad motum alterationis puta ad putredinem: diutius enim quod sanguis est alterabilior alijs huiusmodi cum putredo calido & humido conficiatur qualis est sanguis natura. Sanguis etiam cum permuteetur in choleram versus, febris accedit ad naturam. Cum uero ea in melancholiam recedat ab eadem. Ad aliud dicendum, quod licet multum veritatis adducatur tamen quid falsitatis includit. Non enim propter sanguinem tantum expetitur phlebotomia: uerum etiam propter alios interdum huiusmodi abundantes cum sanguine: 8. apparet de inge. tertio; prima. Verum tamen non tanta in his queritur euacuatio: quanta cum scelus aut precipue peccet sanguis. Inducta autem Gal. in oppositum iam apparuit quomodo sint intelligenda. Aliam siquidem rationem subsecquentem cum eius confirmatione concedo. Conatur enim sanguinem ex eius aptitudine ad putredinem nimis, tādē in choleram posse conuerti: & in febrem tertianam posse transducere. Vel dicendum, quod tria sunt genera febrium sub diuisione per continuam & interpolatam. unde crisim. 2. Tria sunt genera febrium simplicium, quorum unaquaque in duas prius inciditur differentias: aut enim continuatur, uel definitores erunt. huiusmodi autem subdiuisionem febrium sanguinis cum sit continua omnis non recipit, uenas etiam possidens maiores quare in illis non potest tribus associari generibus. Ex ideo in eo non dedit Gal. cognitiones febrium sanguinis. Aut melius intentione ipsius ibidem non erat ut ait multarum immanifestarum febrium intentiones monstrare: verum paucarum & manifestarum exercitationis gratia. Intentiones uero febrium sanguinis erant difficilis cognitionis valde. unde febrium. 2. In reliquis erat utique nulla deterior hac inuestigatio. Non minus etiam id ad libros febrium interiorum ac typhorum pertinet 3. apparet de crisi. Ad vltimum dicendum

quod quamuis propositum conetur concludere, tamen posset calumniari utcumque: posito etiam quod non sit medicus scita apud quosdam sanguis educitur: scitur tamen apud alios aut scitur differentia. 744. Vel dicendum benignius, quod phlebotomia non solum debetur peccato quantitatis, sed etiam peccato qualitatis, puta malitiae sanguinis uel utriusque: licet non ita proprie uelut quantitatis peccato, quarta primi. Quod etiam satis innuit ingenue. 9. differentia 755.

Quaestio 1111.

Quod febris sanguinis cum alijs componatur febribus videtur: quia prima quarti non acquiescitur opinioni eorum qui dicunt duas febres continuas non adinueniri componi scilicet duae tertianae. Cum igitur febris sanguinis sit febris continua, ipsa poterit alii scilicet continuam commisceri. Ad hoc componuntur febres quae sunt diuersorum generum, ut ethica & putrida; quae incomponibiles esse videntur. Igitur componuntur per amplius quae sunt unius generis, cum sint propinquiores, ut sanguinis putrida cum alia putrida, quae putrida cum ethica. Amplius simile videtur de febribus & apostematibus cum fiant ex eisdem causis: sunt. n. formae ipsorum similes. Sed apostema sanguis componitur cum alijs: ut cum cholericis & ceteris. 3. crisi. & 14. de inge. Rursus si causat ariditatem seu febrē: illud de cuius natura minus est hoc facere puta sanguis qui ponitur in Gale. & Isaac familiaris & filius naturae, multo magis habebit causare illud quod non sic diligitur a natura: humores enim non putrescit nisi ad regimen destituta naturae. febrē primo & secundo. Itaque ipso putrefacto & febrē faciente: alij qui eo regebantur humores putrescent & febrē facient. Itidē cholera minus putrescibilis sanguine, compatitur secunda: alia febre, ergo sanguis multo magis copatiatur. Itaque febris sanguinis cum reliquis componitur febribus.

Huiusmodi quoque oppositum monstratur: eo quod a nullo fere auctore inuenitur febrē sanguinis cum alijs componi febribus. Ad hoc talis compositio aut erit secundum compositionem, uel commitionem: quod esse non poterit, cum sanguis sicut tegit tunc & magnescit super alios humores, ita & putredine eius ad se, quod est putredinis aut extraneitatis a liorum humorum attrahat. Aut secundum viciniam, cum non ponatur secundo de crisi. & 8. theo. nisi hi duo modi, hic autem etiam fore non potest: quia ibidē & febrē secundo. non dicitur componi nisi quocidius cum tertiana, aut quarta; uel aliter quocumque modo componi adinueni. Cum igitur non ponat febrē sanguinis cum alijs componi febribus, & sit ipsum dare sufficientem, febris itaque sanguinis cum alijs non componitur.

Propter primam uero sciendum quod quid sit febris, quidque febris sanguinis, & quora quz situm docuit antedictum. Compositio liquidem febrium enodetur realiter primis, deinde nominaliter. Quartum liquidem prima, & diffrentia utrunque. 87. Compositio febrium tripliciter existit. uox quidem in genere remoti: & alia in propinquo: tertia autem in specie. In genere liquidem remoti: seu ethica compositio cum putrida. In propinquo puta quando febris ex diuersis huius causis inuicem componuntur: ut quotidiana cum tertiana, uel cum quartana. In specie quoque sicut quando una tertiana componitur cum alia, aut quartana cum quartana, uel phlegmatica cum phlegmatica. Et compositio liquidem huiusmodi duorum modorum ultimorum licet maxime hoc sit in secundo, aut erit secundum permissionem, aut secundum uiciniam seu affinitatem: ut tatum a Gal. & Halyab. cum Auic. Voco autem compositionem secundum permissionem, quando duae materiae differentes, febrem facientes una componuntur, aut multum, ut phlegma cum cholera, & melancholia. Aut minus ut una species cholera cum alia, ut citrina cum vitellina, uel phlegma dulce cum aceroso uel insipido: & huiusmodi. Et talis compositio, aut erit intra uasa, sicut in febrilibus duabus continuis: aut extra uel in interpolatis. Compositio uero secundum uiciniam est, quando duae materiae diuersae juxta secundum modum, aut eadem secundum tertium componuntur intra uasa, & extra, differtenter febrem causantes: ita quod una faciat febrem continuam: altera uero interpolatam. Adhuc & huiusmodi febrium modus compositionis est triplex. Aut enim febris una est alij communicans, aut subintrans, aut coalternans. Communicans dicitur quando duae febres, aut plures simul incipiunt. Subintrans uero quando uox superuenit ante praecedentis separationem. Coalternans quoque ut alia aduocatur post eradicationem praecedentis. 4. prima. Est autem demum secundum Halyabbatem attendere, quod praedictum compositionum quaedam dominia habent. Aliae uero nominibus carent sicut primae quae in genere remoto, uelut compositio est ethica cum putrida, ac etiam in propinquo cum aliquo, sicut phlegmatica cum quartana: & sic quoque in specie seu phlegmatica cum phlegmatica, aut cholericum cum cholericum. Secundum uero characterizantur alique sicut emittit febris appellata. Circa cuius quidem omeo diuersificati sunt febribus. Quidam enim rudiores dixerunt febrem emittit, cuius materia est phlegma intra putrefactum & extra. Quod tamen oppugnat omnino omnino cum emittit me diam nominet tertianam ab emittit quod est me

dia, & tritius tertianam: quod in praedicta phlegmatica non feruatur. Agatius autem febrem secundum uenerfas quae extenduntur tertianam uidetur emittit nomen: ita or confectatur eiusdem generis esse cum tertiana emittit nomen. Ex differentia uero in magnitudine paroxysmi habere ita igitur rationem nominis non seruat, sicut priores fecerunt, peccat. Et quoniam huiusmodi quaestio magis suot minimum quam rerum, in eis inquit Gale. dedignior immorari. Sunt & alij dicentes tripliciter fore emittit nomen: medium & maiorem: ponentes minorem quoad phlegma putrefcit interius: cholera uero extra: medium autem contra: minorem autem quando melancholia putrefcit interius, & cholera exteriora intra illud. Paruus emittit nomen in uasis phlegma recondit. Extetius cholera, medius contrarius illi. Possimus humor in eis maiori, fel coquit extra. Alij uero in sermonibus Galienipotenti promoti & Aurelij emittit tres dicunt modos: medium scilicet, maiorem, & minorem. Medius est qui tertianae coniungitur: maior uero quartanae: & minor quotidiana. Sunt & alij qui se modernos appellant, cum his conuolentes in omero, diuersificantes penitus in componendi modo: ponunt enim minorem emittit nomen quoad cholera est intra uasa & phlegma extra, medium uero contramissionem quoque quando cholera sit intus & melancholia extra. Qui praedictorum motus tollere conantes, molliuor suum dictum quibusdam probabilitatibus astruere: sed quia bas utantur ex libris non recte fortassis ascriptis sapientioribus & Gale. & quoniam tale litigium potius nomen quam res importat, impetruentur omittatur. Illustriores quoque medicorum inde quibus extat Gal. Serap. & Halyab. & utrunque A. cum Isaac uidentur tantum duas species emittit nomen ponere, purum scilicet seu certum, & non putum. vocant autem purum qui factus est phlegmate intra putrefactum, & cholera extra. Non parum quoque secundum Serap. est contra. Secundum uero quosdam: dum phlegma permanet extra, & cholera intra, aut ambae extra, uel utraque intra: quod est falsum: & quod tamen etiam est improprium quamuis secundum hoc toleret febrium. Emittit nomen enim est febris continua & horrida, id est in qua secundum ploriam partem paroxysmi adsunt horrores ex frigore & rigore commisti. primum autem non reperitur quando ambae materiae sint extra neque secundum enim sint intra feb. 2. Ista liquidem est compositio secundum uiciniam, in qua secundum crissum & febrium quod ad dupliciter potitur compositio uidelicet quoad cholera & phlegma ambae sunt totus, aut extra, seu quando cholera intus, & phlegma extra nel co

tra. Quod & tripliciter potest in his duobus ultimis euenire modis: quia aut cholera & phlegma sunt æquales & ita cetina emittitur, uel cholera superat phlegma: & sic incertus. Componitur etiam cholera cū melancholia his quatuor modis compositionis cholerae ac phlegmatis: quorum duo naturam habebunt emittitæ triplicis etiam præter alios febrium. 2. Potest & melancholia prædictis quatuor modis phlegmati copulari: nullus tamen horum emittiturum constituet cum tertianam saltem importet mediam confluentem à cholera. Et propter hoc tacenti ibidem. Sunt & alij omnem febrem compositam emittiturum appellantes, improprie tamen & communius. Proprius autem & uerius tenendum est quod dicunt isti postremo. Et quia talis perscrutatio magis est nominis quàm rei ait A. cum Gal. quod hoc non est de illis in quibus sit vehemens occupatio habenda.

Propter secundum uero sciendum quod quidā superficiales dixerunt febrem sanguinis ex putrefactione indifferenter componi cum alijs febribus inter uasa, seu extrinsecus. Et mouebantur: quia videbantur illia quod alij humores haberent habilitatem cum sanguine, sicut & alij qui putrescunt in adinuicem: & potissime quia sanguis est maxime paratus putrefactioni. Adhuc simile putant contingere in febribus, ut & in apostematibus contingit: sed apostemata componuntur ut sanguinem cum alijs. Quia quidem positio satis erronea esset inarticulata: neque eorum ualent (ut apparet consequenter) motus. Fuerunt & alij similiter dicentes: addentes tamen febrem aliorum humorum à febre sanguinea occultati. Quod conatur ex Isaac in fine febrium confirmare. Sic etiam dicentes cadunt ut & primi & peius forte sapientes: quia in dogma sempiternæ passionis incidunt.

Adhuc non est morbus aut febris qui sensibilibiter non laedit operationes: cum hoc sit de ratione morbi & febris. uide Ioānitius. Suoq; laedit effectum. Et A. impedit operationem ita ut retineatur. sicut enim pauca aqua mista multo uino: non debet dici aqua, neque mistum ex ambobus, sed uinum: & dicitur purum etiam quod modicum habeat mistionem, prognosticorum. 2. similiter & febres alij non erunt permanentes ut dicunt cum sanguinea febre. Sunt & alij modernorum scriptores: exprimentes febrem sanguinis componi cum febre cholerae tantum. Et cum alijs non ita nidentur adpartare. Et ponuntur triplicem modum compositionis: & triuom nomen: iuxta illud quod dicitur. 4. de inge. In apostematibus mistis ex cholera & sanguine. putant enim ut alij & hi simile fore in febribus & apostematibus. Illorum quidem exprimentes ulli hanc compositi-

tionem extra uasa contingere: & dicentes quod quando cholera æqualiter miscetur cum sanguine, dicitur causon synochus: & synochus causon. Quando uero cholera superat sanguinem causonem synochidem: quando uero sit contra synochum appellat causonidem. Quas etiam nentur compositiones per signa discernere. Horum autem sermo quia non exponitur duplicem potest habere intellectum: aut quod ista compositio febris sanguinis cum febre cholerae fiat ex cholera præexistenti cum sanguine: quod putat eos intelligere: uel ex cholera ea sanguine generata per eius putrefactionem: cum dictum sit prius quod sanguis conuertitur quando putrescit in cholera. Primus uero state non potest sicut tertio ostenditur dicendorum. Adhuc aut putredo cholerae præcedet: & ita ea maioratur super putrefactionem sanguinis. & cum sanguis putrefactus de se conuertatur in cholera: tunc maxime propter cholera fieri etiam conuersio in cholera: sicque febris cholerae & non sanguinis: uel sanguis præcedet & maioratur putredo super cholerae putredinem: & tunc sanguinis putredo totū ad se contrahere quod est cholerae putrefactum, & proprie cum sit cholera de facili motua. Neque etiam æqualis potest stare sanguinis & cholerae compositio: cū sanguis maxime superet cholera. Sunt etiam humores citissime permutabiles.

Propter tertium quidem sciendum, primo quod nullus fere Græcorū neq; Arabum expressit febrem sanguinis cum alijs copulari: sicut etiam apparuit per eorum sermones de compositione febrium inductor: quod innuit febrium secundo ita. febris quæ in sanguine constitit simplicior est his quæ in alijs sunt ha. Subdit etiam demum quod non sit possibile fieri putrefactionem sanguinis secundum quandam unam partem, & quandoque secundum aliam, præterquam si phlegmon colligens decineat incipientem putrescentem humorem. Axamen 4. prima de hoc quæsito sub fuga quadam talem protulit sermonem. Videtur Gal. quod febris sanguinis non componatur cum reliquis febribus: quoniam quando putredo est in sanguine est communis omnium humorum: & in hoc est contradiçtio quibusdam intentionibus suis: in quo non est necesse nos prolongare sermonem: quoniam non iungatur cum eo medicus: cum ipse obseruet quæ sunt sensus: hic autem alias febris non percipit febribus sanguinis permisceri: & si intellectus id fortasse percipit. Contradiçtio uero ea Gal. est forte quæ secundo febrium ita seriatur. Si uirtus fuerit imbecillis facta, causa erit ut non superfluitates solum: sed & sanguis ipse corrumpatur, putrescat, & febrem accendat. & tunc aliud quoddam principium efficietur periodorum paroxysmorum: & si prædictus

Et si seruetur calor, duplex erit species febrium adinuicem complicatarum. Et ista quidem eō traditio apparet in sequenti propositionum ex intentione Gal. Isaac vero in fine febrium. Quatuor febres impossibile est ut coniungantur, nisi quando duæ fuerint vnius materiei; & duæ nō, verbi gratia, sicut si fuerint duæ febres de choletā, & duæ de phlegmate, aut duæ de phlegmate, tertia de choletā, & quarta de melancholia. Sanguinis autem signa impossibile est ut cum aliarum signis appareat. Is enim in amplius ac abundantius in tanto corpore: quā omnes humores alij. Qui si putrescit & febrem generat omnes febres operit quæ cum ea sunt commixtæ: propter multitudinem suæ quantitatis, & obscurat earum significationes. Fortes enim res debilem denigrant, & multum pauciorum apparet in sole obtenebrante ignis splendorem. unde aphor. secunda. Duorum dolorum simul factorum maior minorem denigrat. Manifestum itaque quod sanguis ceteros humores si cum eo fuerint mixti, obscurat. Sic igitur noloit quod febris sanguinis non componatur cū aliis febribus ut sit febris apud medicum dicenda cum non appareant earum significationes neque læsiones manifestæ quas habet inducere. Ex his denique deinceps ostenditur quod febris per se sanguinis ex putrefactione non potest perdurans cum aliis febribus componi: febris autem accidens potest. Dico autem febrem per se sine apostemate per accidens vero quæ causa confurgit apostematis. Inquo etiam ex putredine: quoniam febris ex sanguinis inflammatione non potest cum alijs febribus ea permanente componi. unde Isaac. Neque sanguis est causa alieris febribus: licet calescat: neque ipse calefaciat alios humores. Eius enim complexio temperamento est vicina. Proinde si calescit & putrescit: non multum à temperamento egreditur. Quod autem febris putrida sanguinis per se alijs non componatur febribus ostenditur ratione: quoniam aut componetur febris sanguinis cum febre cholerica, aut melancholica, aut phlegmatica, cum non sit dare plures febres humorum. Et hæc aut intra venas, aut extra. Non intra, quoniam sanguis prædominans caliditatem & aptitudinem ad putredinem humorū omnium aliorum ad se contrahet. Quod firmatur. Quoniam maior motus depellit minorem & occultat de sensu & sensato, de somno & uigilia 3. & 5. de animalium generatione. Motus autem sanguinis & quantitas est maior immo maximus. Ad hoc de causa longitudo & breuitas uitæ. Minor flamma comburit à multa per accidens sibi subito furripienti pabulum seu alimentum. Similiter ignis minor corrumpitur à maiori. 3. ecc. & mun. & proble. prima. Multum ignis ad

se modicum trahit. Cum igitur febris sanguinis sit ut maior flama respectu aliarum, & ignis magnus multus, ipsa omnes alias comburet & ad se trahet. Febris enim sanguinis sic, alias hebetat & obtundit secundum Isaac, ut dolor maior minorem, non secundum eandem partem factus; cum uirtus sensibilis tota ad uel mediocrem decurrat dolorem, ita ut uirtus hic putrefactus. Neque potest componi cum febribus interpolatis, nō quidem cum phlegmate & melancholia. Tum quia huius materie non sunt paratæ ad putrefactionem quando sanguis putrescit. Tum etiam quia calidum & humidum putrefaciunt materiem ipsarum omnium ad id quod est in sanguine putredinis contrahitur & concurrit. Quod autem materia melancholicæ sit indispoluta ostenditur, quia in diuisionibus. O quā parum quidem quartana accidit incipiendo, unde 4. prima. Quartana plurimum uenit in successione agitudinum putidarum, & hæc est illa quam intendimus. Et alia esse non potest cum sequatur illa aliorum humorum putrefactionem. Si igitur raro per se uenit in corpore quantumcumque melancholicum, non quam tunc ueniet in sanguineo in quo nata est fieri sanguinis putredo, unde 9. de inge. Natura febrium sanguinis uera in macro scilicet, quantum ad melancholicum, & frigido quantum ad phlegmaticum amat consistere, quam plurimum autem in multum sanguinem habentibus, & multas carnes est ipsarum generatio. Simili quidem modo monstratur, quod neque phlegmatica materia sit cum sanguine putrefieri apta, cum non multiplicetur phlegma in corporibus in quibus hoc uenit. Adhuc neque ex parte causæ putrefactionis cum talis causa tollatur propter causam sanguinis putrefactiæ, ad quam contrahitur causa aliarum materierum putrefactiæ: imo humiditas ad putrefactionem. & causa tollitur putredinis à phlegmate, per sanguinem calefacientem & exiccantem materiam phlegmaticam frigidam & humidam & inopulatam redudentem, quæ erant putredinis causæ. Similiter id contingit in materia quartanæ maxime secundum alteram eius qualitatem; puta frigiditatem. Subtiliator etiam eius grossities caliditate affecta, quare febris sanguinis putrida cum febre phlegmaticæ, & melancholicæ nō coningetur quocunque modo, & minus cum febre choleræ. Ipsa enim ipsi caliditate, subtilitate & motus agilitate citissime in causas putrefaciennes sanguine deducitur. Cum enim ea de se sit mobilis conderibilis, puta quia in melancholiam transducitur. Multo itaque maius cum habebit aliquid ebulliens attractiū, ut putrescentis sanguinis feruorem. Si autem febris fuerit per accidens, ut quæ apostematizans

tunc

tunc poterit febris sanguinis cum aliis, & maxime cum cholericis complicari. Et id fortassis est in quo dicitur A. Gal. sibi in quibusdam aliis intentionibus contradicere: quod dupliciter evenire potest. Aut manifestius ceu quando duo fuerint apostemata, unum ex cholera in stomacho aut diaphragmate: aliud ex sanguine in hepate, vel pulmone. Quando igitur harum duarum putrescentium materiarum, duo confluent vapore putridi simul cor petentes, hoc enim contingere optime potest cum forma & origo vniuscuiusque permaneat ab alia separata: licet in processu fiat coniunctio aliqua. Aut manifestius ceu quando aliquod apostema ex cholera componitur & sanguine aequaliter maxime. Sicut enim materiae sunt compositae, ita & summi putridi erunt compositi, verum tamen non erit ita discretio ut in praedicta. Ex ideo forsauis quis non immerito febrem unam ponet compositam & non duas. Et quae ita sunt febres ex apostematibus compositae, & praecipue manifestae permanent saepe diu. Id autem non parum ostenditur ex eisum secundo ita. Quandoque accidit apostema in duobus membris diversis sicut splene & hepate, & facit vnum quodque accidere febrem: quae est alia à febre quam aliud evenire facit. Et quandoque accidit in membro vno apostema compositum ut ex sanguine: cuius apostema dicitur phlegmon: & ex cholera quod dicitur erysipela. Et subdit post pauca. Febris quae accidit ex apostemate sanguinis, quod est in aliquo membrorum, quodcunque sit membrum, est praeter febrem quae accidit ex apostemate existente in eo ex cholera: vnde secundo febrium (ceu tactum) non est possibile fieri putrefactionem secundum quandam unam partem: quandoque vero secundum aliam praeter quam si phlegmonem colligens detineat incipientem putrefieri humorem: si autem est putrefactio secundum unam partem & alteram, sicut diversa erit & loco & materia: ita & febris. Propter quod poterit febris sanguinis cum alia febris esse ita permanens compositio.

Propter quartum quidem. ad primum dictum, quod licet inveniatur duae simul componi continuas, non tamen propter hoc concluditur quod altera illarum sit febris sanguinea, ostensum sit ipsam non posse suo modo febribus aliis componi. quod innuit A. quando posuit duas continuas copulari iniquas. Deinde currunt iudicia vehementer & interpolationis. Id autem non evenit in febre per se sanguinea cum ea sit vere continua. Ad aliud dicendum, quod licet componantur febres diversorum generum: non tamen propter hoc quaedam propinquorum: eo quod febres remotorum generum sunt in diversis valde substantiis non ita se impediunt: sicut febres quae sunt in substantiis pro-

pinquis, velut ignes propinqui magis se impediunt & corrumpunt, & maxime cum sint disperses in quantitate, quam distantes. Febris autem sanguinis impedit febres alias ut declaratum est omnes. Ad aliud dicendum: quod non est simile omnino de febribus & apostematibus, quia in apostematibus minere putredinis sunt magis permanentes distinctae: quam in febribus. Concessum est etiam quod febris apostematis sanguinei potest cum alijs componi. Ad aliud dicendum: quod licet sanguis sit minus putrescibilis ratione filiationis & dilectionis naturae: tamen ratione suae complexionis calidae & humidae paratus est putrescere magis. Cuius quidem putrefactio ut ostensum ad se putredinis aptitudinem omnium aliorum humorum convergit: & actum etiam effectuum. Ad aliud dicendum, quod licet cholera ratione qualitatis non sit adeo putrescibilis ut sanguis, ratione tamen odii quod ad ipsam habet, naturam putrescibilis est magis: sanguis enim per oppositum dilectus est & amicus. Adhuc cholera non est tantae quantitatis quod ipsa ad se omnes contrahat humores & occultet velut sanguis.

Quaestio

V.

Quod ex cholera praeputina & æruginosa febris causentur videntur per Auenzoar & Auer. 3.4. & 7. colligit. Adhuc aphor. 5. primo commentarij. & 12. de inge. Quidam iuvenis euomuit humorem æruginosum innatum ut melius foret ipsam dicere certissimam æruginem quam æruginosum: omnisfaria enim fecit ut assimilabatur ærugini: vnde primum sicutus est: sed æruginem purgata cessavit febris & a spasmo statim exiit. Ex æruginosa siquidem deteriore cholera accidit febris. Rursus melancholia innaturalis facta ex adustione melancholice subtilis quæ ebullit & fermentat terram ut acetum inducit ægritudines: puta cancrum, herpetem, & tales 14. therapeutica. Igitur huiusmodi cholera cum non videantur sic saevire ut terram videlicet fermentantes febrem inducant: & praecipue quia febris est ægritudo hominibus appropriata 8. historiarum. Palin. Humor non putrescit: primo, & secundo febrium, nisi à regimine derelinquatur naturæ: hi vero duo videntur omnino ab ipsa derelicti, cum sint intantum depravati, & naturæ reddantur velut venenum oppoluit humanæ. Eui. Humor generati in venis sumus potest cor petere & febrem inducere. Sed cholera praeputina, prognosticorum secundo generatur in venis, & ostensum posse putrescere: poterit igitur sui putrefactione ad ipsum tendere. Amplius hæc cum sint calidae & siccae, proportionem habent cum febre. Sed eorum quæ habent proportionem & symbio-

& symbolum, facilius est transitus. 2. georati-
onis & corrup. & primi secunda. Io genere
proportionabili facilius est transmutatio. Et
tulciur: quia corpus humanum calefit causa
cholericu hu. prafini, primo prima, quod maxi-
me eueniet quando putrefcet. Rursus. Quz
à tota specie oaturz contrariantur humanz, ut
scorpionis, & talium uirus perperisimi, febres
inducunt. Non igitur propter istarum chole-
rarum malitiam: cum non sit tanta ut huiusmo-
di neotoorum cessabunt à febris inductione.
Iridem primo prognosticorum. Si fuerit in cor-
pore xgro antrax, uel carbunculus, & exicca-
tus colorem protulerit viridem: citrium uel
liuidum &c. Color autem viridis & liuidus his
attestantur cholericis. Ex quibus concluditur ex
huiusmodi cholericis morbum seu fe. causari.

Huius quoque oppositum expressius sensuit
Isaac febrium 5. Adhuc nullum inuocio prae-
ter duos antedictos: qui nedum febres: immo
agritudines exprimunt minime ex huiusmodi
sic prauis hu. causari. Amplius. Quod maxi-
me iofestum naturz continue educitur: & im-
manens febrem oon generat, quia ipsius est io
tempore generatio. huiusmodi uero cholere
sunt hz. unde & uidemus paroxysmaliter uo-
mitu expelli. Propter quod cholera prafina
& xrginosa non inducent febrem.

Propter primum quidem distinguendum in
cholera primitus. & deinceps locus generatio-
nis uideatur & situs. Propter huius primum
scieodum, quod choleram tribus inuenio susci-
pi modis. Aliquando nanq; communiter pro
omni humore: uiaat illud 7. aphor. Si febrem
non à cholera habeat &c. quoniam hæc febris
noo est humoralis: sed ephemera in spiritibus
fundata. unde 2. re. acu. hu. crudi de geore cho-
lerarum attrahuntur. Accipitur & proprie pro
cholera dicta ruffa, & melancholia, quare pri-
mo prima. Duz cholera phlegmati &c. Susci-
pitur & magis stricte pro humore amaro. vnde
4. re. acu. Cum dicat quis simpliciter cho-
leram: manifestum quoniam amara. Et tertio
alimentorum. Consuetudo est or dicorum
choleram simpliciter nominare: sine ea quz se-
cundum colorem appositione. Est autem hæc
cholera humor calidus & siccus. Cuius spe-
cies ab omnibus prioribus sunt positz 5. solū.
Est nanque una naturalis: quz est spuma san-
guinis: cuius color est ru. clarus, levis, acuta.
Quz & rubea dicitur clara & ruffa, & flaua, &
interdum citrinea. Est & alia inaturalis qua-
druplex ens: vna ipsius dicitur cholera citrina
sue crocea. Et pallida: quz ex commistione
conspicitur cholere naturalis rubez claræ, &
phlegmatis aquosi. Et reliqua vitellina dicta
quia vitellis ouorum similitur nouiter nato-
rum: confurgens ea commistione cholere na-

turalis pdisce & phlegmate coagulato vel gros-
so. Gal. de cholera oigra. Quz in uasis vel be-
pate etiam simpliciter apud hunc & Halyabba-
tem generatur: secundum uero A. cum adie-
ctione magis: inuenitur tamen secundo natu-
ralium: cholera adusta vitellina oominari. Et
ex naturali & huiusmodi commistione alias uni-
uersas fieri. Io quo Gal. præfertur aliis colli-
get tertio dicentibus choleram vitellinam mi-
nus calidam naturali. Sed iode cholera nigra
ut dictum & id tangetur cum reliquis siue ecō-
tra concidit Gale. unde prognosticorum 2.
Fluam quippe interdum uidere grossam & di-
ligenter flauam euomiram & deorsum proce-
dentem: quam siquidem vitellinam appellant
aliqui: multoties autem humidior minusq;
flauam, quæ proprius citrina oominatur: per
totum supisium mistum habens phlegmaticum
humorem subtilem aut aquosum quod super
fluum. Alimentorum autem primo. Chole-
ra hæc quidem xanta, hæc autem oca, id est vi-
tellina. Et secundum magis & minus utraq;
multiplicitatem obtinent: ut alias choleras præ-
ter uitam quz appareat in corporibus infir-
mis. Interiorum uero quito. Vocat chole-
ram puram q. vitellum oui. postea uero quan-
doque uisidus ostenditur. Sicigitur alia uide-
tur ab adusta: Potest tamen ad Auer. respon-
deri, quod cholera vitellina licet dicatur adusta
à Gale. non tamen adustione tota secundum
quam hu. incioerantur oigrefacti, sed talis est
potius diceoda supetassaria quædam contermi-
natio. licet enim calor fortis adustionem iodu-
ceret: materia tamen resistit frigidityte phleg-
matica inata illud prognosticorum secundi. Con-
tineotis sputum album viscosum rotuodum à
phlegmate accidere adusto. Et ideo remanet
humida viscosa: adustione etiā in ea cōcessa. p-
pter hoc nō habet de hoc Auer. alios mordere.
Neq; similiter quia intensior est in colore citri-
na. igitur est calidior ea. Dicendum etiā oon va-
lere: quia color noo datur solū qualitati: sed ad
hoc etiā operatur substantia rara uel densa. Nā
substantia subtilis mious colorē inteodit: gros-
sior aut magis ut cholera flaua ostēdit sangui-
nis citrina & vitellina. Inuenitur & alia species
cholere dicta prafina, i. porralis: colorē nanq;
soliōrū refert porri & ea ipso ēt georatur. Est
& alia ppter similitudinē quā hēt ad colorē gru-
giois grā: fruginea dicta seu xioaria: & quia ēt
similem ut acutā & corrosiuani habet qualitatē.
Vrit enim in modum ueneni cum ex nimia oas-
catur adustione. Et contrumpunt hæc duz for-
mā specificā caloris naturalis: sicut & uocōū.
Sunt nanq; de genere uocōnōrū. colliget. 3. cū
aliis cæteris, quarū origo magis existit à stoma-
cho. Haly. uero addit vnum inaturalē mo-
dum habentem scilicet colorē indicis: quz siqui-
dem est

dem est expositio eius quod dixerat prasinam. Vel fortassis consurgit per modum adustionis sanguinis ut apparet per A. consequenter. Ipse nanque tanquam medicinæ sufficientior compilator, septem ponit cholera innaturalis species. Non enim expresit famosas solum, uerum & infamosas. Cholera nanque innaturalis efficitur, aut quia sibi cômisceatur res extraneæ, uel quia in seipsa causam acquirit innaturalitatis. Et prima quidem duplex existit. Nam alia est nota famosa, quod dupliciter etiã aduenit: quia quod ei adiungitur, uel est phlegma tenue, & sic est citrina: aut grossum, & citra uitellina uel dictum à Gal. extat ante. Quædam uero minus cognita & famosa est cholera quæ dicitur adusta, quæ etiam dupliciter consurgit. Aut enim cholera rubea in seipsa comburitur: ita quod subtile & cineritium remaneat simul iuncta, uel ut cholera nigra ab extrinseco cholera accurrit naturali & sibi admisceatur, quæ minus est mala prædicta quæ interdum euacuari contingit. Quæ uero ex se corrumpitur ipsa etiam duplex inuenitur: nam una huiusmodi magis generatur ab hepate: quæ est subtile ex adustione sanguinis generatum, cuius grossum cholera extat nigra. Altera uero generatione plus accipit à stomacho. Quæ iterum in prasinam separatur, & uiridem, ut æris ærugo, ut ostensum antea. Hæ quidem & si odiosæ sunt omnes nature, ita quod etiam naturalis, propter hoc fuit secundum Isaac in libro uniuersalium dietarum in Kisti à natura locata, estentque calidæ & siccæ: secundum tamen magis & minus. Nam deterior & calidior cæteris est æruginosa: deinde prasinæ: demumque ex adustione suuipius facta: postea facta ex subtili adustione quod erat in sanguine, deinde calidior licet non deterior naturalis rubea, clara, postea deterior & calidior ex commistione facta maiancholiz, demum citrina, ultimo quoque uitellina minus calida cæteris, licet in malitia sit ut excedens & excessum se habens ad citrinâ ratione estensionis & intentionis diuersificata. Propter secundum huius sciendum, quod locus & modus generationis prasine & æruginosæ multiplex inuenitur assignatus. Galenem secundo pronosticorum, ponit prasinam generari in stomacho & fortasse in uenis. Plurimi uero dicunt quasi illi consentientes prasinam & æruginosam magis à stomacho. Cuius quidem sententia græca. Quemadmodum fit in corpore secundum naturam se habente cholera flaua: ita & poralis altera contra naturam. Et uidetur ipsa multoties in uentre generata aliquorum indigestione ciborum ut olerum quales sunt ficele, cepe, ac caules. Apparet autem aliquando sine hoc tale quid generari morbi ratione in uenis & reumatizari; uel in superiorem uen-

trem aut inferiorem caliditatis in corpore contra naturam ostensus. Et adhuc ibidem in antea. Flauus siquidem humor resoluta ipsius serosa humiditate & finita uiridis apparet, uirus uero cholera uidelicet æruginosa prouenit &c. In secundo uero complexionum ponit choleram prasinam simpliciter in uentre generari inquit, quod quibus in uentre calidior extat complexio, cholericæ generatur superfluitas; similis prasio uisa. Rubea uero, aut pallida est omnino in quibus ex hepate existit & citissime digerentibus. Quibus autem hæc similis prasio generatur hos oportet comedisse, non panem aut carnem porcinam; aut quid his simile, sed calidius aliquod horum; & solum in male digerentibus generatur in uentre. Inde nigra uero cholera, aut tæctum aliquatiter, sicut mista subtilis humiditatis flaua cholera secundum colorem quidem pallidior sit & consistentia humidior, ita quando hæc persimplicius eusporauerit, crudorum uorum propinquitate similatur, & propter hoc uitellina. Ipsa quippe cholera, siue pallida, siue flaua, siue uitellina uidetur, in uasis generationem habet. Secundum uero uentrem prasinam quædam generatur cholera, hæc autem taliter appellant à calore præsorum cognominantes; seu & uirulentam à uiru scilicet æruginosam. Isaac quoque quinto febrium, & in dietis uniuersalibus uult omnes præter naturalem & claram rubeam in stomacho generari inquit. Naturalis tussa habitat in felle. & uirus eius in hepate, non naturalis est in stomacho; est tamen diuersæ uitellina, crocea, prasinæ & æruginosæ. Quarum causa, quia naturalis cholera ad stomachum ueniens miscetur cum hu. in stomacho existentibus. Quod si fuerint laudabiles & temperati ex cibo generati contemperato, cholera ruffa in choleram mutatur croceam naturali uicinantem. Quod si humores quibus cholera permisceatur frigiditati attrineant & humiditati; cholera in uitellinam conuertitur. Si autem hu. mores inueniunt in stomacho calidos & acutos, ut ex pipere, synapi, porris, alliis & similibus generatos, calor augmentatur cholera & prasini redditur coloris. Quod si ista cholera in suo permanferit acumine & calefecerit etiam calor extraneus, sicut calor temporis aut aliarum rerum, intenditur, fitque æruginosa. Quod autem uitellina & citrina: ut asserit contra alios in hepate ponentes, in stomacho generari, ueritatem non uidetur habere: quoniam non post modicum subdit. Si materia febris fuerit uera cholera idest, ruffa, generatur causos: si crocea sit tertiana, si uero uitellina nascitur emittitur. Cum igitur materia existens in uenis febrem inducat in continuam, & non quæ extra: tunc nullam contineret esse febrem ex cholera continuam præter fortassis

fortassis canſonē. Dico autem furta ſiſis: quia etiam cholera ruſſam videtur ſolum in chiſti ſolare. Neque emittitur foret vnquam non rectus: ſeu non verus apud ipſum conſurgens ex putrefactione cholera intra uenas & phlegmatis extra. Neque choleraſi har intelligendū generari in ſtomacho: id eſt in eius uenis: verū in ipſius ſpatioſitate. Et ideo forſan dicit croceam interdum, in hepate generari, cum ſanguis ſit humidior quam decet. Auer. autem concedit cum ipſo quantum ad generationem praſinae & æruinoſe quoquo modo. Inquit enim ouuerſaliter q̃ cauſa generationis illarum eſt, quando cholera egreditur à ſua natura in caliditate & ſiccitate, propter ſparſionem illius ad ſtomachum: & miſcetur tunc cum alijs humoribus & proprie cum melancholia: & ibi recipit aliquam ſpeciem putrefactionis: & peruenit ad talem complexionem: & in hoc diuerſificatur à cæteris. Poniť enim forte has per modum putrefactionis & non aduſionis vt cæteri cauſari. Neque etiam ſic ſeſciunt cholera in ſtomacho melacholiz permiſceri: ſed phlegmatis tantum: eum magis ipſum non ſic autem iuho bitet melancholia. A. veto cum eo q̃ ipſas ponat magis à ſtomacho generari modum dat quo modo geueretur in ipſo dicentis ſibi videri praſinam ex vitellina generari quando aduſitur. Ex hepate hancque vitellina. quæ etiam ſecundum eum ab illo dicta magis generari in ſtomachum concurrit. Praſina uaque quando aduſitur in eam introducit nigredo: quæ eum citriuitate iuncta, viriditatem cauſat ad nigredinem attinentem, calor enim in humidum agens nigredinem inducit, ut apparet in lignis. & ideo aduſta omnia ſiunt uigra, ut ligna, carbones, extincto igne. Ari. de coloribus dicit demum ſibi uideri zinariam, ſeu æruginoſam ex praſina generari, quando aduſitur intantum vt eius exiccetur humiditas, ut & ſi ſiccitate ad albedinem redire incipiat. Calor enim agens in ſiccum dealbat: ut in carbone offenditur. Verum circa prædicta multipliciter reſcōtingit dubitare. primo quia cholera quæ tunc non uidetur ea hepate ad ſtomachum occurrere, cum paucis poris ſelleus à d. ſtomachum extendatur, diuiſus, ſed continous magis petat inteſtinum duodenum complexiouſere. ſec. ſecund. & tertio. 15. Sic igitur tales cholera non poterunt niſi rariis generari. Dicendum dupliciter. primo quidem, quia ſicut rariis porus ad ſtomachum mittitur ſelleus, ita & hæ cholerae praſina & æruinoſa in paucioribus adhuc generantur magis, uel licet nō ſit porus ad ſtomachum: eſt tamen porus ſemper ad duodenum continuatus parum ſub pylorum uētris ſituatus, ita q̃ cholera perueniens illuc rapitur ſurſum ad ſtomachum ſi fuerit de-

bilis lapeſſiuitatū receptiuus aut indigentia tempore attraſtionis uirtute. Amplius. dubitatum quouiam conſeſſum eſt cholera quādoq; uentrem intrare uidetur etiam uelle Ralſiſ in diſiſionibus dicens, q̃ ſel habet tria oriſicia, oriſcium ſcilicet adharens hepatis & oriſcium adharens inteſtinis, & oriſcium ſtomacho. Intelligendum quidem q̃ non ſunt tria incipientia chiſti, ſed duo tantum, ſed ut tactum ſunt tria quo ad extrema in quæ terminantur. Nam alterum puta diſcendens diuiditur in duas partes: quarum maior continuatur inteſtinis ad quæ cholera transmittit: altera ut minor coniungitur ſtomacho, & per eā in eius concanum cholera mandāt 3. theo. In primo uero eiufdem partem cholerae mittit ad ſtomachum, quo per illam ſi ciborū digeſtio. Almanſor etiam & Auer. dicunt cholera in ſtomachi fundum tranſmitti. unde tertio. 15. Et habet oriſcium & meatum ad partes ſtomachi. Concurrunt igitur in ipſum. In oppoſitum 6. enim de iuuſmentis membrorum. Nō ſuit curſus cholerae in ſtomachum ad purgandum illud quod in eo generatur ea phlegmate, propter illud quod timebatur de uocumento quod accidit ſtomacho ex tali cholera, feſtinaretur enim exitus cibi à ſtomacho antequā digereretur, cum indigeat permanentia in ſtomacho longa: donec paulatim digerator, unde quarta primi. Stomachus non habet quod ipſum mundeť ſicut inteſtina cholera rubeam. Dicendum aliquos uoluiſſe cholera non iro ad ſtomachum, quia nō uidit ad fundum eius. Quod tamen eſt contra præiuſtorum aliquos: ſed uadit inquit ad os ſtomachi deorſum, ut confortet expulſiōem: non enim intrat ſubſtantia ſtomachi niſi plus mandetor. Aut inquit q̃ hæc in groſſa obtunditur humiditate ſtomachi phlegmatica, calorq; ipſius inde acnitur. Aut dicendum ſicut tactum prius, q̃ in pluribus hominib; & maxime naturaliter ſe habentium, cholera non tranſducitur per porum ſelleum in ventrem, ſed in inteſtina ſolū ad quos hic ſe tranſtulit Gal. Interdu autem & in his q̃ miſcus naturales extant, ut calidiores hepate. Natura porum etiam produxit mitentem cholera in ventrem, ut eo meretur quandoque. Neque hanc amplius ſedit, quia uigeor multum hi caliditate attraſtionis hepatis & frigidum ipſum habent ne tranſiens per inteſtina excoctet. In plurimis enim unus eſt tantum à ſelle porus tendens in inteſtina. Interdu uero cum hoc in ſtomachum alter diſſunditur. Et ſi ut ad multum eſt minor reliquo rariſſime autem contra, ut in ſaluo ſacerdote aparent complexionouſe. & re. a. ſecundis. Vel ſicut tranſtulit ex Græco dicendum q̃ pars uolida cholera occurrat in ventrem, & non eſt q̃

non transeat omnino in illum. Cuius est series ista. Manifestum quod cholera plurima in ventrem confluente secundum aliquam dispositionem non contingit in ipso manere cibaria. Morbo enim ab humorum acredine uexatur, & stimulat ur ualde ab eo uelocem contentorum effici excretionem. Si autem in uentris peruenit orificium, ut sensibilibissimum existens, doleat ab ipso uehementer morbi, & nauseat, ac uomit. Rursus horum gratia hæsitatur: quoniam uidetur quod subtilior pars cholerae pertranseat cum sanguine, eaque vadit ad chistum, quoniam illa descendit multa: & ad multum in intestina inferius entia, quod autem tale grossius & grauius. Etenim Citrium cholericum quod ostenditur cholerae in spuma & sanguinis phlebothomia est subtilius uisum cholera expressa de chisti. Adhuc cholera vadit cum sanguine propter cum subtiliari facere tandem penetrare. hæc autem perfectius cholera operabitur subtilis grossiori. Subtilior ergo uadens cum sanguine ea quæ ad chistum transmittitur. In oppositum primo enim theoricæ. Quid in cholera subtilius est acutius & clarus trahit ad se fel. Quod autem minus est acutum & clarum natura cum sanguine ad omnia miris corporis membra. unde prima primi. Quod autem de ea colatum est ad chistum transmittitur fellis. Id autem subtilius. Palin. secundum Isaac. Ideo natura cholera incarcerauit in chisti de sui effrenitate partes legeret eis occurrens. Sed hoc proprie inest subtiliori: quia fit amarior cum acuitate quadam & penetrabilitate ac mordacior. Minus autem subtilis in his remissa non, tantum distat a sanguine & partibus. Ecouerso autem de humore accidit nigro, quoniam quidem ipsius subtile cum sanguine permeat. Grossius autem esplen se attractione deducit. theoricæ primo cum naturalium 2. Dicendum quod uadens ad chistum est subtilior reliqua cum sanguine eunti: ut indicatur naturalium secundum do ita. Indiget autem sanguis non minime & tanto humore qui nondum ultime factus est igitur. Iunuitur igitur duplex cholera igitur: & ita subtilior & minus subtilis qua indiget sanguis. Per oppositum autem melancholia uadens cum sanguine, minus grossa est ea que tenet ad splenem. Subtile uaque ad grossum excessum important. Quod autem cum sanguine uadit opus sit temperamento attestari. Ad primum igitur dicendum, quod cholera in intestina non descendit sponte: uerum magis regius impellente virtute, sicut & melancholia sursum. prima primi. Ad aliud dicendum: quod ista non est vera substantia cholerae quæ apparuit in spuma illa supernatante, sed aliquid generatum ex euaporatione seu potius ex ipsius effumatione: quod ostendit secessus cholerae

ex uenis euaporatæ. Ad aliud dicendum, quod sanguis non eget tanta subtilitate: quoniam cholera minus subtilior hunc ualeat attenuare: cum eo quoddam non nocet ut reliqua membra etiam sunt grossa in quæ ordiuntur & meatus sufficientes. Adhuc dubitatur: quoniam non uidetur has choleras posse in stomacho generari: sed in hepate cum sint hu. Nam stomachus ordinatur ad digestionem alimentorum, & eouersionem eorum in chilum. Hepar autem ad conuersionem chili in ebum. unde tertio colligitur. Quod generatur naturale: generatur & non naturale quando corrumpitur eius complexio. Cum igitur stomachus uideatur non habeat generare humorem naturalem: neque innaturalem generabit. Rursus hæc cholera cum sint calidissima, ab agente calidissimo generantur. Tale uero non est stomachus: cum sit frigidus & siccus natura: neruofum est enim non parum ipsius esse, & exangue in hepar quoque calidum & sanguineum: & membrum quantum habet de sanguine, tantum & calor obtinet. primo complexionum, & secundo apparet de partibus. In hepate ergo generantur, & non in stomacho, quod uultus dixit. Dicendum est ipsas in stomacho, & non in hepate generari: quia sui acuitate & malignitate substantiam teneram corrumpent hepatis: quod uatura non finit. Adhuc. humiditas eius est multa. Est namque sors humiditatis secundum Haly. unde prohibet earum generationem cum sint siccissima: & unumquodque in loco eius generatur cognato. Ad primum igitur indutorum dicendum, quod generatio duplex existit: quædam est uera uniuoca: & sic stomachus masculinæ gignit pituitaria: & hepar humores. Est & altera impropria æquiuoca: & hæc cholera hæc duæ possent dici in stomacho generari. Uniuoca quidem dicitur generatio quoniam hoc totum transmutatur in hoc totum. primo de ge. & cor. ita quod non solum sit transmutatio in accidentibus: sed etiam in substantia. Non enim permanens est substantia in essentia & accidentibus solum transmutata. Aequiuoca quidem per oppositum dicitur generatio, puta quod in stomacho huiusmodi generentur cholerae, quia uiriditate in ipso acquiruntur ex acuminu esse: aut cholera ab hepate ad stomachum ueniens aliis formis induitur accidentalibus: ut colore, grossitie, duritie, & hmoi. & sic forsassis intelligunt dicentes eas magis a stomacho generari, quia formam tale in stomacho acquirunt: licet materiam receperint ex hepate permanentem in substantia: sed passionibus transmutatam. Ex in hoc coincidunt modi & loci etiam generationis earum prædicti: & si uideantur forte superficiei tenus diuersi. Aut dicendum, quod magis sunt a stomacho, & proprie præfata plus: quoniam dictum est per

Gal. aliquando ipsam generari in venis propter aliquam ægritudinem, & effundi demum ad stomachum. Ad secundum dicendum quod caliditas dupliciter est insita: naturaliter: & acquisita, prima quidem calidius est hepar. Et nanque natura calidum & humidum. secunda vero stomachus: licet sibi indita frigidus & siccus sit magis. Multa enim concurrunt ad ipsum calefaciendum tertio naturalium, & primo prima. Cor quidem superius mediante diaphragmate ab ipso calefacto adorti per dorsum percurrens posterius & musculi eius. Anteriorius quidem omentum adipinum cum musculis. A dextra vero hepar cum felle. A sinistra quoque splenem propter sanguinem venalem & arterialem magis in ipso contentum: hæc omnia circa stomachum intensam aduentitiam congregant caliditatem. unde & humores potest generare sic extraneos & adustos. Hepar autem sui caliditate innata & humiditate repugnat generationi huiusmodi humorum: generat tamen eorum materia cholera, puta vitellinam aut aliam. Idem dubitatur, quoniam cum secundum Gal. dictum sit cholera poralem aliquando generari in venis: poterit & in hepate similiter generari: quoniam in ipso sunt venæ in quibus humor capitur & non in substantia ipsius. Sæpe nanque Gal. digestionem venarum vocat eam quæ hepatis, ita quod non deficiat talium cholera: generatio in ipso ut dicebatur: propter quod id tevellum corrupterent sui malitia. Dicendum quod in hepate ut apparet non contingit prædictas cholas generari. In venis autem potest propter caliditatem ægritudinem quorundam aduentitiam. Neque est simile de venis quæ sunt in hepatis corpore, & quæ ab ipso prolongantur. Nam telæ venarum existentium in eo sunt tenuiores telis aliarum venarum existentium in toto corpore. & de iuvenamento ut perfectior fiat ab hepate digestio. Nam quanto cibus fuerit propinquior substantia hepatis carnosa, tanto velociori reddetur alterationis & melius sanguinis suscipiens speciem. Quando autem prolongatur ab hepate venarum tunice, ingrossantur & fortificantur. unde A. 5. patet, de anima. Non est illicitum virtutes fortiores & validiores fieri extra sua principia: eo quod fortiorum materias per quas sunt huiusmodi: sicut euidenter apparet in nervorum origine & in processu demum eorum.

Propter secundum vero sciendum, quod à nullis inuenio adhuc diligenter inquirens qui ex prædictis duabus cholera ægritudinem ponat co-surgere: sed aut vomitu expellunt motu extemplo adduci: nisi Anæzot & eius Auer, colligat. Inquit enim ille. Febris quæ sit extraneæ febriis ephemeræ ad febrem cholericam;

si fuerit de genere prasinæ aut æruginosæ habebit accidentia magis fraudulenta, & uix poterit euadere ab ea. Et si euaserit diu permanebit, & subdit ipsius demum signa dicens quod sit eius paroxysmus diuturnus & terminus ægritudinis similiter. Et pauci sunt qui ab hac infirmitate euadant: & si euaserint, erit hoc post multum studium: & ægritudinis prolongationem. Et possibile est ei remanere mala accidentia & fraudulenta tempore quam longo. Tertio uero colliget. Aegritudines quæ ab istis proueniunt cholera, prasinæ uidelicet & æruginosæ, sunt incurabiles, propterea quod non recipiunt digestionem nec permittuntur à calore naturalis immo corrumpunt formam specificam ipsius: si cut corrumpit uenenum. Quarto uero illius ponit ex hoc causam fieri iniquis. Et peior specierum causam est illa, quæ fit à cholera zinnaria vel prasinæ. Et illius paroxysmus longus est propter inobedientiam humoris illius ad digestionem recipiendam. In septimo quoque si febris tertia non fuerit ex cholera pura: sed erit ex vitellina: hanc enim uoluit in tertio sentire Gal. fore adusta 2. naturalium. Moræq; subdit vel prasinæ aut æruginosæ non euadet hic à periculo maximo, & præcipue quando fuerit ex prasinæ & æruginosæ. Et posuit mihi uideri aut impossibile quod aliquis æruginosæ euadat: dicit etiam causam contra alios impossibile fore ex cholera naturali. Hi quidem sunt sermones horum uirorum: quos si quis diligenter considerat: non solum ad alios sunt dissimiles, verum etiam inter se satis dissentient. Nam Zozar ponit esse possibile: cum difficultate tamen quadam grandi à septem prædictarum cholera: hominem posse euadere. Auer. uero isti secundum quid aduersus ait sibi uideri possibile quod quis à febre euadat ex cholera æruginosæ. Adhuc si he cholera: adeo ut ipsi etiam testantur sunt prout quomodo febriis eorum prolongatur & etiam paroxysmus? Quare etiam secundum Auer. causam inducunt: cum sit febriis continua sine paroxysmo: & hæc habeant paroxysmum. Aut quomodo generatur causam: si non sit à cholera naturali: & non tamen prout est naturalis. Non enim fiet à citrina, neque à vitellina non adusta: cum hæc sint frigidiore naturali: neque etiam à vitellina quæ in tertio uocatur adusta: quia in septimo ait. quod vitellina causam frigidiore existit? Quo ergo faciet vitellina causam: si frigidiore naturalis? Aut fortassis vitellinam nunc accipit cõtem eam aliis non seruans quod præsumpsit affirmare & imponere Gal. 3. uel si vitellina adusta sit alia & prasinæ & æruginosæ: distinguere nobis didascalæ. Aut quod dicunt quod non extraneum est & insolitum ualde. unde propter ista: & similia Auer. maxime sermonem non comprehendendo. Dicendum igitur extra ipsum cholera

leram nitellinam duplicem fore. uam quidem per commitionem prædictam magis eius obuiuentem naturam 1. alieram uero per adustionem & ingrossationem substantiæ: qua color insenditur. Gale. igitur quàm breuius naturalium 2. generationem assignans humorum: cum in aliis eam tetigerit opusculi: duas tantum choleras enodauit: uasuralem uidelicet & innaturalem: per choleram quidem vitellinam perfectius quàm per aliquam aliarum audiens omnem choleram innaturalem duplici prædicto generatam modo.

Propter tertium uero sciendum cum aliis magis dico quòd ea cholera proprie æruginosa febris: neque aliqua ægritudinum potest causari: sed potius uomitu emittitur, aut mortem repentinam inducit. In cholera uero præsina dubitandum est utique. Quod autem ex æruginosa non confurgat febris: neque ex præsina præter hoc quòd non inuenio in aliis ægritudinem ab his cholerais positam fieri. Isaac februm quiuio de ipsis talem in communi profert sermonem: præsina impossibile est in hepate generari: neque transit a stomacho: neque generat febre, quia uon tanto tempore in corpore permanet: ut putrescat & febre generet: namentum semper se coadiuuat, ut eam a corpore expellat propter eius malignitatem. Quod si natura defecerit eam expellere nequens, iucendit corpus, & homo moritur. Subditque igitur si talia de præsina accidunt, quanto maiora & certiora de æruginosa eueniunt? Et firmatur quia alimentorum 3. alie omnes cholerae uidentur difficili terenacurri & ægotante corpore viridi exceptaunde in diætiis uniuersalibus. Aeruginosa peior & corruptibilior est præsina. Quare uelociter destruit & mortificat. Quod etiam rationibus confirmatur suppositis quibusdam prius ut quòd natura non mouetur nisi percepto nocimento. Et quia huiusmodi cholerae pessimas habent qualitates acutas mordicantias: ac quæ sunt in stomacho: propriæque æruginosa. Et quòd stomachus est membrorum sensibilibissimorum & maxime os ipsius. 4. de accidenti. Ipsi enim sensus inest præter naturalem etiam animalis. Et quod coniunctur in stomacho facillime educitur: quia propria ipsius euacuatio est per uomitum. Constantius de stomacho. Via uero quæ educitur breuis & lata. Confurgat igitur nunt sermo talis. Natura non mouetur, nisi percepto nocimento. Sed ex huiusmodi cholerais percipit uocementum: cum sint acutissimæ, & stomachus sensibilibissimus. Enomouetur igitur ex stomacho: cum hiant in ipso antequam ægritudinem inferant. Sicut enim natura habens choletis odior ipsam in chisti inuacrerantia & has statim studet expellere quantum potest, ne

ipsam interimant: & ideo uidemus eas euomi, interpolate. Sed contra, non uidetur quæ expellatur adeo confestim ea stomacho: ut ægritudinem non generet: quoniam quod generat capillos uirides: cum hoc fiat temporis mora poterit & febre inde causare. Sed capilli uisi sunt uirides: & proprie in temporibus cuiusdã, hi que ab hac proueniebant cholera cum sibi attestentur: & etiam hebdomada qualibet hanc euomebat periodice. Dicendum dupliciter aut uelut apparet quòd præsina potest interdum febre generare, uel quòd capilli licet efficerentur interdum uirides: non tamen putrescebat cholera præsina; ne febre causare, quoniam expellebatur continue. sicut etiam generabatur uon putrescens: per multastamen ipsius generationis capillos in uiride colorabat, fumos infectos ea superius demaudans. Amplius. quæcunque febre causant humoralem putrescere & cor petere oportet, cum fumus putridus cor petens sit causa febris conuulsæ. Sed quæ sunt ignis, & uehementer igitur, non putrescunt, & ideo alia elementorum impurata putrescunt præter ignem. Talis uero est cholera proprie æruginosa: cum ipsa sit calidissima & siccissima. Verum contra hoc uidetur esse: quia prima primi humor dicitur corpus humidum liquidum. Sed huiusmodi cholerae sunt humores, quod autem est humidum & calidum potest putrescere. Ab his enim causatur putredo 4. meteororum & 1. de inge. Adhuc melancholia res siccior corporis putrescit & febre generat: & cholera similiter naturalis res corporis calidior de distemperantia inæquali putrescitur, ergo, & febre generabunt. Dicendum quæ hæ cholerae & proprie æruginosa minime putrescunt: cum sint igoæ sicæ ualde. Et quod dicitur primitus humidum & liquidum putrescit, dicendum quòd non omne tale putrescit. Oportet enim quòd in humido putrescibili non adit calor adustiuus & condensatiuus, ut hic humidum excludens uehementer & consumens. unde prima primi. ziniaria generatur ex præsina quando tantum aduritur donec eius humorositas siccat: remanet tamen utrunque sub humoris natura. Hæ namque cholerae propriæque ziniariae sunt uelut ulcera corrosiua non putrescere potentia ipsorum caliditate immensa & siccitate, apparet quarta quarti. Aut dicendum quæ huiusmodi humor non habet tempus sufficiens in quo putrescere possit, ut mox apparebit, neque melancholia siccior est huiusmodi cholera, & maxime postea: quoniam melancholia secundum medicos inest nutritiæ, propter quod oportet aliquam humiditatem retinere. Verum est tamen quæ aliqui propter hoc putauerunt melancholia naturalis non posse febre causare quartam 4. prima.

Siccitas enim acquisita incholeta: præcipue in æruginosa, propter id quod cholera existit, & propter caliditatem humidum consumentem intensior redditur siccitate cholerae nigrae naturalis. Rursus. quod facit febrem oportet habere sufficiens tempus in quo ipsa ualeat generari, ut effectus inducatur, cum tria oportet concurrere, agens vigorosum: patiens dispositum, & tempus in quo agens patienti applicetur. differencia 93. & 94. Sed tempus non reperitur sufficiens in quo æruginosa præcipue possit febri causari, cum ipsa fiat mediante putrefactione: hæc autem indiget tempore: cum sit actio quedam & conuersio humoris: ut febris inducatur sit transmutatio per longa, primitus enim oportet causam præter alias remotiores superesse coniunctam, & fumum putridum ab ea resolutionem perentem, deinde remissio illius fumus à corde in totum corpus. Ab eo namque febris in totum demandatur subiectum nisi fuerit impeditum. Cholera igitur proprie æruginosa febrem non causabit, neque uniuersaliter ægritudinem: sed mortem festinam, nisi vomitu expellatur, vel forte secessu. Cuius quidem uomitus sequuntur quandoque dolores in graviori stomachi adeo uehementes, ut accendant spasmos, syncopis, desudationes frigidae, & pariter pulsus omnimoda 12. de inge. Sed circa id dubitare contingit, quia dictum putredinem tempus expetere. Cuius contrarium scribitur. 4. prima. Putredo non habet tempus, & conuersio sanguinis in cholera non fit nisi in tempore: Dicendum quid sufficienter ostensum. differencia 89. Non enim intendit dicere A. quod putredo nullo modo habet tempus: cum sit alteratio quedam ad febrem, & omnis alteratio cum sit uere motus fiat in tempore 3. physico-rum. sed uult innotescere quod tempus minus est quo ex sanguine fit putredo: eo quo sanguis in cholera transducitur: cum plures hic requirantur motus & transmutationes. Quod autem huiusmodi cholera præcipue æruginosa (ut dictum) sit adeo uenenaosa ostenditur: quoniam uenenum est humiditas subtilis horribilis qualitas. Halyab. Ex qualitas ueneni est diuersa: quia aliquid quod est propinquum humoribus convenientibus corpori: aliud quod extat longinquum: & aliquid quod habet qualitatem uenenaosam prauam. Et ideo cum hæc cholera sint tales: non est mirum si natura conatur eas expellere maxime uomitu. Nam eo educuntur multæ species humorum phlegmaticorum, ebolicorum, melancholicorum, & species ueneni diuersæ, similiter & sanguis euomitur interdum. 5. interiorum. Neque mirandum etiam si huiusmodi uenenum in corporibus generatum: cum sit quantitas multæ, posuit mortem inducere repentinam. 6. interiorum, quia

menstruum retentione corruptam, & maxime sperma in subito à coitu proprie abseisis potest ægritudines perniciosas, & mortem inferre festinam, cum uideamus ex paruissimo araneorum ueneno: & præcipue scorpionum symptomata grauissima, & mortem contingere non parum. Similiter uidemus membrum stupefieri ex tactu modico torpedinis, & à contractu etiam saluæ canis rabidi. Merito igitur menstruum & proprie sperma corruptum, potest in uenenum deduci. unde Haly. Fortasse ex spermate est aliquid simile ueneno. Poterit etiam non minus quis humor paratus in uenenum conuer-ti: quando fuerit uolentis qualitatis & locus apertus in illud. De cholera uero præsuna non simpliciter enuntiandum quod febris ea possit gigni: maxime cum non sit condensata ut æruginosa alijs plus possit admisceri humoribus. Generatur etiam non solum in stomacho, uerum ut dictum & in uenis, ut alijs coniuncta bu moribus: non sit etiam ut æruginosa natura odiosa, ut statim percepto expellat etiam non uenimento neque putrefactioni resistens. Quod fortassis uidetur concedere A. quarto prima, inquiens ipsam fieri ex chimis subtilibus plurimum, quorum est ebolicorum uehementis subtilitatis & profundationis malæ substantiæ uenenaosa, cum iam accidit putredo in corporibus calidæ complexionis & licet ualde. Ista uero mala substantia uenenaosa quæ profundatur cholera secundum plurimum uidetur præsuna, cum ipsa dicta sit de genere fore uenenorum. Etego quidem febrem istam in iuvene quodam uidi complexionis siccissimæ & calidæ etiam ualde cum accidentibus huiusmodi, ut calore uehementi interius & sui, frigiditate extremorum, syncopibus aliquando, & affligebatur per tertium maxime, qui fluxu largissimo uentris superueniente cholerae præsinae aquosa cessauit febris. In cuius etiam fluxus ob uirtutem laboratum fuit restrictione: & iste quidem inappetibilia factus uix deglutens & nihil sumens, circa septimam ab inde tebeftatus expirauit. Recte namque illa praua cholera cor & ipsius spiritus vulnerauerat innatos. Et quoniam quæ sunt huiusmodi cholera raro emergunt, auctores nidentur sibi inuicem discordare: cum huius artis plurima experimento magis quam ratione capiuntur: unde de his quæ raro contingunt certificari non possunt: interiorum quinto.

Propter quartum uero; ad primum quid dicendum uisum. Ad aliud dicendum, quod febris illa non fuerat ueras sed quedam potius inflammatio ex coamine nouius confectura & dolore. unde 12. de inge. non ponitur febris: sed tantum 4. accidentia prædicta, uel quod febr. ex alia præerat materia. Ad aliud dicendum:

dum: quod hæc cholera sunt deteriores melancholia subeili, terrea, fermentante terram. Sunt enim calidiores & acutiores: licet enim ista melancholia in certam ebullitionem & fermentationem inducat, non tamen est sic calida & acuta ut hæc. Sed sui quadam hoc causas dimittere seu acedine: sicut acetum ebullit super terram & ferueniat, non sicut aliorum aut fructus ferentis eustorbulum liquor quando non est adhuc condensatus in gummi. Aegritudines etiam quæ fiunt ab hac melancholia non sunt putrefactione, sed magis quadam corrosione, ita quod ipsa est apta ægrotudines causare sui minori acuitate & tarda penetratione: non autem cholera & proprie ægrotudinis: cum natura ipsam non patitur tempore. Ad aliud dicendum, quod humor dupliciter destituitur à regimine nature, aut quia natura non laborat: circa ipsum in conservando & reduciendo eum si peccat ad benignum: Et sic hic humor derelinquitur à regi. nature: non autem sanguis aut phlegma. Vel dicitur destitui: quia natura non curat de ipsius expulsiōe: necum non inisset ipsam, eo quod qualitates non habeat vehementer eacessivas: sicut aliæ quæ melancholia: & præcipue phlegmæ quodammodo. Non enim hæc mouetur: nisi percepto hæfio, apparetur tertio naturalium & ita hæc cholera non derelinquuntur: ut declaratur à regi. nature: immo inquantum potest studet eas à corpore auertere. Ad aliud dicendum quod licet cholera prasiina generetur interdum in venis, natura expellit eam ad stomachum si fortis fuerit. Aut dictum non fore impossibile generari ea ipsa febrem syncopealem minutam subtilem. Ad aliud dicendum, quod hæc cholera æt ætuginosa proportionē habeant cum febre, non tamen cum causā ipsius id est putredine ut ostensum. Siue vero ipsa febris non constituitur humoralis: neque omnis calefactio febrem inducit putredinis: sed vehemens in qua sumus putredinis cor petit: & ipsum eiusque calidum non statim petimur: sed fecit inde ad omnia corporis demandatur membra. Ad aliud dicendum, quod multa venenorum quamquam sint talia à tota forma specificis dicta, ut apparet de veneno scorpionis & araneæ: magis tamen sustinentur à natura: quam huiusmodi cholera: non enim sunt tantæ quantitatis. Sunt enim ut venena in multa quantitate suscipiatur quibus irritata natura mox superius vomitu foras educit: aut inferius quam parum lædenda quæ mortificassent siquidem retenta. Neque etiam hæc habent qualitates sic perniciosas & acutæ, propter quod natura conatur illico expellere, nocuumtū inde percipientes aut ipsarum acumine vehemēti, proprie cum

stomachus sit membrorum sensibilissimum. Similiter & venena quæ exhibentur, alia dulcibus admiscetur, ut eorū mala qualitas occulatur, unde natura: sub dulci decepta venenū ad se trahit: propter quod præcipitur quarto. 6. quod qui timet de in potu sumat venenū, oportet sibi præcauere à cibis dominantium saporum in acetositate, aut acuitate vel dulcedine & dominantium odorū. Sunt & venena perisida: necem cito inducentia plurimum subeili substantiæ liquidæ.

Ad aliud dicendum, quod translatio illa prasiina est, non enim ponit seriem rectam Hippo. sed sententiā solam: & illam interdum imperfecte, sicut ex translatione etiam patet arabica. Sed in ea hic & ubique uerba omnino & sententiā sapit Hippocratis. Cuius quidem series. Vlcus autem siue perfectum &c. Arabice uero sibi consonans. Quando fuerit in corpore infirmi ulcus. Non ergo loquitur Hippo. de antracis siue carbunculi idem existens colore, verum ulcers: nec huiusmodi color causatur ex cholera prasiina seu ætuginosa, licet viridis efficiatur siue liuidus, sed ex melancholia cōcreta adusta. Induit enim quod quando vincit in corpore humor melan cholicus, est color eius aut liuidus, aut uiridis.

Quæstio VI.

Quod in empiala non sit frigus interior & calor exterior videtur per Isaac febrium quin to huius oppositum scribentem.

Adhuc secundum Gal. febris generatur in corpore quem admodum ignis ex lignorum inflammatione. Sed in hac calor est magis in parte infima & profunda lignorum quam in parte exteriori aeri aperta. Cum igitur in empiala phlegma vitreum in quo ea profundatur sit in corporis profundo illi caliditatem inducet: forinsecus uero frigiditatem non potest: sed frigiditate febre calefieri omni quaque.

Rursus. febris empiala fit ex phlegmate frigidiori profundius putrefacto, cum sit humoralis: putrefactio uero sit à calido. Quod autem tale ubi est calefacit: quo uero deficit frigus ostenditur, quare in empiala calor erit interior & frigus exterior. Quod autem in lipyria frigus sit interior & calor e contra monstratur: quoniam fit ex cholera sola nē coniuncta phlegmati vitreo, aut melancholiz, sed cholera petit exteriora calefaciens: phlegma quoque vitreum & melancholia interiora. Palin. Calor est in parte ad quam tendit: huiusmodi autem est exterior superficialis: cum eius motus sit de centro in circumferentiam. Calefient itaque exteriora in ea: & infrigidabuntur interiora.

Cuius contrarium sentitur Sera. 6. & 4. prasiina ita habente. In empiala interiora infrigida

ri & exteriora calefieri: iolypiria vero contra: quorum tangenter cōsequēter motiua. Quod autem talis diuersitas caloris & frigoris in uentre harum possit existere probatur: quia febris procedit à corde per arterias & uenas in totum corpus, sicut ratio testatur ipsius. Quod autem huiusmodi simul vtrāque partem calefacit in teriore scilicet & exteriorē: nō itaq; & reliqua.

Propter primum quidem sciendum: q̄ quid sit calidum: quidque frigidum & quid intenus: quidue exterius, notum erat & ex multis. Est autem empiala dicta gr̄ce super alias: eo quod calor est super frigiditatem aut vtrāque super alteram: quia frigus simul ubique vt ostenditur coniungitur cum calido secundum Gal. & Halyab. Empi oaque gr̄ce supra importat. & Alii id est alia. inde empiala Lypiria vero dicitur quasi pinguis. Lipparoo eam pingue. Si cut nāque pingues calefiunt interius & frigescent exterius: eo quod calor obsessus nō possit se in exteriora protendere. vnde proble. 8. Propter quid pingues vehementer frigescent: sic & in hac euenit febre: quare videtur Halyab. lisuriam nominare: & tunc sanius de ipsa alii protulerunt quam Isaac hanc rationem minimis sequentes. Amp̄. scidum quod febribus simplicibus seu cōpositis dispositione cōtingūt diuersæ caloris aut materiæ causa nominibus differentibus designare. Quibusdam enim febribus inest multa immixta humiditas & viciatur inordinis. Quando vero calor fuerit aduersus intensus, causam dicitur: vel incendium. Quādo autem is & frigus simul in interioribus fuerit & exterioribus per omne, empiala dicitur ex phlegmate vitreo generata. Est & febris in qua sentitur calor in interioribus immensus: in exterioribus vero tepor. Quod ex viscositate contingit humoris & grossitie: ita vt calor non possit petere exteriora: quæ lisuria dicta. Est etiam alia in qua frigus in exterioribus sentitur graue: quæ acromidus dicitur: id est proinosa. Fit quoque reliqua in qua calor est interius intensus & occlusus: à qua vapores eleuantur acutissimi: cum humor non sit viscosus plurimum: quæ febris appellatur tinnidos octauo theoricæ.

Propter secundum vero sciendum: quod autiores differentiter valde circa hanc differentiam locuti. In libro enim de distemperetia inæquali. 7. apho. secunda prognosticorum. & alius cū. 8. theoricæ dicitur: ut apparuit q̄ empiala sit febris in qua simul sentitur calor & frigus secundum omnē corporis partem. vnde 2. febrium. Empiala febris proprie nominatur in qua simul febriunt & rigore patiuntur, & vtrāque feciunt scilicet idem tempus in omni particula corporis. Quod & proprii nominis videtur præfata ethymologia importare.

Tertio quoque simplicium pharmaseorum scribitur quod est febris in qua habens eam inuenitur tremorem & duritiem in toto corpore hora vna. Et hæc quidem febris est illa: quam A. circuloquens ait. Febris in qua sit vnaqueque duarum rerum io vnoquoque duorum locorum. Est autem lypiria febris in qua calefiunt interiora seca, & frigescent extrinseca & quæ secundum Gal. apho. quarta etiam ad febres perniciosorum apostematum interiorum extenditur à quibus sit attractio à toto corpore caliditatis: velut à viciosa. Tertio quoque simplicium. Lypiria est febris in qua interiora ventris incendentur, & eius exteriora sunt frigida, ac etiam de distemperantia inæquali. Non tamen à Gal. inuenio ex qua materia determinate ac quomodo generetur. Isaac autem & A. cum Serap. in empiala & lypiria videntur facis disorderare, non solum in nominum alteratione: verum in opposita causarum assignatione: eam præcipue in empiala. Inquit enim ille cum Aristo proble. 27. quod empiala est febris interiora incendens & exteriora infrigidans: cuius materia est phlegma grossum, vitreum. Eiusque quædam pars est putrefacta: quædam vero minime: putrefacta quidem febrem generat: imputrefacta quoque soli natura congelationem causa. De lypiria quoque sentit quod eius materia sit cholera cum phlegmate vitreo: aut cum humore melancholico, mixta differentia ab empiala, quia illa calefacit interiora & exteriora infrigidat, & pororum foramina oppilat: fumus dissoluitur. In lypiria autem omnia hæc sunt contraria. Interiora enim sunt frigida: & exteriora calida. Huius quoque A. cum Serap. aduersatur: dicit quod in empiala infrigidantur interiora & calent extrinseca. Cuius materia est phlegma vitreum comprehensum, in occulto & profundo quod infrigidatur ubi est. Sed quando ei accidit putredo spargitur ex eo vapor eius quod putruit & disperitur & inflammatur in exterioribus. Cū enim esset quietum antequam sibi superueniret putredo non sentiebat frigidum ipsius aut calidum: cum nō dum esset putrefactum. Materia enim interius frigida io loco fortiori agitata calore frigidior sentitur: vt glacie monstrat dissolutio. Fumus autem à materia computrescente deducitur ad quæ extra inueniens ea minus calida in trinsecus calidior percipitur. Sicut mixtio in balneo corpore reddito calido designat. Lypiriam vero ponit fieri ex phlegmate: aut ex cholera grossa quandoque. Modum autem generationis ipsius ex phlegmate dat duplicem: vñ quidem quoniam quando phlegma inflammatur intrinsecus & putrescit illic calefacit: non enim resoluitur nisi quando calefacit exteriora corporis cum sparsione vaporis calidi. Propter

per etiam calorem intus existentem, ad ipsum accubatur reliquis cum viresque ita ut partes extrinsecus infrigidentur illo, deserta: & maxima si phlegma vitream partes oppilet, & possideat exteriores. Alium quidem quia multo, tunc resoluatur, vapor ex phlegmate, qui non putruit: sed, eleuatur calefactionis: à quo calidum spatio paruo associatum separatur modò quo calidum recedit, vapore ascendente aqua, ut apparet in terminis. Et merito quia huius radicaliter ante putrefieri frigiditatis immensa. Fit autem ex cholera grossa: quia ea paucā intrinsecus latens putrefcit, & illic calefacit. Et quidò non resoluatur aliquid ex ea euenit quod dicebatur in primo modò lippitiae phlegmaticae. Concorrit enim calor cum virtute ab extrinsecis partibus in quæ intus. Circa prædicta dubitatur & primitus de empiria iuxta Gal. si ponat in ea, calidum cum frigido simul per totum sentiri. Quod non videtur: quia hæc sunt contraria. Huiusmodi vero neque non vna commisceri omnino, cum vnum alterum à se depellat. In oppositum: quia ut actum in empiria calor & frigus in eodem sentiuntur loco. Amp. Ateriam ponit febrem à lipuria & empiria quasi ex his duabus congestam: quam circumlocutione nominans dicit unam quam duarum rerum in quocunque duorum locorum fieri. Idem de lipparia hæsitatur 3. quia aphor. 4. Lipparia ponitur ex apostemate phlegmonico interiori vel erysipela confluere: quod nulli exprimitur prædicti. Dicendum quid ad primum quod eundem locum possumus audire dupliciter. Aut verum & iudicibilem, & sic calor & frigus simul in eo fore non possunt, vel sensualem vel communem, & sic vna existere possunt: unde de distemperantia inæquali. Nō fit accipere particulam sensibilem in qua non existat calidum & frigidum: seu quod licet sensus indicet calorem & frigus simul esse: non tamen intellectus. Iudicium enim sensus non est adeo ratum ut quod intellectus: quod ostendit quis circulus apparet: verus oculo manu protrahitur: non autem circulo circumducto. Boethius in sic 5. Quod etiam denotat imago, ex nariis constructa coloribus. minutatim quidem de prope percipiuntur, ut sunt diuersi: de longe autem omnis apparet: seu & vasa in pariete concaua videntur distanter colorum superpositione. Sicque in proposito. Ad aliud dicendum, quod aliter accipit Gal. cum Halyabate empiriam, ut apparuit quam Serap. & A. eius amplius consequens rationem nominis. Quam Gal. enim dicit empiriam. A. circumlocutione ut actum exposuit parum enim de nominibus curauit. Ad aliud hæsitatum dicendum quod A. cum Isaac ponit lippariam fieri sine apostemate. Gal. autem multo tunc cum eo: ha-

bet tamen modum lippariæ secundum illos præcipue, cum ea quæ intus ardeant & rigent: extrinsecus. Varij igitur sunt in his febribus intellectus. Hæc igitur est diuersitas in his febribus inuenta breuiter recollecta, & propriè inter Isaac & A. Isaac enim videtur fortassis propter translationis defectum ab alijs deuiare. Prædicti tamen latiporum videntur cum non auditis alijs simpliciter imitari.

Propter tertium quidem sciendum, quod phlegma vitreum vel est multæ quantitatis, vel paucæ, vel simul computrescit, aut non: si quidem fuerit paucæ quantitatis ut natura simul possit ipsum putrefacere tandem & dominari, tunc calefaciet interius ubi erit putrefactio absconsa vehementer: ita ut prius vapor hic resolutus tendens in extrinsecus redibit ad frigiditatem: cum fuerit eius materia prius frigida valde, aut secundum diuersitatem putrefactionis phlegmatis & impurificationis: quod videtur Isaac sentire. Si autem fuerit multæ quantitatis adeo ut natura non possit in vna putrefacere & sibi dominari: quod interius est motum calido de potètia infrigidandi reducetur in actum illius: seu quando nix liquefit calido motu inf. igitur magis, tum propter actionem contrariarum: tumque subtilitatem. Vapor autem hinc resolutus à calido retinebit adhuc quid eius ita ut sentiat frigus interius, & calor extra. Quod videtur A. tenere. Gal. autem cum Haly. sane sentit in hac febre omnem corporis partem una calefieri & infrigidari: propter phlegma putrefieri partim: partim vero minime: quod nomen denotare dictum est expositum. In lipparia autem nō tantum opponuntur adinice Isaac & A. cum causas non suscipiant ex contrario, sed ex diuerso magis ut apparuit ex alia causa & modo sentit ipsam Isaac confurgere & ex alijs A. consonans peramplius sermoni Gal. volentis in ea calore occultari vehementer in interioribus: sicut & ipsi attestant Serap. filius. Quod & magis approbo. Amp. nosce quod si materia acida & vitrea desuper partes moneatur sensibiles, ita ut computrescat minime rigorem siue frigus inducit absque calore. Quod si amplius mota in putredinem quandam moderatam deueniat, febrem inducet empiriam: in qua secundum omnem partem sensibilem calor & frigus sentiuntur vna. Si vero amplius putrefiat præcedit quidem frigus ut in quotidiana: superuenit autem calor febrilis superato eo ut nequaquam in augmento percipitur: & maxime in statu paroxysmi: febriū. Sufficiat itaque hic brevis sermo in hac innoluta & nringue probabili huiusmodi febrium causarum assignatione.

Propter quartum quidem ad primum quid dicendum, iam apparuit. Ad aliud dicendum quod

quod sua uia procedit. Aut uerum id nisi aliquid impediat. Impediens autem est cetera pars phlegmatis utrei impuridi quae mouetur. Ad aliud dicendum, quod licet pars interior incipiat putrescere: statim tamen occurrunt phlegma vitreum motum impuridum secundum A. in frigidans. Ad aliud de lipparia etiam quid dicendum apparuit. Ad aliud similiter patet considerata causa differentiae & modo generationis lippariae secundum Isaac & A. Ad aliud dicendum secundum A. mouentem hanc dubitationem: quod in huiusmodi terminis attenditur una conditio ut non sit quod prohibeat, sicut diffinitur aqua frigida & humida quando dispositio eius est secundum suam naturam, & non fuerit quod prohibeat. Similiterque de grau descendu. Hic autem est prohibens humor, viscosus, frigidus, inclusus, aut aetherogeneus & diuersimode situatus: ut ostensum ex talium febrium generatione modorum.

Circa id quod dictum est in febre empiata secundum Gale. simul febrile & rigorem pati, haesitator an rigor causetur a calido vel frigido. Quod autem a calido uidetur, quia illud causetur a calido: cuius causa est calida, huiusmodi uero est rigor: ut ostendunt tertiana & causon in quibus euenit, crisis & februm secundis. Adhuc in rigore sentitur uelur acum & spinarum perforantium minutissime punctura. Isaac februm 5. unde dixerunt aliqui rigorem non esse aliud nisi puncturam sensibilium partium ex vaporibus calidioribus. Rursus 10. de ingere Rigor fit propter multitudinem & acredinem eorum quae feruntur, & propter uelocitatem delationis & uisitationis imbecillitatem, talia uero magis conestantur calidum. Amplius illud quod mordicat calidum impugnando naturae: ipsumque fugando, & per consequens in frigidando rigorem inducit, tale quidem est quod calidum mordat, ut apparebit per amplius, causetur itaque rigor a calido. In oppositum ut quod a frigido: quoniam Gale. lib. de investigatione, tremore, rigore, & spasmo. Rigor est frigiditas fortis, frigidum autem causetur a frigido, cum generum producentis sapiat naturam. Palin. Rigor causetur ex contractione calidi de partibus exterioribus ad interiora: quod frigiditas extremam ostendit. Sed is motus est frigidus & calidus uero contra. Eri. Rigori docent subuenire per frictiones calidas, inunctiones, & calidum assumptiones. Inducitur itaque rigor a frigido.

In contrarium etiam: puta quod si rigor fiat a calido non contingat a frigido aut contraria: quia contraria sunt causam contrarii sunt effectus; secundum de generatione & corruptione

ne. Sed calidum & frigidum sunt causa contraria, non unus igitur & idem effectus ut rigor causetur ab eis.

Propter primum: quidem tangatur primis uel uersis qualiter per rigorem & uel uersaliter ea quae apparent in paroxysmis significentur super morbi longitudinem, breuitatem, & medium ipsius. Secundo terminorum a liqua subdatur expositio. Propter primum huius sciendum, quod modi seu uarietates quibus cognoscuntur consistentiae seu ordinis temporum universalium in adiunctionem sunt septem, uel octo: quorum quatuor sunt tanquam essentialia puta paroxysmi anticipatio & postpositio: longitudo & breuitas, fortitudo & debilitas: mos seu modus aggrauationis; seu columitas & incolumitas. Reliqua uel accidentalia sicut accidentium longitudo, fortitudo, & eorum incolumitas, uel ipsorum opposita ut paucitas, breuitas, columitas ipsorum, & tempos declinationis paroxysmi longius priori, uel breuius, & si facilius aut difficiliter feruntur quae ipsius accidentia. Et aut post paroxysmum remaneat ab accidentibus mundificatus, uel circumuolutus in illis. Si ergo concidant omnes hi aut plures & digniores ut adinlicem, puta anticipatio, longitudo & fortitudo ut quae agnitudo erit augmento. Si autem concurrant oppositae omnes uel plures postpositio, breuitas, & reliqua: tunc maxime si materia fuerit digesta, erit in declinatione iam morbus. Si uero ceteri, uel plures aqua liter accendant: ut in priori uel prioribus paroxysmis, erit in statu, dummodo agnitudo non sit quae habeat de sui natura semper equaliter, & ut in statu esse, seu homotenus seu aequaliter extensus, aut anticipare sicut agnalticus seu augmentatiuus: uel postposere semper, seu apomalticus sive declinationis. Cognoscere tamen tantum uolus agnitodinum consistens ex maiori uel minori anticipatione & postpositione, ne cum aliis uel tenore ipsorum plus uel minus uniformi. Cognoscuntur tamen certius digestionem uel indigestionem materiae. Quando autem tales fuerint imminuti principium denotant agnitodinis aut materiae fuerit indigesta: inorta illud ueteris: secundum principia & fines imbecilliora cuncta, hoc crisis & utcumque aphorismorum primis. Propter secundum huius sciendum quod typi sunt tres, uel quatuor, rigor, horror, seu horripilatio: frigus & tremor secundum quosdam, uel de metra. Est triplex typus rigor horripilatio frigus. Frigus phlegma dicitur, rigor est quando cholera pangit. Quadoque potior claudit sex sanguinis tertius hinc. Est tremor quartus qui circit omne genus. Est autem typus figura uel imago uenientis febris: quae est reuocatio caloris natui de exterioribus maxime

maxime ad interiora: indeq; refractus non raro. Rigorem autem communis attribuunt cholera: iuxta illud aphor. quarta. A caufae habito rigore superuenienteolutio &c. Horrorem melancholicis, & frigus phlegmaticis, ut eorū denotant paroxifmi. Multoties tamen nūm pro alio fumitur: ita ut omnis typus aliquando confundatur sub rigore. unde aphor. quarta. Quibuscunq; in febribus quotidie rigores fiūt, quotidie febres foluuntur. Quod autem tremor fit communis circūiens omne genus typi non proprium approbo, cum magis conecdat, ut apparebit cum rigore, unde de huius. 4. prima. ita horripilatio eſt diſpoſitio in qua inuenit corpus diuerſitate in frigore ac punſionem in cute & lacertis, & antecedentem pigritia & confractio, frigus eſt ut ſentiatur in membris ſuis & doctis lacertorum frigus purum, ſentiunt enim ac ſi nix ac frigiditatis congelatio ſit aliqua eis inneſca. Iſaac feb. 5. Rigore eſt ut non poſſit continere membra ſua ex tremore & commotione in eis eueniente motibus inuoluntariis, & fortaliſſe eſt frigus forte; non ſit autem rigor fortis niſi in continua & quartana. Videtur igitur omnia eo communicare in rigore quandoque. Sic igitur rigor aliquando ſumitur communiter pro omni typo, ſicut apud Ioannem horripilatio; plures autem prout ſingulare diuiſum contra typos ceteros. In diuiſionibus quoque omnis typus ponitur horripilatio, diuerſificata tamen punctura, quaſi actuali, non frigore ac profundatione ipſius, & ueritas eſt qd ſuſcipiens auctores, nullam poterit certam inuenire attributionem typi deſignanti materiz alicui, eo fortaliſſe qd a calido procedit & frigido entibus diuerſis. Noſce qd typus accidit in febribus interpolatis, non autem in continuis niſi rarius ut apparebit conſequenter. Nam in his calor diffunditur per totum, ut maxime, tunc autem typus non poteſt magis accidere. Gal. vero eius ponit plures deſcriptiones aliorum rigoris quas omnes mordet, ut qd rigore eſt frigiditas corporis & qd eſt tremor cum frigiditate, & qd eſt frigiditas motiua dolore cauſans, ac qd eſt nocuentū in calore per naturam inuēto in omnibus animalibus: & qd etiam frigiditas eſt corpori ſubito occurrens. Deuuo uero bis omnibus notificationibus deſcriptis utriusque ſubdit, qd rigore eſt frigiditas fortis corpori adueniens: necnō trahens ipſum a naturali diſpoſitione ad innaturalē: quod per longa conatur declarare, & fortaliſſe aliquid indeterminatū conuaciet ac improprium in illo, ut tertio uidebitur dicendum: calidū uero & frigidū nota differentia 15. Propter ſecundum autem ſciendum, quod ut indicat diuerſificari uidentur in hoc queſito maiores: nam aliquando ſonant rigorem cauſati a calido: & interdum à frigido: & uni-

uerſaliter frigiditatem ipſam ut uidebitur per amplius concomitari. Sic etiam oſtendit diſſona ipſius attributio febrium diuerſarum paroxiſmis: & aliis diſpoſitionibus corporum uariis, quid autem de hoc apparebit conſequenter.

Propter tertium uero ſciendū primitus quid ſit rigor: hoc enim ſoluētur eoarguta, & quæ uidentur ipſi in eſſe aderunt reliquis ſeparatis, ac non minus diſſoliz cauſa & oppoſitionis circa bonē erit maniſeſta ut ſic pulcherrime demōſtratur quod eius nūmquodq; phy. 4. & 2. rigor: unde canſetur nūuerſaliter & ſpecialiter oſtendatur. Propter primum bonius ſciendum, qd rigor eſt conuentus quia crebris caloris naturalis & repentinus in corā re omnifariā præter naturam cauſatus: indeque paulatim ad ſuperficiem ut ad multum refractus. hæc nanque uidetur ſufficiens rigoris ratio, eius perfectæ denotans eſſentiam. quod apparet, nam conuentus ſeu concurſus aut motus extat uerius genus, unde principio de accidenti quinti. Ipaſſans, tremor, ſaltus, rigor & reliqua commune quidem habent genus omnia motum peccantem: hic autem motus auditus per ſi conuentus, peccans autem per id quod ſubditur repentinus. talis nanque delinquit in naturam: eum omne ſubitum nature prælatiuum. aphor. 3. hæc autem genere ſeparantur à rigore quæ non cadunt ſub motus ambitu: ſicut diſpoſitiones nel habitus, ceu ſanitas & ægritudo cum ſuis cauſis non habet rationem heri & motus, ut accidētia. Verum facti & quietati: ſicut uifum differentia 73. Eſt enim rigor accideus uitæ animalis, ne cætera præſtata. Dictum eſt alia quis, quia non omniſeuentus, ſed minor aut mediocritas, eſt rigor. Nam hæc diſſio, aliquis, quando additur alicui denotat paucitatem. 3. regi. acutorum. Id autem ſit additum ad differentiam tremoris: eo qd tremor quis ſequitur rigorem, & eſt ſicut rigor fortior cauſatus proprie a calido: licet multoties inſproprie ſumatur pro typo quocunq;. Cuius quidem gratia notandum qd tremor dupliciter accipitur, uno quidem modo prout eſt motus malus nūuerſalis totius corporis: & ita eſt effectus rigoris ceu quando adest uehementiſſima punctura cum agitatione quam maxime & dentiū ſtrodore. Ex hoc amplius cauſatus à calido & ad ſummū ex latione repentina calidi ſeroſi accēti ſuper partes ſenſibilioreſ entes. ſumitur & tremor prout eſt paſſio ſeu morbus officialis ſecundum Auic. quo partes conueniunt abſq; alia paſſione febrili nel altera contingente: ceu reliquæ neruorum ægritudines, io quo uo percipitur maniſeſte calor ſicut in priori tremore, aut frigus, & diſſert ab eo qd hic poteſt aduenire toti corpori uel pluribus partibus aut uni. Sed ille communis eſt omni corpori uel pluribus

ceu rigor à quæ ut ad vltimom pufius est confequendi de iectione rigore & fpafmo i rigor non eft uocamentum accideus in membro licet tremor, neque etiam tremens frigiditate sentit, ceu rigens. Adhuc in rigore est motus præternaturalum omnino, & ideo dictum omnifariam. In tremore autem nequaquam, cum tremor qui est ueruorum paffio coultur ex re præternaturalum couante mēbriorum fua quantitate uimia uel qualitate prana fupprimere: & natura fatagente fubleuare, ita ut bellum motuum contrariorum iufurgat: tremolofum inducens motum. Et propterea dicit Gale. id eft q̃ Plato non recte opinatus eft tremorem & rigorem vnum & idem efle. Sed quis dicit Plānem obferuans tunc per tremorem, illum intelligere qui eft commuui toti corpori multotiens rigor dictus, aut uerus (ut dictum) eius quali effectus: quando omnino caufe rigoris fuerit intenfæ. Separantur etiam fpafmus, & iectatio, uel titillatio, fine saltus. Videtur enim efle maiores magis extendentes uel etiam contrahentes quam rigor aut tremor, & maxime fpafmus: per id autem quod dicitur crebrus diuiditur rigor: & ab his atque à fternutatione, tuffu, fingultu, & huiufmodi. rari enim funt motus eorum i tremoris autem & rigoris commotiones pulfo etiam fpifiores, nifi formicantis forte. Subditur autem caloris naturalis quo fiquidem mouet: uirtus regitiua nunc quidem iutus: tuncq̃ue foras prout obiectum concitat inuatiuam feu oppofitum: vnde uigefima feptima problematum: calidum quod eft in nubis tanquam animal fulgiensq̃ue utique timebit. Ad cuius quidem præfentiam calidum fequitur permanere fubiectum. Ad eius autem abfentiam frigidum: idem namque potefl efle diuerforum caufa, ut nauta qui fui præfentia caufa eft falutis nauis, cuius abfentia fubmerfionis illius. phyficorum 2. Dicit autem in cor, quia calidum nociuum læfum cum fanguine femp̃ concurrat in cor uelut in arcem ac eius principium ut ibidem tueatur 5. appars de accidenti 2. Eideo Mefue de pharmacis omnium nocu mentorum aduenientium corpori primis occurfus eft ad cor, uelut ad bafim uitæ. Dictum autem repetitius, quoniam quod paulatim occorrit, non caufat rigorem, aut dolorem qui pifum comcomitatur. Quod enim paffiorem inducit, oportet ipfum fubitum efle & multum: ut apparet. 4. de accidenti. Debet etiam id efle præter naturam omnifariam, ita ut repentina innaturalitas cadat in naturam, & non in difpofitionem contrariam, quia magis quid dicitur delectabiliter in naturam, uelut quando calidiori occurrit contemperans id quod frigidius, per quod etiam tremor neruorum morbus feperatur à tremore rigorofo. eft etiam bre

uis tempore, ille uero longiffimus. Per id uero quod fubditur paulatine feperatur à uerecundia: ipfa enim fimilatur rigori cum in ea duplex fit talis motus naturæ: primo quidem ad intra, & confequenter ad extra: & in rigore fimiliter ut quàm multum, neruiamen in uerecundia citus fit calor naturalis reditur: non autem adeo in rigore. Dicitur autem ut ad multum refractus, propter rigorem qui aliquando contingit, ficut confpexi in morte uehementem quam magis frigidum aut ob uirtutis debilitatem, uel materiet fupfluum quantitæ 5. de accidenti, hic enim calor confugiens in cor non reuertitur, per hoc etiam fepratur timor & rigor uifus eo qui potefl rigori confociari nunc prætacto. Infficiens itaque prætacta uidetur rigoris ratio. Propter fecundum huius sciendum q̃ rigor apud Gal. & 6. theo. non folum caufatur à calido, uerum etiam à frigido. Quod autem à calido mōftrant ex febris tertianis interpolatis (ut tactum) incipientibus cū ipfo parofiftice, quo etiam terminantur caufones feu inccufiones, iuxta illud aphor. quarta. A caufone habito rigore fuperveniente foluitur ipfe, quod etiam oftendit fcintilla cadens fuper corpus hominis, & aqua feruentiffima confectim occurrentes. Similiter & uulnus medicamine afperfum acutiori. unde Ifaac feb. 5. Causa rigoris funt calidi & acuti chimi citum exitum habentes. Adhuc iftud induci rigorem quod caufat conuentum quendam crebrum caloris uatiui &c. tale uero eft calidum excedens impellens calidum naturale, caufansq̃ue ipfius abfentiam, cum eo q̃ calor naturæ (ut tactum) confugit in cor tanquam in ipfius tutum, itaq̃ rigor caufatur à calido. Firmant q̃ etiam fiat à frigido, ut phlegma oftendit nitreum, proprie cum frigiditatis fuerit multæ, maximeq̃ue cum fortiter moueatur ita ut diffoluatur, & hic quidem rigor non fortis ne prior, qui à calido licet illius refpectu perdoret quàm longiffime, qui & amplius mulieribus accidit quàm uiris, & maxime largam & ociofam ducentibus uitæ. Causatur etiam ab aere & aqua quàm multum frigidis mox occurrentibus, & proprie cum curpus fuerit porofum & natum fufcipere quæ adueniunt, ceu humores corruptos in expofito, fit etiam rigor quis in quarta compofitus aliquatiter ex calido & frigido, cum frigidus de fe fit ipfius humer, calidis uero putrefactione. Rigor tamen ad quem fequitur tremor & agitatiō totius quàm maior à frigidis eorum groffitie non generatur humoribus. Verum à fubtilioribus & acutioribus. Adhuc, illud quod inducit conuentum quendam crebrum &c. rigorem caufat, cum huiufmodi fit eius denotatio. huiufmodi uero eft frigidum cum impellat calorem naturalem, & in fugam ponat, uelut fibi oppofiti.

oppositum: quo siquidem dupliciter infrigidatur subiectum. Voi quidem propter frigidum in occurrentem, alter propter fugam calidi. Sed in eo qui fit a calore solis aduenit frigiditas, propter secessum calidi: & ideo remissior, licet namque acutum penetrat sentiat interiorius immerfas forinsecus tamen percipit frigus, propter quod fortasse rigor simpliciter non est frigiditas fortassis, sicut testatur Gal. verum potius causa ipsius quandoque, effectusque semper. Inducitur ergo rigor etiam à frigido: & sic ab utroque: quod etiam firmat ex 8. proble. ita. Propter quid horripilantur siue rigescunt à calido & frigido insuli. Soluens ait id contingere à frigido: quia extinguit calidum: cogitque ipsum abscedere. A calido quidem, quia frigidum circumferentiale repercutitur in unum & fugatus interiorum: ita ut idem differenter tamen possit diuersis causari, sicut à frigido per se amplius: a calido accidente magis. Sed circa prædictam causam rigoris assignationem debitare contingit: quando enim quis patitur tertianam, & paroxysmus cum rigore debeat superuenire, supposita dispositione omni corporis & continentis, sicut possibile, uniformi rigor tunc incipiens cum paroxismo: unde consabitur non quidem à natura paroxismi, cum non moueatur nisi mota, neque etiam à materia magis nunc quam prius determinate. quare videbitur causam eius sufficiens assignatio. Dicendum id contingere à causa exteriori superna magis quam humoris colluit cholericis & agitatur euenatione in motum determinata periodo: differetia declarata 88. quam siquidem causam medicus ut ipse non habet intueri. Nosce quippe ut particularius colligantur sermones de rigore & maxime Hipp. & una consoni reddantur, quod rigorem aut sequitur febris aut minime. Siquidem id tunc hic rigor paruus, vel forte mediocriter, quoniam ad quem febris non consequitur omnino, non tamen ad magnam consequitur. Rarius tamen enenit ut ad rigorem indifferenter non consequatur febris: ita ut tempore Hipp. semper concomitaretur rigorem febris, tempore tamen Gal. & nunc amplius: quia homines sunt amici gulae & luxuriae ociosi repleti sub frigidis humoribus plurimis & paratis alterari. Balneis etiam crebris utentes rigorem illationis. Aliquando rigorem non consequitur febris de distemperantia quinto de accidenti, & de tremore, ictericatione, rigore, & spasmo: velut quando quis lapsus aere sub frigido ente utcumque se habente denudat incenit huiusmodi rigorem quandoque. Si vero rigori superueniat febris aut id contingit ex parte materiarum magis, vel nimis imbecillitate, aut utraque. Si quidem prius aut materia est intra, uel na, uel extra. Si quippe sic rigor adueniens in

principiis febrium interpolatarum. si vero intratur est quod dictum. A causone habito & c. siquidem indigesta: & in locum unum impulsas: tunc occurrit rigor siue frigus, secundum illud aphor. quarta. In febribus ardentibus si quæ exterius frigida rigescant & reliqua. Unde in eorundem. 7. In acutis morbis frigiditas extremarum mala. Quod si materiam contingat mole, tunc fit rigor & maxime feb. apostematosarum principiis, cum calor nequeat diffundi superfluis obfessorum contrahitur per amplius ad locum apostematis. 4. prima. Si autem accidit uirtutis imbecillitate proprietate, pluries, sic erit ille prius aphorismus quarta. si rigor incidat febre non deficiente, debili uirtute, mortale. si autem utroque modo: tunc rigor in mortem conterminatur prædictum. Attende quoque quod inter sanitatem & mortem multi accidentium interueniunt gradus intermediis, nam post sanitatem anomala quædam extat deinde spontaneus quis labor quadruplex: ordine tamen aliquo, cum deterior sit ceteris apostemosis. deinde contractio postea horror siue horripilatio postea rigor, deinde tremor quos subsequitur, ut tactum, febris: ex febre autem moti aduenit quandoque, cuius quidem causa est extinctio caloris natui obuiatione contraria, uel regimen eius suffocationum. Tremoris autem uniuersalis & proprius causa est multitudine humorum subtilium modicam uelocissime delatorum super partes sensibiles cum uirtutis debilitate: ita ut tantis interueniat motus & agitatio, ut quis se non possit continere quin dentibus frendeat etiam: quem & febri quartana, & non cholericæ tantum attribuit Aimanfor: & maxime talis in ea potest concidere quando fuerit ex cholericæ adfusione febris causata, ita ut hic tremor (ut tactum) nehemetem se quatur rigorem. Rigor uero modicum immixtus his causis accidit. Per amplius autem minoris constante uirtute contingit horror. Ad hunc autem plus talibus imminuit contractionem seu angustiam & labor deinceps spontaneus & animalia & tandem sanitas causis his accidentium propulsatis omnino. quinto de accidenti, & decimo de ingenio.

Propter quartum quidem quid dicendum apparuit, utrinque: omnium partis rationes prioris uerum concluduntur ostendunt rigorem fieri a calido & frigido: ut concessum. Ad aliud uero quod tanquam subcontrarium dicendum non esse inconueniens, unum quiddam (ut ostensum) differenti modo a diuersis fieri causis: ita ut una sit prima: mediata secunda. una etiam per se, reliqua uero per accidentia, ut problematum nona. Ad ultimum in his que ostendunt diuersis agi causis idem est, quæ aut sunt amehæ, nihil prohibet esse alius, cum ostensum constat a quin-

etimaquinquagesimateria curam perfici contrario non solum immediato & per se: uerum per accidens & mediato, cum omne tandem cōcidat in idem & primum.

Quæstio VII.

Quod hectica non sit incipiendo uidetur per secundum crīsum excusantem se à determinatione signorum hecticæ, ita nulla hectica-rum in primis diebus, sed tempore procedente perficitur. Alia translatio. Hæc quidem febris non accidit à principio. Hoc idem sonant sermones Serap. & theo. 8. Amplius unumquodque agens operatur in materiam dispositam magis, & non in contrariam. Actus enim agens sunt in patiente & dispositio: cum forma propriam appetat susceptum: sed spiritus aut humor dispositior est materia ad inflammationem quam membrum: eo quod substantia est subtilior illo: & omnis talis plus recipit passionem, febrium primo. simplicium quarto. & primi secunda. Quod roboratur: quia esse febrium, ut apparet primo easum declaratur ex caliditate exteriorum: primitus enim accenditur caliditas in aerem balnei: deinde in aquam & postea in parietes illius. Adhuc quarto prima. & Isaac etiam febrium primo. Febris mediantibus spiritu & sanguine uel naturali calore se per totum diffeminat corpus. Hoc autem fore non potest, nisi primitus in spiritu & sanguine, idest humore & calore naturæ calor fundetur extraneus: quare uidetur quod omnis in primis febris sit epehemera aut putrida. Rursus. o quam parum est quod quartana accidat incipiendo: plurimum nanque euenit in successione ægritudinum putridarum diuersarum differentia 10. Cum autem materia quartanæ, & humor magis conueniat aliis humoribus, qui sepius febrem inducunt incipiendo quam cum materia hecticæ, quæ est substantia solida seu membrum: tunc nauq; fieri hectica incipiendo.

Itidem si hectica fieret incipiendo, iam non esset hectica: cum incipere dicat quid in dispositione fore, hectica uero habituacionem: ut apparet in his quæ deinceps. Hectica itaque incipiendo minime fiet.

Oppositum horum sapit Gal. in pluribus locorum de differentiis febrium cum A. Zoar. Aver. cum aliis medicis uniuersis. Quod & ratiooibus confirmatur. Cum enim omnes aliæ ægritudines ab eius occurrant principio propter quid hæc non similiter aliis. Adhuc cum de ratioo accidentis sit ut morbos sequatur, uelut nimb: corpus: tertio de accidente. & 1. de inge. si hectica semper alios comitetur morbos, potius accidentis, quam morbi rationem induet: cuius contrarium notum: cum tria ge-

nera sint febrium per se morbus existentia. Amplius non agit agens, nisi patiens eius sustinere valeat actionem. Cum agentis ad patiens oporteat proportionem interuenire, sicut mouetis ad mobile, & intelligentis ad intelligibile. Spiritus autem aut humor corpora subtilia non sunt apta impressioem agentis præpotentioris susceptam etiam sustinere: nerum in membra petransiens fulciatur solidiora. Itaque hectica fiet incipiendo.

Propter primum uero sciendum quod hectica quid habituatum importat, hecticō enim græce habituatum latine. unde 8. de inge. Dispositiones facile solubiles vocant habituinales, idest quasi dispositionales: quæ autem non tales, habituales. habitus enim secundum Boethium in prædicamentis est dispositio firma, uelut dispositio habitus infirmus. Hectica quoque habitum importat: aut quia cum difficultate, uel impossibilitate separatur quando habituata permanferit: uel quia subiecto solido, puta membro aduenit. A quo facta cum difficultate remouetur impressio. Est autem hectica in pluribus dispositionibus similis phtisis & etiā differens ab eadem, habent enim se uelut excedentia & excessa. Isaac febrium secundo. Nam phtisis non quidem modo cōmuni sumitur pro omni consumptione ex quacunque emergente causa: siue præter naturam, siue naturalem: qualis est dispositio quæ accidit decrepitis quando morti appropinquant, unde Almanforis quarto. Qui tali custodiuntur regimine, possibile fit ut ad decrepitam longodeueniant tempore, atque phtisim. Et hectica hæc proportionatur senectuti: quæ quidem euenit non parum ex ægritudine quadam consumptina. sumitur etiam pro illis qui ad ipsam sunt dispositi apho. 3. puta qui collum habent longum, & epiglottim foris prominentem, & pectus strictum, carne nudum, cum humeris eleuatis, & tortis cruribus & huiusmodi. phtisis in plusquam hectica febris se protegit. Est etiam phtisis quæ consumptionem importat: consumptio omnis corporis cum uisceratione pulmonis. Et hoc quidem modo hectica phtisim superat. Nam omnis sic phtisicus hecticus factus est, & non conneritur: cum multi hecticam patientur sine pulmonis ulcere. Talis quoque hectica uelut accidentis consequitur ad phtisim. Quando enim pulmonis aut pectoris sanies non expurgatur libere: effusans in cor ipsum inflammans febrem inducit hecticam. Hectica quoque ut innuebatur per prius duplex existit. Quorundam quidem est cum febre: quæ est calore extraneus fixus in substantia membrorum, ipsorum prohibens operationem, eorumque naturalem consumens humiditatem. colliget 3. Hu-

ius quoque heclicę febris multiplex assignatur modus distinguendi. Quidā enim ipsam penes corporis humiditates distinguunt. Humiditates autem corporis sunt quatuor: ut innuitur. 7. de inge, per quatuor fecitates distinctę illis oppositas. Eas quoque Serapio exprimit. 6. & Isaac febrium tertio. Et quarto prima, & 12. ipsius animalium &c. Quorum esse & numerus differentia innotuit. 33. Secundum haec quoque quatuor humiditates uidetur Isaac interdum species quatuor heclicę distinguere cui libet suam speciem heclicę adaptando. nonnūquam uero tres solum magis pronuntiat. Commouit tamen tres ipsius species distinguuntur, ita ut in primis duabus humiditatibus prima coincidat heclicę species, theoricę. 8. Serapio tamen & Isaac ponunt magis putridam ex ipsa fieri. Et ueritas est fortassis, quia huic putridę tandem associatur heclica. In tertia quoque secunda. In quarta uero, tertia. Has autem humiditates. A. quarto prima cum febrium primo. nititur ostendere & per consequens heclicam illis occurrentem per humiditatem triplicem in lucerna existentem. Est namque in corpore lucerę oleum effusum, quod duabus proportionatur humiditatibus primis. Est & humidum corpore licinij iam imbibitum, quod tertię redditum est humiditati. tertiū quoque humidum ipsius lycinii radicalē: quod partes coniungit & retinet in adinuicem: quod quartę proportionatur humiditati: ut etiam differentia inducitur. 17. 2. Eo hic heclicę modus cum nominibus eius terribilibus incurabilis: nisi manu sanari pronuntiatordiuina. Et ista quidem sufficiens uis est modorum heclicę distinctio. Quidam uero distinxerunt heclicę species dicentes: quoniam aut est in humiditatibus propinquit temporis coagulationi: & sic prima coagulat species, aut in eis quę sunt uelut caro: & hec secunda, uel in membris radicalibus duris: qualia sunt ossa & nerui: & ipsa tertia. 10. apparet de inge. Et iste quidem sermo verificatur ab A. quando ad priorem fuerit reductus antedictę quoniam si denotetur ipso quoddam primū quoddam heclica est humiditas propinquit temporis coagulatione: non erit sermo uerua, cum ex hac; secunda efficiatur heclicę species, & non prima, uel pręter hoc sit in cordis substantia. Hoc autem dicitur febrium primo ut quoddam quando complexio corporis naturalis inflammatur: & non adhuc humiditas consumitur exitensis in ipso: sed uelut ebullitio ostenditur, prima confurgit heclicę species. Quando autem hæc ebullitio ad consumptionem procedit secunda efficitur species. Quando uero membra similia partium laeduntur, ut uenę nerui & huiusmodi, tunc erit & tertia. Et hi quidem

omnes modi sane intellecti idem satis uidentur protendere. Est quoque & modus distinctionis heclicę satis famosus: ut quoddam quidam ipsius est difficilis cognitionis, & facili curationis: ut prima eius species. Quædam quoque facili omnino cognitionis, & impossibilis curationis: sicut tertius est modus. Secunda quoque species medium obtinet cognitionis & curationis. Et ista quidem distinctio magis ostendit modum quā rem: propter quod prædictę hac magis faciunt scire. Et scias quoddam Gal. febrium primo & alibi nominat simpliciter heclicam primam. & secundum maiorem partem secundam ipsius speciem: puta cum nondum deficcatur humiditas cordis: nam quando deficcatur ut in fine secundę species, & in tenia, dicitur tabes: secundum uero A. aduol. Est & alia senectutis dicta uel senii. quoniam aduenit ex ea in hora senii: quod accidit in fine marasmi: & ipsa est siccitatis dominiū super totum corpus absque febre. Cuius quidem causa ut plurimum est frigida cum uirtutis imbecillitate: unde membra uirtutem to carent. causatur etiam ex potu aquę frigidę quando dispositio non affuerit. Eam quandoque causat medicus faciens febrem heclicam marasmodem per potum aquę frigidę & in ipsius proiectionem in hanc quidem minus deterrentem transire. unde to de inge. Melius est frigidam discrasiam translatum hominem: cum spe benigna efficiens quid & periclitari quā sine spe perire certissime: propter quod infrigidamus omnino heclicas febres confestim antequā deuenientes in tabem moriantur. Non enim qui certissime tabescit est tentabimus sanare: & si calorem eius extuxerimus. Sed siccitas derelicta senectutis hominem promittit tanto uicturum tempore, quanto resistent solidę particulę ad ultimam senectutem. Fieri autem incipiendo intelligo heclicam: cum nulla aliarum febrium antecesserit ipsam, neque ephemera neque putrida: ut alia quæcunque causarum immo prima caliditas in corpore accendatur cordis ex causa quadam forti: & si omnes febres fundantur in corde, ista quā maxime in eius figuratur substantia.

Propter secundum autem sciendum, quoddam aliqui rudium audientes superficiei tenas sermonem prædictum Gal. & antemissa motiua dixerunt heclicam incipiendo minime fieri. unde febrium primo. Quare quidam æstimant neque aliter posse fieri hanc passionem talem, ab ægritudinibus præuentibus mori dicendis. Decipiuntur etiam aliqui illic ex serie Gal. tali: Heclicę cum sine causis purgationis generentur, nunquam ab initio inuadunt: sed transcendunt ex his quę sunt ex

putredine. Dicendum q^d his sermo non est simplex: sed magis conditionalis & consequentia destructio: ut apparebit diligenter intuenti eundem & consequentem post plurima. Quorum quidem & aliorum amplius defectus videbitur consequenter aperte.

Propter tertium quidem sciendum, q^d febris hectica ut plurimum non occurrat incipiendo: uerum alias consequitur febres & ægitudines. Raroque incipiendo aduenit cum eius causa raro occurrat. unde feb. primo. Hecticæ febres secundum duplicem sunt modum, quandoque eoim propter causas quàm multum prolongatos: ut & humiditatem corporis consumant cordis. Interdum uero adhuc manente cordis humiditate febres accenduntur uelut lucernarum flamma ex lycinio. Fit etiam hectica non parum ex emittente: unde quarto prima. Emitritur quandoque est de febribus magis interficientibus, quoniam perducit ad hecticam, & ægitudines chronicas & difficiles. Cōfurgit etiam ipsa ut apparuit ex phibitis antecedente: non nunquam uero ex empiam, & uivetsaliter ex apostemate intus maxime sanjato: & propter subtiliationem tegiminis & prohibitionem in frigidationis, ut potus aquæ: & propter modicam observationem lateris cordis cum rebus in frigidantibus de foris aut de intus. Multoties etiam in ipsam cadere facit medici necessitas, ppter causam uirtutis & frequentiam synopsis dantis in potu uinum & aquam carniū & medicinas calidas, ut de musco. Fit etiam (ut tactum) interdum incipiens hectica, unde Galibidem. Vna quidem hecticarum generatio dicta est mihi. reliqua uero est quando a principio inuadunt confestim primam generationem similem facientes ephemeris ut tristitia, ira, & labore ampliori simul cum æstu facta. Decimo uero deinge. Rursus ex causonidibus intabem aut à principio ipsius cōfestim hectica contingit febrem præsilens causonidem. Isaac quoque hanc distinguēs ait q^d hectica quædam est cuius causa est alius morbus: alia uero cuius causa non est alius morbus: quæ confurgit ex inflammatione humoris exstentis in concuitate uenarum & artieriarum cordis. unde recolligens ait. Quia compleninus causam hecticæ: quæ est propter alium morbum: & causam eius quæ nō est propter aliū morbum: sed per se &c. A. uero positis causis quibus febris euenit hectica, consequenter subdit. Longissimum est ut accidat hectica incipiendo: quasi sint membra radicalia iam inflammata & non inflammetur humor siue spiritus ante illud: immo oportet ut caleant illa in primis: deinde secundum profectionem diurnam caleant ista: nisi accidat causa fortis ualde. Sermone quoque de hoc assumpti Zoar

ita. Vna sit species febrium, hectica dicta, quæ ut in pluribus non arripit per se principaliter: sed sequitur aliquā febrium chronicarum corpus exiccantium, ipsūq; dissipantium. quandoque etiam sit propter febrē dici. Colliget quidem 4. Raro accidit febris hectica: nisi post alias febres, sicut post ephemeram in corporibus ad hanc paratis, aut post aliquam ex putridis. Præuenit autem per se in his causa quæ natura sicciore & calidiores uiuentes in laboribus, uigiliis, dicta subtiliori: & amplius si cūhuius aeris dispositione & regionis in iram uel tristitiā peruenerint: febrium primo. Hi utiq; sunt sermones quos de principatione istius febris per se aut post alias illustres indusere. Qui etiam secundum utranque eorum partem possunt rationibus decorari. Quod enim in pluribus hectica morbos concomitetur alios, ostenditur. Cum unum quodque agens (ut tactum) in materiam formam inducat sibi dispositam pluribus causis caliditatem inducentibus in corpus materia amplius disposita est spiritus: qui est subiectum febris ephemeræ, aut humor qui putridæ, quàm membrū in quo & hectica figitur: eo q^d rarius causa adeo uehementer impressiua occurrat corpori: sicut etiam in uniuerso conspiciuntur. In eo enim effectus graudes mirandi rarius occurrunt. Amplius. natura tuetur in quantum potest solidam partem: puta membrum spermaticum: quod est subiectum & sustentaculum eorum omnium quæ sunt in animali: & maxime cor: quod hecticæ proprium subiectum, non solum secundum contenta in eo, ut aliis plus febrium: uerum etiam secundum ipsius substantiam propriam, quod uero tale fuerit, conseruatur maxime à natura cum sapientia & intentione omni. Fit igitur ut ad multum non incipiendo quod indicat Almelileu febres ut plurimum antecedens. Quod autem fiat incipiendo quandoque ostenditur, quia agens agit, non in quocunque, sed in patiens sibi dispositum. Quod autem patiens non sit dispositum dupliciter potest contingere, aut quia sit nimis durum & compactum resistens omniafariam, uel ferum, lapides pretiosi, & maxime adamas: uel quod sit subtile, molle, cessibile, ut aer aut uapor, qui actionem agentis non sustinere potest, sed magis sit transitus in solidius, durius, ceu ostenditur in percussionibus quibus corpora percutiuntur solida non resistenti aere, uelut etiam uidere contingit in fulgure quod nō omne patiens reddit sibi dispositum, ut in ipsum agat: sed illud quod est durum, compactum, & resistens. unde Algazel. Fulgur quod est ignis subtilis penetrat herbas & res molles: sed quando res duras offendit: sicut ferum & aurum, dissoluit eas: quæ cliquat aurum

in marfupio & marfupium non aditit: & diffoluit ferrum in maubus & homines oon adnit: quod euenit: ex eo quòd illa refiftunt, hæc autem minime. Sit itaque in propofito fæpius factum eft quòd fpiritus aut humor (ut oftentum) materia paucia, redditus eft conueniens febribus: oon autem membrum, propter quòd frequentius contingit heftica poft alios morborum. Interdum uero fpiritus, aut humor non eft conueniens fubiectum, propter eorum fubilitatem & mollitiem, fed membrum durum folidum: & hoc quando caufa fuerit quandoque fortis fulguri proportionata. Ex qua talis rarius accidit, tardius enenit, ut fiat heftica incipiendo. Imprefio enim modica ita in humoribus & minor in fpiritibus inducitur: propter quòd in membris calor in calefacto effe non autem in calefieri tantum: uelut in fpiritibus & ho. Amplius, quando fuerit materia fumme difpofita: non forte agens èt in ipfam poterit imprimere: fed difpofita reperitur quando ulime: ut cum tam naturalia quàm innaturalia in calidum tendant & ficum. Nullus enim ab initio confiftit eaptus eft heftica habentium humidum corporis habitum: febrium primo: fed & frigidum multomions. Quòd autem agens occurrat forti aliquando, iam uifum. Quare ficut heftica fit primus, & non alia.

Propter quatum quidem dicendum: ad primum quòd ipsi loquuntur quantum ad id quòd accidit ut in pluribus in quibus maxime ars confiftit. Heftica nero incipiens aduenit in his quæ rarius: ut oftentum. Volens enim, 3. crifum excufare fe Gala datioe fignorum hefticæ: ait ipfam fore omittendam, tum quoniam in aliis locis de his erat tractaturus: ut primo febrium. tum quoniam figna huius febris habebantur per figna illarum febrium præcedentium, cum ipsa fic rarius contingat. Aliquis autem dubitabit fi heftica incipiens raro occurrit: cum de his quæ funt raro non fit fcientia: uerum de his quæ funt fempet aut ut in pluribus. phy. 2. quomodo erit fcientia de ipsa poftis fuperius dicendo quòd raro potest euenire: & tuoe per fe fine alijs febribus præcedentibus fit. Dicendum ut apparet in prædicto, & 6. etiam nota. quòd fcientia non tollit ab aliquo ex eo quòd fit de eis quæ funt raro: dummodo illud raro caufas habeat determinatas: ficut coniunctio Saturni & Iouis in primo anetis minus raro cotingit, quia circa finem mille annorum. Corpus etiam temperatifsimu de bona habitudine in longorum occenrit temporu periodis, & tamen de ipfo eft fcientia: ut de eius caufis & fignis, habet. n. caufas fufficietes effeotie fuz, per quas potest aliquòd poni in effe & fignificationes quibus difcernit fore, fic itaq; & fi aliquid raro eueniat dummodo

caufas habeat per fe determinatas ad aliud, raro de ipfo poterit effe fcientia. Ad aliud dicendum quod fpiritus, & humor pluribus agētibus & febrem caufantibus funt materia difpofita, quibusdam autem paucis oō, ut declaratum prius. Ad confirmationem dicendum, quòd ut apparet per Gal. non folum ex aere calefacto calefit aqua balnei, & iode parietes eius, nerum aliquòd primus potest calefieri paries: deinde aqua & tandem aer. & interdum primo calefiunt humores quifpiritus calefaciant, & tandem membra. Aut membra prius fpiritibus inflammabuntur, fecundum enim quòd fuerint caufa agens materiam fibi coaptat: cum quodlibet oon agat in quodlibet: fed in fibi determinatum. Ad aliud dicendum, quòd calor primus potest in cot infendi ex aliqua grandicaufa, quæ quafi immediatus ufque in eor penetrat, & ita erit febris, & tunc ille calor deportabitur mediante fpiritu & fanguine per totum corpus, oon tamen calor erit in eis in calefacto effe quòd eft febris, cum fit morbus & hic mutationem dicat ftabilem in hoc differens ab accidente. differentia 73. fed oon in calefieri quòd motum deoominat ad calefactum effe. Febrium, enim principio enim fit aliqua febris: puta ephemera feu pu. uel heftica, una iftarum caufatur iocelfe per fumm fubiectum in calefacto effe, fubiecta uero alia non funt in calefacto effe, fed in calefieri folum, licet nanque in qualibet febrium totum corpus inflammetur, quia tamen non eft in calefacto effe, nerum in calefieri magis: ideo non funt alie neceffarie febres ualente. Ex hanc quidem rationem diffolueret deficiuerunt ponentes fpiritem aut humorem minime inflammati, cum heftica adueoit incipiendo dicente caliditate nullo modo in fpiritibus aut humoribus effe, occultetur tamen propter caliditatem grandem membrorum cum hefticæ calor fit intensior calore tertianæ. primo fecunda: & quarto de anima. Caliditas coim maior ad fe minorem contrahit & extinguit. Motus enim maior minorem depellit & occultat. differentia 90. Ad aliud dicendum, quòd per alium modu fit febris quariana et per alium hefticam, nam quarta oon fit e materia frigide & fice putrefactione, quæ omnibus ineptior eft ad putrefactionem, cum putredo per calidum fiat & humidum. uode & quidam ob hoc negauerunt quartanam fieri a melancholia naturali, quarto prima. Heftica uero febris fit ex inflammatione fimpliet, humiditates uero & maxime primæ cum funt notiofe: aptiores funt ad inflammationem, quàm melancholia ad putrefactionem. Et ideo non minus potest accidere heftica incipiendo quàm quartana. Adhuc grofior fortassis eft melancholia, quàm pri

ma humiditates. Ad aliud dicendum, qd he-
ctica magis uidetur hoc nomen sibi acquiritur
se ex suo processu & fine, quam ex eius princi-
pio: tunc enim est in sua dispositione cum ipsa
sit facilis curatione. Aut dicitur hectica (ut ta-
ctum) ratione compactionis subiecti: cui qui-
de m infigitur ut humiditatis uel membrum. Ad
argumentum etiam quoddam alterius partis
dicendum qd licet aliquid ut accidens sequatur
alios morbos: dum tamen stat & figitur essen-
tialiter operatione: laedens: ipsum idem mor-
bus efficitur ut hectica ex phthisi causata. Et do-
lor etiam capitis quando fuerit permansius.
differentia 74. ostensum &c.

Quaestio VIII.

Quod febris pestilentialis sub ephemera re-
ponatur ostenditur quis aer corruptus perue-
niens ad cor spiritus complexionem corrup-
pit. quarto primis. sed ephemera sit in spiriti-
bus. Adhuc febris est passio cordis propria.
Erit itaque principalior partis eius. Sed hoc
est spiritus, qui ipse est radix. Corpus autem
cordis est ramus, tertio 11. Ephemera uero di-
cta est in spiritu fieri: igitur hae ad epheme-
ram reducitur. Amplius uidetur hectica ma-
gis: quia statim A. post hectica de ipsa nego-
natur: quorum autem sit determinatio unus
post aliud immediatus, uidentur ad eandem
rem pertinere, ut ordo seruetur rei & discipli-
nae. Itidem ille febres uidentur esse sub eodem
genere: quae eadem curantur cura: cum ad es-
sentiam morbi, causarum & accidentium ordi-
netur illa. Sed cura eadem uidetur curari hae
febris cum hectica unde Almanforis. 10. Re-
gendi sunt febrientes ex pestilentia ex omni-
bus, quae in capitulo de hectica diximus. Rur-
sus in hectica non iniungitur abstinentia: neq;
in ista timo magis incitantur laborantes re-
comedant: cum plures eorum nihil sumere gli-
scant. Almanfor unde A. Necessè est ut re-
staurantur ipsos supra cibum. Cumque appetitus
ipsorum cadit restaurantur ad comestionem.
nam plurimi eorum qui similiter agunt super
illud & comedunt uiolenter absoluantur & ui-
uunt. Palin. ipsa etiam sit in humiditatibus:
sed febris pestilentialis putrefactio quod de hu-
miditate circumdat cor. A. Itaque febres pe-
stilentiales sub hecticarum genere collocantur.
Rursus uidetur putrida: quoniam ex putrefac-
tione accidit. aerem putrefactus humores
putrefacit aptiores ceteris quae sunt corporis
putrefacti ioui, quia calidi sunt magis & humi-
di. Exi. dicunt ipsam aduenire corporibus hu-
mores habentibus paratos putrefactioni, uno s.
quisque enim incurrit aegritudinem cui extat
expositus magis, cum potissima particula ge-

nerationis aegritudinis sit passus corporis pra-
paratio. februm primo. Erit igitur sub genere
putridae locanda.

Oppositum uero huius monstratur: quoniam
febris putrida est humoralis. haec uero non est
humoralis. unde Isaac februm 3. Plurimi pa-
tiuntur pessimos morbos de genere pestilen-
tiali, & febres non de genere humorum. Pa-
lin. in febre putrida pulsus & urina alterantur
uehementi alteratione: sed in hac minime. Qua-
re quarto prima. Non alteratur pulsus & aqua
magna alteratione. Et quandoque est urina
in febribus pestilentialibus bona & naturalis in
sui substantia & colore & sedimine: & ille cui-
us est tendit ad mortem: quarti secunda. Exi.
A. alium ei construit tractatum & reliquis fe-
brium discretum. Non igitur ipsa erit putrida:
sed nec ephemera uel hectica.

Propter primum quidem primitus sciendum
quot & quae sunt genera februm 2. quot & quae
sint causae pestilentiae: quidque ipsa & morbos
ipsius ostendatur. Primum autem huius om-
ne differentia innouit 87. Propter secundum
huius sciendum, quod cum febris pestilentialis
plurimi sit documenta pernicietique illati-
us. & hoc actione quadam existat: causae ip-
sae erunt tres, aut quatuor, quae in cuiuslibet
naturali expetuntur actione: fortitudo nide-
licet, agentis, dispositio patientis & constantia
& mora. Oportet enim in tali actione cor-
ruptius huiusmodi febrem patientis etiam fore
dispositum ut in aliis euenit actionibus: cum
agentiui actus in materiam concidant dispo-
situm 2. de anima. unde primo februm. Nulla
causarum sine patientis aptitudine agere apta
nata est. Propter quod 4. prima. Agens so-
lum cum peruenit & non sit patienti prepara-
tio: non accidit actio & passio. Et ideo pri-
ma proble. ait hanc febrem omnibus pestilen-
tiam inferre. Quicumque praue habentes pra-
existente. Qui enim bonos habuerunt humo-
res, resistunt eorum temperie & uigore aeris
corruptioni: quare in problem. etiam Arist.
quibusdam ascriptis. Quibuscuque fortiter
sunt secundum ipsam generationem ab astro-
rum impressione quod sunt brevis dicit, uelo-
cius redarguentur, & consumuntur pestilen-
tia concitati. Ut enim domus antiqua & im-
becillis celerius uento concidit uehementi,
quam fortis & noua: sic & hi pestilentialis. vn-
de Haly. Non infirmantur omnes homines apud
mutationem substantiae aeris: nam corpus cui-
us chimus non est preparatus euitat aerem, &
resoluit eum antequam alteretur ab eo. quare
Alexander in proble. Propter quid in pestilen-
tiali constitutione hi quidem moriuntur: hi
vero minime. Causam quidem assignat ex
complexionis preparatione. Si enim fuerit qui
plenus

plenus chochima: manifestum quod inspiratus putrescibilis aer hunc corruptum, si uero euehmus nihil aut parum ipsum pestilentialis aer lædit. Voluit etiam Zoar epidimiam accideri quando Deus illam mandat quod præsentis non est speculationis. Corpora uero huic febris propriè maxime disposita sunt quæ plurimo coitu usæ, latorum pororum, humida, multæ balneationis, & uniuersaliter illa quæ qualitatè putrefactionis aeris sunt homogenea. Contraria uero non læduntur, sed potius contemperantur. Occurrit & hoc agens secundo forte. Quando enim tale fuerit & in materiam agii indispotam primitus illam disponendo: & de noua formam inducendo; ut est guttam lapideam contereere 8. phy. & spho. complexionum ratio cum interiorum primo: aer autem agens est forte putrefactus ut propter ipsius ad nos immediationem, & incurabilem ipsius necessitatem. 9. de inge. tum etiam propter eius putrescibilem pessimam qualitatem cum substantia, plurima enim huius aeris impressio ab agente, ut declarabitur amplius uideatur quàm à materiz dispositione dependere. Etiam tercio contrarius scilicet aeris uadique intus immediatus & exterius occurrentis qui in omni caspetitur actione naturalis de genere, & corru. primo cum quo interuenit & tempus necessario. Quis enim sic potest velociter manum ab igne actiuissimo separare, ut & caliditate ipsius uo percipiat? Neque etiam ignis siue prædictis causis poterit uilatenus operari, quod tempus in huiusmodi aeris impressione inerat proprie: cum talis ipsius simul putrescibilis impressio non de facili possit separari ab eodem. Et hæc quidem cum primis: secundo de causa, & primo secunda in omni quæritur physica operatione. Agentes quoque causæ cum patientibus his duobus sulciris mediis duplices sunt, uniuersales & remotæ: & particulares propinquæ. Primæ quidem sunt dispositiones præcedentes ex formis cæli siue imaginibus facientibus esse necesse illud cuius aduentus ignorata medico, scilicet in quantum tales putrefecere faciès aerem & aquam. Fiunt & putredines in terræ visceribus propter causas à medico ignoratas quod ex luminariū proprie contingit eclipsibus & coniunctione planetarum & maxime Saturni & Martis cum stellis fixis aut iporum adunatione in aliquo signorum humanorum, & proprie quando præualluerint in domo uisæ in aliqua coniunctione maiorum vel aspectu aut reuolutione anni mundani inducentibus prauas temporum constitutiones permutarum effluuiis & naturalis. Causæ uero particulares & propinquæ sunt corruptiones hic sensibiles in aere deprope existentes uel uentis & maxime australibus ea longinquis partibus adductæ, sicut euenit in appetito-

ne cauernarum, & piteorum diutius concluserum. Aut propter inuentationem & contractionem aeris inter parietes & tecta cum imobilis reddatur: uel propter lacanas putridas & stagnas: & res ut linū in illa immisissas: uel propter uegetabilia: sicut caules, eruca lacticiuia acuta & uiscosa. Aut propter baratra uenenosam auram expirantia, sicut circa Sardos & Ierapolim: aut riuum magnam ciuitatem expurgantem uel exercitiū multoties perturbatum. Et propter arbores malarum complexionum, ut sobæ & iaxum: ouces: ficus: odores putridos & priuationem ventorum laudabilium, aut propter stercorea, & animalium cadauera, uel hominum copora occisorum in prælio intumescula, siue incombusta. Nam forsitan ex ethiopia secundum coniuuientem influerunt quedam putrida inquinamenta Atheniensibus habentibus apta corpora lædi ab ipsi futura causa febris: febrium primo. Est etiam & modus quis pestilentiz quasi mediat: mortalitas enim corruptit arbores & uegetabilia, & hæc corumpunt animalia quæ ea comedunt: & propterea homines qui eis uescuntur, corumpuntur. primo secunda. Fit quoque secundum Democritum quando famem sequitur abundantia. Ex propter languida tritica: herbas & uarios cibos quando fame hos sumptu rineo coacti: ut etiam Zoar de pestilentia recitat marochiana. Quando autem pestilentia ex inferioribus fuerit, iubent medici superiora & lata querere aeris. Quando uero ex superioribus, inferiora conclusa. Neque mirandum est aerem putrescere, cum ipse fumis terrestribus uaporibus permiscetur aquosis, radij etiam superiorum permiscetibus ista, neque enim permanet in sui simplicitate, tunc enim non putresceret cum nullū nudorum simpliciū posset putrescere, & ideo cum ignis, inter cætera elementorum simplicior existens permaneat, putrescit, minime, unde meteo. 4. Omnia alia putrescunt excepto igne, etenim terra, aqua, & aer putrescunt. Deinceps quidem considera uolum quid sit pestilentia. Et quia est mutatio quedam facta in aere: primitus sciendum, quod mutatio duplex est ipsius. Una quidem in eius qualitatibus, & altera in eius substantia magis. Mutatio tamen in substantia nunquam potest siue mutatione in qualitatibus perici, cū qualitate omnis fiat actio, non tamen e contra. Mutatio quæ secundū qualitatem est quæ aer secundum caliditatem & frigiditatem maxime ad dispositionem peruenit in tolerabilem, adeo ut inde menses & generatio corrumpantur & vita, quod dupliciter euenit: quoniam aut est symbola mutatio, sicut rabio sitas æstatis in calore, & hyemis in frigore, uel e contra cōuersio, uel malitia frigoris in æstas: & caliditas hyeme. Ex similiter quoque modo in

allis qualitatibus. Quando enim aer permota-
ntur intantum, & corpora similiter peruertun-
tur. disponuntur enim similiter tempore pro-
ble. prima. Mutatio quidem aeris ipsius in sub-
stantia est, ut hæc ad malitiam conuertatur, nõ
q̃ aliqua suarum qualitatum ualde fortior fue-
rit facta augmento aut diminutione, licet non
sine earum mutatione contingat, & hæc dicitur
pestilentialia 5. theori. quæ est mutatio aeris
in corruptionem & putredinem propter egres-
sionem a temperamento in eius substantia &
qualitate. Secundum uero A. pestilentialia est pu-
trefactio quæ accidit aeris: similis putrefactioni
aquæ remolitionis scilicet. Ingrossatur enim
& remolitur uelut aqua quando quis immise-
rit linum aut caupum uel talia in illam. Ut
autem appareat consequenter quid sit morbus
pestilentialis sciendum, q̃ morbus est duplex.
Quidam nanque particularis, idest particula-
riter & diuisim sparsus: sicut qui in eodem tem-
pore & ciuitate differenter hominibus conti-
git, ut alius quartana uel tertiana, nonnullis ue-
ro phrenitis &c. Est & alius communis, qui etiã
duplex, quia quidam est consuetus & cognitus:
& dicitur endemicus, seu endimialis quasi ab in-
tusu eueniens, & est contingens ratione loci, pu-
ta propter aquam uel uentum uel terræ fundus:
cui in quibusdam ciuitatibus nephritis abun-
dat, in alijs botium, quod apud Arabes nunquã
nec raro est reperiunt, in quibusdam uena me-
dici nec ciuilibus sæpe, quam Gal. nunquam uidit
interio. 6. & de tali morbo agitur in libro de
aere & aqua. Est & alter epidimialis, idest su-
per uel extra eueniens ad differentiam illius qui
conspicitur ex loco. Solet etiam epidimia, idest
supereueniens pro pestilentialia sumi: & si genera-
lior & existat ipsa. Est autem secundum Haly
morbus pestilentialis multiplex & subditus: uno
eodem q̃ tempore hominum multitudini com-
munis. Multiplicem quoque dixi: ut osten-
derem varietatem huius morbi, pestilentialis
enim sola ægitudine communis est omni-
bus proble. prima. Quoniam quidam est pes-
tilentialia ex qua febris adueniunt contione: in-
terdum carbunculi, & aliquando dissenteria, ua-
riolæ, morbilli aliquoties, & alia sicut in li-
bris epidemiarum ostenditur. Dicitur autem sub-
ditus ad differentiam morbi endimialis: qui pau-
latine euenit ex impressione illorum quæ in lo-
co existunt illo. Reliquum autem quod in de-
scriptione subiungitur ad differentiam dictum
est morbi proprii. Non enim euenit eodem tẽ-
pore idem plurimis morbis, sed differens magis:
com ex indebita sex rerum administratione cõ-
tingat in qua differentes diuersimode peccant.
Contingit autem pestilentialia & aeris putrefactio
secundum plurimum in postremo ætate, & in
autumno. Almanfor & A. Sed circa præfata

hæsitatur, quia dictum est pestilentialiam fieri ex
putrefactione aeris maxime, quod nõ uidetur,
quia 25. proble. quæritur, quare aqua & terra
putrefit. Cuius causa assignatur, quia omne
calidissimum fit impetridum. Infrigidari enim
oportet primum. Ignis autem calidus semper
Auer. uero igne plenus. In contrarium dictum
est omnia putrefieri excepto igne. Etenim ter-
ra & aqua & aer putrefiunt quod & medici tes-
tantur cuncti. Dicendum q̃ aer porus non
putrefit: neque ipse prout igni commissus. Ve-
hementer enim calidum à putrefactione præ-
seruat, putrefit autem alius ut impermissus &
infrigidatus.

Propter secundum quidem sciendum quod-
dam noluisse hæc febrem ad genus ephemeræ
reducere. Quorum motuum cum antedictis
fuit: quoniam quædam pestilentialia aeris euenit
propter simplicem qualitatẽ sine putrefactio-
ne ipsius. Quæ quidem quia cum spiritibus cõ-
uenit, qui similiter calidi sunt & siccis, & ægritu-
do promptius contingit in genere proportio-
nali, concludunt huiusmodi febrem de genere
febris dici. Sed ista positio stare non potest.
Extraneum enim est multum ut hæc febris po-
natur ephemeræ, cum nullam aut modicam ual-
de convenientiam secum habeat, quod osten-
ditur, quia febris ephemeræ in uno sæpe aut
pluribus rariis in quatuor terminatur diebus, hæc
autem ad plures extenditur dies, secundum di-
spositionem patientis, & fortitudinem agen-
tis. Adhuc ephemeræ salubris est de se, pes-
tilentialis uero febris plurimum mortifera. Vo-
nde Isaac ex hæc ait febres saluari rarissimos. Et
A. secundum plurimum perdens quod inno-
centiapho. 2. plures erisies sunt ad salutem quam
ad mortem, nisi morbus pestilentialis fuerit.
Sic igitur propter hæc & alia plurima, ut etiam
ostenditur, quibus hæc febris omnino discre-
pat ab ephemeris, non est dicendum sub illa ip-
sam locari. Motuum etiam non ualet illorũ,
imo dupliciter deficit. primo quia ut ostensum
est, mutatio aeris in qualitate etiam existente
pestilentialis non reputatur proprie, nisi con-
uersionem causet in substantia. Secundo quia
dispositio aeris calida uehementer & sicca, non
se inducit ephemeram, sed potius potridam uel
hecticam. unde quarti prima. Febres acciden-
tes causa aeris siccis sunt causa ut febres nent
cholericæ: multo igitur magis fieret quãdo est
caliditas aut cum ipsa in aere siccitas coniuncta
hecticæ & non ephemeræ. q̃ autem non eph-
emeræ, sed hecticæ, euenit quia spiritus subiectũ
subtile leuiter tantum in motum aeris non potest
sustinere, unde fit transiunt ad humores, qui sub-
iecta compatiuntur & tolerabilia existunt. differ-
rentia præcedit. Alij uero uolunt ipsam
ad genus hecticarum reducere moti antedictis

præargutis. Et hoc quia sicut in hætica inueniuntur dispositiones laborantibus quasi insensibiles tepide, sic & in ista. Adhuc uidetur & hæc in oculis iuxta profundari, ut hætica, propter quod uoluerunt ad illam reducere. Sed hoc etiam satis est longe quod ad hæticam adducatur, quod ex grandi inter eas ostenditur diuersitate, quoniam in hac præcipitur euacuatio & purgatio, in hætica uero minime. Eius terminator crisis, non autem hætica, propter quod remotus reducitur ad ipsam. Neque etiam motus ipsorum ualent, quia dispositiones in eis non sunt æquales ut in hætica; sed permittantur diuersis mutationibus. Percipitur enim aliqui ex ipsa caliditas & inflammatio fortis: & quandoque frigiditas & proprie in extremis & exterius. Et ad summum calens interiorius, & infrigidatur exterius: quod hæticis non fit. Amplius posito quod fundetur interior ut hætica, non tamen expanditur exterius ut ipsa neque in membris est: sed in humoribus ut ostenditur.

Propter tertium uero sciendum, quod ipsa simpliciter ad febrem reducitur putridam. Modum autem reductionis ipsius A. cum Ari. proble. prima tetigit dicens: aer putrescit propter expulsionem & sparsionem humorum in ipso, qui quidem putrefactus ad cor peruenit, quare corrumpit complexionem spiritus qui est in ipso, & putrescit quod circumdat ipsum de humiditate & accedit caliditas a natura egressa, & spargitur in corpore; & sic inde consurgit febris pestilentialis, quod ostenditur febrium primo, quia uero pestilentioforum meminimus febrium à putredine omnium sentium &c. sic ergo uult eas à putredine fieri. Quod & monstratur ratione sumpta quidem à priori, quoniam febris putrida dicitur, eo quod ex putredine consurgit: sed talis est pestilentialis, quod ostenditur per plurima considerantis quæ Gal. testatur de ipsa cum aliis. uide primo febrium. Febris pestilentialis fit propter humores aptos ad putredinem existentes, quando occasionem quandam breuem à continente acceperit animal, quam multum autem ex respiratione incipit, eo qui in circuitu est aere à putrida euaporatione conterminato. Principium autem putredinis &c. Subdit etiam quod corpora copulata aeri in quo pestilentia consistunt semina superfluitatibus plena, præparata sunt iam & per se putrefieri. Adhuc tertia aphorismorum, & primo febrium, reuertitur dispositio quadam pestilentialis in principio principiante secundum epidemiarum posita ita. Carbunculi in crano ne & reliqua. Quorum quidem causa erat ut ibi ostenditur putredo. Dicitur etiam per A. hanc febrem putrefacere humiditatem cordis. In hanc etiam concludit Isaac sententiam, Rursus febris putrida euenit ex re magis calida

& humida, cum hæc sit putredinis causa. Quæcunque enim calida sunt & humida putrescunt prompte, tales sunt humores & aer, sunt enim calidi & humidi aliorum corporis respectu, non autem sic spiritus & membra. Amplius, cuius significationes sunt febris putridæ, ipsa quæ putrida nominatur, quoniam significationes in cognitionem essentiae uia deducunt morbi, & proprie cum à subtilius aliter inhaerentibus fuerint sumptæ. huiusmodi autem significationes sunt in ipsa posite. In ea uanque adest caliditas inordinata, siccitas linguæ, sitis uehementis, anhelitus angustia, eiusque sator, inquietudo, nausea, dolor oris stomachi, casus uirtutis, syn copis, rationis permixtio, pulsus diuersus, frequens, paruus, & quandoque uehementis, sudor frigidus, frigus extremitatum, spasmi, & alchuzes, uomitus cholerae, solutiones, uentositates, & alia. Quæ quidem aliis non adfunt sic febrium aliarum generibus, uisi putridis.

Idem illa est febris putrida, seu ad illam conducitur, cui procuratio extat ut putrida. Talis autem est hæc. præcipitur namque in ipsa phlebotomia & purgatio putredinis: alteratio & ipsius exiccatio & educio: & talia quæ in febribus obseruanda sunt putridis. Ex quibus concluditur hanc febrem propriissime sub putridis locari, si igitur quis assimilatione quadam conatur ipsam febrem ad hæticam reducere: & proprie ad ephemera: hæc erit extranea & improporionata ualde. Non autem locatur in tractatu cum aliis putridis, quia non ex determinata, ut aliæ contingit, materia, uerum potius ex omni. Quod si quis opponat hanc petractionem simpliciter fore impertinentem cum hæc febris ex formis tandem contingit, ut dictum est superiorum: quibus cum sint necessaria: Aliquis hic non poterit resistere. Quæ ergo necessitas hæc in medicina pettractari.

Rursus hoc supposito quod ex superis eueniat astribus, uidelicet. eclypsibus, ac conuulsioe stellarum & diuersitate in his circuli signorum, non poterit quis uisi astrologus intelligere & obseruare. Quid igitur ad medicum? Ad primum quidem dicendum, quod licet motus, & esse superiorum non possit impediri: cum sit necessarius, neque enim in fortunas possumus ex eo lo depellere, ualemus tamen ipsorum impressiones auertere materiam indispositam reddendam docum dictum fit. Actus actiuorum fore in suscipiente disposito receptibiles. Et ideo in centiloquio astrologus optimus multum malum prohibere poterit: quod secundum stellas est uenerum: præmuniendo taliter suscepturum: ut cum illud adueniat, modicum cui nihil ipsum afficiat: si namque astra cum orbe motiferam adducant hyeme quandam frigiditatem, illam præsequeua muniti ualeamus euitare. Ad

aliud multipliciter, dicendum: quia licet non agnoscamus materiam & dispositionem superiorum: scimus tamen ut medici corpora disposita aegritudinibus pestilentialibus: que rectificare possumus, ut & indispota reddantur illis, quo actio, non accidit superum impressio. Vel licet non cognoscamus per causas superiores pestilentiam futuram, noscimus tamen per causas medias, & signa, puta per dispositionem aeris non continentis, quam Gale. prognosticorum primo, per celeste quoddam, seu diuinum signum intelligit. In qua signa pestilentie declarantur satis aduocum ipsius. prima quarti. Aut & medicus habet hoc præscire sciētia astro nomie quam in se debet habere, cum astronomia non modicum quid conferat medicinæ. Vnde de aere & aqua. Qui uero ea quæ de altissima tractauimus rata tenent, & credunt, nouerint astronomiam medicinæ non inuimam partem esse. Quod asserit Albumasar in introductioni primo: ut differentia ostendit prima.

Propter quantum uero, ad primum dicendum quod licet aer putridus perueniens ad cor corrumpat cordis complexionem, non tamen spiritum putrefacit. Spiritus enim non proprie putrescit: cum sit calidus & siccus, subtilis & io motu plurimo, sed inflammatur & resolutur magis. Aut talis spiritus complexionis corruptio non est io facto esse, sed in fieri potius. Febris autem dicitur esse per id quod est in facto esse non in fieri, ut in ealefacto fore, non in calefieri, differentia prior. Ad aliud dicendum, quod febris quæ est in spiritum, est in insipienti, non autem in innato complantato, qui para est cordis principalior, radix, & uelut forma, & factor. Io vigore namque ipsius uirtus informatiua cor produxit, cum sperma uirile quasi totaliter io spiritus dissoluatur, differentia 36. Sic igitur spiritus sere hincinde suscipitur. Ad aliud dicendum, quod non est hectica, & si determinetur posteaui ab A. quia ipsam pertractat Gal. post ephemeris & ante hecticas. Et Almanfor post febriam apostematam. Isaac autem magis locat ipsam cum putridis, unde non arguit. Causa quoque huius diuersitatis potuit esse, quia hæc febris non est adeo uere putrida, ut cholericæ uel phlegmaticæ. Quod apparet ex accidentium ipsius etiam ad putridas difformitate quadam. similiter uidetur in causa fore diuersitas, eo quod alie febres putridæ magis uiuot ex dispositione humorum ad putredinem aptorum, quam ex fortitudine agentis: hæc uero contra. Quod inuicem Isaac intelligens perfecte quando dixit febrem fieri de pestilentiali genere, & non de humorum genere: uou quod in hu. putrefactis non fiat. Sed quod maior causa inexistit in aera putrefactione, ipsos prius ad hanc habilitatem quam ex uitio humoris proprio, ut in

aliis putridarum. Adhuc cum cætera febrium sint essentialiter cordis passionem, hæc quidem magis cõcomitur ipsum & affigit. Aerem putrefactus immediatus ad eor perueniens, quæ sunt in ipso corrumpit, & putrefacti humiditas: ut sere uelut in alia causa antecesserunt non reduatur sub conuocata, unde quasi causa primitiua immediate se transferat in cõiunctam, quod tamen non audeo simpliciter explicare. Et for casus hæc est causa quare non expresserunt medici sub quo genere febrium locaretur pestilentia simpliciter præcise. Ad aliud dicendum, quod licet per eadem curetur, & non tamen sunt illa plura eadem: sed pauciora magis (ut ostensum) & minora. Mox etiam Almanfor excipit balneum: aquam calidam & lac, omnis quoque feb. in eo, quod febris cum sit mala complexio calida & sicca eadem participat cura. Fuit etiam Almanfor breuiter sermone: ut uno non solum eodem uel simili dicit alterum intelligere: immo more Hippo. suo contrario. Ad aliud dicendum quod ista est una similitudo lata. Et etiam quod in febre hac non prohibetur abstinentia in quantum est putrida: sed propter causam appetitus qui eis associatur frequenter & similiter, ut bonitate ciborum & potuum restatur aeris malignitati: sed io hectica non io iungitur abstinentia propter nimiam corporis, & febrilis caloris exicationem, com eius caliditas sit terianæ secundum A. caliditate actior. Sic igitur non prohibetur eadem minime abstinere de causa. Ad aliud dicendum, quod per humiditatem A. intellexit humorem primum, & non secundum. fuit enim duplex humoris: primi, nidelicet, & secundi noui: ut sanguis, phlegma, cholera & melancholia. Et secundi dicti humiditates, ut quæ est in extremitatibus paruorum uenarum: ros cambium & gluteo differentia 33. Concedendum itaque quod propriissime aliarum sit putrida. Ad ea etiam quæ alterius partem iam apparet. Expositio est enim sermo Isaac. Ad aliud dicendum quod hoc est quasi proprium patris aegritudinibus huic passioni, ut ipsa uehementius ut ostensum quædam alie febres inhereat cordi: ut & nocumētum, suscipiatur in corde & non sic in hepate & alia cæteris suo modo. Propter quod urina naturalis uidetur existere similiter & pulsus cum fuerit ita natura perterrita & succumbens, ut & nullo attenter insurgere contra morbum modo: sed conuertere se ut corpus gubernet uelut in sanitate. Quo circa & urina io morbo etiam durat non sic permanens iudicata in aphorismis mor talis à Damasceno.

Quæstio IX.

Quod apostema intrinsecum causet febrem conti-

etiam omnino, monstratur: per Galapho. quarta ita. Febres continuæ & periculose accidunt, aut propter pravam morigerationem putrefactionis, uel propter inuolsecum apostematata. Amplius, si aliqua apostematata intrinseca febrem causarent interpolata: hæc splenis essent & renum: cum huiusmodi membra minus sint sensitiua: minoremque colligationem cum corde habentia. Propter quod plures medicorum asserunt hæc febres interpolatas causare: sed apostematata membrorum huiusmodi febres inducunt continuas, quod monstratur, quoniam spleu est membrum carnosum interitum: ex sanguine namque arteriali subillitur. quarto de utilitate particularium. Est etiam tarum multæ materię comprehensum: quod autem huiusmodi, quarto prima ad febres præparatur continuas. Renes similiter membra existunt carnea, calida, arteriis & ueniis patentibus non parum coniuncta: quæ febrium continuarum videntur denotare a duentum ibidem. Rursus cuius causa est continua, & effectus ab eadem continuitate suscipitur quoniam causa & effectus sunt proportionales. Sed apostematata existente, sanies inducitur continua, quæ febri causa per se & coniuncta ponitur cum suo effectu conuersio. Itidem in apostematata morborum tria genera (ut videbitur) continentur. Quæ quidem tum propter se, tum propter accidentia ipsos concomitantia, naturam humanam febri appropriatam tanquam in ægritudinem sibi propriam deducunt. Apostematata quæ intrinsecum febrem causabit continuam.

Cõtrarium quoque huius ostenditur apho. prima ita. Quia ipse male se habent paroxysmi: & uniuersaliter melancholici per quartum febricitant. Amplius in diuisionibus, apostematata in renibus sequuntur in principio sui febres permixte habentes paroxysmum cum horripilatione: tales autem sunt interpolatæ. Ad hoc quinto prædicte. Diuersificatur lethargus sine sensu frigidum propter febrem adesse & non adesse. Itidem tertio prima ponitur melancholia fieri propter apostematata meseraica: in quo secundum plurimum non est caliditas, febri, aut sitis. Quarto etiam prima. Membra quæ sunt longinquæ à corde debilem communitatem cum eo habentia uelut renes: non semper propter apostematata febres inducunt, & continuas: immo multoties interpolatas de genere commissarum existentes: & febrium tertianarum, quartanarum, quintanarum, & sextanarum. Rursus differentia febri interpolatæ est ad continuam: quoniam interpolata causatur ea materia extra uasa contenta, continua uero ex intra. Materia uero apostematatis extra uasa continetur ut inquit Gal. de apo.

stematibus in quam plurimis. Ad hoc motus est de extremo in extremum per medium. physicorum quinto & quinto de iuuentutis. Sed quædam apostematata intrinseca qualia dia-phragmatis, & stomachi, & uniuersaliter sub-stantia pancreaticæ: uelut apparet primo pro-gressu febres inducunt continuas. Quædam uero febres non adducunt, unde tertio. 14. In apostematibus hepatis frigiditas non est febri, neque sitis, neque calor. Similiter & in doris splenis. Cum igitur fiat motus de non habere febrem continuam, in habere, aut econ-uerso motus per medium constituitur: hoc autem medium non uidetur nisi febri interpolata. Quare febri uter interpolata interdum ab intrinsecis apostematatum causabitur.

Propter primum quidem sciendum, quod apostematata est tumor siue grossities præter naturam permotus membrum à sua naturali dispositione in eam quæ extra naturam ea materię egressionem uel reomate generatur quato de accedenti. & 13. de inge. Hæc autem non est uera ratio apostematatis: sed potius quædam eius notificatio communis: nam tumor præter naturam est accidens consequens apostematata calidum. Ioannitis. Vera siquidem ratio ipsius est morbus compositus ex triplex genere morbi, differentia 75. In ipso namque concurrunt tria morborum genera: ut mala complexio: praua compositio, & imparis solutio, ut declaratum primo secunda. Cuius quidem causæ uniuersaliores sunt sex. Vis membri uidelicet expulsiua superfluitatum ex superfluo alimenti in eodem accreta. Imbecillitas membri recipientis quod ad ipsum impellitur, materię superflua quantitas. Debilitas nutrientis uirtutis membri. Quando enim solum non ualet alimentum elaborare: in superfluitates conuenitur illi nocentes. Mestuum largitas, quibus superfluitates prompte decurrunt. Et sitis ipsius corporis inferior theori. 6. Ipsius quoque superflua quantitas est illius materię: ut humor quadruplex, aquositas & lentositas. Et adhuc huiusmodi quoddam à causa primitiua nota. Reliquum uero ab opposita. Cuius quidem generationis modus differentia tangitur subsequenti. Est etiam quoddam apostematatum extrinsecum: quod sensibus subiacet: ut tactui & uisui manifeste. hi enim circumscriptionem ipsius apprehendunt immediate. Intrinsecum autem aliud oppositum, ad quod non fit ex significationibus peruenitur à sensu acceptis deducendo. Ex ipsam quidem generatur aut in membris interioribus ubi conuenit: uelut in guttore, pulmone, capsula cordis, uentre cum mery, hepate, splene, intestinis, renibus, matrice & uesica, aut in pancreaticæ circundantibus uel tegentibus: siue per longum, latum, uel profundum. Quid autem

autem febris, & acuta visum differentia. 87. ¶

Propter secundum vero sciendum qd aliqui indistincte posuerunt apostema intrinsecum febrem continuam causare, simpliciter: aliqui uero interpositi non raro ut monstrari arguta, sed quid de hoc, tertio videbitur dicendorum.

Propter tertium quidem sciendum quoddam aliud quod apostema intrinsecum febrem potest inducere interpolatam. Cuius quidem gratia notandum primo ea parte materię, qd causa febris est duplex. una enim essentialis & prima reliqua uero uelut accidentalis & secunda. Prima harum quoque quoddam est mediata: puta auecedens dicta. quoddam uero immediata: quę proprie potest appellari causa conluncta: t eo qd conuertitur & coniungitur cum morbo: qualis est fuligo putrida, seu fumus putridus horribilis subtilis à minera putredinis consurgens: febrium primo. locata in uasis, seu extra t dummodo continuatione eiua corpetat. Ex secundum qd continet aut successiue ipsum esperet: febris generabitur continua uel interpolata: ut uisum differentia 87. cum cæteris. Sed de causis accidentalibus iuuatiua & secunda, quoddam attenditur ratione materię apostematis: alia uero ea parte qualitas partis in qua existit. Primo quidem modo diuersificatur multipliciter. Quoniam apostematū quoddam sunt: ex materia calida: puta ex sanguine & cholera: & phlegmones appellantur ab inflammatione dicta. quoddam uero ex materia frigida, siue dura, molli, aquosa seu uentrosa. prima siquidem sunt magis digna febrem continuam adducere cum maiorem homogeneitatem habeant cum ea. Quę enim sic sunt celeritorem habent transitum secundum Ari. & A. unde primo secunda. Oculorum apostematū calida, demonstrat febris concomitans ea, quę uero sunt frigida, tardius, & ideo febrem posunt causare interpolatam magis, quia fumus procedens ea minera putredinis resultans per se redditur insufficiens cordi continuari: immo motus miuetur eius ex superiorum exagitatione præstolatur. differentia 88. qualis est motus melancholicus per quartam: cholera per tertiam, & phlegmaticus quotidie. Verum quia motus phlegmaticus 18. horis laborantem fatigat, à quo uis mundificatur: propterea si ex phlegmate cunfurgat apostema intrinsecum, ad motum eius addiuit propter causas continuas eis febris: tantum qd & forte si febrem indicant, figetur continua. Quod uidetur innui prima quartę. ponente apostemata renem causare febres committas ea febribus tertianę: quartanę, quintanę & sextanę & non quotidianę. Diuersificatur etiam materia ratione quantitatis multitudinis uidelicet & paucitatis: licet primordialiter hæc diuersitas ex qualitate con-

surgit, sicut fere alia quęcumque: eo qd materia multa seu quantitate replens continuum & extendens & solutionem inducet inde maxime. qd si in locis fuerint sensibilibus, febrem causabit ut sic continuum. Cuius quidem opposita interpolatam poterit causare. Diuersificatur similiter natura apostematis in febrem continuam seu interpolatam causando aut in nullam adducendo ratione dispositionis materię. Contingent namque cum materia apostematis suppuretur, ita qd eius subtile effluet, grossum uero eius remaneat incineratum: uel febrem interpolatam causari, aut nullam, uelut apparet in sclerorizationibus hepatis, splenis & renium quandoque. Potest & idem ratione similiter uariari situationis materię: eo qd ipsa in locis vicinis cordi sita & maxime in his quę grandem cum corde habent affinitatem febrem ut ita afferret continuam: reliqua uero interpolatam magis. Diuersificatur etiam secundum febris ratione partis in qua contingit apostemata intrinsecum multipliciter: quoniam aut illa erit nervosa multa sensibilis eis apta ex stimulatione rennatis propter dolorem spiritus inflammare: & ita febrem continuam inducere. Aut ex parte arteriarum multarum in membris existentium: per eas namque ad maiorem continuitatem habet ad eos spiritus etiam in eis & sanguis continetur feruentiores. Adest etiam eisdem pulsatio, quę oia attestatur caliditate, & generationi febris continuę. Vel ex parte caruoluitatis: membra namque carnosa humidiora existunt porosiora & plurius materię contentina. Aut similiter ratione magnitudinis membrorum, msiore etenim ampliore suscipiunt materiam, & cordi magis supercommuniunt: propter quod eorum intrinsecus apostemata febrem magis causant continuam. In reliquis quoque prædictis his dispositionibus oppositis: febris conurget interpolata amplius. Adiuuat etiam usus sex rerum non naturalium secundum contrarium, aut simile ita, uel aliter mensuratum, in continuationem seu interpolatam generationem. In quibus quidem complexio, ætas, uirtus, tempus, & regio &c. talium sunt attendenda. Quę quidem tum quia fumositatem notiora existunt. tum etiam breuitatis gratia non extendantur in amplius in præsentem. Ex his igitur breuiter uniuersalis demonstratio poterit colligi, uidelicet, quoddam apostemata intrinsecum febrem amplius causant continuam, & quoddam interpolatam quandoque. Apparet itaque ea medicorum legibus deducendo quoddam apostemata intrinsecum febrem poterit interpolatam interdum inducere: teo quando membrum fuerit frigidum ignobile, a membro nobili distans parum, neq; tamen illi manifeste

nifeste coniunctum, nullius, uel pauci sensus. Siq̃ue materia eius frigidior, pauc̃ve quantitas. Per oppositum uero febris insurget continua, quod poterit syllogizari, & apparere. Nosc̃e q̃ febris ex apostemate confurgens intrinseco non est ephemera, cen quidam x̃stimant, immo de genere putridarum, unde prima quareti. Febres quz sequuntur apostemata intrinseca, fortasse non sunt ex applicatione caloris ad cor sine putredine, quz applicatio ephemeram inducat. Hoc etiam apparet, quia exagitatione in huiusmodi febribus currit secundum motum humoris; ita quod adhuc litescente apostemate febris remanet quandoq; putrida manifeste.

Propter quantum uero ad primum dicendū, quod apostema huiusmodi phlegmon est. Is autem cum inflammationem importet ex materia sanguinea & cholericā generatur: febre continuam inducet, non tamen propter hoc concluditur q̃ alia apostemata febrem nō possint causare interpolatam, quz secundum morem Gal. phlegmones non dicuntur: immo etiam apostemata calida sensum à membro remouentia quantumcunq; fuerit sensibile, febre inducunt interpolatam: uelut apostemata cancerata. tercio undecima. Ad aliud dicendum, non propter hoc semper fore necessarium febrem esse continuam, eo quod splen membrū est frigidum, pauci sensus, materiz etiam frigida grossē suscepitūm imparate putrefieri. unde ex his materia minime reumatizat & putrefit. Quz etiam sui grossitudine putrefacta, arterias non potest adeo ingredi, ut accessus eius continuetur, immo motum expetit ex humoris melancholici euentatione. Neq; etiam arteriz splenis directius respiciunt cor, cum nō implantentur ei, sed explantentur magis. Similiter de renibus ut apparuit dicendum, q̃ illa continuatio cum corde est obliqua satis. propter quod de naturalibus secundo. contra Erasistratē, arteriz renibus implantatz proprie non implantantur, sed explantantur: non enim eis sunt directe suppositz, uelut uena concaua hepatis, aut aorta cordi. Adhuc etiam carnositas eorum est compacta sensu priuata, non enim sentiunt nisi per panniculum. Neque in eorum substantia uena continetur aut arteria. dif-

ferentia 86. Propter quod apostema splenis, & renū poterit febres interpolatas interdum causare. Ad aliud dicendum, q̃ in apostemate non semper est sanies. Aut si est, non poterit cor petere, ut uidebitur aliquando. Ad aliud dicendum, q̃ tria huiusmodi lēSIONIS genera, interdum lēSIONem ita modicam inducunt (ut declaratum ex suis causis) tam ex parte materiz, quā partiz, & situi ipsius, q̃ febrem non continuam, sed interpolatam inducunt.

Ad ea quz alterius partis etiam dicendum, q̃ auctoritas Gal. & Rasis concedatur, ut nifum.

Ad ea uero quz Halyab. dicendum q̃ in lethargo in principio quandoque non est febris: aut modica impercepta interdum ferē propter quantitatem materiz ipsius & frigiditatem. Ad alia consequentia quid dicendum apparuit A.

Ad aliud dicendum, q̃ licet in apostematibus materia contineatur extra uenas, nihilominus tamen poterit febrem continuam inducere: eo q̃ fumus resolutus horribilis, acutus, à minera putredinis ualei continuē cor petere, qui positus est causa coniuncta febris & immediata efficiens. Minera uero aqua deciditur magis causa antecedens & materialis, & ita materia & efficiens non coincidunt in idem. differentia 169. Interdum uero sanies adeo est grossa, & cœnulenta, q̃ ab ipsa fumus prædictus continuari nō poterit cordi, sed euentatione humoris tandem cessante respirat. Neque etiam est simile de materia dispersa per totum corpus extra uenas faciente febrem interpolatam, & de collecta ad apostema licet ponatur ipsa etiam extra uenas existere, quoniam quando materia colligitur in apostemate, aggregatur eius virtus magis, & ea unita fortior est seipsa dispersa de causis. Et ideo materia uenosa plerumque existens per totum disseminata, quando in apostema concurrat intrinsecum perimit, remittendo uapores uenenosos ad cor. Vigoratur namque ex eius congregatione. Ex hac etiam cancer ægritudo appropriata malitiosior & incurabilior x̃stimatur lepra totum possidente, differentia 178. Quare materia disseminata per totum corpus extra uasa, interpolatam semper & nunquam continuam ut sic febrem inducet. Ad aliud reliquum etiam quid dicendū, uisum est.

F I N I S.

A R N A L D I

de Villanova.

DE FEBRIBVS

LIBER.



Caput I.



TRACTATVRI de febre, videndum est Gal. super aphorif. febris nihil aliud est quàm calor naturalis in ignem mutatus. Vel sic secundum Isaac: febris est calor naturalis cursum naturæ suæ per gradus

procedens à corde in arterias: suoque legem effectu. Duplex enim in corporibus nostris est calor naturalis: unus, videlicet, qui ab elementis innascitur quæ nostra corpora constituunt ut partes: & iste calor dicitur potentialis. Alius vero est in nostris corporibus calor naturalis qui actualis & sensibus nuncupatur: & iste innascitur a spiritibus & humoribus in corpore existentibus. Ex cum iste calor naturalis actualis distemperatur a vitali spiritu sit fe. Febria igitur aut sit ex principali vitio: siue distemperantia spirituum & dicitur ephamera: aut principali distemperantia humorum & dicitur putrida: aut ex principali vitio seu distemperantia membrorum & hæctica nuncupatur: de quibus omnibus prout melius poterò tractare proposui. Hæc enim tria genera se. comparantur tribusque sunt in bal. aeri, videlicet, aquæ & parietis. Aer enim balnei calorem citius suscipit & citius susceptum deponit quam aqua: & hæc assimilatur ephemeræ in spiritus citius inflammatur & velocius & citius curatur si medicus fuerit sollicitus quàm aliæ. se. sicut inferius evidenter apparebit. Aqua vero bal. putridæ assimilatur quæ cum maiori difficultate calefit quàm aer: & tardius infrigidatur. Similiter putrida cum maiori difficultate accedit & difficilius est eam curare quam ephemeram. paries vero bal. hæcticæ assimilatur in qua membra consumuntur. Nam paries ipsius balnei est sicut hæctica in qua membra consumuntur: ideo difficilius quàm prædictæ curatur. In unoquoque genere febrium est sciendū quòd hæc tria quandoque distinguuntur siue de-

stemperantur scilicet spiritus humor & membra secundū magis & minus: ut dicam inferius.

De ephamera. Cap. II.

Ephamera sicut dictum est superius est febris quæ sit ex principali vitio seu distemperantia spirituum & dicitur ephamera ad similitudinem cuiusdam piscis qui ephemeron dicitur: qui in mari nascitur. & non uiuit nisi per unum diem: eodem enim die quo nascitur moritur: simili modo febris ephamera vix ultra unum diem extenditur. peccato uerbo medici vel infirmi interueniente: aut opilatione pororum nimia si usque ad tertium vel quartum diem durauerit: & per periodos currere incipit in putridam vel hæcticam conuertitur. Febria enim ephamera non dicitur habere nisi unum periodum: nec cum rigore seu horripilatione incipit: corpus pa. cum tangitur non sentitur multum cal. nec pungens: nec mordicans calor apparet: ut naturalium non multum distemperatur in calore vel in substantiam à naturali dispositione urinæ. Ephamera autem aut est symptoma alterius morbi, ut bubonum, & apostematum aliorum calidiorum: aut est morbus per se: & hoc pluribus de causis accidit. aut ex nimio labore ca. aere seu frig. ira, tristitia, angustia, sollicitudine, nimio studio: aut propter nimiam sessionem in aqua frigida: aut propter nimiam moram in bal. vel si bal. ex mala aqua factum fuerit: vel si ex mala ligna venenose qualitatis balneum fuerit calefactum. aut propter medicinam calidam ab imperio medico datam: aut propter superfluum comestionem vel potionem vini fortis: uel propter nimium ieiunium: aut propter corizā: & reumatismum. Si igitur propter solis calorem superuenit alicui ephemeram pa. habet caput calidius reliquo corpore: & facies seruet & rubet: & quandoque rheuma calidum per nares & palatum descendit. Si vero ex calore aeris fuerit: corpus magis incenditur quàm caput: sitim magnam patiuntur: & desiderium attrahendi aerem frigidum

urina

urina apparet semper colorata plus solito, & pulsus etiam mutatur, & post cibum grauius molestari solet: & si exger fuds uerit alleuiatur. In hoc enim ut dixi differt ephamera à putrida: quia putrida in secunda afflictione fortius affligit quàm in prima, cum calor sit acutior per potredinis ebullitionem. In ephamera autem non est sic: quia ut dixi non currit per periodos. Secunda autem accessio ephemerę nullam infert molestiam aut paruam, & raro trāsfit ad aliam accessionem nisi forte in putridam, uel hecticam mutetur ut dixi. Cum ergo ephamera fuerit propter calorem solis uel aerem calidum curetur hoc modo: in aqua bulliant mal. uiol. folia salicis, & uitis, rosę, & huiusmodi, & ex ipsa aqua fomentetur caput eius ut fudeat: postea manus & tempora & pedes ea prædicta aqua cal. lauentur & abstergantur bene cum panno lineo, deinde inungantur oleo ros. uel uiol. cum agrestia & lacte mulieris. Item agrestia saccus cimarum rubi & oleum uiol. & ros. infusum, misce, & in huiusmodi liquore pannus lincus infusus temporibus & fronti applicetur sepe & sepius. Item constitutus æger in domo frigida & fenestree sint apertę, ut uentus frigidus possit libere intrare, & si non fuerit domus naturaliter frigida fiat hoc artificialiter: ut per artem supplicamus defectum naturę. Ars enim sicut dicit Aristot. imitatur naturam in quantum potest: accipiantur itaque ros. uel 5. spongę marinę męgrę & infundantur in aceto & circumdantur circuncirca lectum pa. aqua currens naturaliter uel artificialiter distillans: uel salutem ante infirmum constituantur folia frigida rum arborum & herbę per domum aspergantur: sicut sunt eymbalarie uermionaris, crassulę, solatri, frondium cınarum pampini uitis, & rami salicis, rosę uiol. & similia his artificiosę in frigidabitur domus. Et camphoram etiā odorret, etiam intrent bal. aque tepidę & ibi suauiter & molliter fricentur eum manu precipue in locis articulorum: deinde suauiter cum panno lineo abstergantur, & ex oleo ros. uel uiol. inungantur, & hoc fiat bis uel ter si fuerit opportunum. Syrupum & iulep qui solum sunt ex aqua & zuecharo bibant, uel si nimium cocti pari fuerint syrupum uiol. bibant, & syrupum etiam ros. si non fuerint cocti pari debito, lactucas, portulacas assas, pruna damascena, scario. cichoream, cucur. assatas, farinam bordę amygdalas, nucam panis prius lotā in aqua 5. uel 6. uicibus addito pauco zuecharo. Similiter succum granatorum bibant cum aqua, possunt etiā uinum subtilissimum opime lymphatum bibere si ipsum appetunt, tamen in parua quantitate detur, tutius non dare quàm dare est, collocentur in loco molli. & dormiant plus solito: & emplastrū etiā puocatiuū somni

quod in ea. de phreusi dictū est fronti & temporibus applicetur. Et si post hoc aliquid ueligiū laboris uel lassitudinis apparuerit ad bal. uerū docatur, & omnia prædicta remedia fiant quousq; pa. liberetur. Et si dispositio corporis pa. fuerit plethorica & sanguis ualde abundauerit fac pblōmiam uene basilicę dextri brachij, & se cumdū uirtutē ægri sanguinē extrahas ne foret infirmus in synocham incidat, & hoc dico uiribus ætate complexionē & tēpore permittentibus consuetudine non contradicte. Et si cholera nimīū superabundauerit leuiter & suauiter educatur cum decoct. in capitulo de dolore capitis ex cholera facta dicta ne æger in causon te incidat, deinde supra scripto regimine regatur infirmus. Et si febrē huiusmodi patientes per interualla fuerint nimis constipati fiat eis elysiere aliquod leuitiuū ut ea mal. mercuriali uio. & surfumbus additis cassias. oleo uiol. zuechar. uiol. & similibus, aqua ros. oleū uiol. uel ros. & acetum insimul misce: petia in tali liquore infusa frōi & temporibus pa. applicetur, hoc enim modo curabitur ephamera propter calorem solis uel aeris calidi: uel propter dictā bullitionē per solem uel aerem calidū factā iterando prædicta remedia quousq; pa. liberatus sit. Si uero aliquis ephemerę patiat̃ apterea q̃ usus est bal. naturaliter ea. indebite ut sulfureo aluminosa ferreo calciteo & similibus. Et ęr propter bal. aqua artificialiter calidę quod scitur p. manifestatiōe ipsius pa. tūc curetur hoc modo. Intret bal. aque tepidę & ibi lauet & suauiter fricetur, deinde cū panno lineo abstergetur & cum supra dictis oleis inūgat: & epithimatis isto frōi & tempora epithiment. Recip. sand. & al. & ros. ro. semin. portulacę an. dras. spodiij gummi ar. dratagat. an. drac. 2. aeretur oīa & puluerizentur & cū aqua ros. distēperentur uel de succo folatruel oleo ros. & succo cucu. & agrestia insimul mistis idē facere poteris, detur syrupus ros. uel uiol. & iulep & nutriatur secundū superiorē doctrinā. Si uero q̃s hęc se. incurrat propter nimīā potationē uini fortis & puri: detur syrupus iulep & syrupus acetosus cū frigida & uomitus prouocetur uel cū uomitu patriarchę Nicolai uel scarpellę puocabis uomitū: & à uino oīno abstineat quousq; liberatus sit. Super fluuiū uel aliquē riuū constituat pa. uel saltē in domo fiat aer artificialiter frigidus sicut supra dictum est. Camphorā odoret & huiusmodi frigida, & cū se. sedata fuerit ponatur in bal. aque tepidę & ibi leuiter fricetur cū manu, deinde abstergetur & inungatur ut supra dicta superius scripta tribuatur. Et parentur cibaria ipsius cum aceto & cum agrestia aqua ros. & succo granatorum & similibus: poma etiam elisa comedat. Quod si quis ephemeram pa. propter complexionem calorum ciborum solummodo cure-

tur sicut prædicta, uomitum promouendo & omnia per ordinem faciendo sicut nunc dictum est. Et cum fe. parum sedata fuerit aqua hordii cum zucchero in bona quantitate in potu detur. Et quia hæc fe. prædicta quæ sit ex uini fortis potatione multoties in putridam confucit conuerti & propter hoc oportet medicum ualde esse sollicitum in cura eorum. Si itaque isti patientur capitis grauedinem, & oculorum excusio & rubedo superuenierit & uenarum plenitudo, etiam urina ruffa cum substantia spissa & oris dulcedo & alia signa sanguinis appaeruerint, tunc extrahatur sanguis cum phlebotomia, & citi cum uentosis, & elypteria mollificatiua & lenitiua fiant & soluatur uenter si fuerit opportunum cum decoct. dicta in cap. de dolore capitis ex sanguine facto. Si uero quis ephemeram patiatur ea fri. aere uel frigida aqua introitu cognoscitur, quia color cutis mutatus est in plumbicum uel obscurum: pulsus est paruus & uelox, & urina rubea parum immutata, quandoque apparens alba aut plumbea, oculi & facies parum timent, caput graue & frigidum, cuius dura, durior tamen si sit propter bal. aquæ frigida. patientiam fatetur se lasum fuisse a frigido acore uel bal. uel infusione aquæ frigida. Cum itaque hæc febres his de causis ueniant curantur hoc modo intret pa. stupbam aquæ calidæ & ibi moram trahat quousque fudet, deinde leuiter fricetur & abstergeatur corpus eius & inungatur ea oleo camo. & optime collocetur in lecto molli, & bene cooperiatur & fudet & dormiat ibi, & cibos subtiles sumat & boni nutrimenti & boni sanguinis generatiuus & uinum forte & subtile in parua quantitate bibat & parum comedat: & dum quicuerit si post iterum aliquid de feb. remanserit ad bal. iterum ducatur & ad totum regimen dictum. Eleuaria etiam calida ut diacyminum diacalamentum & huiusmodi cum fuerint oualescentia dētur. Quod si ex ira hæc pass. fuerit oculi rubent & extra eminent & cito mouetur. facies rubet, pulsus est magnus & fortis urina plus solito coloratur parū. Si uero ex tristitia nel angustia oculi cōcitantur & quieti sunt totius corporis debilitas & pulsus debiliior est solito, & facies pallescit uel citrinat parum: & similiter mutatur urina etiam parum a suo colore naturali. Primo ergo mittantur isti tales in bal. aquæ tepidæ & oleo ro. uel uio. leniter inungatur, post hoc aqua ros. super caput eorum infundatur. Epithimetor pectus eorum & supra caput & supra cor ponatur hoc epithima. recip. sandali al. & rubei ro. an. drach. i. campboræ drach. i. terantur & cum aqua ros. confice. Sympus iulep detur in potu cum succo granatorum acetoso-

rum. Cibaria sua sint frigida & condita cum rebus frigidis sicut acetositate citri aceto & agrestas, & similia a uino & rebus calidis omnino ablineant, quoniam hæc plus incendere. rent & augmentarent ipsam febrem. Ita enim nil aliud est quam accensus sanguinis circa cor: ut dicit Arist. cum itaque in ira hæc bullitio sanguinis, & seruuor circa cor finis daremus res naturaliter ea magis augmentarent uisum & incendium: & sic fe. magis augmentaretur & incenderetur. Intendendum enim est cum frigida supradicta: quando ex causis prædictis hæc fe. uenit. Inducatur etiam lætitia & carnis mulicorum & instrumentorum coram pa. pulsentur & parentes eius dent sibi solatium & gaudium. Ex his propter amissionem pecunie uel alceius rei hoc patitur, promittantur sibi similes res a parentibus & amicis. Quod si propter nimiam iniectionem acciderit hæc pa. cognoscitur per corporis dispositionem macram & siccam & oculorum concantatem, pulsus debilem & uelocem & urina rubea quandoque apparens & patiens fatetur se nimium ieiunasse. Curatur hoc modo, pa. reficiatur cibus restauratiuus & potibus bal. electuariis & inunctionibus quæ in sequenti ca. de hæctica sunt dicturus.

Quod si aliquis ephemeram patiatur causa multarum cogitationum uel malæ solitudinis: quod cognoscitur indicio pa. & etiam quia facies & totum corpus, quandoque citrinatur, oculi concuantur: palpebræ graues & molles & ad mouendum tardus sit: & uentosus timidus, urina tenuis, pulsus paruus, in bal. aquæ tepidæ immittatur & leuiter abstergeatur & ungatur secundum prædictam doctrinam: deinde nutriatur ex cibis facili ter digerentibus & nutrientibus, & uinum optimum & nutritiuum parū lymphatū bibat, pronocetur somnus in eo cum emplastro quod in cap. de phrenesi dictum. In domo frigida collocetur. Remoueatur ab huiusmodi solitudine uerborū interpellatione: & aliqui ludi in quibus delectetur fiant coram ipso, instrumenta musicalia corā eo pulsentur si in eis delectatur. Quod si aliquis ephemericā inciderit eo quod plus solito comederit aut cibum multū nutrimentum aut grossi nutrimenti sumpserit aut cibū male & uenenosæ qualitatia, primo ergo statim uomitū prouocemus cū uomitu patriarchæ Nicolai uel scarpellæ uel cum aliquo uomitu cōuenienti. Quod si hæc fe. per plures dies durauerit sic quod quasi synochus esse uideatur, non est materici digestio expectanda: quia synochus & synocha antrax & squinantia materias crudas euacuare iubent. In his enim agnudinibus & similibus non debemus materici digestionē expectare, sed statim phlebotomare & uen-

& ventrem solvere cum aqua cal. fructum, vel aliqua convenienti medicus & detur lytu pos acetosus: ptisana detur solummodo & lac amyg. & micā panis ter vel quater lota cum zuecharo in aqua. Cumque feb. aliquantulum alleviare inceperit pa. in bal. aquz tepide impo- natur in quo moram magnam non faciat. Ex fri- cetur corpus eius ex fursure diu deinde lanetur bene & abstergatur & in panno lineo inuolu- tur & in lecto molli ponatur & quiescat & nu- triatur ut dictum est. Quod si feb. diminuta fue- rit scilicet non in totum recessit iterum virtute e- cassente forti in bal. mittatur & plus moretur ibi quā prius & omnia frigida secundum su- periorē doctrinam calibeatur. In principio tamen huius fe. absque magna cautela bal. in- gredi non debet. Cavendum est enim ne pa. in huiusmodi bal. laborem patiat & ne corpus ipsius caleat. Quod si contingat ipsum in bal. horripilationem pati illico extraheudus est: & hoc dico de quolibet ephemerā pa. Cum. n. quis patitur horripilatione in bal. p hoc cogno- scitur ipsam febrem non esse ephemerā sed putri- dā: & hoc speciale signū ad cognoscendū eph- emerā distingui a putrida. Cū. n. xger se balnea- verit & horripilatio non superueverit scias il- lam febrem esse ephemerā, & tunc vomitus provocetur cum adhuc materia fuerit in ore stomachi: a qua sumi resoluti inscipientes spiri- tus induxerint, vel si neuter fuerit solutus si materia in fundo stomachi fuerit & urina pro- vocata fuerit & phlebotomia etiā facta fuerit si fuerit opportunum & ordo diete observatus fuerit & ordo etiā intraudū bal. & inonendi corpus sicut superius scriptum est observatus cito curabitur quolibet ephemerā nec in putri- dam converteretur. Si autem error in prædictis contingat: in se. poterit vel in quotidianam vel in synocham & similes cito transibit.

Quod si aliquis hanc febrem patitur propte- rea quia usum bal. prætermisit & non balnea- tur ut consueverat quod scitur indicio pa. in bal. aquz tepide immittatur & multa aqua te- pida super eū fundatur & corpus eius fricetur ex fursure se. cōmunibus tritis paucō nitro in- simul mistis: deinde lauetur bene ex dicta aqua & abstergatur eius corpus & ponatur in lecto. & nutriatur ex cibis facilibus digestiōis & cibis exinguentibus calorem: & vinum clarum album oale subtile sibi exhibeatur iu po- tu die sequenti si non liberatus fuerit balneetur & prædicto regimine regatur. Quod si mul- tam sitim habuerit vel si quis hanc fe. propter sitim habuerit deuret exinguentia sitim iu cap. de siti dicta. In bal. aquz tepide mittat. on. ptis- ana hordel & etiā aqua frigida cum zuecharo detur, aqua etiā frigida detur, & nutriatur ex ci- bis humectantibus & frigidis: labore abstineat.

Quod si aliquis hanc febrem patitur propter dysenteriam quam habet vel fluxum ventris aut vomitum vel thenasmonem: succurratur prædictis ægritudinibus & curetur secundum q̄ in propriis capitulis dictum est. Si vero pa- tiatur quis hanc febrem propter rheumatismū seu corizam & tussim & similia: succurrendum est cito cum phlebotomia vel nērosis secundū Rasim: pectus eorum mollicetur & tussis: & rheumatismus sedetur secundū q̄ in propria capitulis dictum est. A carnibus & vino omni- no abstineant ptisanam fariū bordei lac amyg- da. & similia comedat. Cumque feb. quieverit in bal. mittendus est & ordinatim paulatim ad consueta transuendo: huiusmodi enim se. cum ex huiusmodi causis procedit & cura eius ne- gligitur multoties in plenitudo, converti con- suevit. Cum vero hanc feb. quis patitur pro- pter bubones seu apostemata, quod visu di- scernitur, & est pulsus magnus & velox: etiā spissus: urina alba & cruda, facies rubea & infla- ta & in sine sudor aliquis: tunc iufirmus secun- dum Rasim ex parte contraria minuendus est & locus iufrigidandus est, quemadmodum dē apostemate calido ostensum est. bal. vero nullo modo ingreditur nec vinum bibat donec il- lud apostema sedetur & eius igneitas & ardor deprimatur, solvatur venter eorum & caloc eius naturalis mutatus in igneum ad tempe- riem reducatur cum his que in præcedenti- bus dicta sunt, & ex cibis frigidis nutriatur & ipsum apostema ad matritatem perduca- tur & pus extrahatur. Maturato enim apo- stemate & sanie extracta tollitur dolor & fe- bris: quia remota causa remonetur eius effe- ctus. Nam idem dicit Hippoc. in apho. Circa generationem sanici &c.

De hētica. Cap. III.

Hētica febris habitualis dicitur ab hēthi quod est habitudo: quia corpori adueniens in habitum converti consuevit: & habet fieri diversis de causis. Quādoq; enim fit ex præcedentibus fe- diuturnis ex passione: ut ex longa, ira solici- tudine, tristitia, nimio studio: ex nimio ieiunio: nimio coitu ex longo menstruo. vel hemorrhoi- da, fluxu, quādoq; fit ex præcedēte phthisi pleu- rexi vel peripleumonia: & hoc ab auctoribus incanabilis reputatur. Hētica ergo tres sunt species prima, secunda & tertia: Prima spe- cies hētica fit ex cōsumptione humiditatis ad regimen membrorum ab hepate nemientia quā nondum est digesta nec dealbat a nec membris assimilata: & urina apparet citrina vel subcitra- na vel mediocriter tenuis: & mediocriter spissa cū petaloidibus resolutiōibus & calor cōtinuus & levis: & in uolis manum semper est calor,

sed minor post prandium quam ante, & hoc est familiare signum in omni specie hēcticæ, & alia signa communiu cooueniūt, adest tussicula modica membrorum cōsumatio & grauēdo & in poris extensio oculorum cocauitas narium acumeo, & calor, ut dixi continuus in uolūmaoum & pedum. Et hæc signa magis intēduntur si ad secundam speciem deuenierit & magis si ad tertiam. Secunda species fit ex maiori humiditatis consumptione membrorum assimilatæ oec ex toto incorporatæ ex parte digestæ & ex parte dealbatæ cuius signa sunt omoia quæ in prima speciem dictam sunt. sed fortiora & uehementiora signa sunt in hac specielem, urina citrina uel subcitrina mediocriter tenuis uel mediocriter spissa, in qua apparent crinoidales resolutioes & superoatæ ipsi urinae quædam grasiticiæ ut tela aranæ, quam grasitiem Hipp. in pronosticis nūperabilem appellat ubi dicit, grasiticiæ in urina ut aranæ tela uituperanda est, & hæc species uix aut nunquam curatur. In tertia uero specie hēcticæ cōsumitur ipsa humiditas, tertia quæ ex toto digesta & ex toto dealbata & fere unum cum mēbro: in qua urina apparet etiam colore & substatia oleagiosa cum quibusdam atomis albis & rotundis in modum parui frusti carois uenietis, in qua quoadque oculi sunt ualde concaui, tympana plana, nares ualde acutæ & contractæ & facies fit terribilis & collum ualde gracile fit & ualde subtile, ossa pectoris discooperiuntur, ita quod postuot omnia uisu & tactu computari, uox etiam fit ranea, & quoadque exilis & debilis fit, & quoadque uix auditur, pulsus fit ualde debilis & subtilis, & totum corpus desiccatur, sic quod non uidetur nisi corium & ossa, & omnis pulchritudo & claritas corporis recedit, & nenter attenuatur & dilatatur, sic quod uidetur quasi cōstis adhærere. quasi nihil in eo uidetur esse, cutis etiam si eleuetur per se non residet. ultimo cadunt capilli & contriungunt uogues, quæ omoia mortem propinquam pronunciam, & citius si fluxus uentris uel san. supervenerit. Contingit esse hēcticam quandoque cum putrida, quod cōgoscitur, quia celsiore typo pu. calor hēcticæ levis permaoet, & hæc est ualde difficilis ad curandam, quia sicut dicti Bal. Nihil est difficilius ad curandam quam dux ægitudines cōtrarie simul in eodem tempore in corpore existentes. Nam si das aliquod euacuatiuum inuas ad curationem putri. & lædis curatioem hēcticæ, si conuerſo non euacuas, sed circa reſtaurationem infirmi proficias hēcticæ. Etego quendam curauim hoc modo cum cibis conuenientibus ad reſtaurationem per plures dies ipsum nutriui & naturam ipsius fortificaui, quia

sit Bal. Naturæ forti nihil impossibile. educit enim sanicem per medium ossia. Natura uero fortificata leui lotura putridam mundificauit. Et postmodum ad hēcticæ curam infraſcriptæ adhibui: & sic pa. conualuit. In omni itaque specie hēcticæ licet tertia incurabilis sit, & seculoda cum difficultate curetur. Primo ordinatur diæta, cum diæta sit potissima pars curatio nis. Comedant ergo hēctici pollos cum farina hordei coctos, & si carnem masticare non possint, si forte iam ad nimiam debilitatem deuenierint, prædictorum pullorum succus exhibetur lac amygdalarum cum penidiis & dragagato, lac alinum & caprarum calidum cum exuberibus extractum fuerit addito pauco zuecharo & mica panis nel ſioe ea quotidie ſumant, & hoc dico si non multum febricitauerint. Vode post assumptionem lactis uidendum est si aeris attractio urina & alia accideotia fortificetur, & tuoc oōdamus ipsum lac, sed alia prædicta cibaria, uinū clarū & odoriferū cū pūſſa hordei optime lymphatū bibantur. Syrupus optimus & expertus hēcticis & consumptis. Rec. hordei mundi pugillū. t. ſe cōiū. drach. 2. ſucci liquiritiæ berberis sebesteo amygd. drac. 3. ſe. mal. bō baciſ, an. drach. 3. nio. drach. 1. roſ. drach. 1. ſe. feniculi petro. an. drac. 1. x. fiat ſyrupus hoc modo. Arripe quam plures teſtudioes, & diſciude eas per membra proiectis earum conchis, & cū uino albo optimo & pauco ſale ablue eas bene, deinde eoquantur optime in aqua ſic quæ caro ab ossibus ſeparatur & omnes res prædictæ addantur, & ſit os ollæ taliter obturatum quod fumus reſpirere nō poſſit, & addito zuecharo quantum ſufficit fiat ſyrupus quo utatur quotidie, quia mirabiliter reſtaurat phthiſicos à conſumptione. Item comedat ipſas teſtudioes coctas cum bordeo mundo quotidie. Alius ſyrupus ad hēcticam optimus ſit ex aqua decoct. pimpinellæ lingæ caois, dragagatois, & hordei mundi addito zuecharo quantum ſufficit. Alius ſyrupus ad hēcticam boous. recip. ea. ue. ſcolopendriæ, hepaticæ, in melle, bugloſſæ, ſlorum boraginis a o. M. x. corticis citri. drach. 1. ſe. ſe. 40. numero, liquiri. mondæ drach. 1. ſandal. o. al. & rub. ſe. cyd. oioiorum portula. ſe. papaueris albi, gūmi, dragaganti, paſſularum, an. drach. 1. roſ. ſpo dii. an. drach. 3. gūmi arabici, berberis, ſe. cōiū ſe. bombaciſ. craſſulæ. reſticu. niri. ſatyriois, an. drach. 1. ininbæ. 3. ſe. ſe. greci. drach. 1. zuechari quantum ſufficit & prope finē decoct. iſtiſſi ſyrupi impognatur in ea de bona aqua roſ. al. in bona quāritate & utatur eo quotidie hēctici, a bic ſyrupus compositus fuit a magiſtro meo & expertus in hac cā. Syrupus etiā de cucur. bonus eſt hēcticis qui ſi ſit, cucurbitas uirides in paſta inuolue & in ſumo decoqui facias & aquæ cum manibus expreme, in qua gūmi arabi ci, draga-

ci, dragaganti, se. mal. la. l. u. ca. bombacis, cydoniorū papaueris al. & sandal. alb. & tu. 10f. an. fae bullire, & addito zuecharo fiat syrupus. Syrupus de phillo qui fit hoc modo. optimus in hac causa est. Recip. sandal. alb. & ru. rnf. dragaganti, gummi arabici, an. drach. 1. s. spodij. se. portulac. la. l. u. ca. se. comminuium, an. drach. 3. philu in petia lini ligati. drach. 2. omnia in syrupo 10. bul. addita aqua & iterum ultimo addito zuecharo quantum sufficit fiat syrupus & cū coctum fuerit aromatizetur, cum drach. 3. camphore & detur cū ptisana. & si fluxus uetris superuenerit detur cū aqua deco. gummi arabici, dragaganti: & fiant remedia in capitulo de fluxu uetris seu lietheria dicta. Electuariū ad restitutationē humiditatis pro hectis phthisicis & cōsumptis ex quacūq; cā fuerit optimū & expertū. Recip. rosae, zuechari. an. dta. 4. dragaganti: gummi arabici: an. drach. 2. sandalorū alborū & ru. an. drach. 7. se. papaueris al. dra. 1. s. succi liquiritiae amili se. portulacae scariolae spodij: an. drach. 1. s. garisoflorū. drach. 4. einamo mi. drach. 1. zinzibetis storacis: an. drach. 3. croci. drach. 1. penid. drach. 3. se. cōmuniū drach. 1. s. se. cydoniorū. drach. 2. amidi cādi: sebesten: an. drach. 1. se. mal. viol. an. drach. 3. confice cum syrupo ros. in quo fit de bona aqua ros. & sumatur de eo ad quantitatem nucis grossae mane & sero. Electuariū uero quod dicitur diapaouer est optimum in hac causa. recip. succi liquiritiae dragaganti: gummi arabici: an. drach. 10. se. papaueris al. amygdalarū: amidi: se. cydoniorū portulacae ro. an. drach. 30. se. cōmuniū la. l. u. ca. mal. bōba cis, sang. drach. 10. dra. 2. Syrupus solatus ēt sepe si nō febricitauerit multum quantū sufficit detur ut est dictū. Aliud electuariū optimū ad hecticā. recip. se. papau. albi. pincarum penid. gummi arabici dragaganti: an. dta. 5. ligni aloes cinamomi masti. se. cōmuniū mundorū se. cydoniorū sanguinis draconis: an. drach. 3. syrupo 10 fa. quantū sufficit. Quod si fluxus uentris super uenerit detur syrupus restrictiuus in capitulo de dysenteria positus. Trochisci ēt de spodio & trochisci de cāphora: quos ponit Almasor in capitulo de hectica propinquet & alia remedia cōstringentia in capitulo de dysenteria dicta si hęc nō sufficiant. Caueant sibi hectici a salis frinis aciosis: & etiā ab ira, tristitia, & a coitu maxime: & ab omnibus cibariis indigestibilibus quoniam plus possunt. Sint semper in gaudio & leticia toto posse: in flumina musicalia audiant & censeant & ludos in quibus delectantur quotidie uideant. Et hęc de quibus dicta sufficiant.

Additio. Quidā iuuenis uidebat hecticus hanc quo medicus cōsiderauit quātiebat siccitatem hepatis q. est usus syrupo. uio. & aqua hordei p. multū tps & uisione olei uiol. sup. hepatis & aqua frigida & sanus factus est. Syrupus misa

bilijs: accipe testudines quae reperiunt in emote uel loco testudinū puras carnes. Et si nō habes: accipe cerebella caponū & lauenter cū uino & aqua & ponantur in olla rudi plena aqua: prius tñ in mortario eonquassent: & cū illis admisceant liquiritiae & succus eius ros. dragaganti: gummi ara. an. dra. 1. s. se. papau. albi. se. portulac. uetris: amidi: an. drach. 2. se. cucur. melonum, cucur. citrulli: an. nnc. s. se. mal. uiol. an. drach. 2. spodij. unc. 2. hordei lib. 1. penidi. drac. s. se. bombacis cydoniorū: an. drach. 4. pincarū amygd. uuarū passulatū sebesten berberis: an. nnc. 2. s. ponantur in olla & os cū pasta & argilla obturet ne fumus exeat: decoque ad consumptionē tertiae partis: colentur inter duos baculos per pannū & late admisceat zuecharū & syrupizetur & de hoc quantū testa oui capitis sumat cū tribus partibus aquae tepid. uel aquae otidi. Syrupus mirabilis ad hecticā. recip. florū boraginis: se. lactucae quinqueneruiae crassulae testiculorū uiridiū satyrionis: an. partes. 3. se. portulacae basiliconis: se. papau. mal. an. partes. 4. se. cydoniorū bombacis mundi: mal. an. drach. 1. inibus: sebesten. 15. cucur. mundae drac. 3. se. fennegracis: drach. 1. & 1. spodij berberis sandal. & ru. gummi dragaganti: gummi ara. ro. an. drach. 1. uiol. dra. 6. prunorū coctorū. 25. & hoc duo addantur si non fuerit fluxus uentris: & si fuerit non ponantur. Et ponantur omnia praedicta in aqua ros. & addito zuecharo optimo fiat syrupus & enim pauca cāphora aromatizetur. Syrupus optimus hecticis confortatiuus restaurans subtilē humiditatem cōferens his qui sunt deficiente: & facti sunt macilentis. recip. succi boraginis deputati lib. 4. bul. in eo florū boraginis: florū roris marini, se. bombacis, sandalorū citrinorū, berberū rosae capreolorū uitis: an. drach. 1. se. basiliconis drach. 2. zuechari quantū sufficit & ponatur in sine decoct. ipsius musci: ambrae: an. scrupulo. 1. & detur in potu quotidie mane meridie & sero, quā est mirabile. Clyster secundū Serap. cap. de hecti. humectās & impinguans corpus & cōpetit multū hecticis. Accipe caput arietis & pedes eius & contendantur & proiciantur in olla limpida & fundatur super illud aqua quā sufficit tritici & hordei mūdi an. pugilli unū anetice amo. an. drach. 1. passularum absque nucleis suis unc. 1. siccupi numero. 10. coquatur tñ donec ad tertiā partē redeat & colētur, & sumentur ex hac decoe. colata lib. 8. butyri vaccini. nnc. 1. olei sisam. unc. 3. olei de ben. unc. 3. misce torū. & clysteriza semel in tribus diebus, & sic fiat donec corpus humectetur & impinguetur. Rēnes & totū corpus in nocte nngantur ex oleo masticino uel ro. cum cera al. mista, & sorbeat in mane uirellum uini, & parum uini insipidi, deinde ingrediat bal. & parum morietur in eo.

Putrida feb. alia intra uasa: alia extra uasa. Materia extra uasa: ut quotidiana tertiana fe. erratica quartana & huiusmodi. Et huiusmodi enim fe. dicuntur putridæ. eo quod ex principalis uitio putridorum humorum sunt. Causæ autem putrescentium humorum sunt sicut lar gæ digestæ & grossæ: quies multa: somnus multus & immoderatus: uigiliæ immoderate: passionibus animæ: sicut tristitia ira & huiusmodi acritas ualde calidus seu frigidus regio tempus: & huiusmodi. Causæ enim putredinis sunt quinque: scilicet multitudo humorum: grossities eorum: & uiscositas eorum: opilatio pororum: & fumositatum retentio. Quarum duæ ultime sunt magis potentes & sufficientes ad putredinem faciendam. Opilatio enim pororum ex quacunque causam retinetur talis fumositas. Ideo dissoluntur & corruptuntur humores & putrescunt in uasis uel extra uasa: uasa autem appello uenas & arterias. Tractaturi itaque de continuis dicamus quod fe. continuæ sunt ille quæ sunt ex humore putrefacto intra uasa. & continuæ affligunt patientem usque ad ereticam declinationem: sicut sunt synocha inflatiua: synochus putridus: canson & huiusmodi. Causæ autem continuæ afflictionis sunt scilicet putredo continua: continua respiratio putredinis ad cor: & descensus materię proppter principalem corruptionem seu. Et ideo in synocha est requies nulla: cum in ea istæ tres causæ continuitatis cõgregantur. In alijs autem continuis in quibus nisi duæ causæ continuitatis concurrunt aliqua requies fit: & licet cholera & flegma & melancholia altera sine utraq; qualitate putredini repugnant. Tamen propter admistionem san. calidi & humidi qui cõ eis miscetur per interclusionem uenarum continue putrescunt. sed in quibusdam horum plus: in quibusdã uero minus: & rursus licet humores sint admisti: tamen quandoq; unus tamen corruptus est: & non alij. Et quia de eadem dicta humor unus ad corruptionem & ad putredinem habilior generatur t contingit interdum quod unus de quatuor humoribus putrescit. Continuarum fe. alia sunt simplices: alia sunt compositæ. Simples sunt quæ ex una tantum materia in uasis putrefactæ sunt ut synocha. Compositæ uero sunt quæ ex una materia putrefactis intus tantum: t. uel intus & extra sunt: ut emittitæ: & prius de simplicibus agamus.

Cum sanguis superabundat in corpore ultra

debitum modum & præcipue in spiritalibus & super accendatur: & non putrescit: facit quandam fe. continuam: quæ inflatiua synocha appellatur: & dicitur inflatiua propter multam fumositatem: quæ pectus & pulmonem inflat: & etiam totum corpus in hac fe. inflatur. Differt autem synocha inflatiua a synocha putrida: & ab alijs putridis: quia in hac feb. urina non foetet & pulsus est fortis. In putrida temeraria non foetet & pulsus est inordinatus: constrictio uelocior est quàm dilatio. Item in hac fe. apparet urina rissa uel subru. in substantia per totum spissa: & non liuens. In putrida uero liuet ipsa urina. Sunt autem signa alia in synocha inflatiua: scilicet membrorum grauitas, uenarum plenitudo: calor continens: rubor oculorum & faciei: dolor frontis & tympanum. In somno uidetur infirmo quoddam deat lampadas quasi luminatas & robora corpora sicut scarlatum: corpus rubrum: sanguinem: rubeas picturas: & huiusmodi, hæc enim fe. uia cito curetur in pleuresim terminari consuevit multoties. Curetur ergo hoc modo. Si nil obstitit fiat minutio in principio de basilica: uel quod melius est de uena mesc. quæ est inter basilicam & cephalicam extrahatur sanguis usque ad lipotomiam. Multi enim sola minutio ne huiusmodi sunt liberati. Postea si cius uenter fuerit laxatus competenter detur. unc. i. s. syrupi ro. uel uiol. cū frigida. Si fuerit constitutus usque ad sextum diem deoter ei cibaria refrigeratiua & boni san. generatiua: sicut sunt spinacia, borago, lactuca, pruna damas. in aqua elixata: succus granatorum: protulacæ: scariola: mica panis ter uel quater cū aqua lota addito zucha. & similia dentur: & si nimium fuerit constitutus aliquod suppositorium ex lardo & huiusmodi fiat & aliquod clystere leue ex mal. mercuriali frondibus uiol. & fursure decoctis & additis casiaxi. olei uiol. zuchari uiol. & huiusmodi & fiat clystere. Post diem uero septimum si adhuc plenitudo durauerit purgetur cū deco. cap. uc. hepaticæ iuinbarum sebesten: scariolæ: prunorum & uiol. in qua resoluantur casiaxi. unc. 2. amarindorum & māne ana unc. i. zucha. uiol. unc. i. s. Vidit quendam puerum qui patiebatur synocham inflatiuam: qui erat in tantum tumefactus & inflatus quod omnes medici ipsum pro desperato habebant: cui quidam senex pauper petens elemosinam superuenit cui parentes dixerunt uade cum Deo frater: & ille ait: quid habetis: & illi dixerunt: uide quid habemus: & ostendunt sibi puerum: & ille dixit: ite & accipite paritaram, & omni mane detur in potu de succo cius. drach. i. s. cum syrupo rosa. uel uiol. uel zucharo solo, & dictam herbam detis sibi comedere in crispellis coctam, & hoc fecerunt ut

que ad dies .9. & liberatus est pa. In quarto nero die emisit maximam urinae quantitatem, & coratus est perfectus. Quod si huiusmodi egredo cum apostemate fuerit detur pituita hordei, & cetera supradicta in præcedentibus capitula. Pro dolore capitis fiat inunctio ex oleo nucum vel nio. vel populeon & similibus, vel epithimetur frons & tempora de sandal. & ru. uino distemperatis cum aqua ro. & succo semperuiae: lauentur manus & pedes in aqua decoct. florum camo. nio. & mal. & ro. In se. continuis. recip. absinthij. Mani. t. fac bulle in aceto quousq; virtus absinthij demundetur ab aceto, post. Reci. farinæ hordei. unc. 3. farinæ fenugr. unc. 1. fiat emplastrum stomacho usque ad umbilicum.

De syncho putrida. Cap. V I.

Syncho est fe. quæ fit de sanguine putrefacto & superaccenso: in qua urina apparet rubicunda vel subrubicunda in substantia per totum spissa: & liuens superius & etiam fetens si odoretur. Et notandum quod tres sunt species synchi scilicet homotenus, augmasticus & epaumasticus: nam secundum proprietatem materiei & caloris tenorem diuersificatur species synchi. Cum enim materia est multa & ad successionem inepta, & calor est fortis ualde à principio calor foris operatur: & quia materia est multa consumptioni diutius resistit: unum status ægri diuisio cito incipit, & diutius usque ad finem perseverat, & fit species synchi qui dicitur homotenus. ab homoe quod est unum & tenos quod est tenor, quia unus dicitur esse tenoris: & uidemus in multis lignis sicis simul aggregatis, in quibus ignis accessus fortiter agit, & diutius perseverat æqualis. urina apparet, sicut dictum est, pulsus magnus plenus & inordinatus, facies rubes, sitis magna, lingua sicca & spera. Et uniuersaliter scias quod in syncho uel syncho nulla requies uera uel falsa inuenitur: & durat quandoque usque ad diem tertium uel septimum, quandoque usque ad 9. quandoque usque ad 11. quandoque usque ad 19. & ultra non protenditur. Et nota quod urina rubicunda uel subrubicunda in homoteno apparens eadem perseverat usque ad finem, nec mutatur aliquo modo in colore. In augmastico uero urina rub. uel subru. apparet. deinde rubicunda uel subru. efficitur. In epaumastico uero e contrario accidit & hæc ultima species saluior est. Augmasticus est secunda species synchi qui dicitur augmasticus ab augendo, & quando materia est multa & accessioni inepta & calor est debilis, tunc enim ab ipso principio calor lenitur & debilitatur operatur & paulatim augmen-

tatur, & longior tempore manet: cuius similiter est uidere in uiridibus lignis in quibus si ignis accendatur ab ipso principio est debilis lentus. scilicet paulatim incipit fortiter operari & accendi & diu durat. In principio autem nota leniter incipit, sed ualde grauiter finit, sic quod in tertia uel quarta die grauissime & potissime pa. infestat. Quandoque uero materia est pauca & calor est fortis, & tunc calor à principio agit fortiter, & materiam pauce sua cito consumit, unum cito incipit declinatio, & sic fit feb. quæ dicitur epaumastica quasi decrescens, quod est uidere in stoppa, in qua si ignis accendatur, à principio fortiter agit & inflammatur, cito tamen incipit decrescere & lenescere, & omnis symptomata supradicta in hac specie synchi leuiores sunt, & ad bonum conuincunt & istiales qui patiuntur epaumasticum sine auxilio medici liberantur, quia materia licet sit habilis ad accessionem, tamen est pauca & cito consumitur. Homotenus etiam & augmasticus hoc modo curentur. fiat minutio secunda die de uena prædicta uel de uena hepatis, & non tanea, sicut in syncho inflatiua, sed fiat quod san. ex. in contrarium motetur, ut saluetur dictum Hippo. in regimieo acutorum dicentis. Quod non debes uenâ obturare quousque sang. in contrarium mutetur colore. Et purgatio, digesta, suppositoria leuia, clysteria, iunctiones frontis & temporum, & epithimata frontis fiant simili modo, sicut in syncho inflatiua dictum est. Syrupus ro. uio. cum aqua frigida uel zuchharum ro. cum frigida detur. Syrupus optimus ad huiusmodi fe. Recip. pruna sicca & lora in aqua. 3o. se. portulacæ lactucæ: sand. al. & rub. berberum ro. an. drac. quarta. uio. drach. 5. gumi ara. dragaganti & psillii, an. drach. 4. iuiubæ. 2. 5. bul. in aqua cum seminibus prædictis & gummi sin subtili sacculo lineo positis & addito zuchharo in prædicta decoct. fiat syrupus, & aromatizetur cum drach. 2. camphoræ. Syrupus etiam de aqua citrullorum uel cucur. deco. in pasta uel ipsa aqua cucurbi. & huiusmodi cum prædicta decoct. miscetur & fiat syrupus cum zuchharo. Epithimetur frons & tempora ex sandal. al. & ru. ro. cum aqua ro. misis & supra cor & hepar apponatur petia in prædicto licore intincta. Ex populeon oleo ro. uel nio. succo solatri semperuiae & similibus loca prædicta inungantur & epithimentur. Ad sitis etiam mitigationem detur syrupus de psillio. impleatur etiam sacculus lineus subtilis parum se. psillii uel saltcm, semini trito, & ponatur in aqua frigida, & cum illa mucilagine lauentur lingua: & cum ipso sacculo fricetur, semen etiam cydoniorum in ore teneatur, & eius deco. sitim auferet. Spongia uel pannus lini infusus in aqua decoct. mal. se. lini & scoru-

& fenugreci tepida pectori & thoraci applicetur. Quod si uateria fuerit indigesta, & sitis ualde incitet pa. detur uas uitreum, æreum, uel argenteum magnum: quod teneat uiam octauam uel plus plenum totum aqua clarissima & frigida in potu detur. Nam ut ait Hippoc. in regimine acutorum. Aquæ autem nollum inueni usum, nisi quia in feb. acutis exhibetur &c. Et ego hoc solo uidi quamplures ab huiusmodi febris acutis liberatos fuisse. Radatur quoque lingua cum cania uel ligno, & fricetur cum spongia uel saluia infusa in aqua & succum lactucæ & portul. in prædictis ad sitim mitigandam in ore te neat. Pro insomniatate lauentur pedes & crura in aqua, in qua myrtus, uiole, mal. frôdes salicis: lactucæ, iusquiami, & papaueris cocta fuerint: de hac enim aqua lauentur pedes manus frôtes & tempora & pulsus: & deinde leuiter abstergantur: postea aliquod de emplastris ad inducendum somnû dictis in capitulo de phrenesi: fronti & temporibus applicetur. Cû autem in his pas. & in aliis acutis fe. est tanta fe. & insomniat: q. fere pa. ad mortem deducitur: & nullo modo eos possumus prouocare ad somnum: ultimum remedium quod possumus facere in prouocando somnû est istud. recip. ros. drach. 3. se. portulacæ, lactucæ, melonum: anisi, liquir. croci, opil. thebaici: andrach. conficiatur cû aqua frigida & succo apii & syrupo rosa. & detur in potu. Aer etiam akretur cû spongijs in aceto infusus circumcirea lectum suspensus, & frond. cannarum, uicis, salicis, myrti, gladioli, & huiusmodi per domû stentantur, & de super aqua frigida distilletur. Cõstituitur etiã distillatio aquæ frigida, uel si uolus coram eo, quia sic stupor in eorum oculis euenit, fricentur extremitates manuum & pedum: eorum cû stamini infusa in aceto, sale, fuligide, & aqua ros. simul mistis. Et fiant si fuerit necesse ea quæ dicta sunt in capitulo de lethargia. uidelicet si ad lethargiã uideatur tibi parari egrotans. Clysteria fiant ex mal. uiol. branca ur. parietaria & urtica. an. M. l. se. lini triti. drac. 3. in aqua bul. & colentur, & addito succo blæz mercurialis an. drach. 1. zucca. uio. olei uio. an. drach. 1. s. cal. siccif. drach. 3. mel. uio. dra. 1. iniiciatur per clystere, mica panis ter uel quater in aqua lota: cum aqua frigida & zuccharo mista & detur. Quod si in 8. die non terminetur ægritudo purgetur cum locura superius dicta, uel fiat syrupus de se. cõmunibus, psillio, capil. uen. & uol. in quo ponatur drac. 1. reubarbari puluerizati, & detur totum in potu. Et quia hæc ægritudo per fluxum san. uariarum terminari consuevit filij sine die cretico non suat ipse san. ex naribus, & signa deuocutiua ipsius san. e naribus debent fluere præcedunt, sicut sunt dolor capi-

tis, frontis, stomachi, & huiusmodi & scimililationes uelut ignis coram oculis infirani apparent: prouocetur cum fetis porci in naribus immisus uel cum spargula: uel cum sômone nanibus imposito, uel cum sanguis sugis naribus & fronti appositis, uel fiat sômia de uena que est in medio frontis. Quãdoque etiam in uere superuenit fluxus sang. in naribus, & soluitur ægritudo per se. interdum durat diutius ipse fluxus san. à naribus à nobis dictus. Et etiam quãdoque natura fortis facit crisi per fluxum san. uentris qui nõ restringatur nisi feb. prius recesserit. Et si ulterius ipse fluxus uentris durauerit, dentur trocisci de spodio & fiant alia remedia in ca. de fluxu uentris dicta.

De causonide. Cap. VII.

Causon feb. à cauma dicta est, quoniam maximum corpori infert cauma & incendium, & fit ex pura cholera in uenia subtilissimis & arteriis stomachi pulmonis & hepatis putrefacta. Est enim causon de genere tertianæ, scilicet tamen fortior existit & maioris caloris. Vna tamen die fit fortior, alia uero die remissior, nec tamen a corpore separatur, & non accidit horripilatio in causonide, sicut accidit in alia, & accidentia sunt uehementiora in causonide quàm in tertiana secundum quoddam inferius distinguemus. Signa igitur in causonide sunt hæc. Vrina rubicunda uel subru. uel citrina & tenuis, & liues uelut ignis in hac fe. apparet. adest calor continuus & acutus, totius corporis incendium & cauma forte, dolor capitis frontis & temporum figitius in modum clauoris, qui figerentur in capite, & præcipue in dextra parte capitis & oculorum, consumptio cordis, & stomachi morsus, uigiliarum instantia: os amara ricatum, alienationes multe, pulsus uelox & acutus uel subtilis, sitis peruehens, ut eis bibentibus nil sufficiat, lingua cõbusta & desiccata & aspera, & quandoque nigra, facies squallida apparet aliquantula citrinitate perfusa, cõstipatio uentris propter nimiam siccitatem cholere ex seruire uigenti, & semper continuae est dolor & incẽdiũ acutissimũ, & sine intermissione hæc feb. nisi quia in mane circa horas matutinales aliquantula fit incendii & seruioris remissio: nõ tamẽ plena requies. Ex hoc accidit propter horas sanguinea qui tunc spargitur per mēbra qui illa hora dominatur. Et nota quoddam si in causonide hypostasia in fundo urinae permansit alba: significat futuram quotidianam: si fusca tertianam: si nigra erraticam: uel quartanam. Item nota quoddam si in hac fe. & etiam in aliis acutis fuerit hypostasis rubea in fundo urinae continua & peruehens & formæ pinctæ: est optimum signum: significat enim materiam

nam sanguineam: quæ cito digeritur & erit digestioni obediens. Item nota quod si in hac fe. & in aliis feb. acutis apparet urina discolorata & pauca mixtura: ualde malum signum est: & specialiter si nullam facit residuum in fundo nivalis: dum quiescit per duas vel tres horas. Si tamen in multa quantitate mixta fuerit & frequenter: faciat residuum bonum signum est, quia est signum digestionis & purgationis perennam. Item nota quod in hac fe. & in aliis acutis urina pauca frusta, pinguis uel nigra & huiusmodi & mingatur cum difficultate mortem proximam protendit. Curetur igitur huiusmodi passim hunc modum. detur omni mane syrupus acetosus uel oxizaccara uel succus malorum granatorum cum zuccharo mixtus cum aqua se. communium seu cum lacte se. prædictorum. In secundo nero uel tertio fiat minutio de mediana nena, & hoc dico si uirtus ætas & similia particularia in hoc conueniant. Pueri enim & senes non sunt phlebotomandi, sicut uult Aul. Item si uomitus uel fluxus uel tris in principio superuenerit, uel pa. macillentus fuerit ultra modum minutio non est facienda. Item in tempore nimis tris nec nimis ca. nõ debet fieri minutio, nec in tempore nimis uentoso nisi maxima imminet necessitas, & hoc in omnibus acutis feb. & in omnibus aliis ægri tudinibus, & etiam in sanis locum habet. Item nota quod in continuis in die secunda uel quarta ad plus minutionem faciamus & non ultra. Et ratio est, quia usque ad quartum diem harum ægri tudinum materia est fluxibilis & uirtus fortis, a quarta uero die in antea uirtus debilitatur & materia refidet: & propter hoc a quarto die in antea non debet fieri minutio quidam uero minuunt in quarto die quod non approbo. Item nota quod si in huiusmodi continuis sequitur fluxus nentris uel vomitus, est malum signum ualde. Fit enim ex abundantis humorum aut symptomatis & de. 10. uix unus liberatur quibus hoc accidens propter minutionem san. superueniat. Facta minutione detur syrupus uiol. uel ros. cum aqua frigida uel zuccharum ros. uel triasandal. dicta tenuis iningatur quia dicit Hypp. in aphor. Ad ultimas id est acutas ægri tudines ultimæ curationes &c. Sit igitur dicta eorum mica panis ter uel quater lo sa cum zuccharo, scariola lactuca: portulaca: satia hordei, amygd. & huiusmodi dentur in quarto uel octauo die: purgetur cum ista decoctione. reci. cap. iiii. hepaticæ scariolæ. bozæ gnis: an. M. s. uio. drach. a. se. communium contusum: drach. 2. pruna. 30. iunibe sebesten. an. 20. hæc omnia in quantitate aque sufficienti coquantur & colantur & colature addantur pulpa casia uel si. drach. 2. osi mellis simplicis tam nidosum, diapruni. zucchari nioi. an. drach.

zucco

1. zucchari ros. unc. 1. s. reubarbari triti & positi in succo scariol. depurato. drach. 2. Et si maiori indigeat purgatione adde miradolanorum citrinorum puluerizatorum. drach. 1. s. aque decoctio. plantaginis. drach. 2. hæc enim decoctio in omni tertiana & omni ægri tudine de cholera facta conueniens est & bona: in his tamen ægri tudinibus tuor in 14. uel 15. diebus quam ante si competenter possumus uisitare. Quando uero materia fuerit furiosa cruenta subito de loco ad locum: tunc statim purgamus: nec digestionem materiei expectamus. Nā synocha & synocha, phrenesis, squinancia. & antrax. passillacæ, & colica. thenasmon acutissimus & similia materiei digestionem in ægri tudinibus non expectabat magister meus: sed statim humorem peccantem euacuabat etiam materia existente cruda. Utatur pa. cansonidem syrupis frigidis in precedenti capitulo traditis: sicut est syrupus de succo cucur. & zuccharo. syrupus de se. communibus: syrupus phyllis acetosus uio. ros. & huiusmodi sitim extinguentibus in prædicto cap. dictis. Detur etiam syrupus rubeus qui fuit inuentus in ultramarinis partibus qui fit de quadam herba quæ sub niue oritur & zuccharo optimo in bac. fe. & omnibus se. ex ca. humoribus factis mirabiliter confert. Pronocetur somnus lauando pedes manus frõtem & tempora cum aqua in dicto cap. dicta, & ponendo tympani & fronti emplastrum ali quod ex dictis in cap. de phrenesi. Epithimen tur stomachus: frons: hepar, & tempora: cum epithimate dicto. Aque frig. in febribus ad reneibos competenter tribuamur sicut est aqua panis bene cocti & bene fermentati & de bono tritico facti in aqua frigida ponatur: & tandiu ibi iaceat donec optime mollicetur: deinde cum panno lino mundissimo coletur: & si uis adde parum zucchari & colaturam dabis: hoc enim in acutis fe. plurimum ualet: & bene ntrit & calorem mitigat: & aqua ca. decor. dragaganti zucchari & penidiarum: medulla citrullorum in frigida aqua infusa & data. Et hoc dico si huiusmodi fe. fuerit sine apostemate & sine punctura & dolore pectoris: quia tunc huiusmodi aque frigide non competunt. Nam ut ait Hippo. in apho. Frigidum inimicum est ner nis pectori osibus &c. Aqua melonis palesti. in his fe. data optima est quæ hoc modo extrahi dicitur. Accipiantur melo palestini & perforetur, & per illud foramen immitatur zuccharum in prædicto melone, & randin manibus moueatur huc & illuc quousque zuccharum liquefiat, deinde ipsa aqua tribuatur in potu. Alia aqua optima in huiusmodi fe. quæ dyseriam febrilem & in condium & simi mitigat & urinam prouocat, terantur semina communia ad quantitatam. drach. 3. plus uel minus secundum

dum quòd uolueris, & super ipsi tritis infunde pisanam hordei seruetisissimam uel saltem aquam simplicem ca. sed non tantum nalet, & coletur & adde zucchari & penidiarum. & ito potu da. Quòd si fuerit uentris coospicior: detur hæc aqua optima quæ quasi nino assimilatur & multum coonset in huiusmodi fe. & in simplici & duplici tertiana, alteras enim febrem dyserasiam & purgas aliquatulum. bul. aliqua frusta reubarbari in aqua, & ipsum reubarbarum aquam colorabit sic quòd quasi uinum uidebitur, & addito zuccharo uel penidijs uel syrupo uiol. detur in potu. Clystere lenitium uel suppositorium fiat si necesse fuerit pro asperitate linguæ. & pro dolore capitis hæc remedia superius dicta in præcedenti capitulo.

De emittitis, & primo de minori. Cap. VIII.

Emittitres tres sunt species. scilicet maior medius & minor, medius & minor curari possunt si medicus fuerit prouidus & circa infirmum solicius. Maior uero potius diuina quam humana manu curatur, auctoribus omnibus testantibus, emittitres quidem est feb. continua ex duobus humoribus, uno in uenis, & altero extra putrefactis. Et dicunt emittitres ab emi quod est medium & triquetrum quod est tertiana. Inde dicunt emittitres quasi habens mediâ partem sui maioriâ tertianam, scilicet choleram. Minor itaque emittitres fit ex phlegmate putrefacto intra uasa & cholera extra. Vnde talia debent esse symptomata. Vrina ruffa seu subruffa, seu citrina & mediocriter spissa & superius luens cum appositione manus, pulsus uelox & plenus, lingua apparet aliquantulum nigra & limosa, pa. cootinuuo frigore infestatur a primo die usque ad tertium uel quartum diem in uesperis, & postquam frigus minuitur permanet extremitatum frigiditas scilicet manuum, pedum nasi, & sic manet infirmus per 18. horas quas habet in summo labore scilicet ab hora uespertina usque ad matutinam, & est cum oculorum grauitate & falso somno. & sic à quibusdam medicis imperitis minus bene iudicantibus propter huiusmodi accidentia & soporem oculorum lethargia esse creditur, & propter sex horas, scilicet a tertia usque ad uesperas quas habet in falsa quiete. a quibusdam imperitis quotidiana esse creditur, cum non sit. Vnde quisque probus medicus infirmum suum debet assidue uisitare ut assidua nistatione qua pacare debeat cognoscat, & non semper in sola aspectione urine confidat, cum urina sit fallax nuntius præterquam in quibusdam morbis, & specialiter in his morbis que habent materiam intra uasa. Medius uero emittitres fit de colera putrefacta intra uasa, & ex phlegmate extra uasa putrefacto. In principio

apparet urina rubea ncl subru. mediocriter tenuis, in statu uero aliquantulum, inspissatur seu in augmento, & in superficie aliquantulum liniditatis vel viriditatis vel nigredinis adest, uigiliari instantia, scilicet lingue aridas & asperitas, dolor frontis, tymporum & aurium, constipatio uentris. pulsus uelox & subilis. Rigor in hac specie emittitri de tertio in tertium diem inchoatur sexta uel nona hora diei habet. 26. horas in summo labore, & 12. in falsa quiete. Maior uero emittitres fit ex cholera putrefacta intra uasa & melancholia extra, & habet. 40. horas in summo labore, & 12. in falsa quiete, infestans pa. intensissime eisdem accidentibus, sicut in medio emittitri diximus, scilicet magis ualde, & cum pessimo & malis significationibus & mortalibus, urina apparet in conidus uel nigra. Et isti tales sicut superius dixi, sunt sancto spiritui comendandi, & solis ignis pronosticis relinquendi. Et nota quòd quandoque solet fluxus uentris uel uomitus in principio mioris & medi emittitri superuenire, qui si fiat ut symptomatis tam debili exsistente infirmo mortem proximam pronociabis. Si uero eum fortitudine uirtutis & ui materis pugnantis contra morbum tunc aggritudine breuem & bene terminabilem fore pronociabis. Curetur itaque minor emittitres in huoc modum a principio detur syropus acetosus uel oxizaccharum aqua frigida uel tepida. In tertia uel quarta die fiat minutio uirtute & ætate permittentibus. de uena hepatis & fao. secundum uirtutem pa. extrahatur. Post minutionem uero detur syropus ro. uel uiola. cum aqua frigida ncl zuccharum ro. nouum propter confortationem stomachi in 8. ncl. 10. uel. 12. diebus uel ultra, quia huiusmodi ægritudo. 7. 9. 11. 14. uel. 19. die terminatur ne plurimum, & quandoque usque ad. 20. uel 24. diem ad plus proteoditur, prolonges itaque quantum plus potes dare medicinam si uideretur periculum immineri. Des itaque hanc decoc. in decima uel duodecima die recip. polipodii quercum boni & recentis & bene rasi & mundati a cortice exteriori. drach. 4. ueranus bene infusus cum drach. 1. 1. sc. feniculi & bulliant cum 25. prunis siccis & additis. drach. 2. mirabol. citrinorum in fero. maou colatura propinetur, ncl detur hæc decoc. optima ad hoc recip. capi. ue. hepaticæ, an. M. 1. uio. drach. 1. pruni damascena sicca. 30. iuinibz sebellen. 25. polypodii quercini mundati. drach. 1. 1. hordei mundi. p. 1. sc. fen. anis. an. drac. 1. omnia perfecte coquantur & coletur. & additis tamarindorum drach. 2. pulpe castig. drach. 1. miabolano rum citrinorum drach. 1. qui totam diem iaceant ad serenum & additis drach. 1. zucchari uio. mane in aurora tepida exhibeatur in potu.

potius uel detur aqua reubarbari cum syrupo uiolae. & si in hyeme fuerit in auxumno detur oxymel squillinum uel diaprunis uel eleusariu de succo rosae quod si necesse fuerit sepe fiat. & si in 4. uel etiam in 3. transit agnitus. Et etiam si fluxus uentris uel sang. uel uomitus superuenerit: & aeger non uideatur ubi in totum liberatus, propter hoc non stes quin cum praedictis decoct. & electis purges ipsum dummodo uirtus pati. sit fortis. Quod si phlegma extra uasa remanserit prouocabis uomitum cum aqua serad. raparum uel rapistrarum atriplicis seu raphani uel cum uomitipo Nicolai, scarpellae uel patriarchae & similibus in capitulo de uomitu positis. Quod si stupor superuenerit seu subest hiant fricationes seu cetera remedia in capitulo de lethargia dicta, ut suoz clysteria, emplastra, & huiusmodi in occipitio facta fricationes, prius forti: sicut in capitulo praedicto plene dixi. Dixta tenuis exhibetur si uirtus usque ad statum durauerit, sicut est ptisana colata cum auccharo & penidijs naica panis ter uel quater lota in aqua cum zuccharo & penidijs proua damasceon elixa, cum agrestia uel aceto parata dentur, lac amygd. farina hordei cum eodem lacte parata & huiusmodi deorur. Quod si iofirmus fuerit ualde debilis, & uirtus non sufficiat usque ad statum, detur succus parue pullae cum hordeo mundo decocta, uel ipsa caro ipsius pullae intantum decocta quod caro ab ossibus separetur. pira grossa & matura & poma grossa dari possunt, etiam uiz iudaeae, succus granatorum, & similia dari possunt. Medius uero emittitur eodem modo curatur per omnia, sicut minor, hoc excepto, quia in patientibus medium emittitur debemus insisterere quantum possumus cum emplastris, & alijs remedijs prouocantibus somnum in capitulo de phrenesi dictis. Cum isti patientes medium de facili siant phrenetici. In minori debemus fricationes & huiusmodi facere inhibere somnum, sicut dictum est, cum his quae in capitulo de lethargia dicta sunt, cum de facili huiusmodi minor emittitur in lethargiam conuertatur. Vnde in aliquo praeterquam in hoc non differt cura minoris & medij emittit. Eodem enim modo purgamus & digerimus materiam huiusmodi alia facimus in uno sicut in alio. Nec differt cura unius & alterius oisi in duobus dictis. Maior uero emittitur in cura bilis est, ut dixi, cum inuenimus patientem in quantum possumus ipsum pro desperato in curam recipiamus & insillamus cum praedicta cura in capitulo de minori emittitur dicta. Item purgemus po. cum decoct. fenae, thymi, euscute epithimi, uiol. ca. ue. scolopendriae. an. M. s. uiol. drach. 1. pruna. 30. omnibus decoctis addatur colatura calisigi. tamen non doro zucchari uiol.

diaprunis: an. drach. 1. lapidis lauli. drach. 3. reubar. drach. 4. mirabolano rum citrinorum unc. s. per noctem haec insimul iaceant, mane uero colatura propinetur in potu, & faciamus quod possumus: tamen semper huiusmodi pati. maiorem emittitur pro desperato habeamus.

De tertiana uera. Cap. IX.

Tertiana enim duz sunt species: alia uera, alia non uera & haec dicitur notha. Scilicet prima de uera ageodum est. uera tertiana sit ex cholera rum. naturalis pura: & potius in iunco cholericco sicco & macilento magis iofensa: & in aestate & in calida regione & sicca, & dixta etiam calida & sicca: & multae cholerae generatiua praecedente: & talis tertiana inter acutas nominatur, quae tamen per 7. periodos durat est uera, & si transit 7. periodos est notha. Habet igitur uera tertiana. 1. 2. horas in summo labore. 12. in leptopicijs, & 24. in uera quiete. Vrina talium ruffa uel subruffa per totum reouis: & quandoque crocea uel aurea apparet, & pa. de tertio in tertium diem infestatur ad tertiam hora diei in antea. prima cum ingenti rigore: scilicet parum durat: postea sequitur calor magnus: pulsus magnus & uelox: sitis, amaritudo horis, & etiam ulceratur os: dolor frontis & tymporum: & quandoque continuus, id est uomitus contionuus, & cholericus sequitur. Ex nota quod cum dicitur, tertiana uera uel quartana & huiusmodi se. habet. tot uel tot horas in labore: intelligitur quod ea haberet ad plus. aliquando enim huiusmodi tertiana uera non affligit nisi per 9. horas uel 10. uel minus si materia fuerit pauca, & sic de alijs. In principio itaque huiusmodi se. detur ad diuisionem materiei quolibet mane. uoc. 1. s. syrupo uiolati, uel oxizacchara cum aqua frji. nisi fuerit cum hoc dolor pectoris: uel lateris, quia tunc miscemus cum praedicto syrupo tertiam partem. uoc. penidiarum: & damus cum tepida. Et si fuerit cum hoc fluxus uentris: uel uomitus admiscemus praedicto syrupo. unc. s. aucchari rosa. antiqui, uel damus syrupum ros. Si uero uenter fuerit constipatus damus syrupum uiol. cum tepida uel oxyzachars: miscemus zuccharum uiol. & damus. Post uero tertiam uel quartam accessionem, uidelicet in octauo uel decimo die si materia fuerit in stomacho: quod cognoscitur per nauseam: uel uomitum, uel per alia signa supradicta ad hoc eoenuenientia, educatur materia ipsa cum uomitipo patriarchae, uel Nicolai & similibus in capitulo de uomitu dictis: uel in ipso seruiore caloris aqua frigida in multa quantitate exhibetur in potu & digitis in ore immixtis uomit.

eus pronocetur: muli hoc solo curant orioide-
 licet cum materia est in stomacho: quæ faciat
 huiusmodi tertianam ueram. Quod si materia
 sit in intestinis quod cognoscitur, quia dolor &
 tortio sunt circa uentrem, & quandoque adest
 fluxus uentris & ægrotudo cholericæ, & tunc
 educatur materia cum clysterijs acutis, & mor-
 dicatiua superius dictis partim, & partim
 etiam cum medicinis inferius dicendis. Si uero
 materia sit in hepate uel chisti fellis quod co-
 gnoscitur per urinam multum intensam in co-
 lore, & etiam ad quandam spissitudinem acce-
 dentem, & calor est ualde acutus. Si uero in spi-
 ritualibus fuerit materia, tunc adest tiris Inte-
 sa: & per potum mitigari non potest. In quo-
 cunque prædictorum locorum fuerit materia,
 scilicet in intestinis hepate uel chisti fellis: uel
 in spiritualibus digerant secundum doctrinam
 superius dictam. In 10. uel 12. diebus purgetur
 pa. cum deco. ista. recip. ca. uel hepaticæ, scol-
 pēdriæ, boraginis. an. M. s. florū ui-
 tag. an. drac. 1. fe. eō munim. dra. 2. hordei mu-
 di. P. t. prona. 30. iuiobæ sebestæ. an. 2. 3. hæc oīa
 persicte coquantur & colentur & colaturæ ad-
 datur thamarindorum, oximellis simplicis. an.
 drach. 1. zucchini ro. nio an. drach. 2. diaboragi-
 nati, drach. 7. s. reubarbari triti & positi in succo
 scariolæ depurato per noctem, dra. tertiā aqz
 deco. plantaginis. drach. 1. hæc omnia simul
 mista per noctem simul iaceant ad serenū. ma-
 ne uero in potu dentur: quoniam hac decoe. ute-
 batur magister meus in tertianis ueris, etiam &
 in caufone, & in omnibus ægrotis diuinis ex cho-
 lera factis. Vtebatur etiam syrupo laxatiuo
 ad hoc. recip. ui-
 o. drac. 2. pruna. 30. iaceant hæc
 per noctem in aqua feruenci, mane uero bul-
 & colentur: & fiat syrupus cum lib. 1. s. zuccha-
 ri in quo adde reubarbari puluerizati. drach. 3.
 aqz ro. drach. 4. de hoc syrupo somat pa. tunc.
 3. uel 4. de quarto in quartum diem in die quie-
 tis: uel hoc post tertiam uel quartam accessio-
 nem: uel purgetur solum cum deco. mirabola-
 norum citrinorum: & cum drach. 2. zucchini
 in aqua cal. per noctem ponantur: ma-
 ne uero exhibeatur colatura eorum habenti stomachū
 frigidum cum ca. habenti uero stomachum ca.
 cum fri. exhibeantur. Et nota qd mirabolani da-
 ti cum ca. faciunt plus urinate & minus assella-
 re, cum fri. uero dati contrarius faciunt. Quod
 si pa. ualde timorofus fuerit in accipiendo de-
 coc. nec consuetus talia sumere antequam de-
 tur ipsa medicina seu deco. per 5. uel 6. dies
 fiat hoc emplastrum constrictiuum & stom-
 achi confortatiuum, & stomacho apponatur.
 Recip. an. dra. mastice olibani gumi arar. ro.
 an. omnia puluerizata cum succo menthe con-
 ficiantur. Cumque medicinam dare uolueris
 ligetur summitas lacertorum brachiorū & erui-

rum circa msculos & digiti manuū & pedū
 cum aliquibus corrigijs subtilibus seu codiciis li-
 gentur, & fiat fricatio extremitatum & faue-
 ribus os cum aceto uel agreste uel succo arancie:
 uel limoni: uel pomū acetoso siue malagrana-
 to acetoso: & nil de eo deglutiat, & ex succo ali-
 cuius prædictorum: uel aceto infundatur oculi.
 Postquam autem biberit medicinā aspergatur
 facies eius cū aqua ro. uel aqua frigida ad quan-
 titatem uoius cyathi prolesta supra eius facie,
 & odoret panem assum in aceto, & succo men-
 thæ infusum: aut polegium uel muscum, quod
 melius est. Quod si abominatio uenerit pa. &
 medicinam eijcere uoluerit per os panem as-
 sum in aceto infunde addito succo menthe: uel
 ipsa mentha teratur, & spongia marina uel lana
 succida intincta in huiusmodi liquore orificio
 stomachi sæpe apponatur, & in ore eius salam
 teneat, & si uult parum de ipsa transglutiat, ut
 sapor medicinz aboleatur: deinde quiescat in
 lecto cal. nec dormiat: nec etiam deambulando
 uadat nisi prius medicina mouere incipiat.
 Cumq; medicina iam soluere inceperit uadat
 parum deambulando per domum possum post
 passum. Quod si ipsa medicina non bene sol-
 uerit, des parum de reubarbaro pul. cum sero
 caprino, uel de electuario de succo ro. nel dia-
 pruois, uel aliquod tale cum tepida: uel cum
 frigida, uel cum aqua prunorum, quod melius
 est. Quod si propter frigiditatem aeris seu
 stomachi medicina non duceret sicut debet,
 tunc panis calidus sicut exit de furno per me-
 dium scindatur & in pauno lineo inuoluatur, &
 stomacho apponatur, uel locum cal. uiuo albo
 irroratū in paunis inuolutū, immo olla lutea,
 uel uelica enea uiuo uel aqua pennis inuoluta pa-
 nis, & similia ca. stomacho applicentur. Quod
 si uomitus superuenierit succurratur cū his quæ
 in cap. de uomitu restringendo sunt dicta. Quod
 si medicina nimis duxerit teratorem arugine,
 & cum cinere conficiatur, & fiat ex eis empla-
 strum & supra umbilicum ponatur. Mittatur
 pa. in bal. aqz deco. radicis filicis, tapfi, corti-
 cis grauatorum & huiusmodi stipticorum &
 dentur syrupi & electuaria constrictiua in cap.
 de fluxu ueneris & dysenteria dicta. Et no-
 quod si in tertiana dolor pectoris pro-
 pterea forte, quia in spiritualibus materia cou-
 tinetur, uel alia quacunque de causa ab inferio-
 ribus proveniente, non debet dari medicina ni-
 si prius ipse dolor sedetur & recedat, & tunc
 omnia particularia considerari debent. Syrupus
 mirabilis contra tertianam. recip. succi plā-
 tagioia scariolæ & cicoreæ an. quilibet istorum
 succorum depuretur, & omnes in simul misce-
 tur & bulliat, & addito zucchini fiat syrupus
 in quo addatur parum crystalli puluerizati, &
 detur, quia miro modo ualet & sitim extinguit
 & calorem

& calorem reprimat in ipso. Hora accessio-
nis pedes & crura ponantur in aqua frigida
deco. miri, maluz, uiol. & similibus, frons &
tympana supradicta aqua lauentur. Postea in
ipso calore & feruore intensissimo cum pa-
uiderit totus comburi, & sitit mirabiliter, detur
sibi in potu uas æneum uel vitreum magnum
plenum aqua frigidissima & potet ad satiata
& crura & brachia & pedes suos in aqua præ-
dicta frigida tenet deco. myrti & cum subie-
cta. Postea prædicta membra inungantur oleo
ro. & uio. prinstamen cum panno lineo sub-
tili absterfa, & etiam in lecto ponatur pa. hoc
enim solo plures tertianarios curauit magister
meus. Et hoc debet fieri posttertiam uel quartam
accessionem, materia iam digesta. Syru-
pus etiam diaphylon in potu detur pro siti, syru-
pus superius scriptus. pilulum ablutum in ore
tenet. Fiat etiam aer artificialiter frigidus cū
asperzione frigidarum herbarum & aquarum
& huiusmodi per cameram. Electuaria frigi-
da & syrapi frigidi & huiusmodi, & alia frigi-
da in capitulo de causone dicta demur. Pro
infirmitate pronocetur somnus cum his quæ
in capitulo de phrenesi diximus. Pro dolore
renum nngantur renes ex oleo uio. ro. agresta
& lacte mulieris simul mistis. Item fasciculum
cimarum tenerimarum myrti in aceto deco-
qui facias, quoniam miro modo huiusmodi do-
lorem tollit & hoc sæpe fac. Aliud idem acetū
agresta, fructus solari, uermicularis, portula-
cæ, cymbalaria & huiusmodi frigidarum her-
barum insimul misceantur, & addito oleo uiol.
& ro. tepido fiat, & in hoc liquore pannos, spon-
gia, uel lana succida infundatur, & renibus sa-
pius applicetur. Pro oris ulceratione penidie
zuccharum, amidon cū zuccharo uio. & aqua
ro. insimul distemperentur, & ea hoc nlerata
loca liniuntur. Aliud acetum deco. myrti, ma-
sticis, & rosarum gargarizet, quia miro modo
ualet. Item aqua de floribus myrti per alembi-
cum abstracta & gargarizata ad hoc mirabili-
ter ualet. Aliud expertissimum, nitella ouorū
bulliant diu in saragine, & desuper aspergatur
pulvis penidiarum, zucchari & amidi, & ea hoc
locus ulceratus seu postulans sæpe liniatur.
Pro tinnitu aurium succus semperviuæ, corian-
dri, foliati, uermicularis, hedete terrestris unū
quodque per se, uel omnia simul mista cū pau-
co lacte mulieris & aqua ro. auribus instilletur
quia dolorem tollit. Aliud ad idem per me ex-
pertum elixentur duo uel tria uel quatuor oua
gallina sic quod fiant duritia ab albuminibus
iporum aqua extrahatur exprimendo ea forti-
ter cum peris lini subitū, & talis aqua cū obo-
ro. mista tepida, ac si in sole stetit auribus in-
fundatur, quia auribus nihil acin frigidum de-
bet imponi. Pro dolore ergo renum pro ul-

ceratione oris, & pro tinnitu aurium & huiusmodi
modi, si ea quæ dicta sunt hic non sufficiant,
sunt remedia ad hoc conuenientia sicut in pro-
priis capitulis dictum est superius. Item no-
ta quod in omni tertiana tam noua quam ue-
ra post tertiam uel quartam accessionem alu-
men, & trifolium enim triphera saracenica an-
te horam accessionis tollit ipsam tertianam
& patientem liberat, secundum quod dicit
Ma. Petrus Hispanus senex in secretis suis. Itē
aliud optimum ad hoc post purgationem ser-
uaretur sandali albi & ru. cum ferra cū qua sunt
pedines, uel cum simili ferra, & illa ferratura
cum succo uermicularis, uel semperviuæ cum
syrupo ro. nel uio. nel syrupo facto de herba
ribes in potu detur, uel cum aliquo succo her-
barum frigidarum & ancharo in potu detur.
Digta eorum sic mica panis ter nel quater in
aqua frigida lota, deinde cū zuccharo, nel pe-
nidie, lac amygdalarum, prisa, hordei, farina
hordei, speltæ cum prædicto lacte condica, pr-
na damascena elixa, medulla citrulli, & molo
palestinus, uel iudaicæ granatorum sacculus cru-
da herba acetosa uel elixa facis est utilis, scario-
la, lactuca, cicorea, spinachia, portulaca, cucu-
ber omnia elixa, & cū lacte amygdal. edita &
paucis agresta, uel aceto desuper infuso detur,
asparagi etiam elixi optimi sunt. Abstineat a car-
nibus & uino omnino. Quia non parua corpora
quito magis & c. ut ait Hippo. apho. ro. particu-
le secundæ. In die uero accessionis, uel nullus ei
bens detur, uel detur cibis tenuissimis per quos
que nel salte quatuor horas ante paroxysmum,
qui in paroxysmo subtrahere oportet & c. ut ait
Hippo. apho. ro. particule primæ. Nihil igitur
in ipso paroxysmo dandū est de cibo, & hoc in-
telligas nisi ritus esset ualde debilitata & ul-
tra modum dissolueretur sicut accidere consue-
uit in cholericis, in his enim cum apparuerint
accidentia uirtutem dissoluentia illico cibis
est dandus, s. in paroxysmo; & ante paroxysmū
etiam in statu. & hoc uult Gal. In commento
super regimine acutorum, & in commento apho.
9. primæ particule. In accidentibus itaq; uir-
tutem dissoluentibus illico cibis est dandus,
hunc modū tenebat etiam magister meus in
diuturno infirmos suos, dabat igitur corpore
debili existente, & in huiusmodi febricitantibus,
& in aliis etiam febribus pultem nel totam
oui, nel prædicta olera cum lacte amygdalarum condita apposto in eis pro condi-
mento frusto uno integro auxungie recentis.
Cum uero iam pa. consaluerit utatur con-
fortatiuis & restantiniis sicut est rosata nouella,
diamargariton, triasandali, diarodon
abbatis, electuaria ad restauratiōem & si
milia in cap. de heclicis dicta demur. Sy-
rupus confortatiuis & restauratiuis substan-

41 17

Videamus nunc de tertiana notha, seu non vera, Notha igitur tertiana seu non vera est illa in qua omnia accidentia superscripta, uel pluraconueniunt. Nā differt notha a uera in hoc, uidelicet, q̃a pa. nothā infestari dicitur debet de tertio in tertio in uespertinis & ferotinis. Primo rigore maiore quam in uera tertiana, & calor sequitur non tam magnus. pulsus tardior est in hac quam in uera, orina minus intensa est quam in uera. Variatur enim uicina secundum diuersitatem humorum complexionum & temporum. Item differt notha a uera in hoc, quia tertiana uera in 7. periodis longissima indicatur, ut ait Hippo. apho. 59. quartz particulę. Vnde tertiana uera nunquam transiit septimum periodum, & si uulterius extendatur non est uera, sed notha. Item tertiana notha quamuis in ætate fiat. sæpe in iuuenē, & cholericō non fit, sed magis in senē, & si forte in cholericō fiat fit in hyeme uel autumno. Tertiana uera uel dictum est fit solum cū cholera rupeccat. In notha uero quandoque cholera citrina peccat, & quādoque uisellina. Vrina igitur sub citrina, & in substantia citroz cholera remissa ad senitatem magis accedens quam ad spissitudinem tertianam notham de cholera uisellina ostendit. Vnde adest stomachi nimia repletio capitis grauedo fatiditudo, & pa. prædicto modo debet infestari. Quādo uero peccat cholera citrina, orina apparet citrina & in citrino colore remissa tenuis mediocriter, magis tamē ad tenuitatem quam spissitudinem accedens tertianam notham de cholera citrina ostēdit esse, & prædicta symptomata debēt esse. Cholera uero æruginosa & cholera prafina non colliguntur ad putredinem propter facilitatē & uisiositatem motus, & ideo nō inducunt febrem uisum immutant, ut ait Isaac in libro fe. Cūretor itaq̃ tertiana notha de cholera citrina uel uisellina hoc modo, derur pa. onc. i. s. styrupti acetosi de radicibus communibus facti quolibet mane cum aqua tepida decoq. sem. anisi. sphenuli scarię, & mallicis, & hoc fiat usque ad decimum uel undecimum diem, & tuoc purgetur cum hierapigra Gal. drach. i. uel cū benedicta aut cū decoctione ista. recip. poly podij quercinlo primi & niriidis bene rasi & ablut. dr. x. se. fen. dra. i. hac duo infus. ul. cōte, rātur & admisceātur utro radici fe. petro. spij as. p. rasi brusci. an. Ma. uial. drach. i. pruna. jo. nunc. aga. ri. drach. quartis. turbich. esulz. an. unc. tertiam. hac omnia optime decoquantur in quinque lib. aquę, quousque ad unam redeat. deinde colentur & colaturz adde pulpe calsięhi. thamarindi. an. dra. i. s. mirabola nōrā citrinorū & cheb. an. drac. i. reubarbari. drach.

drac. quartis. zuechari uio. & ro. an drac. i. si est aliqua opilario in hepate prædictum reubarbarum teratur, & in succo cudiuiæ per noctem iaceat, deinde in decoctione prædicta ponatur, & in maruisionis tepida exhibeatur. Quod si prædicta cholera uicellua uel citrina in stomacho fuerit provocetur uomitus secundum doctrinam superius scriptam in cap. de uomitu. Si dentur drach. 2. de fe. myrti trito & distemperato cum osymelle & aqua cal. in poru uomitum provocat, quod in quodam seu quilon-go tempore passus fuit tertianam notham probauit, & postea dedi sibi. & uomitum provocauit, postea dedi sibi biezæ pigræ Gal. drach. t. cum tepida, purgatus est optime & conuuluit. Quod si post purgationem amplius inuaderet fe. accessio, ante horam accessionis detur aur. alexandrina uel rubea cum calida. Si in æstate fuerit dicitur ut in uera tertiana, & alia remedia ibi dicta sunt secundum quod oportet. Si in hyeme aurtæpore frigido & in sene, uel puer dentur pulli, hēdi, perdicæ, phasian, seniculum borsago & similia. Et nota quod si dolor in pectore siue in spiritualibus fuerit semper debemus obsequiare illud qd superius dictū est, scilicet quod infirmo de penidii & dragagauro semper apponimus a liquid, & etiam quod nō purgemus pa. donec doloc quieuerit & cætera ibi dicta obseruari debent. Expertus sum in tertiana uera, & in quotidiana post. 14. diem digesta materia, & purgata per unam horam, uel duas ante principium paroxysmi dare drach. 1. rubæ troiscatæ & drach. t. cum uino de coc. rutæ, & abrotani. & saluæ, quia tollit fe. in breui.

De duplici tertiana. Cap. XI.

DVplea tertiana fit de cholera in diuersis locis putrefacta, & in diuersis horis affligitur infirmus quotidie una die grauius, altera uero leuius. Adest calor magnus & feruens, pulsus uelox & acutus, dolor capitis intensus, uomitus cholericus, oris amaritudo, abominatio, rigoc paruus, ita quod deficiente una accessione cū sudore, alia accessio insurgit quandoque. Vnde quidam existimant hanc fe. esse quotidianā uel continuam, sed contiua rigore & sudore cognoscitur. Sed quandoque accessio durat per 12. horas ut quotidiana, sed in paruo rigore & acuto calore & cholerico uomitu distinguitur quotidiana. Vrina in hac fe. apparet rub. uel subru. uel etoea in substantia per totū tenuis in principio, uel medioeriter spissa in statu uel declinatione superius obumbrata, & non liuens. Coretur duplex tertiana per omnia sicut tertiana uera curatur, exceptio quod in hac debet fieri minutio in secundo uel tertio die de uena mediana, detur syrupus ro. cum fri-

gida. Vtantor eadem dixta eodemque regimine, & eodem modo purgationis, & in omnibus his quæ in curatione tertianæ dicta sunt.

De tertiana continua. Cap. XII.

Tertiana continua fit ex cholera putrefacta in uasis affligit per 24. horas in summo labore, & per 23. horas in falsa quiete. differt autem à causon, quia materia causonici est in locis vicinis cordi: materia uero buis est in locis remotis à corde. ideoq; symptomata quæ in causone emergunt, eadem igitur signa in utraque ipsarum apparent, sed differunt in quantitate malitæ, utraque enim fit sine rigore, & utraque istarum uno die affligit magis quàm alio. Tertiana itaque continua eodem modo debet curari sicut causon hoc excepto, quod in tertiana minua frigidis capedit usi & minus tenui dixta quam in causonide. Vtatur eodem regimine & eadem purgatione in cap. prædicto dicta, exceptis his dictis nunc.

De quotidiana uera de phlegmate naturali. Cap. XIII.

Quotidiana alia continua, alia interpolata, alia uera, alia notha. Ex primode uera & interpolata dicamus. Quotidiana uera de phlegmate naturali habet fieri ut plurimum in byeme, & tempore frigido in senibus & mulieribus phlegmaticis. Cum enim ipsum phlegma naturale putrescit extra uasa, & non colligitur ad apostema facit quotidianā interpolatā quæ incipit affligere in tertia hora noctis. Primo rigore, deinde calore, & habet 12. horas ad plus in labore, & sex de falsa quiete. Sin declinatione, & sex in uera quiete. Vrina apparet subcitrina uel pallida & per totū spissa. adest indigestio, nētis & lateris extēlio capitis grauedo, pigrities ad sensum & ad motū somnolētia, oris insipiditas, spūti & saluæ abudantia. Curetur huiusmodi feb. hoc mō. os mane sumat uena. osimellis de cadi cibis cū aqua tepida, uel syrupū acetosum de radicibus seu. petro. apii, asparagi, brusci, & radice lupulorū. Digesta materia quod fiet i. o. uel 12. diebus ad plus purgetur cū syrupo laatinomagistri mei in quotidiana uera optimo qui sit sic. recip. polypodij quercini. dra. 3. uide licet uiridis & bñ mūdati & triui cū. dra. 1. se. se. mixturibz boni & gumosi, esulæ, agarici. an. dra. 3. pruna sicca. 25. prædicta terenda terantur & omnia p noctē in aqua cap. iaceant. mane uero quousque tantum tertia pars remaneat buliant, & addito zuecharo fiat syrupus, de quodas ante horam accessionis digesta materia. drach. 2. uel 3. cum calida. Vel porgetur cum decocta. Reci. capil. nem. hepatica, scolopen-

driz adianthos: polytrici, cicoreę, radicis asparagi, brusci, petro. fen. an. drach. 1. agari. hermod. an. drach. 3. polipodij quercini contriti cū pauco se. fe. drach. 1. s. marathri. drach. 3. hæc omnia per noctē iaceant in lib. 3. aquæ. mane vero bulliant quousq; ad unam redeat, coletur & colatnr addatur pulpę cassię. triphere saracenicę zuchari ru. & zuchari uio. an. drach. 1. mirabolano rubeulorum drach. 2. s. plus uel minus secundum q̃ magis uel minus uis purgare. Vel purgetur cum benedicta laxatina, uel cum catartico, uel cum blāca, uel cum oximelle squilitico, uel cum clareto laxatiuo, q̃ sic fit. recip. lib. 2. polypodij quercini uiridis & boni & cum drach. 2. se. fen. 1. cantur & bulliant in lib. 3. uini boni quousque tertia pars minuatur, postea cola ipsum uinum & adde drach. 3. mellis uel zuchari, cinamomi, folij spicę, cardamomi festini gariosi. & terantur species ista, & in prædicto uino ponantur & colentur per fasciam uel sacculum, & detur in potu lib. 1. quia beuē pnt gat. Et magister meus cum huiusmodi clareto purgabatur delicatis & specialiter gallicos qui mirabiliter abhorrent sumere medicinas & ipse loco medicinz dabat huiusmodi claretum cum quo optime purgabatur & libenter ipsum sumebant. Item purgabatur quosdam cum tragea quadam sūa laxatiua, quę sic fit. recip. enrbith boni gnmosi. drach. 1. folliculorum senę, efule, hermodactylorum, polipodii. an. drach. 2. masticis, semi. fen. & anis. an. drach. 4. terantur & omnia cribellentur, & addatur zuchari ad pondus omnium dosi est. unc. 2. & in qualibet dosi adde. grana. 5. diagridij in pomo cocti, quia mirabiliter ualet contra excessum phlegmatis. etiam artheticis mirabiliter ualet si intantur bis in hebdomada. Vel si nis potes purgare cū pul. petro. supra in passionibus scripto. Quod si post purgationem p. stomachū suum adhuc sentiat repletum fore prouocetur uomitus cū his quę in cap. de uomitu prouocādo scripta sunt. Post purgationem nel uomitū si adhuc febris durauerit, ante horam accessione detur mithridatum uel aur. alexandrina, uel adrianum & similia cum calida & iungantur renes cū aragon, cum marciaton agrippa oleo laurino pulegino & similibus. balneum etiam quod in ca. quartana dicturus sum corpore mūdicato antequā frigus eū inuadat intret: & ibi aliqua de dictis opiatu suscipiat. Dētur sibi electuaria confortatoria, sicut sunt diamargariton, diacalamētū, dianthos & similia. Comedat carnes hēdinas, phasianos, perdices, sturnos, minores aues: & hoc dico postquā ægritudo iam 13. diem transierit, & uirtus valde debilitata fuerit, alioquin si nirtus fuerit fortis & sufficiens usque ad statum & declinationem ægritudinis comedat solum farinam hordei cū lacte amig.

conditam amygdalatum colaturā furoris fen. & boraginis cum eodem lacte conditam, pira & poma grossa assata quando aqum in qua coquatur radix fen. misā bibant cū zuc. Cū uero in cōualescētia, fuerit uel cū ægritudo nimis protēditur & uirtus incipit debilitari, debemus dare prædictas carnes aures & pedes prædictorū cum scniculo & boragine coquinatas, oua surlia & similia, demus etiā uinum album & subtile, cū prædicta aqua lymphatū bibant.

De quotidiana notha: & primo de ea que fit ex phlegmate salso. Cap. XIII.

Quotidiana notha fit diuersis modis, quandoque ex phlegmate dulci, quandoque ex phlegmate salso & quādoque ex phlegmate acetoso. De phlegmate uero salso sapienter habet fieri, & sit quotidiana notha, in æstate, quandoque in autumno, quāque in nere. Vnde in quolibet tēpore anni pōt superuenire. Signa igitur quotidianę nothę de phlegmate salso factę sunt ista. Vrina ruffa uel subruffa mediocriter tenuis in principio nel mediocriter spissa in statu & in declinatione & nō liuens apparet. adest oris salisfeditio digestionis corruptio capitis dolor pruritus p. corpus uniuersum, & quādoque scabies, & maxime adest pruritus in inferioribus partibus corporis circa nodos & iuncturas. Pa. in nona hora diei in antea incipit affligi. primo rigore. de inde leuto calore, & maxime post; ad mediū noctē affligitur. Cnretur in hunc modum, sumat omni mane unc. 1. syrupi acetosi compositi de radicibus facti cū calida in quo misceatur unc. 1. zuchari ro. noui. post uero quintam uel sextam accessione materia iam digesta, prouocetur uomitus cū aliquo de prædictis uomitibus in cap. de uomitu dictis. Quod si nō fuerit facilis ad uomēdū cū oxy. catartico uel benedicta laxatiua purgetur, uel cū decoct. ista. recip. polypodij. drach. 2. agari. drach. 2. epibimi uio. an. drach. 1. se. fen. & anis. an. drach. 1. s. terantur hoc oia & bulliāt cū tribus lib. aqua quousq; ad unā redeāt, coletur & in colatna ponantur. dra. 2. mirabolano rubei citri. & drach. 2. s. zuchari, & sic per noctem iaceant in sinu. In mane uero colatura propinetur. Vel cum ista decoct. alia purgare poteris ad hoc optima, cum qua magister meus huiusmodi febriçiantes purgabatur. recip. scariolę scolopen, boraginis cap. p. an. M. 1. radicis petro. apii. an. drach. 1. florum uio larum & boragi. an. drach. 8. hordei mundi. P. 1. pruna. 25. coquatur omnia & bullcū tribus lib. aquę quonisque ad unam redeat, & colaturę addantur pulpę colloquid. cassię. an. drach. 2. zuchari uio. triphere saracenicę an. drach. 1. zuchari ro. nnc. s. reubar. drach. 3. polp mirabolano rubei citri. xeb. an. drach. 1. Quod si post purgatio

purgationē infirmos nō perfectē curatus fuerit & remanserit aliquid de typo ante horam accessions detur musa znea & mithridatōm Adrianum, efdra, uel aurea Alexandrina & similia, quia mirabiliter valent, dietetur ut in cap. de tertia notha dictum est.

De quotidiana qua fit ex phlegmate dulci.
Cap. V.

Phlegma dulce quandoque corrumpitur: & facit quotidianam, quę similiter notha est sicut prædicta. In hac enim feb. apparet urina rufā uel subrufa in substantia per totum spissa sicut in colore sanguinis obumbrata parum superius. Circa mediam noctem incipit affligere inter horas phlegmatis & sanguinis lento calore typum non debet habere, quia materia non est ita frigida & humida ut frigus inducat: nec ita cal. & sicca ut rigore inducat, nec ita frigida & sicca ut horripilationē inducat, adest oris dulcedo digestionis corruptio, & ciborū sup̄torū putrida & fumosa eructatio tāquam ex ouorū putridorū comestione sēt or nimius egestionū, grauedo capitis, sp̄ti & salinarum abundantia dulcis. Curetur sic, omni mane sumat oxymel uel syrupum acetosum de radicibus cum aqua deco. prunorū & marathri, farina hordei, lac amygdalarum, horago cum lacte amygd. cocta, asparagi elixi, lactuca, cicoreę elixar, mica panis lota, & huiusmodi exhibeantur. Cum uero materia fuerit ad expulsionem parata, quod fit in 3.4. die uel infra, detur hæc deco. recip. ca. uel scolopēdriz, cicoreę, ceterach, polytrici. an. M. i. radices squi, petrol. asparagi, brufci. an. M. s. agarici. drach. s. cuscute. drach. 3. radices hletę. drach. 1. niol. storum borti. an. drach. s. pruna damasce. 25. omnia in aqua bulliant, ut supra dictum est, & colaturę addātur pulpę cassiæ. drach. 3. tripherez sarracenicę, zuchari uio. ro. manę. an. drach. 1. mirabolānorum xebu. citri. cuti. 6. amygdalis dulcibus. drach. 3. Quod si post purgationem aliquid de tepido remanserit dentur aliquę opiatę ante accessionem, ut anrea, efdra, Adrianum, & similia.

De quotidiana de phlegmate acetoso. Cap. VI.

Cum itaque contingit phlegma acetosum putrefieri, & quotidianam notham in eo accendi, tunc eius urina apparet in principio mediocriter tenuis uel mediocriter spissa, cum appropinquat ad digestionem, & est in colore glauca lactea uel alba, parum in colore huiusmodi intensa, hæc enim feb. in sero incipit affligere inter horas phlegmatis & melächolę. Primo horripilationem cum lento calore. Phlegma enim acetosum proprietatē habet cū melancholia,

& ideo inducit horripilationem. Adest oris acetositas, capitis grauedo, indigestio uenteris, constipatio nēn. & lateris inflatio. Facies in contrarium mutat colorem, quia pallidior sit quā uatura esset. permutatio enim mali coloris non fit ob aliud nisi propter malam digestionē, & necessario sequitur malus color. Unde cū dico iste uel ille est male coloratus necessario sequitur quod male digerit. Cū itaq; in phlegmate acetoso excessine superabundante duę qualitates peccent principaliter. scilicet frigiditas & siccitas digestioni contradicentes, non est mirum si colorem in contrarium permittent. In hac ergo fe. primo ordinetur digestio nō nimis tenuis grossior tamen in hyeme quā in æstate. sarnā hordei cum lacte amygd. coctam spinachiā boraginē, lactucā, & huiusmodi cum prædicto lacte coctas, asparagos elixos, pullā parū perdicę & minores aues comedani, uinum subtile clarū, & bene lymphatum bibāt. Sumat quoque liber mane. nnc. 2. & s. huius syrupi cum calida. recip. radices asparagi, apii, brufci, petro. scen. an. M. 1. corticum radicum interiorum, sambuci, & ebuli. an. drach. 3. hordei mundi. P. 1. bulliat perfectē, & addito melle dispumato al. & zuc. an. fiat syrupus de quo omni mane detur ad quantitatem prædictam quousque materia sit digesta. Vel digeratur materia cum oxymelle liquillitico cum syrupo de radicibus, uel oxymelle factō de radice raphani in uino, in mulieribus uero detur quolibet mane mel cum aqua deco. radices fenic. Digesta materia, quod cognoscitur per anticipationem accessionis, uel per urinam mediocriter spissam purgetur pa. cum deco. ista. Recip. sene. thimi, epithimi, cuscute. an. drach. s. radices hletę, asparagi, brufci, fenici. an. drach. 1. hæc omnia in tribus lib. aque bulliant quousque ad unam redeant, & addantur colaturę pulpę cassię. & māue. an. drach. 1. s. tripherez sarracenicę. drach. 1. s. zuch. a. uio. & ro. an. drach. s. mirabolā. indorum emblicotū & kebulorum cum 8. amygd. dulcibus contriturum. an. drach. 1. hæc omnia per noctē insimul stēt. mane uero colētur & colaturę ad unius gobeleti quantitatem pa. detur in potu. Et si medicinā abhorreere uideretur, fiat ad hoc emplastrū supra stomachū & cætera in cap. de tertia notha dicta. Quod si cōstipatus fuerit eius nenter suppositoriū aliquod uel clystere fiat. Utatur etiam balneo ante cibum, in mane in quo possit sint rosę & flores camo. Et cum exiit sumat aliquod de prædictis opiatis. Exiungant renes taliū, & spina dorsī ex oleo laurino camolino & similibus cum butyro mistis, & hoc post bal. & huiusmodi inuēctiōes. Et datio aliquis opiatę fieri debet post purgationem, ante enim quā euacuatio fiat siue purgatio per naturam sine euacuatio non cōpetunt prædicta.

De quotidiana de phlegmate nitreo. Cap. XVII.

Quando phlegma nitreū ioducit quotidiana quæ similiter notha est: sicut & prædictæ: tunc urina taliū in principio morbi apparet alba glauca: uel alba cū gleba hu. apparet in ea un de in ipso dominio phlegmatis uitrei uel cū fe. uel etiā sine fe. urina apparet spissa & globosa. Cū uero iā aptopinquat digestio quotidie de die in diem attenuatur urina. Phlegma etenim in principio suæ dissolutionis calore existente debili dissoluitur in quadam frustula: unde red dit urinam discoloratam & spissam. In fine ue rō suæ dissolutionis calore in eo agente fortius tanquam in materiam subiectam in subiles & aquosas partes dissoluitur sine resoluitur, quæ urina admixtæ reddunt ipsam tenuem & mul tam. Cuius simile uidere possumus in niue quæ si soli exponatur in principio resoluitur in gros sas partes, calore uero solis in eam fortius agē te in fine resoluitur in partes subtiles: & hæc symptomata sunt in hac fe. Post tertiam horam noctis incipit inuadere. Primo adest typus: de inde sequitur calor lentus. Adest maxima extre mitatum frigiditas: & sentitur circa loca in quibus materia continetur, & etiam ibi sentitur tanta frigiditas: ac si ibi esset frustum glaciæ maximum ubi materia continetur, quod nimis onerat pa. adest maxima indigestio: & quan doque per uomitum: & quandoque per seces sum quoddam modicum in modum glaciæ uel uitri emittit: nimis adest intestinorum dolor & corrosio. Vnde quando Gale. huiusmodi passionem pateretur inquit: uidebantur inte stina quasi in eo quodammodo terebella perforari: sed clysterizatus sum ex melle calido: & emisit phlegma quale Caiagoræ uitreum ap pellauit. Curetur hæc fe. sic: non nimis tenuis dicta inungatur. Carnes pullinas: & mi norum auium, prædictum, sturnorum: phas ianorum: & huiusmodi similia: & comedant ole ra prædicta. Vinum odoriferum & clarum cū aqua decoq. radicis feni, & sc. eius bibant à prin cipio quolibet mane sumant nnc. 1. 2. oximel. conditi de radicibus raphani uel oximel. squilli tici: quod sic fit. Accipe squillam & mundetur & frustatim incidatur in aceto dimittatur per duos dies cum M. 3. de radice feni. apij: asparagij: petro. deinde bulliant prædictæ radi ces cum aceto & prædicta squilla: & addatur eis se. fen. petro. apij, auisi, & asparagian. unc. 2. & coquantur perfecte quousque tertia pars remaneat, deinde colentur & colaturæ addatur tantundem mellis dispumati & perfecte co quantur. Istud enim est oxymel squilliticum & compositum: quod ualde competit in his fe. Digesta materia, quod cognoscitur per urinæ attenuationem sicut superius dictum est,

& anticipationem accessionis purgetur pa. cū hieralogodion uel benedicta laxatiua cū aqua mediani corticis radicis sambuci, ebuli, loto riorum cologuintidæ. Et nota quod ista deco ctio est esperitissima in erraticis febribus, uel purgetur cum decoctione aliqua de supradic tis. Si uero dolor fuerit in ore stomachi pro uocetur uomitus cum aliquo de uomitiis in prædicto ca. dictis. Si uero in intestinis con rineatur materia fiant clystera acuta sicut est istud. recip. mal. mercurialis sensationum pari tærie orticæ uol. brancæ ur. radi. sambuci: ebu lian. M. 1. canabrij pugillum, idest addantur triphæz sarracenicæ. drach. 2. mellis & olei. an. drach. 1. 1. siliis pulueriza. nel usti. nuc. 1. Et in ipsa deco. addatur cucumagrestis, & malitæ ræ, & parum de turbit agario colloquiti da esula & hermodactylis: & utatur. magis acutum & magis forte clystere fiet sepe. Si dolor est in aliquo membro: & frigiditas inuagatur mē brum istud unguento aureo aragon, marciatō, oleo laurino, pulgegio, camomillino, & si millibus. Cataplasmetur locus cum patia ria origano calefactis infusum. Cum se. re cesserit detur diacalamentum, diamargation, uel diacymium cum uino decoct. pulgëij & origani. Galeniam quod in cura quartanæ ue ræ dicta satis est utile in hac fe. post corporis modificationem. Et nota quod in phlegmate nitreo siue cum fe. siue sine fe. semper debet ap parere urina discolorata propter frigiditatis ue hementem excessum.

De febre quartana nera. Cap. XVIII.

Februm quartanarum alia uera, alia ne ra, & notha dicitur. Vera quarta fit de melancholia naturali cum putrefit. Et fit magis in autumnio, sene, & melancholico per 24. ho ras affligit, & per 44. interpolat: magnus tre mor cum frigore fit in principio accessionis, ut ossa confrangi & distingi uideantur: sequitur calor leuis & non nimis acutus: & magis durat in tertia accessione. Pulsus in principio paruus & tardus & occultus adest, deinde uero magnus & plenus. Vrius in principio palida & tenuis pectorum, deinde citinescit & fit citrina & tenuis per totum. In fine uero resolutionis ipsius quartanæ quandoque emittitur: urina nigra & spissa, & hoc est bonum si in bona quantitate emittitur quia tunc signum est quod materia facies quartanam per urinam purgatur. Et si etiam durities splenis in quartana nera consue uir esse. Curetur quartana hoc modo. primo subtrahantur omnia cibaria grossum & uisco sum bumorem & melancholicum generatua si cut sunt pisces, lac, caseus, fæc, caules, carnes bouinæ, bubalinæ, scrophinæ, & similia. hæc enim

enim sunt maxime durationis causæ quartanæ. Vnde primo duntaxat omnia cibaria bonum sanguinem generantia sicut carnes pullinæ elixatæ, gallinarum, capreolorum, perdicum, phasianorum, hædorum, & huiusmodi coquinata & condita cum feniculo, boragine, trifolio, & & huiusmodi, & pulvere canellæ & zinzib. in parua quantitate potest super dicta aspergi: vitella ouorum mollia in aqua elixata: & panem triticum bene coctum & bene fermentatum comedant & recentem unius diei. Vinum clarum & odoriferum bibant lymphatum cum aqua decoctæ radicis feniculi, boraginis, scariolæ. In die vero accessions nihil comedant si abstinere possunt, vel comedant saltem in maturinis de prædictis ferculis & parum. Si enim potest abstinere à cibis quousque feb. incipiat declinare satis melius est non comedere quam si comedant. Ordinata dixit, quæ est satis potissima pars curationis secundum Gal. & etiâ Auij. dicit quod non omnis ægrotudo suo curatur contrario, sed sufficit quandoque solummodo bonum regimen in curatione ægrotudinis. Et ad alia remedia medicinalia recurramus. Prima igitur, ponam curâ magistrum mei ad quamlibet quartanam expertam, & in pluribus per experientiam vidi quos in breui spatio curavit hoc modo. ad materiæ præparationem ipse dabat quolibet mane de isto syrupo cum tepida. recip. succi endiviæ, succi boraginis, succi fen. omnium per se depuratorum. an. lib. i. succi pomorum dulcium lib. 3. pimpinellæ, lingvæ bovianæ, xalendulæ, lauendulæ, ca. ue. scolopendriæ. an. M. s. prædictæ herbæ bulliant inquam quousque tertia pars remaneat & colentur & collaturæ addant prædicti succi depurati, & additis zuechari lib. 3. fiat syrupus. Post purgetur hoc modo, dum materia digesta fuerit. recip. mirabolanorum ciliari. xebu. indorum. an. unc. a. uio. larum. unc. i. florum boraginis. unc. a. pruna sicca & lota. 30. omnia in infusum perfecte bulliant, & cum fuerint quasi decocta adde epithimi bortenensis. drach. i. bulliant tribus bullitionibus & tota nocte sub sereno resedant, mane vero coleatur, & addita. drach. i. penidiarum tepida exhibeatur. Item fiant pillulæ & dentur 3. vel 5. ante horam accessions per duas horas quæ. recip. pœoniæ, gētiânæ, callicoræ abfin. an. drach. i. myrrhæ, opposonacis, cœniæ, reæ maiore. camedreos, ca. mepitheos, fenel. lapidis lazuli. an. Scrup. a. conficiantur cum theiaca optima & rubea troscicata, an. & fiat pillulæ grossæ in modum ciceris parvi, & dentur quinque ante horam accessions per duas vel tres horas, quia miro modo valent. Ex prebatur magister meus in die accessions ante horam solū quinque pillulis parvis factis de optima theiaca & myrrhæ. an. & notabiliter valebant. In

die vero quicquid quilibet mane & sero dabat ad quantitatem castaneæ de isto elæctuario, quod charissimum inter cetera reputabat & nemini in scriptis unquam cedere noluit: quod, recip. carnum mirabolanorum citrinorum xebulorum indorum aga. niol. an. drach. 3. anisi reubarb. se. ca. ue. cupa. Quinisti, capparorū, galange, ligni aloes, epithimi bortenensis, nucis muscatæ, cardamomi, lapidis lazuli, salis gemmæ. an. drach. a. confice cum melle & zuecha. an. & deus ut dixi. Post purgationem vero mittatur in bal. aquæ decoctistarum herbarum per horam antequam inuadat enim frigus nel saltem pedes & crura in aqua decoctæ ipsarum calida teocantur quæ sunt istæ. recip. saluæ, sauinæ, rosmarinii, pulegii, serpilli, polycarij maioris & minoris, camedreos, camepitheos, origani, florum camomillæ. an. fasciculum unum, fomentetur & stuphet se bene in prædicta aqua. Et aliqua de dictis opiatissimis sumat, & hoc post purgationem fieri debet. Syrupus magistri Petri Vicentini ad quartanam expertus. recip. camedreos, camepitheos, fenel, thimi, epithimi, diptami. an. drach. a. florum boraginis & se. ue. an. tres partes radicis fen. petro. asparagi brusci. an. M. s. buglossæ, ca. ue. scolopendriæ. an. M. i. zuechari & mellis. q. s. deius ex eo quolibet mane. unc. i. cum calida. Digesta materia purgetur cum decoct. ista ad hoc experta. recip. thimi, epithimi, fenel, cuscute, ellebori nigri, camedreos, squinanti, siccados, se. fenel, anisi, petro. lupilli, cyperi buglossæ, fumiterre, radicis fen. apii, asparagi, brusci, petro. scolopendriæ, ca. ue. omnium. an. drach. a. hæc omnia in tribus lib. aquæ bulliant quousque ad octavam redeant, & colaturæ addatur mirabolanorum indorum. drach. i. s. xebu. drach. i. lapidis lazuli optimæ loti. drach. a. diatene simplicis. drach. i. zuechari ros. drach. i. s. detor calida hæc decoct. in maturinis prope diem nidelicet in anora vel parmanie. Quod si decoctionem sumere non potest purgetur cum his pillulis in quartana uera & notha expertissimis. reci. se. fenel, anisi, melonem, cucurbitarum. an. drach. a. interiorum colloquintide agerici. an. drach. 5. slipendulæ squinanti casisig. guio. ma. sticis, piperis albi, eusforbii lignial. melliloti, centaureæ. an. drach. a. antheræ asse. fetidæ. an. drach. 3. fenel, mirabo. indorum, xebul. cuscute, epithimi, lapidis lazuli, armoniaci. an. drach. 5. oleos. hepatici diagridii in pomo vel pasta cocti. an. drach. i. minus quaræ squille asse. drach. i. conficiantur cum succo absinthii addita aqua, modica decoctionis casto. & formetur pillulæ in modum orobi & detur. i. vel 3. vel 5. vel 7. vel 9. vel plus vel minus secundum virtutem recipientis. Vel purgetur cum paulino, vel bie rapigra Gal. vel theodoricon, empericon, vel hiera fortissima, vel cum pillulis de quinque generibus,

generibus uel cochijis, & his similibus. Troscisci optimi ad quartanam ueram, siue uotham post purgatiuonem dandi, qui ualent contra frigus febricitantium & extremitatum specialiter recip. hircos, succi eupatorii, absinthij, fumiterre. an. drach. i. semi. apij, anisi. feui. su. scrup. i. salisgemme. scrup. i. & graua. 4. fe. cicuta, & cebu. an. drach. i. agari. drach. i. s. ro. rub. scrup. 4. succi liquiritie spice. an. drach. 2. spodi. eupatorii. an. drach. 2. turbit. drach. 3. cunctuantur cum bono uiuo, uel cum succo fe. & fac trosciscos, quorum quilibet ponderet. drach. i. des uiuum cum pauco bono uiuo albo agere horam accessionis in qualibet fe. cum frigore, quia miro modo ualent contra frigus quartanæ & etiam quotidianæ, continuæ, uel interpolatæ. Experimentum quoddam remouendum infallibiliter frigus quartanæ accipe drach. i. s. bonæ theriacæ & misceatur cum drach. i. succi menthæ communis depurati, & cum unc. s. boni uini puri albi & odoriferi, & detur hæc mistura ante horam accessionis per duas horas. Et de eo quod in fundo cyathi remanserit inungatur os stomachi, quia mirabiliter ualet contra frigus ipsius quartanæ. Item si sumantur scrup. 4. mithridati cum drach. 2. succi plantaginis depurati ante horam accessionis remouet infallibiliter quenslibet typum quartanæ. Item, drach. 2. succi radicis tapsi bar. mistum tantumdem boni uini albi puri & odoriferi in potu date quartanarios liberat omnes ad plus infra tertium del quartam accessiuenem. Et hoc sum expertus in me, & in pluribus alijs quartanarijs. Item os de corde cerui puluerizatum & in potu datum cum nino decoctionis diptami, saluæ, camepitheos, camepitheos ante horam accessionis bibicum mirabiliter ualet. Item pul. tartari & blasticæ bibantur: & pul. de cornu cerui qualitercunque hæc omnia, uel aliqua eorum data in potu ante horam accessionis ualent. Item theriaca cum uino decoctionis maioranæ ante horam accessionis bibira, & succus hiaræ ante paroxysmum naribus immisus miro modo ualet. Item oleum rutaceum per os & nares infusum in principio paroxysmi, & statim sumat in potu pa. unum grauum musci cum uino puro odorifero, & albo optimo tollit quemlibet quartanæ typum infallibiliter. Vnguentum expertum in qualibet quartana tã nera quàm uotha: & iurauit mihi magister Heðos Anglicus se cum hoc unguento quæ plures quartanarios curasse: quod Rec. succi abrotani, succi rutæ, arthemisiæ. an. drach. i. olei communis, drach. 2. olei laurini. drach. i. omnia in simul lento igne bulliant quousque succi consumantur. & adde tunc drach. i. aceræ liquefactæ nouæ & fac unguentum, de quo unguento per unam horam ante accessiuenem inter duos ignes inunge renes,

& spuiam dorsinam usque ad caudam ciura & splenem umbilicum & uentræ & plantam manus sinistrae & pedis sinistrae, pulsus & tympana, & statim collocetur in lecto, & bene cooperiatur dato aliquo succorum prædictorum in potu cum uiuo odorifero, & hoc pluries fiat, quia pro certo in breui curabitur quartanarius, & specialiter si præcesserit uniuersalis purgatio. Aliud unguentum ad idem, de quo simili modo loca prædicta inungi debet. recip. succi quercule maioris, succi matricariæ an. cyathum unum, misce cum azungia porcina & oleo communis an. & bulliant in simul usque ad succi consumptionem, & tunc ad misce mastice & olibani puluerizatorum an. drach. i. ceræ & salis communis an. drach. 3. inungantur prædicta membra & fricentur fortiter membra hoc unguento sic per totum quoddam quasi nigredo uideatur per membra pa. Et postmodum collocetur in lecto, & fiat ut supra. Et fiat hoc unguentum in qualibet quartana expertum quod utebatur magister Petrus Maroni de Salerno. Aliud unguentum quod utebatur magister meus ad idem recip. castorei theriacæ. an. scrup. 5. myrrhe laurini. an. scrup. 4. musci ambræ. ana. scrup. i. cunctuantur cum lib. s. mellis despumati, & de hoc inungantur stomachum cum incipiunt frigescere plantæ manus & pedis sinistrae simul & tympana & pulsus & frons similiter, quia hoc unguentum est expertum in prædictis. Et fiat statim duo stuelli de pannu uel bombace, & in prædicta mistura intingantur & statim naribus intro mittantur. & hoc fiat iuxta bonum ignem quo facto statim sumat pa. in potu. drach. i. de bona rubea troscifera cum bono uiuo albo, & statim panis mundis calidis optime cooperiatur in lecto, & ad minus fiat in qualibet accessione in tribus uel quatuor, quia pro certo hoc solo infra tertiam uel quartam accessiuenem ad plus magister meus quartanarios curauit. Quidam etiam Gallicus iurauit mihi, & erat homo fide dignus, quod amplius quartanarios cum hoc emplastro curauit. Recip. faris tritici eribratæ, thuris masculi siue albi puluerizati. an. drach. 2. temperentur cum succo menthæ, fiat inde emplastrum, & supra petiam ante paroxysmum tepidum applicetur a primo spondili spinæ usque deorsum supra caudam, & tandiu ibi remaneat quousque per se cadat, & tunc pro certo liberatus erit, ut dixit mihi & iurauit ille bonus homo Gallicus, cui non fuisset officium boni & probi uiri mendacia in damnum proximi dicere, eo maxime quia ubi tractatur de humanorum corporum salute, & conuerso de mortifero medicamine seu non bono non potest esse quin de exhibentium animarum damnatione tractet, & uere dixit in se & in pluribus, hoc experimentum probasse. Tameu nota quod huiusmodi

huiusmodi emplastrum & unctiones prædictæ maiorem habent efficaciam si fiant corpore purgato, quàm si fiant corpore repleto. Qui dam dixit mihi quòd passus fuit quartanam se re per annum, & quamplures curæ sibi factæ fuerant, & non potuit liberari. Cum autem quadam die in vadere inceptat eum se. erat eques bene armatus & inuasetunt eum inimici sui, sic quod oportuit cum eis præliari, & transiuit horæ accessionsis durantiæ prælio, & sic liberatus est, & non habuit amplius quartanam. Vidi quendam quartanarium qui in prius paroxysmi iactatus fuit in quodā paruo flumine eo ignorante, & propter illum timorem quem habuit liberatus est. Vidi etiam quendam aliū apud quem factū est quoddam artificiale tonitruum in principio accessionsis, qui iurantium timuit quòd liberatus fuit. Vnde nota quòd hæc feb. multoties propter timorem expellitur, & specialiter quidō est in declinatione, multi etenim decipiuntur medici in hac feb. curanda, & specialiter nisi sint bene solliciti circa ipsam curam, & quandoque etiam eum tota eorum sollicitudine & studio ipsam quartanam expellere nequeunt, & propter hoc quartana vocatur à quibusdam uisuperium medicorum. Quidam eum medici sunt qui in hac feb. semper assint cum purgationibus non attendentes circa alia particularia experimenta, & unquam ueniunt ad finem curationis ipsius egritudinis. Si quis igitur secundum infra scripta experimēta processerit Deo auxiliante in breui ipsam quartanam de possessione corporis quod inuasi sit cito tantum indigne, & indebite possidentem eiciet sine dubio, & eam perfecte curabit. Aliud ad idem. recip. myrrhæ electæ drach. 1. fiat pul. & cum theriaca quantum sufficit fiant pillule ad magnitudinem ciceris, & da quartanario quolibet die unam. In die accessionsis lōge autē horam accessionsis da quique. Ad idem recip. myrrhæ ad quantitatem ciceris, iere, & cum succo abstinthii & rutæ depurato ante horam accessionsis detur. Et si ex hoc soluiatur uenit optimum est.

De quartana uera non sine notha.

Cap. XIX.

Accidit quandoque choleram adultam putrefieri cum ipsa accenditur, & fit fe. quartana quæ non uera siue notha dicitur. Et tunc urinalium debet apparere ruffa, nēl subru, & tenuis, pa. de quarto in quartum diem affligitur. Primo rigore potius quam frigore uel tremore, calor acutus magis quàm in uera sequitur, pulsus uelox & spissus, & litis quæ consuevit in tertiana uel aliqua acuta esse in hac feb. adest. Si materia quartanæ est in stomacho ab ipso prin-

cipio cum incipit paroxysmus est dolor stomachi. Et tunc cura istius quartanæ est prouocare uomitum in principio paroxysmi id est antequam incipiat cum aliqua medicina uomitiua. Si uero materia est in intestinis, est dolor intestinorum & tortio, & cum incipit paroxysmus egestio pauca emittitur, sic quòd multum sunt constipati, & hæc paritum per clysteria acuta, & paritum per medicinas laxatiuas dictas superius curatur. Si materia fuerit in hepate pa. huiusmodi quartanam urina accedit spissitudinem & ad nigredinem. Et hæc per prædictas purgationes & per urinam prouocantia curatur. Et si grom quartanæ cuius materia in specialibus cōiunetur est, quòd ampullæ appareant in superficie nrlæ & litis non de facili eorrigitur ea potu. Quòd si materia quartanæ fuerit in splene ab ipso principio adest durities splenis, & etiam in principio paroxysmi sentit pa. punctiōem & dolorem in liuistro latere circa splenem. Et per purgationem & medicinas & inuunctiones in præcedenti capitulo, & in cap. de uitio splenis dictas curatur. Cura etiam quartanæ nothæ est quòd ordinetur dicta in quartana uera dicta, & eodem modo regantur isti sicut & illi. Postea in digestionē materiæ detur pa. quolibet mane. unc. 1. s. de oxymelle composito cum radicibus raphani. uel solum cum oxymelle composito uel osizaccara composita, & dentur hæc cum decoctione florum boraginis & scniculi. Cumque materia ad expulsiōem parata fuerit purgetur pa. cum decoc. ista. recip. cap. uen. scolopendrie, ceterach. polythrici, & dianthos. an. M. s. radicis seni. petro. a. paragi, apij, brusci. an. drach. s. se. se. & anisi, fene, thumi, epithimi. au. drach. tertiam. uiolatum florum boraginis. au. drach. s. se. communium. drach. 3. prana damasc. 3. s. hordei mōdi. P. 1. reupontici. drach. 1. hæc omnia bulliant in lib. 3. aquæ quousque ad unam redeant, & colentur & colaturæ addatur mirabolæ norum citrinorum & indorum. an. drach. 1. s. & quarta para. drach. uuius reubarbari puluerizati, quod prius iaciuit per diem in succo apij depurato, zucchari uiol. & ro. au. drach. s. Et si fuerit de phlegmate adusto adde agarici. drach. quartarium. uel purgetur eum oxymelle laxatiuo, uel cum catartico imperiali, uel cum triphera sarracena. Syrupus etiam diaquilou detur in potu. Et si pa. fuerit fortis complexionis etiam sanguineus multum celebretur sepius minoratio. Et si de phlegmate fiat quartana uerba uel nera, cuius signum est quòd urina apparet alba & spissa, & trigus maximum adest & multum durans, calor uero non durans, tunc huiusmodi feb. ut uera quartana, uel uera quotidiana curatur, hæc tamen species quæ quæ sit de phlegmate cum difficultate & uera quartana, & etiam ea quæ sit de cho-

lera

lera adusta curantur. Vnde si medicus procefferit ad curam earum secundum superius scriptam doctrinam liberabit eos.

De febribus erraticis. Cap. XX.

Conſueverunt aliquando in quibusdam hominibus & mulieribus, & ſpecialiter in autumno ſe. accidere, quæ erraticæ ſeu planeticæ nuncupantur, eo quod certum terminum acceſſionis non ſervant neque certum numerum in acceſſione habent. Interdum enim mane uſque ad tertiam, uel meridiem, uel in ſero, uel in galli cantu, uel in media nocte pa. affligunt bis, quandoque quater uel ſæpius, quandoque ſemel, quandoque nullo modo affligunt pa. & poſtea incipiunt, & nullo ordine ſervato procedunt. Funt enim ex phlegmate melancholia uel cholera ſimol mixtis in aliqua parte corporis, & ſpecialiter in autumno, ut diſi. Et frequenter mutantur in quartanam, quia reliquis humoribus pro maiori parte conſumptis, quod remanet ſumit melancholicæ habitudinē, & facit quartanam. In primis in huiusmodi feb. ordinetur diæta nō multum tenuis nec multum groſſa. Poſtea dentur omni mane uel die unæ. 1. oxymellis compoſiti, uel de radice raphani facti cum aqua calida. Poſtea euacuetur humor cum aliquibus quæ choleram phlegma & melancholiam euacuant, ſed magis apponantur de reſpicientibus melancholiam, ſicut eſt laſis lazali, ſene, thimom, & epithimom, & huiusmodi ſecundum quod ſcriptum eſt ſuperius in cura quartanæ uerz, ubi ſcripta eſt decoctio ad hæc optima. Dentur etiam quandoque ſibi pilulæ factæ ex galbano, caſto. ſiſeleo. peonia. an. drae. 2. aloes hepatici, uel ſucco citrini. drach. 3. informantur cū uino & malaxentur cum oleo laurino, & ſiant groſſi in modū ciceris, & dentur 5. uel 7. bis uel ter in ſeptimana in ſero. Et ſi frigore moleſtetur poſt purgationem, bal. quod in cura uerz quartanæ ſcriptum eſt ſatis, eſt utile & mithridatum, muſa znea, aurea. hel. dra, & ſimilia cum uino calida dentur. Et ſi etiā de dolore capitis conquerantur poſt purgationem, detur etiā rubea troſcificata. Et nota quod in hac paſ. non eſt utile uſum cum purgationibus inſiſtere, niſi pa. ex uſu habuerit.

De quotidiana continua. Cap. XXI.

Quotidiana eſt febris de phlegmate putrefacto intra uafa, cuius ſigna ſunt hæc. Urina ap. parer ruſſa nel ſubruffa, & æqualiter ſpiſſa non manifeſte, ſed cum mannis appoſitione parum liuens & inæqualis, quia quandoque fit fortis, & quandoque debilis, facies tumida, & ſubal. bida, ſitis modica aut nulla, & habet. 1. 8. horas

in ſummo labore, & 6. in falſa quiete. Et nullo frigore ſeu rigore moleſtatur infirmus propter totius materiei poſitionem intra uafa. Et per hoc à laborantibus minori emittitq. differunt. Subueniendi ſunt illi, & ſunt curandi quemadmodum pa. minore emittitq. in diæta, & in omnibus. Excepto quod in minori emittitq. euacuamus phlegma & choleram. In hac uero ſe. principaliter inſiſtendum eſt cum euacuantibus phlegma, ſicut decoct. agarici, poly. podij, turbethi, mirabo. xebu. & huiusmodi ſecū dum quod in cap. de tertianis interpolatis ſcriptum eſt. Suppoſitoria & clyſteria etiam ſunt phlegma educuntia. Et ſi ſiant ſtupidi ſiant fricationes, & alia huiusmodi in cap. de lethargia diſta. Diætentur ſimili modo ſicut pa. emittitq. minorem. Et ſi nimis debiles fuerint detur pulla cum hordeo, uel ſuccenſcis. Quod ſi appetitus in eis deficiat quod ſæpe accidere cō ſuevit in illis pro uocetur hoc modo. Panem aſſum in aceto inuſum odorent calidum. Et falſam ex prædicto pane in aceto aſſo inuſo, & mentham in ore teneant. Et ex ipſa falſa fricetur manus eorum & pedes. Item caſeus, maſtis, & oliuæ cum oleo ro. in teſta oui bulliant ſupra ignem. Et ex his inungatur ſtomachus pa. Et alia remedia in cap. de defectu appetitus diſta ſi fuerit neceſſe in hac cauſa ſiant.

De quartana continua. Cap. XXII.

Continua quartana eſt feb. quæ fit de meli cholia putrefacta intra uafa tantum, & habet 3. 4. horas in ſummo labore, & 4. in falſa quiete. Et fit ſine frigore & rigore, pulſus in initio eſt paruus tardus & occulens, poſtea magnus & plenus. De urina enim non datur certa regula in hac feb. quia diuerſimode mutat urinam. Sed certius ſignum per quod potes eam cognoscere eſt illud quod diſi, uidelicet quod torhoras habet in ſummo labore quot & uera quartana, & tot habet horas in falſa quiete, quot quartana uera habet in nera quiete. Similiter quotidiana tot horas habet in ſummo labore quot quotidiana uera interpolata, & tot horas habet tunc in falſa quiete, quot ipſa quotidiana interpolata in uera quiete. Similiter & tertiana continua tot habet horas in ſummo labore quot & tertiana uera in ſummo labore, & etiā quot habet horas in uera quiete tertiana uera, tot habet horas ipſa tertiana continua in ſummo labore. Vnde in continua quartana nulla eſt quies. Similiter in quotidiana continua, & etiam in tertiana continua. Sed quartana etiā fortis affligit de quarto in quartum, & tertiana continua fortius affligit de tertio in tertium, & ſic de alijs. Conſuevit itaq. quartana cōtinua multoties uſq. ad 40. diem & ultra perſiſtendi,

teudi, & tunc nō debemus infistere nimis cum subtili diata cū sit chronica ægrotudo. postquā iam 14. diē transiuit, q̄a ut ait Hipp. aph. 23. secundæ particulæ. Acutæ ægrotudines in 14. diebus iudicantur. cum aut 14. diē transierint iam nō nominantur acutæ, sed chronicae. Cum itaque alibi dicat Hip. aph. 5. particulæ primæ. In tenuibus diætis peccant &c. Et tenues & ceteræ dixit in diuturnis ægrotudinibus & acutis quibus oon conueniunt &c. ut ait Hip. aph. 4. particulæ primæ. Ex ideo ab ipso principio det farina hordei, præsana colata, fursur, oua mollia, & huiusmodi similia cum lacte amygdalatum condita, pruna elixa, succus malorum grauioratum & huiusmodi. Cum uero ægrotudo transierit. 14. uel 20. diē, & uirtus incipiat bilitari debemus pullam & succum eius, & carnes minorum auium & huiusmodi similia dare. Clysterietur cum clysteribus in quibus educitur phlegma & melancholia ponantur, si cut est hoc. recip. polipodii agar. turbith, sene, thimi, epihimi, culcure, cenauræ minoris. an. drach. 1. colloquintidæ tritæ. drach. 2. rad. ebulli & sambuci. an. drach. 4. radices cucu. agrestis drach. 2. fursuris, se. liui & fenugræci omnium an. p. 1. salis. p. 2. hoc omnia decoquantur quousque solum tertio. pars remaneat in fundo cā cābi, & colaturæ addatur mellis. drach. 1. olei. drach. 2. triphera sarracenicæ. drach. 2. cassiæ. drach. 1. 1. benedictæ laxatiuæ. drach. 1. siat clystere hoc sepius. Vel soluat uenter cum decoq. quæ educit phlegma & melancholia quæ scripta est in cap. de quartana uera, uel cū pilulis uel electuario ibi scriptis, uel emplastrū laxatiuum super uentrē ponatur. In hoc enim loco emplastrū laxatiua & unguenta laxatiua, quæ in locis diuersis habui dispersa simul aggregabo. Emplastrum laxatiuum quodd si supra uentrem ponatur, & ibi per noctem teneatur uentrem soluit in hac feb. & in omnibus aliis ægrotudinibus in quibus est uentris consumptio competit, & specialiter materia digesta. recip. cistareæ, gith. absinthij, farinæ lupinorum, an. drach. 1. masticis. drach. quartam. aloes. drach. 2. conficiantur cum succo absinthij, & hac emplastrum, & tepidum supra umbilicum & uentrem apponatur. Aliud ad idem. bulliant in oleo communia aloes cicorini. drach. 3. & fiat in modum unguenti, & tunc pul. polipodij, & turbith. admisceatur, & supra uentrem totum emplastrum. Aliud emplastrum laxatiuum expertum si supra uentrem ponatur, & ibi per noctem teneatur, mirabiliter laxat & cohibet, ut multoties Ma. me. in hydropicis, spleneticis, & in omni ægrotudine repletionali, & in puris hydropicis, & aliis quæ non sunt apti ad capiendum medicinam. recipit adicis ciclamini. drach. 1. radi. cucu. agrestis & foliorum eius,

an. drach. 1. fellis taurini uel uaccini cyathos. 3. colophonig. ellebri albi puluerizati. an. dra. 2. cere. drach. 5. olei ueteris drach. 4. omnia diligenter teratur & liquefât, & in unum corpus conficiantur in modum unguenti, & inspissentur, deinde supra pannum huiusmodi emplastrum extendatur & supra uentrem calidum apponatur, ita ut totum uentrē ab umbilico inferius, & etiam parum superius cooperiat, & ponatur in gallicantu. deinde pa. iū lecto sup quiescat, & sit bene munita a frigore, plus enim soluit quam catarticum. Et cum usque ad 10. assellas soluerit, tunc pa. iuxta focum in mansione calida collocetur & diligenter totum emplastrum de uentre suo radatur, ita quod antequam ab aqua uenterrangatur sit bene rasum inferius prædictum emplastrum, & uenter cum panno optime sit absterfus, deinde uenter ungatur ex melle. hoc fiat huiusmodi hydropicis ictericis & spleneticis, & similibus his semel uel bis in septimana si uirtus sufficiat quousque sint perfecte curati, quia expertū est. Aliud unguentum laxatiuum quodd solum sit ex felle taurino oleo & saligemma infusum mistis. Vnguentum aliud laxatiuum. recip. saluæ bene tritæ. Ma. 1. ellebori. drach. 1. olei. drach. 3. omnia bal. in uino albo prius trita bene quo usque uinum consumatur, & sit tanta quantitas uini quod superna et saluæ, post coletur cum uinum fuerit consumptum, & colaturæ addatur masticis, ellebori al. aloes an. drach. 1. omnia puluerizata, & in uinum confecta simul incorporentur, & addita pauca cera liquefata fiat unguentum, de quo uenter ungatur & petia superponatur. Ex cum restringere uolueris ducatur pa. ad bal. uel saltem iuxta igitem, & radatur optime emplastrum a uentre & inungatur uenter ex melle calido, deinde aspergatur super ipsum mel. Emplastrum aliud quod multoties sum expertus quod si supra uentrē ponatur celeriter soluit. Si supra stomachum uomitus prodecat. Si supra reuera urinam pro uocat. Si supra pectus mulieris fetum mortuum educit. Sed caue statim cum operationem suam ad effectum deduxerint quodd ipsam statim remoueat, quia nimis educere possent. Et magister Henricus Anglicus Neapoli cōmorans dixit mihi quod in his omnibus hoc emplastrum erat expertum, & nunquam ibat sine eo & sic sit. Recip. laticinij drach. 1. cathaputiarum, interiorum colloquintidæ succi tithymali, an. drach. 6. succi cucu. agrestis, ellebori nigri, terebentinæ, an. drach. 4. cocognidij drach. 1. laureolæ, drach. 2. succi malicoræ. drach. 6. scā monæ. drach. 3. omnia puluerizentur, & cum melle simul conficiantur & usui relectentur: quouiam hoc emplastrum ad omnia prædicta est expertum. Vnguentum aliud optimum laxatiuum

tium quod ualet lispidosis cōstipatis nephreticis, iliatis, & hydropicis supra pectinem & uenter inunctum. Et cum inungere uolueris caueat sibi pa. quod non comedat nisi primus. 6. horz transeat. recip. succicucn. agrestis, succi interiorum squillaz, radicia anabulaz, succi mali terraz, succi radici ebuli, succi radici corticum medianorum sambuci, lactis tithymalli, chimoleaz. an. drach. 2. niol. succi cucu. agrestis. & pomorum eius, camomillaz, succi mercurialia, succi radici polypodii, succi herbz catapuciaz, laurolaz, cap. ve. an. drach. 2. diadij. drach. 1. s. nncis indicaz. drach. 2. euforbii dra. 1. fellis tanari, aloes hepatici, uel succotrin. ana. drae. 2. omnes supradictaz herbz in mense Maij colligantur & conficiantur sic, succo catapuciaz cum lib. 3. olei. 7. diebus misce. octauo nero die tan diu coque donec succorum quantitas consummetur, & tunc adde cerz al. drach. 1. & fellis tanari, & semper agites donec fel & cera liquefiant postea pul. terendorum addatur & usui referuetur. Et hz de unguentis & emplastris laxatiua in hoc loco ad præsens sufficiant.

De febribus pestilentialibus propter aeris corruptionem factis & de regimine sanorum in pestilentia obseruando. Cap. XXIII.

ET quia quandoque contingit aerem corrupti & morbo pestilentiali sibi generari ubi hæc corruptio aeris fit. Ideo de huiusmodi aeris corruptione agamustā in sanis quā in ægris utilia aliqua aggregantes. Isti enim morbi ut plurimum sunt in fine æstatis, & in principio autumnū, quorum signa sunt hæc. aliquando in eadem die minatur pluuia per tonitros & coruscationes, & quandoque per tempus nebulosum & non pluit, apparent in aere uelut ignes rubicundissimi, multiplianitur animalia ex putredine generata, sicut sunt formicæ alate, muscæ, & huiusmodi apparer, & apparent supra terram modi mirabiles animalium & serpentum quæ fugiunt a locis suis propter uehementem aeris corruptionem, auct etiam quæ quandoque de die nolare consueuerunt de nocte quandoque nolant & dimittunt nidos suos & ouas, & non fiat uentus aliqua, aut fiat auster, & tunc est signum quodd pestilentia est ibi propinqua. Cum itaque hæc se. fuerint alicui homini uel multis hominibus insimul in principio nō uidetur multa caliditas & acritas in huiusmodi ægrotantibus, neque multum calidi sentiuntur cum tangerent huiusmodi infirmi cum oculis & corporis partibus & ipsos profunditate maximam lateat noucumentum eis ipsius aeris corruptione generata. sunt enim huiusmodi feb. ualde lentæ & deceptoriz, & sentitur in eis anhelitus ualde fatidus & egestio etiam ualde

fetida, & omnes superfluitates quæ ab eorum emittuntur corporibus, sitim maximam & dolorem & angustiam in spiritalibus patiuntur, & eorum anhelitus augetur, quandoque cum uomitu & egestione aliquid ualde spidum & durum emittunt, deinde aliquando eis superuenit syncopis & subito moriuntur. Vnde propter huiusmodi accidentia reputantur periculosissime & periculosissime huiusmodi feb. Primū itaque & totius consilium quod possit in huiusmodi egritudinibus exhiberi, & etiam sanis est hoc. uidelicet, quod statim cum appareant signa pestilentiz superius dicta fugiant in continenti ab illo aere tam infirmi quam sani, & ad alia contractas tendant seu poterint sic commodè fieri potest. Quod si ad prædicta loca sana commodè se transferre non possint forte propter maximā discrimina, uel propter alias causas contradicentes, succurrat prædictis se. in hunc modum. Aer uolus particularis cameræ alteretur, in qua sit infirmus & infrigidetur hoc modo. recip. foliorum myrtillorum lib. 1. s. sandalorum alborum & rubeorum. ana. lib. s. ros. lib. 1. bulliant omnia hæc in aceto & aqua, & deinde ex ista decoctione parietes & pavimenta cameræ irrorentur, herbz frigidæ, siue sunt frondes saliciz, canarum uitis cymbalariz uermicularis, & huiusmodi per domum sternantur, uel ex solo aceto fiat hæc. Et 15. uel 20. spongiz marinz locz in aqua dulci & extortæ circuncircā parietes, cameræ aceto forti repleat suspēdantur uel in prædicta decoctione infusa, hæc enim fortia sunt in rectificando aerem. Aqua etiam frigida per camerā in modum riuuli ducatur uel eorā pa. distilletur, & eorā eo uentiletur aer quotidie cum flabellulo, quia ex tali uentilatione per motum flabelli facta putrefactio aer & prohibetur ipsius aeris putrefactio. Aqua ros. multoties in die super faciem eorum aspergatur. Syrupus acetosus uel oxizaccar, & syrupus etiam ros. & nemusari. cum pauca camphora aromatizati cum frigida in potu tribuantur pluries inter diem & noctem. Farinam hordei comedant, amygdalas, cæra, scariolas, lactucas, & similia cū pauca grella, uel aceto, uel cum succo pomorum citrinorum conditas, postea in aqua elixas. Et si uel intra modum fuerint debiles succum pulsz, ubi fuerit parum de agrestis, uel de prædicto aceto demons eis. Pomum etiam istud semper odorant quod optimum est pro sanis, & etiam pro medico, quia mirabiliter ualet contra putrefactionem aeris, recip. drach. 1. camphoraz pulz sandalorum. alb. & rub. an. drach. s. ros. drach. 1. s. foliorum myrti, & sem. eius. an. drach. 2. auris myrtis. an. drach. 1. laudani. drach. 2. aceti fortis. drach. s. gummi arabici. & dragagani. ana. drach. 1. resoluatur omnia prædicta in aqua

aqua ro. & ex his sic resolutis pomum vñu
conficiatur quod de manu in manum sepe
mutetur. Odorent infirmi necnon medicus
etiam cum vadit per terram vitando infir-
mos: quia multum confortat, & inhibet ae-
rem corruptam. Pomum etiam citrinum, ne-
russa, & similia odorent. Aliud pomum o-
pprimum, & expertum quod si odoretur, &
specialiter a sanis hominibus mirabiliter p-
seruat corpus illud ab omni aeris patro-
fusione pestilentiali, & corrupto ab omni fe-
tore, letitiam generat, & confortat spiritus,
& totum corpus in sterilitatem facit conuer-
ti. Rec. ambre musci laudan. ana onc. j. ga-
siosilo. cinamomi alipre muscat ana onc. iij.
gumi arabici camphore. ana pondus vnum,
omnia hæc puluerizata cum aqua rosata si-
mul ad ignem dissoluantur, & in corpore-
rat lasimus, ex quibus omnibus pomum co-
ponas ad libitum perforatur, vel non perfo-
ratur, & odorandum exhibeas non febrici-
tanti tamen, quia in sanis magis valet.
Suffumigatio optima valens ad omnia prædi-
cta ad quæ valet pomum, & specialiter in sa-
nis loquor. Rec. ambre musci. ana onc. j. ai-
loaloes. onc. vi. camphore. onc. iij. fiat hoc
modo, ambra prædicta ponatur in vase pul-
chro, & nitido supra cineres calidos & cum
parum aque ro. agitur diu donec inspisse-
tur, deinde apponantur dicte species cribra-
te subtiliter, & moueantur, & coquantur ve-
dum fiat in modum marmoris, sic quod
proiciatur supra marmorem oleo inuncto,
& usui referua, quia fumus eius receptus in
pannis, & in corpore super carbones acen-
sos valet magis quam credi possit. Conser-
ent in tempore pestilenti miro modo sa-
nis, & etiam infirmis; huiusmodi enim su-
bus epilepticis, & cardiacis. uariis, anri-
bus, & ori ferentibus, putridis dentibus, &
gigiuis, coitum prouocat, stomachum con-
fortat, & ad omnia ad quæ prædictum pomum
valet, & istud sumigium similiter valet, & ad
alia quam plurima. Syrupus continens
sanguinem ne ebulliat, variolas prohibet, &
etiam sudorem compescit, & in aere calido,
& in tempore pestilenti valde utilis est. Re-
ci. succi malorum granatorum acetosorum
vve acerbæ. ana lib. vi. castaneorum munda-
rum, aque rosate. ana onc. iij. succi poly-
trici, & aceti acerrimi. ana lib. vnam. Ma-
lorum acrim, & malorum cydoniorum,
ana lib. vnam. coquantur omnia cum libris
quat. sci zoechari, & fiat syrupus, &
quod die vñtur eo infirmi & sani, quia
ad prædicta omnia miro modo valet & effi-
cax est.

Quod si pestilentialis aer ab inferioribus

insurgat ut ab apertione fossæ terre ut acci-
dit meis temporibus prope ierusalem ubi ce-
cidit in ruinam quidam mons, & exierunt
de illo monte serpentes quasi infiniti, & mo-
struosi, & corruptus est ibi in tantum aer, q-
omnes de terra quasi mortui fuerunt. Si
igitur a tali apertione simili modo confun-
gat aeris corruptio, vel forte a cadaveribus
mortuorum ut hominum, vel æquorum,
vel aliorum animalium putridorum in loco
aliquo existentium ipsum aerem inficiendi,
vel si forte a malis herbis corruptus sit aer,
sicut sunt ebull, sambuci, volubilis: succus
cicutæ, & huiusmodi herbe similes aut tinea-
ra sulfurea vel aluminosa, & hæc per visum
discernuntur, vel forte corruptus fuerit aer
a corruptione principali, & putredine a sub-
terraneis partibus procedente quod cognos-
citur per egressum diuersorum & monstruo-
sorum serpentum, & animalium de suis ca-
uernis excurant, & supra terram homini-
bus apparentium quæ sentiunt corruptionis
aeris ab inferioribus provenire, nec possunt
in suis locis esse, & sic fugiunt supra terram.
Tunc qualiterunque huiusmodi aeris cor-
ruptio secundum prædictos modos ab infe-
rioribus proveniat tutior via, & melior est
quod huiusmodi homines a prædictis locis
tam sunt quam egri labitare fugiant si com-
modè hoc fieri possit. Sin autem querantur
hospitia alta, & agitata a ventis, & senestre
sint aperte, & aer cum stibello verberetur,
& in frigidetur cum superius dictis.

Quod si ipsa aeris corruptio a superio-
ribus interatur, quod cognoscitur per vol-
latum animi contra naturam, quia aues quæ
de nocte volare consueverunt, volant de die
& econverso. & per signa alia in aere appa-
rentia quæ superius in principio huius capi-
dicta sunt. Similiter visio via est, quod tam-
fani quam egri a prædictis locis se moueant,
& querant sana loca. Si autem sint in locis
subterraneis, non per terram ambulent ni-
si prius aer per solem deparatus fuerit. &
accidit circa tertiam, & ab illa hora in an-
tea infirmi in prædictis locis subterraneis col-
locati sint, & senestre sint clausæ, & in frigide-
tur aer in ipsis. Et omnia supradicta remedia
sint in hoc conuenientia. Aque etiam recte
fiuntur distillando, vel saltem coquendo
eas, & postea in frigidari permittantur, &
& exhibeantur ut docet. Cauent sibi tunc
sani coitu, quia multum nocet in pas-
sionibus his membra principalia debilitan-
do. Et non ambulent per terram, & dico
nisi prius sol deparatus aerem. Et si ne-
cessitas cogat aliquando eos ire possent feri-
peria manu pomum aliquod de supradictis,

Vu & sem-

& semper odorent ipsum. tutius tamē est stare in camera in qua sit aer particulatiter aliteratur secundum q̄ superius docui. Dixerunt egi fecundum q̄ di si superius. Sanis vero hedina pullina castrina & huiusmodi carnes cum aceto: vel agresta paratę denrunt: quoniam declinare ad acetosa in hoc tempore est valde tutum. Et sint carnes quibus vtrūtur sani vel egi animalis sanissimi: & non egi. Si enim in prædictis animalibus fuerit pestilentia caueant sibi homines ab eis: quia huiusmodi carnes solum essent sufficientes ad pestilentiam inducendum: etiam si non esset præsens in omnibus eis. vtenibus. Vinū quanto plus fieri potest, fugiant: & si non clarum, odoriferum, & subtile sit, lymphetur cum aqua clara distillata: vel cocta: & infusitata: & declinent quantum plus possunt ad acetosa: vt dixi tam sani quam egi.

De feb. Empiala, & Liparia. Cap. XXXIII.

Sicut dicit Auicenna in libro suo quarto vbi de feiloquitur: & Serapio libro 6. cap. de Empiala: & Liparia fe. Empiala feb. fit de flegmate vtreo, quod est frigidius inter ceteras flegmatis species: quod aut vincit in toto corpore aut in membro vno: & illud quod vincit in toto corpore: aut putrescit totum: aut nō putrescit ex eo aliquid: & tunc ipsum generat in corpore frigus: quod non calefit, abique feb. Et si totum putrescit: aut putrescit extra venas: & facit feb. quę dicitur ephemerina habens periodos: aut putrescit intra arterias melericas, & venas: & facit fe. continuam. Si autem putrescit pars eius nominatur Empiala: & ipsa quidem facit interius frigus & calorem exterius. Et vrina quidem pa. Empialam est magnis tendens ad digestionem frigiditatis quam vrina pa. ephemerinam & magis cruda: & grossior ea: & pulsus est grossus superatus: & tardus: & rarus: & fortasse fit fortis omni die: & forte fit fortior in omni tertio vel quarto die: cum materia huiusmodi in corpore est, parua & parte putrefactionis ignea: & fortasse periodus est quatuor horarum: & quęque. q. & quādoque etiam quatuor horarum & fortasse plus secundum grossitatem materiei: & multitudinem secundum spissitudinem corporis: & grossitatem eius: & debilitatem virtutis: & temporum anni. Et hæc quidem fe, non permanet multum: quod est: quia fortasse moratur. 3. diebus: & fortasse super illud addit: & minuitur fe. Feb. aut q̄ fit in oib. 3. diebus: aut in oib. 7. aut in oib. 10. diebus. nō accidit nisi ex flegmate grosso: aut ex cholera nigra: & secundum quantitatem grossitudinis materiei, & eius spissitudinis, ex qua ge-

neratur procedit vehemētia periodi eius: & postponitur & vrina & pulsus & secūdū quātitatē materiei sicut dicit Serapio. cap. prædicto. Liparia vero est fei qua extremitates mebrorū: & qd̄ apparet ex corpore iufundatur: & adiutur in ea pfunditas corporis vtrū stomachi cū sit vehemētis: & cū asperitate linguę, & pulsus est paruus, & letus: vñ liparia cōtraria est Empialę. Iuxta illud. Semp in Empialia frigescent interiora. Exteriora calent, cedit liparia cōtra. Et materia huius egiuudinis siue fe. secūdū plurimū est flegmatica: & quādoque est cholericā ex cholera grossa. Sed vt simus solliciti in Empialia in prouocando vomitū demus Syropū acetosum cū calida: & secūdū Auic. cū aqua faholorū raphani atheni calamēti, & diuretorū. Et simus in eis ambabus fe. solliciti de facto valde in vomitu prouocando. & demus aquā seminū cōium: & prouocatiū vrinę, & potus infrigidantes, & stomachū mūdificantes sicut aqua apij & feniculi cū secanapino, & geleniabin: & cum fuerit digestio facta demus secūdū Auic. & Serap. infusionē de aloes: quā prædicti auctores in suis antidotarijs descibunt: qm̄ multum confert. Ex demus pillulas de eupatorio hierapigrā Gal. & similia. Secūdū Auic. & Serap. sicut camomilla: mellilotum: surfur modula carami, vtriat: cestan. minor anetū almuri & mel. comedant aquā cicorū: & mūri, & cyminū, & scilas, & alparagos: & feniculum cū oleo de amygdalis dulcibus condita, secūdū Serapionē pullos, perdices, & parua volatilia in campis, & nemoribus habitantia, vinū subtile: & odoriferū medicocriter lymphatibant. In practica vero rogerica dicitur q̄ in Empiala digeratur materia cum oximel lesequillitico: & purget cū hierapigra, vel cū hieralogodion s̄m descriptionē antidotarij particularis. Tercio die post purgationē fiat stupha cū herbis istis: scilicet calamēto organo mentastro ruta folijs lauri: camomilla mētha, salvia, rore marino, & similibus herbis calidis, & odoriferis, & cū erit a bal. teratur cum pauco, & ex hoc vnguento inungatur supra spinam, & renes, & stomachum. & circa brachia, & crura: & vmbis, quod sic fit. Rec. succi abūthij, feniculi, abrotani, balsamij, agrimonie, verbenę, anonc. ij. coquatur in oleo cūi, vel in oleo nucum vique ad consumptionem succorū, & additis onc. ij. cereę fiat vnguentum. Quod si pp hoc non fuerit egritudo iam dicta curata dētur opiatę sicut rubes troificata aureę, & huiusmodi cū apparuerint alices, & ofcitationes ter vel quater añ hori accessiois. Itē reiteretur p̄dicta purgatio. Denē ē electuaria calida sicut diacalamētū dianthos & huiusmodi. Itē fiat

fricatio in tibiis, & uentose circa spatulas, & renes apponantur. Scias uero quod liparia fit de cholera subcitrina putrefacta, & ex phlegmate, & melancholia in stomacho uel intestinis putrefacta accedit in ætate de tribus in tribus diebus periodus eius. Et primo superueniunt ei alices & oscitantes deinde rigor, postea frigus, deinde calor, & in medio caloris superuenit frigus intollerabile in interioribus. Et ratio est, quia dum putrefit cholera subcitrina pars trahitur ad cor, & facit ipsum febricitare, & pars trahitur ad flo-

macham & intestina, & dissoluit phlegma vitreum, & melancholiam, & ipsum calefacit, ut potest videri de Sole & glacie. Ex illorum igitur dissolutione membrorum interiorum sequitur in frigidatio. In principio igitur lipariæ confert geleuiabiu secundum Serapionem cum fecaniabin, & in fine infusio de aloë, & hiera pigra, & aqua fœniculi, & masticeis, endiuiz, apij, & troscilci de ros. Et vniuersaliter oportet ut regimen lipariæ magis declinet ad subtilitatem. Et hæc ad laudem omnipotentis sufficiant.

PHILONII

DE FEBRIBVS

L I B E R.

De diffinitione & diuisione febrium in generali. Cap. I.



FEBRIS est calor extraneus accensus in corde procedens ab eo mediante spiritu & sang. per arterias & venas in totū corpus, & inflammatur in eo. inflammatione quæ uocet operationibus naturalibus.

Hanc diffinitionē ponit Aui. in prima 4. c. 1. Et est bona, quia cōuertitur cum suo distincto & facit ipsum differre à quocunq; alio & cū hoc datur per genus & differēcias, Galenus in 1. apho. cōm. 16. Febris est calor naturalis mutatus in igneum. Aliæ multæ diffinitiones ponuntur ab alijs, sed pro nūc illa sufficiunt. Dicitur autem febris à ferueo ferueat, pro eo quia in totū corpus feruorem inducit & ebullitionem. Nunc autem sciēdam secundum Aui. in loco allegato, & secundum Gal. in mech. particula 8. in principio, quod tria fiūt genera febrium distincta penes tria quæ in eo corpore humano reperiuntur. Nam omnia quæ in corpore humano reperiuntur sub triplici genere sunt, quia aut sunt mēbra continentia, aut humiditates, aut spiritus sub quo ponitur, quod nunc naturalis calor, & fumi, & vapores. Et ista diuisiō intelligitur quātū ad res corporeas, non autem quantum ad animam nec ad virtutes nec cōplexiones & similia, quæ sunt incorporeæ. Si ergo inflammatur

spiritus primo & subiectiue inflammatione quæ manifeste nocet operationibus cōsuetis à natura dicitur ephimera ab ephimerō pisce, qui vltra 24 horas non uiuit, & eadem die, in qua suscipit spiritum uitæ moritur: & est generatus per viam putrefactionis, & non propagatiuus. Si autem aliquis de 4. hum. putrefiat, & inde fiat feb. primo & subiectiue, tunc dicitur feb. putrida humoralis, quia primo & subiectiue in hum. fundatur & radicalur. Si uero totum corpus inflammatur ex prima & subiectiua inflammatione cordis & mēbrorum radicalium corporis: tunc dicitur feb. ethica ab ethis græcæ, quod est permauiua dispositio latine. Autem autem comparat membra corporis radicalia parietibus balnei vel ollæ. Et humores corporis aquæ balnei vel aquæ bullienti in olla. Et comparat spiritus aeri balnei, vel vaporibus eleuatis ab olla bullienti. Subdiuiduntur ista tria genera febrium in suas species. Nam ephimera quædam est à causis primitiuis extrinsecus aduenientibus, ut est calor solis, frigus, & similia. Quædam propter actiones corporeas, ut motus corporis. Quædam propter actiones & animales, ut ira, & tristitia. Febris autem humoralis subdiuiditur: nam quædam est de sanguine, alia de cholera, alia de phlegmate, alia de melancholia, alia est de cōmixt. aliquorum illorum. De sanguine autem duobus modis fit febr. aut de multo sanguine sine corruptione, & sic fit sinocha. Aut fit de sanguine corrupto,

& putrefacto & sic fit. *linochus*, unde uersus. Si nocha de multo, sed *linochus* ex putrefacto. Adhuc hæc species se. sanguinea subdividitur scilicet in *augmasticam* & *peraugmasticam* & *homotenā*. Febbris autē cholericā dividitur in *continua* & *interpolā*. Continua duplex est quædā est de cholera pura putrefacta intra uenas remotas à corde & ab officio stomachi, & hæc uocatur *tertiana continua*. Alia sit de cholera uel phlegmate salso putrefactus in uenis circa cor uel circa officium stomachi, & hæc species uocatur *causon*, unde Ga. 4. *amphoclusio* 5. nulla inter *causon* & *tertianam* differentia est quantum ad materiam unde generatur. Tertia interpolata autē quædam est uera seu pura & ista sit de cholera rubra pura & subtili extra uenas putrefacta. Alia est *tertiana* non pura quam medici uocant *nothā* seu non ueram & ista sit de cholera grossa in substantia quæ quidem cholera grossa generator per cōmixtionem cholere rubre cū phlegmate. Ista autem *tertiana* interpolata aliquando est simplex quando scilicet materia non putrefit in duobus locis uel materia est *papea* in quantitate. Febbris autē phlegmatica subdividitur, quia quædam sit de phlegmate putrefacto intra uenas, ut dicit Aui. in prima. 4. tract. 2. c. 1. de febribus putridis. ibi. *Putredo*. Et ista feb. continua adhuc est duplex. Nam quædam est in uenis remotis à corde, & ista quamuis sit continua & inseparabilis: tamen nece ei quædam *nehelementia* seu *exacerbatio* per quā cognoscitur ac si haberet *paroxysmū*, ut dicit ibidē Aui. Alia sit de phlegmate putrefacto in uenis quæ sunt prope cor: & ista est continua & non habet aditiones nec diminutiones in sua continuatione. Alia sit de phlegmate putrefacto extra uenas: & ista dicitur *quotidiana* interpolata. Et adhuc hic subdividitur secundum quod sit de diuersis speciebus phlegmatis ut uidebitur infra domino cōcedente, & etiam secundū locū putredinis in profundo uel in superficie secundū quod sunt duo species. *liparia* & *epiala*. Febbris autē *melancholica* sic fit quia *melancholia* quandoque putrefit intra uenas & facit *continua* sed raro ut dicit Aui. in prima. ten. 4. ca. de feb. quartana periodica & aliquando putrefit extra uenas & facit feb. quartanam interpolatam. Et ista subdividitur, quia quædam est de *melancholia naturali* quæ est *fax san.* Alia est de *melancholia adusta*. Et alia de *melancholia* quæ attinet sanguini. Alia de *melancholia* quæ attinet phlegmati. Alia de *melancholia* quæ attinet cholera. Et illa quæ est de *melancholia adusta* est duplex, quædam est *melancholia adusta* per aduersionem *melancholie naturalis*. Alia est per aduersionē aliorum hum. Et adhuc subdividitur, quia aliquando sit feb. *melancholica* cū ma-

teria minoris quantitatē & magis grossa quā in quartana, & tunc sit feb. *quintana*, *sextana* quæ ut plurimum sūt de materia *melancholica* phlegmatica uel phlegmati attinente. Et alia quæ non est tantę grossitiei, est tamen maioris quantitatē & sit *quartana*. Hæc autem subdividitur, quia quædam est hæc quæ non est feb. & ista uocatur *hæctica* *fenestruis* siue *marasmus*. Alia est *hæctica* quæ est feb. Et ista habet tres species secundum cōsumptionem in humiditatem *nutrimentalium* iam extra uenas existentium ut uidebitur in processu domi no adiuuante. Et hæc est recta diuisio febrium in generali secundum quod genera diuiduntur in suas species. Febres *compositæ* subdividuntur secundum combinationem febrium cōtinuarum & interpolatarum secundum quod cōtinetur in istis uersibus. Paruus *hemirritus* in uenis phlegma recondit, Exterior cholera medius conuertitur illi. Pessimus humor inest in uenis scilicet coquit extra. Præter iam dicta Aui. subdividit hoc genus feb. sic. Quædam sunt feb. acutæ alie non acutæ. Et acuta secundum Ga. diuiditur in acutam peracutam & perperacutam. Item quædam sunt *chronicę* & alie nō *chronicę*. Et ista subdividitur, quia quædam est *chronica* conuersua, alia non conuersua. Et quædam sunt *nocturnę* & alie diurnę. Et quædam sunt *leues* & *salubres*, alie *molite* multū cum terribilibus accidentibus. Alie sunt *dimittentes* & alie *inseparabiles*. Et *inseparabiles* quædam sunt quæ diuinuantur, alie sunt quæ inceduntur, alie quæ sunt similes in accessibus & afflictionibus. Et quædam habent rigorem, alie *tremorem* alie *frigus* & alie *affligunt* sine istis. Et alie sunt *simplices* alie *compositę*, & sunt quædam *continue* alie *interpolatę*. De cōtinuis autem quædam est *pestilentialis*, alia non *pestilentialis*. Quædam est feb. *syncopalis* humorosa quædam *syncopalis* non humorosa uel *minuta*. Item quædam sunt feb. cum appostematibus ut *plenę*. & feb. *pestilenciales* cum bubonibus. Alie sine appostemate ut *causon tertiana* & similia. Et quia feb. *ephimera* inter alias feb. citioris terminationis & facilioris existit corę & etiam minoris laci, quia nix cognoscitur niti postquam recessit: ideo de ea prius nos expediamus.

De feb. ephimera in generali. Cap. II.

Ephimera est febris ex inflammatione spirituum procedēs per totum corpus cuius terminatio est breuis.

Causę istius feb. possunt esse multe. nō aliquid quando sit a causis primitiuis ut est caliditas aeris uel solis & uenti orientalis & frigus exterius. Aliquando sit propter balneū in aquis sitis

Pecis poros exteriores claudentibus, ut sunt
aque calumniosae. Aliquando propter cibum
calidum aliquando propter uinum sumptum
aliquando fit propter actiones animales, ut est
angustia, tristitia, cogitatio, ira, timor, & gaudium, somnus & ioga quies & nigilia. Aliquando
fit febris ephi. propter dispositiones corporales
sicut dicit Avic. quae sunt in duplici differentia:
nam quaedam sunt dispositiones quae sunt actiones
ut est labor & tranquillitas nimis, & evacuatio,
dolor sine cop. fames sitis. ex omnibus istis
potest venire ephi. Alię sunt dispositiones eor
porae quae non sunt actiones seu motus, & pos
sunt causae ephi. ut est oppilatio in corpore
satieta, nautica iam in stomacho recepta,
apostema, clausio potum exteriorum. omnia
ista possunt causare feb. ephi. Et quia istę ephi
aliquando mutantur in feb. putridam quando
non bene dierant. Aliquando ad ethicam ut ac
cidit aliquando cholericis & consumptis quan
do non bene gubernantur, uel eis impositus
ieiunium triduum &c. Ideo ponemus duo
genera signorum, scilicet signa propria, & si
gna permutationis.

Signa propria ephi. Incipit ergo ephi. cum
aliqui rigore & calor profundatur. Et aliqua
do adest pigritia & somnus & profundatio
seu submersio pulsus. Et in augmento calidi
tas non est ita mordacitudo sicut feb. acuta
tarum, immo est levis sicut caliditas hominis
exercitatus, aut sicut caliditas hominis quando
nimis potatur de puro uino. Et si in prima di
uisione est naturalis habens hypostasim & cum
hoc pulsus est bonus sic est ephi in ephi. rina
non multum alteratur nec offendit dominum ubi
causatur sicut facit feb. putrida: ut est tertia
na & feb. sanguinea: quod si urina est bona &
pulsus ordinatus & non frequens magna fre
quencia uincit fe. eph. quamvis aliquando in
ea apparet urina tincta propter suum calorem
nem ha. calido, ut est sang. & cholera in cor
pore ephimerati ex silentio. Similiter pulsus
diferens aliquando parvus & debilis secundum
diferentiam ephi. & diuersitatem particula
rum. Aliud autem est signum quod facit ipsam
differre a feb. putrida & acuta, & est quod prin
cipium eius sit leue, & si tangatur corpus eius
caliditas nec additur nec crescit sicut fit in aliis
feb. acutis. Ex istatu non uenit accidentia
multum fortia nec terribilia, sicut in aliis feb.
nec febris nec crescit per sudorem leuem sicut
fit sudor in latitudine famitatis non multum quā
tuitur. Et si in ea apparuerit dolor capitis & re
cedat salubiter post recessum feb. & eius eradica
tionem, signum est quod illa fuit ephi. Si uero
ostendat magna exuberantia sudoris, non est ephi
sed aliorum speciei. Signa permutationis: ephi

inter ad alias feb. sunt primo quia ipsa declinat
sine sudore & humoresitate. Et si forte ludet
& non eradicator feb. tunc permutat ad alias
feb. & pulsus post sudorem ostendit reliquias
feb. & si affuerit dolor capitis remanet ul
tra diem naturalem. Omnia ista signa permuta
tionem eius ad putridam uel hecticam osten
dunt, quando tamen mutantur ad hecticam ista
sunt intensiora, & cum hoc diutius durant, &
ultra hoc locus arteriarum est calidior & feb.
remanet uniformis & est augmentum caloris
post refectionem pulsus datus & equalis & par
uus. Si uero permutat ad feb. putridam appa
ret diuersitas in pulsu, ita quod aliquando est
frequenter aliquando magnus, & aliquando
est minor caliditas mordacitudo in tactu: & in
urina non apparent a principio signa digestio
nis. Si autem permutat ad feb. sanguineam ut
est sinocha, tunc apparent signa repletionis san
guinis cum rubore faciei & in more non consu
to & pulsus est plenus.

Cura ephi. in generali si p. ephime fuerit
cholericis & macri uel ephi. sit ex fame uel ex
labore uel angustia: oportet quod isti nu
triantur cum cibis boni nutrimenti & facili
digestionis, ut est hordeum, avena, uinum, amy
gdalatum, & ut sunt parui pulli galline uel peti
dices & comedat lactucas & portulacas coctas
cum lacte amig. & bibant aquam frigidam uel
aquam hordei uel uinum myke: aque nautis
Et in istis non oportet expectare declinationem
feb. nam si isti non cibarentur, cito efficeretur
hecticus uel caderent in feb. putrida. Et in hoc
errabant aliqui antiqui: qui indifferenter in
omni febris imponebant ieiunium triduum ut
dicit Gal. in lib. de inge. sanitatis. Si uero
ephime fuerit ex apostemate uel ex oppila
tione, tunc illi non sunt cibandi nisi post man
ifesta declinationem, & similiter in aliis specie
bus. Si habent sitim datur eis aqua frigida, quia
cum ista feb. solum sit in spiritibus sine materia
na grossitate, sola in refrigeratio est melior cura
cum in eis non indigamus maiore euacuatio
ne, ideo dicitur de hoc nullis eorum purgandi sunt
nisi habentes repletionem oppilationem &
nauticam satietatem. Et pro tanto non sone
prohibendi ab aqua frigida, dum tamen non ha
berent apostema in stomacho uel in hepate uel
splene & in aliis interioribus membris. In fine
autem paraxismi potest poni in balneo aque
dulcis, quia humectat & aperit poros & inducit
ad exhalationem uaporum & inducit sudorem.
Et sic competit dum tamen non habeant feb.
ephi. ex oppilatione in interioribus: quia tunc
non cōpetit, propterea quia balneum facit eum motu
non in humores per oppilationem obclusi, quia
quidem humores non euecti purificati & bal
neatio generatur: egreditur putrida, ut dicitur.

Aui. Et dum tamen nō habeant ephimeram ex aquaeuua fatigato. donec illa prius euascat. Et similiter habent ea casarum cum effluvia balneandi nō sunt. Si uero ephi. est ex oppilatione pororum exteriorum, uel ex oppilatione to membris interioribus ualet. frictio suavis & longa, & non balneum. Visis generalibus ad particularia accedamus.

De cura ephimera in speciali. Cap. III.

Ephimera a calore exteriori fit aliquando propter calorem aeris uel uenti orientalis uel australis, uel propter calorem balnei, ut frequenter accidit paruiticibus longam moram in balneo facientibus, uerumetiam frequenter accidit a calore solis, ut accidit aliquando illis qui flumini uel uadum in sole tempore calido, maxime discoperto capite. Tunc enim sol calefacit spiritus animales, qui magis declinant ad partes exteriores, quam uisiles uel naturales. Et tunc illi supercalefacti & inflammati inflammant alios spiritus usque ad cor, & sic fit febris. Et post expanditur per totum corpus, & iste est unus modus. Alius modus est quod aer calidus per solem uel aliter attrahitur ad cor, propter quem inflammatur spiritus eius; deinde fit processus a corde ad totum corpus, unde in illa quae fit propter calorem solis primū incipit a cerebro & in capite, quia forte tale caput nec corpus non est mundum: imo repletum & per caliditatem solis dissoluntur uapores calidi calefacientes spiritus. Et in illa quae fit ab aere calido fit impressio in corde propter attractionem aeris calidi ad ipsum.

Signa sunt aggrauatio & inflammatio & dolor in capite: maxime quando ibi est repletio nobilioris magnus, & calor maior exterior, quam interior: quia partes apparentes corporis sunt magis calefactae a calore solis & a calore febrili & interiores a solo calore febrili. Et scitur ex iudicio patientis: quia ipse dixit se fuisse uel sitisse in sole uel aere calido per longam morā.

Curatio istius est: quod ungatur caput cum oleo rosaceo uel uulnereo acri frigido & totum pectus, uel ab alio embrocetur cum oleo salcis, & dictis oleis mixtis cum decoctione herbarum frigidarum in frigidam. Et si sitit de cur sibi aqua frigida fontana uel ranea lactis & migdalarum clarificati cum aqua frigidissima, & hoc continetur usque ad declinationem. Et tunc ponatur in balneo aquae calidae & caput embrocetur cum aqua calida: quia humectat & resoluit calorem febrilem & uapores & fumos ab exteriori calore in corpore generatos, & remouet malam complexionem & reliquias febris. Vnde haec embrocatio cum tepibus superdictis melior est, quam si sinit sola ma-

defectio secundum Aui. in c. proprio. Deinde reuertatur paulatim ad dietam consuetam cauendo calorem.

Ephimera a frigore aeris exterioris uel aquae, ut accidit uariis uel aliter stantibus in aqua frigida. Et ista ephi. fit propter clausuram pororum, quae clausio uel constructio est causa retentionis fumorum & uaporum, propter quam retentionem inflammantur spiritus & sic febris ephimera.

Signa habentur ex indicatione patientis, & pulsus non est ita parvus sicut in illa quae fit ex tristitia & angustia: attamen paruus est, & quod praemittit manus supra corpus, calor magis sentitur augmentari quam si esset ex tristitia, uel displicentia, nel tedio seu angustia. Pulsus etiam est uelox propter necessitatem factam a fumis uaporosis retentis cum spiritibus non potentibus exhalari & resolui propter clausuram pororum. Oculi etiam nō profundantur: imo aliquando inflantur propter retentionem uaporum. Urina aliquando est alba: ideo quia calor naturalis est quasi exinctus, & aliquando est colorata: quia calor inuis recluditur & forficatur circa hepate & etiam circa uias urinales.

Curatio. Melior cura istius est sudorifica membrum omnis, excepto ore, ut anhelare possit. Et cum pannis cooperiatur donec fudet. Et si per se sudare non potest, ponatur in balneo aquae calidae in qua decoctae sunt res aperitiae ut est mentastrum balsamita, ambrosia, feniculum, apium, & petroselinum cum suis radicibus, & fricetur fricatione leni, & non madescent uel angustentur, donec fudent, & balneum aeris calidi uel saltem calefactio precedat balneum aquae, deinde ungantur & embrocetur caput eorum cum oleis aperitiuis, ut est oleum de aneto, & oleum de been, & de camomilla. Deinde cibentur cum bonis cibis subtilibus facili digestiouis, ut pulli gallinarum & perdicum capretus lactans & similia. Et bibant unum album medioeriter limphatum. Cuius & potio aquae per se uel a frigido exteriori, & a cibis facientibus pororum clausuram & oppilationem, & ex balneis siccis & poris claudicibus.

Ephimera si fiat ut fit frequenter ex balneis aluminosis calidioribus, quia retinentur fumi & fūs febres ephimeras: sic et immediate dicitur est. & frequenter talis ephimera perducit ad putredinem. Signa cutis est sensa, pulsus parvus & uelox, uina alba & tenuis non habet oculos nec faciem ad inferius demissos nec profundatos.

Curatio istius uisibilis est sicut cura ephimerae factae a frigore, diutius tamē debent stare in aere balnei calidi, & in aqua calida similiter. & per consequens non tardetur inunctio cum oleis aperitiuis, & teneatur aperitiuum regimen & eucimum.

& euchimim cavendo semper repletionem ciborum & posum.

Ephimera propter cibos calidos. Primum fundamentum illius est in hepate & in spiritu naturali: propterea quia virtus cibi calidi citius ad partem asurgit. Vnde dicit Avic. quia illa quæ sita calore solis, ne plurimum est cerebellaris & in spiritu animali. Et illa quæ est ex balneo est cordialis & in spiritu vitali. Istæ autem calidis pronuntias est apertæ & in spiritu naturali.

Curatio fit per administrationem ciborum frigidorum, ut lactucarum, portulacurum & malorum granatorum & similia. Et evadentur cum calidum vel cum succo prunorum, vel cum tamarin. & manna granata, & dentur medicum frigidum, ut est scissandum. & aqua endivivæ vel oxizaccæ, sirupus rosæ, insuper cum aqua hœdæ. Et super partem & caput ponantur epithimata ex sand. & ros. & aquis ros. & end. cum pauco aceto & camphora & succo lactuæ & portulacæ & similia herbarum frigidarum. Ephimera ex vino curatur cum vomitu & solutio. ne ventris, & cum eis quæ immediate dicta sunt, & caput embrocetur cum oleo rosaceo, & succis frigidis, quando ibi est dolor, & in declinatione ponatur in balneo. Et fiat talis curatio, ut dictum fuit in capitulo de ebrietate in lib. 1.

De speciebus ephimeræ propter affectiones animales ut sunt accidentia animæ, & propter somnum & quietem & vigilas. Cap. IIII.

Ephimera ea tristitia & angustia, ista species fit aliquando propter motum & reclusionem spirituum ad partem anteriorem & conculationem eorum versus cor unde fit febris. Signa sunt dimissio oculorum & profundatio eorum propter resolutionem, & facies est discolorata tendens ad citrinitatem, propter fundationem caloris naturalis & spirituum circa partes interiores, & pulsus est parvus, & aliquando durus propter duritiem arteriarum, & urina est ignea, & quandoque pa. sentit ardorem eius, & acuitatem propter siccitatem in ea dominantem: & quia calor & spiritus ex tristitia & angustia interni recluduntur.

Curatio. Primo vitanda sunt ista accidentia, a quibus talis fit. præcedit, & utatur letificandis, & intret balneum aquæ calidæ & non acreum, & olfaciat redolentia frigida ut sunt rosæ, violæ, sandalus, & similia: & caput & pedes ungantur cum oleis frigidis & epithimetur cum panonia madescentis in muscillagine pluri & camphoræ vel in succis herbarum frigidarum. Vinum odorisum mixtum aquæ innotat eos, & omnem hominem venientem in hunc mundum. Post audiat pulchras cantilenas, &

musica instrumenta & reliqua letificantia.

Ephimera ex ira fit propter motum subitum spirituum ab interioribus ad exteriora: propter quem motum spiritus inflantur, & fit febris. ephimera cum omnis motus localis collisus & confusivus sit causa caloris: imo & incendii aliquando, ut dicitur secundo metheororum.

Signa ea iudicio patientis fore & assistentium habentur, & enim hoc adest rubedo faciei, nistimor cum ira miscetur, sicut accidit illis qui cum enisibus nudatis se volunt verberare: tunc enim iterum calor & spiritus ad interiora reuertuntur sanitate, & sic facies pallida vel citrina non sine causa efficitur, & adest inflatio faciei similis illi qui dormiunt vel studuis super libro capite dimisso, & oculi rubei, & hoc propter motum spirituum & sanguinis ad exteriora & urina tincta, & pulsus plenus & magnus & frequens, & si forte concomitetur ei timor: tunc fit pulsus aliquantulum diversus.

Curatio, quod fit in tranquillitate, & mutetur eius intentio ab ira ad res letificantes ut sunt castellenas, hyssoris, fabule, & lectura librorum hyssoris in enarratione suam, & accidentium in mundo, & inspectio localium magni valoris. & ponatur in balneo aquæ calidæ, & ungatur cum oleis frigidis vel temperatis, & cibetur cum bonis cibis facilis digestionis, & quibus Avic. dicit, quod non detur eis vinum verum & purum forte sed debile & limphatum unde in ira competit eis in declinatione.

Ephimera ex gaudio: motus in gaudio fit spirituum ab interioribus ad exteriora sicut in ira sed in ira talis motus fit subito, & in gaudio vero paulatim: ideo raro accidit inde febris ephimera. Si tamen aliquando accidat: habet tunc talia signa.

Signa sunt debilitas pulsus & tarditas eius propter exhalationem spirituum, caliditas non tamen sicut in ira, nec urina tincta, nec oculi sunt ita rubei, & habet aspectum oculorum & faciei bonum & gaudentem quibus habeat febris. Et pulsus non est ita frequens sicut in ira.

Curatio ferè talis est sicut in ira cum levioribus tamen infrigidantibus mitigatur: quia inter animæ accidentia gaudium & letitia hominigenaturæ amabiliora existunt. Tristitia vero & angustia corpus, & animam & operationes impediunt: quo nihil clarior nostris mentibus elucescit. Gaudium ergo & delicia moderate temperata hominibus lapsis afferunt magnum fructum & iuvamentum.

Ephimera ex timore causatur sicut ephimera ex tristitia, nam in utraq; spiritus ad interiora reducuntur, sed in tristitia paulatim in ira subito, & hæc est differentia inter utranque.

Ephimera ex vigilis habet sua signa, nam

uigi.

vigiliæ præcellerunt, & adest fuculoso palpebrarum, & profundatio oculorum propter con-
fumptionem & resolutionem humiditatum oc-
bite & parium oculi. vna apparet conturba-
ta propter indigestionem quæ in superfluo si-
gillus non perficitur celebratur debilitas pulsus
discoloratio faciei. Et ista signa aliquando cõ-
miserunt uel mutantur: proinde ad maiora
inspicere debemus.

1. Cura talis est: sicut dictum est in ca. de som-
no. promouetur somnus & stetin quiete & tri-
quillitate, & embrocetur caput cum decoctio-
ne herbarum frigidarum & humidarum, ut ibi
dictum est. & utatur balneo & bonis cibis hu-
medantibus & bono oino quia confert eis.

2. Ephimera ex somno & quiete, aliquando ex
somno & longa quiete retinetur vapores mul-
ti ab hu. resoluti, qui calefaciendi spiritus per
cõmutionem, uel iuxta positionem inducunt
feb. spirituales. Signa sunt quia somnus & o-
tium præcellerunt hinc consuetudine, & pulsus
est plenus & humorosus, caliditas in tactu non
est multum acuta. Cura est uigiliæ & non
dormire, & utatur fricatione temperata.

*De ephimera propter dispositionem corporis quæ
sunt actiones, ut est labor. Cap. 3. P. 1.*

Ephimera ex labore fit ideo quia exercitiu &
labor inordinatus calef. corpus & spiritus.
Ex qua calefactione spiritus inflammari cau-
sant feb. ephi. Ista autem feb. molesta est inier
alias ephi. quia nocet spiritibus & uicioribus
animalibus & uitalibus. Signa habentur ex di-
cto p. & sodalium: quia nimis laborant non
consuere. Et quia iuncturæ inter cetera mem-
bra propter motum collisionis & fricationis
magis supercalefiunt, ideo calidiores tacto re-
periuntur & corpus siccum. Et si ex labore nõ
superfluo accidat ephi. tunc corpus non est sic-
cum, y. humidum, & e conuerso. Si est super-
fluus labor quia non fit sudor nec homestatio
in corpore. Et quia in latere superfluo partes
pectorales multum laborant & excruciantur, adeo
accidit eis sitis & tussis sicca, & pulsus durus
& parvus & debilis: dorus propter siccitatem cor-
parum & debilis propter resolutionem hu. &
caloris naturalis & spiritus. factam in labore.

3. Curatio est quod ut ait dicitur resumptio
capiendo cibos facili digestionis, & boni
nutrimenti, & pratur otio & tranquillitate,
& potatur ip. balneo aquæ dulcis calide
& ungatur totum corpus præcipue iunctu-
ræ cum oleis temperatis, & dormiat & re-
quiescat sumendo hordeatum & auen. & pullos
galline & perdicæ & capreum in suo tempo-
re & pisces squamosos de aquis mundis, & vi-
num limphatum, parum tamen comedat, quia

icum digestus sit debilis, non tantum possunt
digerere sicut prius: perinde debent uti etiam
cibi spatui quânitatis & multi nutrimenti ut
sunt cibi supradicti, & parui aucule bove præ-
parati & nitella ouorum sorbilibus & relictu-
lis flororum & similia.

4. Ephimera facta propter euacuationem sic
aliquando propter commotionem hu. & runc
spiritus mouentur impetuose & superflue, qui
quidem motus inflammât spiritus & fit ephi.
Aliquando hæc fe. propter medic. irrationas,
ideo quia nimis calefaciunt corpus & spiritus
cum suo superfluo calore. Et quadoque ue-
niunt post phlebotomiam propter commotionem
que fit in humiditatibus & spiritibus, & propie-
rea quia phlebotomia facit redire vapores hu-
midos uero tam cholere & cum calefactione &
inflammatione illorum uaporum inflammantur
spiritus & fit ephi.

5. Curatio, si fluxus superfluit retineatur cum
cibis & potibus relictis, consumptis & cũ
medicinis sipticis interius sumptis & exterius
ministratis supra stomachum, & applicentur
actu calida propter eius confortationem. Et
melius emplastrum est lana infusa in oleo ma-
sticino & nardino calidis, & lana expressa & di-
ctis oleis aliquantulum stomacho applicetur, ue-
rum tamen dicitur Au. quod circa cor & hepar
debeant poni res refrigerantes.

6. Ephimera ex dolore corporali iunctum do-
lor aliquando calefacit spiritus, & inde eph. ge-
neratur. Signa sunt prædicta dolorum in bra-
chio uel tibia uel oculo uel dente uel intelli-
guntur in aliquo loco uel corporis. Curatio est
quod remoueat ille dolor sicut docetur in
suis cap. propriis, deinde sit illa quæ dicta sunt
in ephi. ex labore.

7. Ephimera ex sincopi fit propter diuersam
commotionem in spiritibus, quæ commotione
sequitur calefactionem in eis & inflammatio-
nem. Signa sunt quia sincop. præcedit nõdum est
naturalis, dicitur & pulsus est diuersus, aliquando
debilis quando uincit caliditas. Curatio est quæ
do curatur sincop. sicut fuit dictum in suo cap.
Et de eorum cibis & potibus & facili digestionis
ut dictum est in ephi. ex labore. & de ur eis ui-
num odoriferum compansienter limphatum &
singulis relictis.

8. Ephimera ex fame fit, quia vapores corpo-
ris & calor accipiunt quando calor non inue-
nit nutrimentum & inde feb. generatur. Signa
sunt pulsus paruus & debilis & quandoque du-
rus. Curatur assumptione hordei aut uel anena-
ti in principio postea dantur cibi laudabiles, &
uult eis balneum aquæ dulcis calide & embroca-
tio super caput eius & dormiat & requiescat.

9. Ephimera ex siti fit per eandem modum si-
cut ex fame & curatur per potum aquæ frigide
dz, &

dz; & si misceatur succus malorum granatorum est bonum.

Ephimera ex oppilatione aliquando per cutis exterioris oppilatur propter frigora ab extra aliquando propter balnea stipica, & aliquando propter a dustione sol. ut dicit Aui. Et quando hæc sunt vapores retinet & coarctatur & sunt causa inflammationis spirituum & feb. ephi. & hoc propter defectum respirationis. Et si tunc inflammetur san. multus in corpore existens fit tunc sinocha ex inflammatione san. & spirituum sine aliqua putrefactione.

Signa si sita causis primitiuis, ista oppilatio habetur ex indicatione pa. ut quia transiuit per loca niuosa uel stetit per tantum tempus ad frigus quod cutis fuit oppilata & inspillata & vapores non possunt exhalari. Item tarde incipit declinare maxime si declinent sine euacuatione. Et si oppilationes sunt magnæ pulsus est paruus.

Curatio est quod ponatur in loco temperato & mediocriter panosis cooperiatur & suauiter per totum corpus cum manibus fricetur. Et postquam febr. cessauerit comedat auenarum aut cibos de genere speltæ & ius pullæ cum siccis beatis & cum aliis aperitiuis rebus optet. aut cibetur cum paruis auibus scilicet præparatis. recedat autem febr. si uideretur quod ibi sit repletio san. per se uel cum aliis hu. fit phlebotomia. & si sint grossi hu. digerantur & purgetur prout oportet, & in fine competit balneum aquæ dulcis decoctionis capilli ueni. & cismo. & feniculi & melliloti.

Ephimera ex occasione facietate à tali repletionem generatur uaporis mali ex quibus tenditur caliditas & inflammatur spiritus & fit ephi. & magis fit in hominibus choleris, ut dicit Aui. in suo cap.

Cura est si ista facietas est ouella & cibus adhuc est in sto. prouocetur uomitus uel fiat purgatio cum clysteribus aut cū pharmaco & utatur abstinentia moderata. Si affuerit eructuatio acetosa significat indigestionem stomachi. & tunc utatur aliquo electuario confortati uo ut diagalangia diatriopipereone, & ungatur stomachus cum oleo mallicia & oleo de abinthio & nardino in quibus calidis lana succida intincta, superponatur, & à cætero caueat sibi à tali mortali peccato, quod si continetur non solum corpus necat, immo & animam perire facit. Et capiat cibos leues facili digestionis & in parua quantitate & stet in loco temperato postquam paroxysmus transierit & dormiat & famelicat donec facietas sit transacta &c.

Ephimera ex apostemate quando apostema est in interioribus sic in pleuri uel in periploon. & tunc feb. sunt pus. propter effumationem ad cor. sed aliquando ueniunt aposte-

mata in tibijs uel in aliqua parte corporis exteriori, ita quod hu. de genere cholera descendit aliquando in paruo temporis spatio & io tali descensu calefiunt & inflammantur spiritus & fit fortis feb. ephi. cū intolerantia & magna sui in comparatione ad alias eph. Et hoc frequenter uidi fieri precipue in domino Arnaldo chomite fuxi bonæ memoriæ. hoc etiam frequenter fit in quibusdam furunculis exterioribus eucnientibus & in panaricijs & aliquando in alijs apostematibus extrinsecis, & hoc uocant uulgares raicum febr. siue ista apostemata fiant à causis primitiuis uel antecedentibus, sicut sunt repletio præterita & oppilatio intus seca uel extrinseca, uel icus uel calus, & ut plurimum sunt istæ ephimeræ ex apostematibus sanguineis uel choleris ut io herisipila. Et cognoscuntur per ardorem & rubricationem loci & per pulsulum uelocem & pleum per situm fortem.

Curatio si ista apostemata uocunt frequenter consideretur a quo hu. sunt unde si fiant a sanguine fiat phlebotomia præueniendo illa apostemata ne fiant uel illa ulcera quæ aliquando consueuerunt sequi talem descensum hu. et si est de genere cholera præueniendo purgatur illa cholera & sic de alijs hu. simpliciter uel commixtim. Et si de facto habet illa apostemata corentur sicut in suis proprijs dicitur casu deus permiscuit tatum de uita, & non comedat ovis post declinationem perfectam & tunc utatur digra frigida & humectatio. & caueat a uino nisi post cibum sumat unum subtile & bene lymphatum. Et circa illa apostemata ponantur emplastra sicut medico uidetur, et postea dicitur. Et ut plurimum debet esse frigida & debeat poni secundum Aui. io uia quæ est inter apostemata & cor, oesthi sumi quæ eleuantur ab eo ueniunt ad cor.

Ephimera ex calore interdum ex calore aeris uel ex calore solis uel balnei accidit febr. ephi. ueruntamen ut plurimum fit ex calore solis. Primum enim quod in hac febr. leditur, est caput. & ideo spiritus animalis prius inflammatur & post uitalis propter attractionem aeris calidi ad cor. & signa sunt: quia laborauit uel ininerauit ad solem & aerem calidum ibi stetit diu in aere balnei calidi & similia.

Curatio fit cū rebus infrigidantibus latus & extra inungendo caput & pectus cum oleo ros. & nensarino & stetit loco ad frigiditatem declinat & potest aquam frigidam in sui sua, si medico uidetur expedire & in declinatione febr. balneetur in aqua dulci tepida & de aqua tepida super caput eius effundatur, quia aqua tepida humectat et resoluit. sicut dicit Aui. Et alii sunt species feb. ephi. parum magis aut parum minus ad ista possunt reduci, quia ephi. uia cognoscitur nisi postquam paroxysmus totaliter recessit.

recessit: ideo dicitur q. eph. est facilius cura & diffisilis cognitionis, quia ut plurimum natura eam curat sine adiutorio medicinarum.

Declaratio in febr. eph. Primo queritur utrum ex nauseaus satietate possit feb. eph. generari: & probatur q. non, quia talis nauseaus repletio diminuit, & obundit: immo etiam in parte extinguit naturalem calorem, igitur, &c. tenet consequentia, quia feb. non sunt nisi ex inflammatione & ignitione naturalis caloris, ut dicit Gal. in apho. conclusio illius can. humidæ dietæ omnibus &c. probatur antecedens per Isaac in lib. de fe. ubi vult quod multitudo cibi & potus calorem extinguit naturalem. Et Gal. super illo apho. & qui crescent: & exemplum extrinsecum ibidem positum, ut si multa ligna maxime vitidia paucis igni apponantur. necesse est quod ignis extinguatur. Secundo arguitur sic, Talis repletio est causa frigidorum morborum, ergo non est causa feb. cum feb. & morbus frigidus sint contraria, & contrariorum effectuum contrarie sunt causæ: antecedens probatur per Gal. 2. de morbo. cap. 3. ubi dicit sic: idem contingit. i. generatio multorum morborum frigidorum ex nimia abundantia cibi. licet enim sit corporis nutritivus, tamen conveniens causa est frigidorum morborum. Tercio ex tali repletione generantur hu. crudi & indigesti, igitur &c. tenet consequentia quia tales magis habent infrigidare q. calefacere. antecedens probatur per Aul. in procemio can. in fen. 2. supra prima c. 15. de his quæ proveniunt ex eis quæ comeduntur &c. Oppositum dicit Gal. 8. de inge. & Avic. in prima. dist. 4. Et probatur ratione, quia talis repletio nauseaus potest inflammare cor & spiritus inflammatione nocente operationibus nocumento sensibili & notabili, ergo potest nauseaus satietas causare feb. consequentia est not. & antecedens est Gal. 6. de inge. ubi vult quod ex crapula sit inflammatio cordis, & spiritus, & quandoq. apostemata. Pro isto dubio est notandum, quod talis repletio est duplex: quædam est ad quam sequitur eructatio acetosa, & raro talis facit feb. quia significat dominium frigiditatis in stomacho. Alia est ad quam sequitur eructatio fumosa, & talis bene causat eph. Et modus est iste, quia ex tali crapula resolvuntur multi fumi calidi, qui inflamment spiritus ad feb. maxime si stomachus sit calidus, & cibi assumpti calidi, vel speciatim, ut vinum purum non limbatum. Secundo nota secundum Gal. 8. de ingenio, & Avic. in loco allegato, quod eph. de qua est sermo ut plurimum accidit corporibus cholericis in quibus ratione caliditatis in eis dominantis ascendunt fumi resoluti a tali repletione calidi, qui inflamment spiritus. De materia autem

generationis istius dicunt aliqui q. isti fumi resoluti a tali repletione sunt multi & grossi, & vadunt per totum corpus, & causant oppilationem, & claudunt poros cum sua grossitate quæ oppilatione stante dictorum fumorum resolutionem eorum fieri non potest ad extra, & sic reclusi fortificantur & reueterantur & multiplicantur deinde inflammentur, & sic inflamment spiritus, sicut inflamatur exhalatio calida & sicca in nube frigida & humida inclusa, ut patet in metheoris, & sic fit eph. Et per hoc ad rationes, ad primam, quando dicitur q. talis repletio diminuit & obundat calorem naturalem &c. dico q. verum est de illa ad quam sequitur eructatio acetosa, vel dico q. quævis in principio obundat, tamen postquam natura incipit ipsam digerere eleuantur in tali digestionem & actionem fumi calidi multi & grossi qui inflamment spiritus, similiter dicitur ad secundam. Tercio nota quod ex frigore exteriori per aerem dens, s. claudendo poros cutis non fit debita evectio nec exhalatio fumorum & vaporum, nec superflua per eos expelluntur, & tunc tales fumi sic retenti per modum statim dictum calefaciunt spiritus, & sic fit feb. eph. Sed oportet quod sit frigus forte ad claudendum poros. Quarto dubitatur si ex accidentibus anime potest feb. eph. generari. Et probatur quod non, primo accidentia anime non sunt filia feb. eph. igitur ab eis non potest generari: antecedens est notum, & consequentia patet, quia omne quod generatur a suo simili generatur 7. metaph. Secundo accidentia anime non possunt alterare cor nec spiritus, ergo &c. consequentia not. antecedens probatur, quia accidentia anime sunt immaterialia: spiritus autem & cor sunt materialia, nunc autem immateriale non potest agere in materiale per comen. 7. metaph. Tercio accidentia anime infrigidant corpus humanum, ergo non causabunt in eo feb. tenet consequentia, quia feb. eph. fit a rebus calefacientibus, antecedens patet, quia timor, angustia, & tristitia, & similia infrigidant corpus, ut dicit Hely tertio reg. comm. 11. Et ex accidentibus anime, & commento istius. Abstinerem, confirmatur, quia si ex accidentibus anime feb. eph. causaretur, sequeretur, quod ut plurimum corpora humana haberent feb. eph. consequens est falsum ad experientiam, & consequentia nota est, quia vis possumus liberari ab illis accidentibus anime. Oppositum dicit Aul. in prima 4. trac. primo ubi ponit feb. eph. ex accidentibus anime, ut est etiam positum in c. 4. istius septimi lib. & probatur ratione accidentia anime possunt inflamment cor & spiritus inflammatione nocitiva operationibus naturalibus, igitur &c. consequentia nota, & antecedens probatur per Gal. & Hely 3. arch. casu. & concl. 16.

conclu. 16. ibi. Et ex accidentibus que acci-
det &c. Et per Aui. in quarto. casu. ten prima
ubi ponit se. effi. ex accidentibus animę.
Pro isto dubio est notandum secundum q
dicit Haly in tertio tech. com. 15. Et secundum
q dicit Aui. in diffinitione secunda pri-
mi libri. casu. doc. 2. summa prima capitulo.
14. de his que proueniunt ex motu animali
quod accidentia animę nihil operantur in
corpore nisi mediante motu spiritus & calo-
ris naturalis & san. nam quedam accidentia
mouent calorem naturalem & spiritum ab
exterioribus ad interiora. sicut ira & gaudiū.
Ira quidem mouet ipsum motu forti, & gau-
dium mouet ipsum paulatim. Aliqua sunt
accidentia que mouent spiritum & calorem
naturalem ab exterioribus ad interiora. sicut
angustia & tristitia & timor tremor timores
& tremores terrores tamē maxime subito mo-
uent. Angustia & tristitia paulatime mouent
ab exterioribus ad interiora. io tali ergo mo-
tu subito maxime ab exterioribus ad interio-
ra spiritus, que sunt subiectum se. effi. citra
cor super calefactione ratione multiplicatio-
nis & conculcationis & inflammantur, & sic
se. effi. et dictum est supra. Et hoc maxime fit
in ira & timore. pater igitur, q ex accidenti-
bus animę effi. potest generari. Ad rationes
quę dī q nō sunt similia se. effi. & omne q ge-
neratur a suo simili gñatur. mera. Dico q au-
rores habent verumque substantijs, nō autē
in accidentibus. vel dico quod haberent ve-
rum in generatione per se, scilicet accidentia
animę generant febrem per accidens, sicut
habet ad motum caloris & spiritus.

Defecuta. 1. Cap. VI.

ACuta se. continua est illa que cum veloci-
tate sui finis dicitur esse magna. hęc est
diffinitio quam ponit Gal. 2. amphi. com.
16. ibi. Acutorum morborum &c. Alio mo-
do dicitur se. acuta & est que mouetur cum
velocitate, & est in ea timor. Ista autem se.
acuta & continua non transit 4. dies. Nun-
quam enim acuitas egrediens eū fortibus
accidentibus continis. 14. potest pertransi-
re. Ista autem se. acuta & continua. cito ad
mortem vel ad salutem terminum suum, p̄q
parabit. Et ista talis io sermone portugale-
sum quorundam simpliciter infirmitas non
cupat.

Cause se. acutę est putredo humorum me-
ch. particula 1. in p̄m. istius autem putrefa-
ctionis causa est conculcatio & euentationis
prohibitio quia hęc quando coartatur & non
expirat, putrescit & inflammatur in eo calidi-
tas extranea ex qua se. generatur 3. feb. conti-

mento. 9. 1. ibi. Perant enim si ita contingat
iam ergo apparet per illud q dicimus q pu-
treto est causa retinens se. Et si vis ut ipsa di-
catur causa coniuncta, dic cum Haly ibidē
ita, q putredo humorum cum effumatione
ad eor est causa immediata se. Et causa putre-
dinis est prohibitio euentationis & concul-
catio. Et causa istorum est oppillatio & cau-
sa oppillationis est multitudine vel grossities
vel viscositas humorum, vel alia causa clau-
dens vias & meatus. Iste autem cause sunt a-
dinuicem concathentur, quia vna sine alia
vix poterit esse. Et iste sunt pro causis coniu-
ctis. Cause antecedentes sunt nimia cor-
poris repletio multorum humorum vel vi-
scolorum vel nimia venarum defecatio in
estate, que tunc humores calidos sibi attra-
hant ex coherico genere vt scribitur. 4. am-
pho. com. 34. ibi. scilicet acutorum morbo-
rum &c. Cause primitiue sunt aeris ex te-
rioris nimia caliditas aculeatim vel ebulli-
tionem io humoribus inducens vel mala qua-
litas alia vt eius corruptio vel pertransitio vt
apparet io aere pessimali: similiter frigidi-
tas aeris exterioris faciens clausuram poro-
rum exteriorum & fortificationem humorū
calidorum in corpore quasi per antiprili-
sim, similiter nimius motus & immoderata
exercitia io feruore estus. Similiter nimia
vigilia & angustia & cogitationes & longe
abstinencia. Omnia ista faciunt mediate vel
immediate ad acuitatem humorum corporis
& eorum furie augmentationem & ex-
citationem.

Signa se. acutę continē sunt comuni-
ter dolor capitis calor & se. intensio. Et in ea
quę videtur q calor penetret ad interiora me-
ns vigilie angustia. co. potalis intolerantia
luna & ardor pulsus velocis & tria: ribea tim-
da aliquando ad citripitatem intensam vel
ruseclipsē declipis omnia hęc significant
morbum esse acutum & motus eius velocis-
simus. Et Galenus in primo defec. ad Glauco-
nem ponit signa, continuorum & non defici-
entium se. quia non habent rigorem nec ti-
pum sicut interpellate, nec se. ista cessat in
24. horis sicut cessant io tepellate. Et si i pul-
su fuerit inordinatio aut inegalitas in dis-
persis percussionibus & plurius est signum
magnitudinis & acuitatis se. & q nō est de-
ficiencia quibus, id est interpolatis: Si humores
fuerint cholericis eius se. vique acutiores e-
runt. 4. de causis pulsuum commento. 7. Et
sequitur. si phlegmatorum maius fuerit. qui-
dem erit se. proprium est enim se. maxime a-
cutis quod habeant pulsus velocem. quar-
to de causis pulsuum commento. 15. & cau-
sa istius est. necessitas attractionis aeris ad
in-

Infirigidandum cauma cordis & partium eius constantium. Aliud signum est quia cum somnietate & vigilis propter vapores ascendentes ad caput loquuntur in somnijs & sic frequenter in eis parafrasis. & somnia eorum sunt terribilia. Et cum istis supradictis signis alia particularia concurrunt, ut est mas tempus regio aer & regimen preteritum &c.

Indicia in fe. continuis. Primo dicit hypocras. Acute aggritudines in 14. diebus iudicantur. 1. terminantur. 2. aph. aph. 23. in com. crisis in acutis aggritudinibus non multum moratur tempus. Secundo iudicatur crisis sexta die esse illauidabilis. 2. amph. commento. 23. ibi acute aggritudines.

Tertio quando incipit signa digestionis apparere: tunc est finis principij aggritudinis. in sententia 1. de crisi capitulo. 18. Quarto indicatur etiam esse futuram per ista signa vel quando aliqua eorum antecedunt & ponuntur a Galeo. 3. de crisi cap. 2. sic. Et antecedunt supple etiam venturam que fiet per evacuationem aliquando per apertione exiturę diuersa commotio in corpore egri & vehemens, & id est quod accidit ei in quietudo esturto & permixtio in sensu profundus somnus alteratio in anhelito verigo gressus sui corporis, & adueniunt dolores capitis & dolores in collo & in alijs locis plurimis corporis, & accidit eis quandoque tintipus & somnus in vtrisque auribus & videtur coram, semilia radijs, & currunt lachryme eius absque volutate & retinetur vtriusque eius, & tremor labium eius interius. Et aduenit ei in vno membro tremor & accidit ei obliuio & negat cognitionem eius que est ei presens quam videt, & aduenit ei rigor vehemens & antecedit paroxysmus. 6. eius secundum plurimum horam in qua consuetudo eius erat ut veniret, & aduenit ei inflammatio vehemens & finis in tolerabilis: & clamat & facit sicut dolorosus; deinde procedit ex eo sudor exuberans aut vomitus plurimus aut soluitur venter eius subito aut procedit ex eo san. plurimus & accidit ei species diuersa ab istis aut omnes earum. simul. 3. de crisi. cap. 2.

Quinto. primo quod consideratur in ea id est crisi maior signum est digestio vtriusque digestionis & quod aspuitur ex pectore. Et ego presens sui multitudinam in infirmorum quam comprehendit in hora crisi. & nunque vidi aliquem eorum mori quibus aduenit crisi. post digestionem materie. tertio de crisi. c. 3. igitur primum signorum signantium bonitatem crisis presentis & maius ipsorum est digestio. ibidem. & sequitur in sententia. Et secundum signum est quod fe. in die crisis indicata per diem indicationem, & tertium signum,

est quod fiat secundum naturam aggritudinis ut si est fe. adurens, tunc necessarius est fluxus san. narium: aut rigor foris & polles sequatur sudor, cal. & humidus comprehendens totum corpus aut euomat aut egerat cholestram plurimam. tertio de crisi. c. 3. Sexto in non deficiente febre si labium aut oculus aut supercilium aut nasus disorquetur, aut non videat aut non audiat san. debili. entente corpore: quodcumque horum fiat iam prope est mors. 4. amph. amph. 46. Septimo vbi in fe. non deficiente dispnea superuenit & desipientia mortale est vbi supra amph. 50. Octavo quibuscunque in febribus aut in his aggritudinibus voluntarie, oculi lachrymantur nihil inconueniens quibus vero non secundum voluntatem inconueniens est 4. ampho. amph. 51. Nonno quibuscunque in dentibus febribus immitates sunt fortiores & diuturniores sunt fe. vbi supra ampho. 53. Decimo febricitanti sudor omnis superueniens non deficiente fe. in positione post co summationem sudorem malum, prolongatur enim morbus & humores plurimos signat. 4. amph. amph. 59. Undecimo. quibuscunque in febribus aures iurdescunt san. narium illic aut venter in barbas soluit aggritudinem 4. ampho. amph. 60. Duodecimo quibuscunque in fe. ictericia superuenit ante septimum die malum est. 4. amph. amph. 63. Decimotertio quibus in san. 7. aut 9. aut 11. aut 14. die ictericia superuenit bonum, si non dexteram hypochondrium durum fuerit id est si non habuerit durum apostema in hepate. si vero non: non bonum id est si non venerit in diebus supradictis non est bonum signum ibidem. amph. 65. Decimoquarto in fe. circa ventrem cauma forte, & cordis morbus vel tremor malum vbi supra: amph. 69. Et sequitur in com. hęc accedentia sunt mala & vltimate pessima, quia vitę fundamē tam igneo calore est calefactum. Ite ampho. intelligitur in fe. conctus in quibus infirmi aliquando dicunt: cor meum adest. Iud cauma venit: interdū propter apostematam in stomacho vel in membris vicinis. Decimoquinto indicat Hypo. in fe. ex somnijs timores aut spasmi malum. 4. amph. amph. 67. Decimosexto. in fe. spiritus offendens malum spasmi enim signat amph. 69. Decimo septimo in fe. acutus spasmus & circa viscera dolor fortis, malum vbi supra. amph. 60. Decimo octauo quibuscunque in fe. vtriusque co rēbore velut subigalum his capitis dolores aut adfunt, aut aderunt. vbi supra amph. 72. Quædam autem homini vrinam turbata existunt que scilicet hypostasim grossam vel lociter faciunt que cum sit yelocitate mor-

bi cessantis signat. 4. amphi. com. 72. Et sequitur ibidem. que vero hypostasim non faciunt & turbat existunt si virtus sit fortis, longum morbum protrahendū, si debilis, mortem ibidem. Decimo nono quibus in septima. terminatur ægritudo his nubem claram rubeam. 4. die habet vrinam & alia signa secundum rationem. 4. amphi. amph. 73. & sequitur in com. Vnde non solum nebula rubra in quarta die & 7. crism significat sed & alba ad hoc certior & dignior est, & hoc magis si nebula in medio sit etiam suspensam continua quolibet & æqualis & ibidem.

Vigesimo indicium per vrinam, sic vrina que vna die, habet hypostasim laudabilem & alia die, non significat quod quidam hominum recipiant digestionem. alij vero non. & ideo longi ægritudinem significat. 2. prognosticorum commento 26. & in can. Hipp. idem dicit. Et tu considera si virtus sit fortis potens expectare finem longi morbi, vel non, & secundum hoc iudica & vide ægrum.

Vigesimo primo vrina al. cum se. acuta significat frenesim vel mortem.

Vigesimo secundo vrina nigra intendens ad croceum in circulo cum se. acuta sine alleviatione patientis mortale est.

Vigesimo tertio vrina siue aliqua hypostasi in se acuta talis permanens nihil boni significat & quia communiter medico præsentantur vrinæ continue & amici cupiunt scire de ægro & petunt a medico quid videatur vobis. ideo continemus hic inspiculendo dicta Hippocratis in prognosti. & bene serviumus nobis in istis seacutis continuis & in acutis conversis & in peracutis & in alijs sebi interpolatis compolitis. Dicamus logo si secundum Hippo. Vigesimo quarto iudicium per vrinam sit tale. Vrina est laudabilis que hypostasim albam & subdensem æqualem & continuam atque leuem habebit & sic permanens vsque ad crism erit. Est enim fidelis & nuncia salutis, & significat brevitatem ægritudinis; que vero cum hypostasi prædicta modis vero sine ea est diuturnitatem ægritudinis significat nec est omnino fidelis. secundo prognosticorum can. 36. Et sequitur in com. circa medium quod si fuerit in ea sedimen. i. in vrina laudabili tunc oportet proculdubio ut sit in ea nebula alba. Et oportet necessario ut sit color vrinæ æqualis in citrinitate & substantia eius media inter subtilitatem & aquosam grossitatem sicut vrina alini. Vigesimo quinto vrina rubra nimis cum sua sibi simili hypostasi longi ægritudinis signat. est tamen nuncia fidelis, & certa sperare salutis. 2. prognostico rû can. 27. Et sequitur in com. ista vrina signat diuturnum san. cum aquositate, & dicit ibi Ga. q.

in ægritudinibus que sunt a sanitate que est magis iuuatius in humoribus non est timor. Et illa aquositas que est cum sanguine indiget digestionem. Vigesimo sexto nebula pedes in vrina si al. bona, si nigra mala. ubi supra can. 29. & Gal. in cõ. dicit q. nigredo denunciat mortificationem, vel calore excessivum. Vigesimo septimo cum vrina clara & citrina fuerit; indigesta signat ægritudinem 2. prognostico. can. 30. Et sequitur in com. Color vrinæ naturalis est æqualis citrinitatis. Et sequitur. Cuius huius subtilitas fuerit tenuis signat q. ægritudo non digeritur. Et sequitur vrina naturalis i colore suo temperato in citrinitate & in substantia sua æquali ita ut non sit subtilis sicut aqua nec grossa sicut viscina alini & bestie &c. Ibidem timendus est igitur infirmi defectus. Et sequitur in com. Et si citra li vrina clara & citrina virtus ægri fuerit fortis potes spectare digestionem iuberis infirmus alia morietur. Vigesimo octavo vrina mortis signatur & fidelis & certa est aquosa aut fetida aut nigra siue lurosa. i. grossa vel turbida ubi supra can. 32. Et rû dicitur est, quia vrina aquosa arguit inobediens materiem vltimam & impotentiam virtutis digestivæ vltimata signat. Ca. secundi, quia fetor signat mortificationem vel adustionem. Ca. tertij est, quia nigredo signat mortificationem vel adustionem. Ca. quarti quia si sit in principio vel augmento signat corroboracionem in humoribus. vltimam & tunc est mortalis. Si aut talis vrina venerit in statu aut declinatione nõquea venit per viam mundificationis quæ hanc & sapientiares et commiscetur, & Ga. in cõ. vrina aquosa est cuius substantia est tenuis & color eius albus signat indigestum humorum in fine vltimo & debilitate virtutis facientis digestionem. Vigesimo nono prognosticat Hipp. sic in principio prognostico i principio. Primo in vi ægritudine ægri facies puorabis. vtrum similis sit sano & et si sibi sano similis sit q. si sit optimus, si vero contrarius, pessimus est & magis malum si infirmi facies sit similis faciebns mortuorum ut si nares acutæ oculi concavi tpa plana color viridis niger pallidus aut plube quibus appareribus infra triduum ægritudinis non pcedere fluxu vtrius vel superfluo vomitu aut supdus vigilijs vel abstinentia immoderata, oia ista signa sunt mortalia. 2. substantialis & radicalis humiditatis signat consumptionem & virtutis debilitatem & calor naturalis exhalatione facta a calore febrili & molestia eius.

Trigesimo si in somnijs palpebris sublevis sola alba videatur sine fluxu ventris præterito naturali vel artificiali nec hoc habet, in consuetudine, timendum est de morte ubi supra. Trigesimo primo, si labia torquentur aut nares aut palpebre aut supercilia mortale est maxime cum debili virtute & si sequa-

tur amissio sensus per se vel cum istis prædi-
 ctis mortale est. Trigessimosecundo in non
 deficientibus se. si quæ quidem extra frigida
 fuerint quæ uero intus ardeant, & sitim ha-
 beant, mortale est. quarto ampho. ampho.
 48. Et dicit Galenus in commento quod non
 intelligitur nisi in fe. petacutis & continuis
 & in febriosis & non in alijs, nec in feb. ter-
 rianis quæ calidiores sunt alijs. Et sequitur
 in commento causa horum accidentium a-
 poplema est calidum de phlegmonū genere
 vel herispilarum quæ sunt causa sanguinis
 attrahendi ad membra ubi supra. unde &
 incenduntur interiores & cutis & exteriora
 & frigescunt, hæc ille, & pro concordantia.
 Trigesimo tertio in acutis morbis frigiditas
 extremarum malum 7. ampho. ampho. & vi-
 de causam in commento, quæ immediate di-
 cta est. Et pro concordantia in dolore forti
 circa ventrem extremarum frigiditas ma-
 lum est. 7. ampho. ampho. 6. & vide commentū
 & causam. Trigesimo quarto si testes aut
 virga contrahantur aut minuantur non ta-
 men occasione dol. mortale est. Et secundo
 prognosticorum manuum mobilitatis signa
 sic pernotabis. In feb. acuta & in peripleu-
 monia & in frenesi & in dolore capitis si ma-
 nus utilitatem caput aliquod positurus vela-
 liquid collecturus hæc illic quæsierit, vel de
 velibus quasi pillos everserit vel festucis de
 pariete decerpserit, malum signum & morta-
 le est. Nimis longum esset si totum librum
 prognosticorum hic vellemus asserere. Sed
 secundum Gal. in secundo prognosticorum
 commento 6. vocetur hic pronosticum hoc
 & est pro. Trigesimo quinto summa in om-
 ni prognosticatione, quæ est super illum qui
 moritur & quæ vivit est comparatio inter
 fortitudinem ægritudinis & inter fortitudi-
 nem infirmi quando est ergo ægritudo forti-
 or, moritur infirmus proculdubio. Et quan-
 do debilior est virtute infirmi non moritur
 secundo pronostici. comment. 7. ibi, Bonum
 est modeste se &c. Et no. ibidem quomodo
 oportet considerare res principales virtutes,
 quæ quidem cognoscuntur debiles esse aut
 fortes ex debilitate vel fortitudine suarum
 operationum. Trigesimo sexto si liuor mix-
 tus viridi in yugibus & digitis affuerit mor-
 tem advenire non dubitatur. Secundo pro-
 nosticorum. cap. 8. Si autem vis scire signa
 sumpta ab alijs exentibus vide in pronosti-
 Hippo. & in alijs libris: sed considera bene
 in supradictis: quia res quæ in vltimo sunt
 contrarietatis rebus naturalibus sunt in vlti-
 mo significantes perditionem 2. prognosti-
 com. 32.

Trigesimo septimo iudicium febricitanti

bus non fortiter ac omnino in superficiem
 permanere vel minuere corpus aut contabe-
 scere malum est magis eo quod secundum ra-
 tionem, sit hoc enim id est non minuere lon-
 gitudinem ægritudinis. hoc enim. i. contabe-
 scere imbecillitatem virtutis signat. 2. ampho.
 ampho. 8. sequitur in commento. Si enim fe-
 br. maior sit & velocior macies fiet velocior.

Trigesimo octavo temporibus siccis febr.
 nascitur acuta & brevissima ex humoribus
 choleicis 3. ampho. comment. 7. ibi. & egri-
 tates vero sicce &c. intellige de regionibus
 & complexionibus & gradibus calidis & sic-
 cis. unde in hispanorum regnis & in orien-
 talibus regionibus se acutæ & choleicæ fre-
 quenter sunt, in alijs vero frigidis raro.

Trigesimo nono in non deficientibus feb.
 si quæ quidem extra sunt frigida fuerint quæ
 vero intus ardeant & sitim habent mortale
 est. 4. ampho. ampho. 48. Significat enim
 apostema in viscenibus esse hæc ille.

Curatio februm acutarum continuarum
 Nunc autem volo pro amore dei, & vilitate
 communi aggregare aliquas generales cau-
 per quos quis possit regulariter in febr. cau-
 operari.

Primus est in feb. acutis putridis, scimus
 sanitatem non posse fieri nisi putredo primi
 terminetur, ideo oportet illam prius æ-
 ferri de intentione domini Galeni. 10. de in-
 ge. 2. in principio.

Secundus si aliquis se. pu. vult curare prius
 mitigabit putrefactionem, & intentio sua e-
 rit in feb. & in putredine. In feb. autem duo-
 bus modis intendat. vno modo ut curet il-
 lud quod adest & venturum prohibeat. In
 putredine quoque intendens curet eam. i.
 putredinem quæ dixi. verba sunt Gal. 10. de
 inge. c. 5.

Tertius, quicunque putrefactionem auferte
 voluerit ad removendam oppillationem quæ
 est causa eius in rendere debet, quia remanen-
 te causa effectus vique semper remanebit.

Quartus casus est Auci in prima quarta
 & 2. cap. intentio ad curationes febr. putri-
 darum quando feb. est multæ vehementiæ &
 acuitatis & non iuuenis virtutem fortem ro-
 sistentem & tolerantem, tunc magis veni-
 dum est in frigidatione non vltima, quæ
 evacuatione nec digestionem. Dico non vltima
 quia quæ excellenti refrigerant, extin-
 guunt innatum calorem, primo de febr. id
 Glaucosum cap. 10. Si autem virtus est for-
 tis, & resistens abscedere causam & expelle
 humor. & absconde cibum & non in frigi-
 dationem, quæ prohibeat resolutionem.

Quintus, quotiescunque virtus est de-
ficiens

ficiens, medicus sit occupatus iniquando cōplexionem contrariam ei, quare debes illam calidam cōplexionem in frigidare, & virtutem cum cibo viuificare, vbi supra virtus enim viuificata redit ad causam digerendam & expellendam. Sextus in frigidatō in fe. non est faciendū cum rebus stipticis & desiccatis vt sunt aliqui truciſci illius virtutis, nisi hoc fieret post digestionem & euacuatiōem materię. Septimus vbi dubitatur de specie & natura sē. subtilia regimen, & causę vt paroxismo ventrem inuenias euacuatum virtute hoc tolerante. Octauus omnes sē. autē recentes nocent febricitantibus cum sua ebullitione & corruptione in stomacho. Ideo febricitantes ab eis sunt prohibendi. Auice, in prima 4. in capitulo. Intentio generalis ad curaciones se. pu. Nonus est Auic. ibidem, virtute forti existente & sanguine superabundante, vel si cum hu. vincente san. cognoscitur abundare, tunc flebotomia cūctis medicis conuenienter existit, maxime quando vrina est rugosa & non citrina, ignea ex qua timetur victoria cholere & acuitas eius post flebotomiam. Decimus pręsupposita virtutis constantia solutio ventris. minoraria, subtilis lenitio. Flebotomiam sequatur & hu. superabundantis residui sequatur euacuatio. Auic. vbi supra scilicet in prima fen. quarti tra. 3. c. Intentio ad curaciones viles se. pu. Vnde decimus in continuis fecacis ventris lenificatio cum solutivis lenibus non laboriosa est plurimum componenda. sententia Auic. ibidem. Vnde decimus si per singulū, vel nauseam, vel per dolorem stomachi, vel aliter cognoscitur q. hu. ad stomachum, declinat illico vomitus est propinquandus. Si per rugitum & gurgulationem in intestinis pręsumitur materiam infusurū decuram, per solutionem ventris est euacuanda, quia vnde cūque reperit natura inde ducere oportet per conuenientes regiones. Decimus tertius euacuatio eradicatoria ante materię digestionem exstercenda non est, nec in calida, nec in frigida, nisi materia fuerit furiosa, & non quiescens & tolerabilia induens accidentia. Iste canō est Hippoc. primo amphibi digella medicis & non eruda moneri. Et similiter est Auic. in prima fen. 4. loco superius allegato. Et causa istius est quia per istam euacuatiōem ante digestionem, materię impeditur digestio nocitui, & iuuatiuum cum nocituum permiscetur propter motum quem dicta euacuatio in humoribus inducit, ad quem etiam motum mouetur malignum abque digestionē sui.

Decimus quartus i dominio sanguinis, vbi

de flebotomia sumus sulliciei non oportet digestionē expectare. Suis alijs hu. & nō sanguini debetur expectatio digestionis. Decimus quintus cum natura ad crīsum manuerit perfectę non indiget medicaminibus, si autē imperfectę oportet nōs iuuare eam & minoritatem sui rēboris adimplere, vt crīsum perfectę appetatur cum vttoque, scilicet virtute & medicaminibus. t. ampho. comm. 22. lib. scilicet. Digella medicari. Decimus sextus, si in aliqua feb. continua competit flebotomia illa in principio est exercenda. Cū enim postponitur, flebotomia apud principium egritudinis amplius ad eam non est intentio & fortasse interficit per aduentum debilitatis. Iste est Auic. in prima quarti tra. 2. c. Intentio ad curaciones valueriales &c.

Decimus septimus euacuatio cū medicina in die interpolatiōis vel minoris afflictionis & in hęc diei frigidiori est faciendā, & nō in die parafismi vel maioris afflictionis. Auic. ibidem. Decimus octauus, si se. acutissima fuerit vinum balneum & epithyma relinquantur & ad aquam frigidam conuertitur, quia magnum iuuamen ad se. extinguendam pręstat & eius acumen, sed tamen non valet ad purgandum putredinem cum vrina vel sudore vel egestionē. mech. particula. 1. r. quasi in col. 3. Decimus nonus quocirca si omnia fortiora sunt, scilicet cor, hep. & cerebrum, & se. sit acutissima, da aquam frigidam sine dubio, si senior vel decrepitiū non fuerit, impossibile est enim decrepitiū fortem inuenire. Galenus ibidem. Vigesima si multitudo sang. & viscositas humorū & angustia & oppilatio corporis primo flebotomia succurritus deinde humores attenuantur & post poros aperimus & diluamus secundum ordinem nature, mech. particula. 11. col. 3. Vigesima primus ante omnia virtus requirenda est, que si sit fortis & expediat purgari, interpedis purgabis. Si autem fuerit defecta nequaquam purges aut modicum quod virtus ferre valeat, aut prius virtus cum aliquibus confortetur, deinde purganda purgentur. ibidem. Vigesima secundus si in febr. pu. putredo est propter oppilationem, apernatur illa. Et si propter humorum multitudinem minue eos si propter grossitatem & viscositatem attenuentur & subtilientur. Et si causa est composita medicinam secundum compositionem cause compositione. ibidem. Vigesima tertius si frigidus aer. extrahatur ad cordialis ante omnia medicioam adiungit. Ideo vt ipse refrigeret & in feb. acutis naturaliter, vel artificialiter est procurandus.

Vigefimus quartus aliquando propter magnam moleſtiam morbi nociua ægri tudinis miniſtramus verbi gratia ſi ſincopis fue rit cum febre. necesse eſt infirmo vinum dare & ius carniū, & propter hoc oportet vt ad illud quodd magis neceſſarium eſt feſtino mus. mech. particula. 7. colom. 9. Vigefi mus quiorus, ſi eſt neceſſe vt multum extra harur ſan. a. u. h. u. & virtus ſit debilis non ſemel, ſed paulatim & multis detractiōibus cōtinuatur, ſi autem foris, ſemel & multus extrahendus eſt. mech. particula. 9. colom. 9. Vigefimulſeſtus. in ſe. acūis in laxando me dicus ſit auarus, quia melius eſt partem ma teriæ relinquere quā totum exquiliſe euac uare vt dicit Auicē. in 4. primi. Vigefi mulſeprimus medicus in reſciendo debet eſſe anxius & largus, quia omne peccatum quodcunque ſit magis ſit in tenuiſſis dietis, quā in groſſioribus, vt dicit Hipp. 1. apho. Vigefimulſeſtus aſſiduare gutturi patiē tis ægri tudinem calidum aliquid vt rema neat humidum & non exiccat in curis earum eſt iunatium valde, Auicē. in prima. 4. c. de cura. febr. acutarum per ipſum. illa autem cum quibus hoc ſit ſecundum Auicē. ibidē ſunt mucillago pſilij & mucillago granorum cironiorum, & ſuccus portulac, & ſuccus liquiritiæ vt ſedetur ſitis. Curatio particularis febr. acutę continū, in primis ergo iuxta doctrinam. 23. cañ. conſtituantur acutę febricitans in aere frigido, ita quodd camēra ſit munda a ſuperfluis & roretur cum aceto & aqua roſata vel ſaltem cum aqua frigida & ſternatur cum ſolis ſalicis & vitis & canne. Et circa lectum & parietes camēre ponant canne & rami & folia ſupradicta & folia & flores nenufari & lentiginis aque. Et iſti rami debent colligi ante ortum ſolis & odorent violas roſas ſanda. vel ſiat ſacculus cum iſtis cum modico camphorę, qui quidem ſacculus aliquando aqua roſa & aceto roretur & continuo odoretur. Et ſi in dicto ſacculo addas de ſe. papaueris & floribus nenufa ris. melius valebit. Secundo iuxta te norem noui canon. virtute fortę exiſtente ſi videtur quodd ſan. ſuperabundet ſolus, vel cum alijs humoelbus in magna quanti tate ſiat febotomia de baſilica in magna quantitate ſecundum quantitatem plenitudinis. tamen prius conſideretur ſi adeſt con ſtipatio, & illa cum cluſteri molliſſimo vel ſup poſitorio remonetur, vel cū cluſteri inſiciatur ſucci ſicę. h. j. olei violę. uar. j. ſal. dra. j. Si autem ſe. eſt ardentiffima & videtur quaſi e ſtare, extrahatur ſuccus melonis cucur. & cucu. & lactis & addito zuccaro & oleo vio

la. ſiat cluſtere & ad j. li. iſtius addatur ſali communis camphorę ana. dram. j. ſiat cluſto re & tepidum inſiciatur. laſce enim & inſri gida, canna quod in treſſinis eſt & caliditatem anoullat & extirpat.

Iſtam aurem febotomiam in ſecunda vel in tertia die ſequatur vna medicina mi noratina virtute hoc tolerante iuxta teo orem decimi caſon. Recip. ſlorum viola. unc. j. ſlorum borag. & bugloſſę ana. unc. vi. voi co ſeruore bulliant in j. li. aque & colentur in colatura diſſoluatur oxigenie. unc. j. Poſt ſortem fricationem coletur & exhibea tur, vel in dicta colatura diſſoluatur caſſia ſi. vel manna granata vel reubarbarum diſ ſolutum in aqua codiue. Iſta enim com micta vel ſimpliciter exhibeantur iuxta in digentiam infirmi & induſtriam medici. Hiſ ſic expletis & dum iſta exequuntur debe mus intendere ad digeſtionem materię di geratur ergo materia cum ſirupo acetoso ſa cto cum zuccaro & aceto & aqua: quia dicit Auicē. multotiens inueni rem, quę digerit & ſubtiliat & euacuat & inſrigidat ſicut eſt ſirupus acetosus vel ozizaccara, quę ſiut de ſucco malorum granatorum aceto ſorum aceto & zuccaro ad eaſdem inſer uones. in cauſis etiam calidiſſimis, vbi eſt ſitis & ardor & febr. intenſa valet ſirupos de pa pa. & ſirupos nenufarinus, ſirupos roſa. & viola. & ſirupos endi. ſirupos de ſe. portu lac quem ponit hebdomadę, & ſirupos limonum & de ribes & ſuccus granatorum aqua extracta a cucurbita in furno cocta. Si materiā eſt commixta aliquatę & quodd eſſetibi phlegma vt interdō accidit de phleg mate falſo vel alia ſpecie humoris groſſi: tunc addenda ſunt cum ſupradictis aliqua inciuia, quę non excedant mſtrum in aliqua qualitate, vt eſt endiua cicorea cum radice adiantos radis apij & cicera, betu ca, vel digeratur cum aqua cicera ſo quę prius graminis virgula & radix feniculi prę bullentur cum modico aceto.

Cognita autem digeſtione materię, ſi eſt acuta calida purgetur cum hac deco ctione. Recip. ſlorum viola. boragin. & bugloſſę ana. unc. j. bulliant vnico ſeruore & in colatura diſſoluatur caſſia ſi. munda. unc. j. reubar. temperati in aqua endiue. dram. j. vel ſic in dicta decoctione temperetur tamarindi. unc. j. & vj. bulliant iterum vel beneconſcentur & colentur & mini ſtrentur addendo de eleſuario de ſucco ro ſato. dram. liij. vel magis vel minus ſecun dum virtutem egri, vel detur manna gra nata cum ſer.

In materia autem phlegmatica si est grossa & viscosa fiat ei talis medicina. Recip. polipodij querci. recentis & mundi florum violę & boraginis & buglosis passu. munda. ab arill. ana. unc. x. fiat decoctio in qua dissolvatur cassia si. munda. unc. j. scamoneę decoctę in coctano grana. v. vel loco eius ponatur reub. unc. vj. purgar phlegma cum portione cholere. aliqui in dicta decoctione addunt collata pul. diatrybith cum modico spice nardi. Aliqui etiam ponunt in dicta decoctione radicem ebulli & anisum, & sic euacuant phlegma. Ista enim facienda sunt eam. vniuersalibus bene obseruatis. In materia supradicta grossa & viscosa phlegmatica, quod scitur: ex præterito desiderio & copioso regimine, vel piscium vel fructuum ingenti cibatione, & ex habitudine plana cum sputamine aquoso crudo & aliquando spisso & similibus. In tali inquam casu pro digestio sirupus acetosus commode tribuitur cum aqua cicorum & virgularum graminis. Et si addatur aliquid de sirupo de absinthio bonum erit. Sirupus enim acetosus non solum subtilem materiam digerendo ingrossat immo & tenacem phlegmaticam incidit & dissolvit ut dicit Hebe. & Auicenn. Pro solutiis autem quidam ministraverunt mirabolanos, sed non inueniunt ei intentionem secundum quam operentur. Strigunt enim poros post solutionem ut dicit Auicenn. & exasperant viscera ut ipse asserit in intentione generali ad curationes generales feb. putridarum & dicit ibi quod si fuerint necessarii quod dentur post digestionem integram materie. Dicit tunc Stephanus Arnaldi in defensorio vite, quod mirabolani mira in feb. faciunt, quia frigidi sunt & a remotis hu. attrahunt, sed bene intelligit quod dentur post perfectam digestionem materie, fiat ergo sic. Reci. corticis mirabolani cirrini. unc. j. chebulid. si esset materia composita ana. unc. vj. conterantur grosso modo & temperentur per totam noctem in viij. unc. lactis amigda. dulcium. Deinde Recip. tamarindi. unc. iij. violę iuvibatarum. unc. j. zuccari. unc. j. fiat lenis decoctio cum qua limphetur potio mirabo. post perfectam frictionem & colaturam eorum. & offeratur vna quantitas secundum vires ægri ad leniendum materiam & ad reprimendum calorem. Aliis potus secundum ipsam. Recip. reubar. nœ. j. & vj. succi rosar. nœ. iij. aquę calide. unc. ij. zuccari unc. j. Dicit etiam ipse, quod scamonea cum pauco mentha & violę in pusana vel cum zuccaro in lacte amigda. est conueniens. Ponit e-

tiam ipse quoddam si. ij. dram. scamoneę pulueri zate ponantur in coctano inuoluto in pasta & coquantur donec pasta sit perfecte cocta sub cineribus vel in furno & abijciatur scamonea & illud coctanum vel pomum offeratur ent delicatum laxatiuum, & purgat choleram in delicatis sine calfactione epatis cum zuccato vel penidijs & pul. sanda. & sirupus viola. & fiat ad modum electuarij, vel confusę & patet ut supra. Si igitur materia feb. magis fuerit phlegmatica quàm cholerica fiat sic. Recip. corticum mirabola. chebu. unc. j. bellericorum turbieth ana. dra. ij. remolliantur per sex horas. in j. l. aqua tepide cum duabus unc. camem passula. ram ad calorem seruientis aquę in duplici vase seruere permittatur, inde enletur & colatura offeratur secundum vires ægri. Si autem in ista fe. continua fuerit phlegma falsum cum cholera mixtum quod scitur ex salledine oris & in ieiunio in salledine spui, æqueis cum tascatione, creatione & ex li. ri continua & prurita de scabie præterita vel præterente. Tunc post digestionem in quõ virtus epithimi & passulę inueniatur purgetur talis huius vt curet fe. & scabies euacuet. Rec. feri caprini. l. j. ponant in eo violę. unc. j. absinthij. unc. vj. bulliant vniço ferore & in colatura dissolvatur tamarindorum. unc. j. Et post perfectam frictionem & colaturam dantur sero vel in medio noctis cognita digestionem materie. Et valet in fe. & in scabie si continentur. Si autem materia feb. tendit ad melancholiam fiat sic. Recip. foliorum fenę. dram. iij. passula. munda. ab arill. unc. j. epithi. dram. j. agarici. dram. vj. omnia temperentur per sex ho. in duabus. li. aquę deinde bulliant vniço ferore & colaturę addatur manę granatę. dram. x. vel magis vel minus. verumtamen sena decoctionem nigram reddit & obest quamplurimum hominibus cholericis & siccis in habitudine idę &c. Ergo locovillius fiat sic. Recip. polipodij querci. passu. munda. an. si epithimi. ana. unc. vj. fiat lenis decoctio in sero caprino in cuius colatura dissolvatur tamarindorum. dram. vj. offeratur colatura, vel purgetur cum reliquis appropriatis. Tamarindi enim cum sua acedine & frigiditate, & euacuatione auerant malam complexionem calidam febrem, & euacuant choleram & humorem adustum. & ideo habent duplex inuamentum.

Hoc autem non est ignorandum, quod hectica febr. continue veniant interdum cum cacochimia propter coactionem humorum; & tunc sunt malitii mali humores, & paucus bonus fuit

Et tunc febricitantia non est exercenda. Dicitur enim. Autem quatuor distinctione primi. c. 2. Cum ergo alicuius fuerit sanguis paucus bonus, & fuerint in ipsius corpore multi mali humores febricitantia bonum rapit & malum relinquit. Iam autem cacochimiam indagabis per faciei plenitudinem in consuetam, & per calorem, vergentem ad plumbeum vel cineritum vel rubrum mortificatum per dimissionem purgationis consuetę per vomitum vel per secessum factum per artem vel per naturam cognoscitur & per crapulam & regimem crapulosum & per quietem & non amorem & per cessationem passionum consuetarum, & sunt species quartę in quibus propter longam durationem & absterentiam non solum boni, immo & mali humores consumuntur. Si militer accidit quando multi humores crudissimi in corpore reperiuntur, tunc enim febricitantia est multum impediens, ut dicitur Aul. in loca allegata. Quatuor sunt rationes.

Dieta febricitantium acuta, circa quam aliqui cano. vniuersales sunt premitendi. Primus est Hippo. primo ampho. amph. i. 6. & transumptus. Aul. in capitulo de curatione febricitantium scilicet humida dietę omnibus febricitantibus conferunt & maxime pueris & alijs sic assuetis refici. Secundus in morbis acutissimis totalis simpliciter cibi competit prohibitio presupposita virtutis constantia de inrentione Hippo. primo ampho. amph. ibi. Ad vicinas agnoscitur & c. Tercius in morbis acutis in quibus virtus est debilis non competit totalis cibi prohibitio. primo amph. ibi. Contemplari autem oportet. Quartus in morbis autem acutis in quibus competit cibis ille debet dari subtilis & non grossus. Causa istorum trium canonum est. ut natura magis occupetur in digestionem materię morbi & non distrahatur ab eadem digestionem cibi. Quin rursus cuique accidit & natura est sicca non cibis penitus ante, si non egreditur foras per feces. Ille est Aul. in prima quart. cap. 2. capitulo de curatione febricitantium. Sextus, necessarius est paroxysmus & exacerbationes stomachi & febricitantium vacuos inuenire ne natura ad cibum conuersa a digestionem & expulsionem materię morbi desistat. Septimus est Aul. in tentio curatiua, in omnibus feb. putridis omnes fructus nocentes febricitantibus cum ebullitione sua & corruptione in stomacho, ideo febricitantes vniuersaliter quasi integratos debent eos edicare. Octauus est. Stephani Arnaldi in defensione vite. Non est vtile nec licitum febricitantes febte putredinali nimis herbis crudis nutriti nisi siat mulce necessitas, quia na-

turam fatigant in digerendo, sicut nec fructibus est bonum vil. Nunc cibaria grossa, & impura & ad putrefactionem conuertibilia sunt apud febricitantes dimittenda.

Decimus cibaria sicciora nequaquam febricitantibus conferunt nisi extendens sit laxatio ventris. Undecimus dulcia cibaria in acutis feb. non sunt vitia nisi pestus aliquantuliter patiantur. Inter cetera cibaria acutę febricitantibus vitia & amica. pisana colata, & non colata. obinet principatum postquam hordeatam apud me sit collocatum. Duodecimus, potus aque hoc dei prius alijs potibus interueniens & melior inueniunt de competentę. Decimus tertius, tenet in morbis dietę omnium febricitantium sit facilis digestio & inquam secundum poros detenta. Decimus quartus, ubi virtus est debilis & siccus & morbus plus de cibo & grossiori est ministrandum, ubi autem virtus est fortis & siccus propinquus nihil de ciborum parum de subtiliori est concedendum, inter vtique de dispositionem istorum oportet medicum concedere secundum estimationem, veritatem propinquam, quia quam tunc offerendum, certis litteris denotari non potest ut dicit Galenus in techi. Decimus quintus, corporibus calidis & siccis cito resoluabilibus non solum semel sed bis ter die cibos est exhibendus & calidus multum valeat frigida & humida. Si tamen viscosa non sunt nec multum nutritia mech. particula. & colz. & hoc si quia in istis multum timens de hectica. Dieta particularis febricitantium acutę. Cum ergo videris se peracutum quam potius indigere per calorem & feruorem inrentiam, & aliquando cum magno dolore capitis & per iniquitatem & angustiam magnam, & per alias symptomata retroverit facientia, ista iniqua prius ostendunt morbum esse peracutum, & materiam peracuti istam & velocissimam modum habentem fore & venit crassum quattuor diebus sic apparentibus nihil potius pro cibo ministrabis, solum autem aliquam hordei propinabis vel aliquos frumens vel pottus alteratiuos vel est frumens acerosus oxiracena ulep. Alexandrinum, Rob de succis frigidis vel rob de agrestris & rob de succo acetosę & rob de fructibus acedule, & similia. Si tamen esset infirmus in aetate puerili vel in senili vel esset complexionis calidę & sicę vel esset multum rare habitudinis cum apertione & raritate, pororum quod appareret quia frequenter in sanitate ex modica causa sudabat vel si haber in consuetudine comedendi plurimum & frequenter, vel si aliter est debilis multum. Si enim aliquid de istis vel maior pars intendant concedimus

et auenatum, vel hordeatum clarum in primis tribus diebus & si crasis sit in quarta die illa die nihil datus de cibo: Si crasis usque ad septimum diem differat dictos cibos concedimus usque; ad sextum diem in clausis & succos malorum granatorum & sirupos alterantes ardorem febris acutæ. In septima autem nihil cibale nec medicinale penitus est offerendum: sola enim aqua hordei in magnitudine sitis in parua quantitate est tribuenda. Vbi autem agritudo procedit usque ad 11. vel 4. concedimus hordeatam factam cum lacte amigdae & cum lacte. 4. se. frigidorum maiorum, & anenatum similiter conditum & tus parat pulle coctæ cum lactucis vel frusto cucurbitæ viridi vel pisciculis squamosos boni saporis de aqua eutrentibus maxime impetuose super lapides & aliquando pro appetitu concedimus de pomis, vel pitis observatis ad hyemem coctis in tineribus cum aliquantulo de zuccaro. Aliqui dant auenam fractam vel capdarosam cum lacte amigdae & ponit in cucurbitum. Nos vero in eo ponimus granatatorum propter sapiditatem & infriagationem vel parum de succo vel aceto sinu alimon non vel pini citrini vel a range, per hoc enim appetitus roboratur, & cibis sapidiore & frigidiore inuenitur aliquando datur colatura sorfasis frumenti cocti cocta ad mediocrem spissitudinem cum pauco zuccaro. Comeditur etiam mica panis frumentitior vel quater tota in aqua frigida & vltimo cum aqua ros. non siccatis manibus, refrigerando enim nutrit si superparatus zuccari panis, sed non tantum refrigerat. In regionibus hispanie medici & medicæ multum videntur ure cicerum betuorum. Aliqui concedunt spinargia & lactucas per æquales partes coctas cum lacte amigdae. & se. frigidorum maiorum, conceditur & dictum lac bullitum & superparatum super panem terlorum superparato zuccaro. Dant etiam pruna dama scena in aqua frigida lota & temperata seu remollita. Aliquo etiam concedunt racemos hyemales in tempore vindemiarum suspensos, vel lactucas & portulacas & parum end. bullitas in aqua qua abiectæ, addatur acrum & comedantur, ista enim sustinent naturam & non augent, immo minuant & non sunt grossi immo ad latus subtilitatis magis trahunt. Similiter panis simile solutus in aqua frigida, & est secundum panis frumentitioris granatorum mellitarum parum commixtionis, ita quod ibi sit multum de aqua & parum de melle vel zuccaro. Illa autem que trahunt ad latus grossitie sunt perdicæ pulli gallinarum capreus & extremitatum ouium oua sorbilia & zuicula campestres pedes &

auriculæ porcellorum pedes montonis perfectæ cocti pisces squamosi de aquis mundis currentibus et semine cucurbitæ, & tantum, de amigdae dulcibus extrahatur lac & ponatur cum avena fracta vel cum spelta mundata fracta, & poquantur ad perfectionem & offeratur. Si autem esset multum debilis vel indigeret fortificatione virtutis, fiat cibus albus cum dicto auenato addendo pulsam galinæ bullitæ & zaccarum. Quantum ad potum febricitantium acute oportet quod vinum postponatur & toralier relinquantur assis in sincopi vel to nimis virtutis debilitates sed detur aqua hordei vel detur in tersum aqua in qua temperetur & malaxetur mica panis simile vel panis hordei & offeratur. Sed nos nequaquam habentes feb. pn. balneare dimittimus, nec eis cataplasmata nec emplastica frigida nec calida, nisi post purificationem totius corporis. Cum corpus perfecte purgatum fuerit balnea & lantra & episthymata fieri iubemus. megatechni particula vnde cina. colundelo tertio. Alius modus, & opinio quantum ad modum gubernationis in horum febricitantium acute est apud aliquos de hispanis vt ego vidi. nam in illis regionibus hispanie multi de istis intensionibus, & est quæ febricitantes non frequenter muret lectum, immo nec interminis permittunt mutari usque ad crismis dicunt enim quod calor lecti attrahit calorem & vaporem ad præterea, & sic minuitur febris calor, & natura fruentius operatur in digestionem materis feb. quando patientis stat in calore reflectionis sui corporis quam si frequenter acci frigido exponeretur. Et dicunt quod non valeret tantum si interminis recentia in calore solis vel ignis caleficerent, quia non tantum est similis calori corporis. Et si quis hoc perspicue dignaretur in ueri aliquam veritatem sciam illam inueniret. Et ideo communiter operando quando agri in lecto existentes se dicto cooperiunt existentes, faciunt eos melius cooperiri. in primo de feb. ad Glayconem in cura se. acuarum dicit. Continua vero feb. quibus quidem status non procul a 7. esse debet & est virtus fortis, & ea que ætatis sunt concordant certe & valde subtiliter oportet deigere, quibus autem procul a 7. est status totius ætatis in iudicio aut ea que virtutis non sunt bene robusta secundum principium quidem grossius, prope vero statum tenens & in statu & in istis existentibus tempissime digere. Hæc sunt verba Galeni vbi supra. Et pro cibo iubet ibidem Galenus dare pitinam & hordeatum, & mellitarum, nisi feb. esset ita fortis quod mellitarum ratione mellitæ, conuerteretur in cholera. Et iubet ibi da-

re candarum per quod intelligo hordeum mundatum fractum grosso modo aut avena & spelta mundata & simili modo fracta. iubeat etiam dari panem lotum per aquam frigidam &c. Et sequitur in fine. In vero calidis & causonibus quando primo videris digestionis signa: eris audens aquam frigidam dare bibere in multitudine dationis commendatur horam & regionem, & etatem, consuetudinem & naturam. hec ille.

Declaratio in fe. acuta continua, primo intelligendum secundum Galenum in de differentiis febrium, quod prima causa in febre, put. quantum ad curam consideratur plenitudo corporis quo ad vasa vel quo ad virtutem, secundum consideratur oppillatio viarum & pororum. Tercio consideratur detentio materię & prohibitio respirationis & euentationis propter conculcationem ex qua co-culcatione hu. sequitur putrefactio & ex putrefactione fumus eleuatur qui proueniendo ad cor facit fe. hæc sunt verba Galeni vbi supra. Et in isto continetur in sententia modus generationis febris putridę & causę eius & modus curę. Secundo nota quod in cura febris, secundum Galenum mech. particula 8. col. primo quod in fe. putrida causa se permanentem necessarium est primo putredinem excludi, deinde malam complexionem curari. Ex isto sequitur quod alteratio male complexionis debet sequi purgationem statim, & remotionem putredinis. Et sequitur etiā q. epithimata frigida sup. hepar, vel sup. pulsum vel sup. frontē & rpa in principio nec augmēt. apponenda non sunt sicut faciunt aliqui ignorantes medici in arte medicinę abortiui. Tercio notandum quod in fe. acuta aliquando competit flebotomia, sed aliquando postponitur propter indigestionem ciborum assump. prorum vel humorum qui adhuc stāt semidigesti circa epas & venas eius. ideo in prima & secunda die omittatur flebotomia. In tertia autem die interdū postponitur propter motum materię fe. acutę quę vt plurimum est cho. vt dicunt auctores, motus autē cho. in tertia die celebratur & tollitur cum muniter ante flebotomiam; ergo in prima die flebotomia dimitienda est propter constipationem, in secunda propter crapulam, vel indigestionem, in tertia similiter propter insultum materię chol. Et ideo aliqui in co-tinuis fe. non flebotomiant vsque ad 4. diem attamen si san. vincit; facia principio flebotomiam nisi virtus aut ætas aut crapula non consentiant, vel cibus indigestus nouiter assumptus. Hęc enim solent flebotomiam impedire ne fiat in principio vt dicit Gal. in libello de flebotomia. Quarto in ordine no-

tandum quod medici præcipue Aui. & Iohannicius distinguunt fe. per calorem dicendo q. feb. est calor extraneus &c. Sed hoc videtur falsum, quia si sic: tunc ad feb. esset motus, consequens est falsum, igitur & illud ex quo sequitur, quod consequens sit falsum probatur per Auer. 3. col. 3. c. 1. vbi dicit quod omnis morbus est mala dispositio. modo dispositio est de prima specie qualitatis ad quam non est motus 7. physicorum probatur consequentia, quia calor extraneus acquiritur per alterationem in qua est motus igitur &c. Secundo ad idem, si prædictio esset vera tunc calor caperetur pro corpore calido aut pro sola qualitate a sufficienti diuisione data a Gal. in commen. Et qui crescunt non primo modo, quia fe. est motus & morbus est accidens, & accidens non est corpus nec 1. quia feb. mouetur a corde in totum corpus, vt ponit Aui. in diuisione. modo nullam accidēs mouetur de subiecto in subiectum, quia accidentia indignantis naturę sunt. parum enim possunt mutari aut nequaquam vt ponit autor 6. principiorum. Tercio sequetur quod duo contraria essent in eodem, subiecto adequato: consequens est falsum contra Arist. in post prædicamentis, & contra Gal. in 1. de complexionibus. probatur consequentia, quia in fe. liipparia interiora sunt frigida. Et tamen per fe. est in corde, ergo calor febrilis & frigus simul essent in eodem loco, quod est absurdum. Oppositum dicit Aui. in prima 4. c. 1. dicens quod fe. est calor extraneus &c. Et probatur ratione fe. est mala com. ergo vel est mala com. calida vel mala frigida vel mala humida, non frigida non humida nec sicca per fe. quia nulla istarum apparet ad sensum tactus, ergo est mala calida consequentia nota est. antecedens est Gal. 8. de inge. cap. 1. vbi dicit quod fe. est quidam morbus ex mala complexionem corporis &c. ergo fe. est calor extraneus præter naturam quod suis probandum. Pro ista questione est notandum quod capiēdo calorem præter naturam pro corpore calido sic feb. non est calor præter naturam, quia febr. est morbus, & omnis morbus est accidens morbi, modo accidens non potest esse corpus, imo distinguuntur. ergo fe. non est calor præter naturam sumendo ly calor pro corpore calido. Confirmatur, quia tunc sequeretur, quod duo corpora essent simul in eodem loco adequato, quod est cōtra Arist. 4. phi. probatur consequentia, quia feb. est simul cum spiritu & sanguine, & sic corpus esset in corpore simul & esset corporum penetratio, qđ est falsum, quia nullus dubitat quod calor naturalis & spiritus sunt corpora, vt dicit haly,

Haly. 3. tech. commento illius cas. Et ex accidentibus animæ. Item notandum est, quod aliqui dicunt quod febr. est calor sumendo ly calor pro caliditate sola in spiritibus, & sanguine existentes & in toto corpore. Et isti bene dicunt quamvis non bene declararet, qualiter & per quem modum febr. est calor propter quod est notandum quod quando Avic. & Gal. dicunt quod febr. est calor extraneus accessus in corde procedens ab eo in totum corpus mediante calore & spiritu, non intelligit quod eadem caliditas numero que est in corde moueatur a corde & transeat ad totum corpus, sed ille calor qui est in corde causatur alium calorem extraneum in sanguine, & venis, & arterijs propinquioribus cordi, & ille nominat causatur generat alium & ille alium, & sic procedit ad totum corpus nisi sit aliquod prohibens & est simile de hyste ferrea cuius grossa extremitas posita in fornace calefacta a calore fornacis exinde calescit pars sequens & illa calefacit aliam donec caliditas venit ad magnam distantiam: vel est simile de stupha protensa in terra. si ignis ponatur in vna extremitate tota stupha inflammabitur vsque ad aliam extremitatem non est tamen in relinendam, quod prima flamma vel caliditas que erat in prima extremitate transeat ad aliam, sed illa prima generat aliam & alia aliam, donec tota stupha est inflammata, vel est simile de candella, quia non est eadem flamma vel caliditas in fine, quia fuit in principio, sed prima generat aliam, & alia aliam, & sic per continuum generationis flammæ ardet tota candela successiue, quia caliditas cum sit accidens non transit de subiecto in subiectum, sed cum sit magnæ acuitatis apendo multiplicat species suas per diuersa subiecta propinqua. Tunc respondeo ad quæsitum & pono. 4. conclusiones. Prima est cum dicitur quod febr. est calor extraneus &c. Dico quod ista prædicatio est effectus id est quod ille calor extraneus accessus in corde facit febr. multiplicando suas species mediâte sanguine & spû per venas & arterias per totum corpus ita quod febr. est effectus caloris extranei cordis multiplicantis species suas mediâte sanguine & spiritu per venas & arterias vsque ad totum corpus ut dictum est. Ista conclus. probata est per notabile immediate dictum. Secunda con. pro iuuenibus disponere volentibus. Febris non est calor formaliter. probatur, sanitas non est formaliter calor temperatus. igitur nec febr. est formaliter calor distemperatus. igitur tener consequentia, quia sic se habet sanitas ad temperamentum sic egri. ad distemperatum per Gal. 1. de morbo. probatur antea-

dens, quia calor naturalis temperatus solum est instrumentum virtutum spirituum & operatio inembrocum & hu. sanitas vero dependet ex temperamento omnium istorum, ergo sanitas non est calor temperatus. Secundo confirmatur con. si febr. esset cal. formaliter distemperatus tunc se. & sanitas sibi op. non differrent specie. consequens est falsum patet, quia febr. & sanitas sunt contraria, & contraria differunt specie: ut haberetur in post prædicta consequentia probatur, quia calor naturalis temperatus & calor febrilis distemperatus non differunt formaliter in specie sed sicut intensum & remissum que in specie non differunt. 4. meta. & Gal. 1. de differentiis febr. c. 1. Tertia con. febr. est calor distemperatus extraneus effectiue ad istum sensum quod febr. est effectus vel mala dispositio causata immediatè a calore extraneo vel a calore præter naturam. probatur per supradicta & probatur ratione. si febr. esset calor præter naturam vel esset in genere causæ efficientis materialis formalis vel finalis a sufficienti diuisione, quia non sunt plures causæ. non materialis, quia calor præter naturam non est materia febr. nec in genere causæ formalis ut visum fuit in 2. conclusionem, & quia substantialis forma introducit subito & non successiue. nec in genere causæ finalis, quia finis est operatio, ergo est in genere causæ efficientis quod est quid magis notum, ergo se. est calor effectiue & non formaliter quod fuit probandum. Sed circa hoc intellige quod iste locutiones quamvis intendunt ad veritatem & sint vere, tamen quodammodo transcendunt sensum medicum: modo sic est quod consideratio totius medicinæ non pertranseat sensum 3. tech. com. illius cas. Quam forte aliquis non &c. Et medicus est artifex sensibilis ubi supra ibidem. Omnibus his sensibus indicatis. Ideo magis intendere debemus ad realitatem causæ quam ad argumenta, quod enim pertinet medicinæ non est aliud nisi medicum investigare qualiter eger ad sanitatem reducat verba sunt Gal. 9. de inge. c. 2. Ideo aliter est dicendum secundum medicos loquendo, & sic hæc con. Calor præter naturam in corde & in alijs membris & febr. sunt idem penitus secundum medicum. probatur. Calor præter naturam in corde existenti & in alijs membris & febris debetur idem modus curandi. ergo sunt idem secundum medicum, quia medicus sumit differentiam in rebus ex parte finis, quia finis me est curare & gritudinem & sanitatem conferre & probatur antea dens, quia eisdem medicinis remouetur se. & calor præter naturam, & istud intendit Auicem. in diffinitione sua, quando

do dicit. Si intendatur se. in corde intensio-
ne prima; &c.

Et per hoc ad rationes ad primā qñ dicitur
q sequeretur, q ad se. esset motus dico quòd
haberetur locum si se. esset calor formalis. sed
quia non est calor nisi effectus, ideo non va-
let. Ad secundam, vnde dicitur si predicatio
esset vera, tunc calor caperetur pro corpore,
calido aut pro sola qualitate &c. Dico. q. q.
feb. est calor sumendo ly, calor pro caliditate
sola & ad probatioem dico, quòd ille idem
in numero quæ est in corde non mouetur ad
totum corpus, sed ille causat alium, & sic de
aliis docet per totū corpus sit expansus. Ad
tertiam dico quòd non valet quia quamuis
io liparia interiora sūt frigida, tamen non
propter hoc sequitur quòd cor sit frigidum;
quia quando dicitur quòd io liparia interio-
ra sūt frigida illa est quidam propositio in-
definita oō vniuersalis, & sic patet quid dica-
t ad omnes rationes. Quarto in ordine ootabi-
lilium nota quòd in acutis ægri. medicus
debet habere mentem ad dies indicatios &
ad criticos, vnde si crisis debeat fieri in 7. die
per sudorem. tunc in 4. quæ est eius indicati-
ua habebit aliquid de sudore vel vapore pro-
cedente ab opere nature. Si autem crisis de-
beat fieri per vomitum in 7. die in 4. habebit
nauseam vel vomitum in parua quantitate &
sic intellige de omnibus diebus criticis in
comparatione ad omnes dies indicatios &
demonstratios, & fere nunquam. 6. dies est
bona ad laudabilem crism. Quinto ogra-
dum est quòd non solum febr. acuta continua
immo fere omnes ægri. curabiles habent 4.
tempora scilicet principium augmentum, sta-
tum, & declinatioem. Principium est cum
manifestum nocumentum & debilitas & fra-
gilitas in cōsuetis agilibus inuenitur, & cum
hoc oullum signum digestionis in vrina ap-
paret, nec io sputo, nec in egestionē. Augmen-
tum autem est quando exacerbatio vel paro-
xismus augetur & anticipat horam & lon-
gior efficitur, & calor & sitis angmentatur,
& similiter alia accidentia feb. augmentatur
& alleuatio modica vel valde occultata sit tūc
feb. est in augmento. Et si tunc signa digestio-
nis incipiant apparere tunc erunt signa præ-
terita, signa augmenti magis certa. Status au-
tem est quando accidentia & synthomata se-
continue vltimantur, vt est io somnietas. ca-
lor sitis intolerantia, & tunc apparet perfe-
cta digestio in feb. curabili vel sananda. Si
tunc oulla digestio apparet erit signum mor-
tale, tunc quantum est primus status febre,
acutæ. Declinatio autem scitur per qualita-
tes & dispositioes contrarias dispositioni-
bus supradictis, vt quando calor & sitis, &

alia accidentia diminuuntur & æger maiori
festam sentit alleuatioem cum bona tole-
rantia & appetitus ad cibum aliquid meli-
oratur & confortatur & præcessit crisis cū
aliqua manifesta euacuatione, tuoc est decli-
natio prædictæ febr. acutæ & vniua apparet re-
missa & pollus bonus & equalis quamuis de-
bilis. Et secundo ista tria oportet eos purga-
re & diætare & flebotomare secundo cum
superius scriptos, vnde cum magna molestia
& synthomatum angustia signū est, quòd est
brevis temporis & citæ terminationis & vo-
cabitur acutus vel peracutus vel peracutissi-
mus; quòd idem est secundum quatuoratem
molestiæ synthomatum & talis cito ducit æ-
gerum ad mortem vel ad vitam. Et istarū bre-
uitas vel prolongatio ex breuitate vel prolō-
gatione suorum principiorum cognoscitur.
Correspondet enim principium alijs tempo-
ribus secundum proportioem, nam si io
prima die apparuerit signum digestionis in
vrina tuoc in illa die est extra principium &
incipit augmentum, & sic alia tria breuia io-
ueciuntur. Sexto sciendum quid in feacu-
tis contiovis & ardētibus semper debemus
intendere ad infrigidationem & rectificatio-
nem hepatis. Aliquando embrocis aliquan-
do epithematibus frigidis obseruatis tamen
cū supradictis, & ideo dicit Auic. io illo. c.
Corationes se. acutarum, & embrocare be-
par cum rebus infrigidantibus est res maxi-
ma & magis inuans. nam cum æquatur ho-
par, est in eo maior pars rectificatiois & for-
tasse rectificat aquam, id est vrinam. Septi-
mo nota secundum Auic. ibidem quòd quan-
do medicus vider aliquem febricitantē som-
nulosum & fortē habet humidum nasum,
& multitudinem saliu tunc non facias em-
brocationes capiti, nec epithimata refrigerā-
tia nec somnifera, sed illud in trahendo ma-
teriam ad partem inferiorem cum clisteri-
bus & fricatione partium inferiorum, &
hoc fit ne cadaat in lithargiam. Et si forte ap-
paret rubor io facie & naso non est malum si
san. cum setis porcinis a naribus extrahatur,
& hæc est sententia Auicen. vbi supra.

Ostendo scias secundum Gal. de crisi. c. 14.
hoc dicit autoritate Hippo. quòd ægritudo
non vocatur acuta vt plurimum oīli cum fe-
est continua, & dicit in c. 17. quòd ægritudo
in qua venit crisis, cum velocitate, & io 4.
die est talis io hoc acutioris, id est non potest
esse plus acuta. 3. de crisi. c. 48. Et ponit ibi q.
Archigenes. non vidit hoc oīli bis nec ipla
Gale, hoc vidit nisi semel. Ego autem istum
quononem vidi tempore meo vna vice in vi-
ro iuuenē, & alia vice io muliere similiter iu-
uene. quoc amplius videbo. Deus scit. sub

fit honor benedictio & gloria.

De tertiana vera. Cap. VII.

TERTIANA est in triplici differentia quædam est tertiana continua: alia est interpolata & ista diuiditur quia quædam est vera & alia nota, sed de tertiana continua pro nunc taceo, quia eadem causa & eadem materia est veræ tertianæ & cansonis, quia nulla est inter causam & tertianæ veram differentia quantum ad materiam vnde generantur ambæ se. Ambæ. n. a scilicet ut cho. ru. verba sunt Gal. 4. amph. 59. ibi est. Tertiana vera, dicimus igitur quod tertiana vera est feb. interpolata proveniens ex cho. ru. extra venas putrefacta. ista autem vocatur a Gal. primo de febr. ad Glauco. c. 5. Et ab Anitra. 4. prime. fen. 4. ta. c. de tertiana absolute tritæus. Circa quod est sciendum quod cho. aut putrefit intra venas, aut extra, si putrefit extra venas facit feb. tertianam interpolatam. Si cho. putrefit intra venas remoras a corde facit continuam. Si autem putrefit in venis proximis cordi, vel in venis oris stomachi vel hepatis tunc facit cansonem de quo postea tractabitur.

Causæ veræ tertianæ quædam sunt primariæ alie antecedentes alie coniunctæ.

Primariæ vt nimis labor & exercitium maxime in tempore calido & longus vsus rerum multiplicantium cholera & calefactionem hu. sicut sunt allia piperata & res in quibus multe species ponuntur, & vsus zingiberi viridis & vini puri acuri calidi & vsus neccatis, omnia ista multiplicat cho. ru. que augmentata & multiplicata ultra mensuram in corpore nequit gubernari: immo destituta à gubernatione nature concalcat & non euentatur, & putrefit in loco minere & extra vasa & sic causat tertianam interpolatam affligentem vna die & alia non.

Causæ antecedentes sunt multa chole. in corpore existens & nondum a regimine nature derelicta similiter coplexio calida & sicca cholectica, ga coplexio q̄ citius recipit fe. est coplexio calida & sicca. 8. de inge. c. 7. Alia cō pōt esse mala coplexio calida vel calida & sicca hepatis, nā tales parati sunt ad feb. vt dicit Auic. 3. can. fen. 1. 4. c. 14. de signis malitiae complexionis calide. Causa coniuncta tertianæ quædam est præcedens vt est concalcatio & non euentatio humorum. Alia causa coniuncta subsequens istam cōcalcationem est putrefactio istius hu. cholerici. testem habemus Halyrodoaham sic dicentis. chimia. n. non putrefit donec prohibeatur eius respiratio & non prohibetur eius respiratio donec multiplicetur: vt non toleret eius virtus

ipsum & cessat a regimine eius. & quando natura cessat a regimine eius & putrefit. hæc ille. 3. tech. com. ibi. Euacuationes enim si ita contigat. Effumatio verò quæ fit à putrefactione vel inflammatione fumigantis a minera sunt causæ coniunctissimæ se. putredarum tam continuarum quàm interpolatarum simplicium & compositarum.

Signa tertianæ veræ ponuntur a Galeno primo de febr. ad Glauco. c. 4. sic. Ea que cum vehemendi rigore incipit. coaruescit. potius tertianam quàm aliquam aliarum se. esse, & sequitur. Alia vero signa sunt calbris quantitas & qualitas & arteriarum motus sequitur. calorem enim multum & aerem iusto oportet. pulsus autem magnos veloces & spissos & absque qualibet inæqualitate præter febrilem rigorem enim sentiuntur ac si corpus pungeretur cōp aliquo acuto magis quàm frigidum & lingua & vniuersum corpus est siccissimum in tertianis & sequitur cuius enim tertianæ venæ omnino paroxysmi tempus est breue horarum alicubi. 4. 5. vel 6. aut ad longissimum. 11. vel 12. de fe. ad Glauco. c. 5. p̄ n̄ curetis à Rū in diuis. quia ista febr. incipit cum horripilatione simili puncturæ acutæ & non prolongatur spacium horripilationis nec concutitur propter eam dentes nec est magnum frigus sed vtrū cum acubus, vel sp̄is pungētur & aliquando in frigiditatem manus & pedes. Et dicit Am. quod si paroxysmus transt. 1. 3. horas non est tertiana vera: ipso nocte. Incipit enim paroxysmus cum vehemendi rigore maxime in primis paroxysmis ac si acubus vel sp̄is pungētur. Et quantum rigor sit vehemens cum frigore tamen paulatim & velociter minuitur cuius oppositum sit, in quartana: vrina est rubea tendens ad igneare cum subtilitate substantiæ vt plurimum, & si tangatur corpus sentitur magna caliditas non tamen penetrat manum si diu super corpus teneatur. si cur sit in causone & in alijs se. continuis acutis & dicit Auic. quod accidentia: quæ accidunt eis sunt vigilie sine gramitate capitis nisi in quibusdam non puris tertianis & adest tū furor & ira & odium locutionis & pulsus acutus & velox per comparationem ad reliquas se. & non equalis constrictionis & dilatationis est tamē in principio parvus & in statu paroxysmi fit magnus & resoluitur paroxysmus cum sudore, & si alia particularia concurrant tū certum signum est quod est vera tertiana vt si est inuenus cholericus; & tempus ætas & habitudo corporis macra & regimē præteritum multiplicans cholo. cum dicta & cibus & potibus calidis & siccis vel si habet lunem vorem, & vsus fuit coita

omne immoderato, & dicit Constan. quod proprium est huic feb. habere vomitum cholericum & gestationem tinctam & citrinam maxime post tres accessiones vel 4. Et dicit, q. sepe habent puncturam in hepate propter choleram sang. mixtam. Et dicit viterius Galen. Et iterum videmus in tertiana vera quamvis materia eius sit cho. ru. plusquā in ceteris fe. tamen febricitantes maiorem rigorem atque tremorem habent quā ceteri febricitantes. Et quanto materia erit purior, id est cho. pura, tanto rigor est fortior. 5. de morbo. c. 8.

Indicia in tertiana
Primo iudicat Hippo. tertiana vera in 7. periodis iudicatur longissima 4. amp. amph. 59. Item dicit Gal. 1. de febr. ad Glau. & in li. de differentijs Febr. 4. c. proprio.

Secundo iudicatur per Gale. quod tertiana est sine periculo primo de febr. vbi supra sc. Certa aut tertiana longissima in 7. periodis iudicatur cum eo quod est sine periculo. 1. de febr. ad Glau. c. 9.

Tertio iudicatur sic tertiana vera velox est & brevis & vicinam facit crisi in aestate tamen brevis in hyeme vero longior sicque aestas morbos abbreviat. t. ampho. comm. 1. 2. ibi proximos & consistentias.

Quarto dicit Gord. quod primus paroxysmus est debilis & secundus fortior tertius fortissimus quartus fortissimus omnium ibi enim est status & fortissima accidentia in ultimo acuitatis, & cetero incipiunt paroxysmi gradatim deficere vsque ad 7. qui parvus est vel nullus in vera tertiana nisi error incidat ex parte medici vel infirmi, & hoc debet medicus per dicere.

Quinto dicit Rasis in diuisione, quod status istius fe. est in 4. paroxysmo & frequenter finitur in eo & non transit septimum.

Sexto & cum vides principium cum rigore & statum cum sudore exuberante, tunc nō dubites quin ipsa sit pura. 7. Halya. Theo. Si tertianarius vlcera in labijs fiat & naribus fe. finis significatur.

Ratio vera tertianæ.

Primo hic debent notari omnes illi causæ universales qui fuerunt scripti in ca. de febre contin. acutis, quā quamvis tertiana non sit continua, est tamen acuta quia in 14. diebus terminatur vt statim dictum est, auctoritate Hippo. Sed primus generalis causæ. spectans ad curam tertianæ trahitur à Gale. primo de febr. ad Glau. capitulo de cura tertianæ veræ sic certam igitur tertianam tamquam à cho. ru. motam fortissime hāere & in frigiditate oportet maxime in quantum possumus contraria enim contrariorum sunt sanatio.

nes vbi supra.

Secundus est Gal. ibidem sic. Cholera enim est humor omnium eorum qui in corpore siccissimus simul & calidissimus existit provocare. igitur eum qui ad ventrem sunt humorem euacuarē per vomitum, illum vero qui deorsum ibi eodem modo per evacuationem inferiorem. hæc ille ibidem.

Tertius est Gal. ibidem in forma. cibaria vero quæcunque hāereant proficua sunt istis tertianis: supple nisi in se habuerit aliquam malam qualitatem paratam putrefactioni.

Quartus causæ est Haly de regali dispositio. n. in li. 3. secundæ partis. Cura tertianæ, & omnium febr. pu. stat in euacuatione humorum facientium eas & in extinctione caloris, & quia tertiana vera materia non est, tantæ quantitatis sicut est calor, ideo in hac feb. magis intendimus ad alterationem quā ad euacuationem, quamvis competens euacuationis semper sit premiitenda vbi competit.

Quintus non parum qui tertianam pariatur ventris constipatione molestantur ideo non laboriose sed leuibus laxatiuis aere hiliti lenitio a principio oportet clausam potius aperire & linire intestina & humores pro viribus diminuerē & mitigare.

Sextus sicut comestio fructuum recentium corpora humana ad se preparat putredinales, sic etiam ad earum augmentationem, & conseruationem alimoniam & alimentum videntur prestare ideo non solum in tertiana, immo in omni feb. pu. sunt postponendi.

Septimus est Rasis ad alman. li. 10. cap. de tertiana inter comestione & inuasionis principium sit lōgum tempus (scilicet, quod nutritur tribus horis aut duabus aut equum se accidat aut eorundem horis postquam febr. recesserit. hæc ille.

Ostans est Serap. in li. 6. Cum ergo declinatur digestio in vrina tunc oportet euacuarē materiam per partem ad quam declinat iste causæ, quantum ad primam partem conseruatur per Hippocra. ibid. Digesta medicari. Et quantum ad secundum conseruatur per eundem ibi. Undeunque repetit natura & c.

Nonus si in declinatione paroxysmi super supernederit in quocunque tempore totus egri, venerit vultus expectandus est nisi ipsum aliquod malitiosum sint ho. vt est sympto- pis sequeretur.

Decimus in principio paroxysmi a somno & potu abstineant febricitantes, somnus cū materiam ad intra recludit, & potus naturā à digestionē, & expulsionē materię cogit retrahere.

Undecimus est Gordo, in suis vrinis. Nunquam in tertiana sibi otomia competit, nisi post

pūst tres aut quatuor accessiones, ita etiam, quod signa digestionis appareant, & virtus sit fortis.

Dundecimus est eiusdem ibidem in principio tertianæ non dentur mirabolani, quia laxant in principio, & in fine constingunt.

Decimus tertius scamonee nō detur in principio tertianæ, quia inflammabilia est, ideo non competit cuiquam in æstate, idem Doctor ibidem.

Decimus quartus nullum acetosum detur si malum cum pituita, quia vnum aliud corrumpit nisi expectetur tempus, quod vnum primum stomachum exierit.

Decimus quintus reubar. cho. purgat caliditate, & post se calorem dimitteudo: idcirco in aqua end. temperandum est, ante eius dationem.

Decimus sextus cum clisteri aut aliquo laxativo ad interiores partes statim materia trahatur, ubi raptus eius timetur ad caput. caput quonque ne illam recipiat, confortetur. isti enim casu. & alij prædicti in capitulo præceden. observentur.

Cura particularis veræ tertianæ. In primis si reperitur constipatio iuxta doct. 5. can. fiat tale clistere lenitium & mollium. Recip. maluz, bis maluz, violariæ, brancherzsq. ana. m. 1. sursuris. p. 1. sit decoctio, & in colatura dissoluatur cassiæ sumund. vnc. r. & se. olei violæ. vnc. 2. salis communis dram. 1. & s. fiat clistere ad quart. 5. detur de mane & statim sit talis sirupus.

Recip. end. non lotz, scariolis, lactuce, portulacæ, rostri porcini, hepaticæ summitatū papæ ana. m. 1. 4. se. frigidorum minorum florum violæ, florum nenufa. ros. ru. ana. nnc. s. acetū al. unc. 3. zachari panis lib. 1. sit sirupus: & in clarificatione ponatur se. portulacæ fan. al. spodij. ana. dram. 2. campbo. dra. 1. iste sirupus infrigidat & ingrossat materiam cholicam, & ipsam digerit si magna est putrefactio & oppilatio, quod scitur per longum paroxysmum, & malitiam eius. detur iste sirupus cum aqua decoctionis cicero, vel detur cū aqua hordei simpliciter. In quarto autem die, & post secundum paroxysmum iuxta tenorem quinti can. detur ista medicina euacuativa cholericæ rub. & molliens ventrem. Recip. carniū prunorum damasce. 5. numero, viol. vn. 1. tamarindorum vn. s. bulliant omnia unica bullitione, & post fortiter cum manibus fricetur & coletur, & colaturæ addatur cassiæ sumund. vnc. 1. sit potus, & iste est aliquando tantæ virtutis quod tota se. recedit: & aliquando excusat nns ab omni alio labore: quia radices se. truncat. Post tertium autem paroxysmum in die interpolationis, si urina appa-

ret rubea, & aliquantulum spissa, sit flebotomia de basilica, & extrahatur de sanguine secundum quantitatem repletionis. Ego autem tempore meo feci fieri hanc flebotomiam frequenter in tertiana & iuvene cholerica, cuius urina erat ignea, ostendens dominium cholericæ magis, quam sanguinis: & semper me bene reperi, & hoc sit propter infrigidationē, & euentationem quæ flebotomia inducit & diminutionem feruoris sicut apparet quādo nlla bullit fortiter & propter magnum feruorem & ebullitionem aqua resiliit ad extra, & si notabilis illius aque feruentis quantitas auferatur, feror vique diminuetur, & aqua exterius non salubri hac allegoria declarat quantum flebotomia vel minoratiua pharmacia in feruore humorum, & in tertiana & se. putrida afferat iuuamentum similiter in peracutis. Si autem in illis temporibus veniat vomitus cholericus, vel egessio cholericæ nullo modo sistatur nisi multum superfluat, quia curatio sunt veræ & notæ tertianæ si aliquid de phlegmate cum cholera eiciatur.

Si vero per hoc paroxysmus non videatur minui, iterum purgetur patiens cum dicta medicina, vel cum ista. Recip. vnlubilis minoris florum violæ, boraginis, & buglossæ pass. mundæ ab arill. ana. vnc. 1. sit decoctio in qua dissoluatur manne granatæ vn. 1. vel cassiæ sumund. tantumdem. reubarbari. dram. 1. Gal. primo de feb. ad Glau. vult quod sit clistere de succo cicule cum sale & oleo ros. & zaccaro rubeo.

Et vult Gal. ibidem, quod quando signa digestionis apparent, detur de absinthio, de cuius puluere secundum aliquos dantur dram. 2. vel detur de decoctione eius facta in aqua cum zaccaro, vel secundum Gal. extremitates eius ponantur in mellificato, & sumat patiens, ad corrigendum stomachum.

Tunc etiam antiqui scilicet post signa digestionis balneabant in aqua dulci tepida, & valet eis, ut vult Galen. ibidem: cauendo tamen balnea naturalia, & aquam salinam, propter clausuram pororum. Idem dicit Serapio. sic. si febr. est parua, tunc oportet, ut balneetur infirmus, & antequam ostendatur digestio, & proprie si est ei consuetudo illius, & si non, pa. non balneetur, donec signa digestionis appareant. hanc ille. Jam enim sciunt vulgares, quod vera tertiana brevis est terminationis, ideo nunc tales non ponuntur in balneo, sed sufficit eis, quod sudent in fine paroxysmorum.

Et post quartum, & quintum paroxysmum abluimus pedes, & tibias cum aqua tepida decoctionis foliorum salicis, & vitis, & cannæ, necnon manus, & brachia, ut calor interius remaneat.

mens post potorum appetitionem exterius expellatur. Post tamen talem leuonem bene se paucis debet cooperire & ab aere frigido corpore eius non tangatur.

Item post euacuationem eius sufficientem, & stomacho ieiuno existente si calor fortis, in corpore & regioe hepatis calida sentiat, secundum Rasis io decimo ad Almanforem epithima frigidum hepatis est superpooendū, ita quod pannus lineus infundatur in aqua rosa commixta cum sandi, vel sit tale epithima. Recip. aque endiuiz aque rosa. ana. li. s. sand. al. & ru. ros. ru. ana. dra. 2. spodij dra. t. caphore. dra. s. acet. vna. 2. sit epithima. Preter iam dicta cognita tertiana vera per signa supradicta & quia affligit vna die & alia non, & quia venit cum conuocoeoria particularum & paroxysmis non extenditur ultra 12. horas, tuoc à principio facto clisteri mollificatio ordinem turaliqua ex istis, scilicet sirupus rosa. aut viu lacerus sirupus acetosus vel ozizaccara, quæ sit ex octo partibus succi malorum granatorum acetorum & 4. panis zucari.

Sirupus acetosus sic fit. bulliat zochatum cum aqua, & tunc addatur in clarificatione acetum al. & detur oon. cum ptisana, sed cum æqua perbullita & infrigidata, sirupus enim acetosus & ozizaccara sunt commutua in materia cholericæ eo quod acetum est mors cholere & vita maliçæ, vt dicit Hippocra. Valer etiam sirupus nenufaris sirupus de papauere sirupus de se. portolacæ quem ponit Hebe. Et dicit Rasis decimo ad Almanforem capitulo proprio cum æger fortis iouenitur & est diu, quod oon fuerit solutus pondus mirab. citri. in aqua ferocenti die ac nocte infunde. deinde manibus fricatum cnm. dra. 30. tereniabim, idest maonę graonę misceatur in mane in potu tribuatur, vel si quarta pars tercię uois sca. noneę tribuatur cum iulep & aqua tanta quantitate, quod vna vice forberi possit vel, vt dicit ibidem Rasis cum hoc factum fuerit aut febris nullo modo accidet vel parum per alleuiabitur. Et sequitur, quod si patiens est debilis & fuerit æstus vnaquaque die fopple in die interpolatiois sumat hoc medicamen. 30. pron. damasce. & 10. dram. tamarindorum dissoluatur io duabus. li. aquæ & coquantur in manibus fricata, & colata misceantur, & addatur colatoræ. dram. 10. zucchari & antequam dormiat, in potu sumatur in crastinum post solutionem cibetur cum hordeato vel aliter prout decet, & stet & dormiat & quiescat in loco temperato tendente ad frigiditatem & humiditatem, oon tamen sit locus reumaticus, tamarindi enim habent magnum effectum in febr. quia fri-

gidi sunt & sicci & purgant chole. & ideo dupliciter infrigidant, vno modo de per se. quia frigidi sunt alio modo per accidens, quia euacuatur cholera rub. quæ est causa febr. & caloris, sed quia sicci sunt miscentur cum eis pruna, quæ sunt humida. Confortant tamarodi stomacum debilitatum, ex vomitu, & valent io febr. habentibus sincopim.

Fiat tale restauratiuum. Recip. pol. tria san. pul. diaspapa. ana dram: 4. pul. diaspaga. nati frigid. dram. 3. conseruę violæ. vnc. vnam zucchari panis quatr. 3. fiat mixtura ad modum zucchari rosa. detur vnum colear plenum: & post sumat de aqua hordei. Si autem vis, vt sit magis cordialis adiungatur pul. diamargaritoo siue speciebus vel addantur margaritz iaciori, rubini, & saphiri, & os de corde cerui, & aurum & argentum limatum, & foliatum, & corallus addatur. Et istud valet, & est necessarium quando habent sincopim: Violæ conditæ in conserua sunt valde bonæ in lenificatione ventris, & valens conspiciat.

Et istud iulep est molrum refrigeratiuum & ingrossatiuum materie cholericę. ideo valet ante digestioem materie, & post. Recip. focci cucu. aque cucur. ana lib. semu. cilla giniis pilij quarr. i. aque end. aque rose succi malorum granatorum acetorum acetu. al. ana. voc. 4. zucchari panis. lib. i. & 3. sit iuleb. & coquantur ad perfectionem & in clarificatione poantur. 4. se. fri. minoris sand. al. & ru. rosa. ru. spodij. ana. dram. i. camphorę. dram. s.

Ego reperi io quibusdam additionibus Serap. quod ista Reuereda quæ sequitur est probata ad tertianam. Recip. opii. dram. 4. croci amigdalini cardamomi storacis rub. & iusquiami baccarum lau. ana. dram. 10. am. conficiantur cum melle, & detur ante horam paroxysmi. Scribitur etiam in primo libro hyranidarum, quod cor auis quæ dicitur cotur. circumligatum collo luna deficiente sanat tertianam. Dicit etiam Petrus hispanus, quod trifera taracena data cum decoctione trifolij, & alleuiat sanat tertianam, deor tamen in quantitate, quod purget. Dicunt tamen quidam quod si tertianarius bibat de succo amaglosi quanturum testa oui gallina potest capere tribus vicibus ante horam accessionis, curat tertianam veram.

De tertiana notha.

Tertiana notha sic dicitur quod non est cognita in malicia & duratione paroxysmorum & in toto tempore sue durationis, nam eius paroxysmi longiores sunt, & totum tempus durationis longius quam vere tertiane.

Causa. fit autem tertiana non ex cholera grossa putrefacta extra venas & ista cho. facta est grossa propter admixtionem phlegmatis, ita quod commiscetur adnuicla, & sic unus humor, qui nec est cho. nec puritas phlegmatis sed talis chole. grossa non pura non sunt duo haec sed unus haec. Ista estiam commixtio cho. potest fieri cum melancholia secundum Serap. dicit Auic. quod in hoc differt tertiana no. ab emittente quia erosijs eam faciunt duae materiae separatae in diversis locis existentes, quarum qualibet retinet suam formam & suum nomen. Tertiana autem notha fit ex vna materia vna formam & vnum nomen retinente, & in vno loco putrefacta coposita ex duobus humoribus.

Signa nothae tertianae non sunt ita pura sicut tertianae vere immo sunt commixta. Et Auic. facit calidum ite differentia inter veramque quia paroxysmi verae tertianae consumuntur in 4. hor. vsque ad 12. & si istas transiit, non est vera. ut plucimur. In tertiana vero paroxysmus ut plurimum se extendit vsque ad 7. horas, & corpus velociter calefit extremitatibus adhuc frigidis remanentibus. Et vera tertiana terminatur in 7. periodis, nisi accidat extor ex parte medici vel infirmi. In tertiana vero notha non ita cito calefit corpus nec est itans calor nec eiam ita fortia accidentia. Paroxysmi autem nocte durant ultra, 12. horas & extenditur duratio eius aliquando vsque ad 2. menses, &c. & est cum disconuenientia particularium vel quia est senex vel stultus & tempus hyemis & alia huiusmodi. Et secundum quantitatem additionis paroxysmi super, 12. horas secundum hoc cognoscimus elongationem eius a vera tertiana. Item in tertiana notha non ita cito apparet signa digestionis sicut in vera, nec ita cito extenuatur corpus sicut in vera nec paroxysmus terminatur, cum multitudine sudoris, sicut in vera tertiana.

Iudicia in tertiana notha. Dico quod tertiana notha, & in tertiana duplex & tertiana nocturna volunt omnes esse longae, & tarde terminationis propter quod dicit Galenus primo de febr. ad Glauc. capitulo 9. sic. Aliam vero non certam tertianam vidi. Aliquando quidem autumno incipiente vere

terminante vel cessante ut supra. Et sequitur ibidem. Aliud signum est quia non vera tertiana affligit ultra, 12. horas: nec calor eius est cum acumine. nec est pinguissimus: nec est itus ardor sicut in vera.

Cura tertianae notae. Prima regula generalis secundum quod nota tertiana accidit ad veram, & secundum quod ab ea distat in signis, & in alijs, secundum hoc cura eius differt a cura verae tertianae.

Secundus canon. Ex quo materia notae tertianae est composita ex chole. & stase, sic etiam medicina digestiua & euacuatua debet, esse composita ex simplicibus digerentibus & euacuantibus vtrunque hu.

Tertius. sirupus acetosus quia stas incidit & cho. digerit ut Auic. competeret in notha tertiana potest ministrari.

Quartus quis in nota tertiana status longus est à principio ideo in ea dicta non tantum subleuietur sicuti verarum cibis & potibus est sustinendus egrotans ut virtus possit expectare vsque ad zgeritudinis statum. In primis igitur fiat talis sirupus. Recipe end. nouellae no. lae scariolae portulacae rostri porcini adiantos virgularum graminis rad. apij & fen. & cico. ana. m. 3. zuc. libr. 1. aceti al. vnc. 3. fiat sirupus & detur cum aqua cicerum r. p. cognita digestionem materiam purgetur sic. Recipe. polipodij, quercis, dram. 1. an. dram. 5. storum violae, & borag. & buglossi. ana. vnc. 5. fiat decoctio in qua dissoluatur cassiis, mundae, vnc. 1. reubarb. dram. 5. fiat potus vel in dicta decoctione dissoluatur triseris saracene quae in hunc casu habet specialem aspectum. vnc. vnam. pul. diaturbis, dram. 1. & in dicto sirupo potest, addi radi. brusci, & sparag.

Dicit etiam Auic. quod nihil iuuat eostantur sicut vomitus post cibum. Et dicit quod quando vena eorum est grossa fiat febricitantia de basilica. Item vomitus malum vel si veniat sponte vel aliter in principio paroxysmi. Bonum digestiuium in tertiana nota secundum Auicenn. & est sirupus acetosus factus cum rad. apij. fen. & cum seminibus eorum. Et post 7. diem detur decoctio ablinthij, est enim iuuatua & subleuiatua materiae & stomachi & confortatua similiteraque fen. & apij, & dicit Auicenna. quod in aqua hordei decoquantur hisopus, origanum, & calamitum, & vtraque spica, & sic pro digestiuium vel detur aqua hordei mixta cum aqua cicerum.

Postquam autem signa digestionis apparent in vena, purgetur cum hac medicina quam poni i. Auec. Recipe. hieropigrae, dram. 3. succi lactucae eupato. ana. dram. 3. se. apij. mirabo.

citrini & chebulorum ana. dram. 5. semelonis & cucur & citrulli seapij & polipodij bedegar. ana dram. 10. rurbith. dram. 1. cassia. dra. 6. pall. nucel. dram. 30. sebesfen. 30. numero: ficuum. 10. mell. 10 dram. 15. fiat apozima de quo sumatur vnom vitrum plenum cum 6. granis de scamonea. Et sequitur. Et fortasse necessaria est medicina fortis, & dicit Haly. Si videris hanc febr. prolongari cum signis fan. vt est rubedo coloris, & magnitudo pulsus minue venam hepatis & extrah. fan. secundū virtutem. Et si non, euacua flegma per vomitum & per secesum, & valent troscifi de spodio, & vtiar semper digitiuo aliquo vtiar cibis subtilibus cōfortantibus, & hoc post digestionem, tempore accessionis non dabitur, vt natura occipere circa morbum & materiam eius dicit Haly.

Dieta patientium tertianam. Consilio meo recur ad ea, de se. continuis acutis & ibi repeties in clisue digitar. tertianarum, quia tertiana inter acutas computatur quando est vora, & eligantur ibi speciales canib. positi, & comedant hordeatū acoetatum, & micam panis ter lotam coctam cum lacte amigda. & colatūem farsfnis similiter coctam, & lac amigda. coctum & missum super micam panis spario zuccato potest sumi in vera tertiana ioh. paruz pulle alteratē cum lactucis, & pogru-lacis, vel frustis cucurbit. virid. Et si esset tertiana nota intus in pilla, possunt poni folia per. & radix eius & cicera hesuca & crocus, in vera tertiana comedantur lactuce portulacæ crudæ paratæ cum aceto, & quando coquuntur coquantur cum lacte amigda. cum aceto. Similiter si coctæ sumantur cum aceto non est error. Fructus autem hoc loco non competunt, sed vitandus sunt præcipue vix, & si quis aliquando tamen ad vigoraodum appetitum & ad reprehensionem cholerae componit melones & cucurb. & pruna matura in parua quantitate. Similiter guindolæ poma, & pira cocta sob prunis cum zucharo & similia. Porus autem sit aqua hordei & aqua per se bullita, & in frigidata & post statum in decinatione detur: vinum clarum bene commixtum aque. Vnde dicit Auic. Et non timeas post deciationem potare eos vinum plurimum commixtum: vinum enim fratum per commixtionem confert quantitati residui etus in resolvendo quibus necessaria est resolutio & succurrit penetrationi aqua cum fortitudine sua per commixtionem quæ est in eo de calefactione pauca quare in frigidat vehementer & humidat. hæc ille ca. proprio de tertiana.

Declaratio in tertiana.

Primo notandum secundum Gale. primo

de crisi, cap. 14. quod febr. interpolatae habent suas correlatiuas de febr. continuis. vnde dicit Gale. talia verba. Tertianam quidem & eius correlatiua de febr. continuis sunt breues, & quartana & eius correlatiua de febr. continuis sunt longæ & prolixæ, sed faciens paroxysmum omni die id est quotidiana & eius correlatiua de continuis sunt prolixæ, verumtamen minus prolongantur quam quartana. hæc ille.

Secundo intelligendum quod duplex tertiana & duplex tertiana, & tertiana non voluit semper esse longa, tamen quia materia est malita vel diuersa in locis putrefacta quæ quidem loca forte ignorantur præter hepar, quod in omnibus percipitur esse lesum in tertiana, vt plurimum tamen quia virtus ægis debilitata, & egritudine resistere non potest perfecte: ideo in istis casibus de operam modo digerendo ouncaperiendo nititur purgando expectando vel hobotomia saluando semper virutem.

Tertio nota, quod tertiana terminatur de necessitate sicut dicit Gale. 3. de crisi. cap. 7. aut cum vomitu cho. & egestione eius aut indore plurimo in toto corpore. Et ex isto apparet error illorum qui negant vomitum in tertiana, quia per illum debet curari.

Quarto dubitat Gordes de bene. vtrum in tertiana & in febr. cholericis competat sirupus acetosus: cum de se sit subtilitatis, & materia de se sit multum subtilis, immo magis viderentur valere ingrossanda quam subtilianda Recipiendo, quod in materia cholericâ subtili non competat subtilitatis quantum ad digestionem materię, sed potius ingrossanda, sed bene competunt ratione applicationis & putrefactionis, quia enim eius subtilitate aperitur opilationes, & cum eorum sic citate resiliunt putrefactioni. Et cum istis ponantur rose spodium & alia quæ ingrossant. Et quia sunt frigida alterant malam complexionem. Ideo dicit Auicenna in ca. de cura. febr. pu. in vniuersali, & multoties inuenitur res qd digerit & subtilizat & euacuat, vt est sirupus acetosus. Quinto notandum qd in feb. acutis simpliciter, vt plurimum spectatur febr. omnia vique ad 4. diem: In prima postponatur propter constipationem. in secunda pp crasitiam vel indigestionem. in tertia postponitur pp motum maxime cholerae, quæ est de tertio in tertio, & quia tales se. vt plerumq. fiunt de cho.

Sexto sciendum qd quod est parvus lapsus accidentalis alicuius membri tunc indiget modica medicina quantum ad pondus, & ad gradum, vt accidit quando est similis compilationi & reati & temporis & arti & consuetudini &c. Et quia morbus est contra naturam membri, & corporis: tunc indiget ut

forti

venis proclama cordis, vel in venis hepatis, vel oris stomachi putrefacta quæ quidē cholera iam est delicta a regimine nature, ve est clausa & conculcata & putrefacta. Alia causa continetur secundum Auic. potest esse phlegma falsum in eisdem venis. Similiter obculcata non eueniam, & putrefactum quamuis Gal. doceat contrarium. 3. de crisi. cap. 13. vbi dicit sic. Causon autem non generatur nisi ex cholera. Idem dicit 3. amph. commento. 30. ibi. Ultra vero hanc ratem, quia non videtur aliquibus quiddā phlegmate falso, tam terribilia accidentia possent puenire. Et si forte sit cau. ab illo phlegmate falso, et vult Auic. sic sit illa species quæ durat vsque ad septimum diem, quia phlegma tardius & contra maiori difficultate digeritur & expellitur.

Signa causonis sunt caliditas continuatiditas alperitas lingue a principio cum quadam citrinitate, & post efficitur nigra propter adfectionem & adest vehemens sitis, & priuatio sudoris nisi in crisi. Et quasi nulla in causone reperitur distinctio temporum morbi, quia fere æqualia sunt tempora accidentium in terribilitate & fortior est caliditas in interioribus quā in exterioribus, quia ma. cau. interior est prope cor & partes vicinas, ideo dicunt semper citare, & ardere ideo continuo sicut. assunt vigiliæ & inquietudo permixtio rationis dolor capitis diuisi in tolerabilis pulsatio temporum propter vehemētem motum arteriarum profundatio oculorum propter magnam consumptionem humiditatum orbitalium. Debilitas appetitus vena citrina ignea pulsus frequens propter magnam necessitatem attractionis aeris & aliquando sunt surdi propter accessionē cholere ad organum auditus. Aliquando muti propter remissionem cholere ad organum locutionis vbi plurimum adest conspiciatio ventris.

Iudicia in cau. Primo primæ medicorum Hippo. 4. amph. ampho. 58. dicit sic. A causo habito rigore superueniente solutio fit Et pro concordia si superuenierit ei qui habet cau. rigor consumitur se. eius 2. de crisi. 3. Et causa istius est quia cho. ru. inter venas manens secundum crisma natura exterius expellitur & natura eam cogit penetrare per lacertos & carnem vsque ad cutem. Secundo si cau. in ætate & iuuentu contrigerit non est ita timendum quoniam multus calor facillime materiam sepe irritat eamque cito dissoluit. 2. amph. com. 34. in fine commentum ibi. In morbis &c.

Tertio si cau. quod incendium interpreta- tur, si iuuentu contrigerit in hyeme nimium si

gnat huc æstare, & est peius quā si contrigeret in ætate. Fortis est enim ignis quo aqua non exstinguitur. Galibidem.

Quinto causon accendit in senibus periculoso indicatur per eandem rationem. Sexto si cognoscens causonem & videris aliquod signum digestionis indica ipsam terminare per vnam de 4. crisi. 4. scilicet per vomitum aut per solutionem ventris aut per sudorem aut per fluxum sanarium quodlibet istorum superueniens causoni est signum bonum signis digestionis precedentibus. Septimo quibuscunque in causone tremores sunt alienatio solui. 4. amph. amph. 28. Gal. tamen non tenet istum amph. quia non est consuetudo dicere quiddā ægri. soluiur si in periculosorem muretur. Et sequitur in eom. Materiam, vnde nascitur causon intra venas & arterias est, quia si mutetur ad nervos in primis fit tremor & ex nervorum passionibus cerebrum quod est eorum fundamētum patitur, & sic necessario fit alienatio solui. elusidem.

Octauo causon brevis terminationis est quia, vbi plurimum in quarta, vel quinta terminatur die, & ad longius in septima. Curatio causonis. in principio ponantur caus. generales & nocēt illi qui fuerint positi in cura se. a curam in generali in ca. 6. istius 7. lib. Sit ergo primus causon. Festinanda est a principio in causone euacuatio minoritina. Et quia suriosa est materia ipsam sequet eradicatione digone apparare maxime. Secundus si vrina fuerit citrina vel subcitrina & pulsus non multum plenus sicut botomia non est celebranda quia magis inflammaretur cho. per remotionem san. sceni eius.

Tertius si vrina sit turbida vel ru. & spissa, & pulsus plenus sicut botomia debet a principio celebrari.

Quartus si in cau. competat sicut botomia illa a principio est exercenda, quando enim postponitur sicut botomia apud principium ægritudinis post non est ei intentio & fortassis interficit propter aduentum debilitatis. Iste caus. est Aule. in prima 4. tract. 1. c. Intentiones ad curationes vniuersales &c.

Quintus, habentes causonem subliatione indigēt regiminis in vltimo nisi timeatur casus virtutis tunc enim necessarium est vt cibentur, quamuis non appetant & res quas sumunt sicut acta frigide. Auic. in cau. proprio.

Sextus si obliuiscantur aquam potare pro- pinietur eis aqua frequenter, quia sium nequaquam debet sustinere.

Septimus quando in habente causonem superfluit fluxus san. nariū vel aliunde oportet

ter vt restringatur ne virtutis debilitas magnificetur, & ne habens corporis nimium relaxentur.

Octauus capita patientium cansonem rebus infrigidantibus sunt defendenda vel infrigidanda ne cho. vel fumi etus ad ipsum a-
scendant. Et in hoc casu valet oleum ros. cū
aceto & sand. cum aqua ros. & vigilie & alia
sinthomata cū rebus appropriatis mitigetur.

Nonus cas. est Galin passio. Primo eu-
acuetur cholericus hu. per vomitum aut ven-
tris solutionem, deinde caliditas eius acuta
remaneas extinguatur, & hoc certissime fit
si aqua frigida in bona quantitate potetur.

Decimus quia vt plurimum sunt consti-
pati. ideo in prima die vel secunda lenitino
clisteri feces expellantur.

Vndecimus est Ras. ro. ad Almanforem
c. proprio sic. Ergo igitur quacunque nocte,
& apozimate pinorum & tamarind. est tri-
buendū, venter quotidie bis aut ter soluatur.
Duodecimus quia materia cansonis ardē-
tissima est prope cor putrefacta & ad ipsum
continue eusporans, ideoque frigida cordia-
lia sine interuallo parari sunt ministrandi.

Curatio particularis cansonis. Primo stat
in ratione quod isti constriantur in camera
vbi sit aer frigidus: quæ aspersa sit & ro-
ta cum aqua frigida & aceto, & circa lectum
ponantur folia & rami salicis & cannarum,
& vitium & quercus & maligranari que sint
collecta ante solis ortum & sternantur came-
ra cum tinnis & folijs vitis similiter colle-
ctis. Ista omnia & similia alterant aerem; qui
tractus ad pulmonem & cor ipsa infrigi-
dant & cauma eorum refrigerant paulatine.
Deinde iuxta doctrinam tertij cas. Si vrina
est rubra & spissa sit febotomia de mediana
vel basilica & hoc fit a principio secundum
doctrinam 4. cas. soluta constipatione. Et si
ista febotomia a principio non fit dimitta-
tur, deinde in eadem die vel saltem in sequen-
ti propter timorem accidentium, & mole-
stia & furiositate materie dei hæc medicina.

Recip. florum violæ borag. & buglossi ana
vnc. vi. prunorum siccorum. 30. numero fiat
decoctio in qua dissoluantur tamarind cas-
siæ f. sumund. ana vnc. 6. reubarbari temperati
in aqua end. dra. 6. fiat potus, & offeratur in
aurore quia in principio si quid vñ monendū
move. in statū aut silētiū adhibere melius est
a principio iuxta doctrinā. 9. canoni. ad altera-
tionem & infrigidationē materie & qualita-
tis eius fiat talis sirupus que digerit & ingros-
sat & infrigidat materiam ne furiat per ve-
nas saliendo. Reci. enditæ lactuce scariolæ
portulacæ, rostri porc. hepatici foliorum &
summitatum papaueris capilli veneris recen-

tis, ana m. j. florum violæ ros. ru. florum no-
nufari. lentig. aquæ font. ana vnc. 2. & se.
frigidorum minorum. ana dram. 2. fit deco-
ctio in aqua fontana vsque ad li. 2. & 3. & in
clarificatione cum zuccaro. li. 1. & 2. addatur
aquæ end. aquæ ros. lucci malorum granato-
rū actiū ana li. 5. podij, sand. al. & ru. cāphoræ
se. papa. ana dram. 2. & a. detur cū aqua hordei
vel cū aqua frigida in mane & in sero & in
vesperis & in medio noctis si potū desiderat.

Et si egritudo ista cum vehementia sintho-
marū & inquietudo & incendio vñmatis ve-
nit & in secunda die aliqua signa digestionis
apparere incipiunt & creditur terminari in
quarta. tunc nihil quod sit cibale ægro est tri-
buendum iuxta doctrinam. 5. cas. & Hippo.
quia ad vltimas egritudines vltima curatio-
nes sunt potentes ad perfectionē 1. ampho.
amph. 6. sed quia virtus pp abstinētiæ deficit
1. ampho. com. 5. ideo contentum oportet
ægotantem si sufficit cum tali digesta us-
que ad statū egritudinis & vñ ille prius de-
ficiat & tunc dandū est aliquid de cibo vel de
inpradictis quia nutrit, & detur aqua hordei
& detur auenatum clarum non spissum, vel
mici panis multotiens lora in aqua frigida,
& cum lacte se. cucur. & melonis mund. vel
ipsum lac amigd. cum se. cucur. factum cum
aqua frigida. Potus autem qui dari possunt
secundum Aui. sunt sirupus acerosus & mu-
scillago se. end. & portulacæ & melonis & si-
rupus de papauere nigro.

Vltimus pro potu vbi sitis videtur esse in-
extinguibilis & infirmus inueniens estuat & de-
siderat aquam frigidam potare. Porē de
qua frigida quantum in vno haustu potest et
trahere, donec iterum sitiat cum arsura. Et
tunc iterum alium capiat haustum & c. Istis
tñ conditionibus obseruatis. Prima est quod
non sit decrepitus secunda quod non sit ma-
nifesta debilitas in aliquo membro principa-
li vel immediate principali deservienti. 3. q.
se. non sit ex frigida materia. 4. quod non sit
virtutis debilitas. 5. quod materia non sit crū-
da, immo digesta 6. quod non sit oppillatio
magna & manifesta. 7. quod morbus non sit
in principio sed in declinatione. 8. quod sit
vehementia sitis, & patiens appetat aquam
frigidam. Inquit Galin passionario. Certissi-
mē autem extinguetur si pa. bibat aquā frigi-
gidā & multā frigidā. Pōt ē succum malorū
granatorum cum aqua frigida bibere: potest
etiam sumere in defectu virtutis ius parum
pulles coctū cum lactucis vel portulacis & cu-
cur. cum agresta & tener locum sibi & medi-
cina, vel secundum Ras. potest dari mici pa-
nis multotiens in aqua frigida lora & mura:
cum lacte a quo extractum sit butyrum additū

do parum zucchari. Si ergo vides egrum multum sicire & aquam frigidam desiderare, & videtur ei quod alij porus non remouetur si tum condonionibus obseruatis si non habet apostemam in aliquo membro interiori & sit confuetus eam bibere ministra ei aquam frigidam sicut statim dictum est, & fac alia remedia supradicta. Cum ergo videris habentem causonem quodd ei incipiat sñdor dimitte eñ sudare stando prope ne se discopèriat & sudet quantum sufferre poterit, vel si incipiat fluxus sanguinis narium vel fluxus ventris: rege ipsum secundum canon. supradictos habendo oculum ad tenorem virtutis.

1. Declaratio. Primo intelligendum secundum quodd dicit Ras. 10. ad Almanf. quodd in ægritudinibus, que sunt à materia friuola duabus de causis medicina laxatiua danda est à principio. Prima est quia isti humores friuoli digestionem spectare non possunt, quia continne de loco ad locum impetuose mouentur vt dicit Gal. 1. ampho. comm. Digesta medicari &c. Alia causa quia si in principio euacuat non fuerit in augmento, vel in statu perniciem asserant. & si propter grossitiem materiz vel aliter non das medicinam laxatiuam in principio non presumas ipsam dare in statu, sed quiesce ne naturam impediās, verba sunt Ras. vbi suprà.

2. Secundo no. quodd Rasin loco allegato iubet in causone apponere super hepate & tot pannos infusos in aqua ros. Et dicit quodd si non haberas postemam in interioribus: nec sto. est debilis nec hepaticibz de aqua frigida in frigidata super niuem tantum quantum potest donec facies virid. sit & habeat tremorē.

3. Tercio dubitatur vtrum causon possit fieri ex cholera superincenta non putrefacta. Et arguitur quodd sic si illud, quod minus videt inesse inest, ergo & illud quod magis, sed minus videtur esse quodd ex sanguine superincento non putrefacto generetur febr. quàm ex cholera. igitur &c. consequentia tenet per locum à minori. Minor probatur quia sanguis paratior est putrefactioni & ideo minus videtur quodd possit inflammati sine putrefactione cuius vtraque qualitate sit paratus putrefactioni. Quod autem ex sanguine non putrefacto, sed in inflammaro possit fieri febr. hoc patet in sinocha.

In contrarium sunt omnes auctores ponentes causonem fieri ex cholera putrefacta in venis proximis cordi vel in venis sto. vel epatis. Primo nota quod in tentio sñor aliquorum quod causon pot fieri ex cholera aquosa & inflammata sine putrefactione immo etiam a mala sola complexione introducta in corpore, & istius opi. fuit Gariopontus in additionibus

passionarij. d. Causon alia ex humore, alia ex qualitate. Si ex hu. dissoluitur, si ex qualitate exinguitur. hac ille. & hoc probat ratio ante oppositum. Ista oppositio est contra mentem Galeni tertij de cri. c. 3. & 3. amph. com. illius. Vltra vero hanc ætatem, vbi vult quodd causon fiat a chio. eu. putrefacta intra venas proximas cordi.

Secundo no. quod sangu. est multum amicus nature in tantum quod non purgatur cum laxatiuis sicut ceteri hum. nisi laxatiuū esset multum violentum: tunc vltimo expelleretur ideo quia magis amicus nature, & propter hoc magis est sollicita de generatione & cōseruatione eius: quia ppter defendit ipsam ab omni corruptione, & putrefactione quantum potest. Et si natura ei dedit complexum in quo maxime fundatur putrefactio, hoc non fecit vt in eo cansaretur putrefactio, sed vt esset apertior generationi membrorum & nutritioni eorum, quia nutritio fit per calidum & humidum, secundo de generatione. Et hoc dico propterea quia licet sanguis supercalefiat, tamen non ita cito putrescit sicut alij humores, quia natura defendit ipsum, & in hoc dar operam quantum potest.

Tunc ponitur talis conclusio. Causon non generatur ex cholera superincenta nō putrefacta, probatur. quia causon ab omnibus ponitur sub genere se. putridarum. enim per Aui. qui dicit quod causon sit a cholera putrefacta. Probatur secundo. quia ad putrefactionem duo requiruntur. scilicet conculcatio & non euentatio humoris in vno loco, vel in locis pluribus. Secundo requiritur calor faciens bullitionem & commiscens putrum cum impuro, sed sic est in cholera, quia ipsa conculcatur in locis supradictis, & ibi venit vel causatur calor extraneus & sic putrescit & facit se. putridam.

Ad argumentum. si illud quod minus videtur inesse inest. ergo & illud, quod magis conceditur maior aliquibus conditionibus obseruatis: que videri habent in logica & ad minorem. minus videtur inesse quod ex sanguine superincento non putrefacto generetur febr. quàm ex cholera. Dico distinguendo vel ex parte qualitatum illorum humorum inter se comparatorum, & sic conceditur minor. Vel ex parte instrumenti, scilicet nature & sic negatur minor quia natura magis sollicita est de sanguine quàm de cholera & magis fatagit circa eius custodiam, ideo non ita cito putrescit sicut cholera. Sanguis autem quamuis aliquando supercalefit, & inflammatur ex sui multitudinis facit se. que reponitur sub genere se. effi. & hoc non conuenit fieri ex cholera.

Quarto queritur, quæ species caustionis sit molestior an illa quæ sit de cholera, robor illa quæ sit de phlegmate falso. Dico quod si molestia attendatur penes acumen & molestiam accidentium, dico quod illa quæ sit de cholera est molestior; quia maius incendium & acumen habet. Si autem molestia attendatur penes durationem & difficultatē eradicationis, si est molestior quid est ex phlegmate falso.

Quinto notandum quod caustionem habet causam efficientem & est putredo cholera quæ facit morbum qui nominatur caustionem, & habet accidens, quia dolorem capitis & vigiliam; & sitim, & sic ibi est morbus causa morbi & accidens morbi, unde putrefactio & corruptio propriæ & innatæ & substantialis humiditatis ex frigida caloris naturalis superabundante calore alieno. Istam distinctionem ponit Galienus.

Sexto nota, quod duæ sunt causæ terminationis caustionis. Primæ est ex parte naturæ & morbi primo quia morbus est multum intensus & molestus de natura ipsius diu sustinere non potest, ideo citius ipsum cito expellere; quia natura non sufficit longitudinem morbi, cum viciata maxime accidentium terribilitate. Alia causa est ex parte materię & quæ est multum subtilis & cito euaporabilis.

Septimo queritur vitium accidentis putrefactionis in quo humore alij humores putrefiant, probatur quod sic, quia sunt commixti ad invicem, & sic non videtur quod unus putrefiat sine alio, consequens est bona & antecedens pro maiori parte est Gal. 2. prognosticorum commento. 38. ibi. Laudabile vero videtur. Vbi sic dicit Gal. Hippo. ergo videtur ne aliquis sit humor purus, sed quod sint per mixti simul.

Octavo sic. Sicut se habet calor naturalis ad digestionem ita se habet calor innaturalis ad corruptionem & putrefactionem, sed calor naturalis sic se habet ad digestionem quod omnes humores simul digerit & generat, ergo calor innaturalis eos simul putrefacit & corrumpit. Maior est nota, quia contrariorū contrarij sunt effectus, & minor est. Aucin doct. de humoribus.

In oppositum ad omnem putrefactionem alicuius humoris, horribilem sequitur febris, ergo putrefactio uno humore si alij putrefiant data una se, omnes alie aderunt quod est falsum & contra mentem Galeni lib. de differentiis feb. & 2. de crisi.

Notandum pro prima ratione, quod commixtio est duplex secundum philosophum. 2. de generatione & 4. meteor. Quædam est vera commixtio in qua omnes partes miscibilium adiuvem commiscantur, ita quod in tali

commixtione quodlibet commiscibilium perdit formam suam, & in mixto introducitur nova forma. Alia est commixtio in qua miscibilia suam propriam retinent formam, & ista non dicitur vera commixtio, sed potius debet dici ista positio.

Secundo notandum quod humores quatuor simul in venis veruntamen quilibet retinet suum proprium nomen & formam, & omnes simul aggregati dicuntur massa sanguinis, & hoc patet quia natura eos segregat in hora nutritionis, & attrahit sanguinem ad generandum & nutriendum eandem & melancholia ad nutriendum ossa & sic de alijs.

Tertio notandum quod aliter se habet calor naturalis ad digestionem, & aliter se habet calor præter naturam ad corruptionem & putrefactionem, quia calor naturalis est uniformis & uniformiter agit in materia præterente, ut ex qualibet parte generet in simul quod spiritum natum est generari, & sic simul & generat & consumit, & ex chilo simul generat & mores succelline, tamen quia totus chylus simul non posset recipi in venis hepatis ita quod in fine actionis una pars est sanis alia cholera alia melancholia, alia phlegma. Calor autem innaturalis agit distincte, & distincte agit in re quæ magis parata est putrefactioni & corruptioni, & cum hoc natura facit curam & regere res corpori necessarias & iustitias & illas iuxta possedere defendere. Obstat autem quod res quæ putrefiunt extra regimen nature sunt & ab ea non gubernantur.

Tunc sit prima conclusio, humores non sunt simul mixti secundum primam mixtionem, scilicet in qua nova forma miscibilium acquiritur, sed bene sunt mixti mixtione secundæ de qua dictum est in primo notabili. Secundæ conclusio est. Putrefactio uno humore est necessaria alios humores putrefieri, patet per rationem factam post oppositum.

Ad rationes ad primam quando dicitur, quod humores sunt commixti, dico quod non sunt mixti prima mixtione; sed secunda quæ est quedam iuxta positio, & sic unus potest putrefieri alio remanente sano, quia est extra regimen nature & natura de eo non est sollicita, de alijs vero sollicita est & illos gubernat, & sustinet.

Queritur octavo quare caustionem magis generatur ex phlegmate falso quam ex alijs humoribus frigidis, sicut est melancholia aut phlegma &c. Primo notandum est ex primis viis dicitur primo ca. doctrina. 4. cap. 1. quod phlegma falsum sit ex phlegmate renui quod saporem non habet, vel parum saporis cui commiscetur cholera sicut adusta & facit ipsum phlegma falsum & ipsum calefacit, &

& istud phlegma est cholericum & omnibus speciebus, phlegmaticus est acutius & succius & leuius. Cum igitur phlegma salsum post cholera sit, magis calidum & acutum. Ideo ex eo post cholera, maxime sit, causon.

Nono queritur, Si causon pot fieri ex cholera putrefacta in venis remotis a corde sicut in venis proximis cordi. Respondet Aui, quod causon potest fieri ex cholera putrefacta in venis totius corporis, hoc dicit in c. proprio. Et videtur quod iste sit mortalis propter multitudinem materiz.

Decimo notandū q raro accidit causon in senibus & si accadat, est mortalis, quia multo adest materiz cum virtutis debilitate pueris autem & iuuenibus non sic, ideo non sunt ita periculosi. Similiter dicendum est de mulieribus maxime phlegmaticis, quia in morbis minus periclitantur aegrotantes.

Vndecimo sciendum, quod aqua frigida subtilis & passibilis est ideo si sumatur in parua quantitate cito inflammatur a calore innaturali, & causam febr. fornicat, sicut patet in ramusculo fabi in aqua madefacto aggregantur carbonem ad oculum fornicat, runc enim ignis fornicis magis fornicat, vt patet ad experientiam. Similiter accidit in administratione aque in causone, quia si detur de parua quantitate statim inflammatur, & si detur in magna quantitate vt quantitas supplet substantie eius subtilitatem de inflatu metur, sed se. extinguit.

Duodecimo dubitatur de administratione aque frigide. Dictum est enim quod detur post digestionem materiz. Sed contra, quia illud quod digerit de infirigidat & ingrossat materiam cholericam debet in principio ministrari, aqua frigida est huiusmodi. igitur &c. consequentia nota est & maior est Aui, ca. de cura febrium putridarum in vniuersali, & minor nota est de se.

In oppositum. Nihil quod crudificat materiam & ipsam reddit compactā debet in principio & ante digestionem ministrari, sic est de aqua frigida &c. Dico quod non debet ministrari ante digestionem materiz, patet per rationem ante oppositum, & patet auctoritate Gal. mech. particula complexa quasi colum. 6. vbi dicit sic. Aqua non purgat eos, scilicet malos humores, sed cruditatem augmentat quamuis cum bibitur quiddam quierit & refrigerationis argi pariantur. Nam causa febris de apostematiz non solum permanet, sed augmentata, & a digestionem remota est, vbi supra, & sequitur. Necessarium est iterum, vtraque illa intendatur & calefiat, cum frigiditas eius non stet ante fortitudinem febris vnde necessario se. confortatur & induratur magis quam

fuerit propter oppillationem quam in foris facit, & conclusionem dissolutorum quocirca febr. sit diuturna, hanc ille ibidem. Ecce loquitur etiam aliquando virtutem aliquorum membrorum magnam in corpore actionem habentium defectum facit si ea debilia inueniuntur siue ex generatione siue ex illo tempore, vnde penitus ab illis actionem ampuant ibidem.

Exponit Galen u. Membra quibus nocet aqua frigida aliquando nocet meri quod non potest transgredire, aliquando nocet stomacho, quod non potest digerere, aliquando nocet hinc stomachi, aliquando hepati & in alijs duabus frigiditatibus pulmonis, alijs renibus & vesicis &c. hanc ille ibidem. Et sequitur quibusdam citissime anhelum grauat & spalinum & sic morem facit, in rebus. Quare dico, quod qui hoc audiens formidat aquam frigidam, feberrantibus ministrare, ibidem. Et requiritur remediare illis ergo non debet dare aquam qui quidem membra habent debilia, & in quibus nobilium membrorum apostemata sunt, vnde da siue frigida siue mollia, siue dura. Et qui oppillationem habent aut humores crudos aut putrefactos, mech. particula 9. col. 7. Et sequitur, Sed tamen si signa digestionis appaerent postemate absente da aquam frigidam materiam si quaedam membra non habent frigida vnde suspicatur actionem eorum defectu possit. Nec nocet heri supilatione apostematibus puerum siue comixtione materiz &c. sed cura curatio eius est ibidem. Et in isto apparet opinio solutiorum qui dixerunt, quod aqua frigida competit ante materiz digestionem.

Decimotercio intellige, secundum canonem, vbi dicitur quod omni die detur apozima tamariodorum & prunorum, & bene quia illa cum hoc q sunt laxatiua sunt refrigeratiua, ita quod habent laxare cholera, & cum hoc in refrigerant causam caloris remouendo & alterando & infirigidando.

De synocha. capit. IX.
Synocha est feb. continua ex multitudine sanguinis non putrefacti & respirationem prae sui multitudine non habentis.
Causae synochae antecedentes sunt sanguinea complexio inclinata ad multum sanguinem generandum, vnde posito quod homo sanguineus eidem cibarijs vescatur quibus melancholicus, magis tamen de bono sanguine in sanguineo generabitur & multiplicabitur quam in melancholico, & hoc est ratio complexionis quae ad hoc est inclinata. Alia causa antecedens est multus sanguis iam in corpore existens, & ipsa vasa replens, & foramina.

Causæ enim primitivæ sunt dimissio exercitij, ut dicit Gale. 9. meth. colum. 2. Similiter multum exercitium non assuetum comestio & frequens usus ciborum multiplicantiū sanguinem, sicut sunt carnes electæ & bonum vinum maturū & vitella oavorum & similia.

Causa coninnetæ sunt multitudo fumotū à tali sanguine euaporantium & respiratione non habentiam, immo retenti calefaciunt sanguinem & spiritum & sic feb. reposita est sub specie effi. factæ propter oppilationem pororum & retentionem vaporum & fumorum à sanguine reolutorū, quia ab eadem causa fit & per eundem modum quamuis inter, eas sit differentia.

Causa autem retinens illos fumos est oppilatio pororum curis vel oppilatio pororum & viarum interiorum, ita quod ebullitio, & supercalefactio sit causa oppilationis suffocata caliditate, sicut dicit Avic.

Signa synochæ ponuntur à Gal. meth. particula 9. col. 2. ubi loquitur de illo iuvene qui habebat fe. sanguineam & est febr. calidissima pulsus æqualis velox & magnus & spissus, & fortis & calor in volis manuum & uon est mordacitius & vrina in colore, & liqnore est vicina vrina sanæ. Ego dico, quod vt plurimum est rubra & spissa adest & grossities corporis & multitudo carnis. Et per ista signa non tam fuit Gal. quod erat feb. synocha ex oppilatione propter multitudinem sang. orta, & propter prohibitionem dissolutionis, & pp grossitiem corporis &c. Adest etiā rubedo coloris & plenitudo venarum & extensio membrorum ac si haberet alices. Et addit Avic. q. habent ruborē in facie, & oculis & inflationē venarum temporum, & repletionē corporis vltimatum: & non est fe. cum rigore & habet constrictionem anhelitus. Et quandoque accidit eis profundatio somni ac si haberet subeth & ante commotionem eius scilicet febr. adest grauitas in corpore, & regimen præcessit multiplicans sanguinem. Et adest pruritus in naribus & fatigatio membrorum præcedit, & in somnijs vident res rubens vel sanguinolentas. Adest grauitas & dolor frontis, & accidit eis difficultas locutionis & caliditas extēla vaporosa propter humiditatem quæ sentitur tactu non ita sicca sicut sentitur in causione vel vera tertiana vel in acutis.

Iudicia in synocha. Primo dicit Auicenna in capitulo proprio, quod profundatio somni & difficultas sermonis in synocha & in synocha est malum signum.

Secundo apostema gutturis in synocha, & in synocha est malum signum.

Tertio si habentes synocham non flebotomantur subito moriuntur aut in nimiam mo-

lestiam & timorem veniunt, nisi fortuna ex vi nature eis sanear cum fluxu sanguinis nortum aut cum sudore megatechni, particula nona colundello quarto in fine colundelli.

Quarto synocha frequenter mutatur ad fe. putridam vel hecticam dicit. Avic. nisi cum flebotomia cito succurratur.

Quinto si signa digestionis in ea tarde apparent tardè fiet crisis eius maxime si febr. sit tepida. Et si signa digestionis vique post tertium aut quartum diem expectant, signum est quod crisis non veniet in septimo. Et alii quando venit crisis eius in quarta die.

Sexto quando apparent pustulæ liuidæ aut nigre, signum est moris.

Septimo si oculi lachrymantur sine voluntate flendi, sed propter malitiam morbi, & adest difficultas anhelitus, est signum moris.

Octauo iudicat Gal. sic. Nentra tamen harū specierum. i. synochæ & synochi fit in macris, & frigidis corporibus: sed in caruosis multum sanguine habentibus. 9. de ingenio. c. 14.

Nono iudicat Rafis. hæc feb. sepe in casu nem mutatur nisi à principio cum refrigerantibus & debita flebotomia extinguatur. 10. ad Almanforem. c. 5. in fine capituli.

Curatio vniuersalis fe. synochæ. Post cano. Gal. 9. de inge. cap. 9. Quicunque corare voluerit synocham faciat infirmum flebotomari extrahendo multum de sanguine fere vsque ad, sin copim quasi omnes autores tenent istum canon.

Secundus est Avic. t. 4. canon. Si sanguis inuenitur aquosus subtilis vel multum choleticus infrigidandus est & ingrossandus.

Tertius si sanguis fuerit multum grossus subtiliandus est.

Quartus, mundificatio humoris ipsū sanguinem subuliantis vel ingrossantis sequatur flebotomia post eius digestionem competentem.

Quintus, aperio pororum cum frictione & similibus post euacuationem cum flebotomia, vel aliter factam in retentione synochæ est multum iuuans & necessaria existit.

Sextus si a principio propter medicam absentionem vel propter aliam causam flebotomia neglecta fuerit: postea quocunque tempore medicus ad infirmum venerit: exercenda erit præsupposita virtutis constantia, vt error in principio factus in processu corrigatur. Avic. cap. proprio.

Septimus si patiens synocham flebotomia non sustinet, cum alteratiuis, & apertiuis, & euacuatiuis est insistendum. Et si possibile est cum vëtois & sanguifugis vt superfluitas humoris sanguinei diminuat, & eius qualitas alteretur.

17 Octauus ca.ñ. est Aui. in c. proptio. Flebotomia, & sumere in potu aquam frigidam quandoque excusat ab infrigidatione alia.

Nonus habentes sinocham regimine indiget sublatione, & comestionis diminutione.

Decimus augmastica quamuis plus indiget minutione, secundo homotena, tertio peraugmastica, quamuis in illa specie flebotomia erit priuanda.

Vndecimus est Aui. si autem morbi initium sit propter nimium cibum, quem comederat infirmus, & adhuc in ventre sit coadunatus, oportet quod vsque ad diem secundum, vel ad tertiam flebotomia suspendatur.

Curatio particularis sinochæ. Ista egritudo non suffert pigritiam necignorantiam medici, propterea quia potest mutari in deteriozem, vt dicitur in nono iudicio, ideo canonibus obseruatis à principio, & iuxta tenorem primi canonis, flebotomia fiat de vena medianæ, quæ ab inferius, & superius euacuat, & extrahatur sanguis vsque ad sinopim serē, vel saltem pansionē, & frequenter de sanguine auferatur: deinde dentur refrigeratiua sicut est rob, qui sit de succo vuae acerbe, & rob qui sit de acetositate citri, & rob de ribes, & rob factum de succo granorum acedule, & detor sirupus limonū, & sirupus qui sit de succo cucurbitæ, & de succo vel aqua acetosæ, & de succo granatorum acrimum. Et detur aqua frigida iuxta tenorem octauī cañ. in magna quantitate, obseruatis conditionibus dictis in cura caufonis. Et si eger fuerit debilis, ciba ipsum cum medulla panis loti cū succo granatorum muforum & aggregata, & da ei aquam hordei, & refrigera ipsum cum muscillagine pilij, & da zuccatum ros. secundum Ras. si ualeat constipatio fiat lenitium clistere galinæ coctæ cum maluis. deinde purgetur cum tamarind. & prunis, & cum manna & cassia.

Sequitur sirupus de se. portulacæ secundum Hebe. extinguens inflammationem & feb. & auferit sitim, & confortat stomachum, & hep. supercalefacta. Rec. succi end. cocti & despumati. li. 2. fe. portulacæ vnc. 2. teratur se. & super ipsum fundatur succus, & stet in vase lapideo die ac nocte coquantur lento igne ad consumptionē mediæ partis, & addatur zuccari lib. s. addendo in clarificatione aceti albi, succi matorum granatorum acrimum ana. vnc. 1. & se. Idem potest fieri de aquis distillatis, sed non tam, videlicet sicut succi, quia in eis distillatis remanet virtus ignis, quia dicit philosophus. Quod semel est calidum semper retinet aliquam virtutem calidi.

Similiter est, videlicet rob qui sit de succo berbe acetosæ, & videlicet tantū succi rob. de ribes vt dicit Hebe. Recip. succi acetosæ libr. ro.

coquantur lento igne, donec consumatur tertia pars suc, & post dimittatur stare donec faciat resistentiam, & iterum coquantur lento igne vsque ad spissitudinem. Aliqui exponunt soli donec fiat spissum, sicut etiam faciunt de succo agrestis. Et ista valent ad debilitatem stomachi factā à causa calida, & videlicet ad solutionē ventris à causa calida, & cum hoc exinquir sitim. Et fiant similes medicinæ donec extinguatur. Valet etiam oxizaccara simplex & iulep Alexandrinum, & sirupus rosaceus, & violaceus & cetera similia.

Declaratio in sinocha. Primo queritur cum multi hominum sint pingues, grassi, & carnosi, & pleni sanguine, quare aliqui eorum patiuntur sinocham alij vero non. Ad hoc respondet Gal. mech. paracula 9. quasi col. 5. in fine. colum. vbi dicit. Complexiones vero, & corpora bonos humores habentia, de quibus dissoluitur sumus aeris si oppilationē multam habent ducuntur ad se. continuam sanguineam, quæ sinocha nuncupatur. Quando vero mali & acuti humores sunt cum caliditate putredinem festinanter incidunt: boni vero, & temperati non cito, sed tarde putrescunt, bæcille. Patet igitur ex dictis Gale quod aliqui habent multitudine sanguinis & humorum. Et si tales habeant oppilationes, tales cito cadunt in feb. maxime si humores tendant ad acuitatē. Alij vero quibus sint crassi & pingues vel carnosī: non tamen habent oppilationes, humores eorum bene euentantur, & a natura gubernantur, & sic non cadunt in feb.

Secundò intelligendum secundum quod dicit Anice. in prima sen. 4. cap. de synocha, q synocha est de summa februm, quæ est inter se, putridas & inter se. effi. differt enim a feb. effi. meta, quia primum quod in ea calefit est humor, & primum quod in effi. calefit est spiritus. Differt etiam a febr. putrida, quia in synocha non est putredo sicut in putridis, est tamen febr. acuta, & talis synocha non est effi. nec ethica, nec putrida. Ex quo sequitur corte larix quod ista præpositio vniuersalis est falsa, omnis fe. aut est effimera, aut putrida, aut ethica, sed ista est vera, omnis feb. vel est effimera aut humoralis, aut ethica.

Tertiò dubitatur si languis manēdo san. possit putrescere & facere febr. Dicitur quod sic, quia sang. in fe. habet duas qualitates, scilicet caliditatem & humiditatem, quæ sunt principia putrefactionis.

Quartò sciendum quod istius febr. auctores primo Gal. in 9. mech. & Anic. in 4. canon. in c. proptio, ponunt tres species specialissimas. Prima vult augmastica ab augmento, quia cōtinue procedit augmentando vsque ad critum. & ista inter ceteras est deterior: quia plus de

de fumis, & vaporibus malis cootinis generatur, quàm ootora possit resolvere. Secunda species vocatur peraugmasti, quia à principio perfecte augmentata, id est, quoddam principium augmenti est nequior horum eius. Et ista procedit continuo diminuyendo usque ad ad crism. Et in ista natura magis resoluatur, & consumit de fumis, & vaporibus quàm de materia aggritudinis dissolvitur, & ista species est leuioris & ceteris curationis, & terminationis. Tertia species vocatur heterotona quasi æqualiter hominem tenuens. Et ista à principio ad alia tempora non recipit augmentum nec declinationem, sed æqualis in assuetudine, & accidentibus iudicatur. Et ista species est mediocris in malicia inter alias duas species, & sic remanet usque ad crism. Et in ista generatur tantum de fumis, & vaporibus quantum resoluatur, & morbus, & natura quasi cootendo de pari donec alter succumbat.

Sed nuoc restat dubitare si quilibet istarum specierum febr. habeat quatuor tempora, sicut ceteræ aggritudines curabiles scilicet principium augmentum statum, & declinationem. Pro quo notandum, quod in principio cuiuslibet febr. ca. naturalis, & innaturalis obuiant subinuenient, & uterque calor maxime naturalis in principio est sopitus, & non fit magna actio tuoc inter eos, & ideo in principio oot apparet mala, nec fortia accidentia. Io augmento vero, quia natura medianre calore naturali, & spirito sentiens nocumotum agit fortiter cootra calorem innaturalem, & causam eius, & incipit materiam digetere, & tunc accidentia fortificantur propter aggrauationem virtutis regitæ, quæ tunc posita est in tribulatione, & angustia propter pnam. Propter quod aduertendum, quod processus in febr. est duplex, vel enim cõsideratur à parte materiz, vel à parte temporum morbi. Si à parte materiz sic est processus io istis febr. sanguineis speciebus, quia sang. est multum obediens naturæ: unde si sang. est melancolicus, & grossus, & oot fortiter egit in illum, fit prima species, si est paucus, & subtilis, & natura agit in illum, fit secunda species. Si mediocris, si militer agit natura, & fit tertia species. Si autem iste processus cõsideretur à parte temporis morbi, & ex parte digestionis materiz, sic dicimus cum Galen. quod omnis morbus curabilis habet quatuor tempora manifestæ, vel occulte quo ad accidentia, vel quo ad digestionem, vel indigestionem materiz, & posito, quod io istis speciebus quantum ad sensum, vel ad intentionem accidentiom non appareant tempora distincta veridice loquendo io eis cõsideratous, & reperiuntur ista

quatuor tempora quo ad digestionem materiz, & eius expulsionem si morbus est curabilis.

Quinto queritur quare similis distinctio istarum specierum, scilicet augmasti, & peraugmasti, & homotone oon sunt in febr. cholericis sicut in sanguineis. Dico quod causa est, quia maior apitudo sanguineis est ad putrefactionem, vel ad meliorationem quàm in alijs hu. Primo ad putrefactionem, quia io se. duo habet principia putrefactionis secundum ad meliorationem, quia amicus nature est, & morbi, qui ab eo fiat oot suot ita periculosi.

Sexto queritur quare oot est aliqua species istius sanguineæ, quæ sit tota principium sicut est aliqua quæ est tota augmentum alia tota status, alia declinatio. Ad hoc dicitur quod si aliqua species esset tota principium nunquàm illa curaretur, quia principium est illud sepius in quo nulla signa digestionis apparent nunquam signa digestionis apparent nunquam se. curaretur quia digestio præcedit expulsionem medicæ.

Septimo dubitatur, si flebotomia debet exerceri in processu istius aggritudinis, scilicet in 3. vel 6. die posito, quod à principio non fit. Videtur, quod oon per Hippo. qui dicit, quod à principio si quid videtur moendum, moe, io statim autem silentium adhibere melius est à. amph. ideo dicit Auic. sen. com. 4. tractat. c. 7. Intentiones ad curationes vniuersales cõioquir, & cõ. postpooit flebotomia in principio aggritudinis non amplius est ei intentio. Respondeo, quod in se. sanguineis post principium & io omoi tempore si necesse est, & appareot signa dominij sanguinis est fienda flebotomia, præsupposita virtutis constantia, quæ oot habet euacuacionem artificialem ita bonam sicut est flebotomia, ideo si à principio non fuerit facta, postea est facienda, tunc ad Hippoc. & Auic. dico, quod verum dicit in bono regimine ubi non cadit error, quia à principio non fit facta, & iste error potest corrigi post flebotomiam in processu aggritudinis facram.

Ostauo nota hec gratia exempli, & ad cõfutationem. 7. cas. coram quæ facta sunt omdam comitæ qui vocabatur dominus Petrus eames de Horteilis io regno Portugaliz. Etat enim homo pioguis plenus, qui deneot in lynchâ, ut reuoluit mihi homo fide dignus. Medici vero volentes ipsum flebotomare nullam venam inuenire potuerunt, quia absconsectant præ oimis carne, & pinguedine erat enim somno lenus, & quando proprio nomine vocabatur respoodebat, & statim reuertebatur ad somnum. Et, medicus

affluens habuit copiam sanguifugarum, & appositum corpori eius, & in tibis, & fronti, & inter spatulas, & per latera, & postquam fuerunt repleti exasperatus est, & post cibavit illum cum iure pulle, & auena. & sanatus fuit. Laus Deo.

In declinatione autem istius febr. si adhuc remanet febr. quæ ita cito non potest extirpari fiat tale electuarium. Recip. spo. sand. al. & ru. 4. se. fri. ma. & mi. ana dram. 2. succi liquiriti. dram. 2. & se. gummi arab. & dragaganti. amigda. ana dram. 1. camphoræ. dram. 1. conferuq. nennifaris, vn. 1. succa. quod suff. fiat electuarium in bolos, vel ad modum restaurantis.

Nono dicit Galen. quod statim à principio febotomia competit, nisi impediat virtutis debilitas aut nouella repletio, sed dicit quod vt plurimum in istis duabus ægritudinibus virtus in principio reperitur fortis. ista autem repletio nouella expectanda est vsque ad secundum diem.

De synochi Cap. X.

Synochus est febr. acuta continua ex putrefactione sanguinis generata, ita quod est intelligendum quod Galen. a de crisi. capit. 14. versus finem. cap. dicit sic. Veruntamen cum san. incipit putrefieri non remanet verus san. sed declinat ad chole. Et non potest ibi fieri fe. ex sang. putrefacto. Et hoc est quod dicit Auicenna. in prima quarti cap. proprio. ibi. febrem fieri opinatus est. Galenus huic opinioni contrarius est. Auicenna. & ceteri doctores ponentes synocham fieri à putrefactione sanguinis. quamuis Galen. hoc non neget expresse.

Causæ synochi, habet synochus easdem causas primitivas, & antecedentes sicut synocha, veruntamen in causa coniunctæ synochæ est, multitudo humorum retentorum sine sanguinis putrefactione, sed causa coniuncta synochi est, putrefactio sanguinis.

Signa etiam talia sunt in synocha sicut in synocha, nisi quia in synocha febr. est magis iuxta & calidius mordacitius, & pulsus inordinatus, & vrina rub. grossa spissa, & innaturalis, & in synocha non sic fit. Et pulsus in synocha, est maximus fortis, & equalis in duritie, & mollitie stabilis secundum, quod in sanitate magnitudo, & spissitudo, & secundum magnitudinem, & paritatem febr. nono mech. colum. primo. Et sequitur ibi. Porro hæc significationes sunt vniuersales in his duabus febr. scilicet synocha, & synocha. licet tamen vna si-

gnificationum putredinis in vrina, & pulsu, & calore, liquore, & hypostasi a sana vrina mutetur. in pulsantem, quia ab ordinatione, & stabilitate egreditur. In calore quia pungitius, & mordacitius ractus est mech. particula. nona colum. 2. in fine colum. Et nunquam in hac febre sentitur interpolatio, sicut in aliis febribus continuis.

Curatio synochi sumitur ad experientiam & à Galen. mech. particula. 11. colum. 4. in hæc verba. Si virtus fuerit fortis in febr. continua propter hum. & sangu. in putredine existentem statim febotomia nisi facietis stomachi prohibeat, est scienda: Oportet enim febotomiam donec cibus digeratur suspendi, sed vt plurimum virtutem fortem inuenimus in principio huius febr. vbi supra: Et sequitur ibidem, quod si æger nondum fuerit. 14. annorum nequaquam est febotomandus.

Postea porgetur sicut dictum est superius, in cap. de synocha cum rebus manducantibus, & alteretur eius mala complexio, prout in synocha dictum fuit, veruntamen debemus addere aliqua aperitiua propter oppilationem.

Si autem cum ista febr. haberet hepatis debilitatem, dentur isti troscisci, quos ponit Auicenna. Recip. spod. dram. 3. se. portulacæ. dram. 6. gummi dragaganti amid. ana. dram. 3. succi liquirit. dram. 7. refrigerant enim, & confortant stomachum, & hepatis. Vel fiat sic. Recip. ros. rub. dram. 2. berberis. dram. 2. & se. cucu. & melonis, & citruli, & portulacæ. & spodij. ana dram. 1. gummi dragaganti. & arab. amigd. ana dram. se. reubarbari croci camphoræ. ana. scrop. 1. fiant troscisci cum aqua end. & dentur cum aqua hordei. Ex istis potest fieri restitutorium cum zuc. & conferua ros. & est, magis gratiosum ad sumendum, vel detur triasialis. id est dragagantum fri. & ista valent in vrina febr. sanguinea, quia vtrique similis est in crassa, & c. quasi.

Dicta istorum sit, q. comedant hodeatum, & auenatum, & ius parue pulle bullitæ cum lactucis, & agrella, & frustis viridis cocurbi, & micam panis ter lotam, & coctam cum lacte amigda. & quatuor se. frigidorum com. vel cum lacte amygd. potest sumere secundum aliquos lentes prius bullitas, & iterum in alia aqua coctas cum per. & paruo oleo addito aceto, vel succo malorum granatorum, & iure cicerum rub. vel betucorum, & poma, & pira cocta cum zucca, & sumat malagranata, & potest vti cucurbi. bullita cum lacte amigdal. Et comedat ali-

aliquando melonem & citrullon. Et vntur end. nouella lactuca portulaca. Si veniet est confilpatus, comedat puretram de malis & spinargijs & mercuriali paratis cum lacte amigda. vel soluatue cum decoctione prunorum & cassiis. & tamarind. & manne grana re. vel cum clisteri lenitio. Aquam autem frigidam in synocho non damus nisi postquam signa digestionis appuerint. mech. particula. nona. quali col. 7. Et si dolor capitis superuenierit: oleum ros. cum aceto mixtum capiti superponatur. Et videlicet oleum viol. & nenna fatis auribus immitatur, & similiter natisbus olfaciant. Et similiter odorent ros. & sand, & folia salicis & campho.

Si vigilijs vexantur, fiat dormitorium de succis herbarum frigidarum & hn. sempernua vermicularis solatrum vmblicum veneris lactuca portulaca papa. & se. eims lentigo aque vnguentum populeon. Ita capiti applicentur in dolore capitis, & in vigilijs nisi esset catarus, vel nisi esset somniculosus paratus ad subeth, vel litargiam. Communis & magis vnta potus istorum acute febricitantium est aqua hordei. sed in magna estuacione, & angustia sitis damus muscullaginem pilij, & succu granatorum vel aliquem de sirapis, & rob supradictis cum aqua frigidissima confidentes, quodd aliquae ex istis remoueat malitiam aque frigide cui commiscetur. Si autem patientur cardiacum succurratur cum aromaticis frigidis, sicut dictum est in cardiacis, & stomacho, & regioni hepatis superponatur hoc emplastrum. Recip. omnium sand. dram. 3. to sa. rub. farina hordei. ana vnc. 2. camphorae. dram. 2. fiat emplastrum cum aqua ros. Si autem veniat somnolentia, extrimentates fortissime fricentur, & aotum fortissimum cum digitis, & plamis naribus immittatur; & vapor aceticus super regulam ardentem sentiantur & exciteros clamectibus, vel aliter imendo de litargia, vel applicata, quia isti vapores in magna copia ad caput ascendentes ibi causant subeth litargiam, vel apoplexiam. Et hoc tenet verum in omni feb. & dolore capitis. Si autem habent suum intolerabilem, bibant aquam frigidam cum paruo acetate. Et fiant sacculi de se. citoniorum, & de semine pilij, vel de sic secundum Gordonium. Recipe succi vite acerbe, succi acetosa, succi lactuca, succi malorum granatorum acetosa. ana vnc. vnam coquantur in lento igne. addatur zucarum candi zucarum albisimi, ana quod sufficiant pillule, & teneantur sub lingua.

Declatio in synocho.

Primo intelligendum est, quod si aliquis patiatur synocham, & a principio non suc-

curatur cum extractione sang. per siccotiam aut non, ipsum non expellit per fluxum san. narium, vel aliter, & si aliter cum refrigerati vis cito non succurratur, vel talis synochia inflatur cito in synochiam de putredine san. conuertitur, quia san. propter retentionem humorum, & vaporum, & coactionem eorum, & defectum expirationis putrescit, & sic de synocha fit synochus, quomodo feb. gramot, & maioris periculi, & sic intellexit Galen. in 20. de crisi. capitulo 14. & ibi loquitur de synocha, & synocho. Synochus etiam potest generari ibi absque synocha precedente, quia san. in se potest putrescere cum in se habeat utraque principia putrefactionis, & corruptionis.

Secundo notandum, quodd Galen. secundo de crisi capitulo 6. quasi in medio ca. dicit sic. Et tibi quidem sufficit, ut cognoscas esse huiusmodi febr. quodd generata est, ex eo chole. pura. & quia ipsa est inflammatoria adurens, & quia ipsa est acuta valde. Et propterea quidam medicorum nominauerunt hanc febr. nomine proprio quod est, synochus. hec ille. Ultra vero hoc Galen. in secundo de crisi in capitulo 14. negat febr. fieri ex sang. dicens sic, quodd si ad aliquod membrum cutrat sang. solus remanens secundum naturam suam, & figuram apostema, & fit nonne illius apostema apud grecos vocatur phlegmon cuius derivatio est ab inflammatione, & febr. quae generatur ex eo est febr. leuis, & salubris, & febr. cui magis assimilatur, est febr. diel eueniens ex apostema carnis mollis, quae est in emunctotijs, & locis alijs. hoc enim apostema non firmatur sangu. solo sano vbi sangu. sed declinat ad cholera vbi supra. Et sequitur immediare. Constat ergo, quodd genera febr. sang. omnia sunt tria, propterea quia febr. quae provenit ex sang. proportionatur ad cholera cum sang. quando putrescit declinat ad cholera ibidem. Et secundum hoc. sermone negat ibi Galen. febr. fieri ex sang. ipso remanente sang. quomodo in nono particula mech. & nono de ingenio dicit oppositum per hunc dictum in principio istius cap. Synochus est cum putredo sang. est in toto corpore, quia in omnibus partibus corporis, mech. particula. 9. colum. 1. in fine colum. Et sequitur. Dico ergo febr. huiusmodi putredinis synocham esse. continuam. quandiu putredo permanet. Putredo enim semper est in humidis. rebus maxime calidis cum dissoluatione, vel euatione caruerint, sicut videmus in sordie, in stercoribus, cum vna pars aliam concoluerint. ibidem. Vide ergo quomodo Galen. iniuste accusatur & ei

Non ergo faciamus dubitationem de eo quod Gale. expresse ponit quia se. putridam ponit san. putrido generati secundum ipsum.

Tertio in ordine declarationum queritur si ex san. putrido extra venas potest se. generari. verum illa sit continua vel continua, vel interpolata. Et videtur q. interpolata, quia materia putrefacta extra venas facit interpolati, & consequentia patet in phlegmone ex auctoritate Gal. ut dictum est in declaratione. secundo ante istam.

Pro isto dubio est sciendum secundum Hippo. 4. amph. amph. 64. in quibuscumque feb. quotidie rigores sunt quotidie feb. soluntur. Et feb. interpolata que venit cum rigore quotidie in paroxismo illa feb. soluitur, & annulatur. Et secundum Gal. in com. posito quod illa se. soluitur post paroxysmum, quendam male qualitates retinentur, vel remanent intra corpus que sunt causa reuersionis ipsarum se. & mox iudicio illarum qualitates sunt precipue in loco minere, in quo est talis caliditas, & dispositio materiæ ibi veniens iterum conculcatur, & putreficit. Et iterum natura facit paroxysmi insultum faciendo contra materiam morbi. Ex hac est causa formalis paroxysmi. Causa autem materialis est ipse hu. putrefactus, & materia antecessores in corpore superabundans. Causa vero efficiens paroxysmi est, natura que conatur inimicam nocuum cum sua vi expulsiua extra corpus eicere. Causa autem finalis paroxysmi est sanitas quam non semper intendit & hæc est similitudo de furore a quo fuit extractus panis nouiter in quo post extractionem panis remanet caliditas, & habitudo ut iterum cito sit caliditas similiter est similitudo valis in quo per longum tempus acetum fuit conseruatum quo perfecte euacuatio si vinum in eo reponatur cito fiet acetum &c.

Secundo nota quod feb. efficitur continua rebus de causis. Prima est sumus materiæ intra vasa, quia tunc de directo sumi a minera elenati non possunt venas exire minimo per rotam repertum canalem ad hepar, & coactum manent, & elenatur. Secunda causa continuitatis est se. proportio humorum ad putrefactionem ut patet de san. quæ ex vtraque qualitate conueniens est, & proportionatus putrefactioni. 9. de inge. Tertia causa continuitatis se. est multitudo materiæ. Causæ autem interpolationis sunt contrariæ istis. Cum ergo san. inter omnes humo. sit maioris quantitatis cum etiam sit magis aptus putrefactioni, sequitur, q. ad locum minere continue fuit ratione quantitatis, & continue putref. ratione qualitatis, & sic continuus facit se. & hoc de isto dubio. Laus Deo vivo, & vero. quia situs mate-

riæ putrefactæ extra venas non est tam sufficiens ut se. fiat. interpolata sed bene cum paucitate materiæ, quia si materia esse multa, & putrefactioni parata bene faceret continuam, ut patet in phlegmone, & in bubonibus se. pestilentialium.

Quarto queritur quare ex apostemate choleico fiat se. continua, & non interpolata, cum materia sit extra venas. Ad hoc dicendum q. situs materiæ intra vasa non est causa essentialis putrefactionis interpolate quoniam bene uiuet, sed multitudo materiæ, & aptitudo cursus eius, & putrefactionis est causa putrefactionis continue. quod ergo materia cholericæ est habilis ad fluxum, & penetrationem ad locum minere. ideo continuum facit putrefactionem. & per consequens feb. sen. & quia in maiori quantitate est ceteris hu. similiter.

Quinto nota, quod in sanguineis se. non est ex. stando digestio materiæ quia san. maxime est digestus, & quia citius cognoscitur quæ aliæ species se.

Sexto sciendum quod corpora calida & humida paratiora sunt ad incurrendum synocham & synocham.

Sexto Ga. Cuicunq. dominatur ista consilio secundum calida, & hu. putredo cito festinat in eo. cum etiam in sanitate putrefactioni vicinus sit. quod precipitur ex istis potiore, & vrinæ putrefactione, & egestionem atque anholiæ: quia natura horum est quasi hirci in horribilitate odoris, propter quam plurimos morbos. 8. de ingenio. c. 12.

De febre quotidiana. Cap. XI.

Febris quotidiana est feb. interpolata affligens omni die ex materia phlegmatica extra venas putrefacta perueniens. Nunc autem sciendum quod se. quotidiana sicut multe aliæ egritudines habet causas primitivas antecessores coniunctas.

Causæ sequotidianæ primitivæ possunt esse se. frigiditas & humiditas aeris exterioris, longus usus rerum frigidarum, & humidarum ut est usus fructuum recentium, & piscium. Similiter quies & longum otium, & dimissio exercitij consueti. Etiam frequens balneum & dulcis aquæ, & frequentis crapula &c.

Causæ antecessores sunt nimia repletio humorum in corpore precipue phlegmatis secundum suas species, ut est phlegma vitreum vel lalum. &c.

Causa coniuncta est phlegma putrefactum extra venas effmans vique ad cor, & inflammatio illius sumi in corde est, causa putrefactionis, & conculcatio, & non enenatio illius phlegmatis secundum suas species.

Significatio fe. colligitur à Gal. 2. de crisi. c. 5. sic. feb. faciens paroxysmum omni die & cum procedant cum ea dies tunc quod accidit eis in primis horis paroxysmorum est frigus in eo quod apparet de corpore, & extremitatibus eius non est rigor verus, & reperitur in pulsibus diuersis, & corrumpitur ordo eius in principio paroxysmorum feb. & remanet de illa diuersitate aliquid in hora augmenti paroxysmi, & non reperitur in eo, velocitas & magnitudo, & fortitudo sicut in tertiana nec sentit tantam inflammationem nec anhelitus est magnus, & frequens nec tantus appetitus aque frigide. Suis est minor quam in ceteris fe. Et sequitur. Et urina à prima die eius est secundam quod est in principio quartanae, nec rger fortiter sudat in ea in primis diebus, sed in eo quod est post cum prolongatur in ea dies. & tunc iam fit in ea sudor. hæc est sententia Gal. ubi supra. Et sequitur in sententia quod alia paraculis conueniat, ut quia est complexionis frigide & stetit diu in otio, & quiete & multitudine cibi. Et propter hoc accidit sæpe pueris & communiter accidit cum læsio stomachi, vel hepatis & præcessit frequens nausearum fatietas, & tarditas in digestionem & eructationes acroscis inflationis hypochondriorum & color infirmi tendit ad albedinem, tempus est hyems & regio & complexio humida & hæc est sententia Gal. de crisi. c. quinto.

Si ergo quotidiana sit a phlegmate dulci in primis paroxysmis non venit frigus nec horripilatio nec rigor donec pertransuerint plures paroxysmi. Si sit a phlegmate vitreo, vel acetofo frigus est magnus valde, nec iste rigor nec frigus veniunt ita cito sicut in tertiana sed paulatim & primo in extremitatibus, & postea sunt sicut nix. Et sequitur vomitus phlegmaticus in principio paluitas sudoris, sed cum appropinquante dissoluitur materia, & in omnibus speciebus dolor stomachi, vel splenis & discoloratio faciei & priuatio sitis & cacochymia, & casus appetitus sunt signa communia.

Si fiat a phlegmate falso adest suis & frigus nimis rigor similiter, & maior caliditas, & siccitas & laevis in ore salisus non plangamus ergo papirum recolligendo signa quotidiana. Incipit ergo quotidiana de phlegmate dulci cum paruo frigore in extremis, & pulsus est paruus, & occultus, & vaporosus, & terminatur cum modico sudore, vel bulla in principio, sed propinquante crisi fit sudor nimis & de facili urina est remissa in principio, & spissa, & aliquando subtilis propter oppillationem, sed appropinquante digestionem materia sit rufa vel subrufa in quantum, quod aliqua

do indicatur caliditas hepatis, & non est adest tumor faciei, & color plumbeus, vel pallidus vel humidus. Os habet humidum, & non sinit. In phlegmate vero vitreo maximum frigus sentitur, & in acetofo similiter, nimis tamen quam vitreo. in dulci autem minus omnibus, quia quantum phlegma est frigidius tanto quiescat minus frigus.

Modica in febre quotidiana.

Primo indicat Gal. de fe. ad Glau. ca. 9. Amphimerina, id est quotidiana longa est & non sine periculo.

Secundo conualescentes effrenati, vel non bene gubernati ab amphimerina sepius molestantur, nam debitis digestis, & non debita vel immoderate cibi, & potest assumptio est, phlegmatis causa superditi augmentandi.

Tertio adolescentem quippe cholericum & siccum in complexionem nunquam videtur, pium huiusmodi fe. primo de se ad Glau. c. 7.

Quarto vniuersum corpus in huiusmodi fe. scilicet quotidianis iuuenes plenum indigestis humorem.

Quinto indicabis tempus durationis paroxysmi, & interpolationis, & secundum, quod materia est magis, vel minus compacta, & viscosa, quæ cognoscitur per tarda signa digestionis in urina. Et confirmari debet, quod durat paroxysmus per 8. horas, & interpolat. secundum variatum.

Sexto indicabis cognita specie febr. principium certitudinis illius se est usque ad 2. dies, & terminus sit radicationis usque ad 4. dies.

Septimo iudicatur in si vocabulorum, si venerit vomitus in principio accessionis, & sudor multus in fine eius, cito egritudo terminabitur, quia obediencia materis, & virtutis fortitudo indicantur.

Octauo abbreviatum, & alleuiatum paroxysmorum, & suorum temporum iudicant, illam esse citæ terminationis & sanationis.

Nono si sæpe fiant sternutationes post statum egritudinis sunt bona signa, quia indicant fortitudinem expulsiuæ.

Decimo iudicamus materiam incipi digeri per mitigationem accedentem, & per mutationem coloris urinae, & hypostasin eius, & per gurgulationem intestinorum & inflationem & per abominationem.

Vndecimo si isti in declinatione patientum aliquam inflammationem pedum, & ubiarum non mireris si alia bona signa apparet, sed fac ipsum abstinere à omniestate cibi, & potus, & fac ipsum sudare & confortare digestionem.

Duodecimo breuitas paroxysmorum, & multus sudor breuitatem egritudinis denotat.

niant, quia paucitas materię, & obedientia eius denotatur.

Curatio vniuersalis feb. quotis. Et primo cū. vniuersales permittantur.

Primus est Gal. de febr. ad Glaucō. cap. 12. Vniuersum tibi diēz regimentum calidum incisivum sit.

Secundus si amphimerinam patientes cum difficultate euniant, subfiliatione indigent hēmotum, qui stomacho sunt iuuiscati, vel adhęrentes.

Tertius competenter in principio paroxysmorum istius febr. vomitus prouocetur, vt materię antecedentis & coniunctę quantitas aliqua extirpetur.

Quartus in scisso, & subfiliatione materię, & consequens euacuatio in hac egritudine vsque ad finem continuandam intra tamen vnā horam euacuatinnis, & aliam mora sufficiens, & regimen cōseres sunt a medico expectanda.

Quintus omnes species istius febr. conueniunt in tribus, in principio scilicet in mollificatione naturę mderata, & in prouocatione vomitus, & in administratione rerum subfiliantium & incidentium & diureticorum. Aut. in c. proprio in prima quarti.

Sextus, quoniam debilitas digestiue stomachi & hepatis est causa phlegma multiplicandi. Ideo stomachum & hepatis & spleenem conuenit aperire & confortare.

Septimus secundum elongationem, vel appropinquationem status ad princip. egrit. secundum hoc eger diiudicandus & dictandus & magis vel minus de cibo ministrandum.

Octauus, nunquam in principiis paroxysmi dormire permittantur, nec in statu ne expulsiō materię impediatur. In declinatione autē si famescēdo dormiant, iuuat eos virtute hęc tolerante, quia tunc digestio, & consumpcio grossorum chilorum celebratur.

Nonus, nullus pręsumat cibare pati, quoti dianam durante paroxismo, sed post, vel ante per magnam pausam, nisi virtus multum fuerit defectiua. Gal. in passio. lib. 6.

Cura particularis fe. quotis. Et primo quādo est a phlegmate dulci naturali, quia tale phlegma san. est imperfecte decoctus. Et scitur per saporem dulcē in ore & per alia signa supra dicta. & tunc iuxta tenorem 4. cano. digeratur materia sic. Reci. rad. brnsci, sparagi, graminis a pij sen. cicoreę pet. ana vnc. 2. conquassata in aceto temperentur per sex horas. si non adest tussis, tunc addatur end. scariolę politrici, adianthos, capilli veneris, menis, ab sinthij ana vnc. 1. & s. end. & scariolę fe. brnsci & sparagi ana vnc. 1. ros. rn. florum boraginis & buglossę, corticis citri, & coriandri preparati ana dram. 3. zuchati. libr. 3. sit siru-

pus, & detur cum aqua cicerum rubeorum, & spicenardi incidit enim materias grossas, & confortat stomachum & cor, & alterat qualitatē febrilem. Et poterit addere scolopēdiam camedreos, & petro. maced. & similia, potest etiam digeri materia cum sirupo acetofo, in quo bulliatur hyssopus, vel sumatur cum decoctione hyssopi, & cicerum ru. vel cum osimelle diuretico. postea purgetur sic. Recip. polipodij querc. recentis & conquisati. vnc. 1. floru boraginis & buglossę ana vnc. 1. pall. mundi. ab arill. vnc. 1. & se. fiat decoctio, & in colatura temperentur corticis mirab. chebul. vnc. 1. in mane fricentur fortiter & colentur, & effio ratur colatura, ista enim decoctio euacuat phlegma quod est antecedens & coniuncta causa fe. quotis. & post stomachum corroboratum & confortatum dimittunt. vel in dicta decoctione dissoluatur pul. diaturbithi dram. 3. agrici dra. 1. fiat potus. Et ista iterentur, in principio tamen potest fieri clistere, & medicina laxatiua vel lenitiua cum cassia, quę secundum purgat phlegma, & cum pul. diaturbithi. Nos vero interdum damus eis iuxta tenorem 6. can. sirupum de absinthio, vel decoctionem absinthij & mensę cum virgul. graminis & radice sen. & an. vel si est multū delicatus fiat iulep ex aquis distillatis mētę & absinthij & florum sambuci, & radice sen. & petro. & apij cū zuccaro. deinde fit bolus deauratus ex diacarta. vnc. 5. & dram. 1. & s. pul. diaturbithi excepto iure de magis vel minus. Raro ministramus pill. quia materia est in stomacho & non indigemus longa attractione.

Sed iuxta tenorem 3. can. prouocetur vomitus tali modo. Rec. osimel. iussilitici, aquę rafa. ana. vn. 1. tepidum offeratur, & post prouocetur vomitus cum pluma, alleuat enim totum paroxysmum & materiam antecedentem & coniunctam euacuat. Aliqui enim dant rotulas rasani gall. & post duas horas mouent cū pluma & oleo. Si infirmus sentit inflationem, & gurgulationem intestinorum & abominationem & nauseam stomachi, signa sunt subfiliationis materię, & tunc medicina laxatiua per inferius vel vomitus est ministranda, & tunc securē potest dari catartum aliquod vel pill. stomachicę aliquantiter acuatę. Phlegma falsum si fuerit in causa istius febr. quotis. digeratur materia cum oxizaccara composita & aqua calida, quia secundum omnes aqua calida habet magnam proprietatem in phlegmate falso in lauando stomachum & temperando falsedinem eius. Et quia hæc species phlegmatis componitur ex phlegmate dulci, & ex cholera, ideo indiget medicina digestiua & euacuatua vtrinque humoris: digeratur igitur ista cum sirupo de hyssopo & oxizacca-

ra simplici. Et euacuatur cum medicina compoſita ex mirab. citrini. & che. vel indus, & eupatorio. & abſinthio, & uvis paſſis, & prunis & caſſia. & puluere diarubith, agarico in pil. vel in colatura. Et ſi uſus phlegma repertur eſſe circa hepar, quod ſcitur ex pruritu & aliquali ſcabie. Danda ſunt diuretica ad prouocandum vrinam & purgetur cum polipodi. & epithimo, & ſenſ coctis in ſero caprino, & poſt conſortetur ſtomachus cum trociſcis de ſpodio, & de ſand. & de camphora.

Phlegma uero acetofum cognoscitur per acetofum ſaporem in ore, & per oxiremiā frequentem, & per eructationes acetofas, & quia melicolia habet partem cum phlegmate in iſta ſpecie, ideo in digeſtiuis, & euacuationis miſcentur medicina eis ambabus appropriata: ſimiliter in phlegmate vitreo, & iſte duplex phlegmas ſunt frigidiore, & magis compactæ, ideo ſunt ad digeſtionem, & eradicationem inobedientiores, & ad curandum cardiores, & ſunt paroxiſmi earum longiores & frigidiore. ideo indigent fortiori- bus digeſtiuis & euacuationis. Digeratur ergo materia cum oximelle diuretico vel ſquillitico, & ſirupo de fumo terræ, vel oxizaccara, ſed in apozimate cum quo iſta ſumuntur ponantur aromatica, vt ſpice galangis & ciperus, vel pro digeſtio detur priſana eam modico pipere. deinde prouocetur vomitus cum ſe. ſala, & atriplicis vel cum ſaſano lardato cum el-leboro al. abieſtio elleboro, vel cum electua, facta ex ſucco ſquille & zuccaro, & conſortetur hepar, & ſtomachus cum trociſcis herberis, & de abſinthio, & poteſt interdum dari coſſetua de radicibus apij cum aqua diſtillationis abſinthij. Et purgetur cum diareſe, & diarubith, vel cum polipodio, & ſenæ, & epithimo, vel cum turbit, & ſumoterræ, vel cum chebul. & indi. & hierieplra, & hieratufni acuatris cum pilula colloquintide, & ſal gemme & cum pillula ſtomacis ſimiliter acuatris, quæ omnia dimiſſo medico ſapienter particu-lariter operanti.

Hic nota ſecundum Gerardum Crem. quod ſi tres guttæ ſucci mercuriali calidi in aurem vel narem dextram mittantur, ſtatim remouet tipum, probatum eſt, vt dicit in principio paroxiſmi ponantur pedes in aqua calida, in qua ſint coctæ herbe calide. Et ſiant vnguenta & olea calida cum ſtaſſagria, & piretro & dauco, & caſſoreo ad vngendum latera, & dorſum, ubi ſentiunt dolorem, & ſtomachus intus & exterius cum abſinthio, & menta, & hiſopo, & calamento cum mallice conſortetur poſt perfectam euacuationem per vomitū vel ſceſſum, &c. ſirupus etiam de menta videlicet iſto caſu, ſimiliter ſirupus de abſinthio.

Dieta. Primo caueant ab omni repletione cibi & potus, & a cibis multum humidis, vt ſunt piſces recentes, & omnes fruſtus recentes huiusmodi, & lac, & ſit iſta diaſia ſicut primus cauſa inclinet ad inſiſſionem materię: ideo competenter miniſtratur ius cicercum betu-corum cum petro. & ſpicæ. & paruo oleo, & ſale, & ius paruæ pullæ cum petro. & hyſopo, & croco. Et de herbis vtatur menta, aneto, bora-ſen. petro. apio. Et concedimus aliquando de pulla ſic parata & extremitates capreti. Et datus aliquando vinum ſubtile bñ limphatum. Et iſta concedimus quando ſimemus debilitatem virtutis: non intret balneum niſi poſt ſigna digeſtionis. Ingroſſatio autem diaræ, & eius ſubtiliatio reliquatur induſtriæ medici quo operatur in arte. Si vrina aliquando appareret ruſa, vel ſubruiſa, & virtus eſt fortis, extrahatur de ſan. cum menſura, dum tamen euacuetur à membro leſo. Dicit Galien. paſſio. q̄ in iſta febr. dandi ſunt cibi calidi, ſicut eſt piper, & ruta, & aniſum. Et iubet dari vinum ſubtile al. coloris. In acceſſione nihil dandum eſt de cibo nec de potu niſi in ſi. acceſſionis. aquam hordei cum gramine & rad. petro. Et ad comedendum detur pullus coctus cum petro. & croco. Et ſecundum Galenum ponatur ibi piper & cimi. Et docet ibi Gal. dare pedes lactantium quadrupelum coctos cum aceto, & pule. &c. Vinum ergo non deitur ſtomacho ieiuno, quia quod leſit ſanos, leſit inſirmos. Comedat auenatum hordeatum cum lacte amigd. Multa particularia occurrunt in paſſionibus, & diuerſi appetitus veniunt, ideo deſideratis, & appetitus aliquid eſt patienti offerendum ſecundum induſtriā. &c.

Declaratio in quotidiana. Primo ſciendum quod a principio vrina eſt al. propter phlegmatis frigiditatē, & eſt ſpiſſa propter eius humiditatem. Sed quando materia incipit digeri efficitur ruſa aut ſubruiſa cum ſubſtantia mer-diocriter tenui aut pingui propterea, quia natura conuertit illud in digerendum ad naturam ſan. & aliqui de hu. & ſuperfluitatibus digeſtionis cum vrina extra mictuntur.

Secundo nota, quod dictum fuit in ſignis quod pulſus eſt moll. & latus, & debilis, & diuerſus: vnde dico, quod mollis propter humiditatem, latus propter extensionem arterię molliſcatæ: quæ faciliſter extenditur propter nimiam humiditatem, & eſt tardus propter paruitatem caloris, & eſt diuerſus propterea, quia aliquando non dominatur ſuper materiam, & tunc pulſus eſt fortis, aliquando materia eſt magne reſiſtentię, & natura tunc non poteſt dominari, & tunc pulſus eſt debilis, & ſic ſit diuerſus.

Tercio intelligendum, quod ſc. quotidiana quæ

quæ Gal. vocatur amphimerina non dicitur quotidiana ex eo, quia quotidie affligat, sed ideo quia generatur de phlegmate putrefacto extra vasa, quia tertiana duplex affligit etiam omni die, sed tamen propter hoc non dicitur quotidiana, sed duplex tertiana nuncupatur. Dicitur autem à Gal. ubi supra amphimera ab am, quod est circum & meros, quod est dies, eo, quod in circumeundo omnibus diebus suos reitetet inultus, ut dicit Gerardus de cremo.

Quarto intelligendum est secundum, quod dicitur in 7. ll. pantech. quod paroxysmi quotidiani, & aliarum fe. in quibusdam sunt longi & in alijs breues, & hoc accidit propter vnum trium. Prima causa est natura materie, nam si materia est melior grossa, & viscosa, & frigida se. & paroxysmi eius erunt longiores, si autem calidior & subtilior minus viscosa, ræta se. & paroxysmi eius sunt breviores. Secunda causa est fortitudo, vel debilitas virtutis virtus. n. fortis citius digerit, & expellit debilis autem tardius. Tertia causa est figura corporis si corpus est spissum & vicolum, & oppilatum, & pori eius sunt clausi, & oppilati tæta se. & eius paroxysmi sunt longiores. Et si corpus est subtile & rarum, & pori eius sunt aperti tæta se. & eius paroxysmi erunt breviores, quia materia cito exhalatur.

Quinto sciendum quod quando fe. quor. fit a phlegmate acetoso quomodo fit frigidum tamen auctores iubent dare trociscos de ros. & de berberis ad combustionem stomachi, & de hepatis & ad refrigerandum complexionem febrilem. Sed quia sunt frigidi, ideo debent dari cum aliqua decoctione aperitiva, & calida, ut est decoctio anisi mæta, & carui ad aperendum. Et troscisci dentur ad temperandum calorem feb. & medicinarum calidarum quæ continue ministrantur, pôt quod datur intelligi, quod nunquam in ista fe. nec in alia res calida per se sine commixtione frigidorum debent dari ut materia se. vel eius mala qualitas non augmentetur. Dantur etiam isti troscisci, ut dictum est ad confortandum stomachum, & hepar quæ multum sunt debilitata propter vomitum, & purgationes, vi ipsa confortent, & stipicent. Et ista ministranda sunt post digestionem & purgationem materie.

Sexto sciendum, quod ex istis duabus speciebus phlegmatis, scilicet vitrei, & acetosi possunt generari alie febre. quæ ponuntur ab aliquibus doctoribus scilicet epiala, & liparia. Vnde epiala dicitur ab epi, quod est supra, & alior quod est frigus quasi frigus desuper idest, in partibus exterioribus. Ideo dicitur, quæ epiala est febr. in qua exteriora frigescunt, & caliditas ignota nimis sentitur, & hoc est.

quia ad partes exteriores mittitur phlegma vitreum & ibi remanet expallum super membra sensibilia, & sparsum tamen pro tunc non dicitur est putrefactum, nec supercalescendum. Ideo infrigidat multum membra exteriora. Et fit calor febris, quæ est ab alia materia phlegmatica interior putrefacta per mixtionem sui contrarij augetur, & cremet partes interiores, & non potest calefacere exteriores nisi post magnum tempus: ideo dicitur quæ paroxysmus eius durat quasi per. 24. horas. Et dicunt aliqui quod ut plurimum convertitur in quartanam: ut paroxysmus tantum dicitur quia materia est multa & copiosa, & grossa, & stipica, & virtus debilis sopita. Et propter hoc videtur continua quia quasi vnum paroxysmum attingit. luum, & tamen non est continua. Eo est alia species istius feb. phlegmaticæ quæ vocatur lipatia & eius interpretatio est epialæ contraria. Et in ista frigus interiorum conculcatur & exteriora calefcunt propterea, quia cholera vel phlegma falsum, expanditur supra membra exteriora & ibi putrefit & interior est vitreum quod opus magnum spacium putrefit & expanditur exteriori, & de hoc sunt compositi versus. Semper in epiala frigescunt exteriora. Interiora calent liparia vertitur. Et præter has se. scribitur in pantechni lib. 8. ca. de feb. compositis & causis, & significationibus eorum quod est vna fe. hætica in qua sentitur calor nimis in corporibus interioribus, & de illa materia sic putrefacta cito ascendit summus acutissimus in corporibus exterioribus. Et hoc fit quia hæc materia non est viscosa, & sic filijs est calor in interioribus & exterioribus; & hæc se. vocatur chymotos; & iste calor durat ad curationem paroxysmi, & venit omni die, & ibidem ait hoc parum, quod est quædam fe. in qua sentit infirmus calorem, & frigiditatem simul in corporis interioribus, & hoc est tingit quando se. nascitur ex putredine phlegmatis vitrei. Calor enim iste se. est propter putrefactionem hætici. Frigus enim est extra aliqua parte hætici nondum putrefacti, & vocatur hæc se. hyfelus, & interpretatur hyens longa, vnde sciendum quod licet Constan. imponat sibi quod ipse fecit pantech. tamen falsum est, quia Ras. composuit ipsam sic ut ego repeti in quodam antiquissimo li. ubi expresse ponitur in principio. Incipit liber Ras. philosophi, verumtamen Constan. mutat titulum & prohibemus hisach. etiam christus non composuit viaticum & non Constan. ut fateor Gerardus cremo. super eundem librum. Pereant ergo latrones quæ metunt, & non seminaverunt & ponunt saltē in messia aliena.

Septimo intelligendum, quod sicut dictum fuit in principio signis datis à Gal. in secundo

do de crisi quòd in primis diebus huius fe. eger non sudat, & causa est materia nondum digesta, nec est habilis nec subtilis vt exeat per sudorem. Sed cum elongantur in ea dies in quibus natura facit, & digerit & subtiliat di. ctam materiam & grossam, & illa efficitur digestina & subtilis & habilis expulsiōi, tūc natura resoluit illam materiam in fumum quam mittit ad cutem, & ibi conuersa in vaporem aqueum in sudore, per poros cutis exterius emittitur. vnde ad sudorem eria requiruntur. Primum est apertio pororum. Secundum est mollicies cutis. Tertium est fortis natura potens digerere, & resoluerē illam materiam & ipsam ad superficiem cutis expellere. Constat autem quòd in primis diebus huius fe. ista nō existunt, ideo sudor in principio non exit, vt primo dictum est.

Octauo dubitatur si vinum cōpetit tu quotidiana cum sit fe. & omnis fe. est morbus caliditas, & siccus. secundo de morbo. c. 1. Si ergo datur vinum augmenabitur fe. quia omne simile additum suo simili facit illud maius, & facit ipsum furere. 2. amph. cō. 14. ibi. In morbis minus periclitantur ægrotantes, &c. Ad hoc dicendum, q. vinum competit in hac fe. si cut dicit Petrus hispanus quem in suis clarificationibus sequitur Gordouius. vnde si quotidiana est a phlegmate salso nō ita de directo competit quia digerit, & aperit, & prouocat vrinam, & cum hoc quod potius est confortatur naturam dummodo sit album vel clarum debite per se vel per commixtionem aque, & ibi etiam iubet dare cibos calidos, & vinum al. & subtile. & contradicit ibi medicis indoctis, quæ dant cibos frigidis in hoc. & tales credunt extinguere fe. & extinguunt spiraculum vitæ. Gal. vbi supra. Et responde mihi quare non daretur vinum quia piper & ciminum, & ruta eis conceduntur, & multo magis vinū cum sit amicus naturæ.

Nono dubitatur de vomitu vtrum competit, & videtur q. non, quia quando egritudo materia eius est super diaphragma tunc competit vomitus. Et quando est infra diaphragma cōpetit pharmacia que ducat per inferius. sed materia quotidiana est infra diaphragma quia in stomacho. ergo &c. consequentia est bona, & antecedens pro maiori est Hippo. 4. ampho. 8. ibi. Supra diaphragma dolores sursum, pharmacia inferius indigere significat, vbi supra. pater minor de se & per omnes auctores. Secundo probatur, quod non competit saltem in principio quia digesta medicari & non mouere cruda. Ad hoc dicendum, q. vomitus competit in quotidiana. Primo quia quia submouet, & subleuat materiam, quæ multum est inuiscata & tenax. Secundo quia

partem eius euacuat & minorat eius quantitatem quapropter alleviat paroxysmum. Tertio, quia stomachus multum granatur in hac passione, vt dicit Gal. r. de fe. ad Glau. quia materia coniuucta fe. quot. pro maiori parte in stomacho continetur, & ad ipsum finit ideo expe dit vtiple stomacho alleviatur, ne supuentur cibis in eo corrumpatur cum illa materia mixtus, quarto quia ad expellendum est, breuior quam si per inferius purgaretur. Et tunc ad primam rationem dico quòd ampho. intelligitur quando non adest fe. sicut dicit Gale. in com. in fine eius. Ad secundam, quando arguit quòd materia nondum est digesta dico quamuis in principio materia non sit digesta, tamen vomitus iuvat ad digestionem illam mouendo &c.

Nono Bern. de Gordouio magister bonus bene loquitur de 4. humoribus in quatuor partibus diei naturalis, & hoc secundum influentiam superiorum & inferiorum bene diuidendo diem naturalem in 24. horas secundum hoc regnant. 4. humores quilibet per. 6. horas & quilibet i suis horis magis mouetur. Vnde sanguis regnat in vltimis tribus horis noctis, & in primis tribus horis diei sole oriente sequitur motum solis qui est in oriente, & hoc facit ratione conformitatis, quia dignior humor & dignior planatus, & hoc de radice superiori de radice inferiori, quia natura in nocte generat sanguinem propter fortiora digestinam & mouet ipsum in illa hora vt à se per illius mundetur. Cholera autem mouetur in 6. horis sequentibus sequens secundam quadram motus solis que est calida & siccā & hoc quantum ad radicem superiorem, ratione autem radices inferioris tunc mouetur, vt non inflamment sanguinem. Melancholia autem mouetur tu alijs. 6. horis sequentibus que est, quadra frigida & siccā ratione radices superioris vt per suum motum caliditas & humiditas fau. temperetur & purgetur a superficialitatibus melancholicis. Plegma vero mouetur per alias sex horas sequentes que est quadra frigida, & humida ratione conformitatis. Et vt tunc san. à superficialitatibus phlegmaticis mouificetur. Et istæ horæ sunt inæquales secundum ascensionem signorum. Quilibet enim hora durat tantum quantum medietas ligui vnius cuiuslibet ascendit vel oritur super horizontem, & de hoc stat. versus. Tres lucis primas, tres noctis tenet & imas Sanguis, sed cholera sex conuenit esse sequentes. Ast ater reliquas humor sex occupat horas. Postremis regnat sic phlegma sequentibus horis.

Decimo intelligendum quòd phlegma quod generatur ex nimia frigiditate acidum efficitur, quod autem ex nimio calore salsum fit. Si

autem

autem generetur a paruo calore dulce fit aut si ne sapore. 3. ampho. com. 1. 3. ibi. Si vero hyes austriua fuerit.

De quartana. Cap. XII.

Quartana est febr. interpolata de melancholia extra vasa putrefacta proveniens paroxysmus de quarto in quartum diem faciens. Ista definitio trahitur ex dictis Gal. 1. de differentiis fe. Circa istam materiam intelligendum ut prius tactum est in c. 1. istius. 7. li. quod melancholia quandoque putrescit intra venas, & facit fe. continuam & hoc accidit raro, ut dicit Aui. in prima. 4. c. de quartana. Et aliquando melancholia putrescit extra venas & facit interpolatam. Et ista potest subdividi, quia quedam generatur de melancholia naturali, quae est proprie fe. san. & illa melancholia naturalis generatur, quando sanguis, & alij hu. generantur. Aliquando ista melancholia a qua talis quartana generatur est melancholia adusta, quae facta est per aduersionem hu. aliorum, ut dicit Gal. 2. de crisi. quod quando san. putrescit de subtiliori parte eius efficitur melancholia. Et praeter hoc quedam quartana fit de melancholia, quae magis trahit ad naturam san. Alia est, quae trahit ad naturam choleae & sic de alijs.

Causae fe. quartanae sunt omnes quae inuadunt & multiplicant in corpore melancholiam sine illa sit naturalis, scilicet fe. & coleraetum san. & aliorum hu. si uicilla melancholia ueniat per aduersionem san. & aliorum hu. Exemplum primum sicut sunt longus usus, & comestio rerum multiplicantium hu. melancholicum. Ex primo de pane, panis militij, & panis opus, & panis arsus lentes fabae, & substantia omnium leguminum castaneae & caseus salitui & antiqui pisces salsi & desiccati. de carnibus autem est caro, bouinis, leporina, ceruina & omnis caro salta, effumata, canes &c. Exemplum secundum sicut est usus rerum adurentium san. ut sunt alia piper nasturtium sinapi forte vinum neque aqua ardens, omnes species herbarum, & grana excellenter calida & precipue nimis labor, ut quando longa itinera in tempore aestiuo & in diebus canicularibus. similiter longa ira frequens & continua nimia tristitia similiter longae praecedentes in quibus san. & alij hu. aduersionem & putrescent per magnum calorem conuertuntur in melancholiam, quae non euacuatur immo remanet in corpore, & putrescit, & facit quartanam. similiter passionem splenis iuuant in utraque causa, ut est oppilatio apostema durices & similia, & ad hoc iuuat complexio radicalis, & fluens melancholica, quae ad hoc est inclinata, ut generet melancholiam. similiter tempus autumnale, & alia par-

ricularia tendentia ad frigiditatem, & siccitatem &c.

Signa quartanae sumuntur à rebus naturalibus, & a rebus non naturalibus, & a rebus contra naturam, ut dicit Coslan. in pantech. & impletur Aui. in c. proprio. Ex rebus naturalibus ut est, melancholicae complexionis male coloratus colore citrino vel cinericio vel fusco vel plumbeo & mēbra paucae carnis, & macra, & nigra in colore.

Sumuntur etiam a rebus non naturalibus quia sunt vsus cibis quorum natura generare melancholiam sicut sunt caules, & calcus antiquus, & carnes salae, & effumatae, omnes species leguminum caro leporina, & ceruina vel quia sunt vsus rebus sanguinem adurentibus ut nimis labor tempore aestiuo, longus usus specierum, scilicet piperis zinziberi, & similiter herbarum vel seminum calidorum ut aliorum siop. naturae ferreae & similitum, vel quia diu stent in frequenti ira & tristitia, vel quia sunt in multis & frequentibus vigilijs, vel quia praecesserunt se. longae, & errantiae. omnia ista iuuant ad multiplicationem melancholiae, & quando febri periodica adest, & ista in maiori parte praecesserunt, significatur quod illa est quartana. not.

Sumuntur etiam a rebus contra naturam primo a morbo, quia astringit de quarto in quartum, & est morbus frigidus, & siccus quod ad materiam saltem antecedentem quamuis calidam propter putrefactionem. Sumuntur etiam signa ab accidentibus morbi, quia quartana scilicet incipit cum frigore paucos deinde augmentatur. frigus deinde minoratur prope statum paroxysmi sicut fit in feb. phlegmatica, sicut dicit Aui. Deinde expanditur calor per totum corpus cum horripilatione, non tamen est uelut mens calor sicut in tertiana & est maior quam in quotidiana. Et dicit Aui. quod non comprehendit totum corpus, sed est cum horripilatione mixta cum frigore & aliquantulo dolore, quasi frangantur ossa. Et ista sunt propter grossitatem materiae, & frigoris eius. Et uenit aliquando talis compressio & confractio, quod dentes strident. Pulsus est in principio paruus, & durus & tardus, & occultus: ac si elicti pulsus senis. Urina in principio est alba declinans ad viriditatem cum priuatione digestionis, & post principium diuersificatur urina secundum quod diuersificatur generatio melancholiae & diuersis hominibus, ut dicit Aui. Et in quartana reperitur cunctis arida, & sicca cum calore plumbeo, & nigro.

Si melancholia quae facit quartanam sita san. adusto antecedunt signa san. & forte se. sanguine praecesserunt, & urina est r. & adest conuenientia particularium: ut est aetas complexio tempus & c. & pulsus est plenus magnus.

Si à phlegmate aduſto paroxiſmi diutius durant, & accidunt eis maius frigus & longius, & ſudor tardior & vena groſſior, & ducies in pulſu minor, & venit talis quartana poſt feb. phlegmaticas. Si eſt à cho. aduſta pulſus eſt va-
locior, & paroxiſmus incipit cum horripilatione, & frigore in carne, & cum ſudore in ſine paroxiſmi. Advenit eis ira, & furor & forte præceſſerunt feb. choleticæ. Si a melancolia, ſigna iam ſunt dicta.

Iudicia in quartana. Primum iudicium eſt, Auiſen. in prima. 4. in c. proprio. Raro durat quartana quin in ſplene ſit oppilatio aut dolorant durities. Secundum iudicium Hipp. Eſti-
ue quartanæ vt multum ſunt breues, autum-
nales vero longe maxime quæ ad hyemem cõ-
iunguntur. 2. amph. 2. 5.

Tertio febris inordinate vagâibus quar-
tana ſi tunc ſunt certius tamen circa autum-
num. 3. progno. cañ. 19.

Quarto quartana quæ non venit cum apo-
ſtemate ſplenis vel aliqua paſſione eius, non
ita longa nec ita mala ſicut ſi venierit cum eis,
quia talis perducitur ægrum ad hydropiſm.

Quinto prognofiſticat Aui. quartana quan-
do eſt ſaluata, quando eſt ſine apoſtemate, & ſi
ne alia ægritudine, & bene gubernatur: non
eſt periculofa, & liberat ægrum a malis ægri. &
multis ſi curet à melicholia, epilepſia, & ſpaſ-
mus: quia materia à qua generatur eſt ſicca, &
quantum eſt deſe, eſt ægritudo ſine periculo
quæuis longa ſit.

Sexto iudicat Aui. quando in quartana
nō accidit error: non durat vltra vnum au-
tūm quia ſicut ægri acute iudicantur per mo-
tum lunæ, ſic & cronice per motum ſolis. Et
aliquando durat vſque ad duodecim annos
quando male gubernantur, aliquando per
duos, aliquando per vnum cum dimidio.

Septimo ſi quartana bene gubernetur, &
regatur in autumno & hyeme cū bona diætā,
& purgationibus, & digeſtiuis debitis, & ſple-
nis, hepatis, & ſtomachi obſervatione in tẽpo-
re venis frequentior curatur ante ſinem maij.

Octavo quartana quando ſit ex melancolia,
ex ſanguine generata, eſt breuioris ſpacij, & ci-
tioris cure deinde illam quæ ſit ex cho. deinde
phlegmate: deinde melancolia, & hoc dicit
Bern. de Gord.

Nono iudicatur ſecundum Raf. & eſt con-
ſiderandum an ſe. & eius accidentia & ſuz ac-
ceſſionis longitudo minoretur & quæ currit
in ea, & hoc bonum eſt. hæc ille. 10. ad alman.
c. de quartana.

Decimo cognofceſ, & iudicabis ſtatū ægri.
per forſiſſima accidentia, & deteriora cum ſta-
tus ſit fortius tempus omnibus temporibus
morbi. Haly. de reg. diſpoſitione. c. proprio.

Vndecimo iudicabis digeſtionem materie
iſtius, & alterius morbi per mitigationem pa-
roxifmorum, & minorationem eorum. Haly.
ibidem.

Duodecimo iudicat Gal. in primo de fe. ad
Glan. c. 8. ſic iter deficientes. in interpolatis ac-
tiſſima, miſiſſima eſt rectiana. lōguliſſima vero,
& ſine periculo quantum in ſeipſa eſt quat-
tana vbi. 8.

Decimotertio iudicium ſic Hippo. in 4. am-
pho. ampho. 30. & extenditur ad omnem feb.
interpolatam. Quibuſcunque exacerbationes
ſunt, vel paroxiſmi ſi in qua hora febr. dimi-
ſerit, in cratiſſimo eadem hora accipiat diſcri-
pta id eſt longa.

Decimoquarto eſt Hipp. ſic. A quartanis
habiti non valde à ſpaſmo apprehendantur,
ſi vero apprehendantur & ſuperuenit quarta-
na, ſoluuntur. 3. amph. amph. 7.

Curatio quartanæ. Et primo aliqui caſi. vni-
uerſales curativi permittantur, in quibus in-
generalis cura quartanæ continetur.

Primus eſt Haly. in 3. de reg. diſpoſitione, &
eſt etiam Aui. in prima. 4. In quartana ſi vides
in pulſu magnitudinem, & velocitatem non
multā & vena eſt r. groſſa, & habito plē-
na, & ætas inuenuilis acceleranda eſt ſanguinis
natio de vena baſilica aut de ſplenica de
mano ſiniſtra. Et ſi ſanguis r. & clarus, ſta-
tim claudenda vena, & ſi niger aut turbidus,
aufer de ſan. ſecundū menſuram neceſſitatis.

Secundus eſt Haly. ibidem. Niſi ſang. tū-
tū videatur abundare, nullo ſtebotomia eſt
attendenda propter cauſam ſupradictam.

Tertius nallum medicamẽ forte laxatiuum
in principio quartanario eſt offerendum, quia
talis hñ. melancholicus diu remanet crudus,
& propter ſuam groſſitiam, & durtitiam in
principio non poterit euacuari, ſed bonum,
& ſubtile euacuabitur, & groſſum: & indigo-
ſtem remanebit, & ſic ſe. magis cõſortabitur.
de clyſtere lenitio & minorationis purgatio-
ne non negligendo.

Quartus eſt Haly. ibidem. Taliter ingenien-
dum eſt in quartana cum cibis, & potibus, &
herbis, & fructibus aliquibus, quod venter do-
cileſt ad molliciem. Et conſtipatio cum iſtiſ-
que tunc vel ſaltem cum molliſſimo clyſteri.

Quintus eſt Haly. ibid. prohibe quartana-
rios a cibo in hora accēſſionis, vt natura in-
ſiſtendo morbo potius occupetur.

Sextus ſequitur immediate. In quartana
nō oportet vti balneo, niſi cum ſtatuſ eius ad
uenerit, & declinaſio inſeperit.

Septimus tota die quartanarij cõtarieror.
generationi choleticę dignæ.

Octauus ab omnibus autumnalibus fructi-
bus, & alijs recentibus quartanarij ſunt pro-
hibendi

hibendi, quia hu. grassos, & cito corruptibiles generant & faciunt oppilationes.

Nonus caueant ab aere frigido, & in aere calido, vel temperato sit habitatio eorum.

Decimus omnes quartanarj cibis, & potibus indigent & medicinis aperitiuis, & humo- rum conculcationem prohibentibus. Et regi- men eorum ad caliditatem & humiditatem in- clinetur, pro maiori parte.

Vndecimus propter ea quia materia huius egri. est dura, & compacta, & stas. eius remo- tus est à principio, ideo non multum subtiliter eger à principio est. distandus, sed taliter cibis & poribus reficiatur, q. victus eius salua ad statum valeat pervenire.

Duodecimus in hoc egri. non offerantur res excellentes calide aut deficientes, ne talis materia inde generata faciat sepe prolongari vel duplicari aut in continuam converteri.

Decimus tertius est. Frigida excellenter mi- nistranda non sunt, quia materiam infringit, & coagulat & digestionem impediunt, & excruciationem perturbant. Gerendus sup via- ticum ponit istos duos vltimos can.

Decimus quartus quartanarj spectare de- bene paroxysmum stomacho ieiuno videtur. *cañ. 10.*

Coratio particularis quartanæ: iuxta tenori- rem. 10. cano. regatur pabnis tibus, & potibus in quibus sint res aperitiue. & ista sunt pulli gallinarum, & perdicum, & phasianorum, & capreus lactans, & galline iuvenes, & petro, & boraginis, & malux & spinagii, & pisces squamosi de quibus mund. Et si in princi- pio mentis capiat, pruna damas. vel massulas sine arillis, & postea bibat de iure gallinæ, vel caprei, vel castrum vix. primæ bullitionis, vel galli antiqui. & sic vtiq. quartus in molebiq. can. & alleviabitur ægritudo. Idem operatur ius malux, & attriptis, & borag. & mercuria- lis, & sicq. paratæ cum inre mutonis, vel caprei, vel gallinæ. &c. Et vt. 10. can. impleatur vti- tur ordo, & auenato, & lacte amigd. cocto- cum extremitatibus caprei perfecte bullitis cum pet. & croco. Et secundum istum can. vi- dentur competere omnia forbilia, & pisces petro- si parvi, & squamosi parati cum petro. & ci- namomo, & croco, & tale semper parcendo su- perfluo cibo, & potui sic gubernentur per ali- quod tempus, prognosticando quod ista egri- tudo est longa, & non vult dimittere pacien- tem apud hyemem.

I. si autem ægritudo non videtur allegiari immo continue crescit, tunc rationabile est, quod materia aliquantulum pergetur, & prius cum oximelle simplici, vel diuretico, vel cum aliqui digestio hu. peccantis materia deinde pergetur cum ista colatura, & cedente leniti

uo clysteri. Recip. storum boraginis, & buglos- se. polipodij querci. sene anisi ana vac. se. pas- mand. ab arill. vnc. i. fiat decoctio, & in colat- ura ponatur pul. sene, & epithimi ana dram. i. & se. corticis emblicorum, & belliricorini ana dram. 2. fiat potus. In 2. & 3. vice digeratur materia cum oximelle diuretico mixto est decoctione e pitui. & sumiteira. & anisi de- inde purgetur cum diaseis, & diarraglinis, vel cum supra dicta decoctione facta in sero ca- prino, & addatur lapid. lazuli. dram. 2. de qua- ri. de succo ros. dram. 1. & se.

Istis autem sic in ceptris si signa apparent sang. fiat flebotomia de basilica in brachio sinistro, & sic adimplebis primū can. Et si adhuc sang. videtur abundare fiat flebotomia de salustela la in manu sinistra, & post ista digeratur mate- ria cum illo sive pot. Rec. rad. apij, & feminuli, & graminis bractei paragi modum corticis ro- buli & sambuci, fraxini, & genestæ, & aquaria sci. ana. m. i. conquantentur, & temperentur per diem, & noctem in aereo. foris limbo, albo, vel claro non in vase cupreo, quia recipit inde su- pore, sed in ligneo, vel terreo, & deinde adda- rut cicoreæ cum toto germandur. vtriusque sticidos vtriusque calamentum. ana vnc. i. scolop. m. 2. absinthij menthe end. scariol. mel- lissæ. ana vnc. 2. q. se. frigidosum minorum. 10. c. capiat spicæ, & cel. ana dram. 2. & 3. mellis ros. h. 2. eucauri. lix. fiat sirupus, & detur cum aqua decoctionis cicoreæ. tui. & sicq. mixtura pus debet fieri cum aqua ferratæ. & mirabilis ad omnem quartanum. Postquam cognoverit digestionem medicinadum cum hieracisina, vel cum colatura superius dicta in qua dissolu- natur indorum, & belliricorum ana vnc. 2. tem- perentur per sex horas deinde fricentur, & co- lentur etiam offerantur immixtæ post oia- turam uocetam detur la pidis lazuli abluen- deam. r.

Postquam autem fuerit purgatus, & acci- dentia incipiant diminui, capiat res in septi- mana trisani aut meridiorum cum vino de- coctionis agrimonie. Si autem materia est tri- bellis digestibon, & inobediens: nec signa dige- stionis apparent nec fistuloma allentantur tunc regatur pa. dicta calida, & humida, & re- neat se in calose, & iterum de nouo in cipe di- gerere materiam cum aliquibus ex istis, scilicet oximelle diuretico, & squilluico, vel sit u- po de absinthio cum apozimate de radicibus apertis sirupus de bisancis sirupus de squi- nna to consummiter valent. Et videlicet con- serua achori per se, & conserua rad. apij, & maxime quando est diutius splenis.

Et iterum purgetur cum hac colatura quæ purgat cho. ni. Rec. pas. ab arill. mund. sene ab- sint hij storum borag. polipod. querci. epithi- anisi

asini ana. unc. s. fiat decoctio in sero caprino & in colatura temperetur corticis mirab. emblicorum & bellinorum ana vnc. i. per totā noctem, & fricentur fortiter, & colentur, & colatura offeratur. Et est intelligendum quod quando in vrina apparet rubedo tunc cum digestus dicunt ministrari aliqua frigida simul cum euacuationis vt end. scariola scolopendria & 4. se. frigida maiora & minora sand. & ros. & similia, & hoc ad reprimendum calorem rerum calidarum pro electuarij detur tria san. rosata nouella, & zucarū ros. In causa calida in viatico inbetur dari apozima de radicibus apertius cum sirupo de absinthio, & inbetur materia purgari cum vomitu. Comedat tamē ante vomitus prouocationem per tres horas rotulas rasi. gall. temperatas in melle. & post cum pluma, & oleo vomitus prouocetur. & in fine paroxysmi si est possibile sudor prouocetur. Et ego habui in mea iuuentute se. quartanam præteritens paroxysmum euenire in traham lectum & pannos calidos aliquando tegulam calidam pedibus faciebam applicare aliquando cucurbitam plenam aqua calida, vt idāna frigoris euitarem, & sic transibat frigus & postea veniebat calor, & post sudor in fine paroxysmi, & aliquando prouocauit vomitum in principio paroxysmi, & ante principium post acceptationem cibi, & sic continuando dimisit me se. in fine septembris, quæ incepta in vigilia sancti Laurentij immediate præcedentis, nullos tamen fructus recentes comed. di. Laus Deo viuo, & vero. Dicit Avic. auctoritate Gal. sic Gal. inquit sanauit plurimam gentem a quartana sic. dedi eis in potu post digestionem solutium. deinde dedi eis in potu succum absinthij, & inde dedi eis etiam cam. Et dico quod ista, & pipet singularia sunt inuamēta valde hæc ille. Ultra hoc ponunt mul ti auctores, quodam quartana magis attrinet san. alia magis stat. & sic de alijs. Et secundum hoc diuersificatur cura secundum diuersitatem humorū qua talibus melancholia generatur. Si ergo in aliquo præcessit morbus sanguineus, & complexio infirmi sit sanguinea, & apparet venæ plene, & vrina ru. & grossa, & pul sūs plenus, & alia particularia conueniant: tunc dicitur quod quartana est a melancholia facta per adustionem san. & tunc detur medicina digestiua, in qua non sit calefactio sicut est oxi zacchara, & sirupus de ros. & oxiseni. & mel ros. & zucarum ros. & viol. & pitana, & sirupus end. & sirupus scariolæ, & similia. & dentur mala granata. deinde detur medicina, quæ purgat san. ab hu. adustis, & melancholicis post prouocetur vomitus in principio paroxysmi facta prius fletoromia de basilica. deinde purgetur cum ista colatura. Recipe carniū

prunorum damasce. rs. numero pass. mundi iurubarum sebesten florum boraginis, & burgosiz viol. ana vnc. i. fiat decoctio in qua dissoluitur corticis mirab. citrino. vn. r. cassia si. vnc. se. detur pro vna dosi, & videlicet in ea sanguinea & cholericā.

In quartana procedente a melancholia generata ex cholera, vel in qua cholera habet partem, & præcessit tertiana, vel alius morbus cholicus & pulsus est velox, & vrina citrina & cholericā, & alia particularia conueniunt & tunc digeratur materia cum oxizaccara vel sirupo viol. & ros. & vratur lacūs portulacis borag. & spinargijs, & mecuriali, & fumoterriz in suo tempore, deinde purgetur cum decoctione supradicta, vel digeratur materia cum sirupo de capillis veneris, vel cū isto sirupo. Recip. dianthos capilli veneris scariol. end. rostri porci. ana. ma. se. frigidorum minorum se. brusci. aqua. vnc. 3. scolopend. r. corticis tamarisci ana. unc. i. zucarū quarta. 5. sit sirupus, & detur cum aqua scolopendria, & purgetur cum oxiseni. & iunna, & cassia, & similibus.

In quartana autem de statu in qua vrina est grossa, & sitis parua, & complexio phlegmatica, & forte aliquis morbus phlegmaticus præcessit. Et alia particularia conueniunt tunc detur apozima de radicibus apertius cum seminibus salidis apertius pro digestionem cum menta & absinthio, & melle ros. Purgetur materia cum iuribith, & agarico, chebolis, & diacarthamo, & pulpa toloquinidæ. Et in omnibus istis respiciantur causæ vniuersales, quibus vomitus in isto casu multum videlicet, quia phlegma, & vtriusque plurimum ad stomacum concurrit, & ideo prouocetur vomitus in principio paroxysmi, & post perfectam euacuationem in isto casu multum valet tyriaca, & metridarum, & similia. deinde gubernetur, vt supra dictum est. De quartana facta a melancholia, cura posita est ante omnes.

Sed est hic intelligendum, quod tyriaca magna, & metridarum, & aurea Alexandrina, & similes medicinæ debent ministrari post digestionem, & euacuationem materię, & non ante: quia magis mouerent materiam, & dissoluunt sine consumptione, vel euacuatione eius. Dixerunt aliqui quod succus absinthij distemperatus cum aceto datus tribus auroris conuinis curat quartanam. Idem dicunt de succo berberis distemperato cum vino. hoc intelligitur purgata materia sufficienter. Item ponit Haly. de regali dispositione, quod locostæ longæ suspensæ ad collum curat quartanam. Scribit etiam in primo libro chironidarum quod cor auica-

lx, quæ torquet collū, quæ vocatur in lingua beernensium tortura luna deficiente: si suspēdat ad collum patientis quartanam curat. Ista sunt experimenta & potius empirica. Conferua facta de radicibus apij et conferva quæ fit de floribus tamarisci, valet in isto casu. Similiter visus cassiæ, cum epithimo & folliculis senæ.

Vel fiat sic. Recip. confertur radicis apij, vn. 2. cassiæ, passatæ per sedacium, dram. 3. folliculorum sc. vnc. 1. epithimi, vnc. 1. confertur bugiosse, dram. 7. zuccari panis vnc. 2. fiat mixtura, & offeratur stomacho ieiuno qualibet die, dram. 5. cum vino decoctionis liliifragi. Dicitur quoddam succus tapii barbari datus test ante peroximum per vnam horam curat quartanam. Flebotomia de salueta sinistra manus in hora accessionis curavit multos, me vidente quannis sit contra regulas artis. Ex sanguine a sinis, & succo corrigiolæ, & aceto si fiat quali vnguentum, & vnguantur quartanarij sanant eos, cit. 2. Cor leporis in panno missum, & suspensum in collo idem facit empiricum est succus calamenti sumptus cum vino añ horam accessionis curat quartanam. Gordonius. Omnia ista intelliguntur cum bono regimine, & purgata materia.

Vnguitur spina dorsū cum oleo benedictæ, & oleo de lilio, & vaguendo arogon, & marciarib. in hora magni frigoris balnea humectantia valent in fine quartanæ quia tunc materia iam est subtiliata, & sic euacuabitur per sudorem, ante autem non valet.

De declaratione quartanæ.

Primo sciendum quod iuvenes nimis vixorari si multum in principio continent cum vxore frequenter incurrunt in hanc febrem: Principio ratione nimij coitus virtus debilitatur, & mali in corpore multiplicatur in humores, & sic in se decidunt frequenter, quæ ratione mali regiminis prolongantur, & in quartanam conuertuntur. Ideo prohibendi sunt à coitu si cito volunt sanari.

Secundo queritur quomodo locusta suspēsa ad collum curat quartanam dicitur quoddam ista empirica aliquid operentur illud faciunt a tota proprietate quæ est virtus absconsa domini forma specificam illius rei mediante cetera alicuius vel aliquorum corporum super celestium influentia.

Secundum tunc dubitatur quæ est illa tota proprietas. Iuxta hoc multa dicta dixerunt aurores. Nam Auer. in 5. collo. videtur dicere quoddam sit complexio. Alij dicunt quoddam est forma substantialis illius compositi. Alij dicunt quoddam est totum mixturum. scilicet forma, & substantia, & complexio quæ Aui. vocat totam substantiam in doctrina. 3. sen. primi causa. c. 15. quæ

dicit quoddam res quæ non est operans a materia nec qualitate, illa est operans, & tota substantia. Nota hic quoddam intentio Auer. vt supra fuit quoddam complexio propria sub ratione quia declinat in qualitatem obiecti sub debita proportionem. illud dicitur tota proprietatis. Vt verius, & clarius loquamur dicamus quoddam tota substantia vel proprietates per quam mixturatur operatur aliquem effectum, cuius productionis causa naturaliter loquendo est ignota. est quidam virtus, vel naturalis positio consequens immediate formam substantialem rei acquisita cum influenda corporum suorum praecelestium ad hoc speciale influentiam habent in introductionem formæ, & videtur esse de mēte Aui. in secunda sen. primi doc. 2. summa propria c. 15. & in libello de viribus corde trac. primo. c. ultimo. unde Arnaldus in tra. de causis sterilitatis ait sic. Dicitur autem proprietas propria natura ad quam acquirendam propria & substantialis forma mixtionis disponitur sicut accidit consiliet mixto. & hæc natura occulta dicitur tunc ignorata vt plurimum, tunc quia via rationis nunquam cognoscitur, sicut cognoscitur decium complexionis qualitatibus complexionalibus. Et proinde completio dicitur natura. non quia proprietas nominari potest. Et viam etiam rationis cognoscitur tota autem proprietas nunquam nisi per viam experimenti cognoscitur. Et in hoc cognoscitur intellectus quoddam in altitudine operationibus medicinis presuit experimentum quia ratio, quia multa stant in experimento quoddam nunquam fuerunt nec de presenti stant in ratione.

Secundo cognoscitur intellectus quoddam non omne experimentum potest valari ratione nec confirmari. Ista autem proprietas potest sic describi proprietas est quiddam virtus vel naturalis positio consequens immediate, & inseparabiliter formam substantialem rei adductam super ipsam sub determinata proportionem adiuvante celesti influentia. Et supradictis patet quod tota proprietas non est complexio. patet quia si sic ille quæ haberet eandem proprietatem haberent eandem vel similem complexionem, consequens est falsum, quia reubarbarum, & tamarindi a tota proprietate attrahunt choleam, & tamen non sunt eiusdem complexionis.

Tertio intelligendum: quod in quartanam secundum dicta autorum vrinæ apparatus dicitur sic secundum diversitatem colorum humorum ex quibus fit quartana. unde non apparet diversitas in qualibet specie quartanæ sed secundum diversas species humorum a quibus generatur talis melancolia. vbi si fiat a melancolia sanguinis vrinæ sit rubra, & spissa, & si cholericæ, sit citrina, vel subcitrina. Si autem fiat quartana a phleg-

phlegmatico adusto. vrinā appetat. in colore, & spissā in substantia. Diuersificatur etiam vrinā secundum diuersitatem temporum morborum secundum digestionem, vel indigestionem medicinā morbi.

Quarto intelligendum est, quod dictum fuit in 7. iudicio, quod quartana, quæ sit ex melancholia sanguinea est salubrior, & breuior & est verum, & causa istius est, quia sicut dicit Galenus. in 2. de complexionibus. c. 6. in ca. q. san. omnibus humoribus melior, & conuenientior natura existit. cho. vero nigra est sicut sedimen, & fer, sanguis propter hoc ille. Et per consequens egritudines factæ a melancholia longiores, & tardiores sunt ad curandum. Et propter hoc dicit Galen. quod in egritudinibus, quæ sunt a san. qui est magis in uariis in humoribus, non est timor 2. prognosticorum com. 27. ubi vrinā rubra &c.

Quinto intelligit quod dictum fuit in secundo cā. generali, quod signis sanguinis apparentibus sit feboromia &c. & si non apparent non fiat feboromia. Et si sit feboromia, & sanguis apparet rubeus & clarus laudatur vena, & plus non exeat, quia si sit, virtus debiliabitur, & non poterit resistere morbo, & sic feboromia est causa mortis, vel longitudinis egritudinis. Et hoc dicit Haly. 3. de regali dispositione. c. 3.

Sexto memorandū est de 9. cā. in quo dicitur, quod balneum non competit nisi post statum, & apparente declinatione, & causam istius reddit Haly. ibidem. quia balnei interest humores subtiliter euacuare, nunc autem ista materia quartanæ est multum grossa, & compacta, & inue per balneum illud quod est subtile euacuaretur, & grossum remaneret augmentans materiam morbi, & faciens ipsum diutius corpus affligere, & permanere. Et tunc iudicis, isti casus docent, quod non debemus euacuare nec balneare nec sortia diuretica ministrare. Quid ergo faciendum? dico secundum Haly, quod competit tenuis fricatio moderata, & levis cum moderatione cibi, & potus, & hoc competit, ut fiat dilatio pororum, & materia attenuetur, & possint interea debilia digestua, & laxatiua administrari, & similiter cibi, & potus in quibus sit digestio, & minoratio materie, & per consequens quartanæ eius.

Septimo dictum fuit in 11. iudicio &c. q. digestio materie istius, & alterius morbi cognoscitur per paroxysmorum mitigationem, & minorationem eorū. Et causa istius est, quia accessio febr. sit instabilis non interpolari temporis, ut uim custodit si firma, & stabilis, tempus interpolationis non dimittit tunc ergo eius dissolutio dura erit, & instabilis de necessitate facili erit. Et hoc est quod dicitur a

cis dicitur q. quando feb. mutatur dimittitur.

Octauo p. declaratione tertij iudicij in quo dicitur febris inordinate vagantibus quantæ venturæ sunt. Sciendum q. febr. inordinate vagantibus sunt se. quæ non custodiunt tepus certum paroxysmorum, sed aliquando in 3. aliquando in 4. aliquando in 4. & sic de alijs faciunt paroxysmum & Hippo. vocat eas in alio loco errantes, & Galen. passionario vocat eas planetas, quia omnes planetæ videntur errantes, & deuiantes a via solis, quæ est linea ecliptica sub qua sol semper mouetur. vnde Hippo. autumnus vero, & æstiuum multa, & se. quartanæ errantes, & c. 3. amph. amph. 3. Et sequitur in com. feb. errantes in autumno huius inordinatis autumni complexionibus, &c.

Nono dubitatur de melancholia cum sit frigida, & si cæ quod potest putrefieri quia utraq. qualitate repugnat putrefactioni. Et iterum Galen. de complexionibus. c. 2. dicit quod nullius rerum proprietas est ut putrefiat ex sicco nec ex frigido. Ad hoc respondet Gordonius, q. quamuis melancholia sit frigida, & sicca virtualiter tamen est humida, & liquida actualiter ratione cuius humiditatis actualis & liquiditatis in casu se attentiōis de non euertationis potest putrefieri ad se.

Decimo clarificatur causæ longitudinis & abbreviationis paroxysmorum, & interpolationis hoc conuenit secundum q. materia est multa vel pauca, & secundum q. multum, vel parum resistit putrefactioni: quia ergo melancholia est, grossa, & non est apta resolutioni diu affligit, & paroxysmus eius longus quia cuius materia frigida est sicca, & utraque qualitate putrefactioni resistit, & ideo est longam facit interpolationem. Phlegma ita facit paroxysmum longum, quia materia est frigida, & viscosa, & non cito dissolubilis, & paruo tempore durat interpolatione quia materia multa est, & parata putrefactioni ratione multæ humiditatis, & ideo quasi non interpolat, aut est in falsa quiete. Cho. aut parum affligit, quia materia subtilis, & cito res solubilis, & interpolatio eius est intra quotidianam, & quartanam, quia ratione leuitatis non ita cito putref. sicut phlegma, & ratione caliditatis non tantum moratur sicut melancholia. San. autem non facit febr. interpolatam cum paroxysmo, & interpolatione.

Vndecimo scias, & intellige secundum Galen. 2. de criticis diebus in cap. q. aliquando inuenimus quartanam prolongari usque ad numerum multorum annorum, & inuenitur alia quartana, quæ terminatur in rot diebus sicut facit numerus periodarum illius quartanæ quæ fuit multorum annorum. Et ego videri febriatantem, quæ solum febriatantem semel in 30. diebus, & in ista durauit per triginta annos solas. Laus Deo. Amen.

Compositæ Feb. sunt multæ, ut dicitur Ga. 2. de c. iij. c. 10. & 11. & 12. Et dicit in fine capituli. 11. quoddam fortæ febrium singularium sine apostemate sunt tres. una est ex phlegmate, alia est ex chol. alia ex melancholia. Et tu si exercitaueris te ipsum & visitatus fueris in cognitione cuiuslibet earum singularium secundum suam singularitatem non est tibi difficile cognoscere compositionem earum, quæ ex eis componuntur. hæc ille. Quia ergo istæ compositiones sunt multæ, quia aliquando continue cum continuis, & aliquando interpolatæ cum interpolatis, & aliquando interpolatæ cum continuis componuntur, & illud scribere, & narrare esset longum, remitto te ad Galenum 2. de crisi capitalis allegatis, & ad li. de differentijs febr. & suff. nunc nobis ponere compositionem continuarum cum interpolatis. Et ultra hoc compositionem febr. interpolatæ tertianæ cum quotidiana interpolata.

Vnde præsupponitur ex dictis Gal. ibidem. & ex dictis in 6. cap. huius septimi libr. quoddam quilibet trium humorum potest putrescere intra venas, & potest canescere, continuam, qui libet etiam potest putrescere extra venas, & potest causare feb. interpolatam. Et istorum humorum quilibet potest putrescere intra venas & alias ab eo extra venas, secundum hoc possunt causari tres species febr. compositarum, quæ dicuntur emitritici. Si enim phlegma putrescit intra venas tunc facitur febr. continuam quæ non separatur nec interpolata, & sic cum hoc putrescit cho. extra venas facit tertianam interpolatam, & sic sunt duæ feb. scilicet continua ex phlegmate, & interpolata ex cho. & sic est prima species emitriteorum, quæ dicitur parvus emitriteus.

Secunda species est contraria isti, & fit, ex phlegmate putrescente extra venas, & ex chol. putrescente intra venas, & sic tertiana continua componitur cum quotidiana interpolata, & vocatur medius emitriteus.

Tertia compositio fit ex melancholia putrescente intra venas, & ex chole. putrescente extra ista fit ex quartana continua, & ex tertiana interpolata, & est tertia species emitriteorum. Et de isto stant verba antiqui. Patuus emitriteus in venis phlegma recondit. Exterius choleram meditur conuertitur illi. Pessimus humor inest maiori sed coquitur extra.

Quarta compositio est ex tertiana interpolata, & quotidiana interpolata. omnia ista habent causas, & signa, & curationes

sicut habent sue simplices ex quibus componuntur.

Causæ compositionis istarum febrium est, compositio mali regiminis & usus rerum multiplicantium phlegma, vel cholera, vel melancholiam simul in eadem mensa, vel per longum tempus unum humorem & per aliud tempus alium, exemplum primi, ut quando in eadem mensa quis in principio mensæ comederet cerasa prona guindola, & post comederet pastillos cum multo pipere, & biberet necet aut vinum forte. Exemplum secundi, ut si quis per totam ætatem fuisset usus curb. & melonibus, & multitudine fructuum, & in fine autumnum se subito mutaret, & vesce ætæ allijs, & cepis & sinapi, & porris, & nascitio & speciebus calidis. Mutationes etiam temporum ad qualitates oppositas sunt similiter causæ istarum febr. compositarum. Mutatio nes etiam ætatum cum regimine disproportionato ætati, & complexionis. Et quando isti humores diversi, & multi in quantitate sunt in corpore generati, si putrescunt in corpore faciunt istas febres compositas.

Signa parvi emitritei sunt, quia intensior febr. continua, quæ nunquam eradicat, & ista est lenta. Pulsus inordinatus aggrauatus oculorum, & est febr. remissa non multum adrens sine æstuatione. Et ista sic existente superuenit paroxysmus tertianæ cum quadam horripilatione, vel rigore ac si spinis pungere-retur, & post succedit calor magnus cum magna iustatione, & siti, & vigilia, & terminatur cum sudore, & vomitu, & post paroxysmum remanet febr. lenta moll. & in ista febr. dies tertia est similis primæ. & quarta secundæ, & hoc est propter motum cholera quæ est de tertio in tertium.

Signa autem medij emitritei, tunc enim est febr. continua semper cum nimio calore, & ardore, & siti & vigilijs, & inquietudine. Et postea venit paroxysmus quotidianus cum modico frigore, & cum quodam quasi stupore, & sitis quæ prius erat aliquoties recessit, & aliquando venit vomitus &c.

Signa maioris emitritei, & fit exterius nimia frigiditas a melancholia putrescente intra vasa, & tertiana interpolata facta a cholera putrescente extra vasa. Et dicitur, quod in ista febr. urina est aliquando remissa in calore, & fortiter in substantia propter malam melancholiam, aliquando intensa, & citrina propter chole. & adest timor, & sollicitudo, & communiter sunt splenetici cum dolore in latere sinistro, & habet somnia timorosa horrenda & falsa cum falsis imaginationibus, & siccitas in corpore est magna, & calor fuscus, & sitis, & vigilia. Ipsa autem

notam sic stante cōtinua venit paroxysmus de tertio in tertium cū quadam horripilatione, & vrina est in tenfa. Et postquam paroxysmus finitus est, iterum remanet febris continua.

Si autem feb. tertiana interpolata hæc signa sequuntur. & primo sunt posita a Ga. 2. de crisi. c. 9. sic in sententia. Fe incipit cum horripilatione, & diuersitate in pulsu, & postea venit caliditas per totum corpus, ita quod iam videtur, quod veniat status paroxysmi, & antequā finiat idem paroxysmus iterum redit horripilatio, & pulsus iterum fit paruus, & minor quā fuit, & debilior & tardior, & vehementioris raritatis, inuenies etiam calorem separari ab extremitatibus, & multiplicari in ventre, & pectore.

Ista febr. est composita ex tertiana quæ separatur, & ex fe. faciente paroxysmum omni die, & eius compositio est secundum commixtionem, & compositionem quam greci vocant emittitum. Et crisis fe. compositæ ex tertiana, quæ separator, & ex faciente paroxysmum omni die quam dixi grecos nominare emittitū fit si cum ea est euacuatio cholerae, & phlegmatis. 3. de crisi. c. 30.

Iudicia in speciebus emittiteorum. Primo istæ fe. communiter sunt tardæ terminationis, & fallaces, ideo si sunt cum debilitate virtutis sunt multum dubie de morte.

Secundo dicitur sic paruus emittiteus frequenter conuertitur in litargiam pp. somnolentiam quæ fit a relatione humorum facta a phlegmate quod est putrefactum intra venas quæ cōtinue funant ad caput, quia vt plurimū facta a phlegmate sunt causa somnolentia.

Tercio iudicamus sic. medius emittiteus sepe conuertitur in frenesim propterea quia sumi eleuati a materia cholericā intra venas putrefacta continue caput ascendunt, & ratione longæ durationis faciunt apostema.

Quarto maior emittiteus vt plurimum est mortal. quia materia putrefacta intra venas causat cōtinuum, & longum morbum, & vires multum debilitatur a duabus fe. ideo eis non potest resistere, & sic succumbit, solus autem deus potest ipsum curare, quæ solus sanat languores, medici vero ministri eius sunt in morborum curationibus.

Quinto dicit Auic. quod febremus in dando decoctiones supple laxatiuis ante digestiōnem materiz, timetur enim sit sem. id est apostoma in ventriculo, cer.

Sexto semper emittitei sunt dubij de salute vbi virtutis debilitas reperitur.

Curatio Fe. compositarum. Primus casus est Auic. in sententia. In speciebus emittiteorum magis intendendum est ad euacuationem ma-

teriarum per ventris solutionem quā ad alterationem per extinctiā caloris.

Secundus morbi compositi cum medicinis compositis sunt procurandi.

Tercius simpliciu norma curabis cōpositiua. Quartus est Auic. vbi supra, ante euacuationē præcedit digestio veruntamen aliqua possunt præcedere lenitiua, materia enim emittitei totū pro maiori parte est grossa.

Quintus in curatione emittiteorum confidera quis huius cōponentium superabundet, & de digestiōis, & euacuatiuis illius hu. in componenda me. magis est apponendum.

Sextus dicit Auic. quod emittiteus durat aliquando vsque ad 7. menses ideo cito succurrendum est cum digestiuis & euacuatiuis non fortibus donec materia sit digesta.

Cura particularis parui emittitei. Et primo digeratur materia cum rebus calidis ratione materiz stātie quæ magis abundat, similiter addantur frigida ratione choleræ, & discrasie febrilis. Et sit talis stropus. Rec. rad. fen. & petros. & apij cicoreæ, & brusci ana vnc. 5. Ista potitur ratione stitis scariolæ end. eupas. ana vnc. 1. & se. 4. fe. fri. mi. se. brusci ros. ru. ipod. stromenof. ana, dram. 3. camphore. dram. 1. vñ al. quar. 1. zuc. lib. 3. sit supus, quæ vñtur toto tempore ægrotudinis cum aqua gramilibus, & cicorum ru. & spicenardi.

Cognita digestione materie purgetur sic. Recip. strom violæ boragi. & buglossæ vñ Inbilis minoris quæ gerit strom alb. polipod. quercis ana ana vnc. se. sit decoctio in qua dissoluatur calix fi. mund. vnc. 1. agati pul. pul. diaturbith ana dram. 1. & se. vel magis vel minus secundum vires infirmis, decur in aqua ros. vel purgetur cum electuario de succo rosa. de pul. diaturbith. Ista digestio, & euacuatio cōtinuetur vsque ad finem curæ. In istis enim emittiteis quia materia est grossa potest imitari stati supus de bisancijs, & in supradictis purgationibus reubarbari, dram. 1. & spicenardi, dram. se.

Deinde propter nimiam corruptionem quæ est in humoribus omnes species emittiteorum videntur quasi morbi pestilentes ideo tractandi sunt, sicut eptidimati quo ad defensionem cordis, & aliorum membrorum principalium. Ideo faciale cordiale. Recip. sem. & corticis citri vel saltem limonis rad. tormen. pul. triafanda pul. diamargariton. rosa. rpb. ana dram. vñ spicenardi. dram. sem. camphore. scropol. vnam. conferne buglossæ. vnc. vnam. zuc. cari. lib. se. sit mixtum admodum zacca. rosa. Et post sit talis sacculus. Recip. ros. sub. strom nenofar. violæ. strom camo. ana vnc. sem. corticis citri. dram. 3.

sand. mulcat. dra. 2. caphorę dram. 1. conqual
sentur omnia, & ponantur in sacco, & alper
gatur aqua ros. & aceto, & frequenter odo-
retur, idem de ros. & sand. mulca. & camo. &
ablin. & parua menta fiat sacculus supra sto-
machum, & ista continenter paulatim pur-
gan. & continue egrum viaticis salubribus
pro virtutis defensione nutriendo.

Pro medio emittitico fiat sic, si istud phleg-
ma est putrefactum intra venas, & facit quo-
tidiana interpolata, & cho. putrefit intra ve-
nas, & facit continuam, tuac cho. est in maio-
ri quantitate, & ideo plus debemus ponere de
digerentibus, & euacuantibus cho. & ideo fit
sic. Rec. end. nouellę non lotę scariolę rostri
porcini hepaticę lactuce. ana m. 1. capil. vene-
ris recentis politicę & dianthos rad. apij. &
pet. & fen. & brusci, & graminis, & spatagi,
ana m. se. 4. se. frigidum mi. ros. viol. horum
nenasa vnc. se. campho. dram. 4. spodij li-
quiritice ras. ana dram. 2. zucca. li. t. & se. fit si
xupus, & detur cum aqua end. & scolopend.
addatur ablin thij. vnc. 2. in sirupo. Purgetur
sic. Recip. horum viol. boraginis, & buglosę
polipodij querci. ana vnc. se. an. 4. se. frigidu-
rum mi. ana dram. 3. fiat decoctio in qua dissol-
uatur cassię. mund. tama. ind. ana. un. se. pul-
diarubith. dram. 1. & se. reubarbari, agarici,
ana dram. se. secundum magis aut minus. Ite-
rum fiat restauratum electuarium supradic-
tum. Parat autem sic. euchsima cum bonis. ci-
bis paratis cum rebis appetitiuis. Secum aduol-
7. In maiori emittitico dicitur quod non eua-
det habens ipsum. propter pessimitatem mate-
rie, & longitudinem egritudinis. verum tamen
semper confortetur natura, & digeratur ma-
teria per istum modum. Reci. succi sumitree
succi lapacij acuti succi boraginis, & buglosę
succendiui succi lupuli ana. quart. 4. semi-
frigidorum mi. seminis brusci epithimi florę
viol. nenasa. seminis acetosę berbennis, ana
dram. 3. fiat sirupus cum zuccaro lib. 2. & se.
detur cum aqua scolopend. & tamari. purge-
tur sic. Rec. horum viol. boraginis, & buglosę
se. epithimi fene ana. un. se. polipodij. dram.
3. anisi. dram. 3. fiat decoctio in qua dissolua-
tur cassię. mund. vnc. 1. mirab. indi. dram. 3.
epithimi pulue. dram. 1. & se. detur in aurore.
Et dicit Auicenna in prima. 4. in cura emitti-
tici. quod Gal. & qui fuerunt ante ipsum cura-
bant emittiticos cum aqua hordei in qua erat
virtus piperis, cui aliqui contradixerant, quia
piper inflamat febrem, & aqua hordei pigra
facit materiam. Et Auicenna ibidem tenet se-
cum. Gal. dicens quod generalis cau. est quod
iste egrus curatur cum medicinis composi-
tis ex infrigidantibus, & calefacientibus, vt
discernat natura inter duas virtutes, & occu-

petur infrigidantium cum febre. & partibus
cordis, & calefacientium cum materia. Et quia
est, qui caret emittitico absque hoc, quā di-
cat nullus. Paulatim ergo digeratur, & paula-
tim enacuetur materia. Ex istis infra scriptis
possunt fieri trofici aut pillule quę non sunt
multum laxatiue aut electuarium aut restau-
rarium ros. rub. liquiritię sicut est spodium
spicę reubarba. semen endiue, & portulacę,
& cucurbitę cuscute crocas. res ponti. lacca
gummi arabici cacabe. semen acetosę eupato-
rium, & anisum. Et in laxatiuis ponatur aloę
ablinthium, & mirab. agaricus epithimus reu-
barba. fene, & cassię. &c.

Dixerunt aliqui quod smaragdus lapis pre-
ciosus suspensus ad collum a tota proprietate
curat emittitico. istas pillulas ponit Auicenna,
& asserit quod valent ad emittiticos, & ad
febres cronicas ledentes viscera maxime quan-
do materia vincens est phlegmatica. Realos
masti. corticis mirabol. citrini reubarb. succi
eupato. succi ablinthij ros. rub. ana partes 2.
quales, croci partem mediam fiant pillule cū
aqua endiuię, & dosis eius est. dram. 2.

Declaratio in emittitico.

Primo sciendum secundum Auicenn. in pri-
ma. 4. capitulo proprio, quod inter medicinas
quę prolant in isto casu est ablinthium roma-
num ad recuscandum materiam, & vt faciat
venire egritudinem ad statum dnmmodo nō
festinemus in dando ipsum, & non detur nisi
post septem dies. Ex causa inceptę apparere
signa digestionis, nam si ante statumatur, facit
accidere angustiam, & maiorem, & cum succe-
ditate, & siccatate cum stipiditate facit non
ratos ad euacuationem, & hoc intelligitur
quando datur ad euacuandum in sua dosi.

Secundo iuxta dictam Auicenn. in cura ma-
ioris emittitici de administratione aque her-
dei in qua fit virtus piperis, quando dicit, vt
discernat natura inter duas virtutes, &c. Tūc
queritur vtrum sit dare quintam virtutem na-
turalem, scilicet discretiua, quę discernat ca-
lidum à frigido, & calidum applicet materię
morbī frigide, & frigidum applicet discretiue
& materię morbī calide, & videtur, qd sic au-
toritate Auicennę in fine primę fen. 4. in cura
emittitici. Item argo auctoritate, Auer. quā
eam expresse ponit in 2. & 3. col. in c. de acci-
dentibus virtutis stomachi. In oppositum ar-
guitur quia videtur quod Gal. & Auic. & alij
sunt diminui ponentes solum 4. virtutes na-
turales, & non ponunt virtutem discretiua.
Ad istam quęstionem dicendum, quod aliqui
tenent secundum Auer. qd est dare quintam vir-
tutem, quia ad hoc quod aliqua virtus attra-
ctiua attrahat aliquod attrahibile oportet,
quod illud sit discretum, & dictum alias non
posset

posset attrahi. & sic virtus discretiva, vel separativa preparat illud subiectum virtuti expulsiue, vel attractiue. secundum patet ad experientiam quia hepardigeri chilum, & preparat ipsum, ut sit nutrimentum toti corpori antequam sit attractio ad membra nutrienda oportet, quod sit segregatio superfluitatum & quælibet vadat ad suum locum, & hæc est una via. Alio modo dicit Iordanus de turre supra. 3. de morbo & dicit quod salua reuerentia. Auer. non est ponenda 5. virtus scilicet discretiva, & dato quod sic non est, naturaliter consideranda a medico, & ratio est, quia si actus ille quem in imponis fieri per virtutem discretivam potest compleri per alias virtutes naturales, non est necessarium quod illa virtus ponatur in esse, quia virtutes, & operationes alie ex alijs cognoscuntur. Sed ille actus, vel operatio potest compleri per alias virtutes naturales ergo, &c. consequentia nota antecedit patet, quod potest compleri per virtutem expulsiuam, & per virtutem retentiuam operante virtute digestiva, quia attractiva sit post expulsiuam in conuenientia, ita quod expulsiua membri expellit quod sibi non conuenit, & attractiva alterius membri attrahit expulsum tanquam conueniens. Et hoc vere intelligitur in generatione humorum & segregatione eorum ab invicem, quia digestiva operante virtus expulsiua expellit ab hepate per suum meatum ad cisternam fellis, superfluitatem cholæ, similiter per suum alium meatum superfluitatem melancholicam ad splenem ratione quod melius est, usque ad tempus. Et in hoc iuuat virtus attractiva rectorum illorum ad quos sit impulsio rei nutritiue, vel non nutritiue.

Et adhuc circa hoc est sciendum quod discretio potest intelligi dupliciter quædam est discretio aliquorum existentium in potentia, quæ quamuis appareat quod sit vnum tamen sunt plura in potentia, ut in massa sanguinea. Et est alia discretio aliquorum, quæ sunt in actu sub diuersis formis, ut in coloribus. De prima discretione loquendo dico quod non potest compleri per virtutem expulsiuam, & attractiuam, quia attrahibile oportet quod sit distinctum & discretum loquendo de secunda discretione talis potest compleri per virtutem expulsiuam & retentiuam operante virtute digestiva, quæ preparat, & digerit tales res, ut quælibet earum expellatur a loco in quo est, & virtus attractiva aliorum membrorum attrahat quamlibet rem ad locum, ubi necessaria existit. Qui etiam vellet speculari ad hoc talis discretio humorum potest compleri per virtutem retentiuam & expulsiuam, quia hæc sunt distincti formaliter simul, tamen sub quadam acerbatione & accumulatione, & hæc

est finis medicorum, quia ista quia virtus posita, quod sit, tamen non est necessaria medico, quia non faciat finem medici, quia finis imponit necessitatem rei, quia medicus non tractat de virtutibus nisi ratione finis, scilicet ut instrumenta earum corrigat, sed virtus discretiva non habet instrumentum, quia quælibet virtus naturalis operatur per complexionem, & tunc dicitur, quod tot sunt naturales virtutes quot sunt combinationes complexionum, sed non sunt nisi 4. quia calidum, & humidum instrumentum virtutis digestivæ, frigidum & humidum expulsiue, & sic retentivæ calidum, & sic est instrumentum attractivæ. Et non sunt plures combinationes possibiles, ergo non plures virtutes. Et ad Auer. dicitur quod ipse locutus fuit velut purus philosophus, nos vero loquimur sicut medici loquuntur in ratione finis, scilicet, ut sciamus corrigere instrumenta istarum virtutum quando virtutes sunt defectu. Et si Aui. vel Gal. vel aliquis ponat istam virtutem discretivam ponunt ipsam tanquam actum completum ab alijs virtutibus naturalibus, scilicet expulsiua, & retentiva, & attractiva, cooperante digestiva. Aliqui vero dicunt, quod ista discretio sit a virtute corporis regimini, & operi naturæ.

Tertio sciendum quod Aui. in sen. 2. 3. in c. de signis doloris iuncturarum, quod species gutte composite sunt secundum diuersitatem huius in corpore existentium, simile equum est dicendum de se compositis. Nam si aliquis dicitur hoc vult ut regimine refrigeratio: comes dedit lactucas & herbas frigidas & frustas frigidis & huiusmodi res generantes phlegma, & crudos, vel vitæ nimia repletionem, naturalem suam faceret, & cum hoc vitæ crebris choicis necantibus post longum usum serum phlegmaticum, & isti huiusmodi, vel destituantur a regimine naturæ, & faciant commotionem non veram, & generent guttam compositam ex diuersis huiusmodi. Similiter similes huiusmodi, facient diuersas se compositas secundum diuersitatem secundum compositionem, & secundum positionem huiusmodi, intra vel extra vas, secundum hoc sunt diuersæ species amittiteorum, & alia feb. sicut ponitur a de cris. &c.

De febribus, de quibus Lep. XIII.

Ethica est nomen latinum, & est extractum à greco. Dicitur autem ethica ab ethis quod est habitudo vel habitus propterea, quia ista egrum videtur habitata & fixa. Ideo dicitur a de cris. c. decimo quod ethica dicitur ab effusione, Ethica secundum statum Io. de medicina dicitur ab ethis quod est mos. & de ethica cum penultima correpta, id est moralis.

&

& hæc ethica ideo est scientia moralis. Papias vero dicit quod ethica est genus febr. cuius tres sunt species prima. 2. & 3. De prima leviter infirmus curatur, de secunda vix. de tertia nunquam. Quantum igitur spectat ad propositum dico quod ethica est duplex quædam est cum feb. & alia sine feb. quæ vocatur ethica senectutis sine marasmus. de qua postea videbitur domino adiuvante. Prima autem diffinitur sic. Ethica est febr. continua membris radicalibus subiective adharrens, & humiditates substantiales, & nutrimentales, & totum corpus consumens, & habet causas antecedentes primitivas & coniunctas.

Causæ primitivæ sunt omnia illa extrinseca quæ calefaciunt, vel inflammant membra radicalia, & possunt facere essi. vel pu. aliquibus non bene digeratis, vel gubernatis succellus potest fieri feb. ethica. ita quod causæ primitivæ istarum sunt etiam causæ primitivæ ad hoc faciunt exterius dicens quicquid est causa causæ est causa causari. quia qui occasionem damni dat damnum sibi dedisse videtur.

Causæ autem antecedentes ethice sunt species fe. essi. vel fe. pu. acuratum maxime ille quæ sunt cum inflatione, & adhesionem. Alia causa potest esse prohibitio cibi, & potus in tempore quo deberet dari, & maxime hoc fit in hominibus cholericis, & macris quibus advenit febr. continua cholera adureas, & caustori, & ei prohibetur potus aque frigide, vel aquæ hordei similiter fe. quæ fit cum apostemate. Unde si ieiunium inducitur imponatur completio calida, & sicca existente in ethica deueniant. 8. de inge. ca. 6. intelligitur si prius febriçitanerit. Vlcus pulmonis propter quod prohibetur pulmo a perfecta euentatione cordis, & sic inflatur cor, similiter nigra caliditas hepatis aut pulmonis aut stomachi aut similibus.

Causæ coniunctæ ethicæ sunt caliditas, & siccitas cordis consumens humiditates nutritivas tales etiam, & similitudinem membrorum similiter mala complexio æquali in eisdem membris introducta a febr. præcedenti, vel a mala complexione diuersa præcedente, & diu durare vel ab omnibus alijs causis citro, & fortissime malam complexionem calidam, & siccam introducentibus in corde, & in membris radicalibus, & ipsa consumens.

Signa ethicæ feb. sunt fe. equalis vni formis sine paroxysmis, & interpolationibus, ita quod semper calefacit corpus nec vna dies plus aggrauatur quam alia, nisi ibi esset mixto febr. pul. Cuius est arida, & sicca sine humiditate. Caliditas istius feb. tangendo non est incensa sicut, in febr. putridis. immo in primo tactu videtur frigidus. Et si manus remanet per aliquod spatium super cutem, fit caliditas fortior, & vide

tur augmentari, & aliquantulum mordicare, pulsus est parvus, & debilis, & frequens propter siccitatem arteriæ Caliditas augetur post refecutionem, quod licet fit in alijs fe. non tamen ita manifeste. vnde voluit apparere in vris, & egestionem.

In secunda specie ethicæ vris est vnde uosa, & surfures in ea apparent, & extremitates manifeste discarnatæ & nodositates crescunt, & ideo apparet manifesta distinctio.

In tertia specie ethicæ facies apparet hypocratica nates acutæ oculi concavi tempora plana aures frigide, & contractæ, & pulpes eorum in uersæ, & totius faciei color pallidus aut plumbus aut terreus, & habent pannum in facie ac si pul. super faciem spargeretur. In ethica etiam reperitur maior calor in volis manuum & in plantis pedum.

Signa permutationis effimæ ad ethicam sunt permanentia fortitudinis calor, nam fe. essi. ut plurimum incipit declinare post duodecim horas, & si non declinat immo remanet in eodem statu usque ad certum diem tunc fit ethica.

Signa quod ethica fit composita cum fe. putrida sunt quia putrida sunt interpolationem per sudorem vel aliter. semper tamen remanet caliditas, & siccitas, & semper crescit extenuatio, & arefactio, & alia signa (supradicta, & distinctiva in pulso, & paruas, & debilitas maior est in secunda quam in prima, & in tertia quam in prima, vel secunda. Et in secunda crescunt extremitates, & iuncturæ videntur decrescere propter carniū coniunctionem. Pulsus ethicorum sunt debiles, & parui veloces seu frequentes, parui sunt propter debilitatem caloris naturalis etiam per consequens virentis, & sunt veloces seu frequentes propter necessitatem quam inducit febr. ethica. Galienus in quarto libro de causis pulsum eom. 16. Et calidus, quod fit in ethica est locus venarum & arteriarum scilicet in volis manuum, & plantis pedum, quia ibi terminantur venæ & arteriæ, &c.

Iudicia in febr. ethica. Primo notandum quod Axi. in prima sen. primis docet de humoribus cum in principio capituli ponit humores, & ponit humiditates, sed quedam istarum humiditatum sunt superfluentes alie sunt non superfluentes, quarum prima est in faciemibus extremitatum paruarum venarum membrorum simplicium, & illa humiditas non habet nomen, sed circumloquitur, & vocatur prima humiditas de secundis.

Secunda humiditas est humiditas rationalis quæ spargitur super omnia membra simplicia & ista est a prius nata conuerit in membrum quod corpus causatur nutrimentum, & a prius, vt mem-

membrum humectet quando exsiccantur a forti exercitio vel a balia causa, & ista vocatur ros. tertia humiditas est illa, quæ parum ante congelata est per vltiorem actionem, & est antrimentum, quod quia iam quantum est ex parte complexionis in nutrimentum, & membrorum substantiam conuertitur, sed ex parte essentie nondum conuersa est in substantiam, & essentiam, & in similitudinem membri totalem. Et ista humiditas vocatur cambiū, quia de proximo cambiatur & mutatur in glutinū quæ est quarta humiditas, quæ continet membra simplicia.

Dicit ergo Anij. prima sen. 4. trac. vltimo. & concordat Serap. in capitulo proprio quod ad consumptionem humiditatis, quæ vocatur ros, sequitur prima species ethicæ, & est simile de oleo quod continetur in lampade. quando autem prima humiditas incipit consumi, quæ vocatur cambiū tunc fit secunda species, & est simile de oleo quod est iam bibirum in substantia lichini. post consumptionem istarum duarum humiditatum quarta humiditas, quæ vocatur glutinum incipit consumi, quæ congelat partes membrorum simplicium, tunc est simile de humiditate subtili ipsius lichini per quem partes lichini continentur, & tunc est tertia species ethicæ. Prima igitur species difficilis cognitionis & facilis curationis. vt dicit Aui. Tertia autem species est oppositum. quia est facilis cognitionis, & impossibilis curationis. Secunda autem species in cognitione, & curatione tener medium.

Curatio Febris ethicæ. In primo aliqui cā. generales sunt præmittēdi: vt exinde cura eliciatur. Primus cā. est Gal. in 10. mech. quasi in col. 14. ethicis nihil aliud est, necessarium nisi refrigerare, & humectare eorum corpora.

Secundus est Gal. ibidem. Et hic vero quia non oportet purgari nec calefieri calor balnei nocet, nam augmentabis calorem, & siccitatem. hæc ille vbi supra.

Tertius est Galen. in decimo mech. quasi in fine sexti col. Nutrimenta ethicorum necesse est esse frigida, & humida aor temperata sicut prisanam, & humida iura, & mund. panem.

Quartus, cura enim ethicorum similis est, curæ siccam in stomaco complexionem habentem, sed tamen ethicis frigidiora sunt necessaria propter multitudinem caloris eorum.

Quintus est Aui. Si cogantur propter necessitatem dare res, quæ faciunt citam humiditatem vel humectationem, & illæ sunt calidæ, vt aqua carnis, & vinum, oportet quod antecedant, vel sequantur res infrigidas. Isto autem est Aui. in prima. 4. in cura febr. ethicæ.

Sextus. Si ethica accidat propter apostema aut lesionem in aliquo membro, vt est hepa-

tis calefactio necesse est, curare illud apostema aut membrū lesum corrigere & præparare.

Septimus, infrigidanda aeris est de rebus magis iuantibus ethicos similiter indui pannis lotis in aqua in qua sint, rosæ, & folia salicis aqua ros. & troscisci de camphora nō modicum iuant eos. Aui. ibidem.

Octauus, odora campho. & ros. sand. & mādragoram papa. & aquam ros. & similia iuuat ad cornu curam.

Nonus est Aui. vbi. supra. Emplastra in frigidanda quibus oportet eos curare sint aromatica: nam ipsa sunt propinquioris iuuamenti, & proprie super pectus & partes vicinas, & sint actu frigida sine suspitione nam siptica desiccant, & prohibent virtutem medicinarum profundari, & ad interius penetrare, non tamen tantum retineantur, quod vocari, & anhelitus inferant nocumentum, hæc ille in sententia.

Decimus quies & somnus & tranquillitas, & præseruatio a fame tristitia, & ira, & odio, & angustia, & si iuuat in ethicorum curatione.

Vndecimus lectus eorum sit de natalicijis frigidis ex paunis laneis cum coto intermedio similiter, & coopertura, & non sepeliatur in culcitra plumacea nisi super ipsa coopertoria de corijs paratis extendantur. Et si lectica eorum statatur super aliquod vas aq. plenum esset eis bonum, vt dicit Aui.

Decimus sextus est Aui. in loco alleg. in sententia in ca. rememorato infrigidantium eos in fine capituli. Lectus eorum sit prope cursus aquarum, vel saltem currat aqua si frigida prope lectum, & ibi sternantur, & circūpouantur succi & folia, & rami salicis folia cā. & herbarum frigidarum, & similiter herbe naturaliter frigide in frigida aqua madefactæ.

Decimus tertius lac caprarum, & asine nutriturum in pascuis frigidis & hu. & proprie asine vltimum eradicat fe. ethicam, si possibilis est ei eradicatio Aui. ibidem.

Decimus quartus lac muliebre sugendo ab ubere, & sumptum conuenientius est omni alio lacte.

Decimus quintus lac a quo extractum est butyrum est vtile ethicis infrigidando eos.

Decimus sextus lac comperit ethicis a principio vsque ad finem.

Decimus septimus ius paræ polle alteratæ cum tenera cucurbita, & agresta remittit eorum calorem nutriendo.

Curatio feb. ethicæ particularis. Primo in iuxta tenorem Septimi cā. constituitur in loco vel in camera humida vbi attrahat aerem frigidum, & humidum, & si naturaliter non habetur, sit forando cameram cum aqua fontina vel puteali, & sternendo ipsam, & circa lectū

ponendo folia, & ramōs falicis, & cananarū cū iuncis, & rof. viol. & nenufa. & leotiginis aquæ, & papa. & folia vitis albæ. Et fit talis facculus quem odorabit iuxta tenorem. 7. can. Rec. omnium ſand. rof. ruſe. lactucæ, & porulacæ, papa. al. rad. mandragoræ. ana dram. 3. ſe. iufquami camphoræ. ana dram. 2. ſlorum nenufa. dra. 1. & ſe. opij tebaici. dram. 1. ſiant do. ſacculi hæc odoretur vnus & alius per interualla vnus poſt alium, & iſta continuentur. At iorta tenorem ſinis. 7. can. caſiſcæ quas inducitur ſuor. immo & diploides propter ſactam dealbationem iterum lauētur in aqua in qua decoctæ ſint ſummitates pa. & leotiginis aquæ & malux, & lactuca, & folia falicis, & ſimilia. Et ſi in aqua iſta poſt colaturam poſeatur camphora, & ttoiciſci eius: eſſet melius. & tales pāni deſiccantur in vmbra, & iodiſtantur eis, & mīniet frequenter lectum, & veſtes, & lintheamia.

Iſtis ſic ordinariis digretur ſic. Habetur paruos pullos, vel parua pulla, & coquantur cum lactucis, vel portulacis, vel fruſtis cucur. Et comedat cocarbitas & carnes pulle, & oſſas in iure eius, & ſicut dicitur de polla ſic poſſet dici de ahys auibus vialibus præterquem de de gentibus in aquis. Et iuxta tenorem primi can. vtatur cibus, alijs frigidis ab hu. vt eſt herdeum auenatum, & farina de ſpelta, & colatura ſurfuris cum lacte amigd. & 4. ſe. frigidorum ma. Poſſunt etiam iſta ſupradicta patari cum lacte vacuo a quo extractum eſt butirum. Mica etiam panis ter lota in aqua frigida, & expreſſa & cocta cum dicto lacte, vel cū lacte de ſe. frigidis iuat eos quia outrimentū iſtorum oaturaliter eſt frigidum, & refrigerat hepar, & cor, & ſang. venatum obtemperat, & contrarietur febri, humectat corpus. Alius cibus ſit de caoris ſtomialibus ita, quod carnes eorum extrahantur a corticibus eorum laueotur cum lexioſo ſacto de cioeribus viciū. ſicut docet Auic. Alius cibus ſit de carnibus limaciarum coctis cum ſen. propter viſcoſitatem, & poſt extrahantur a caſulis, & poſt comedantur, ſicut faciuor cathanani. & vero io hoc frequenter inueſci iuuamentum. Potus iſtorum ſi aqua hordei, & ſi vinum bibant illud ſit multum limphatum clarum, vel aliqua lier robeum, & nutritium, & aliquoado ſumat lac amigd. Et ſeqendo doctrinam primi can. vtatur piſcibus ſquamofis de aquis mon. bullitis io aqua cum pet. Piſces tamen mar. ſuo ſuor vt ſalmo, & aloſa, & luccus, & ceteri ſimiles. Item vtatur lacte amig. bullito, & proiecto ſuper oſſas, vel pecias panis cum zuccaro. Item vtatur cibo ſacto cum lacte a quo extractum ſit butirum, cum mica panis, & zuccaro, vel cum farina hordei, & ſimilibus

& iuat eos etiam poma cocta ſub cineribus cum zuccaro miniſtrata, & lactucæ coctæ cum pul. gallinarum, iuxta tenorem vltimi cano. Et ſcias iuxta teoorem. t. 3. cano. & ſecundum autores noſtros, quod lac eſt de rebus magis iuantibus eos. Vnde lac ſit mulieris bene nutritæ bonis cibus frigidis & humi. & ſomantor ab vberē iuſta doctrinam. t. 4. cano. Si hoc noluert ſumere. vtatur lacte aſino, vel ſaltem capræ quæ nutriatur herbis frigidis, & homi.

Et quando miniſtrari debet iſta aormalia ſint prope ioſtrum, & quanto citius poterit calidum ab ore ſumatur de mane, & poſtea ſopor dormiat. Et lac a quo extractum eſt butirum iuat eos, & quia in iſto quarto libro iam fecimus mentionē de adminiſtratione lactis, ideo recurre ad capitulum quartum quarti libri ad curam malæ complexionis ſicce ſtomachi, & ſac ſicut ibi docetur.

Balneum competit aquæ dulcis non multum calidæ quia multum calida multum calefacit, & multum deſiccatur. ſed ſit aliquantulum ſuens tepiditatem, & cibo digeſto io ſtomaco poſeatur in tina plena tali aqua ſollicit dulci in aqua ſint coctæ her. frigide, & hu. & non ſudet dicit Aui. ſed poſt exitum a balneo vngatur cum oleis frigidis hu. ſicut eſt oleum violæ & nenufa. Et vult Aui. quod io exitu a balneo, vt humiditates per poros oſo exhalent. ſpargetur paulatim aqua quæ oſo ſit multum frigida, ſicut eſt aqua aſtatis quæ aliquantulum ſit tepida per calorem ſolis & in tali aqua pannus lineus ſit madefactus, & liniatur inde corpus ſimul. deinde ſtet in lecto ſive calore, & ſine ſudore. Et dicit Aoi. quod ſi ante balneū molvegeator ſuper corpus eius lac, eſſet bonum, & poſt exitum a balneo, & in vñctione cum dictis oleis capiat aliquid iuſſellum de rebus humectantibus. ſic eſt iuſſellum paroarum auis, & gallinæ, & ſimilium, & ſic ſtet in tranquillitate, & ſomno ſive anguſtia, & triſtitia, & ſine ira, & ſine labore, & poſt vinum clarum ſubtile cum multa aqua non tamen immediate poſt lac. Et caueat a ſudore niſi eſſet feb. putrida. Et caueat a ſtombia & purgatione, quia iſta ſe ſine vizio hu. eſt.

Coodeſcendeodo ad apothecam ſit talis ſirupus ad ioſfrigidandum, & humectandum ethicos. Rec. ſummitatum papa. al. ſoliorum lactucæ portulacæ cod. ſcariolæ hepaticæ. ana m. 1. 4. ſeminum frigidorum mi. ſe. malux, & malua uiciſci ana. dram. 3. iuiob. ſebecten paſſularum mund. ab ari. liquiritiæ raſe. ſoa. voc. 1. & ſe. roſ. ru. ſlorum violæ & oenuſa. ſoa. voc. 1. zuccari albiſſ. li. 2. & ſe. ſit ſirupus quo vtatur frequenter cum aqua hordei. Et ſi aliqua ſpecies ſe. putridæ eſſet ibi commixta, poſſoat ad di iſta aperitiua hordei. Et ſi aliqua ſpecies ſe. putri-

putride esset ibi commixta, possunt addi ista aperta v. et cicorea gramen & rad. & febris sci & se frigida min. maiori quantitate.

Sumat etiam de illo electuario. Recip. pol. papa. pol. diapenid. sine speciebus vel diadraganti pulueris tria sand. pol. elect. resumptui, ana dram. 2. conferuz tortoris facte per frustra id est conferuz testudinis memorialis conferuz ros. & violana vnc. 1. conferuz nenasi. voc. semis zuccari panis. lib. 1. fiat mixtum ad modum zuccari rosa. vel potest fieri in tabulis sed non tantum valet, quia virtutem ignis si tamen sit in talibus fundatur zuccarum cum aqua ros. & eod. In isto casu valet sirupus de papa. & viol. & ros. Et indigenus in isto casu magna cordis infirmitate. quia in ista febr. cor principale subiectum cum alijs membris radicalibus. adeo valet principaliter illa, quæ refrigerant cor sicut electuario diamargariton sine speciebus, & sicut margarita utramque, & utraq; corallus, & iacintus smaragdus, & ceteri lapides preciosi ros. camph. viol. sirupus viol. nenasi ros. & c. ista confectio valet in ethica, quæ non multum calefacit, & non erit abundanter. Rec. filicorum piscinarum pistacearum amigd. dulcium. ana. vnc. 14. se frig. maiorum mund. ana. vnc. se. pass. mund. ab ab arrill. voc. 1. se. maluz, & bifmaluz, & cito nij, & bombaci mund. se. papa. ana dram. 2. incorporantur omnia cum zuccaro, & utatur pa. Pauperes enim non possunt abundare pecunijs, ad multa medicamina habenda, sed istis lenibus gubernentur.

Aliud vnguentum, quod sequitur valet multum si peccus, & latera vagantur cum eo non calido sed sic est. Rec. cerealbe nouæ quart. 1. olei viol. li. 3. butiri sine sale. unc. 2. liquifiant omnia simul ad ignem, & postea colata in mortarium projiciantur: in quo sit lactus mulieris puellam lactantis, & parturientis li. 3. gummi arab. draganti infusorum in aqua ros. ana. unc. 3. camphore. dram. duas ducantur tantum in mortario donec fiat vnguentum albissimum, & valerit in ethica & phtia & in marasmo. Magister. Bern. de Gordonio ponit aliam formam vnguenti. Recip. modulle cerui, & vitali butiri sine sale axungie galline recentis draganti gummi arabici infusorum olei uenasi. olei viol. olei de cucurbita olei de salice ana. voc. 1. ceræ al. quod sufficit fiat vnguentum bonum est, verum tamen ille medalle & axungie sunt calidæ, sed post infusionem mittantur in mortario in quo sit aqua ros. & lac muliebre, & erit melius, & magis frigidum.

Magister poncius de sancto Agidio ponit hoc electuarium. Rec. candi penid. ana. unc. 3. pinearum pistacearum amigdalorum dulcium

seminis papa. al. seminis bombacis maluz bit. maluz, & citoniorum bene albæ est rubei trochiscorum diarodon dianthos ana. vnc. semis se minis lactuce, & portulacæ quatuor semini frigidorum maiorum mundarum ana. voc. 1. ros. mirrallorum omnium mundarum ana. vnc. 1. ros. mirrallorum omnium sand. spodijs raturæ eboris ossis de corde cerui, blacke bitan cie coralli albi, & rubei ana. drachmam vnam, sirupi de papa. quod sufficiat, fiat ad modum opiæ. Prævalent alia supradicta electuaria, quia in isto multa calida, & sicca ponitur & c.

De marasmo.

Cap. XV.

Ethica senectutis est marasmon, seu tabescentia totius corporis ex dominio malæ complexionis sicæ siue febr. Nam marasmon consummatio interpretatur. p. dei ut. c. 2: in fine capituli. unde marasmon interpretatur tabescentia seu arefactio corporis, & humiditatum subtilium secundum Galenum. 8. de causis pulsuum.

Causæ Ethicæ senectutis. Et primo ponantur causæ primitivæ.

Prima potest esse porus aque frigide, stomacho stante ieiuno, & debili vel si alumeretur post immoderatum exercitium virtutem debilitans, & poros aperiens, & calorem naturalem resoluens. Propter quod aqua potata cito astrahitur ad viscera totum corpus refrigerat. Alia causa primitiva potest esse nimia caliditas aeris resoluens liquefaciens humiditates substantiales corporis propter quod calor naturalis resolvitur & debilitatur, immo destruitur, & frigiditas & siccitas subintrant & c.

Causæ antecedentes sunt debilitas calor naturalis, & virtus unitivæ non in ultimo debilitata adhuc existens. Alia causa potest esse mali vaporis frigidi elevari ab aliqua materia frigida in corpore existente qui vadunt ad cor, & ipsum infrigant. Alia causa antecedens potest, esse resolutio caloris naturalis non ultimata: sed si continetur, efficitur causa coniuncta.

Causæ coniunctæ. Prima est mala complexio frigida dominans in corpore cum debilitate totius corporis. quia prohibet virtutem digestivam; & nutritivam a suis operationibus, sicut accidit in siue senij. Similiter superflua infrigidatio facta cum potibus. vel medicinis, vel emplastris in patientibus febres. Similiter consumptio, & resolutio caloris naturalis, & similia his.

Signa ethicæ senectutis ponit gal. in 4. lib. de causis pulsuum in c. 10. dicens quod in ethica senectutis quæ est siue se pulsus est parvus, & rarus. Et Alii. addit quod est tardus. Aliud signum

gnum est arefactio, & exiccatio corporis mani-
festa, & non adest calor, immo vt plurimum
reperiuntur frigidi in tactu vt plurimum vri-
na est, alba subtilis aquosa. Et isti in dispo-
sitionibus suis sunt sicut senes decrepiti.

Iudicia in ethica senectute. Primum dicit Ani-
cen. quod huic egritudini postquam est confir-
mata non est cura. Et si ei esset ingenium cura-
tionis, similiter esset ingenii curationis mor-
tis. in prima sen. 4. c. proprio.

Curatio ethice senectutis si curari debet
curatur cum calefacientibus, & humectanti-
bus. Et humectatio fit cum cibis, & potibus
calidis & cum balneo aque dulcis sicut dictum
fuit superius. Insuper secundum Auicennam
fiat humectatio cum clysteribus humectatiuis
sicut est clystere factum cum brodio capicum,
& pedum arietum, & ouium, & cum clysteri
facto ex colaturis factis ex caponibus, galli-
nis, & phasianis, & perdicibus. Nam dicit rosa-
zius, quod quando aliqua colaticia vel inra-
nutritia in liquida substantia per partem infe-
riorem iniiciuntur per modum clysteris: non
mirum si stomachus attrahat aliquid ad dige-
rendum, & nutriendum, vel forte ipsa inte-
stina aliquam digestionem dicto clysteri ope-
rantur & per venas meseraicas ad hepar mi-
tuntur aliquę partes ad nutritionem & cor-
poris humectationem, & cum hoc humectat
viscera, nec in talibus ponendus est sal nec spe-
cies, timendo mordicationem & subicam exi-
tum. Et quantitas clysteris sit, l. i. f. & offerat-
ur quater in die naturali. Lenis autem friga-
tio post refectionem lunat. similiter hoc coctum
cum lapidibus valet multum, & sicut mel est,
inimicum habentibus ethicam, sic est iuuati-
uum habentibus ethicam senectutis. Et iuuat
eos omnis cibus humectans facili digestionis
in quo non est viscositas, sicut iura carniuum,
& aqua carnis, & vitella ouorum sobilia. Et
vinum subtile odoriferum in digestibili quan-
titate confert eis. etiam emplastra, & vnguen-
ta dicta in ethica dum tamen adtineant calidi-
tati conferunt eis. Cauent a frigido exteriori
& ab illis quę humiditatem consumunt.

Declaratio in se. ethica.

Primo notandum quod species se. ethice
apud latinos non habent nomina specificata
sicut habent multe alie ægri. vt est dolor capi-
tis hydropsis lepra, & ægri tudines renum, &
intestinatorum. Et causa istius est quia, vt pluri-
mus prius venit ad secundam speciem anteq-
quam cognoscatur, & fortasse ad tertiam.

Secundo queritur quare in ethica non ira-
cto consumitur cambium vel glutinum sicut
ros. Dico quod ros est subtilioris substantie;
ideo citius consumitur, ideo ad consumptio-
nem eius sequitur prima species ethice se. si-

cut dictum fuit in iudicijs. Alia causa est quia
natura, & est magis preparata vt fiat membrum
cambium, & glutinum sunt magis digesta, &
preparata vt fiat pars membri quam ros ideo
diligentius a natura custodiuntur, ideo tardius
consumuntur.

Tertio scias, quod dictum fuit superius in
cura particulari quod pot balneum aque cal-
lide vngendi sunt cum oleis, & vnguentis fri-
gidis. Et causa istius est, quia per calorem bal-
nei pori aperiuntur & humiditas nutrimenta-
lis attrahitur versus partes exteriores, & tunc
quia pori sunt rari, aperti tales humiditates
subtilitate exhalarent, nisi fieret pororum clau-
sio cum vocatione oleorum, & vnguentorum
frigidorum vel cum ratione aque quasi fri-
gida. Per ista enim pori clauduntur, & humidi-
tas nutrimentalis ingrossatur, & in substanti-
am membrarum conuertitur. etiam corpus
infrigidatur & humectatur.

Quarto scias quod Galen lib. de mala com-
plexione diuersa in col. 5. concludit quod ma-
la complexio diuersa est quandoque causa ma-
le complexionis adequate. Tunc enim mala
diuersa est, in terminis sue actionis quando
mala diuersa est introdunda, & dicitur hæc verba.
Cum autem omnia prima corporis mem-
bra integre, & perfecte sunt calefacta dicitur
illa febr. ethica quę est fixa, & hoc ideo quan-
do eius essentia tunc non consistit in humidi-
tatibus idest humoribus, & spiritu tantum
sed est præter hoc in corporibus quibus adest
fixio, & cum hac se. non est passio nec dolor.
Et estimat pa. quod nullo modo sit in co-
febris. quoniam non sentit caliditatem. hæc ille.
Ex istis dictis patet quod in ethica licet, sit su-
percalefactio in humoribus: etiam in membris
radicalibus. tamen se. non sumit nomen nisi
ab illis quibus subiectine, & principaliter sub-
datur. Si enim spūs prius, & principaliter su-
percalefactus sic erit se. effi. & si hñ. sic erit feb.
humoralis. Si membra principaliter supercal-
escunt, erit ethica. Ita quod quomnis in vna-
quaque omnia ista tria scilicet spiritus & hu-
mores & membra radicalia supercalefant: est
aliqua se. tamen illa se. non habet nomen nisi
ab eo in quo subiectine, & principaliter inest.
Ideo contingit, quod nulla febr. cuiuscunque
speciei sit potest dimittere feb. effimera post
se, quamuis effi. post se possit dimittere alias
duas species, &c. quia non est verisimile quod
membra radicalia supercalefant quin spiritus
& humores prius calefant, & inflammantur
non tamen subiectine, & principaliter. ideo
quando vna est non est alia, nec omnes simul
existunt.

Quinto dicit Gal. in mech. parti. 6. col. 7. qd
si estimera debeat in aliam se. mutari, muta-
bitur

bitur in putridam, vel in ethicam: sed hoc fit ut plurimum in caldis, & sicis corporibus. Si medici errent in regimine eorum cum abstinentia, & negligentia humide diete. Primo mutatur in acutam postea in ethicam. In calidis vero & humidis, quia sunt putrefactioni parati: effluera mutatur in sinocham praesupposito praedicto errore, & quod permaneat. Et si non curetur ut oportet aut moritur aut in ethicam mutatur. ubi supra.

Sexto nota, quod ethica per se sola est sine vitio alicuius hu. Et ideo nec stibotomia nec purgatio ei competunt, nisi esset composita cum putrida: tunc enim potest utrumque competere. Sed tunc dubitatur quomodo mala diuersa, & mala equalis simul esse possunt in eodem subiecto. Dico quod sic quia ardentibus lignis solidis adhuc stupet in concavitatibus eorum contentae & inflammatae possunt simul ardere & inflammatis stupis, vel ardentibus lignis solidis remanent inflammata: similiter nec sudor eis competit nec artificialis euacuatio eis competit, nec exercitium.

De sudore. Cap. 16.

Propterea quia febr. aliquando ad bonum aliquando ad malum per sudorem terminatur: ideo bonum est quod post dedicationem febr. de sudore fiat mentio. Vnde sudor est humiditas exiens a corpore per poros cutis facta ex vaporibus a corpore resolutis iuxta corporis superficiem condensata. Vel dico cum Gordo, quod sudor est vapor humidus ab interioribus resolutus iuxta corporis superficiem condensatus. Sudor sicut ceteri effectus habet quatuor causas, scilicet materialem, efficientem, formalem, & finalem.

Causa materialis sudoris est materia, vel humiditas vel hu. in membris, & eorum porositatibus existens.

Causa efficiens est calor dissoluens & conuertens talem humiditatem in fumum siue illa caliditas sit interior siue exterior.

Causa formalis, est frigiditas condensans illum vaporem, vel fumum iuxta curam & illa frigiditas non est absoluta, sed comparata. Videmus enim, quod in alembico quamvis sit calidum vaporem rerum distillabilem condensari.

Causa autem finalis est, purgatio corporis a superfluitatibus, ut per eas actio naturae non impediatur.

Causae sudoris quaedam sunt primitivae quaedam antecedentes, & quaedam coniun-

ctae. Primitivae sunt, sicut nimia caliditas aeris nimius labor maxime in tempore calido balneum & insufflatio venti australis. Magna coopertura pannorum, vel plumaceorum, vel pellium.

Causae antecedentes sunt hu. vel humiditates in corpore existentes.

Causae coniunctae sudoris est fortis calefactio, & subtilitatio illius humiditatis, & ingrossatio eius sub cute & raritas, & apertio pororum per quos exit, quia si essent clausi aut consipati, ut accidit in hydropisii nunquam exiret sudor. Dicit Constan. quem sequitur Gordo in isto quod sudor est duplex; quidam est naturalis qui fit a bona, & perfecta crisi, vel in diebus iudicatiis, & in exercitijs temperatis, vel in tempore aestivo. in tali enim si dore nocitua expellatur & non vitia, & iste est cum bona tolerantia, & alienatione. Alius sudor est innaturalis & diaforeticus & synchomaticus, ut apparet in nimijs doloribus & in morientibus.

Signa sudoris.

Primo si sudor sit multus: multitudo materiae aut eius agnositas, & subtilitas significatur & fortitudo virtutis liquefacitur, & expulsioque significatur raritas pororum. Paucus autem sudor est signum paucitatis materiae, vel viscositatis eius & grossitiei: aut signum debilitas virtutis.

Sudor autem rubescens signum est, dominij sanguinis. si citrinus cholera significatur: si albus phlegma: si niger melancholia.

Tertio autem fetidus corruptionem & putrefactionem humorum significat. Similiter possunt notari singularia per saporem: quia dulcedo eius significat san. &c. amaritudo cholera & sic de alijs.

Iudicia in sudore.

Primo indicat Hippo. Sudores febricitanti si ceperint boni tertiani quintani septimi, & qui in nonadie, & vndecima, & decimaquarta, & vigesima, & vigesimoprima, & vigesimaquarta, & vigesima septima, & trigesima, & trigesima prima, & trigesima quarta, & trigesima quinta, & quadragesima. hi sudores egritudinem indicant: qui vero non ita sunt: dolore significant, & longitudo egritudinem egritudinem, & conversionem. quarto, amphorif. amphor. trigesimo sexto omnes isti dies sunt critici. Et sequitur in commento non solum sudores, sed etiam egestionem multam, & urinarum quantitas, & apostemata post auricles laudabiles sunt si in diebus criticis appareant. Et sequitur in eodem commento. Morbi enim hos terminos transeuntes non crism cum sudoribus sunt facientes nec cum egestionibus.

bus, sed potius cum dissolutionibus paulatim exentibus, vel cum apostematibus, hæc ille.

Secundo iudicat Hippo. per sudorem. sudores frigidi cum acuta quidem fe. facti motem significant. Cum molliori uero fe. longitudo egritudinis significant. 4. amph. ampho. 37. causa est, quia significat, quod multa & quod calor naturalis est extinctus, vel propinquas extinctioni.

Tertio ubi in corpore sudor ibi narrat egritudinem. 4. amph. ampho. 48. Et causa istius est, quia si materia morbi spargatur necesse est totum corpus sudore pergetur: sudor enim nihil aliud est nisi purgatio naturæ a nimis superfluitatibus: tunc crisis esse probatur bona. Aut humiditas morbo cogente a corpore dissoluitur, quod quando fit ex solis locis est, ubi regnat infirmitas. Gal. in com. eiusdem.

Quarto docet Hipp. iudicare per sudorem sine fe. sic multus sudor ex somno siue aliqua causa manifesta factus. Significat quoniam corpus plurimo cibo nutritur. Si vero cibo non accipienti hoc fit, significat quoniam enacatio ne indiget. 4. amph. amph. 41. Et sequitur in com. Si enim ex cibis est facile soluitur. Si autem ex humoribus euacuentur. Multis enim labor & fatigatio sudorem facit, ergo quando in humoribus, vel cibis digerendis laboratur, fit sudor necessario. Et sequitur in fine commenti. Multis enim sudor duobus modis fitant ex multo cibo ante morbum accepto quæ est causa huius materiæ: aut ex cibi in morbo assumpti multitudine quæ si fuerit ante morbum purgetur, preterea vero abstinentia corrigatur, ibidem. Ex isto habes quod repletio antiqua scilicet humorum corrigatur per purificationem, & nonella per abstinentiam.

Quinto febrecitanti, omnis sudor superueniens non deficiente fe. malum: prolongatur enim morbus & humores multos significat. 4. amph. amph. 56.

Sexto docet Auicenna. 2. fen. 4. tract. 1. & post multa verba dicit sic. Sudor interceptus malus est, & significat multitudine egritudinis propter multitudinem materiei, & non conuenit habenti eum flebotomia nec solutio ventris propter debilitatem suam, immo elisteria leuia. Et quando post sudorem non venit lenitas non est bonum signum, & si faciat augmentum in egritudine est malum signum: posito quod sit per totum corpus. Sudor sellinus in principio egritudinis est malus: quia significat multitudinem materiæ, nisi causa in eo sit humiditas aeris, aut propter pluuiam multam tunc est minor malitia. Auicenna. capitul. de signis sumptis ex parte

sudoris.

Septimo dicit Hippo. In sudore rigor malum est. 7. amph. amph. 4. Et Gal. dicit in com. quod accidentia crisis non facientia crisin, sunt signa crisis discretæ, id est male terminatiois siue mortis cum natura in his sit perterrita ita, ut morbum fugiat. Unde rigor in sudore malum est. Hæc ille. Cum isto ampho. concordat Auicenna. in loco all. sic. Et quando cum sudore horripilatio accidit, non est bonum immo malum, quoniam horripilatio significat expulsionem hu. mali nocentis, in corpore, & illud significat, quod sudor non mundificat immo mouet de hu. malis illud enim acutus est fracta &c. & significat, quod ibi est multa ma.

Octauo quia fe. ut plurimum criticant per sudorem, ideo ponamus hic conditiones bonæ crisis, quas ponit Gale. 1. ampho. comm. 1. ubi. Ea quorum crisis fit, & quorum facta est &c. Prima conditio est, quod fiat cum purgatione & non cum apostemate. Secunda est ut purgentur hu. nocui qui sunt causa morbi. Tercio quod fiat alteratio morbi. Quarto, quod fiat cum alleviatione patientis. Quinto quod fiat post apparitionem signorum conditionis. Sexto quod fiat in die cresca. ubi supra fuit allegatum.

Nono in ordine dictorum iudicat, Auicenna. cap. vlti. all. & dicit sic. quando debilitatur virtus & pulsus & sudat frons parum, est signum magnam, si uero cadit pulsus, est signum mortis. Iudicat Auicenna. ibidem de sudore ad bonum, & dicit quod sudor bonus cui conuenit, ut sit per ipsam crisis completa est ille, quæ fit in die cresca, & est communis toti corpori abundans super ipsum, & alleviatur infirmus, & sequitur in bonitate illi qui non est, per totum corpus, & succedit ei lenitas &c.

Curatio sudoris.

Primus casus generalis non remouetur sudor donec materia sit perfecte purgata, & eger sentiat alleviationem manifestam virtute stante forti.

Secundus egritudinibus consumptiuis sicut est ethica, & phthisis non competit sudor.

Tertius est Constanti. in viatico sic. cum autem sudor adeo augmentatur: ut inde virtus debilitetur, oportet ipsum restringi. Restringatur ergo sudor discooperiendo corpus, vel minuendo coopertorium, & si sit ex nimis cibis assumptis, iudicantur ieiunium & abstinentia. Et si propter corporis repletionem, digeratur & purgetur hu. potens ita quod fiat diminutio in hu. superabundantibus quæ sunt mate. sudoris, deinde

vnga-

ungatur corpus cum oleo rosæ & oleo nennia. & iulicino, & oleo citrouiorum, & quolibet per se, vel simul mixtis. Vel sit sic. Recip. rosa. vnc. 2. sandaru. balau. vnc. 1. gallarum frondium mirtæ, ana vnc. 1. coquantur omnia in aqua duabus lib. aquæ usque ad tertiam partem & coletur & addatur olei rosæ lib. 1. & coquantur iterum donec aqua sit consumpta. & de isto oleo frigidus unguatur pa. maxime pectus, & latera. Er potest de sirupo rosæ vel iulep cum aqua frigida habellatur cū habellis: vel aspergatur pectus & latera cum panno in aqua frigida madefacto, & dormiat solus in lecto duro & sit male cooperatus.

Si autem volumus sudorem prouocare co-operari se bene pa. & ponat caput infra co-operimenta & anhelet infra & ponat cucurbitam plenam aqua calida ad pedes, vel ad latera. Et aliquando unguatur par. cum oleo camo. & laurino vel vino & unguatur dorsum & totum corpus. Item piper & cinamomum calamus aromaticus reuonicum piterum reubar. coctus castialgi. carphallamus san succus succus mentastri mixta, vel separata bulliant in oleo unguatur vt supra dictum est & prouocabitur sudor. Vel si suffumigium fimbrijs protensis cum castoreo, & calamento & carphallamo, & se. vertice & carui simul tritis vel coquantur herbæ calide in olla. & fumus sedendo in sella perforata recipiatur. Mentastrum teratur, & succus eius bibatur cum aqua mellis, calefacit for dier & educit sudorem. Haly. de regali dispositione, vel fiant balnea & stuphæ dicte in spasmus & paralyti. & sic sudor prouocabitur Deo danre. Alius modus est prouocandi sudorem quem modum pro nunc dimittit.

Declaratio in sudore.

Primum sciendum secundum Hyppo. 4. amphi. amphi. 42. quod sudor multus calidus, vel frigidus superfluens supple ante signa digestionis & non in die critica, talis enim sudor si sit frigidus, significat longiorem egritudinem, calidus vero minorem designat. Et sequitur in commento. Cum ambo multos humores. significant, frigidus frigidus, & calidus calidos. Vnde huiusmodi calidus minorem designat egritudinem, quia multum maretiam cum paucio calore ostendit, e contrario vero calidus sudor multum calorem cum paucio materia, & ideo minorem ostendit egritudinem, vbi supra.

Secundum intelligendum secundum quod dicit Gal. in primo amphi. com. 15. præter naturam, quia hic cursus corporis est auctoritate. Diafcori. & ipse probat quod sudor est secundum cursum naturæ & natura domians ip-

sum vicerit nō ad cutem superfluitas cibi mādatur sensibiliter, sudor enim in laboribus & nimis exercitijs, vel calidus extra naturam sit & faugationibus, hæc ille.

Tertio nota quod Hypp. primo prognosticorum cano, vigesimo nono docet prognosticari per sudorem sic. Sudor bonus & laudabilis existit si in die critica sit & ægrum liberat. Est etiam bonus qui sit in toto corpore. & eger ex eo liberatur & sanior, & fortius reficitur. qui vero nihil horum fecerit, id est inutilis. Frigidus autem est malus peior si in ceruice, & in capite solo. in acuta quidem egritudine morientem significat, cum lenta vero prolixitatem significat ægritudinis. Et Gal. in commento dicit quod ille qui sit in solo capite & ceruice quamuis sit calidus est mortalis idem dicit Aui.

Quarto dubitatur quomodo cum acuta fe. potest venire sudor sicut dicitur in secundo iudicio auctoritate Hyp. Dico quod Gal. in dicto commento ponit quomodo hoc potest fieri dicens sic, quod sudor frigidus non emergit ab illo loco in quo est calor febrilis, quia si ibi necessario est calor febrilis, necessitate sudor caleficeret, sed cum sudor exit per cutem, quæ si sit frigida, necessario sudor exit frigidus in interioribus calefcentibus. sudor igitur frigidus in ægritudine acuta sit, sicut cum hu. alicubi putrefit, & cum hoc calor naturalis deficit, & febrilis non potest venire ad extrema corporis propter oppilationes. vel propter aliud cum agit in illis & conuertit aliquam partem eorum in vaporem, ille vapor veniens ad superficiem corporis, & cutis inueniet ibi frigiditatem & ingrossatur & exit, vel exit primo & post ingrossatur in cutis superficie, & intellige, quod iste sudor non infrigidatur tantum sub cute quin exeat per poros qui adhuc sunt aperti ratione caloris febrilis præcedentis: sed quando est super cutem infrigidatur.

Quinto clarificat Gordonius dicens quod si sudor venit ex causis intrinsicis vt plurimum venit de nocte & magis in hyeme & magis in dormiendo, quia in istis calor naturalis est fortior. Si autem venerit à causis extrinsecis, magis venit in uigilijs & in estate & in die. Et dicit Auicenna, non sit sudor frigidus nisi iam ceciderit caliditas innata. quare non conferuat humiditates immo separatur ab eis, & sudor primo venit in parte anteriori: quia pars calidior est secundum ipsum Gor.

Sexto nota, quod si in die indicativa naturæ faciat aliquam similitudinem sudoris & in die critica sequenti non venit ille sudor circa finem status: quia natura est sopita & negligens tunc medicus debet incitare & iuuare naturam in prouocando sudorem quia coadiuto-

res naturę sumus.

Quinto nota quod postquam homo sudavit per bonam pausam & volumus quod amplius sudet: debemus paulatim abstergere sudorem. ne sudor remaneat super poros cutis claudat eos, & hoc fiat ter vel quater suaviter cum pauno calido sine euentatione: & sudet usque ad fatigationem sudantis, sententia est Aui. c. simili de accidentibus febrium.

Octavo scias sicut dicit Aui. in secunda seu 4. in iudicijs sumptis à sudore, quod ista signa distinguuntur aliquando per tactum: ut si est calidus vel frigidus: aliquando per calorem: aliquando per quantitatem &c. Vnde scias quod in bona crisi debet venire sudor calidus per totum corpus & debet continuari equaliter usque ad finem terminationis. Aliquando sudor est multus propter consumptionem humiditatis subtilis, vel propter calorem fortem resoluentem humiditatem in corpore: aut propter multas humiditates in corpore aggregatas aut propter raritatem corporis. & pororū cutis, aut propter fortitudinem expulsiue & debilitatem retentiue. Sudor autem paruus fit propter causas contrarias istis.

Item per tactum: quia aliquando sudor est frigidus. & tunc significat humores & extinctionē caloris innati. Et si apparet in motibus acutis: mortem significat. Et si in morbis chronicis, vel lentis longitudinem morbi signat. Calidus autem significat humorem calidum & abbreviationem egritudinis. Et ista debemus considerare: si veniat in principio egritudinis vel in diebus iudicationis. Et per colorem similiter distinguitur, quia albus dominium phlegmatis ostendit, & rubens dominium sanguinis, huius melancholiam: croceus, vel citrinus choleam. Similiter ex parte odoris: quia fetidus corruptionem significat equalium humorum. Ex parte similiter saporis, quia eius dulcedo dominium sanguinis, amaritas choleam: ponticus melancholiam, & Aspiticus similiter insipidus phlegma falsum. Ex parte substantiæ seu liquoris: quia viscosus & grossus signat humores grossos & viscosos subtilis attestatur super humores subtiles: & intelligit quod aliquando pori sunt ita aperti: & sanguis subtilis quod si ille sudet & sudor abstergetur cum panno lineo, ille sudor videtur sanguineus.

N I C O L A I

N I C O L I

De Febris Epitome.



Febris quid sit.



FEBRIS, ut ait Aus. 4. primi est calor extraneus accensus in corde, procedens ab eo medianibus sanguinem, & spiritu per arterias, & venas in totum corpus ita, quod noceat naturalibus operationibus.

& Gale. in lib. de mala complexionē dicitur febris est morbus in completionē non frigida, nec humida, nec sicca, unde calida, & siccitas sequitur calorem. calor autem præternaturalis duplex est differentiā. alia quando egreditur mensuram caloris naturalis: alia quando egreditur naturalitatis proprietatem, per quam non existit conueniens instrumentum virtutis, licet sit in gradu non excedens, ut sit in febre petiti, cuius calor sepe est remissior naturali, tum per suam malam proprietatem occidit, & calor extraneus faciens febrem non est præternaturalis per mensuram excessum: quia iratus febricitans, sed per proprietatem malam, quæ dicitur improprio. & hæc ab Isaac, Aue. autē 5. colligitur, duplex est calor innaturalis: unus, qui omnino est præter naturam, & vice oppositus, qualis est cadaverum, & membrorum corruptorum. alius est innaturalis secundum quid, qualis est, qui est medius inter naturalem & præternaturalem absolute. & hic habet latitudinem, secundum quam talis calor innaturalis ponitur sub triplici gradu innaturalitatis, quorum unus est versus latus caloris naturæ, si in primo gradu innaturalitatis, qualis est calor innaturalis extraneus mensuræ illius, & hic non nocet operationibus, vel non obis: alius est versus latus caloris, quod uno est innaturalis, qualis est extremus extraneus appetitatis caloris innaturalis versus suum, qualis est calor febricitans pueri in hora mortis, aut qualis est calor membri existentis in via cor-

ruptionis, ut in herpete, vel cancro: & tertius est medius inter duos dictos, qualis est calor febris, maxime febris salubris. & de duobus ultimis dicitur calor innaturalis in definitione febris positus. de medio loquitur Gal. in 1. de Diff. & ait, qui est sicut semiputredo, quæ est media inter sanie, quæ ad bonum est simpliciter in genere suo, & putredinem omnino ad malum, quare calor febrilis videtur tenere medium inter naturalem, & absolute præternaturalem, verumtamen febrilis calor alius, ut ait Gal. lenis est, & facilis, alius fortissimus, & quasi igneus, & alius inter hos, sed omnis est extraneus.

De febris subiecto.

Primum subiectum febris est calor, secundum totum corpus, unde Aul. inquit de philosophi. cum calefit aer, & peruenit ad cor, fit febris, deinde per totum corpus spargitur. hic calor non necessarius est in omnibus cordis partibus, sed in spiritibus, vel humore, vel substantia, vel alio proportionabile, & semper simile cordis ventriculis peruenit ad calorem febrilem, primo, quia est calidior, & magis apertus inflammationi: nam sanguis est subtilior, & nature spiritus vicior, & motus motu continuo. Quidam improprie assignant febrile subiectum, & est membrum, à quo causa febris prius manifestatur, vel est aliquam in miera, vel venter, ex sole caput, in putrida sanguis, aliquando hepatis, in phlegma stomachus, & in melancholica spleen.

Calor febrilis quomodo consideratur.

Calor extraneus est ipsius visibilis, improprietabilis cordis, quod cum improprietatur calor naturalis ad suam naturalitatem & disemperat, hæc Isaac, & calor febrilis aie Avic. defertur in totum corpus, nisi sit quid prohibens, quare ad calorem febrilem intentione tantum in putrida non est semper necessarius calor febrilem expandat membra per vaporem.

rem putridum; quia talis vapor potest alterare cor, & non expandi, vel vapor si sit paucus, potest per anhelum expelli: vel aliqua materia paucæ quantitatis, sed malæ vicinæ cordi, quæ ob malitiam captabit febrem. calor verò febrilis in spiritu prius, & sanguine posteriori defertur per arterias, & venas ad totum corpus, non tamen immediate ad quamlibet partem eius, sed ad alias per præsentiam suam idest sang. & spiritus, & ad alias, ad quas non pervenit arteria, nec vena, per simplicem alterat alterando partem post partem. calor autem hecticæ in membris habitus, & factus, existens, & inde pendens in eis, nec in eis amplius existens in produci ad suam conservationem requirit transmissionem sanguinis, & spiritus ad membra, in quibus est, & sicut calor naturalis perficit primo omnes operationes cordis, & totius corporis, sic in naturalibus nocet operationibus primo vitalibus, dein de naturalibus, & postea animalibus, sed non æque omnes leduntur. Et quidam sunt parati capite magis ledi, alij stomacho. leditur operatio a calore febrili, vel per se, vel per accidens, per se, quando desuperat temperamentum membri, quod erat perfectiorem operationum eius; per accidens, quando aliud membrum distemperat, cuius temperamentum requiritur ad operationes primi, vel calor febrilis aliquando ledit generationem sanguinis distemperando temperatam hepatis, quæ est lesio per se aliquando ledit eandem operationem distemperando temperatam stomachi, quo distemperato non præparat stomachus hepaticam materiam convenientem, pro generatione sanguinis, vnde fit mutatio in membro vivente, aut deferente virtutem, spiritum, vel sanguinem. mutatur & id quod recipit.

Febrium differentia.

Febrium differentia alie sumantur à substantia, alie ab accidenti, si à substantia, vel à forma, vel à materia, in qua si à forma, vel à magnitudine, & parvitate, vel à modo impressionis caloris in tactu sanguinis, ut pungentes manum, suaves, ardentes, vel sicce, si à magnitudine, vel parvitate consideratur quantitas caloris, & qualitas, quantitas est subtilis caloris, vel vel vaporum calefactorum, qualitas est gradus elevari, vel remissi idest secundum magis, vel minus, quæ non sunt specificæ differentie, magna, & parva febris triplicem habet modum: primus quando est magna in quantitate, & qualitate caloris, ut tertiana, continua, & phlegmatica è phlegmate falso aut contrà parva, ut ephemera, secundum est magna in quantitate, & non in qualitate,

ut, ut syuoca inflatio, tertius quando est magna in qualitate, & non in quantitate, ut causon. contra parva magna etiam dicitur, quæ perseverat, mediocris est, quando pro aliquo tempore habet magnam caliditatem, & pro aliquo parvum in quantitate, & qualitate.

Corpora ad febrem parata.

Corpus aliud alio paratius est ad febrem, aut ista, quatuor de causis scilicet ob similitudinem in complexionem, ob raritatem in compositionem, ob fortitudinem agentis, & ob longam continuatam actionem. minus aliis disposita sunt temperata in complexionem, & compositionem: quia fortitudo virtutis eorum resistit causis inprimis ut verum ait Gal. paratissima est crasis calida, & sicca: quia est conformior crasi febrili. deinde calida, & humida, & proprie ad febres putrides, corpora frigida, & humida, & frigida, & sicca sunt longinquiora. idem dicendum est de sexu, ætate, & humiliori rebus naturalibus: non naturalia ut æstas, regio calida, & sicca &c. præparat magis corpora ad febres, & primas feræ æstas, secundas autumnus, tertias, ver & demum hyems.

Febrium causa quot sunt.

Cause febrium sunt quatuor, nam dicitur subiectum, in quo formalis est calor extraneus, efficiens est triplex, scilicet efficiens propriè, augens, & conservans, prima est triplex (scilicet primitiva, antecedens, & coniuncta, sine coniunctis non potest esse febris, sine antecedentibus non potest esse humoralis, nec ephemera, absque primitiva, ad hecticam, sufficit coniuncta, tamen & alie adesse possunt, causa augens, & confirmans dividitur in antecedentem, & primitivam, & nulla harum ad esse febris necessario concentrit, conservans verò alia est intrinsicca, & est eadem cum generante vel efficiente; forma enim quæ dat esse rei illam etiam conservari essentialia extrinsecca omnino diversa ob efficientem, harum causarum alia est naturalis, aut non naturalis, aut præter naturalis, naturalis ut humor in corpore qui exit cursu nature in quantitate, vel qualitate; non naturalis, ut aer, præternaturalis, ut apostema, de efficiente, & augente ait Gal. sicut neque calor, neque ignis unus est generationis, & augmenti modus, sed aut propter motum immoderatum, aut putrefactionem, aut copulationem alterius caloris

• ut retentionem effusio num choleze; aut immissionem subflantiz calide; ita febrium causæ ad hos reducuntur modos, & omnis causa, quæ potest generare, & augere febrem, potest & eam confirmare. primus autem qui alteratur in corpore, est spiritus secundus humor, tertius pinguedo, quartus caro, quintus membrum, & nervosa corpora; tandem cartilaginosa, & ossa. Gal. causas efficientes octo numerat, septem actiua, unam passiuam, prima est obuiatio solis, vel ignis, & id generis. secunda cibus, & potus calidus actu, vel potentiam. tertia est medicina superflue calida, quarta est excitatio, & motus nimius. quinta affectus animi, sexta defectus nutrimenti, septima pororum contractio, & prohibitio transpirationis eius, contra corpore debet dissolui, ut sit à frigiditate. octaua est causa passiuæ quæ est extenuatio corporis facile calorem suscipiens. hinc febris est ledere operationes.

Febrium signa generalia.

Signa febrium generalia sumuntur à rebus naturalibus, non naturalibus, & præter naturalibus, à naturalibus ut à complexionē calida, aut sicca, ab habitudine macra, an carnosa, vel pingui, ut raræ texture, vel densæ, ab ætate, & a sexu, a non naturalibus constitutio aeris calidi vel frigidi, &c. præter naturalis, ut an præteritæ consuetudine frigoris fuerint calide, vel frigidæ humorales, vel non, & quæ propriæ regionis, an operationes sint mutatæ, an æqualitas corporis in complexionē, & habitudine sit mutata siue totum corpus uel pars, an aliquod exiens à corpore sit mutatum à consuetudine, ut urina, egestio, & sudor. Anic. reducit signa ad nonem genera. scilicet quæ declarant magnitudinem, uel paruitatem, mordacitatem, uel suauitatem, secundum quæ genus febrium, ut tertianam, uel quotidianam, tertium quæ malignitatem febrium. quartum quæ digestionem, uel indigestionem. quintum quæ crisim. sextum laetem, vel contra. septimum quæ habitudinem corporis. octauum quæ tempora morbi nonnam quæ dispositiones febris, & ex qua specie fiat.

De morbi tempora.

Tempora morbi considerantur tripliciter. scilicet secundum essentiam eius, secundum quod variatur, ut calor extraneus in febre, secundo secundum actionem naturæ in materiam morbi, id est respicit causam morbi, tertio secundum actionem materiz, uel qualitatis eius in naturam, cuius effectus est morbus. essentia calor extraneus declarat quatuor tempora. scilicet initium

quando incipit, augmentum quando. scilicet auctur &c. actio naturæ in materiam de notatur per principium, quando nondum apparent signa digestionis. augmentum quando incipiunt, statum quando apparet complete, & declinatio, quando materia causa digesta extra ducitur. initium igitur temporum uniuersali nam morbi est, ait Isaac quando incipit morbus, & eius accidentia panarum a minores quosque plura, vel omnia appareant, augmentum cum purtissima completur, declinatio. id est postquam accidentia indicantia morbum erunt perfecta, deinde molestiora & acutiora fieri incipiunt, & durat quosque natura, & morbi repugnatio ostenditur; status autem hora, in qua morbus in oibus suis partibus, manet secundum unam dispositionem, declinatio est ab initio crisi. mitigatis terribilibus accidentibus furoribus usque ad salutem, initium uero temporum particularium est paroxysmorum quando caliditas est in tota inclusa, exterius non comprehensa apparet augmentum, quando caliditas ad extra panditur & manifesta, & apparenter additur, statu quando est in tota expansa, & addita. declinatio quando minuitur, absque quia ad interiora includatur.

De febre Ephimera

Febbris ephimera fundata est in spiritu; quæ in viginti quatuor horis sæpe quæ exicit; aliquando ait Haly uidetur punire ad criginæ & duas, & ad quadraginta & octo. parum durat, ait Auic. quia accensa in re subtili est, quæ uelociter accenditur, uel vel alij dicunt, spiritus non conseruat qualitates impressas, uel talis spiritus est influens, qui cum fiat à cibo resoluitur in viginti quatuor horis, quæque prorogatur per accidens, quando scilicet frigus contra adueniens cordi non permittit iam resolui, aut ieiunium triduanum, durat uero per plures horas aliquando per pauciores, uel ob multum spiritum in corde repletum, uel ob eorum facilitatem in difficilem resolutionem, uel ob raritatem, & densitatem corporis. spiritus inquit Viani. in quibus accenditur febris, sunt iuxta primo & per se, deinde alij Ephimera alia est uera & persistens, & est quæ antecedit putridam, & hecticam, alia accidentalis, ut quæ sequitur a postrema, hi sunt parati ad ueram qui sunt calidi, & sicci deinde qui calidi & humidi, cause reducuntur ad quatuor genera ab Haly. serapi. Isaac. primum est quod calefacit, uel insensibilis sume, & obstructions facit, ut calor solis &c. secundum sumitur intra ut cibus calidus. tertium corpus, uel anime laboriosum quæ a postrema in collo, sub aëllis, matrice &c.

cibus, & potus humidus sit & parum frigidus, & facili digestio. altera calorem cum frigido humidis cordialibus præsertim intra. si obstructio facta sit à frigido. paucus sentitur ad manum, sed postea palam sit pulsus parui ob frigus extra, veloces, & còtinui ob caliditatem submersam intra. difficultas est anhelitus, facies palida, ait Viar. frigus, & pondus in capite, catarrhus in trachea, urina ait Aui. alba. cura est, ut remouens causam præsentem. si at igitur exercitium. locus sit remotus à vento, & à frigore ait Haly. frictio lenis, & mollis lenis, inquit Alman. & prouoca sudorem inquit Mel. in declinatione ait Alm. ingredia tur balneum usque quo sudat, deinde ait Aui cen. unge cum oleis aperitiuis, & anethino, chamæ. i. rino, & huiusmodi. cibus inquit Aui cen. declinet ad caliditatem, & aqua mellis valde est utilis. & Alma. uinum forte, sed limphatum.

Si febris facta sit ex balneo stiptico, cura sit, inquit Aui. & Alman. similis curæ suctæ à frigore.

Si facta sit ex dimissione frictionum, cutis est mollis, graua sunt membra, urina grossa, turbida, gravis odor, & defectio appetitus. ster in aere luminoso clato, fiat balneum post declinationem, & sudet in eo, fiat frictio cum fursure, & farina fabarum, & ordeï, amigdal. amararum & seminis, itera balneum, absterge gradatim. da cibus frigidus, & humidus, uinum album durum, limphatum.

Si febris fiat ab agitatione, oculi stant fissi, facies citrina, cura est similis curæ factæ ex uigiliis. detur uinum album, subtile, limphatum, & prouoca somnum.

Si ephemera fiat à uigiliis, facies ut Aui. & Serap. est citrina ob malam digestionem; oculi rubent. & ait Aui. grauitas palpebrarum, & inflatio, pulsus debilis ad resolutionem spirituum, & durus ob siccitatem arteriarum. cura est, ut remoneas causam, alteres discrasiam & curras symptomata. i. indigestionem, & exiccationem corporis. prouoca primū ait Serap. somnum cum embrocis super caput, frictio fiat pedum, & manuum, ut materia trahatur ad infra. cibus sit humidus, facili digestio, uinum sit inspidum. balneum est utile post hoc uinum limphatum.

Si ephemera facta est à somno; somnus autem reatus declarat, inflatio palpebrarum & faciei, & oculi tardi motus, urina grossa propter admixtionem superfluitatum prohibitarum resoluui somno, pulsus plenus, mollis, corpus uaporosum. cuncto uocis, opilatiuarii. pignitia animæ & corporis. faciei decoloratio: cura est remotio causæ, & alienatio febrilis caloris. locus igitur sit luminosus, parum calidus

& siccus. ita facta, exercitiū fiat, & frictio extrimitatū. sudet in balneo, & lauetur in decocto chamæ meliori, anethi, sticados, & similiū. ait Aui. cibus paucus frigidus, & humidus, uo bibat uinum, alteret cor cū frigidis temperate, & cerebrum cum sicci temperate, cum quibus misce aliquando resoluencia uapores sine attractione.

Si ex nimio quiete fiat ephemera, corpus è uaporosum, graue, tardum, pulsus plenus, uina grossa cum multo sedimine, & plurimum non iuncta, æger letus. cura est cura dictæ.

Si fiat ex nimio motu, nam spiritus uniuersales accenduntur, & agitantur humores & inflammantur ob continuatam spiritus cordis signa sunt antecessio laboris, dolor & debilitas iuncturarum. corpus siccum, ait Aui. & Serap. pulsus, ut Gal. & Aui. est paruus, & debilis, urina subtilis, & acuta ob resolutionem attrahendi acetem. cura est remotio, & alienatio febrilis caloris. locus sit humidus, & parum calidus, uel frigidus, lectus mollis, quies, ait Isaac. & Serap. fac odores, non calefacti, nec sudet ait Alman. non balneetur ualde ait Isaac. sed funde aquā tepidam super artus, absterge, & unge oleo uiolarum fricando, & Serap. cum oleo nenupharis, si hepar est calidum, uel chamæ, & de been, si dispositio sit contraria, unge collum, & caput, & spondilia. cibus ait Gal. humidus, & sæpe ait Serap. ob testationem. uinum minus solito & limphatum inquit Serap.

Si ephemera fiat à calore solis in capite, calidum est caput, oculi sicci, uenæ temporum plenæ, oculi rubent, facies citrina, uel rubea ait Haly. urina est subtilis, citrina, aut parum rubea. cura est similis curæ factæ à caliditate aeris. sed magis uerte te ad caput, locus sit frigidus, odoret fandalos, & frigida ait Haly. & Gal. ubi, quod infundatur oleum rosatum, aut dampnacinum infrigidatum in pateo super committitur coronalem usque ad declinationem. & Haly. pannum laneum in aqua rosata aceto, oleo ros. & fandalis, & iteres. idē Alman. oleum uiolatum cum lacte papaneris iubet Serap. nisi cortiza ad sit pluries balnea ait Aui. inquit Serap. funde super caput decoctum cannæ sicce, storum nenapharis, & ros. in declinatione cibus sit mica panis loti cum zucchero lactue. portul. cocum. & idge ueris, potus sit succus granatorum cum zucchero, uel ulepe rufato, uel uiolato, uel aqua hordei. & nisi catarrhus angat, da carnes leues, & uinum album, limphatum.

Si ephemera fiat à fame, locus sit humidus & parum frigidus, letitia, quies, somnus multus post cibum, cibus ait Auer. frigidus, & humidus parum, & cito digestibilis. da parum;

& sepe ait Auic. & non expectes, ait Ras. Declinationem. unum debile, limphatum, iulep, aqua hordei cum zucchero. balneum fiet & fundatur super caput aqua tepida, unge cū oleo uiolato, de cucurbitis &c.

Si ephemera à sit fiat, humecta, & infrigida plus, da iulep uiolatum, de encurbitis, uel nenophar. cum aqua frigida, nisi materia sit in stomacho, da ait Anic. aquam fructuum, & granatorum. inquit Alm. cibus sit triticū mol roties ablutum cum zucchero, in fine balnee rur, & cinde quiescat, cibetur, & bibat prisanā ait Auic.

Si fiat à cibus, & potibus calidis, urina est magis rubra, quā in aliis ephemeris ob lēsiōnem hepatis. ait Ser. hepar ait Constan. est calidus tactu, stomachus, & hepar. & siccitas, & incensio, os siccum est, & amarum, dolor capitis, rubredine faciei, & oculorū, pulsus & anhelitus maior, cibus uomatur, si fuerit in stomacho: si minus, fluat uenter cum lenientibus, ait Alm. aer frigidus, & non comedat, nec uinum bibat post declinationem bibat aquam hordei, comedat non carnes, sed condita cū aceto, & granata muza, da syrupum acetosū cum aqua frigida. Si sitis infellet, da aquam frigidam, aut hordeaceam cum iulep. & ait Serap. tude hepari cum infrigidantibus: & prouocantibus urinam, da syrupum acetosum cum nino granatorū. si cibi fuerint grossi, ait Alm. febris manet multas dies, ut synochus esse uideatur, & facit opilationes, & febres putridas. aer sit temperatus, dormiat ad cibi digestionē. deinde balnea, & nutries subtiliter, per aliquot dies non exercitentur. uinum album, clarum, lymphatum, aut sirupū acetosum. & ante fiat exercitium leue uel frictio, solue uentrem cibus nouissim cum succo fructuum. Ras. iubet phlebotomiam si color est rubeus ualde, & cetera consentiant.

Si fiat à uino multo, & potente, aer sit frigidus, & humidus. frica ait Haly extrema gescat, & dormiat ad digestionem uini, & Alm. bibat aquam frigidam plurimam & robur cum frigidis paulatim, sedata febre, ingrediantur balneum, & funde super caput multam aquam frigidam. sit cibus frigidus, & humidus facilis digestionis pauce quantitas, uinum fugiat. si in capite remanserit grauitas, & in oculis rubedo, & extensio, ait Alm. phlebo, & uento ferat, & soluat cum succo fructuum.

Si fiat à med. calida seda ait Mes. caliditatem, & acuitatem cum frigidis, & humidis & inquit Alm. cum aqua frigida admixtis. ciba ante declinationem completam. ait Auicem.

Sicut ephemera, quæ sit a sole, plurimum est cerebialis, in spiritu animal, & quæ ex bal-

neo, cordialis & in spiritu uitali, sic quæ ex cibus, & medicina est hepatica, & in spiritu naturali.

Febris ephemera non ueta facta primo ex inflammatione spiritus uitalis quæ uor habet species, & totidem causas. si lyncopim, uaporem putridum inspiratum, uenenum, & apostema in anterioribus. cura facit a lyncopim quandoque uertitur ad lyncopim, quandoque ad causam, quandoque ad calorem febrilem. cura facit a uapore, sit aer temperate frigidus, odoriferus. ex rebus frigidis moueat parem, non dormiat usque ad declinationem febris. & tunc balneetur in aqua simplici calida, aut in decocto rerum temperatarum, deinde ciba cum frigidis, & humidis, odoriferis. uinum sit debile, clarum odoriferum, limphatum, deinde dormiat. & si quid caloris remanserit, extingue cum frigidis, humidis in tra, & extra. si febris, fiat ex neneno, remoue ipsum, deinde febre. si fiat ex apostemate, pulsus ait Gal. 2. de Crisi. est magnus, uelox, & frequens, calor in toto corpore non multū mordicans. facies rubra, urina ait Auic. alba, aquosa ob raptum materię ad apostema, de lū natio est cum sudore. Cura est primo ad bubonem, & eius causam, sec. ad discrasiam febrilem, ter. ad accidentia. fuge uinum, carne Serap. balneum Haly. aerem calidum, iram, motum, frictions membris leui, dietam grossam, & calidam. fiat phlebotomia, & fluat uenter, ait Auic. & Haly. infrigida uiam inter ipsum, & cor.

Si ephemera fiat a dolore, calor est in toto corpore, anhelitus frequens, & aliquando magnus, & uelox, aliquando contra. item pulsus, uigilie, inquietudo, urina tincta, & quandoque aquosa. cura est remouitio doloris.

Si fiat ex catarrho, cura non est negligenda. ait Alm. quia sit aliquando pleureth, uel peripneumonia, & id generis, fuge uinum, carnem ait Viat. & balneum inquit Galen. 8. metho.

Ephemera non ueta facta ex inflammatione spirituum naturalium habet nouem causas, & species. loppilationem, nauicationem facietatem, materiam in ore stomachi contentam, uentris conspilationem, fluxum, sudorem, cutum, uomitum. medicina cal. agitante humidi. opilatio ait Auic. sit in poris cutis ob spissitudinem eius naturalem, & paucitatem ablutiois, & multitudinem ciborum, & ob frigiditatem, & ablutioem cum stypticis, & adustionem solis. & quandoque sit in uillis uenarum, & meatibus earum, & officii, & uilis earum. hæc opilatio relata ad uenas est duplex una in uenis magnis, & maxime profundis. & hanc.

& hanc plurimum sequitur in spiratio, & inde putrefactio, & sic febris putrida alia in partibus, & iuxta eum terminatur. & hanc sequitur febris ephemera non vera, ex his habes, quod quidam opilatio faciens febrem præbet causam materialem, ut opilatio viscerum, & uenarum maguarum profundarum aggregans superfluitates humorales, & parans eas ad inflammationem, quædam præbet causam efficientem, ut est opilatio pororum, & capitorum uenarum paruarum, & arteriarum & ipsorum meatuum contiguarum simul, quæ prohibet transitionem uaporum, calorem, spiritum, & humores in inflammatos.

Signa febris ephemeræ ab opilatione factæ sunt difficiliora, quia est febris humoralis, ut ait Auic. accidit enim quinque, frigus, & horripilatio, & duras versus tres dies, & aliquando pertransiit, idem Ras. 13. comm. ait & si opilatio est modica, brevis est, si multa, durat ad dies & si cum hac fuerint humores frigidi grossi, & viscosi, fiet synocha sine putredine, si corpus erit in æqualitate: si minus, in putridam, idem ait, hæc febris accidit sine causa primitiua opilante poro cutis, sed ex cibis grossis quorum superfluitates opilant in retri digestionem meatuum, per quos fluit superfluitas tercia, siue sudor, unde fit multa caliditas, & repletio, quare si non habuerit causam manifestam, & in primo periodo fuerit multa purgatio, erit ab opilatione. caret, ait, rigore. caliditas est similis ephemeræ, urina digesta, ait Rabi. in diuisi. si in primo die febris erit ephemera, in secundo augetur, urina tingitur, pulsus fit uelox, & anhelitus, facies, & oculi rubet est ab opilatione.

Verum si acciderint sint magna, & fortia, ait 8. comp. ephemera transiit in synocham, uel acutam.

Cura est remotio cause. i. opilationis, dicatur febrilis, & accidentium. aer sit temperatus, gaudeat, moderate moueatur, fiat balneum da mellicratum cum petrosi. & post tres horas comedet per duas horas ante paroxysmum. sed antequam fiat balneum, præcedat euacuatio, & apertio, & febris sit in declinatione. Si secunda accessio est minor prima, balneum fiat, urina sit digesta, & pulsus uerbis significet putredinem. & ingrediatur per v. horas ante paroxysmum. ubi diu moretur, uel si accidens malum adueniat, & frica cum sari na hordei, & salequo ad euacuationem inquit Auic. non facias apertionem ante anacuatiorem. fiat phlebotomia. uam ait Gal. 8. metho. nullus febrilis ex opilatione ad putredinem venit in initio phlebotomatus. & Ras. in diuisi. si rubedo addit, pulsus plenus, corpus carnosum, calidum, & humidum tactu. & Auic.

si repletio est magna, & fiat in interpolatione, uel lentitia, quia alio tempore ageretur humor, & misceret bonos cum malis. & ait Auic. item ex altera parte si dolor accidat extrinsecus, si igitur opilatio est propter multitudinem humorum, fiat phlebotomia. si ob viscositatem, incide, facta euacuatiore aperi opilationem cum oximelle, mellicrato facto cum calamento, hisso, origano.

Satietas naefestua est duplex, una quæ ad fumosum, alia quæ ad acetosum, & hæc duplex, alia à caliditate facientie ebullitionem, alia à frigidityte calorem innarum minuentem quæ sit à caliditate, fit febris raro, quæ à corruptione cibi in stomacho, eleuantur uapores multi inflammati, qui retenti maxime in partibus stomachi, hepatis, & aliorum nutritiuorum inflammant spiritum uatalem, ad quod adiungit materia multa, quæ ad ipsa membra calefacta attrahitur, & calefit. spiritus uatalem inflamar uatalem, & fit febris, quæ ait Gal. aliquando est cum fluxu uentris, & curatur facile, aliquando cum constipatione, quæ non sic facile. uertitur plurimum in putrida præsertim si chylus corruptus transiit ad hepatis, & fiat chymus corruptus. ait Auic. nō excedit tres dies ut plurimum, scitur autem, quod est ephemera, quia pulsus est similis sano.

Signa buis febris sunt eructatio fumosa acetosa, scetida, grauitas stomachi inflatio, appetitus deiectionis, nauſea si fumosa erit, ait Conſt. sitis, ardor, morfus cordis, æstusio fumosa, oculi, & facies cubent si acetosa; ructus acetosus, inflatio, & rugitus maior, urina eruda, subtilis, aquosa, deinde turbida, pulsus paruus, non multum frequens.

Cura respicit causam, difficiam febrilem, & accidentia. aer sit frigidus ait Alm. si est fumosa, viter solem, laborem, iram, cibum, coctum, donec purificatus fuerit stomachus. locus sit odorifer. si cum fluxu euacuatum sit abunde, ait Gal. 8. meth. balnea, ut reliquæ, quæ sunt in omnis resoluuntur; & ciba. in declinatione. si euacuatio fuerit superflua, ciba, siue balnea, & unge uentrem cum oleo ab sinthii facto in duplici uase. & si morfus est in uentre, superponit multoties filtrum infusum in dicto oleo, in acetosameliis est oleum nardinum, in fumosa, oleum citoniorum, flores uitæ, & hipoquissidos in forma ceroti. hæc confirmat Haly. ait quidem Auic. fiat uenter, si materia fluens est causa, donet ructus sint sui. deinde fac balneum, & ciba. si uerò non fluat uenter, tange corpus, & uide grauedinem, unde fit, si in alta parte, da diatnon pipereon. deinde samenta cum de coc. diſcis. si in infima, sint clyſteria, & suppositoſia non acuta si uentris est morfus clyſte-

riza cum oleo fabino, adipe anseris, uel gallinæ uel capræ. si status addit cum oleo rutaceo, & decocto seminis cumini, apij, fœniculi: si uentura fuerit cum aqua mellis, & pauco oleo: si corruptio in stomacho pſeueret, uome, deinde ciba & omittit styptica. Rasin diuis. somous sig. loogus, cibos sit leuis, booi succi, & permittit styptica. si nimio fluat oenter, ait Aui. quo ad causam ait Alm. solue com foc co fructum nec expectes, q febris decedat. In fumosa. idem Aui. Raf. indiuis. pbleboro ma, si rubedo est magna, sed ait Aui. in declinatione, si magna sit necessitas.

Si ephemera fiat ex materia in stomacho coepta, adest naosea, tremor labij inferioris, grauitas in stomacho, aliquando inuadario in ipso. cura est similis superiori. cum calida oomat, & oxia. ait Guil. si ooo pôt oomere, expelle per inferiora cum clystere acuto, ait Alm. uel solutio ppharmaco. cum mundus fuerit. si ut neq; nausea, ructus fumosus, mordicatio, & grauitas oon angat, balneum fiat, & ciba.

Si ephimera fiat a phleboromia, cura cõpletur cum extioctiuis ebullitionis, & fumosissimatis cholere quæ si multa fuerit, educe cū aqua fructuum. s. thamarindorum, prunorum, cas sic, & id generis.

Si fiat à fluxu ventris, uel uomitu: aer sit paru calidus. letus sit, dormiat, & quiescat, ooo surgat ad fellam. cibi pauci, boni succi.

Si ex sudore accidat, cohibe, oon abstergendo ipsum, auerte odo, permittendo ægrom de loco, ad locum, ungeodo cum stringentibus:

Si fiat ex coitu, cura est ut dictum est pro prio cap.

Si fiat ex medicina solutiuâ, uel uomitione edu. si causa est frigus, aperi poros. si calor me dicinæ, extiogue.

De Febre Hectica.

Febris hectica ait Aui. est calor extraneus acceosus in substantia cordis, & membrorū innatam consumens humiditatem. & ait A oeruo est morbus calidus, & siccus sine materia. diuiditur autem in tres species, quæ potius debent dici modi distincti penes tres gradus consumptionis. qui distinguuntur penes consumptionem quatuor hum. ex prima humiditate ait serap. potius accenditur febris putrida q̃a Prima humiditas sapit moltum oaturam ho morale. Gal. 7. meth. quatuor distinguit species siccitatis. prima sit io substantia membrorū solidorum spermaticorum, secio in substantia carniformi. ter, est coconsumptio humiditatis diffemioatæ per poros membrorum in modum toris, quarta sit ex consumptione humi

ditatis existens in capribus uenarum parmarum. Isaac facit quatuor species hectiæ adaptans eas quatuor humiditatis secundis: unam penes glueo. secunda penes canabium. tertia penes rorem. quarta proes humiditatem, quæ est sine nomioe. ait Raf. t. 6. con. uia est deficcata, alia coosumptiuâ, & tertia arefactiuâ. prima igitur species hectiæ sicce est quando oondum accidit coosumptio io humiditate coinuata cordis, & substantifica, glutine. s. & cambio, nec in parte, oec in toto; sed io parte in primis duabus humidit. sanguinea, & rorida. quia oon sunt coiooatæ, & substantificæ, sed ex harum calefactione potest calefieri glueo, & cambium ebulare, & consumi. Secunda species est, quando coosumitur io parte humiditatis coinnata, quæ est cambium. quo immediate uotriuntur particule, quæ est uerus cibus. ter. quando caliditas consumpserit omnes liquores cordis, & sit, ut consumat substantiam. i. substantificam humiditatem membrorum, quæ est gluten conseruarium substantiæ eorum. Primus modus hectiæ dicitur ueluti principij. secundus augmentom, i. secunda species, tertius status. i. tertia species. inquit Sera. hectica febris diuiditur io duas species: oon sequitur ex aduotione: caloris, altera sit senibus absque febre, quando exinguitur caliditas per resolutionem, quæ dicitur à Filagiro fenestra.

Signa hectiæ notantur undecim. primū signum si post omoes horas inspectas dederis cibum, & post cibum per oam, oel duos horas angetur calor ait Galen. in l. de bile. quadoque ait Raf. t. 6. coo. assumptio cibo sit quædam species febris io uenis stomachi, & est caliditas superabundans in eo, quæ declinat cum declinatione uehementis nutrimento, sed hectica perseuerat. post cibum additur calor io hectica; quando ooo habet materiam causam ad inducendam talem inuolutionem inuolutionis, sicut putridæ habent febris: & ait Zoar. additur strictura anbelitus cum calore dicto, & pulsus sit magnos. Serap. & Isaac iudicant tooc hecticam esse secundæ speciei, cum calor post cibum est. ait Galen. quod omnis arida caliditas, o calz irrorata humido promptiore, & maiorem caliditatem ostendit.

Secūdum signum est, ait Gal. Ani. & Raf. arteriæ sunt calidiores, & locus cordis, quæ aliæ partes corporis, & magis patet si facies balocum rerum apertionem brachia, ubi est pulsus: quia calor magis manifestus fiat. causa est, quia calor hectiæ maior est io corde, & arterijs, quam in alijs locis. io febre patrida est multitudo uaporum, qui expanduntur fere per totum corpus, ita quod ubique calor

lor in corpore occurrit tactui cum multitudine uaporum.

Tertium est quod ablato augmento caloris, qui fit post cibum, calor heclicæ semper equalis permanet, ut ait Galen. in libro de tabe.

Quartum calor multus non sentitur à tactu, uelut in putridis, in quibus flamma uidetur tactui ob multitudinem uaporum.

Quintum calor est imbecillis, & parvus in prima specie, in secunda magis, & in tertia magis, quam in secunda. tamen si diutius tangendo persistis, calor est mordax, & maxime in marasmo: quia fundatus est in substantia grossa.

Sextum ait Galen. in l. de mala compl. diuer. æger non sentit febrem, imo uidetur si bilee habere, quando talis calor factus est & habitus.

Septimum ait Raf. urina est oleaginea, quia si in ea sit oleum, & egestio unctio, & pinguis, & quidam aiunt, quandoque habet resolutiones similes petaloidibus, & quandoque ad modum farri fracti, quandoque in substantia tenuis, & quandoque spissa, quandoque abscolor, in pluribus est spissa superius, & subrussa inferius tenuis in superficie manu opposita, liuida, pinguedo enim ait Guil. dissoluitur à pectore, & quandoque est similis sanis, & maxime circa principium, & medium.

Octauum pulsus ait zoar, est durus ob siccitatem, & Auicem. parvus, frequens, & debilis.

Nonum ait Rabi, digitus calefiunt ob modicam carnem, & quia est in membris radialis collocatus calor.

Decimum plurimum est tossis sicca, & quidamque humida, & ob rursim, & siccitatem, quandoque æger spuit sanguinem, quia aliqua uenula frangitur.

Vndecimum quandoque dolor est pungitior in sinistra spatula ob colligantiam, quia habet com spiritibus, & ob ascensum aliquis feruidi uaporis & aliquando genarum rubedo, & frons cal. hæc Ferru. unde ait Guil. calor est plumbeus, & liuidus ob spirituum, & sanguinis paucitatem, aliquando parum citius ut in cholericis, quibus heclica succedit post cholicas.

Inquit Iudens si febris remanet uno septe non tepida in eodem statu est heclica: si duobus sepiam dominata est. si per tres, confirmata est & Raf. decimo ad Alm. ait, si in eodem statu calor non augetur, nec accidentia illa aliarum febrium infestauerint putridarum.

Signa specialia primæ speciei sunt, ait Galen. & Auicem. si epiphora transiit duodecim horas absque declinatione, imo continuatur usque ad tres dies, & foris ad manum medica est heclica: & addit Serap. color fit niger, & extenuatio, & citrinitas, & addit Guil. urina pinguis absque renum dolore & caliditate.

Secundæ speciei signa ait Isaac, & Sera. quod si uerum dictis signis post cibum æger sentiat augmentum caloris, & addit Alm. facies extenuata & oculi concaui, caro diminuta, & cutis exsiccata, idem Haly. Auer. & Auic.

Tertiæ speciei signa ait Gal. Auic. & Isaac sunt, quod magis profunda uerit oculi, fit lipitudo sicca, supercilia grauiora, oculus somnolentus clausus absque somno, cutis ait Galen. arida, puluerulenta, aures ait Raf. minorantur, plana sunt tempora, & Auer. palpebre citrini coloris, & Gal. deperditio carnis omnino, uenter adheret dorso, pellis, Auer. mirach rugosa, & sicca, pulsus, ut Auerro. uelut eborda tenus, uelos, & debilis, pili uidentur oblongati, pediculi oriuntur Auic. Si heclica facta fuerit ab aliquo membro læso, semper lætio membri palam erit tibi. Alm. cum capilli cadunt, & uenter soluitur, mors est propinqua, & quandoque tibi instantur, ut plurimum moritur infra tres dies, ait Ger.

Curatio heclicæ febris.

Febris heclica ait Auer. est mala complexio calida & sicca absque materia. quare una est curatio in intentione. alterando, quæ est in frigida & humectare, & quia heclica quandoque sequuntur mala accidentia, alia est intentio, quæ est eorum correctio in frigida & humectata, ait Gal. modificanda sunt quia calor naturalis est debilis, & corpus fragile. in frigida ait Auic. non desiccant, ut trochisci de caphora nec calefaciant, ut nimum quid nocent. & in frigida sunt non proportionata calore febrili, sed temeraria. sed loco gradus fortis adde ad quantitatem, uel reuera per multas uices. humectata sunt in gradu proportionata: quia non uehementis inuestitionis, & si non sunt in gradu, adde ad quantitatem uel reuera, quare recte ait Auer. 7. collig. plus in hac febre indigemus humectatione quam in frigida. Fugiat igitur aer frigidum, ait Auic. non sit in cubiculo ignis, nec fumus, & Gal. multi hominum, quia aer calefaciat, hyeme uero si necesse fuerit fiat ignis & ligas ualde siccis, addit Gui. nocet et aer siccus motuosus, mora ad ignem, solem & uentum, & autum maxime nocet heclicis. animi accidentia, & exiccant, sugia, ut ira, motu corporeo, nisi lenium, frigidum siccum, balneum

Ccc calidum

calidum, uigilias, calidos cibos, & siccos, & qui inflammantur, & conuertuntur in humores acutos, item siccos, & frigidos ualde: item potus tales. hæc Haly, & Rasis fuge amara, falſa, & acuta, duræ digestionis, tardæ penetrationis, ut uiscosa. fuge quæ habent superfluitates, acetosa, fixa, vetusta, mel ait Galen. est fugiendum maxime, & omnia dulcia, acetum, nisi mixtum ad infrigidationem cum multa aqua, frigida aqua multum est inimica, fugiat ieiunium, famem, & sitim, omnem immoderatam euacuationem, & præsertim coitum. nocet ait Aulicæ, multus cibus, & potus una uice datus. ser sit temperatus, & æstare locus tetrenus, uel uersus aquilonem, uel stratus folijs, & floribus odoriferis, frigidis ad aerem temperandam. byeme ignis monet catarrhos, exiccat, quare meliora sunt nescimentum, gaudeat cum amicis. non dormiat cum plumis. comedat succum pitæne frigidum & panem optime custoditum insolum in aqua frigida, aquam hordei, & hordeum dat Auicenna, alij micam panis coctam in lacte amigdalârû, uel inte pullorum cum zucharo, & penidiis. Isaac. panis bis locus cum aqua frigida. & infusus in uino albo leui, lymphato alij mixtum cum lacte amigdalârû & zucharo si fluat uenter: alij olera frigida, & humida, alij cerasa, pruna, cocune. & id generis: alij pisces fluuiorum, & caneros, testudines, limacias, ranas, lac, caseum recentem non salitum. Auicenna oua forbilis in aqua decocta: alij carnes hedi, agni, fasciani, perdicis, pullorum, auisrum paruarum, si uictus sit fortis. Galen. testes in lacte decoctos Auerro, pullos & capones nutritos ex frumento, & amido: alij agrestem non acetbam, uel succum granarorum dulcium, uel mazorum. uel arautia matura, quando eis admiscuerit species quæ R. cardamomi vncî, vna liquiri, cinamo. ana vnc. 2. croci dragm. 2. Auicenna in potu dat aquam hordei cum zucharo decoctâ, & inlep Galen. uinum parum ponticum, aquosum, album, aromaticum. Et Galen. pluries in die ciba, & Auerro. & ad minus ter. in digerendo non des potum, ait Galen. sed post digestionem, da copiose, quia distribuitur quam cito cibus. aquam frigidam paulatim assumptam in corporibus nondum siccis dat Gale. Alm. & Isaac.

Lac hæcticis maxime est utile præsertim humanum, deinde asinum: quia ait Gal. minime caſeat, & cito penetrat ad omnia membra, sed inquit Alman. lac non caſeat, si parum zuchari tribuatur, sal etiam

idem efficit. post lac asinum est lac caprinum, ait Alman. Auicenna, & Auerro. eradicat enim hæcticam lac asine, nisi addit putredo, & eradicatio sit possibilis. quartum locum tenet lac uaccinum, à quo extractum sirtutyrum. Guiljel. sit stomachus mundus, & detur lac cum zucharo, nisi sugatur proprio ore. al. sit robullum, iuuenis, & moderatum exercitium ficiat. inquit Galen. septimo met. nutriatur asina herbis frigidis. & humidis ait Serapio. ex aqua dulci Auerro. dat stomacho ieiuno, & debili vncî unâ primo die, & postea ange paulatim usque ad medium rotulum idest medium libram. Isaac dat vncî. 2. lactis, uaccini si corpus careat multa nutritione in primo die, demum usque ad quatuor. dandum est lac ait Alman. si corpus macrum, & siccum fuerit ualde. unde non conuenit primæ speciei. Auicenna & Serapio. dant à principio ad finem. & Auicenna inquit si pntrescit in stomacho, solue leuiter, & abline à lacte. Signa corruptionis sunt scilicet calor accensio, anhelitus maior, pulsus frequentior arctatus, vrina coloratior, & acutior, sine intensior, ait Isaac. si nentris solutio accidat: extingue lapidem, uel calybem bis, uel ter in lacte.

Si hæctica ait Galen. decimo met. cum putredine, aut heryſipilate aliqua fnerit, non facias balneum: sin minus, nudaſter fac, & præsertim in marasmo. addit Auicenna & ubi cibus indigestus sit, & Rog. si cum temmate sit. balneum aquæ frigide ualde competet primæ speciei, nisi debilis esset intus, sed balneum prius fiat in calida deinde nisi dubium addit, submergatur statim in frigida. quia est ultimum in cura: aut gradatim à calida ad minus calidam deueni usque ad frigidam. & melior aqua ait Auicenna. est decoctum rerum infrigidantium, & humectantium, ut folia cucur. ait Serapio, hordeum, uiol. nenuph. & huiusmodi. & Alman. misce lac cum aqua, nisi toleret asperſionem lactis super caput. & Rog. coque in aqua balnei pedes, & capia arietis. & Platte. misce ouorum albumen, & vitellos cû ea. calor aquæ ait Haly sit foris. absterge postea cum spongia, deinde unge oleo, ait Serapio. violata nenuphati. cum cera alba collata: humectant enim & conseruant humiditatem aquæ. nel Rec. oleorum frigidorum, & humidorum q. bulliant in eis, medulla cancrorum fluuiatium, carnes limaciæ, testudinum, & ranarum ad consumptionem tertiz part. olei. cola fortiter, & unge spinam. mox autem sit in balneo donec caro humida appareat, ait Gal.

Galen. donec ait Isaac membra rubicunda & inflammata sint, pinguescit enim corpus, & augetur caro. Haly, parum stet in concha. & Auicen. separaretur uelociter, ingreditur balneum ait Gale. in l. de tabe, digesto cibo. idem Auic. ait. Serapio. autem fedeat in balneo post hac uice una, & post cibum. scilicet digestum alium. Haly. bis in die balneabis, & Auicen. ter, si uirtus est fortis.

Curatio heclicæ simplicis per potionem, non cum putrida aliquando uertitur ad causam introducentem, uel consumentem, aliquando ad discretam febrilem, aliquando ad membrum, à quo haber originem, aliquando ad dispositiones corporis secum complicatas, & tandem ad accidentia corrigenda. frigida igitur, & humida deatur ait Auicen. in principio trochif. de campho. cum uel lep acetoso, in aurora aquam hordei cum canis. & ad uesperam mucilag. psylli, nisi timeas de frigidityte stomachi. aqua hordei sit vnc. vi. cum trochif. in frigidantibus, Haly dat aquam hordei cum zucchero, & postea non iam uleper, aut syrupum de papauere, uel de ruiubis vnc. 2. cum frig. Rog. dat syrupum restauratum de testudinibus. Ferr. syrupum cucurbi. cum diapapauere. Guil. restauratum de carne, & lacte. Gilib. electuarium de testudine nemoralium cum colatna & syrupo de iure testudinum, qui maxime impinguar. sed quia laxat, adde stiptica grata. uultu gallinas cum brodio, cum quo decoctæ sint decem uel duodecim. ranae fontem, item stillatum ex his: multum enim impinguant & cancri fluuiales cocti cum sumach comesti.

Ad altera ait Alm. panni in aqua rosacea infusi in niue infrigidata cum camphora, & spodio ponantur supra pectus, postquam cibis descenderit, & antequam comedat, & tepesfacti fuerint, permittantur. Haly ponit pannum infusum aqua ros. & sand. aut in ceroto ex aqua rosata, succo portulacæ, cucurbitæ, semperuiuz, oleo rosaceo, & uiolato. Auicen. magis laudat vñdiones cum oleo de cucurbitis, papau. nenupharino, fasilicibus, & uiolis. ung. optimum R. assungie, gallinæ, medollæ crurii utriusq. buthiri, recentis sine sale, medullæ ceruine, sepi hircini ana un. 5. assungie anatis, serpentis cocti ana un. 3. macill. psylli. sem. citoniorum ana vnc. 1. draga. gumi arab. ana vnc. 1. olei uiol. amigd. dulci ana un. 1. s. ceræ citrinæ q. s. ut sit bene fluxibile, & cum eo tepido inunge pectus ante, & retro. Guil. ponit centum uittellos ouorum in uase, in quo pger sedeat, & eos per anum su-

gat. est ultimum ad spasum de inanitione.

Si febris putrida coningatur, uel materia putrescat, Isaac expellit cum mundificantibus absque caliditate & siccitate ut est succus lupul. zucchero rosluiubis, manna, & calia, zucchero uiolato.

De Hætica senectutis.

Hætica senectutis, ait Auicen. quarta primi est hætica febris 3 quæ plurimum accidit senibus, & dicitur senecta. dicitur etiam hæc proprie marasmus, & tabes, quæ ait Galen. de Tabe. corruptio corporis uiuentis ex siccitate. Haly. marcor. est duplex ait Galea. de differen. naturalis, & accidentalis, naturalis peruenit ex actione caloris naturalis in humidum radicale, accidit decrepitis, & non est proprie ægrotudo. accidentalis, quæ pueris accidit & aliis: quæ est composita uel simplex. & hæc scilicet simplex ex sola siccitate fit cum temperantia actiuorum. composita est duplex: una est siccitas, & caliditas, siue illa caliditas fit febris ut tertiz speciei hætica, uel febris putridæ liquefactiue: siue non sit febris, sed mala complexio calida, alia siccitas & frigi. quæ proprie dicitur hætica senectutis. & eius fundamentum prius est in corde quam in aliis membris. Rab. in tertia par. cuius cor est siccum cum siccitate incompleta, prouenit cito ad senectutem. tamen uiuit aliquibus annis: cui est cum siccitate completa uenit ad phthisim id est consumptionem, uel tabem. accidentalis ait Serap. oritur ex multitudine morborum præcedentium, aut dolorum, sit etiam ex frigore dominante cum debilitate corporis, aut ex potu aquæ frigide in hora non apta: & ex dimissione exercitii, aut ex malis uaporibus frigidis eleuatis ad cor, qui infrigidant eius complexiorem, aut ex caliditate, quæ resoluit, & liquefacit humiditates, aut ex superfluitatibus, & id generis.

Signa ait Galen. de tabe, pulsus paruus, & rarus, anhelitus frigidus, & rarus, pectus frigidum totum, & urina ait Isaac, cruda, alba, & subtilis, ructus, Rog. & Gilibace-rosus, & nulla sitis.

Hæc siccitas confirmata, in corde, cito inducit ad mortem, deinde quæ in hepate potest quæ in stomacho. consumptio, quæ oritur ab aliis est tardior, & leuior, cuius ait Galeno septimo method. & Auiceni: est humectatio, & calefactio. fugiat igitur omnia infrigidantia, & exicantia

tia balneum, ait Auicenn. competit. cibi calidi, & humid, facili digestionis, pauca quantitas & multi nutrimenti, facili descensus, & cito penetrationis, cum pauca viscositate vium subtile, odoriferum, pauca quantitas. lac muliebre, asinum ex vberibus tractum, mel est vile, & uinum in frigida tabe. ait Serap. carnes pullorum, & oua. odores gratos calidos. Auicenn. lac delectum cum lapidibus est ualde utile, & mel est ultimum in iuramento. si debilitetur, ait Serap. da thiriacam, mitridarum, uel diamuscum in potu, & liac. syrupum de zingib. Const. corroborat hepat cum signo aloec. xinz. galanga pipere longo, cinnamomo, gariofilis, spica, & huiusmodi super cibaria. Galen. 7. meth. in unge mentem cum oleo nardino, ita ut sit semper unctus. uel masticum uel opobalsamum. adde ceram si uis, ut adhæreat magis, uel si frigus sit unge cum lana infusa, & melior est lana succida. & unge stomachum cum dictis oleis, & sepe excita appetitum cum dando in potu mel rosatum cum uino albo decoctionis ciperi, radicum capparis, & acri. si superfinitates in stomacho apparent, vomere uel cum lenitate educ. intestina præhume, & impingua. Clystere ait Serap. fiat ex decocto pedum, & caprum agnorum chamemillæ, hoi dei, tritici, anethi cum oleo sesamio, & huius, & caliquando oleo de been. idque tribus diebus, & post aliquos dies, iteremus. balneum ait Serap. sit decoctum chamæ. samplici, liliorum, & id generis.

De febre putrida.

FEBRIS putrida dicitur à sobiecto proprio putrido, uel à putredine sui sobiecti. causa coniuncta est duplex altera instrumentalis, & immediata, non tamen per se. & is est uapor putridus, qui per se non est causa febris putridæ, sed in uirtute humiditatis putridæ, à qua eleuatur. alia est coniuncta per se, & est humor putridus. & secundum quoddam uarietur est humor, uariatur febris, & eius curatio, & eo remoto, remouetur febris. unde ad esse febris putridæ semper est necessarius humor putridus, non multitudo humoris non putridi quia sterici febrifera, quibus multitudo cholera est in toto corpore. dixit Auicenn. humor recipiens putrefactionem, aut est cholera talis modi, ut ab ea uaporegrediatur. qui sit subtilis, ualde fumosus: aut sanguis, ut uapor subtilis, aut phlegma, ut uapor spissus, aut mela, ut uapor fumosus, spissus,

poluuerulentus: ex his uerbis habes adesse febris putridæ non esse necessarium humorem putridum esse in corde sed sufficit, ab humore putrido esse communica tum cordi uaporem putridum, siue fuliginem putridam. notant quod in febribus putridis, nonquam tota causa antecedens transit in coniunctam cum sit morbus febris. unde non reperitur putrida febris absque utraque materia antecedente, & coniuncta. sed in aliis morbis materialibus potest reperiri corpus absque materia antecedente, ut in spasmo de repletionem, cum iam tota materia factura spasmi fluxerit, non est in corpore spasmatum materia, quæ respectu illius spasmi sit materia antecedens, licet aliquando fuerit, ut cum pars fluxerit, & pars adhuc fluit.

Diuisio febrium putridarum essentialis est diuisione sui sobiecti, quod est humor, uel res reducibilis ad humorem. & secundum hoc est aut ex sanguinis putrefactione, aut cholera. dicunt, quod humiditates in membris remanentes ex fecundis humiditatibus licet non possint esse causa materialis, nec efficiens febris, possunt esse causa dispositiua ad febrem putridam; nam cum membra defecerint ab expulsiōe, ipsarum reliquæ in ipso corpore redeunt ad interiora, & misceantur cum humoribus, qui impuri facti destituntur a natura unde putrescant, & febre generant. Alia diuisio est accidentaliter, & tribus modis, nam sumitur à modo situs humoris putridi ut febris putrida. alia est de materia collecta in uno loco, ut in apostemate, alia de sparsa; quæ aut est in uenis & arteriis, aut est in carne, & raritate membrorum. secundus modus secundum modo à modo motus ipsius, quando alia est continua, quam greci sinocham appellant: alia interpollata. & continua est, quando humor putridam febrem generans est intra uenas, nam synchæ sunt à materiis, quæ intra uenas commisceantur, ait Alexan. sanguini & putrescunt. Haly ait intra uenas, & arterias. febris est materia collecta, dum est uno loco, ut apostematate, uel alicuius membri raritate, ut pectoris: quædam sparsa, quæ est in uno loco quandoque facit febrem continuam, quod est quando materia est collecta in aliquo membro nobili interiori, aut quando est ualde multa, quique non in membro aliquo interiori, & præcipue quando propinquum fuerit cordi, aut membro multarum articularum. & tunc est interpollata quia

quia est collecta in membro exteriori non magno, nec cordi propinquo, & quando materia nou est multa, & est in membro aliquo interiori à corde remoto, sicut si esset materia collecta in renibus, matrice, uel recto intestino fieret febris interp. ut tertiaræ, quarantæ, quinquag. & mixtæ. ex apostemate interiori, ut plurimum sit febris continua præsertim ex materia calida ex frig. interpol. & apostema magnum multa materia replente, & extendente dolorosum, item ex materia subtili faciunt continuatam, ex grossa Inter. item quando suppuratur facit continuam. quando non, uulnam, uel Inter. item apostema in membro magno sensus, uel in membro cordi uicino, uel quod cum corde habeat colligantiam facit ut plurimum continuam. ex dictis habes, quod omnis febris interpolata est putrida. sed non omnis continua est putrida. & ex continuis. frequentius fit interpolata quam contra. putridam quædam sunt cum symptomatibus, & quædam sine, quæ rarissime sunt. quæ cum symptomatibus & præsertim multis, ac fortibus, laboriose dicuntur: quæ non, non.

Causa continuitatis februm, ait Avicenna, est hæc. cum accidit putredo in uenis, difficile resoluitur. hæc putredo ob duas causas. primo ob continuitatem, quæ est in quibusdam uenis cum aliis, & putrescit omnes res, quæ est ei uiciua, aut parata est putrescere, & ex uno uicino reducit ad aliud. secunda est, quia illud, quod est comprehensum in uenis, est maioris continuitatis ad cor. has causas coadiuuant alie, è quibus est, quod uapores, & fumi capiuntur in febre continua (sunt positi in profundo corporis. unde difficiliter fit eorum dissolutio, & de eis est soliditas, & densitas corporis uenarum, in quibus contiuentur, prohibens facilitatem resolutionis eorum. & de eis est ipsorum multitudo, quam uirtus non potest perfecte resolvere. quare remanet continuitatem faciunt febris, donec causa ebullitionis, uel putredo fuerit totaliter, uel ut plurimum sublata. & de eis est opilatio foris: quia humores non fluunt, si ne euaporant, quidam reducant causas continuz febris ad quatuor. scilicet continuam in uenis putrefactionem fumorum, coactionem respirationis, prohibitionem, & directionem ipsorum ad cor ascensionem.

Causa interp. februm est similis causæ fluxus rheumatici periodicæ confluenti ad aliquod membrum. hæc causa, scilicet Inter. consideratur in duobus scilicet in eradicatione paroxysmi, & in reditu cuius secun-

dum plurimum. causa eradicationis est completa resolutio uaporum, qui ascendeant ad cor aut humores in corde retentorum, qui resoluti remanent, sicut è lignis uilis ciuis, non ciuis quidem ut lignum ustorum, sed plus, & minus cineri similes sunt, prout plus, & minus grossissimi, uel terrestre-ritatis, uel acritatis, & subtilitatis participauerit humor, quo incinerat cessat color febrilis. causa autem completæ resolutionis uaporum, in interpolatis est, quia materiam qua surgebant, non habet continuitatem cum alia materia, quæ per eam disponderetur ad ebullitionem, & putrefactionem, antequam ipsa incineretur, & cesset ab ea uaporum eleuatio, sed eleuatorum sit prius completa uaporatio. hanc tamen coadiuuant alie, quæ sunt locatio uaporum in extrinsecis, & locis porosis, raris, unde facile resoluntur, & uaporum ipsorum paucitas, quam potest complere uirtus, & finire consumit uerò calor putredinalis. materia, quæ prius erat in uenis, postquam acquisiuit in eis dispositiones propinquas, & præuias ad putrefactionem, expellitur à uirtute expulsiua uenarum, quæ non possunt sustinere molestias. Habet interpositionem circuitus, & typus, quia humor quædam putrescere oportet, non putrescit simul, & semel. quod est, quia putrefactionis præparatio in ea non est completa, sed paulatim eo procedit. & addit Auer. putrefactio, quæ in humore, quia extra uenas existit, sit, est eius, quæ in humore, qui intra uenas, est contraria propter uaporationem, quæ fit per porositatem membrorum. unde sumitur in his circuitus, & eradicatione febris, non solum sit per insensibilem euaporationem, sed per sensibilem, euacuationem materię. dixit Galen. interpola quatuor sunt cause, scilicet fluxus materię ad locum putrefactionis paulatim, & intermissus, secunda est libera fumorum exhalatio tertia est remotio materię à corde secundum directionem, & non localem distantiam. quarta est impedita fumorum respiratio ad cor.

Causæ periodicationis februm, ait Galen. in lib. 2. de differ. Feb. sunt duæ, scilicet de fluxu humorum in aliquem locum, siue membrum, & congestio materię ibi, quoniam materia aduata in membro est causa motus paroxysmi morbi. causæ congestionis sunt uirtutes naturales unni fortes, & ordinatæ a natura, uelut si attractiua attrahat plus quam sit uicelle, & eo tempore quo uouidum erat opportunitas, & præter has potest membrorum, quæ

irrigant superfluitates sunt sani. secunda causa congelationis est duplex, scilicet caliditas addita particulæ adiuuat apertio meatuum siue canaliculorum particulæ, in qua est caliditas, & resolutio humorum circumstantium, & illarum subtilitatio sequentes ad illam caliditatem unde habitantur ad fluxum. superflua etiam caliditas debilitat particulam, & dolere facit unde disponitur ad recipiendum influit enim humor in his, quæ dolent, & dolor est secunda causa. dolor exacuit materiam, ut fluere faciat ad locum dolentem. ait Galen. decimo tertio. method. & causa est quoniam uirtus expulsiua non efficit operationem suam nisi quando aliquod sensit nocumentum, unde cum dolor est in membro, & sensus rei cognoscantis mouetur ad expellendam illam rem. & si facile non potest, conatur, & hinc sequuntur motus spirituum & sanguinis, humorum propter expressionem suam. adiuuant membra uicina compactione, quorum motus expulsiua sumit. quando autem materia adiuuata fuerit, non putrescit semper, nam si multa est, uel maligna uel ambo simul ledit: quoniam uirtus caloris non potest ei dominari, unde derelicta necesse est, ut putrescat, & postea morbus, & si attingat morbum illum cessare, & per causas dictas iterum materiam ibi currere, redit morbus. Cause reditus paroxysmi febris sunt. duæ scilicet una est, remansio reliquiarum caliditatis febrilis in loco minere. Primæ putredinis, quæ caliditas est causa, qui denuo alia materia moueatur ad locum mineræ illius, quæ ibi putrescit, & febrem facit, & præter hoc, ut quidam uolunt, remanet qualitas uelori quartanæ excitandæ siue præparandæ in quartanam. sec. est inuentio causarum putredinis, quæ fuerint in materia primi paroxysmi: ipsi. n. stantibus necesse est aliam materiam putrescere, & paroxysmum redire. sed si nulla ibi cellitas in nascitur particulæ, nec currunt inperfluitates, quiescit morbus ille. finita eius superfluitate per euacuationem eius uel incinerationem: quia non sunt ibi causæ re aggregationis materię, nec p. uia congelationis, nec defluxus: nam membrum ueluti hepar, siue eius uirtus, & mala complexio eum malo regimine est causa, qui generet humorem malum paratum putrescere.

In die interpolationis corpus non dicitur sanum, sed ægrum, considerata mala dispositione membrorum, in qua remanet corpus in tempore interpolationis. per quam maxime sensibiliter leduntur operationes aliquorum membrorum, per quorum lesionem alia materia aggregatur, & ad locum minerę pu-

tredinis expellitur.

Dixit Galen. in con. apho. febris illa, quæ de se corpus mundificat, non est molesta: quæ non, est molesta. & Ras. t. 6. conu. febris si tepescens fuerit, salubris erit. si non, sal. lax. & deteriores febres, ait Auic. sunt inseparabiles, in quibus putredo est intra uenas: deinde, quæ eradicator, quarum putredo est in toto corpore sparsa, aut in pluribus corporis partibus. febres continuæ sunt interpollatis deteriores, ob continuam afflictionem, & quia sunt cum senioribus accidentibus, & magis prostratione uirtutis. ait Ras. t. 6. con. in febris, in quibus corpus separatim cum ultima prauitate non erit fallacia, licet paroxysmi illarum fuerint cum ultima uolentia, & prolixitate: quoniam huiusmodi febres non sunt cum apostemate, nec cum purredine maligna humorum nam à febre, quæ accidit cum altero horum duorum, non separatur corpus cum paritate bona, febrium continuarum alie sunt nere continue, alie noue quibus ait Auic. quod inque componuntur quædam febres putridæ interpolari. sed tali compositione, quæ fiat in forma febris in separabilis, & illud est nerbigratia quando incipit aliquis humor putrescere in loco, deinde incipit alius de genere sui, aut de alio, & obuiat secundus paroxysmus tempore declinationis primi paroxysmi. deinde continuatur res, febris autem continua multifariam diuiditur: nam alia reseruat materiam suam ad unicam expulsiuonem, non quod tota omnino euacuatur, sed maior pars, & maxime gravior & subtilis in declinatione sensibiliter, uel insensibiliter euacuata, & ut plurimum hæc febris terminatur in nona septimana, alia non reseruat, hæc est longa, & plures facit crises, aut per euacuationem, aut diminutionem, aut reuam perfecte finitur, & hæc difficilis iudicari. alia diuisio febrium. alie sunt netz synochæ, quorum uniuersum tempus est unum à principio usque ad finem, & hæc uniformiter mouentur, nec habent excrecentias: alie quæ uiuocæ, quia plures habent circuitus. primæ dicuntur conclusæ uerę, & proprię, & sunt sanguineæ, quia sanguini non inest motus periodicationis, sed inlum uniformiter mouentur: causa est putredo in uenis propinquis cordi, ut in ea quæ ab hepate ad cor est, in ea quæ est in corde & pulmone, alie sunt uerę, sed non proprię, & hæc habent excrecentias occultas in cæphlegmatica, uel melancholica. sed conclusæ non dicuntur sanguineæ, & cholericæ dictæ canison. conclusæ nere, & proprię tres sunt species, sagmaticus, pagmaticus, & omorenus, uniformiter a principio ad finem uergetur, secunda uniformiter minuitur. stat in suo esse, & uere

con-

conclufum alia est aduftina incenfua, & hæc eft caufa, quæ facta eft aut ex humore cholerico putrido, aut non putrido, fed vfto, & incenfo, quæ eft vehementis incendij, cito liquefaciens, & confumens corpus, vnde liquefactua dicitur, & arfina à Gal. quæ vt plurimum eft mortalis, alia non eft arfina, nec incenfua valde, & eft fanguinea. febres æquiuocæ continuæ quædam exacerbantur per tertium, & dicuntur tertianæ, quædam omnino dir. & febris fanguinea, in eo quod fanguinea non habet excrefcencia, fed in eo quod aliqua pars subtilis fanguinis connectitur in cholera, & fit febris de tertio, in tertium. fed pars fang. groffa non fit melancolia, imo cholera. Alia diuifio. Febris alla acuta, alia non acuta, fed chronica. acuta dicitur morbus ratione quantitatis, vel qualitaris, aut fitus. quæritatis, vt quia materia fit multa, & fit lynchæ inflatua dicitur morbus acutus. qualitatit, vt quia materia eius fit vehementer calida, vt cholerica. fitus vt in fquinaria in materia fituata in epigloti. morbus morbus dicitur acutus tripliciter, fcilicet ratione fuz effentia, vt quia fit febris multæ caliditatis, vt febris tertiana, continua, caufa, & lynchæ. ratione quantitatis, vt morbus grandis. ratione nobilitatis morbi in quo eft, & fecundum hunc modum fyncopis, & appoplexia, & fpaſmus dicuntur acuti. ratione accidentiũ, quando feua fequuntur accidentia, vt dolor fortis, & quandoque vna tantum, quandoque duæ, quandoque tres concurrunt, vt in charabito, qui eft morbus acutus ratione caufæ, morbi, & accidentiũ. non acutus eft oppofitus acuto in caufis febribus. aut acuta propter prædictas conditiones poſtulat, quod fit breuis terminationis, & cito deueniat ad flatum ob fnam magnitudinem, quam natura tolerare non poteſt, & non ex virtutis debilitate. vel alia caufa, hæcica tertie ſpeciei licet ex virtutis debilitate cito terminat ad mortem, non tamen eft nec dicitur febris acuta ob conditiones dictas. Februm acutum, alię ſunt acutę absolute, quæ in 14. diebus iudicantur: quædam non acutę absolute poſſunt in 7. diebus iudicari, fi valde ſint acutę, & ante quandoque, vt in 4. & 3. & dicuntur peracutę. acutę absolute acutę plus, & minus iudicantur ex varia aeris diſpoſitione, tempore anni, & regionem in caliditate maiori, vel minori. vnde Auer. 2. collig. morbi qui ſunt acuti in tertis Hipp. exiſtunt in noſtris peracutę. illa febris, quæ tranſcendit 14. diem, non dicitur acuta absolute, ſed quodammodo, quam ad 20. & hæc ſapientatur acutę, quia debilitatur virtus. acuta absolute eft ordinari motus à principio vſque ad finem, non absolute: tamen incipit,

enim debiliter, deinde ſortificatur, & iterum diminuitur. acutari alia eft liquefactua, & citò conſumpua hom. corporis, alia non. liquefactua, & acuta in inmentute magis ſunt ob cholera multitudine & ſunt diſſicilia ſymptomatum, & citius ierminantur: ſenioribus, & pueris febres diuturnæ magis: quia humores eorum ſunt reſtriſtiotes. Chronica febris ait Gal. 2. de diebus crit. eſt illa, quæ incipit à principio ſui cum motu leui, & tardo, deinde prolongatur. morbi hi ait Gal. in aph. acutorum morbi. ſunt è materia inuſcata in membris, ſcilicet in loco radicis, vel mineræ morbi, & eſt tardæ digeſtionis, vt in ſple nead quartanam, & in extremis chacticis amphemerina, & chronica tum alia eſt, quæ eradicatur omnino in declinatione paroxiſmi & eſt interpolata, alia quæ reincipit flatim, & eſt continua, & locatur in numero acutorum conueſuarum. ambæ poſſunt in 40. diebus terminare.

Inquit Aui. quādo humor putreſcit extra venas, & non eſt cauſa alia, veluti materia putrida in concavitate peſtoris, vel in ventriculis cordis, vel in apoſteme danti putredinem continuam cordi, ſit febris periodica. & ſi cholera putreſcit, ſit tertiana, & quæ currit curſu eius, vt ſyncopalis minima. ſi melicolia, ſit quartana. & deinceps quintana & ſi phlegma, ſit quotidiana, & quæ currit cum ea, vt empiola, lypiria, ſyncopalis humoralis, harum ſcilicet inter alia ſunt vterque interpolatę, alie non veræ. vt harum febrium alia eſt pura, facta ab humore, alia notha, & facta à pluri-bus, quorum vnus dominatur. harum febriu alie innadunt cum typo, vt cum rigore, horripilatione, frigore, olcitatione, extenſione, ſomno, & pigritia, quædam ſine typo. prius eradicantur, ſecundæ cum harum reſolutione poſtulat ſenſibiliter per manifeſtam evacuationem, quidam inſenſibiliter per incenerationem materię, vel inſenſibilem. harum etiam quædam habent paroxiſmos ordinatos, quædam non. cauſe ordinationis paroxiſmi in ordinationis ſunt ſecundum Aui. quinque prima eſt ex parte materię, quæ diuerſa eſt in multitudine, paucitate, groſſitate, ſubtilitate, viſcolitate, & eius oppoſito, quare ex ea quandoque monetur parum, quandoque multum & quandoque ſubtile, quandoque groſſum, ſecunda ex materia, propterea illa vnus paroxiſmi diſſert à materia alterius, veluti ſi materia huini paroxiſmi eſſet cholerica, & alterius phlegmatica. tertia cauſa eſt malum regimẽ egri, vel aſtantium, vel inopia rerum. quarta eſt à virtute egri, quæ ſi debilis, non poteſt vniformiter monere materiam. quinta eſt multitudo, ſive vehementia ſenſus egri, qui

ex parua causa percipit nocuentum, unde stimulata mouet materiam. Harum paroxysmus alius brevis est, alius longus, quoniam non vna species morbi, neque eadem multitudo superfluitatum, neque similiter accendi omnes paroxysmos, neque euaporari decet: nam materia amplior, frigidior, viscosa, & grossa longiorem cit paroxysmum: contra, breuiorem virtutis robur, & raritas, breuior. & paroxysmorum alius inuadit, & inuenit finem alterius, & subintrat, vt antequam febris terminet, paroxysmus inuadit, ant antequam primus finiat, alter superuenit. sed & alij sunt coalternantes euenientes cum quiete media inter primum, & secundum. item paroxysmorum alius est festinus, alius tardus. festinus quia materia est multa, sicut phlegma, aut subtilis, vt cholera, aut virtus fortis, & sensus vehemens, & viz late. Februm interpol. alie semper anticipant inuasionem, alie postponunt, alie eadem hora inuadunt. causa prima nam est materia diuersa in grossitie, & subtilitate, que si fuerit in dispositione, quod pars subtilis incipit prius putrescere, tunc talis morbus sit semper postponendus: quia semper materia, que in postremum reseruatur, est difficilioris motus, cum sit grossior facta. idem dicendum est de materia diuersa in viscositate, frigiditate, & id generis. adiunat diuersa corporis dispositio in sensibilitate, & sensus obrusione: quando enim sensus est acutus, materia stimular naturam, vt citius expellatur, unde anticipat. item paroxysmi interpol. februm alij velociter consumuntur, alij extenduntur. item alij sunt multorum, & sequorum accidentium, alij paucorum, & mitium: & alij habent quietem longam, vt quartanarum, alij breuem, alij mediam.

Sanguis stans sub forma sang. hec conuersus, nec dedinans, ad naturam alterius humoris mouetur vniuformiter continue, nec est ei circuitus. & phlegma mouetur in diem. cholera in tertium, melancolia in quartum.

Omnis febris precedit putrefactio in materia: cum enim incipit opilatio, incipit supercalefactio, & putrefactio, & humorum eleuatio, & ipsorum retentio, à quibus saltem remissus caloris gradus accidit, dixit Hip. labores spontanei precipue labor vlcerosus manant morbos, & Ras. in superficie corporis est morbus similis mortui acui, unde ait Aui. lassitudo membrorum, & Ras. sentiunt ponderositatem membrorum sui corporis absque causa illam faciente, unde sunt tardi motus, & pigritia, patiuntur officitationem, que accedit ob vapores malos, qui communicant membrum precipue spirituum, & mandibularum. quare membra mouentur ad eos expellendos: &

præterea falsus ex iisdem vaporibus communicatus nervis. & Ras. subdit abundat in eis sputum, & macilago narium multiplicatis materijs ex indigestione, & ex vaporibus ad ipsam eleuatis. & ponderosum est caput. & somnus excitabitur, vel turbabitur: quia vapores humidus cerebro communicant. & ad sunt vigilia, quia vapores bitrosi cerebro communicant. labor erit in vigilia, & anhelitus horribilis, non boni odoris, cum amaritudine oris, & siccitate. constructio anhelitus ob vapores communicatos spiritualibus, facies inflata, & citrina ex inflammatione sanguinis in hepate, & venis, accidit etiam sudor, vomitus, vel similis enuocatio, tenso hypochondriorum ex vaporibus, vel ex vento, ex indigestione multiplicata. item pulsatio tympanum, & capitis ex materia sanguinea, & communicata: & dolor capitis ex vaporibus ascendentibus. debilitas appetitus, syncope, & debilitas corporis, & frequentia pulsus ex dictis causis. ait Ras. 16. con. cutatur hæc præparatio ad febrem cum euacuatione, & zucharo rosato: etenim rose proprie conferant huic passioni: sit enim ex humore malo incluso in corpore, & microbiali nigri conseruati, & coriandrum cum zucharo scilicet tritum qualibet die, & cuscute, & ameos, & policaria.

Cum absque causa primitiua quis febre inceptit, qui prius non febricitabat, febris est in humoribus, secundum signum, cum febris incipit à rigore, frigore, & ceteris, est in equalitas pulsus, & caloris. quod accidit à materia febris granata naturam. quartum est calor mordax, non suavis, qui mordicat sicut fumus oculos, & nares: quia calor febris putride fundatus est in subiecto magis deo, quam calor ephemere. tamen in ephemera à calore solis claudente poros facta est mordax, item calor hecticus, quantum habet multas inuasiones, tamen nec synocha, nec causam habet paroxysmum. sextum remanet semper in corpore reliquæ, siue malæ qualitates, per quas omnino non mandificatur: tamen alij volunt tertianam resolui, sed non sine sudore. septimum est vrine indigestio, ant digestio oculta. in principio putridarum non est hypostasis in vrina, & ait Anic. est vrina valde tincta, vel mordicata. octauum putride vt plurimum sunt cum siti, dolore capitis, & nigredine lingue maxime apud statum, & inquietus est eger.

Signa à quibus possumus sumi, qui humores faciunt febres humores, sunt ait Auic. prima quæ res naturales, non naturales, & præternaturales, naturales, vt etas si iuuenis, in qua dominatur cholera, indicat febrem cholericam. si adolescenti, sanguineam: si

pnerilis, uel senilis phlegmaticam, & melan-
cholicam, item si complexio ianguinea, decla-
rat sanguinem, si uir significat humorem calidum : si femina, frigidū. si habendo pinguis
phlegmaticam febrem. si carnosā ; sanguinei.
si macra, rara, cholericam. si macra denia mel-
ancholicam. Ex rebus nō naturalibus, si el-
ibi præteriti per menses, si regio, si anni tem-
pus fuerit calidum ; calidam, item considera
in his pulsū, uenam, humorem exeuntem,
appetitum, anhelitum, & consuetudinem fo-
brium, ueluti si æger solitus est affici febre ter-
tiana, & si talis constitutio temporis adferat
febres tertianas, uerum ait Ras. 16. con. maius
signum est dispositio in qualitate caloris: quo-
niam si declinauit ad usorem, & lenitatem
febris erit sanguinea : si pungens, seruens, &
mordens, ab aliqua cholera, scilicet citius,
uel nigra : si primo in tactu pnerit diuersitas
in locis, quasi penetrat per colatorium, erit de
phlegmate.

Signa febris à putredine sang. sunt tria. pri-
mum signum est citè terminationis, ut in qua-
tuor, uel septem diebus. hæc maxime accidit
corporibus carnosīs, sanguineis utentibus
dieta sang. multiplicatiua, & maxime tempo-
re ueris, constitutione, & regione cal. & hinc.
ait Auic.

Cholerice febris signa sunt quatuor. pri-
mum motus eius est ternarius, & hoc de ch-
lerica simplici, non de composita. duplex. h.
tertiana facit quotidie paroxysmum. Sec. est
acuta febris, idest breuis, & citi motus ob ma-
terie subtilitatem, & hæc in 7. periodis iudica-
tur longissima. tertium calor est mordax ob
multam choleram, & causa est caliditas cho-
leræ coniuncta siccitati. quart. in cholerica est
salubris: quia cholera est lenis supra naturam
idest subtilis resolutionis, & obediens natu-
ræ : & quoniam facit quietem magnam tam
in paroxysmo, quam in exacerbatione. quare
ad facilem materie resolutionem salubrior
est febris cholerica : quo ad calorem sangui-
nea, & phlegmatica, quia calor est acutior. hæc
ait Auic.

Phlegmaticæ febris signa notat Auic. qua-
tuor, prim. inuadit quonidie, sed auit magis
in uespere accedere : quia illa hora phlegmati
est proportionalis. secundum calor est lenis,
quia est fundatus in materia humida, & frigi-
da. tertium est longa ob tres causas, scilicet ob
viscositatem materie, ob multitudine, & ob
frigus complexionis suæ, quartum est parum
spatium interpolationis, & quietis, & debi-
litas oris stomachi à qua corripitur æger: quo-
niam stomachus est uelut receptaculū phleg-
matis, unde sequuntur syncope, & passionis
cordis, casus appetitus : in phlegmatica est

pulsus lenis, & in hætica durus. quāquā
aliquando in phlegmatica sit durus, & maxi-
me in latrica, in qua cito corpus extenuatur,
ob debilitatem appetitus. unde parum come-
dit, maxime quando multum phlegmatis à ca-
pite descendit in pectus, quod stans super dia-
phragmate corrumpitur, & corruptionis no-
cumentum cordi communicatur. unde acci-
dit exsiccatio in humido substantifico, similis
exiccationi hæctice. quæ exiccato communi-
catur tandem arterijs. quare sit pulsus duri-
cies. sic etiam in hæctica aliquando reperitur
pulsus mollis, ut quando procedit à sanio in
pectore contenta, cuius humiditas communi-
cat arterijs.

Quartana febris signum primum Aulcan.
ait est longi motus uel frigus materie. quare
est longa ab grossissime materie. secundum est
longa. tertium accidentia sunt remissa : ut ca-
lor non est intensus, & acutus :

Dixit Alex. si æger erit in colore iteo, idest
sanguineo, & in somnietatem patiat, & circa
utilitatem domus sollicitudinem gerat, & æta-
te iuuenili sit, febris est cholera. si color al-
bus, & pallidus, & natura piger, aut in opere
fixus febris est amphemerina ex phlegmate. si
plumbeus, quartana est.

Continuarum febrium proprium, ait Gal.
2. de differ. feb. est non horrere sumendo hor-
rorem pro omni sorti sympt. quia materia
mala non rapit per sensibilia membra: tamen
ait Alex. per accidens potest euenire, uel quia
aliquid aduenit accidens subito nature ter-
rorem inducens, unde calor retrahatur de in-
teriora, & exteriora rigere : aut quia natura
nonnam pugnam contra morbos, uel mate-
riam morbi inchoet, uel morbus, contra na-
turam. quare calor retrahitur, & retractus
uinit, & materiam expellit super membra
sensitiua criticè, uel non criticè, aut quia in
dicta pugna natura nocumentum materie
præcipiens irritat aliquam eius partem. su-
per membra expellit : aut quia aliquis hu-
mor extra uas posuit circa membra sensiti-
ua quietus, postea ex pugna ipsa, uel alia de
causa mouetur super membra dicta, & horro-
rem infert. quare ait Gal. 2. progn. com. 4. in
principio febrium acutarum contingit ali-
quando frigidum extremitatum, aut quia hu-
mor non expellitur super membra sensitiua,
tamen expelluntur acuti vapores mordica-
tini, qui horrorem cantant, aut quia reuoca-
tur calor intra ob malam, & uenenosam pro-
prietatem febris & suæ putredinis & propter
motum materie malam, & impetuosum, unde
infrigidantur & teriora : aut quia ante ad-
uentum febris continetur superuenient rigor,
qui postea febre superueniente sequitur : aut
quia

quia virtus retentiva adeo debilitatur, & relaxatur, quod materiam in vasis continere non possit, unde symptomatice materia mouetur, & efficit horrorem: aut quia febris continua composita sit cum aliqua interpolata, aut composita cum aliquo apostemate. unde Gale. ad Glau. in prius febrium continuarum, non erit rigor: & si erit frigus extremitatum, aut horripilatio, hoc erit ex apostemate magno in ventre, vel renibus in augmento, & status dicunt quidam posse rigorem fieri: quia materia habet digestionem, quam natura expellere potest super membra sensitiva.

Secundum signum est, quod pulsus est, ut ait Alm. diuersus, & male ordinatus: quia si stilet est maior diastole: & quandoque tendit ad magnitudinem, & fortitudinem, & quandoque contra causa est, quia in continuo cor, & arterie leduntur magis, quam in interpolatis. quare Auic. cum videris pulsus valde diuersus in febre, & illa diuersitas non fuerit ob accidentia, neque ob causas primitivas neque in principio paroxysmorum, sed solum propter febrem, iudica febrem illam esse continuam.

Tertium dixit Alm. febres interpolatas terminantur intra spacium viginti quatuor horarum: tamen aliquando aliqua tertiana notha pertransit, & aliqua ephemera, sed nulla continua terminatur.

Quartum ait Auic. non associatur febris continuæ de significationibus eradicationis alij, scilicet prædictis, id est alijs ab horrore, & similibus. & hoc quia non finitur cum sudore, vomitu, fecesque, vel alia euacuatione manifesta, sic quod desinat in infestationem, vique ad finem.

Quin. ait Auic. est assiduitas caloris, sed diuersitas eius, nam in augmento augetur quandoque, & quandoque minuitur.

In continuis febribus, ait Gil. semper vrina nigra, vel viridis, vel limba distincte vel cum opposicione manus apparet, quoniam in eis calor est fortior, & magis consumptus, interpolata contra. & interpolata incipit cum rigore, aut horripilatione, & finit ut plurimum cum sudore, & in principio vomitus.

Febris continua si fuerit cum superfluo calore, & acuitate accidentium de genere adurentis febris facit ex cholera, quæ est inflammationis, adurens acutæ. si cum superfluo calore, non acuto, sed vaporoso, est conclusa vera. si sine superfluo calore vaporoso, erit conclusa non verè, nec propriè.

Febris liquefactur signa ait Ras. 6. con. est e missio fauillarum ad manum tangētis, quæ cito corpus consumunt, & ad dispositionem tornatilem deducunt in urinis, & egestionibus

plurimum supernatur pinguedo.

Ut cognoscas in principio febris in quo genere collocanda sit, an scilicet tertiana, an quotidiana, considera signa propria vniuersi iusque speciei, & accidentis; nam si febris vno die accidit, & alio non, tamen accidentia tertianæ non sunt pura, nec fortia, sed mixta, hæc non est tertiana, aut est tertiana non pura, quo circa ad cognitionem febris aduerte.

Cum febris incipit à causa primitiva carere rigore, & calor est vaporosus, pulsus eius non est mutatus imminens magnifice, & vrina est multum digesta, & in sine sudor, vel vapor egressus est è toto corpore, & ex his eger alioationem senserit, quasi nihil sentiat, hæc febris est ephemera.

Quando febris inceperit absque rigore, & signa adsunt repletionis, & regimen fuerit ad repletionem, pulsus fuerit fortis, magnus, latus, vrina ruffa, & circulus ruffus, emenens, inflatus, sed sanguis non sit acutus, adit asthma, & inflammatio, & non manifestantur in venis signa putrefactionis, & calor erit multus, & vaporosus, & pulsus erit velox, est synocha ex calefactione sanguinis. sed cum aderunt prædicta signa, ac præterea signa manifestæ putrefactionis, & restrictio pulsus, erit ad interitus magis, & vrina maioris acuitatis, & minoris digestionis, & caliditas sit vehemens magis, & sitis, & calor in toto corpore æqualis, & non plus in corde & pectore, & regimen fuerit ad putrefactionem, & durauerit usque ad diminutionem, est synocha putrida.

Si inuaserit absque causa primitiva, tamen cum horrore, & morfu illato in corpore ad modum puncturæ acus in princ. & in ipso tempore pulsus fuerit occultus & anhelitus restrictus, & parvus ultra solitum, deinde incipit caliditas, & non erit spatium longum dum dominabitur corpori perfecte cum inflammatione, sitis, & vomitu cholericæ, & caliditas erit sicca, sumosa, deinde declinabit. & terminabitur post ad vomitum, & postea fiet alienatio in capite, & vrina erit tenuis, hæc febris erit tertiana, & maxime si terminatur, & mundificatur vena post duodecim horas, vel ante à febre, & si hæc accidentia appareant omnia, sed vrina non fuerit rubea grossa, nec pulsus, erit tertiana notha.

Dum verò incipiat febris cum frigore debili, & est pura, & non mordens eius caliditas, & postea cum spatio longo, difficilis erit eius expansio, & quando expanditur, non sit abundantis inflammationis, nec sitis intensa, pulsus parvus, tardus, sed magis diuersus quam in tertiana, & paroxysmus prolixus, & vrina alba, nec remanebit sudor apud separationem ipsius, & erit aliquod residuum, & regimen

gimen ante actum, & tempus, & consuetudo absque causa primitiua, erit febris quotidiana, & si hæc accidentia sint absque frig. & separatione, erit quotidiana continua, & proprie si aggregatur in tempore paroxysmi.

Quoties autem febris incipit post febrem eruptam, aut post magnitudinem splenis aut aliquem morbum melancholicum, & rigor erit quasi contrundens ex profundatione eius in corpore, & difficulter calescit, & secunda calefactione vehementior fit calefactio in quantitate, & qualitate. vrina est indigesta, pulsus quasi ligatus interius trahens valde cum paruitate, & tarditate, & calor est aridus, & siccus, febris est quartana continua.

Tandem ait Ras. 16. con. si febris accidit post dolorem stomachi, vt plurimum febris erit quotidiana, si post dolorem splenis, quartana, si post dolorem hepatis, tertiana.

Dixit Gal. in lib. de Typo. typus est ordo inuasionum, & remissionum, & periodus est tempus intensiouis, & remissionis. typus largus, & stricte dicitur, sed proprie est, qui antecedit febrem interpolatam, & typorum alij primi, qui paruum habent inuasionem, & longam remissionem, vt tertiana, & quartana. alij secundi, qui longam habent inuasionem, & paruum remissionem, vt quotidiana, & prolongati, tertiani, alij stantes qui semper in eisdem horis semper inuadunt, alij moti, qui horas nunc antecedunt, nunc postponunt: alij simplices, qui habent vnam inuasionem. alij tandem compositi. typum febrem antecedentem, præcedunt duæ dispositiones, scilicet pigritia, & fractio membrorum, scilicet lassitudo, quæ aliquando copulatæ sunt cum alicibus, & oscitationibus. causa pigritiæ est materia, quæ expanditur paulatim super membra, & non mouetur, sed quæta manet. causa fractionis est eadem, sed maior materie copia, sed si fractio erit intensa, dicere verberati, materia iam incipit moueri. quare si materia stat est fractio vno modo, si mouetur paulatim, dicitur lassitudo vlcerosi, siue apostemosa. Aliæ sunt, quando totum corpus extenditur, & maxime spiritalia, & brachia, & oscitatio quando os aperitur, causa est materia pauca vaporosa, quæ veniens ad musculos spiritalia, & mandibularum excitat expulsionem. Typi proprie dicti species sunt tres, scilicet horripilatio, siue horror, rigor, siue tremor, & frigus. horripilatio, & horror dicitur ab horrore quod est frigere cum extensione pilorum totius corporis, & cutis: nam efficiens horripilationis est vaporosa, vnde mutatur velociter ad cutem, dicunt quidam, quod horror est dispositio intensior horripilationis, & quidam, quod differunt secundum lo-

cum ita, vt horror sit dispositio magis profunda. Rigor ait Auic. est vt æger non possit continere sua membra ex commotione, & tremore veniente in eis in motibus inuoluntariis. est compositus ex tremore, & frigore, tremor fortificatur occasione mouentis, & frigus occasione humoris. sed rigor, & tremor, ait Auer. 3. col. sunt motus virtutis expulsiue in musculo, vt expellat humorem ledentem sua frigiditate, & caliditate. tremor idem est quod rigor, sed differunt secundum magis, & minus, & dicitur tremor, quædo rigor fortis: & quando tremor est paruus, rigor. frigus ait Auicem, est, vt æger sentiat in suis membris, & dorsus lacerorum suorum frigus parum. si sine motu malo inæquali: nam si esset cum punitione, horripilatio esset, vel rigor. quia, cum sentitur frigus in spina dorsus, & laceris & per totum corpus, dicitur frigus. maxime autem sentitur in dorso; quia maior copia materie expellitur ad posteriora, & facilitatur impressio frigiditatis in posterioribus frigiditate nuchæ coadiunante, & uernorum ab ea ortorum.

Typorum causæ aut sunt primitiue, & extrinsecæ, aut corporales, & intrinsecæ. primitiue aeris frigiditas, aqua frigida proiecta subito super corpus, aqua feruentissima, ut ignia scintilla, intrinsecæ sunt duæ. ex parte uirtutis, & materie. ex parte uirtutis in se, aut sui instrumenti, i. caloris naturalis. nature aut ex parte qualitatis ipsius, aut motus eius per membra. unde Gal. 10. meth. rigor est ob multitudinem, ut a credentem eorum, qui feruntur super membra sensitiua, & ob velocitatem delationis eorum, & uirtutis imbecillitatem. in li. de Typo. rigor accidit, quoniam corpus leditur, quia calor naturalis leditur, & quoniam motus materie est inæqualis, accidit toti corpori concussio in vtriusque motibus. ait Auicem 2. p. res. rigor, vel frigus, & horripilatio vbi plurimam sunt ob frigus humoris, aut quia humor mordicat lacertos, aut ob profunditatem caloris ad interiora tendentis ad partem materie, aut ob debilitatem uirtutis, ob frigus aeris. & quandoque causæ extrinsecæ mouent causas antecedentes ad rigorem causandum. sit aer calidus, sol exercitatus, & id generis repentina operatur superbitatam imperium, quæ impetuose venientes ad cutem eo tempore densam, non potentes resolui, coadunare sub cute necant, & mordet, & horripilationem faciunt. quare ait Gale. in lib. de Typo. res se habent sic, & ait Plata. quod res aduenientes corpori cum quiete, & paulatim non sentitur: sed oportet, vt veniat cum forti mora, & subdit causa diſſorum accidentium est duplex, scilicet humor: qui non reme-

remo-

remouetur in venis motu vehemēti, & subito, sicut mouetur extra venas expulsus; & quia intra venas non mouetur nisi permixtus alijs humoribus, extra, solus, sec. est membrum & est duplex scilicet vna quia vena assueta est ipsi motui, quare inde non patitur: sec. quia membra sensitiua, quæ sunt extra venas, sunt valde sens. & venæ parum: nam cum humores per lacertos, & carnem penetrant loca, per quæ transeunt, purgant, & vt quasi venenum mordent. hæc accidentia eueniunt ob mobilitatem, vel immobilitatem: videmus enim per se plures si quiescunt, angustiam suam finit, vel pigritiam, vel fractionem, si mouetur, rigorem, si plurimum exercitatur, tremor inducunt: nam res nocua cum quieuerit non multum molestat. si mouentur, maximū dolorem excitat, arguendo est dolor oculorum, quibus clausis si quid occurrerit, parū molestiam sentiunt, si mouentur, maxime. vnde Aui. pri. q. humor frigidus stans, in membro non sentitur, nec læditur. quia est quies, & illi conseruit membrum in quo est. quocirca acquisitus est medius motus complexionis inter complexionem humoris, & complexionem membri, nec virtutis imbecillitas est causa horum, sed est causa respectu materię congregandæ, expellendæ, & consumendæ antequam aggregata grauet, & lædat, & irriter virtutem expulsuam, quæ sine eam aggregari & non expellit neque consumit eam: nam cum materia aggregata irrita expulsionem necesse est, vt virtus sit foris ad expellendum. si causa esse debet dictorum accidentiū, retractio autem sanguinis cum calore, & spiritu ad interiora est causa horum. retrahitur quidem vt resistat materię lædenti, aut vt digeratur. & quando materia est intra venas in pluribus venis stans, frigescent exteriora, vt aliquando in febre continua: quando est sparsa extra, retrahitur calor, & frigescent extrema: & exteriora, vt in interpolatis. quando est collecta in vno loco, vt in apostemate frigescent exteriora: vnde febre ab apostemate facta, dicunt quidam quod causa tremoris est, quod cum calor renatus sit ad intra, debilis remanet virtus alijs in membris extrinsecis depauperatis calore. materia est causa typorum in qualitate calida, vel frigida, quæ ambæ mordicatione sunt, mordicatio ait Aui. materię calidæ est apud panniculum tegentem primum, deinde alijs partibus lacertorū. materia verò mouetur velociter: quia vt in stereticis est materia calida & non est rigor.

36. Frigus non accidit ex materia calida, & frigida mixta, & rigor, & horripilatio possunt accidere, frigus non accidit ex sola caloris retractione, & rigor, & horrip. possunt in fri-

gore non accidit motus, & conussio, quæ vt accidunt, oportet, vt frigus fiat per retractionem caloris. frigus verò est in profundo, & in superficie, & horripilatio in superficie. differt etiam rigor ab horripil. nam humor mordens, qui est causa horrip. est in cute tantum. Sed qui facit rigorem, est in membris: quæ sunt sub cute deinde in horripilatione frigus est remissius, vel minus durans quam in rigore, ter. in horripilatione motus est remissus, quasi occultus superficialis, in rigore est fortis concutens membra superficialia, & profunda. & quandoque tantum augetur, vt fiat tremor, adeo vt collisio dentium quat in horripilatione potest percipi frigus. & vt fiat phlegma tanquam à materia faciente eā: in rigore sentitur frigus positiuum, non sentitur punctio: si punctio, non frigus: in rigore motus occupat totum corpus, & est accidens virtutis expulsuæ, & tremor rigoris non est penitus motus præter naturam, sicut tremor quia partim sit à re præter naturam, & partim à re naturali, quæ conatur expellere rem lædem rem: sed tremor est motus præter naturam, & tremor rigoris est brevis, & tremor longus, tunc factus à materia calida est, quando percipiuntur in exterioribus frigiditas, & in interioribus caliditas: à materia frigida sentitur frigus in interioribus, & exterioribus, simul, & parum, aut nihil sentiunt: rigor factus à materia delata per membra declaratur, quia sequitur eius euacuatio per vomitum, læcessum, vel sudorem, quia in reditu caloris à profundo sepe dissoluit aliquid humiditatis, & expellitur factus à vapore calido, vel frigido, aut vento non sequitur euacuatio: aliquando enim causa tremoris est ventus grossus in inclusus in loco solido.

37. Inquit Hip. 5. apho. mulieribus rigores ex lumbis magis, & per dorsum caput ascendit: viris recto magis, quam ante veluti in cubitis, coxis, & alijs partibus extremis: rigor hoc loco sumptus est pro omni typo, in lumbis mulierum, quia habent materiem nervosam, in posteriori parte virorum, quia posterior est frigidior anterior: signum est raritas, & porositas partis anterioris, & est pilosus, & carnosior, & plus sanguinis habens. extrema sunt frigidiora, & densiora non potentia bene calefieri ob remotiones caloris. vnde cito rigent, incipit ab inferiori parte dorsū, & ascendit caput, quoniam hic locus est frigidior, & vento hor, & spissior, & minus sanguinis habens. dixit Rasi. 8. conc. rigor vehemens calefit velociter, quidam tarde: & debilis quidam tardè, & debilis quidam calefit velociter quidam tardè. pri. sit ex melancolia. sec. ex phlegmate vitreo. ter. ex falso, quat. ex grosso

non vehemens frigiditatis. & vna species est, quam sequitur febris, & vna quam non sequitur. & ter. quam mors, quæ est cum casu virtutis, quæ non potest sustinere membra. rigor aut Gal. 3. de accid. à quacunque causa perueniat, qui est fortior & brevior à primitiuis, vt plurimum accidit macris, & latorum pororum, & præsertim si malis, & pungitiuis chymis, sine repleti. ab antecedentibus vt plurimum crassis, densis, ac opilatis. post rigorem sequitur magnus calor, propter ea quod intra erat retractus absque euentatione & vnitus, & ob confricationem, & collisionem partium angustuosam, vt videmus in corporibus laborantium, & currentium, qui calefiunt, & si starent in sole. quare rigor absque febre est ob multos humores crudos generatos, similes viro, qui humores non sunt putrefacti, quoniam post rigorem accenderetur febris.

Vniuersalis curatio febrium putridarum.

G Ale. 3. metho. air. febris humoralis curatur per contrarium. quod verum est in febre absque materia, sed in Tech. inquit. febris putridæ duplex est curatio: alteratio, scilicet & euacuatio, & Anero. 7. collig. intentio est remonendi malam complexionem, & malam materiam. nam tibi noiscende sunt res naturales, & præternaturales. & quidam aiunt, ex dictis sex factis est, scilicet cognoscere febrem, ægri complexionem, ætatem, virtutem, aeris complexionem, & consuetudinem ægri. & 10. meth. air. solue febrem præsentem euertere. quod generatum est, prohibe generari. & 2. metho. inquit considera morbum, causam morbi, & symptomata. & Auic. prima quarti in medicana tali febre quandoque vertitur ad febrem, vnde in frigida, & humida: quandoque ad materiam, quare matures, & digeris, aut euacues, aut diueras. digestio est alteratio faciens cessare putredinem, manente substantia, ita quod tunc sola remanet intentio alterationis discrasie. nec satis est ad remouendam febrem digestio materie: quia remanet vt videtur innuere Auic. 2. 4. & Galen. secundum prog. sed 3. meth. sumitur, quod cum putredine concurrat causa eius, quæ est ex indebita humoris transpiratione, & accidens concurrat causæ eius, quod est detentio eorum, quæ transpirare debent. quare præter intentionem sumptam à putredine, emergunt duæ aliæ: vna ad prohibitam transpirationem remouendam: altera ad transpirandum, quod retinetur. & quia prohibita transpiratio habet causam opilationem. vnde alia surgit intentio ad aperiendum, &

exopilandum: & quoniam opilatio quatuor habet causas scilicet primitiuam, vt frigiditatem exteriorem, sordiciem cutis, & id generis: & tres corporales, scilicet multitudinem humoris, grossiciem eius, & viscositatem. quocirca quatuor insurgunt intentiones curatiue. pri. ad remouendam causam primitiuam. sec. ad euacuandam multitudinem. ter. ad subuiliandum grossiciem, quar. ad incidendam viscositatem. & quia euacuatio est necessaria, & aliquando humor ob subtilitatem est ineptus euacuacioni, ingrossandus est, & quia membra febricitantium læduntur, & debilitantur: hinc alia intentio ad membrorum confortationem, ex his igitur intentionibus curatiue 12. colliguntur. prima scilicet à febre, & est alteratio caloris eius, nonem à causa febris: vna à causa primicina, aliæ à causa corporali, id est à multitudine humorum, à grossicie, viscositate, subtilitate, opilatione, prohibita transpiratione, transpirandorum retentione, à putredine. vnde decima sumitur à subiecto febris, quæ est membrorum confortatio: dno. decima ab effectu febris, & est accidentium rectificatio. quare ait a Gale. 3. metho. inspicie has omnes intentiones, vt intelligas, quo auxilio primum & magis, quod minus secundum, & quod adhuc minus tertium, & vide quod prima medicis intentio est febrem abijcere. secunda putrefactionem expellere. tertia retenta respirare. quarta opilationem remouere. quinta causam opilationis expellere. sed Gale. 2. metho. ait quodcunque inuentum est, vltimum est secundum methodum resolutoriam in curatione. vnde quod est primum intentione, est vltimum resolutione. quocirca primum causas opilationis remouebis, secundò opilationes aperies, tertio retenta transpirabis. quar. putredinem expelles. quin. calorem qui remanserit, extingues. verum non semper medicus potest ordinem regularem seruare. itaque in vehementi caliditate febrili cogatur quandoque à curatione febris incipere, quandoque ab euacuacione secundum totum. i. eradicatiua, quandoque ab enacnacione secundum quod. i. minoratiua. itaque ait Gale. in tentio curatiua est triplex, vna minuit calorem, & auget causam, & hanc improbo. secunda causam amputat, & calorem negligit. quod vitupero in febre fortissima, quam æger sufferre non potest. & eius virtus non sit potens. vnde ait Auic. si virtus est fortis, absconde causam, expelle humorem, absconde cibum, & non infigdes in frigidatione, quæ prohibeat resolutionem. si virtus est debilis, in frigida, &

vinifica virtutem . & cum facta fuerit fortis, redead causam . tertia est consideratio accidentium, quæ quadoque cognuit vti contrarijs, & morbo, & caulz, ac postea fit, vtaut morbus diuturnior euadatur, aut magna cum difficultate curetur, aut virunque accidat : veluti quomodoque coacti fuerimus in febre exhibere vinum ob debilitatem stomachi, coius gratia fit syocopis . omnes intentiones supra dictæ sunt à re præter naturam, sed oportet etiam indicationem sumere à re oratorali, & præcipue à complexioe, & maxime ea, quæ tunc est, cum febris incipit . dixit Galeo. 3. de tuen. saniti. non sufficit scire, quid sit operandum, sed cum quibus & quomodo: sed quia natura est operatrix depulsio nis morborum, & rerum præter naturam tres corporis membri naturas conserua; vt eis mediamentibus morbi fiat expulsio . quare coratio ooo sit morbo contraria, vt noo sit similis naturali dispositioni : sicut enim curatio fit per cootratia, sic cooservatio per similia .

Non obliuioni tradas cor, & etiam alia membra, à quibus febris origioem ducit, quare scopus circa febrem sit contrarijs vti, circa materiam digerere, & euacuare. digestio cootratiaur indigestioni, & putrefactioni, noo quantitati repleti, sed euacuatio est pncipialis scopus, & digestio accessoria ferè, quoniam in omni materia noua est digestio necessaria, vt in furiosa ex putrefactionis causis est putrefactio . quare si à frigidityte densatum est corpus, rarifica, si à caliditate & siccitate dilata poros cum caliditate, & mollitie . grossos, & viscosos humores subtilia, & incide, siue fluideos redde. nam subtilitas est cootratia grossitiei, & liquiditas viscositati : si multi fuerint, euacuabis.

Putrefactioni ait Galeo. 2. metho. oppositue digestio, eio, & iofrigidatio : digestio enim est oppositum formale, nam facit eam cessare, sed cessata remanet humor euacuandus, & quia omnis materia putrida est calida vt cholera per se, & pblegma per accidens; in cholera necessaria est iofrigidatio io alteratione, & in digestionem, & in principio. sed io pblegmate remissa in pncipio, sed competit digestio cum calidis subtiliatiuis, & iocisuiis, io processu eio cum eisdem, in fine si discrasia calida remanserit, iofrigidatio : & hoc pacto potredinem remouemus febris vero idest calori, & præternaturalitati caloris cootratia est iofrigidatio, & calida aromatica, quæ corroboratior calorem naturalem, vt resistat præternaturalitati, & eam depellat . verum iouetiga, quæ medicina tandem morbum, causam morbi, & sym-

ptomata cureor . omnes dictæ intentiones putridæ febris conueniunt . tameo secundum alios reducitur ad tres scilicet digestionem, euacuatioem, & alterationem : oam intentionio subtiliationis humoris grossi, & iocisionis viscosi, & ingrossationis subtilis, & apertionis opilationis ad digestionem reducuntur : Intentionio sumpta à prohibita transpiratione, & à detentione eorum, quæ transpirare debent, ad euacuatioem : sumpta à putredine, ad alterationem reducitur.

Noo moueas materiam iodigestam nisi in tribus casibus . primus quando materia est sanguis putridus, siue non putridus, io quo ait Auiceo. prima quarti noo conuenit digestio. sec. quando materia est fumosa, & est illa, quæ est vehemente calida acuta, velociter de loco, ad locum mobilis, & malignitate, & venustitate participat . hæc materia oou sinit ægrum quiescere, & facile tendit ad membra pncipialia. ter, quando humor fuerit multus grauans sua multitudine super naturam . tunc Auicen. ne æger recumbar, minora materiam, exceptis his tribus, materiam indigestam oon euacuabis, noo quia fortasse multiplicator euacuatio boni humoris, quæ erit causa, quod oatura oon perduret vliq ad statum, vel si duret, non cum fortitudine, cum qua possit expellere malum humorem : tameo quia multiplicatur euacuatio humoris subtilis, qui etiam resoluitur à natura . vnde nil prodest, sed ledit virtutem, tamen quia forte miscebitur in euacuatione malignum cum bono: itaque fiet morbus fortior.

Et scito, quod si in pncipio medicus videret ob multitudinem materiz ooo posse iuuare, sed ægrum moriturum siue euacuet, siue noo; oon euacuet: nam, ait Gale. commen. in constaotibus morbis morituros uou debere medicari. quidam addunt quartum casum, & est quod auctoritate Galen. 13. metho. & Anicen. quarta primi. de apostematibus occultis, materia minor ooda sit phlebotomia, & solutioe ventris : phlebotomia quando apostema est sanguineus aut defluxus est cum sanguine: solutioe, quando defluxus est aliorum humorum noo cum sanguine: si quidem in principio fiat euacuatio diuersina, præsertim si materia sit multa.

Ad aperriendas opilationes ait Ga. 2. meth. si vis aperire prius præuacuas multitudinem. quod oisi feceris, maiorem opilationis dispositionem ages, repugnantibus sibi inuicem intentionibus.

Vbi virtus est debilis, non euacues . sed prius refocilla . sed Ras. 18. concl. in febribus humorum nihil est laudabilius euacuatione-

tione : quando hæc febris est ignis iustamatus superfluitatibus . adheret autem eis , & virtus dissoluitur , & sequitur mors , sed euacuatio minoraturia ante digestionem in principio fieri potest cum medicina euacuant exsoluendo cum materia illa exigerit : eradicatoria , nisi completo statu , & tunc solum in casu , in quo videas materiam non debere criticum facere , vnde Auicenn. non facias euacuationem eradic . & ideo moueas donec vincat natura , & digerat . quod est in fine status perfectæ . & tunc etiam specta naturam , quæ solet illo tempore mouere , quæ si tunc mouet , aut parata est mouere , dimitte eam . Sio moueat : moue siu hora motus eius , scilicet completa , & expectata . si igitur non mouet per totum diem vicinum i moue ra in die sequenti . & si mouet motu diminuto , aut leoto ; adiuua . & cum euacues , euacua per regionem conuenientem , & non contra partem materiz euacuans per conuenientia loca de digestionem , & euacuationem ait Auer. 7. collig. euacuatio , quæ fit aperiendo opilationes , fit incidendo humores grossos , & subtilizando & digerendo , & rectificando illud quod potest rectificari , & expellendo quod non potest rectificari . & hoc fit maxime in in omnibus febribus , & præcipue quæ sunt incensibus , & etiam in omnibus temporis eius quando materia putrida non rectificatur nisi , rectificando quod non potest rectificari : & expellendo quod non potest rectificari .

Alterationem euacuatio precedere debet Gal. 10. meth. quando in frigiditas in frigidando nullo modo intendendum est ad dispositionem tantum ita scilicet quod intentione ad causam relinquatur . quare in frigidatio fit tanta ; quod causa febris non augeatur . vnde Auic. prima quarti non des trochiscos in frigidationes , scilicet & stypticos , vt de rosas , & de spodio , nec zuc. rosini febre putrida nã licet in hæc concedamus , id fit , quoniam curatio hæcica super contrarietate morbi est posita ; putrida non solum super contrarietate , sed etiam super abscissione causæ , quã didi trochisci , & alia similia prohibent : propter eam quod styptica opilant , & transpirationem prohibent , & sic ad putredinem faciunt . idem confirmat Auer. 7. coll. tamẽ in duobus casibus ante digestionem , & euacuationem possumus vt frigidis stypticis : vobis quando causa febris esset fluxus ventris , aut vomitus , virtutem prosteruens . secundus . quando si fieret magna a corpore transpiratio , aut sudor plurimus , quo virtus prosterneretur . post digestionem , & materiz euacuationem vt licet alterantibus frigidis & stypt. extinguunt eorum reliquias caloris , confortant membra , & quã

do autem euacuationem danda sunt alterantia frigid. sunt & humida , ac talia , vt alterando per tres dies modificant , & abstergant . & ait Auic. in die parox. non curabis febre , scilicet cum in frigiditatibus , quia prohibent citram resolutionem , & ter. parosissimi , & hoc nisi caliditas fortia indoset accidentia de fici , vigilijs , inquietudine , & id generis , aut nisi fortiter resoluendo virtutem frustraerit : nec solum ad intra , sed ad extra alterantia non adiuueris , nec ad extra nisi materia minorata , præsertim styptica . nec conceduntur virtute imbecilli , sed fortius quæ in frigid. non sunt iotentia quia essent causa indigestionis , augenda opilationis , febris , & debilitate virtutis . & hoc cauendum est non solum in febribus remissis , sed etiam in acutis . & caue ne in frigidatio tua cadat in principio parox. cum sit hora abscissionis materiz , nec in augmento , nec in declinatione , cum sit hora resolutionis materiz & sudoris . sed fiat in statu quæ est bona feruoris . quidam concedunt in fine augmenti , quidam in die interpollationis , & etiam parox. per multas horas , vt Alex.

Euacuatio alia est communis , quæ ab Auic. dicitur exsiccatio , alia propria , communis respicit materias communes corporis , & illas solum euacuat : propria proprium , quæ facit febre , siue sit causa antecedens , siue coniuncta . propria est duplex , altera minoraturia , quæ febris partem abscidit , altera euacuatia , quæ totam febris materiam communis fit vt plurimum in principio morbi , propria post commuem euacuat , & quibus obuiat , sed propria proprium humorem minoraturia potest fieri cum aliqua materiz portio est digesta : eradicatoria , cum perfecte tota minoraturia cum medic. leniori virtute , vel dosi . communis præparat ad minorationem , & hæc ad eradicationem , communis , & propria possunt fieri per phar. maca solutiva , vomitibus , per sanguinis missio uẽ & c. sed aduerte , quod tres materie species in corpore febrientis e febre putrida repertiuntur : quedam seruant suã naturalitatem , quamquam secundum primas qualitates mutatae sint ad calorem febrilem . & hæc sunt materia febris putrida , neque antecedens , neque coniuncta , quamuis aliquando contingat ex febris malignitate vel errore fieri materia antecedens , & deinde coniuncta febris putridæ . & hæc non egent euacuatione nisi quantitatem excedant naturalem , aut in causam vertantur antecedentem . & tunc fiat vt per naturæ exonerationem , & allouationem melius , & citius natura febris reficiat . nec materia illa communis exuberans , & qualitate alterata relinquatur nature , quæ uitate habet circa febre , & materiam eius , &

derelicta corrumpatur, & fiat materia antecedens, & tandem coniuncta febris. vnde febrem angeat, & prorogat, vel in deteriorationem dispositionem mutet. hæc materia non in febrientem respiciatur, tamen in pluribus ut in ephemera, cum homo est valde repletus, & in hectica primæ speciei; vnde euacuanda est ob præseruationem. propter ea in putrida febrientem insunt alie materię, scilicet alię quę sunt in eo necessarię & etiam in ephemeris, & hectica, quedam contingenter. quę reperiuntur in omni febre siue ephemeris, siue putrida, siue hectica & sunt duplices; quia quedā semper sunt in stomacho vel venis mela, in orificijs carum, ut materię quedam fecales, & mucosę, & chylosę. quedam in venis cum sanguine quę sunt aquosę, serosę, vel vncuosę. & præter has duas in putridis reperiuntur alie materię vaporosę magis, ut vapores corrupti à materia appropriata coniuncta febris putridę eleuati qui per venient ad corporis insperficiem: quia non omnes petunt cor. sed quidam ad ambitum corporis nõ expulsi. idest retenti nõ aliquam casualum, secundum totum, vel secundum partem ingrossantur ibi vapores etiam corrupti missi simul cum calore febrili à corde ad membra. vapores etiam eleuati à causa antecedenti febris, quę omnes materię alterantur à calore febrili, & disponuntur, ut corrumpantur, & misceantur etiam cum vaporibus corruptis, aut inflammantur maxime quę sunt vncuosę, & prædictę materię tandiu in corpora reperiuntur, quando in durat febris quę quotidie generatur, & alteratur. materię autem contingenter in febribus repetere non reperiuntur in hectica, sed in ephemeris, ac multa magis in putridis: sed nec semper, sed in quibusdam corporis dispositionibus. & hæc sunt aliquando sanguis, aliquando cholera, phlegma, vel melancolia, & aliquando sunt materię in stomacho generatę per viam indigestionis fructuum, herbarum, & huiusmodi præter supra dictas necessario repetas, & prædictę materię omnes dicuntur communes sicut & primę, vnde necesse est ut etiam illo modo euacuantur, imo multo plus cum alteratę sunt magis dispositę corruptioni quàm illę. quę naturam plus granant. tercię materię febris putridę sunt materia approprianda febris, quę est duplex, scilicet altera quę verè computruit, & dicitur materia coniuncta febris putridę; quia ipsa posita ponitur & febris, & remota remouetur, altera, quę nondum computruit: sed est sub dispositione, sub qua si in corpore remaneat, necessario putresceret actu. & esset materia coniuncta febris, & hæc dicitur causa antecedens febris putridę. pos-

sunt etiam hæc tres materię adaptari febrili humori non putridę & quibusdam ephemeris. veris, ut quę sit ab opilatione, nauca sua facie tate, bubone, vomitu, fluxu ventris, & huius. nam in omnibus his febribus materię peccantes debent euacuari. sed materię quę sunt proprię febris putridę. non dicemus de euacuatione communium, deinde propriarum materiarum.

Quocirca palam est, quod materię communes in diuersis corporis partibus sunt locatę. quedam in venis, ut sanguis, vel alius humor sanguini mixtus mixtione forti, & vnita, vel non vnita, sed potius separata, ut aquosę materię, & serosę, quedam in stomacho, intestinis, & mesarialis: quedam iuxta corporis superficiem, ut vaporosę, & vapores ingrossati, quedam in diuersis partibus, ut venis, vel receptaculis, quę tamen possunt petere stomachum vel intestina, & quia vnaqueque materia debet euacuari per convenientem regimē, & loca situationis earum sunt quinque: igitur Avic. quinque canones ad earum conuenientem euacuationem, direxit.

Primus & vltimus ad materias communes contingenter repertas, tres medijs ad necessario repertas. quare primus ait Avic. cum sanguis vixent, aut fuerit cum humore, phlebotomia est conueniens, si vrina fuerit rubra grossa, non citrina ignea, ex qua timeatur apud phlebotomiam vltoria cholera, & acuitas eius, neque liuida, neque alba, ex qua timeatur phlegmatis cruditas: nā vrina rubra grossa significat abundantiam sanguinis, & obplexionem radicalem sanguinis, quomodo ager laborat morbo alterius generis.

Secundus est de materia necessario reperta in stomacho, intestinis, & primis venis. vnde post phleb. si necessaria sit, fiat debilis solutio ventris, idest lenitio, si succus fuerit venter, & sit vltimitas, idest medicamentum euacans materiam propriam febris, neque laboris sum vel loco lenitui fiat clystere.

Tertius venit ad humidas serosas, & aquosas, & hæc sunt, quę vrinam pronocant debilitate ut syrup. acetos. cum radice spij, & butiri. & hæc est conueniens regio materię aquosę, & serosę.

Quartus posset veni ad materias vaporosę, & fac fudare ægrum, & aperi poros, ut excludantur vapores nondum ingrossati.

Quintus si humor tendit ad stomachum per signa declarantia fac vomere debilitate, & cum syrupo acetoso, & aqua calida, si ad intestina adhuc, quod leuiter soluat. quod si natura id per se efficiat, sine, & non diuersifices. tamen si ex, g. quis sodaret ante

ante patet ismum; sudor non est pars materie febris. si postea accederet rigor, ac in fine, siue declinatione sudor: sed est alius humor. primus, & quin impleantur, quando materie repertæ fuerint, ita quod etiam augmento, & statu vniuersalibus, vel particularibus, & si non inveniuntur in aliquo tempore nõ moueas, alij tunc, qui diriguntur ad materias necessario reperiunt non solum in principio, vniuersali, sed et in particularibus debet obseruari omni tempore, quando materie dictæ reperiuntur in dictis febribus. v.g. vir sanguineus quadragenarius carnosus ob captiuitatem multa comedit ex fructibus, & herbis, & post febrilem phlegmam, vidi vrinam rubeam grossam. iussu clystere, ac postea feci phleb. sequenti nocte accepit in anora vnc. ij. syrapi acetosi vt digestio materie appropriatæ febris fieret. post solis ortum exhibui cyphum aquæ hrdel cum vnc. j. zuc. rubei, vt venter leniretur per abstersionem, ante cenam per duas horas exhibui vnc. iij. aquæ capil. vene. quæ digerit materiam, & vrinam prouocat, serofos excludendo humores, & post horam vnam & mediam iussu cum fricari leniter cum panno aspero calefacto vt vapores excluderentur. & quamquam feci coperrere, non sudauit. post cenam per tres horas passus est nanciam, & assumpsit aquam tepidam cum paucis acetis, & cum digito euomit humores viscosos tendentes ad colorem citrinum, vel viride, tunc sumpsit mel rosatum colatum, & syrup. dictum ana vnc. j. & post solis ortum recepit clyst. ex decoctione blitis, malur, & fursuris cum zuc. melle, & oleo communi, & sale. prædicti caupones non in omni febre putrida impleri possunt omnes, quia medicus non semper vocatus est in principio vniuersale, & quia aliquando prædictæ materie omnes non reperiuntur, & saltem sanguis indicans phleb. & ob nocumtum, quæ occurrere possunt, tamen semper implendi sunt hi: quia ad materias necessarias reperiuntur diriguntur. hoc factis processu cura febris phlegmaticæ nunc euacuationem materie appropriatæ aggrediamur.

Phlebotomia euacuat materiam appropriatam febris hum. febres vero, quibus comperit phleb. sunt duplices: nam in vna peccatum est, in sanguine solo stante sub forma sanguinis, siue sit sanguis contradistinctus alijs humoribus, siue sit massa sanguinea, & peccatum ipsius sanguinis. potest esse in quantitate, aut qualitate, aut in utraque, aut est peccatum in sanguine tum solo, sed cum alio humore mixtus mixtione mala; quæ sequi possunt sanguinem, alie sunt in quibus

peccatum est in vno vel pluribus aliorum humorum, & tunc autem cum eo peccat, vel cum eis peccat etiam sanguis, vel non.

si igitur sit peccatum in sanguine solo, phlebotomia statim a principio nulla expectata digestionem. quoniam est obediens, & aptissimus educi: quia est digestus: sine mala complexione, & subiecto non peccat: vnde vena incisa statim fluat sanguis. sic per dictas rationes illico fiat phlebotomia. si mixtus est cum alijs mixtione vaita, si peccat in quanto, si sanguis solus peccat, aut mixtus cum alijs in qualitate, & illa mala qualitas, si est coniuncta putredini eo pacto secundum quod sanguis, vel alij humores cum eo non multum sit remouens a sua naturalitate, nec sit factus inobediens fluxui per suum malum modum substantiæ illico a principio facienda est phlebotomia, non expectata digestionem. quare his tribus casibus fiat copiosa eradicationum, quam in prima casu facienda est ad defectum animi, in secundo minus, & in tertio minus, quam in secundo consentiente complexionem, habitu, consuetudine ætate, & huius. quocirca Auicenna. prima quarti cum phlebotomia. postponitur a principio non est vt amplius intentio: quia si eam fueris tantum, & talem, qualem in principio fortasse interficere ægrum; nam quondam humor. alteratur, & renouentur a suis bonis conditionibus. vnde debilitatur virtus non bene regulans humores. & terminus ait Auicenna, quarta primi non est post quatuor dies, sed etiam post quadraginta, & quatuor si circumstantie consentiant. si peccatum magnum fuerit in qualitate solius sanguinis, vel cum alijs ita, vt non possit fieri phlebotomia digere, ac postea fac eam, non eradicationem, sed minoratiam, consentiente ætate, & alijs. sic si in qualitate, & quantitate peccet solus, vel mixtus, & peccatum sit paruum; statim incide venam; si magnum prius digere. Auertit, septimo colligit, ait, quod phlebotomia fiat ubi sanguis signa, apparent, sed melius est, ubi est quantitas, & non malitia. quare maius ita uentum phlebotomiam expectatur in synocha inflammatione, deinde in febre, in qua peccat in quantitate cum vno, vel pluribus humoribus. deinde in qua; & quanto; & qualisimul: postea in qua sanguis solus in qualitate secundum peccat. tandem in qua sanguis cum alijs in qualitate peccat. verum ait Galenus. ubi est, rigor fortis, & prolixus, quia significant abundantiam humoris crudi, ne mendas, & precipue si calor corporis, & regimen præteritum attestantur, & caliditas

sequens fuerit brevis, & debilis. & Auen. de phleb. consulo, vt dimittatur vbi sanguis est bonus, & humores alij peccantes: quando euacuabitur sanguis, qui non peccat, vnde debilis sit virtus, nec fiat puleb. in abundantia humore crudo, nec in multis febribus acutis: nam in febre continua, in qua corpus attenuatur, cito quæ est cautionica febris adueniens, & adducens citiorem ad tenuitatem cuius hum. sunt vehemens subtilitatis. non fiat minutio, timeret enim cholera ebullitio, & sutia, & phlegmatis in crudario vltima. & si quando necessitas sit, reteretur, & præsertim vbi alij humores dominantur: quouiam in tali phleb. euacuatur ignitum eius, cuius euacuatio non est necessaria, idest sanguinis, secundò quia minus aliorum humorum quam sanguis euacuatur. tertio quia debilitatem uanura resistendo in crilibus, quare aliquando reddit alios humores deteriores euacuando frænum eorum, cum plures erunt necessaria euacuatioes. quinto ait Auen. postpone sanguinis euacuationem. quoniam & natura sic facit, & reseruat ad postremum, nec deserit huius coacta, & ipsa peccatū sang. sepe corrigit. Auen. ait in febre sanguinea cum alijs humoribus sic in principio fiat parua phleb. in processu copiosa: quia quandoque contingit, quod materia iam multum dimiuita, & natura dominante residuo materie eger liberetur toto. sed ad euacuationem materie per medicinalia transsumamus. Ait Gale. in meth. plurimæ medicina sunt calidæ, & siccæ febrem augentes. & Auen. plurimum digestium, & euacuationem est calidum, & siccum. tamen quedam medicinæ sunt frigidæ & sunt lenitiuæ, & minoratiuæ, vt thamarindiquedam sunt calidæ, item eradicatiuæ materiarum vt electuarium de succo ros. verum ait Ras. 16. con. auctori. Hip. non des febrienti medicamen laxatiuum ante 14. diem, quoniam carnes feblicitantium ante hoc tempus sunt calidæ valde, vnde attraherent ad se medicamen illud celeriter, & si medicina fuerit abundans: interficiet eum celeriter: si modicum, augebit febrem, & longiorem faciet spatium morbi, & ducet ad ictericiam. & si medicamen fuerit forte, id quod non poterit corpus attrahere, laxabit fortiter, & inducet spasum ex violentia siccitatis corporis. quod si eger saluabitur, & tollitur febris eius post euacuationem subuertetur postea, & interficiet, quare in forti febre non sumas laxatiuum forte, nec calefactiuum, nisi opus fuerit.

Secundò exhibe in febre putrida medicinam appropriatam humori peccanti: quoniam si fuerit aliter, mala inducit accidentia, & la-

boriose, & angustiose euacuabit, & quandoque quod frænum erat humoris peccantis educet. vnde humor sutosus euadet. sic leuis, quoniã fortis agitat humorem, & inquietat, & periodum incitat. non si valde stypticum, ne opilatio noua fiat, & in euacuando, ait Auer. 7. collig. sequamur naturam toto posse.

Ter. uon moueas ait Auen. in die paroxysmi si fuerit possibile: quia motus medicamenti contrariatur motui nature mouentis materiam è centro ad circumferentiam, & medicina è circumfer. ad centrum. quare posset in casu antecedente febris fieri agitaro vehemens quæ posset esse causa delinxis ad principia, & secundum naturam naturaliter operans mouet materiam, & facit crism in die paroxysmi. coacta tamen aliquando mouemus vt si febris accederet quotidie, aut conclusa non proportionalis, aut materia esset venenosa, & & furiosa, aut natura in die crisis moueat leuiter, vnde egeret auxilio, quo non exhibito timor esset, ne materia moueretur ad aliquod membrum principale. vomitus tamen securius, quam scellus potest prouocari in die paroxysmi, quia humores in paroxismo turbati mouentur sursum, & vt frequenter ad os stomachi. fiat enim in die meliori, vel declinatione, nisi in declinatione fieret euacuatio manifesta, vt sudoris copiosi, vel egestionis. si declinatio fuerit cum euacuatione, melius est vt hoc phleb. fiat scarificatio in anthesis, vel secus antrum apponatur sanguisug. & scellus pronocetur per clysteria. si febris nunquam cessaret omnino, euacuatio fiat cum tepescit, vel hora frigiditatis, vt in auro.

Quar. ait Hip. vbi natura reple, ibi ducere oportet, si euacuet per conuenientes regiones. & Aui. non agas in euacuatione partem contra partem euacuationis nature quæ cuncta sit euacuatio illa: quoniam eius humores faceres redire per illud, quod facis in dispositione ad dispositionem motus paroxysmi. Idem ait nou diminuas à prin. humores per medicinas quæ faciunt statim redire paroxysmi, vt facit scamonea sola exhibita in prin. ternane, nam inflammat humores, & paroxysmi. fortior reddit. & mirabolani citrini in tertiana, chebuli in quotidiana, & indi in quartana: quia opilant, & addunt ad putrefactionem. vnde redit paroxysmus maior.

Quin. cum in principio materia est cruda, & multa, & virtus non fortis, aut times ne debilis per euacuationem euadat, ad digerendum residuum, tunc da medicinam fortem debile, idest dimidiom dosi, aut virtutem eius, & projice substantiam.

De vomitu ait Gal. 10. meth. quoniam humores impetu faciunt ad os stomachi, vomitu prouocant illos.

illos: aliter autem non oportet præter naturam prouocare. & Auic. cum uatura minnet humorem ad uomitum, si quacunque hora particulari, nel uniuersali in principio uel processu, præcedentibus, uel non præcedentibus aliis euacuationibus; non differat eas ab eo scilicet sed adiuua si expediat. & Paul. si de clinant, & non excitatur nausea; non fiat uomitus. ait Ras. 26. con. non detur febrienti medicina uomitiuum, vt vomat ante septimū diem: quoniam si vomeret, & in insuleu morbi a. in principiu ultri, pareretur dolorem stomachi, asthma, tumorem ventris, alienationem & per medicinam vomitiuum intellexit fortem, sine detur ad minora vomitum, siue eradicandum ob agitationem, quam poneret in materia non digesta, & idem ibi ex secundo epid. ait euacuatio cum laxatio in febris est melior, quam cum vomitum: quoniam euacuatio cum uomitu est fallax.

Clystere laxatiuum in omni febre putrida, uel acuta, ante uel post phlebotomiam ut ait Auicem. quarta primi est multum uile, cum ob estificationem, quam facit febris, tum ob materias in intestinis contentas non corrumpantur, uel inflammantur: tum per expulsiuam uaporem malarum, qui sunt in eis: & retenti sunt causa doloris ventris, deiectionis appetitus, & id generis accidentium malorum: tum demum ubi materias, que resudant a mesaricis ad intestina, ut excludantur. Nec lenitiuum per os assumptum idem præstat, quia laxat stomachum, deicit appetitum, & lenitiuam præparat. quocirca ait Auic. prima quarta clystere, usum sibi esse maxime dissectum, itaque quidam alternis diebus, quidam quotidie clystere iubent, hinc ait Auic. prouide, ne occurrat proximus, nisi uoluerit sit vacuus à febris, & alius materis in intestinis contentis. usum clyst. maxime sit post phlebotomiam & alias euacuationes minora, & eo magis quando materis sunt in inferioribus uentris, sed quando in superioribus medicina lenitiua per os assumatur. & hoc in loco consideranda ægri dispositionem, & aptitudinem ad hanc uel illam sustinendam. Rabi ait in 13. par. cuius uirtus est fortis, clystere: cuius est debilis suppositorium. fertur q. rogu. acu. q. qui habent carnem raram, leuem, & facilem resolui, & est pinguedo, uel macies dominans, omnia purgantia sunt dobia, & timorosa. sed cutanea sunt clystere, & suppositorii. in febris acutis non facias clystere acutum, nisi acciderit aliquod cogit, imo nec in principio febrium putidarum: quoniam mouent materiam, & si acciderit inter, ante clyst. acutum fiat lenitiuum: & ait Auicem. quarta primi clystere acutum debilitat he-

par, & producit ad febre post principium tamen in putridis à materia frigida conceditur, ac magis si solutiuum exhiberi non possit, & materia pneganda sit in locis propinquis intestinis, stomacho, uel capiti. unde ait Auicem. quarta primi clystere est medicamentum nobile in attrahendis super. à materia principalibus superioribus, si uero materia esset in uenis remanens, ad quas uirtus actus clysteris peruenire non posset; ipsam non administraret. fortasse, n. agitare materiam, & non educeret.

De euacuatione per urinam ait Auic. prima quarti non prouocet urinam: nisi præcedant clystere euacuationes, præsertim post euacuationem minoratiuum. reuera si opus fuerit ad mundificationem intestinorum, stomachi, & mesaricarum, hepatis, & uenarum emulgentium à materis in eis contentis: nā si diu retica inueniunt materias malas in dictis locis, mouerent eas uersus hepar, & obstrueret ipsum: si in hepate mouerent eas ad uenas, & eas obstruerent, & augerent febre: sed medicatis his omnibus diuretica sunt ualde uirilia, ut ait Auer. 7. collig. nam tunc precipitè reliquias materis, que remansit, & opilationes aperiuunt, & febre amputant. Vnus eorum sit in febris phlegmaticis & aliis omnibus chronicis, & incipe à debiliore, & gradatim ascendere, & præsertim, in his qui sustinent ardorem urinae, quia enim calidis misce frigida, & quoniam aliquando, si idem, inducunt angustiam, in quietudinem, & corruptionem huius membra principalia ut in declinatione diureticorum adde masticem, uel znc. ros.

Post prædictas euacuationes si opus fuerit, fac sudare, que prouocant uniuersam subtiliandū humorem deducunt eum ad aqueum humorem, que sudorem, subtiliandū humorem deducunt illud ad quoddam humiditatem subtiliorem illa. prouocatiuum sudoris, & urina non exhibeatur ante euacuationes prædictas, uel post si remanserint opilationes in poris cutis, quia opilatio augeretur diuersè. deo materias illic, que non possunt sudore euacuari, quia prius aperiantur pori cutis. Sic à debiliore sudorifico incipe. dicit Auerro. 7. collig. si materia febris fuerit frigidus humor & siccor abstinendum est ab his, quoniam sic ea non debent quarta uariis exhiberi. & si uis, frange siccitatem cum succo liquiritie, & rucho violato. nec in febris ualde acutis sudor est prouocandus, & in quibus timetur arefactio corporis, & consumptio, nisi materis essent contentæ extra cutem, & id cauto stat adhibendo frigida, & humida iura, & extra, qui corrigant arefactionem. prouocatur sudor ab extra, & ab intra. denia sudorifica omni

omni tempore morbiāntus, & extra possunt applicari fortia non stante plenitudine maximo quæ ab intus, ne materias deducerent ad uenas, & uersus cutem, & in opilationem adderent.

Euacuatio insensibilis est omnium postrema, ideo Auic. supra. post prouocationem vrinæ, fac sudore & aperit poros, id est si insensibiliter euacua, sed ait Galen. to. metho. prohibetur fortis apertio pororum stante plenitudine maxime in facili resoluibili, ut raris, lenibus, subtiliorum humorum, & spirituum uel ætate ut in pueris, constitutione aeris calida, & sicca aut in pestilentiali. & ii. metho. non rarifices nisi euacuato corpore, corpus nec partem nobilem: calefacere. u. hypochondria & præcordia uon est semper infallax, sed fiat in illis infirmis, quibus nihil est superfluum in toto corpore, & Gal. ibidem. crebra applicatio & immutatio auxiliorum præsertim resoluuiorum maximum malum in his, qui non sunt phlebotomati, & est non maximum in phlebotomatis: nam in phlebotomia etiā in synocha febre apta nata est uocere incensa enim viscera multo calore ambulantur & assantur. & Gale. to. meth. quando instat magnitudo febris, ut in synochis, non ueteris vino, nec balneo, nec vnctione tarificiente: sed tunc cum appareat humorum digestio, quæ significant uirtutem fortem: & tempus frigidum, cum igitur leuiter transpirare uolumus, eligam us calida in primo gradu: cum fortiter, calidiora. sed non multum eleuata, & prius fiant leues frictiones. & quando inuocatio sit cum oleo solo, absterge postea, ne opilatio sequatur: si cum oleo mixto, cum aqua, uel vino, uon est necessaria abstergio.

Duodecim dictum est, esse intentiones curatiuas febris putridæ, inter quas est leuiticū medicamen, ut manna, cassia simul, uel separatim in bolis, uel cum aqua hordei, sed maior in dosi dissoluta. item conditum recens de violis, succo granatorum. in febre phlegmatica, uel melancolica optimum lenitium est: ius galli decrepiti à vnc. vi. vsque ad lib. i. Clystere lenitium sit cum iure pulli, uitelis o- uorum, & oleo miolato. ait Gale. in li. de Cly. confectio cæstionis ægritudinem anget, & facit futere humorem, debilitat operationes naturales, & corrumpit animales inducendograuem somnum, & mentis alienationem. recitat Ioannitius Clyst. mitigans febrem R. vitellos ouorum n. 3. croci chireat 12. olei rosa. vnc. 3. uini cocti vnc. iij. compone cum aqua hordei. mitigat ait Ras. inflammationem, & situm valde.

Vacuant materias serofas contentas in gib

bo hepatis, & uenis; quæ leniter prouocant vrinam, ut in acutis aqua seminum communium frig. & emulsio eorum bibita ad vnc. iij. aut aqua solatri, endiuie, scariolæ, & id generis. in phleg. aqua feniculi, uel pluvialis, in qua bullierint radices apii, uel feni, aut ciccer rubeum. prouocantia dentur post lenitionem, sine processerit phlebotomia sine non.

Materias communes sitas iuxta cutem euacuant prouocantia leuiter sudorem, ut aqua hordei cum zuchcharo in acutis bibita ad vnc. iij. in aliis febribus vinum album debile limphatis ad vnc. iij. post lenitionem ventris, & prouocationem vrinæ, postea cooperi, ut sudor exeat. ait, dinam. bulliat semen lini in aqua, & liga in pannum bene expressum, & pone super stomachum calidum.

Materias communes prædictas euacuat uomit. sed case, sicut quidam in acutis quia febris fit intensior, nisi humor irruat ad stomachum. tunc si expedit prouocare cum aqua hordei tepida, & modico aceti, aut tyrrap. acetos. vnc. iij. in phleg. oximel simplex sumpto uomituo circiter quartum horæ prouocetur, uomitus digito, uel penna.

Deopilatio fit remouendo causam primitiuam opilationem si adfuerit, leuiter fricando totum corpus ante cibum, omissis prius superfluitatibus, incipiendo à superiori ad inferiora, quidam fricat cum aqua decoctionis florum chamæ. melloti calida, quidam cum oleo chamæ. solo, uel mixto cum uino albo debili, uel cū aqua, & fiat quotidie frictio semper diuturnior, & asperior. Auferunt ad causas opilationis corporales digestiones humorum opilantium, & syr. acetos. simp. est digestum omnium humorum.

Post digestionem si materia perfecte digesta fuerit, & febris est de referuantibus materiam ad unicam criticam expulsiōnem, dimittatur naturæ. si tamen ea non mouerit, eradicata, si uero non fuerit perfecte digesta, aut non fuerit febris referuans materiam ad unicam expulsiōnem, minora cum minoratiuo non debili.

Ablationem, & prohibitionem putrefacti. quidam complemento, ut frigida, sicca, ut acetum, aqua ferrea, acetosa, granatam maza, acetositas. citri quendam prohibent ut sandali, rose uel camphora, & quedam à proprietate, ut sunt calida, ut cinnamomo, cortex citri, capillene, ficadas, eupatorium, & Thetiaca.

Inflammationem febrium acutarum extringunt syripi uiolati, nenphæ. cucur. de endiuia, iuiub. manv. christi, triafan. narcotica leuia, ut syrupus de papauere nigro. Ras. 17. con. Ras. sand. citri, vnc. iij. ros. v. cū. semini. lact. citrul

citrus. spodiū ana vnc. i. fiant trochisci da vnc. ii. cum aqua rosata. liberatur p̄ciens à febre acuta uno die.

Alterantia ab exta noo debent regulariter administrari, nisi pauca existente materia, aut multum misorione. aliquando coactus à summa inflammatione uterē: sed caue in debilib, & extenuatis. quare embroca hepar, quia quatuor eius complexio, & veorum. sed ne valde infirgids pr̄sertim hora sudoris, & resolutionis: nam esset causa longa morbi. sic cor, sic caput nisi gravitate, oel catarrho aliquo te neatur. sic renes, sic testes, sic stomachum. Ad confortationem virtutis, & membrorum ex hibe cibos opportunos, & extingue malam complexionem, quæ dicitur virtutem.

A proprietate febtem auferit, si in nomine saluatoris sciendes ramos ebulli & cum vino albos des ante horam paroxismi. & caue ne dormiat quoniam auferit omnes febres, item hepar lepotis reitum, & datom cum aqua scorpio. ponatur in lib. i. olei Luna deetrescente, vel quando est in gemini, & unge sp̄nam ter riar quartanarii, & quotidia. sterens gatē cum oleo de lilio inunctum tenuem febrem sanat. coagulum lepons in pollice manus det̄tum sanat, ster. hum. bibitum cum melle, uel nino conuenit omnibus paroxismis. Qui uult à potridis febribus preferuari, uiter causas, & maxime facile putrescibilia, quæ opilationes intrinsecas generant, aut poros cutis obstruunt, uiter satietatem auseatunam, & quæ prohibeot bonam digestionem, uiter soporositates in qualitate, & quantitate, & aggregat̄e coacunt, & sepe vitatur his quæ putref. resistunt siue cum qualitate ut acetosa siue à proprietate, ut aromatica, & vnc. i. theriac cum aqua calida in omnibus decem diebus, tempore hyemis preferuat à febre putrida, ab epilepsia, & à colica, & sanitas fit omnium membrorum.

De febre sanguinea.

Febres sanguinea est calor accēsus in sanguine, & hæc est duplex, siue putredioe. & pur. & Serap. febris, quæ ab initio ad finē est vniū paroxismi. fit ex sanguine, qui calefit calefitioe sola, & fit febribus similis febri ephemeræ: quia est humoralis siue putredine. quando à putref. proprio instrumentis magnis, accidit febris, quæ est acutior illa, & est humoralis putrida. sed dubium est, utrum sanguis putridus remoueat, aut conuertatur in aliū humorem. putref. ait Galen. sanguis. uel quia non transpirat, uel quia non regitur à natura ob multitudinem, & putrefactos seruet analogiam paroxismi tertianæ. quia pars subci-

lior conuertitur io natoram bilis flauæ: crassior nigre, sed subtilior est uelacio. unde prius. sed ad cognoscendam febrem, calor est suauis, & mitis si est sanguis putrefactus stans sub forma sang. quia stat io materia humida, si factus sit cholera, calor est mordax, & acutus, quæ fit ob multitudinem sanguinis est media inter ephemeram, & putridam. & vsque ad quartum diem stat sub forma sanguinis, sed postea vertitur io choleram, & ait Gale. non sicut aliquis, qd putrefactio sanguinis, quæ est in uenis dicitur putrefactio vniuersalis adeo ut omnes humores siue massa sanguinis tota putrefactam cum natura eos resuscitare non potest, membra outrimeto priuareatur & virtos caederet, & mors sequeretur.

Sanguis ooo est causa alterius febris quia est uicinus temperamento. quia noo calefacit alios humores. sed alii putrefaciunt sanguinem. febris sangioea nō putrida dicta est ab Auic. febris profundi somni facti à multitudine vaporum ascendentium, condensatorū, & humectantium cerebrum, & à medicis dicitur synocha inflatiua: quia causat inflationem ex multitudine uaporum, dicitur etiam asthmatica, quia causat difficultatē anhelitus: quia replet uenæ, quæ sunt circa cor reddūt anhelitum frequentem.

De causis febris sanguineæ ait Gal. g. meth. opilationes factæ à multitudine sanguinis q̄ maxime sunt circa ora uenarū, & arteriarū, & pori cutis non sunt potētes generare synocham siue putridam, nisi quod transpiratum fuerit multum, & calidum, nam cum dixit. dicitur calor regi interiori strictis poris, non opo rret existimare certissimam factam esse dēntem, ut nulli eorum qui sufficienter subiliati sunt homorum concedat ad quod exterius fluere: neque enim hoc in ossibus, uerum erit nondum io carnibus, & cute augmentatus esse sanguis conculcatur, & conculcatus calefit sicut accidit segetibus cum uirides conculantur in horreis sic à sanguine multi summeleuati nō potentes pr̄ gravitate nature, & opilationibus educi ex corpore, sed retenti inflammantur, & inflammant sanguinem, cuius inflammatio peruenit ad cor, & facit febrē. & Girat. augmentatus sangiois peccat quantitatē & aggrauat naturā sua oimā quantitatem, & non subleuat, sen deporatur, plorimi igitur uapores ab eo resolati, & non educi ipsum calefaciunt, & spiritus naturales & uitaes in uenis, & arterijs coarctatos. & sic fit febris synocha inflatiua siue putredine. q̄ autem coniogetur repletio, & opilatio fit febris sanguinea putrida. alia causa est primitiua, ut aer calidus, & exercitiū. item aquositas in sanguine multa facta à fructibus aquosis q̄

talit

alis humiditas facit putrefactionem, item humus crudus factus ex fructibus, ut pomis, pyris, & melonibus. & hæc febris dicitur synocha.

Febris sanguinea à principio ad finem remanet semper eodem modo, & dicitur omotonus: aut augetur paulatim, & dicitur augmenta: aut paulatim minuitur, & dicitur paugmenta: quando augetur, est, quia id quod putrefcit est plus, quam id quod resoluitur quando minuitur contra. quando remanet, tantum est quod putrefcit quantum quod resoluitur: initium verò harum specierum febris erit, cum nondum apparuerint signa digestionis, vel contrarii eius, cum inceperint apparere: erit augmentum, cum perfectæ, erit status. dixit Aui. febris sanguinea sine putredine quandoque mutatur in hecticam, qd potest accidere ob approximationem rerum frigidarum ob quas calor naturalis multum minuitur in membris, quare non possunt nutrimentum regere, sed præ penuria nutrimenti pulsa inflammantur, & accenditur calor, qui est febris hectica, quod rarissimè contingit. & Auic. si aliquando in tali febre sanguinea infrigiderit multum caput, mutatur in letargum: si cerebrum, in subet: si sanguis descendit ad pulmonem fit peripneumonia, si ad paniculos pectoris fit pleuresis: si ad ventrem hydrops temp. si in crisi per viâ deurationis, sunt varioli, & morbilli. durat vt ait Auic. febris sanguinea vsque ad 7. dies & resoluitur per sensatam euacuationem sanguinis narium, mensium, excretionum cholericarum, & sudoris quandoque facit etiam apostemata in emunctoriis, & pustulas in cute.

Signa generalia febris sanguineæ sunt hæc ait Alm. hanc febrem præcedunt grauitas, scilicet membrorum, pigritia, extensio, plenitudo, & dispositio, quæ lassitudini, scilicet extensio, vel apostemose assimilatur, in somno est iu-per-suitas, & amentia, & stupor, & maxime post somnum longum, in capite grauitas, & si capite in fronte, tympanibus venarum exuberantia in toto corpore, pruritus in oculis, naribus, & lucis, ubi ventosas apponere consuevit, vel fieri phleb. Isaac addit ruborem coloris corporis, & calor in superficie. & quidam dicunt, percipitur ut sensus uerberati cum recunivdente, non fatigante cutim.

Signa specialia recitat Gal. 9. meth. quæ reperit in iuueni febrienti febris sanguinea non putrida, & hæc sunt. febris sufficienter calida: qui calor ait Semp. est similis calori febris ephemere, mitis, non mordax. pulsus est equalis, maximus, citus, spissus, & uehemens, & arteria nec dura, nec mollis ob humiditatem

mollientem, est magnus ob fortitudinem virtutis, & obedientie instrumenti, est plenus ob multitudinem sanguinis, & frequens ob necessitatem. urina in colore, & substantia est similis sanis, ac citrina Alm. est rubra spissa, color rubeus est in facie, & oculis, & Alm. in naribus, inflatio faciei, & oculorum, & tympanum, & repletio maxime. incipit hæc febris ait Alm. & Auic. sine tremore, & rigore, sed cum calore & nullam habet interpositionem. in mane tamè ob aeris temperiem sentit æger aliquam remissionem, inflammatio est fortis, ait Alm. sed talis apparet egro: sed mitis calor uidetur medico. adest dolor capitis pulsatiuus, inquit Gal. de iuvene ob repletionem arteriarum capitis cum inflammatione, & grauitate, ait Semp. ad iunior, ait Gai. uigilie insuauis, inquietudo, & maxime si uapores fuerint mordacitui, aut plurimi sed si mires, pigritia, grauitas corporis, & profundus somnus. ait Gal. reliquit cõsera exercitia. & Alex. copiosus vini uetus, & crassique usus, & mulæ carnis Ras. constringitur anhelus. idem affirmat Auic. & Serap. Ratiocinatio eius est sicut corporis balneati. Auic. non sordet nisi apud crism. prurit nasus, cadunt lacrimæ ex multa humiditate laxante contentum oculorum. Zoot accidit sitis in augmento, & statu cum siccatate lingue, & ariditate. Gerar. apparet lampades ante oculos nec tenebrositas addit ob vapores sanguinis ra-beos. Guil. uident in somnis res rubear. Ferar. est dulcedo in ore ex fumis resolutis, & sanguine in spissatis circa linguam. Auer. quæ colla. ad sunt suspicia, & inquietudo.

Signa synochæ de putredine sanguinis sunt pulsus, ait Haly, qui nimium est diuersus, & urina rubea alchimi. Guil. urina fetet, perturbata, & liuida, & pulsus inordinatus.

Signa cõia utriusque febris est pruritus in nato, & loco ventofationis, & phlebotomias anhelitus, profundatio somni, & caliditas per totum corpus æqualis: tamen in putrida est magis similis causoni, & sitis est maior, & uigilie, & inquietudo, & tristitia, & in putrida pulsus maior est systole quam diastole, in inflatio contra. ait Gerar. synocha putrida magis consuevit euenire tempore pestis, quia sequuntur alia accedentia in statu mala, ut variolæ, nimius sanguinis fluxus est in naribus, difficultas anhelitus, & heryspela. dixit Alex. si hæmor. uel alius sanguinis fluxus clausus fuerit, maximum signum est synocham esse. Aaron ait. Febris sanguinea, quæ continuo augetur est maligna adrens. quæ continue minuitur, est salutaris, quæ in nona dispositione permanet medio modo se habet, se-cunda

eandē speciei non euenit declinatio vsq; ad 3. uel 6. dies.

Signa longitudinis, & breuitatis febris san guinea dixit Auic. sumuntur ex festina signorum apparitione, uel tarda, & symptomatum malorum.

Inquit Alm. t. 7. con. si patienti hanc febrē accidit subeth, aut uigiliæ ob multam inque tudinem perlectum, & uenter est inflatus, & sonat cum percutitur, ut tympanum, uel est molli inflatione non cessante, & apparent in corpore puncta minuta, sicut morbus pnlicis, recede ab eo: nam ait Isaac. causa eius est fumus pestilens factus ab ebullitione humorum corrupto rursus ex extraneo calore, & maxime si in extremitatibus apparuerit petiæ liuidæ: significant enim uisionem humorum, & calorem naturalem ferē extinctum. Difficultas anhelitus magna signum est malū & 2. meth. ait. quod nisi in aere frigido sensor refrigerium, non est bona spes, & cum hoc uirtus est debilis, & digestionis signa non apparent, necessitas morietur. ait Raf. t. 7. con. uidi in febre sanguinea ex putredine sanguinis, & multitudinis fieri lrisen, & subeth, aut lethargis accidat, lethale est. uentris stipricitas significat choleram moueri (sursim). Passio. ait. si synochus habuerit excrementas: longiorem efficiet febrē, & non sine periculo. fertur, quod si eis somnus sit laboriosus, & à somno surgant grauiores, & huc, & illuc inordinate se moueant, & cum magna angustia sine signis digestionis, talia mortem significant, & eo magis si apparent in corpore pulsus nigri, liuidi, uel ignei.

De signis bonis ait Raf. t. 7. con. ex Hippo. 2. de humo. synopsis in febre multum sanguinea ex inflammato multo sanguine uirtute forti est satis iuuatua, quia in frigidat corpus, & extinguit febrē.

Si in synocha urina multum incensa albā, & continuam habuerit hypostasim, breuem, & eucratam esse significant. si rubeam, lenem, & continuam habuerit; longam, sed eucratam. facilis respiratio, bonus anhelitus, facilis motus bonum pronunciat. urina incensa sine hypostasi, & cruda persistens significat à longe timorem: incensa cum mala hypostasi breuem, & discratam, aiont quidam quantum est ad primam apparitionem signorum digestionis: tantum ab illa appa. ad crifim. uode si apparet in prima quarta, crifis erit in prima 7. in prima 7. crifis erit, in 14.

Curatio.

Synocha inflata, & putrida sunt acurę, qua

re non dant inducias, diæta sit earum rerum, quæ sanguinem minime augent, ut caro, & uinum. & id in febre, & post eius remotionē. quæ facile putrescunt, caue; ne in putridam, febrē uertant in flatuam, uel putridam augent caue quæ actu, uel potentia calefaciant ut ignis, suffumigium, ira, tristitia, strepitus, uigiliæ, labor. cane multum cibum, & retentionem omnem superfluitatum. rotum uerò regimen ad frigidum redat cum panco sicco, ut sanguis ingrossetur, & hum. minuatnr, & ntere semper diæta tenui, & magis in statu habita ratione complexionis, compositionis, ætatis, & id generis: nam qui sunt rari, habent debile stomachum, qui in subili diæta nimis attentantur, & si uirtus est fortis, ait Haly. ciba spinac. cucur. portulaca, lactuca, cucum. aqua granatorum. & Raf. da aquam hordei, & si uirtus est debilis, adde uis pullorem. & Scrap. postquam lenitur natura, da aquam hordei, & non ante. & si natura est sicca damus eam cum aqua granatorum mizorum cum secaniabin. si non est sicca, da lentes excorticas, Auic. ait, prima recentia, & medulla citrulli, & cuscute in sicca, in non sicca natura & pyta odori fera. di. cit Roger. si status est ppiuquus, uix da lac amigdalorum, & nebulas. potus ait Gal. 9. meth. sit aqua frigida nisi qd prohibeat, si natura est sicca, ait Ser. a qua prunorū, cucurbi. cū zuce. aut iulep. niola to aqua citrulli. post apparitiōē digestionis aqua frigida, aut cocta cū pauco zuc. aqua hordei cum zuccha. aqua cum aceto, nini granatorū, nini leue, bene lymphatum præferim in declinatione, in qua reficis cum largiori uictu, & tunc regimen sit ueluti febris phlegmaticæ, quia phleb. & regimen præteritum reprimunt calorem, & hum. & frigidita. induxerunt. hora optima ait Passio. sit in prandio.

De aliis rebus non naturalibus sit camera nersa ad septentrionem in æstate, uel terrena, & peirrata aqua. & ornata floribus, & foliis uitis, salicis, & huiusmodi, odoret mala citronia, persica, & id generis, & fiat ampulla aquæ ros. ferē plena cum puluere rosarum, uio larum, sandalorum, & pauco camphora. Gaudeat tamen si stuporem, ac somnum profundum corripet eum, cum frictionibus, & ligaturis excita. quotidie egerat regimen in putredinali declinet ad frigidum, & acetosum sanguine inflammato choletico ad frigid. & hum. & ingrossandum aquoso ad sicum, grosso per phlegmā, aut melacholiam ad subitandum, & incidendum.

Ait Gale. 3. meth. synocharum curatio est phlebotomia, & aquæ frigide pono, sed ait Rabi. 1. o. particula sit potio post digestionē, si fuerit cum putredine febris: si uerò sine putredine,

tre dine, datur expectata oolla digestione. nec p̄mittas pble. quia si habebis intentionem ad causam euacuandam augebis febrem: si ad discrasiam detinebis multos homines in corpore, & si ea quæ dicta sunt alias, memoria tenueris, euacuatio habet plures intentiones, & alteratio vna. vnde prius est euacuandum quam alterandum. intentiones quæ respici debent, sunt sanguinis tepletio, materiæ alterius malæ, vel corruptæ in corpore inoentio, quæ est aut materia communis, aut materia accidentalis sanguini mixta, vaporum à sanguine eleuatorum multitudo, obstructio pororum, & hæc quatuor in vtraque synocha cōsiderantur, sed in putredinali aliz dux. s. peccatum substantiæ sanguinis in subtilitate, aot aquositate, & in grossitie, vel viscositate, & sanguinis putredo. quare necessaria primo est sanguis. euacuatio. sec. mundificatio sanguinis & corporis ab aliis materiis. ter. resolutio vaporum. quar. apertio. quin. æquatio substantiæ sanguinis quæ potest dici digestio. sex digestio, quæ est putrefactionis correctio, & prohibitio.

Primum igitur phle. est eger nulla expectata digestione, & nulla hora electa, si febris ait Gal. 9. met. adfuerit à sola obstructione, or sunt, qui synocha laborant in flammâ, & in synocha facta ex multitudine humorū sine opilatione & putredine, sed in synocha ex potredine, quia impossibilis opilatione, & potredinem sanari ex phleb. aliis etiam indiget auxiliis, & ibidem ait. nisi phlebotomati fuerint in somnam venerit discrasiam, nisi fluxus sanguinis copiosus, vel sudor apprehenderit, & suffocabuntur, uel in syncopim deciderint vel debilitatur uasorum natura ob calorem, & 3. meth. non solum in inflatiua, sed in putredinali statu à principio vena est secanda: nam ait Isaac. non totus ebullit sanguis, & putrefit, licet sit totus aptus potrefieri ob continuitatem, & transitum eius per vniuersas corporis venas, acta tamen aliquando putrefit in vna, oel pluribus partibus, & aliquando putrefit in toto, sed non totus. Haly. inquit io primo. 2. vel 3. die quo movetur sanguis, incidatur vena nigra, vel basilica, & Rabi. vena nigra, quæ est vena cordis & Viar. considera virtutem, & complexionem, tempus, acrit, & consuetudinem, quæ si omnes conueniant, & maxime virtus, iocide venam, sed ante statum. in stato, & augumento caue, & præsertim phlebotom. copiosam: nam in his duobus temporibus non virtuti confidemus egri. quare tunc regimine extinctio vtemur, in phlebotomia respice stomachi dispositionem, & cibum digestum, an non. si non est digestum uomatur, si necessaria sit phlebotomia subi-

to. sanguinis quantitas sit ad syncopim, uirtute forti, & ætate uigente, tam in putrida, quam in non putrida sanguinea. hoc docet Galco. Serapio. & Raf. qui ait si est debilis virtus noo una uice, sed bis incide uenam: & addit. & ciba illum cum medulla panis, & aqua granati muzi, nel agreste; deinde minue. Auer. autem ait ducere ad syncopim non est naturale, immo erroneum, quia natura id non facit nisi in crisisibus malis, & intentio debet esse ad extractionem sanguinis secundum quantitatem. unde remaneat debitus. & Gal. intellexit usque ad in frigidationem. & idem Gal. 9. meth. ait. quod necesse est tantum auferre sanguinis, quantum virtus tolerat. & 3. meth. si multum sanguinis euacuatum fuerit, ante nutriendo febrem augebis, uel non nutriendo virtutem dissolues. dixit Isaac, si pectus, dolet, pbleb. hepaticam: si non mediariâ. & dicunt quidam, quod venæ peccante sanguine solo in quantitate fiat è vena brachii dextri: si acutus, & multus è vena sinistri propter ferocit cordis. & Auic. ait. si syncopis superueniat piam resolutionis, & cibo subtili, & quiete recide: si ppter morsum stomachi à cholera post phlebotomiam per plures horas ait Gal. exhibe cibum. & 9. meth. præcepit vt dormiat ad corroborationem virtutis defecit ob sanguinis emissionem, & dormiat usque ad primam horam noctis. ciba etiam cum pane, & agreste succo. & 3. meth. patientes synocham phlebotomati plorimi in 5. die crisis habuerunt: quidam ad 7. longius autem nullus. & Haly. unde autem febrem extirpabis, aut breuem facies, nec timebis mortem. Dixit Auic. si vena non permittat or incidere, incide venam frons, aut appone ventosas in loco conuenienti. idè Viar. ait. scarificatio cōpetit, si uirtus est fortis: quia sola uirtus morbo repugnat: & aliz circumstantiæ non adfint. si aliæ uigent, & victus non; nihil facies. & si natura aperiatur hemorrhoides, uel sang. narium, non impediatis nisi syncopis superueniat.

Materiæ communes ante phlebotomiam euacuandæ sunt, quando in stomacho, in iute sinis, & uenis mēstacis essent materiæ malæ corruptæ, quæ possibile esset, ut ad uenas per phlebotomiam attraherentur, & præsertim si sanctas nauetatus, & regimen inordinatum in potu, & cibo præcesserit. cum uerò repletio suffocatiua cogeret, statim phlebotom. est, & postea venter leniatur. & quando materiæ essent ualde paucæ, aut materiæ contingenter conuenirentur in uenis: has materias communes euacuat decoctio prunorum, thamarindorum, passularum, terreniæ. & cassia, ait Serapio, & Alman. cum succo granatorum aceræ.

acethorum . & Viat. cum manha, & violis : & nisi lenitium tale possit exhiberi , ait Scutiat clysterele. idem affirmat Auicenna & quoniam materiz contingenter reperiuntur sunt plures, quam possint , prædicta lenientia educere , vel sunt in venis remotis : ad quas non perveniunt educ cum medicina illis apta prædigeibz , vt ait Auicenna cum mirab. citrinis, & indis, & fumoterræ, cassia, & id generis . & hæc euacuatio fit, vt mundificet sanguine à materiis corruptis cholereticis, & adultis cibi mixtis : vel cum aliis appropriatis , aut cum reubarbaro si cholera mixta esset cum sanguine non adultis, & cum edacentibus phlegma , & melancholiam.

Tertia intentio est pororum apertio ; & quarta est vaporum resolutio , quæ duæ compleuntur per fridionem , & inunctionem aperturam . ante phlebotomiam fiat frictio levis & inunctio post . & si phlebotomia sufficeret ad febrem sedandam, ad resolutionem reliquorum vaporum , sufficit lenis illa frictio , nisi multiundo vaporum remanserit , tunc frictio facienda est cum mandali mediocriter aspero , & postea vngendum est corp. cum pauculo chamemelino, & vino albo subtili paruo, & aqua decocta ampliori simul mixtis , & calefactis . & sedata inflammatione , ingreditur balneum temperatum , & cum fursure , ait Ras. in diuisio. si ca multum , & iterum , deinde dormiat, vt sudet.

Quinta rectificat sanguinem , unde ut vult Galenus attenuantibus , & aperientibus , & mundificantibus sine caliditate, vt febrem non augeas . & id fiat inquit Auicenna post phlebotomiam uel aliam euacuationem , si phlegma non possit . unde potest exhiberi Syrupus acetosus , & acetosus , aqua seminum commacinarum, vel capillueneris , endiuia , & id generis . & hoc in sanguine viscoso , & grosso, qui si multum sit grossus , & viscosus ; digeratur cum calidis , qui non obstant febri , quæ non sint eleuata in gradu . Si sanguis sit subtilis ait Auicenna. ingrossa cum robur, syrapiubarum , qui fiat ex decoctione iubarum , & cum zucchero fiat syrupus, sed parua sit zaccari quantitas. lentes in aceto acetoso forti decoctæ sanguinem ingrossant.

Sexta quæ est in synocha putrida , est cum eis quæ prohibent putrefactionem , & remittunt eam, vt cum succo granatorum mororum, & cum granatis moris.

Intentio ad infrigidationem est , vt de-

tut aqua cocta, & infrigidata si non est, ait Auicenna, quod prohibeat . & addit . scias . quod esse contentum infrigidatione ; & dimittere phlebotomiam & solutionem ventris , est addere in oppilationem , aut eam facere , quare additur putredo , & caliditas in reliqua dispositione sua , & quoniam inquit Auerroes septimo collig. hæc febris, habet latitudinem in colore secundum magis , & minus , & quæ est fortioris caloris , dicitur ardua, unde secundum hanc sunt digerenda frigida magis, & minus . & ait Ras. in diuis. si tardatur phlebotomia in sua dispositione , aut omittatur , stude in dando aquam frigidam plurimum , tantum quod sanetur , aut infrigidetur , & tremat . si febris deserit eam ; sufficit tertia si reddit , iterum vsque quo declinet , & fiat levis , & tunc rege regimini febris phlegmaticæ tribus igitur , cum ingens est necessitas , nisi quando febris synocha erit ex apostemate in stomacho , hepate, matrice, vesica, diaphragmate, pulmone, aut pellore . signa necessitatis est quando est uehementis febris inflammata , & cor pulsatur , & tremor post assiduationem febris secundum illam dispositionem diffisilem duobus diebus , aut tribus , & non extinguitur eam estringentia alia ; datur ergo subito in posito tantum quod sanetur : res enim valde frigida verè perueniunt ad illud , quod est necessarium ; & si hi non bibunt aquam frigidam superuenit eis synopsis paululum , & venæ scinduntur in ventribz eorum , & in panniculis cerebri , quia largus sanguis fluere à naribus & moriuntur ; quoniam arteriæ propriæ scinduntur , & si arteriæ non scinduntur ; consurgit anhelitus , & putrefacitur subito : quare potui aquam frigidam præbe : ex hoc enim non sequitur nisi debilitas febris , & eius spatii prolongatio , & aduenit apostematis duci in uisceribus . & Auerro. septimo collig. quando omnia particularia , & virtus conuertant in febre ardua , & æget multum desiderat aquam frigidam , non est digestio expectanda : quia æget ante digestionem consumeretur : nam si expectares : digestio esset mala , sicut nebula nigra , & si aqua frigida exhibito non prodest materia enim quæ calefacit febreant , qualis est hæc , cum sit multitudo caliditatis , non est priuata digestionem nisi ob maiorem qualitatem acutam , non propter grossitatem , aut viscositatem . & quando hanc infrigidabis , materia erit digesta stans danda, igitur est aqua tenuis , ut æger sit pallidus, & tremens , & ad pondus lib. 4. hmo

languinem inflammatum, & subrilatum à febre in frigidando ingrossat, ne ad principalia descendat, & febrem extinguat: natura enim confortata benignos humores trahit ad se: subtiliores per sudorem, vel ventrem excernit, & fluxum sanguinem narum provocat. & hæc aqua, ait Passio. si possibile est, detur in die critico. Avicenna. melior hora est vehementissima ebullitionis, & est status quo ad accidentia, siue evacuationio facta fuerit, siue non. Alman. si non prius succurratnr phlebotomia, quam lingua nigra fiat, & accidentia causis superveniatur, cura fiat cum in frigidantibus: nam tunc convenit humectare, & in frigidare magis, quam sanguinem humidum extrahere: quia tunc phlebotomia cholera rubeam bullire facit, & ualde corpus inflammant, in frigidantia ait Haly. sunt aqua granatorum dulcium acerborum cum squingibio, aqua thamarind. Viat. addit psyllum, syrnum violatum, & prunorum aquam. Avicenna. aquam lentum, & lactucæ, & aquam hordei. sed vna nocte infundatur semen psylli integrum in aqua crassa, mane coletur, & colaturæ addatur zueharû & tribuatur: nam sitim summè extinguit, & ventrem lenit. Serap. clystere facit, ut ex aqua lactucæ cum mucillagine psylli, & oleo rosato tollit inflammationem, & tremorem cordis: item aqua uitæ pastoris salicis, psyllum cum oleo violato. Ab extra ait Serapio. est cerotum ex oleo rosato, aqua citrulli, cucurbitæ, & in squami positum super stomacho, & hepate, & porrula trita, in declinatione de trochiscos de camphora ait Avicenna. ad consumandum residuum caloris febrilis, & ad confortanda membra resoluta, eorum substantiam minuendo. ex dictis igitur palam est, quod in augmastico fiat phlebotomia maior, magis subito, in frigidatio maior, & citius aquæ frigide exhibitio: in peragmastico contra scilicet maior phleb. & minor in frigidatio, & homotenus potius tendat ad augmentum.

De cholera febre.

Febri cholera alia sit siue putredine, quam quidam vocant cholericam inflationem, siue causon inflationem, alia cum putredine, quæ aut est continua, aut est interpollata. & Avicenna ait. febres cholericæ sunt tres, tertiana continua, tertiana periodica, & causon. & tertiana tam continua quam interpollata alia est pura, alia non pura, quæ notha dicitur.

Febres cholericas interpollatas, siue continuas ait Galenus secundo de Crisi, facit cholera, quæ est pura, aut mixta. pura fit ex chymo in hepate generato simul cum aliis humoribus, qui dicitur generatus generatione prima, & est cholera naturalis dicta cholera rubra: aut generaliter secunda: quæ cholera fit ex putrefactione sanguinis cuius subtilis transit in cholera puram. hæc est multum subtilior prima, sed differt, quod est causa, & materia febris cholericæ continue, alia, ait Avicenna potest esse causa, & materia continue periodicæ, & causon. mixta, siue innaturalis est cum per adustionem ingrossatur aut ingrossatur per admixtionem phlegmatis, vel melancholicæ cholera naturalis mixtione unita: quia fieret, si non esset unita, non nna febris, sed composita, quæ haberet duos proximos, dixit, cholera innaturalis potest esse causa febris cholericæ, noctis, interpollatæ, & continue. sed ait Avicenna, causa non puræ tertianæ est cholera grossæ substantiæ: per mixtionem phlegmatis cum ea, vel melancholicæ cum ea, licet rariet, quia obsecitatem difficile coniungitur. si phlegma, quod ei admiscetur fuerit grossum; fiet cholera vitellio: si subtile aquosum, citrina. quidam dixerunt à cholera puram non generari febrem portidam, quia eius multa succitas: resistit putrefactioni. quare ait Auer. quod causa febris est sanguis aut alia humiditas, in qua dominatur cholera. unde potest recipere digestionem, & reuerti ad suam naturam cholera prassina, & frigidiosa non facit febrem: quia cum sint veluti venenum, natura expellit ad ventriculum, & si facit febrem, non uacat periculum magno.

Causæ primitiue mouentes antecedentes febrium cholericarum sunt labor, sollicitudo, ira, furor, sitis, æstus, uigilie, cibi, & potus calidi, & sicci, & pharmaca similia.

Febres cholericæ sunt de genere acutorum & præsertim causon, & post eam tertiana continua, & post eam tertiana puncturata, & tertiana periodica non pura secundum quendam modum acutatis, tertiana autem notha maxime periodica aliquando non seruat morem acutatis febrium.

Febres cholericas quandoque antecedunt hæc signa, scilicet lentatio puncturatio in corpore & maxime in dorso, somni diminutio, uigilie, deiectio appetitus, morsus aliquando, & ardor io ore stomachi, acuitas in egestionem, & citrina, & dextri temporis dolor.

Signa generalia harū febrium alia sunt communia, alia particularia. communia sunt undecim, sitis, angustia, inquietudo, impatentia, alienatio, nausea, amaritudo oris. siccitas labiorum, scissio eorum, dolor capitis siccitas ventris, ut plurimum. sitis est ait Auicenna. ob exsiccationem oris stomachi, angustia, inquietudo, & impatentia ob acuitatem, & inflammationem cholerae stimulantem vehementer naturam. alienatio ob ascensum cholerae ad cerebrum. nausea, & amaritudo oris ob motum cholerae ad os stomachi, siccitas labiorum, linguae, & torius corporis, ac scissio, quia facile cholera recipitur in labijs, cum sint partes oris magis extremae & carnosae & uenter stipiticus, quia motus cholerae non est ad intestina, sed aut ad exteriora, aut ad extrema, aut ad cutim.

Tertianae periodicae primum signum est rigor, quasi acuum punctura, vel punctio aquae bullientis. causa ait Serap. est cholera citrina partium ignearum, quae cum cadit super membra sensibilia mordet. quare submergitur calor naturalis versus profundum. unde sequitur tremor in extremis, mordicatio in partibus sensitiuis. non prolongatur autem frigus, imo tendit ad calefactionem, & dentes non concutuntur, & in primis diebus rigor, ait Auicenna. est fortior. & Zoar. qualis cum aqua calida effusa fuerit super aliquem repente.

Secundum signum est caliditas inflammatis corpus ex acuitate cholerae, unde fit sitis. sed non moratur nisi parum donec ueniat status. sed caliditas est acuta valde ad manum, quia eleuatur cum uapore, sed postea manus uincit eam: febris autem maligna est acutior, & magis ledens manum, & in cane fons manus semper plus inflammatur a carne egri; quia caliditas causouis est magis in interioribus, & est acutorum vaporum, quod manus reprimere non potest.

Tertium signum ait Serapio. est diuersitas pulsus, quouiam in principio pulsus est parvus, quia calor nondum est expansus, in augmento maior, & in statu minor. quam in augmento, & maior quam in declinatione. magnus est ait Haly. quia nirtus est fortis, quia cholera leuis non grauat eam. est velox, sed equalis, & anhelitus est diuersus in principio ab augmento, & statu: quia in principio materia grauat magis nirtutem, & calor naturalis suffocatur plus sub humore. Auicenna. ait, pulsus in tertiana est fortior, quam in alijs peritidis, & Auer. quando calor extraneus generatur in humore putrido admiscetur calori naturali, & tunc crescit, & inde pulsus.

hic pulsus est inordinatus, & equalis: phlegmatica uero uon.

Quartum signū sunt accidentia; nam ait Auicenna. in tertiana sunt nigilix sine grauitate capitis, nisi in quibusdam non puris, sinus, furor, odium loquendi, & audiendi, & amor solitudinis: quia auditus organum cum sit siccum; leditur ut uerbis percutientibus. & sentit ebullitionem in hepate. & sentit in eo puncturam propter acuitatem, & ebullitionem cholerae in felle.

Quintum ait Galenus ad Glauc. urinae sunt rubrae clare, aut subigneae, id est citrinae, uel subcitrinae ob calorem. est subtilis ob siccitatem.

Sextum ait Galenus. 2. de differentiis feb. fedat hanc febrem, aut uomitibus cholericiis, & id est proprium eius signum, aut egestionibus cholericiis, aut sudoribus. & hoc fit ait Valerius in tertio, aut quarto periodo, quia tunc materia est magis digesta, & apta expulsiōi. & finitur secundum omnes cum sudore, qui est uera tertianae solutio. in prima accessione ait Isaac sudor est paucus: quia materia eius non est bene digesta, & calor febrilis desiccatur enim. conuertitur autem uapor cholerae in sudorem ueniens ad cutem ibi à frigiditate cutis, & aeris, & aliquid condensatur, & fit sudor.

Septimum est aetas iuuenilis, & aet calidus.

Octauum si in illo tempore sint multae tertianae, si urina fuerit ualde citrina, & in primo periodo non aderit nubes, prorogatur ad 7. periodos. est subtilis substantia, sed subtilior quae fit in causae.

Propria autem signa febris tertianae purae, ait Galenus secundo de differentiis febrinum sunt. quod longitudo unius paroxysmi permaxima est duodecim horarum. secundum signum est, quod status fit cito, quia cito corpus calescit. tertium si eger bibit aquam uel uidetur corpus humectari praesertim in statu. quartum signum est, quod in septem periodicis est longissima. prima accessio, ait Isaac, permanet quatuor horas, aut sex, aut octo, & accidentia sunt pauca: secunda, accidentia longiora, & similis primae, & permanet decem horas. in tertia incipiunt insperuitates terminari, & ebullire, & accidentia sunt molesta. in quarta angustur accidentia, & prorogatur paroxysmus aliquando usque ad quindecim horas, uel sexdecim. in quinta sunt minora, & in sexta tenuior, & in septima terminatur. Rabbi Moysi. in decima parte, ex mente Galeni recitat undecim signa purae tertianae. ob quae

medicus statim in principio eam cognoscit, primum est rigor fortis, & cutis pungitur. se-
cundum est sitis, & inflammatio, quæ non
prolongatur. tertium est fortitudo pulsus to-
to tempore. quartam est status accessionis pri-
ncipio proximus: quia diffusio caloris per to-
tum corpus est æqualiter. sextum est calor
acutus ad manum, sed debilitatur, & nin-
citur à manu. septimum est exitus vaporis ca-
lidi cum bibitur aqua cocta. est vomitus
cholera citrinæ, vel ventris fluxus, vel vrina
copiosa cholericæ. nonum est sudor vapo-
rosus, calidus, & æqualis in toto corpore.
decimum est post hæc omnis eradicatio, &
cessatio completa febris. undecimum est pa-
roxismus non transiens duodecim horas. ue-
rum ex dictis signis duo sunt potissima. f. rig-
or in principio & sudor iu fine: nam ait
Auicem, cum vides principium cum rigore,
& statum cum sudore exuberante, verè est fe-
bris tertiana pura. dixit Gilib. in tertiana pu-
ra, vel non pura si post appositionem signo-
rum digestionis interdù duplicetur accessio,
non est timeendum: quia interdum cum mor-
bus sit acutior, salus est propinquior. & id èt
in quartanariis.

Dixit Galen. primo ad Glauc. vinum pro-
hibeatur antequam ægritudo digeratur: quia
est prouocatiuum, & commotiuum humoris
& putrescens eos auger putrefactionem,
quare incipiente digestionem detur vinu aquo-
sum. hæc confirmat Auic.

Curatio simplicis tertianæ ait Serap. com-
pletur per curationem malæ complexionis,
& multitudine materie eius: quare opus est
alterare, & euacuare. sed prius digerere, ut
vult Haly. quare quinque comperunt huic cu-
rationi. f. lenire, & educere materias commu-
nes, euacuare materiam propriâ, digerere, &
& prohibere putredinem, alterare, siue earin-
guere calorem febrilem, demum corrigere ac-
cidentia.

Præter leniengia si necesse fuerit usus vo-
mitus in principio competit in tertiana, &
omni febre interpollata spontaneus, vel leui-
ter prouocatus, quia alleviatur totus paroxis-
mus: uam qui patitur interpollatam, & in pa-
roxismo nulla sit euacuatio, in tempore inter-
pollationis totus est ponderosus, & grauis &
cum paucâ alleviatione. deinde ait Auicem. non
des pharmacum, sed prius digeræ. & Anicen,
non prouocet vrinam in principio cum emul-
sione seminum, & alii addunt nec sudor pro-
uocandus est. & ait Auicem. cum apparent signa
digestionis, & crisis, & natura euacuat totam
materiam: bene est, si uon totam, adiuua in
illa parte, in qua agit, ut si per uomitum,
tunc adiuua uomitum, si uero ipsa non mo-

uerit quicquam, tunc moue per fluxum ue-
tris, & euacua ventrè cū medicina benedicta:
quia nihil est magis congruum huic euacua-
tioni quàm fluxus. Dixit Auicem. post euacua-
tionem criticam, aut factam tempore
debito, sed natura nisi adiuua, non po-
tuit, prouoca vrinam, & sudorem: quia
sunt aptæ ad consumendas, & finiendas reli-
quias materierum.

Tertia intentio completur cum frigidis, &
acetosis. dixit Gilib. cura tertianæ fumatur à
causa antecedente, quæ est cholera rubra na-
turalis, subtilis, liquida, imbibita in mem-
bris. hanc oportet inspissare cum frigidis, ut
sunt semina communia, herba frigida: ad-
ditis fundalis, & spodio. syrup. acetos. quia
acerum penetrat in uenas, alterat, & resistit
febrili discrasie. & ait Auicem. fumat omni
mane syrupum acetosum, & post duas horas
aquam hordei. si die interpollationis. nam in
die paroxis. aqua hordei non est danda, quia
nutrit.

Quarta intentio fit cum extinguentibus
calorem febrilem. unde infrigidandum, & hu-
mediandum est & ait Auicem. cum aqua hordei
& inlep. quidam dant trochiscos de campho-
ra cum aceto, semine portulacæ, sed fiat post
digestionem, ventriculo forti, & hepate, &
inlep factum ex aqua portulacæ, florum ne-
nupharis. in quibus insusum fuerit pilulum
per noctem, aromatizatum cum duobus
granis camphoræ est vrinum. De approxi-
mandis extra prius bene minorata matè-
ria, dixit Alman. hepati in nocte vacuato
ventre pannus in fundalis, aqua rosata
infusus apponatur, & Auicem. ponat pe-
des in aqua frigida ad attrahendum residuum
caloris. sed caue in die paroxismi, &
crisis. & ait si post crism remanet calor
inseparabilis, da syrupum acetosum cum suc-
cis diureticis, uel de duabus, uel quinque
radicibus, ut residuum materie prouoce-
tur per vrinam.

In tertiana pura facta ex cholera gene-
rata per aduersionem ex sanguine regimèta
sit frigidus, & humidus: & diæta
rumpet crassior: quia diuturnior est. dixit
Fidelis succus corrigiolæ bibitus ante
accessionem per unam horam prohibet pa-
roxismum, & succus pimpinellæ bibitus in
ipsa accessione tollit aut minuit ipsam.

Curatio tertiana non pura.

Dixit Galen. ad Glauc. non quolibet die ci-
baudus est in tertiana non pura, ut in die
paroxismi, nisi uirtus sit debilis, sed dixit
Haly. in die accessionis refice cura

agro id ignorant. idem facit herba coriandri ante ortum solis supposita capiti, ignorant agro, unge ante paroxysmum egrum cum focco ocimi mixto cum stercore hyrundinis. multas araneas coque io lucrosa, & tritas apcoe temporibus ante paroxysmum & pulibus brachiorum. oculi coturoicis, uel piscis autari ad collum appensi tollunt tertianam. item R. summitates foliorum uicis teoeras, & sommitates utricæ teoeræ, pista, & adde parum aceti accerimi, & io mortalo distempera, unge pulsus brachiorum, & timporum ante accessionem, succus hiperici bibitus com aqua calida aore paroxysmum tollit. eum. pimpinella, uel eius succus curat tertianam, sua folia missa in aqua beoediata io nomine sanctissimæ trinitatis bibat ante accessioem uel post, certum est remedium. tria folia uetbenæ, & tres radices sumptæ ante accessioem tertianam corant, debent rammen prius resoluti in aquam; de plicibus plātaginis idem com vnc. iiii. vini mixti com tantundem aqoe. radices gentianæ vni. bibita ante accessioem curat tertianam ootham chronicam, folia iofquiami trita, & sumpta cum vino aore accessioem per duas horas immobilisand materiam prohibet paroxysmum, deturigitur minorata materia.

Curatio tertianæ cōtiooe tam uetæ, quam nouo uetæ est eadem quæ interpol. tamen differt in hoc, quod materia est copiosior io cōtinua, deterior, & magis timenda. Cibi ait Auic. sicut tenues, frigidioris, & humid. qualitas, an de caue uinum, & expelle omnes superfluitates.

Digestio fiat cum fortiori digestiue, quia materia est magis resiliens, & forte magis mixta sanguini, & aliis humoribus ooo putrefactis, qui non sunt materia febris quando eger a quatione, & sequestratione ab illis. adde, quod materia cōtionarum est magis sparsa per totum corpus, & in oenis remoris. unde Ras. in diu. d. syr. de prunis in autora, & aquam hordei post duas horas, si oatur fuerit sicca: si uerò floida per duas uices io die ooa dat, sed succum granatorum mutorum tritorum cum suis interioribus. Auic. da syrupum acetosum factum cum seminibus frigidis. Mes. in Antido. syrup. de prunis & syrup. nenupha.

In euacuatioe si phlebotomia est necessaria fiat statim copiosa, & hora quietiori, clysteria sunt leuiora, quam in interpolatis. & Auic. in principio ne desolutioem oisi materia fuerit furiosa, sed da quæ leniunt, & educunt feces commoos, ut syrup. viola. & aqua fructuum. appareoibus signis digestiois, nisi signa alia appareant, euacua cū diamaana,

syrupo uiol. elect. de succo ros. syrupo prunorum Mes. cum reub. De uirna ait Aoic. qui d cootiona est declinatio ad prouocatioem uirine, sed loco, & tempore de oomita, hic est coouaiens in interpolatis, & magis utilis. De alteratione ait Ras. in diu. ex turgore quorum potes calorem præferim in meridie cū aqua cucubite, meloos indi, cirrulli, & mucilagine psilli in sero, & da aqom frigidā, quando aget uult, & comeder fructus frigidos & hum. nam hæc via est securior: propter ea quod plurimum eorum cerebrum affleretur, & stomachus ita, ut spasmus, sit corrupta. syrup. utilis R. quoique radicem voc. is. ex piluæ. politr. ros. scolop. hepaticæ, endio; scarole ana m. isem. papau. albi, portulacæ; lactuce, endio. sandal. ana vnc. i. lnp. sumit. borag. ana m. s. hordei mundini, seminom corrian. frig. ana voc. iiii. ros. robea. oiolarum, nenuph. ana voc. iiii. fiat decoctio, & cum zuch. & aceto forti fiat syrupus.

In omnibus febribus northis in senibus, malanolicis, phleg. hyeme, & regiooe frigidā datur succus chamæ. mane p tres dies colatus, & mixtus cū zucharo, & puluere liquiritiæ. dohis est ab vna. viq; ad 3. & quiparū succi hęc, infunde in lacte amigdalæ dulciū, uel in aqua bordei. pōt ē fieri iofasio ex florib. camæ. sicis in aqua hordei, uel endinæ, & hmo. scolop. & tallus barbas. uel camedreos dator in hac febre prosperet.

De Causa.

Causa ait Auic. est duplex. scilicet cholericus, cuius causa est cholera multa putrefacta, aut intra oenas totius corporis, aut in oenis, quæ se quonitur partes cordis propriæ, aor in uenis partium oris stomachi, ant hepatis, & Ras. addit pulmonis: qui humores cholericus putrefiunt, & sparguntur per totū corpus, & perueniunt ob suam putredinem ad nimium calorem similem ebullitioni. Ex toto corpore rorō accidit, sed plurimū ex partibus, quæ se quōt totū: aliquādo ex partibus stomachi, aut hepatis. tertiana continua ait Serap. ex materia sparsa io uenis totius, quæ ebollit, & in flammatur causa ex materia, quæ ebullit apud cor, stomachum, hepar, & pulmonē. materia oeri caofonis est cholera oatoralis, quæ ut uult Isaac putrefacta ē aut nouo putre, dum multiplicata sit in partibus cordis uicibus possit facere caus. & Gazar. idem affirmat, quod conuenit com ephemera causoo: cui magis nocet uementia caloris quam horribilitate putrediois, tamen & sit a putredioe. causoo nothus sit a phlegmate salso iam putrefacto io uenis, quæ sequuntur partes cordis. & tale phlegma salsum, ait Auic. est

est cholera aquosa & fluidibilis per phlegmatis agnoscatem. hæc febris est phlegmatica, quo ad accidentia cholerica, quæ cholera quo ad virtutem vincit phlegma. non sit à vitellina, quæ est complexio nris falsæ, quia est crassior, unde vapores grassii, non pungentes; non è sanguine quia eius vapores sunt mulcres: nam si melancolica, quia grossi. & eius grossities repugnat inflammationi caufonis, quando cholera, quæ mixta cum phlegmate quo ad virtutem dicitur caufon nothos, fumosus: quando equè cum sang. sed maior quo ad virtutem dicitur tum fumosus, inter tertianam continuam, & caufon. ait Galen. 4. apho. nil differt in materia, nisi quod illa est in tertiana in vno loco, in cauf. in alio. caufon his plurimum accidit, ait Haly. in quorū venis plurimum cholera adnascitur. fit in diebus calidis, & sicis à qualibet causa procacitica. caufon ait Alm. à phlegmate falso est deterior factò à cholera non ratione accidentium, quia tunc grauior in cholerica, sed longitudo eius & difficilis curæ, & sic ait Auic. breuior tertia continua: quia habet grauiora accidentia. caufon acutissimus est ait Gilib. propter incensionem cholera, quia vicinatur cordi, & quia coarctata est eius putredo in strictissimis venis. unde si à principio apparent omnia signa bona, vel mala, terminabitur in prima quæstæ, vel in fæa, & aliquando extenditur, ad 7. & si transgreditur, fit alia febris. Crisis caufonis ait Auic. est, quia vt plurimum consumitur vomitu; aut fluxu vetricis cholerico; aut dolore, aut sanguine narium: quia ebullit & ascendit, & compie vases cum urinis albis, & in colore remissis; & crassius, & lenibus subfistentibus. apostema quorum aliquo emūdoriorā soluit caufon. si sine his redibit, vel dolor crurium & expuat grossa nisi materia fuerit euacuata. si materia est supra diaphragma; soluitur caufon per apostemata in emūctorijs cerebriū infra, per apostemata interiorum.

Causi primum signum ait Hip. 4. reg. acut. est lingua aspera, sicca, & nigra valde, & ait Alm. labia citrina & lingua vel nigra. secundū ait Hip. est secundum ventrem, morsus, & dolor & Gilib. pondio stomachi ob acredinem exposit Gal. humotum. tertium ait Hip. po. egestionis sicæ ob calorem citrinæ. Gor. ait quandoque est fluxus ventris, quandoque non. et Gilib. si fluxus est cholera abundantiæ, quæ irritatiua; si conspiciat; est qualitatiua. unde si quantitatiua; aderit fluxus cholericus, & vomitus, vel vtrunque cholericum. quar. ait Hip. & sicis vehemens, & continua, & est dicit Auer. 4. collig. proprium signum huius febris, nisi, ait Apicen. si fortassis par-

ua. causa sitis ait Viat. est, tum materia eius in venis otis stomachi, & concuicatis hepatis. necesse est, vt sitis confortetur, & continuetur, quamquam etiam ad sitis propter spiritalia. quin. insunt vigilie ait Hippo. ob siccitatem, & Auic. ait quod infantibus inest profundus somnus ob vapores eleuatos. sentum aliquando ait Hip. dehyant ob cholera in repentem ad caput vici Gal. sepait Hippo. fractura ossium, & labor, & est species labitudinis vlcerosæ, quæ fit à mordicatione humorum dignium, quorum pars intrat in intimos lacertos prope ossa. ostra. est calor, inquit Viat. intensius, molestissimus, nature inimicus ob materiam acumen. & Auic. calor in exterioribus non est ita fortis, vt in interioribus, quia materia parum extra euaporat. nonum ait Alm. & Auic. è febris, quæ à corpore non separatur, idest verè continua omni die quod non fit in tertiana continua. quare est sine typo. decimum non est cum sudore, nisi quando recedit, dom modo crisiæ sit per sudorem. ait Alm. Vnde decimum pulsus est velocissimus, magnus, & frequens. ait Gordo. & Guil. tandem ait Alm. quæ signa eueniunt in tertiana notha sunt in cansone, sed fortiora. Haly. sequuntur eam sitis maxima, aliamatio, angustia, acuitio, & propinquitas ad perditionem. & Gor. inquiendo, malitia tolerandi, syncopis, tremor cordis. & Gil. vehemens capius dolor, frontis, ac tympani, tinitus aurium, citrinitas faciei, rubedo oculorum, instabilitas, tremor cordis, tossis sicca, & quandoque nauies, & vomitus.

Causon nothi signa ait Hip. 4. reg. acut. sunt fluxus ventris, & Gale. videtur humoralis, sed si materia est in stomacho corrupta cibum, est cibalis. si in hepate, chylosus, & Alex. non verus caufon habet sitim, sed non nimiam aut multam intensum, neque nigredinem linguæ, neque vomitum. depositio cholerica est, sed magis corruptio, non est in ore amaritudo, sed potius falsedo. in vero causone lingua est amara, vigilie, inquietudines, & magis in vero quam in notho. Gordo. si caufon fuerit ex phlegmate falso accidentia erūt remissiora, tempus hyemale, & diuina phlegmatica præcessit, & affligit horas 18. vti na ait Rabi aucto. Gal. in 3. epid. Subtilis in febre acuta adrenti significat humores multos, ac crudos in venis, quæ sunt in gibbo hepatis, & maxime in cansone factò à cholera citrina, vel phlegmate falso ex ipsa materia, quæ est subiectum febris. & in factò à cholera pura potest urina apparere cruda ex crapula nouella, vel alia materia posita circa hepar, & vias vrindes, quæ non est subiectum febris Gordo. est rupea, & senilis, lucent, ac scintillans, i

vt iugis : & quandoque ex nimio incendio vires in superiori parte , & interdum nigrescit , & Gord. aliquando est in princ. cruda ob multitudinem opilationis , aliquando tineta ob resolutionem cholerae , aliquando liuens turbida ob multitudinem opilationis , & putrefactionis. dicunt quidam , quod vrina rubicunda , ignea subtilis liuens superius causonem de cholera significat , si non sit subtilis , sed rubicunda absque igneitate , causonem de san guine cholericico . Si ruffa magis grossa , liuida superius , causonem de phlegmate falso : recipit enim rubedinem à cholera , & grossitiem à phlegmate. inquit Gal. in com. prædic. Si causon est ob materiam contentam in stomacho , vel hepate , est ibi magna inflammatio : si in pulmone , lingua est nigra , & magis desipiunt , & habent dispnceam cum ore aperto . & magis appetunt frigus aeris , quàm aquæ potum . ait Alex. & Rabi vt supra , varietas vomitus in acuta febre adurenti est signum humoris crudi in venis , quæ sunt in iunctæ intestitinis , & concauo hepatis . Causonizantes aliquando fiunt muri , aliquando surdi . si virutes , & sensus sunt boni , & corporis leuitas , & calor per totum corpus , & bonitas appetitus , ait Isaac non est desperandum . si rigor ait Hip. in causone deuenit , morbi fit solutio : quia concurrit materia ad extra , & id in die critico . post signa digestionis vt ait Ras. 16. con alio modo est malus , factu rigore necesse est , ne sudor , vel vomitus , vel alui fluxus sequatur . in causone magis fit rigor , quam in tertiana continua : quia materia tertianæ est in venis magnis , & amplius , & sparsa ad multas venas , & grossior , quàm illa causo vis . aliquando in rigore illo fit alienario : quia materia expellitur ad membra sensibilia . signa mala , ait ibi Gale . est rigor in principio vigilæ , fastidium , sitis , vrinæ nigre subtiles , & paucæ sientes , aduulso cholericico humore , frigus extremitatum ait Ras. bidelem & dicit etiam si in causone repente rubea fiat facies , & oculi cum ponderoso eloquio , & horribili morie tur eodem die . rigor in principio gnatæ sanguinis è naribus , in secunda die singultus , dolor in visceribus , sudor frigidus in quarto , mortem , aut longitudinem significant . & vbi exit sanguis non est rigor : quia materia est intra venas . hæc enn. & Isaac . causon in pueris , ait Auic. est leuior ob humiditatem . hī abhorrent mamillam , & accescit lac in stomacho , Gord. ait si ictæritia in causone fiat ante 7. morietur . Gale . 5. dynam. antequam causon fiat , dolor sentitur & capitis grauitas , & dolor aurium cum forti ictu , & tremore .

Curatio . Viat. in pice quatuor morbi tempora , quæ cognoscuntur optime per signa di

gestionis , & cruditatit . & non dat inducias . vnde sis sollicitus . cura igitur causi veri ait Auic. est qualis tertianæ continuæ , & putris non veri vt tertianæ nothæ . sed regimen ten dat ad frigidum , & hum. quam in tertiana , & magis vtatur cordialibus . quare vires æger æ rem calidum , succum , irem , strepitum , motū laborem , fricationes asperas , vigilias , salia , & acuta tam in cibo , quàm in medicina alteratiua , & solutiua , vt vult Hipp. 4. reg. acutorum carnes , vinum , non des cibum in augmento , Alex. stetin balneo aquæ dulcis tepidæ vsq; ad caput , sed caue , ait Gal. vbi est repletio . vn de Auic. inquit in die declinatione , sed tendat ad frigidum præsertim , in quibus est febris è phlegmate falso . quare consert in vtroque causone . finis est vt aliterentur reliquæ caloris , & consumerentur reliqui humores . dicta vt que ad quartum fit nulla , ait ibi Hip. nisi , ait Constan. sit puer , complexio cholericica , rara compositio , & vsus comedendi . bi ait Viat. comedant prisanam , panem ter lotum cum zuccaro , & bibat aquam cum zuc. succo granæ . mazorum . cucu. citrul. syr. viol. in augmento si innatus sit stomachus , in primis quatuor diebus . si febris est terminatura , da stomacho debili mellicratum , syrup. vio. vel ros. vel succum granatorum . Alm. dat micam panis infusam in lacte acetoso , absque butiro , cum zuc. bibat aquam hordei . Gord. dat præter hæc lac amygdalarum lactucum , portulacum , ius pullorum . & Guil. faciat lacum a gresta , succo granatorum , acetos. citri. cibis vtilis sit ex penidijis , & medulla panis lota , & dissoluta in iulep. rosato vel viol. cum modico aquæ rosate in qua granum camphoræ potatur . cibis . . ait Constan. detur in extremo dici , & maxime in aurore ob aeris frigus Gal. 1. ad Glauc. quando signa digestionis completæ apparent da aquam frigidam consideranda cum complexionem , &c. & si dederis ante , da cum zuc. iulep. vel syrup. acetoso , vt diu non moretur in stomacho . & ait Rab. in 13. par. liquefacit carnem , & planguedinem . vnde exhibenda est aqua frigida . hidromel aquosum da , vel de zuc. multum in vna vice , quia primum extinguendus est calor : quia paucæ quiditas augeat eum . & Auicem . detur i syrup. acetos. scilicet & emulsio seminis endiuiz . & melonis indi . item aquæ cucurbitæ coctæ in furo cum zuc. ad vnc. iiii. quod lenie ventrem t vel ad vnc. vj. & aquæ cucur. citrulli coctæ cū zuc. & detur assidue . ait Alm. aquam frigidā bibat , vsque dum facies vitidis fiat : calidus . extingnetur , sudabit , & liberabitur . melior autem est aqua anguriz in paroysmo , quam aqua pura , quia restituit , & addit in sanguine faciendo frigidam qualitatem . de syrup.

vilibus est syrup. nenafa, violat. cum aqua cocta, in qua infusum fuerit semen psillij integrum die, ac nocte. vel Rec. succi grana. aceto. agrestis, berberij, citoniorum, aceti ana lib. ʒ. succi malorum acetosorum, pitorum acetosorum, & acetos. citri. ana lib. v. zoc. albidissimi lib. iiii. fiat syrup. & aromatizetur cum sandalis citrimis, rubeis, & paucis camphoræ. vel Rec. succi acetos. citri. vel limon. lib. iij. bulliant in eis berbe. vncij. fiat sy. & aromatizetur. vel Rec. sand. spodij, succi liquiritiæ, dragag. sem. portulacæ, berbenæ ana vnc. j. reubar. vnc. v. pulueriza, & liga in petia bulliant in aqua mellonis, vel citrulli, in qua psillium fuerit infusum, & cum zuc. fiat syrup. cum paucis camphoræ. vel Rec. sy. acetos. simp. de neuusa. de papau. ana vnc. iij. s. misce & da vncij. cum aqua frigida, vel aqua portulacæ. De aqua ait Alm. bibat multum cum iulep, & succo granatorum, nisi apostema intus fuerit, vel hepar debile. valde conferunt trochisci de camphora, & valent ad ardorem vrinæ ad extra. ait Alm. super hepar, & cor ponantur panni in aqua ros. infusi. quidam statim post lenitionem id faciunt vnde ait Alexand. in frigida statim, quia putrefactio in dies plus augetur. & nisi timor esset in summo non des. ait Girard. mucilag. psillij, sem. portul. & huius. multum iuxta calor sit vehemens. De euacuatione, medici nihil dicunt. de digestionem, quia materia est furiosa, & quando non esset alteratio, quæ potest dici & digestio, sit curæ initium. in euacuatione respice materias communes, & necessario repetas. vnde vomitus confert, ait ibi Hip. & clystere, & serum lactis in potu, vt soluat. leuiant thamar. & singulis noctis tribue ait Alm. ex apozemate prunorum, & thamar. duodecim, aut ter quodique venter soluatur, & leui in principio ait Auic. quia exsiccant aures feces, valde. Auer. 7. collig. dat quotidie aureos. x. thamarin. infusum in aqua scilicet sine syrupo, vel alia re dulci, deinde dar aquam hordei. clystera alterantia sunt ex succo cucurbit. cocum. melo. indi. cum par. i. succi lactucæ & portulacæ par. ij. decoct. violarum par. vi. aut coque lactucam, portul. viol. semperuium, malum in aquis stillatis, & Rabi. fiat ex aqua, & oleo, vt calorem aduerentem abrupas. confert in his cassia, zuc. viol. & id generis. de materiis contingenter repetis Auic. vult sanguinem mitui in principio phleb. si egerit sanguineus, & causam factus fuerit ex cholera à putrefactione sanguinis generata, & præcipue si nouum totum subtile sanguinis conuersum fuerit in choleram, sed ratione materie propriæ febris Auic. non consentit phleb. quia ait, inflammabit fortasse eos. facit enim ebullire humo-

res motos, cholicos, & iucrudat phlegmaticos. idem affirmat Guil. & de sang. è naribus quia acuit humores & nocet quando cholera non est sic mixta sanguini, vt sequatur eum in euacuatione. cuius signum est vrina subtilis, ignea, sed non est permixta. verum mixta est, quando est grossa, & rubra, & tunc fortasse Auic. confert, quia minorabitur materia febris. Gord. nunquam in causione fiat phlebotomia euacuatione minorauit. ait Auic. quando indiget euacuatione, euacuatum cum his, quæ ad febrem tertianam, nec differas si materia est praua, & multa, & Viat. in parte purga, & remoue materiam cum thamar. prunis, violis, cassia, & huius. in magna dosi, vel in parua si misceas electuarium de succo ros. in vero, in uotho reub. vel agar. nam ait Auer. 7. collig. licet purgare in principio cum attritu. in augmento ait Viat. non euacues: quia natura remouebitur à regimine febris & proprie in crisi facienda. euacuationem eradicauiam ait Auic. facias apud digestionem completam. vnde in mediis tempore digere cum syrupo non acetoso, quia maxime acuit, facta tali euacuatione, da prouocantia frigida.

Dicitur quod decoctio foliorum, vel florū tassi barbati bibita cum syrupo mitigat calorem, item cimbalaria bibita emplastrata, itē portulaca cum farina hordei cocta emplastrata super stomacho, ventre, & hypo. & repetita. item oleum de raris innunctum frontii, & temp. item semen pastinacæ tritum, & bullitum & cum zuc. fiat syrupus. & cum eadem decoctione exhibeat. curat statim febrem, acetum, in quo bullient absinthium iunctum super pulsus & tempora. mitigat calorem.

De febre phlegmatica.

Febres phlegmatica dicitur communiter amphimeria, vel quotidiana: quia per totum, vel ferè totum diem affligit patientem. pueri, mulieres, senes, otiosi, eunuchi, & id generis capiuntur ab hac febre. causa ait Auer. 3. collig. est opposita causæ cholericæ.

Huius alia est continua, ait Serap. cuius humor putrescit intra venas, alia interpollata quæ extra, & in tertijs humiditatibus. quæ sit à phlegmate naturali, pura dicitur, quæ ab in naturali, vocatur notha. verum raro reperitur. innaturale est salsum, dulce, acetosum, & vitreum. & hoc species sunt quotidianæ unthæ quæ sunt periculosisiores cholericis ob grassationem phlegmatis ob opilationes, quæ sunt ab eo, & ob interpol. quæ est valde brevis. dixit Auic. longius tempus eius est augmentum, quia materia est grossa, viscosa, tarda accendi & tardatur apparatus digestionis 18. dies. vnde

in longior est declinatio eius quam tertiana. eradicatio eius est in ter. 64. dies. dixit Gord. sicut febris quartana raro reperitur continua, sic quotidiana raro in seipollata.

Febrim phlegmaticam futuram esse significat, ait Gal. 2. de crisi nascitur fatietas plurima, tarditas in digestionem, eructatio aceto sa, somnolentia, pigritia ad motiones, appetitus defectio, grauitas totius corporis. & Gail. vrina grossa, & alba.

Febris phlegmatica signa demonstratua ait Gal. 2. de differ. feb. est primum quod incipit a frigore extremorum, & ait Alm. in dorso. ait Serap. sentit ille cui scilicet febris aduenit, frigus ob partem phlegmaticam, quod non potest adhuc & in fine febris facit horripilationem ob phlegma, quod iam computruit, & ignitur. ait Gal. phlegma putrefactum non mordicat membra sensitiua valde, vnde accidit in ea rigor, sed frigus in superficie corporis, & extremitatibus: proprium enim est rigoris phlegmaticae, quod frigeat superficies corporis, & extrema sine tremore, & est difficultas calefactionis corporis, & protoga tur mora, & tempus augmenti.

Secundum signum, quod corpus difficile calefit ait Galen. sed Alm. tempus rigoris est prolixum, & vix calefit: & vt plurimum calefit, & iterum frigeat: quia phlegma hoc est grossum, & viscosum. & Auic. frigus non venit subito, sed paulatim ex extremis in totum corpus.

Tertium ait Gal. ad Glanco. calor torridus cum quadam acedine innemitur a mano: quia ait Ser. ex tali humore vapor eleuatur sicut ex lignis viridibus. & Haly. humiditas est ob phlegma, & pauca caliditas ob putrefactionem, & calor ait Alman. non est vt in tertiana vehementis incendij. & calor ait Gale. 2. de differ. non est per totum corpus aequalis, sed manus sentit in vno loco asperitatem, in alio lenitatem, quasi calor coletur per cribellum. quaedam pars putrefcit, quaedam minime. quare ait Auic. tactus calor in primis est debilis, & vaporosus, deinde si positio manus prorogetur, sentit acuitatem debilem, & non equalem, & xper non desiderat aetern frigidum, & aquam frigidam, vt tertianarius.

Quartum pulsus est inaequalis, & paucus in principio & in augmento est inaequalis, quia materia grauat virtutem, est debilis ob virtutis imbecillitatem, est paucus ob frigus phlegmaticae. sic Gale. sed Haly. pulsus est minor pulsu quartanae, tertianae, & spissior. paucus est quia virtus deficit a frigore, dissoluitur, & angustatur a multitudine eius. spissus est, vt recuperet magnitudinem. est rarus ait Auic. ob frigus materiae, est debilis ob multitudinem.

& Girard. pulsus est mollis ab humore latus ob descensionem, & multitudinem, tardus ob caloris paruitatem, diuersus in fortitudine, & debilitate: quia nunc materia dominatur naturae, nunc natura materiae, & est breuior, & rarior pulsus tertianae, & quartanae in quolibet tempore.

Quintum vrina est in principio alba & subtilis ob cruditatem, & in fine rubra, & grossa ob decoctionem, & quandoque quia noua materia mouetur, definit febris omnino, reddijt alba, & postea rubra, & grossa. & hanc Auic.

Sextum ait Gale. 2. de crisi non habet anhelitum magnum, frequentem, nec inflammationem. & Alm. est expiratio maior in inspiratione: quia maior est necessitas emittendi fumos putridos, & capinosos, quam attrahendi aerem frigidum.

Septimum ait Galen. t. ad Glanc. vomitus sunt phlegmatici, & quae per ventrem excernuntur, frigidiora, crassiora, & aquosiora, & totum corpus indigestis humoribus est refectum nisi ait Serap. complexio aegri sit calida, aut eius, cuius cholera prohibetur itread venas in vijs vrinae, & non ad intestina. vnde in his aliquando est egestio cirina.

Octauum longitudo paroxysmi est longior quam in tertiana, & inualio vt plurimum est in fine diei iuxta noctem, ait Alm. & Serap.

Nonum, ait Gale. aeger nunquam immunis est a febre. idem ait Serap. & secundum calorem, & pulsus, quoniam ait Auic. materia cum grossitie est multa. vnde non potest tota resolui, imo manet, vt cinis humidus, quare ad saluam quietem tendit. effusum vero caloris reliqui aggregat materia pro nouo paroxysmo. tamen si materia est dulcis, & benigna, & aliquando salua, soluitur a febre in 12. horis, & aliud tempus est verè quietum.

Decimum omni die inuadit vt ferunt omnes medici, dixit Gal. ad Glau. quotidiana vera quotidie anticipat, vt primo die inuadit in primam horam, secundo in secundam, tertio, in tertiam. non vera postponit vt primo die in tertiam horam, secundum in secundam, & tertio in primam.

Vndecim, ait Gal. 2. de crisi sudores non erant in principio vniuersali, & si erit ait Alm. erit paruus, & viscosus ob grossitatem materiae. quare Auic. paucitas sudoris est proprium signum: quoniam vapor phlegmaticus difficile penetrat per poros ob grossitatem, & viscositatem. sed cum materia est digesta, vt in statu, tunc incipit sudor: nam significat materiam subtilem, & fluidam.

Duodecimum dixit Gale. de crisi non potest aqua frigidam, & prius sitit, quam in alijs febri.

febris. & si sit ait Serap. non est ob phlegma, sed ob putrefactionem, & Auic. propter falsedinem. vnde ait Serap. & Gerardus est in spidum, horridum, vel mali saporis, vel cum mucillagine viscosa, tamen processu temporis, si putrefactio fuerit magna, & maxime ex phlegmate in ore contento, os & lingua exficatur, & aspera fit, & nigra, tamen quod adhaeret ei, est viscosum.

Decimamtertiam ait Gal. 2. de crisi fortasse laesio est in stomacho, vel in hepate. Serap. & Ras. est dolor stomachi, & nausea, vel vomitus, deiectionis appetitus est signum commune in omni phlegmatica. ait Guil.

Quartumdecimam cum protogator, facies inflammatur, & sit viridis ob fortitudinem phlegmatis. Gal. Alm. Auic. & Viat. ait calor est viridis ob frigus mortificans: citrinus ob calorem putredinalalem.

Quintumdecimam ait Auic. ructus acetosus ob diminutam digestionem praesertim, in principio & augmento.

Sextumdecimam Gal. 2. de crisi, & Auic. inflatio laterum fit ob expilationem, & multiplicationem ventis, & propter dextri hypochondrii in principio, & augmento. in statu minoratur ob digestionem factam in materia.

Decimumseptimum ait Sera. magnam fit splen ob grossitatem materiae, praesertim in statu. dixit Auic.

Decimumoctauum incipit cum grani, & profundo somno ob elevationem vaporum humidat caput, nisi humor sit falsus.

Decimumnonum aliquando aggrauat praesertim in principio parox. virtutem adeo ut fiat syncopis non vera, fed ait Auic. ob debilitatem oris ventriculi, casum appetitus, & priuationem bonae digestionis: & quandoque sit 2uar ob declinationem caloris ad medium, & eius extinctionem factam ab humido peccante.

Vige, sumitur a rebus naturalibus, vt complexione frigida, & humi. etate puerili, sexu femini, compositione densa, habitudine pingui: a no naturali, vt hyeme, & id generis.

Summam signorum colligit Rabi a Gal. 2. de crisi. haec sunt septem. primu febris in primis diebus no incipit cum rigore, sed postea, & frigida sunt extrema. secundum pulsus inaequalis, & corruptus in ordine in principio paroxif. tertium non sentit inflammationem vehementem, & sitis est minor quam in alijs. quartum non iudat fortiter in primis diebus cum indigestione vrine. quintum forte non fit hac febris absque lesione stomachi, & hepatis. Sextum in hypocondrio fit inflatio. Septimum color est inter citrinum, & album in statu. dixit Gilib. quaedam sunt acci-

dentia superuenientia, vt dolus capitis cum granitate, & praecipue occipitij, abundantia salutarum, stupor sensuum, & hebetudo, indigestio, & grauedo maior post cibum, dolor stomachi, lentio laterum, & ralcationes, & emulsiotiones plurimae sine causa manifesta, facilis defudatio, fastidium cibi, & porus, in somnia aquatum, & balneorum, & huius. contingit aliquando angere febrem 1a die tertio, vel quarto ob maiorem accumulationem phlegmatis, quam ob permixtionem cholerae, vel melancholiz. ait Ras. quando phlegmatica in omni inter. resoluuntur, brevis erit ob phlegmatis paucitatem, & subtilitatem, & pororum aperitionem: & si cum hac fuerit sudor erit securitas maior. dixit Gal. ad Glau. cum quotidiana non recte curatur in macronoxia uertitur, & hinc in quartanam.

Signa specialia febris putridae periodicae purae factae a phlegmate naturali sunt, ait Gerard. haec febris libenter inuadit cum oscitationibus, & alicibus cum quoda stupore & paucitate sit, rubore, & liore faciei mixtis, & dolore stomachi continuo. incipit cum paucifrigore extremitatum, pulso occulto, & cum uenit ad statum calor est lentus, occultus, pulsus est semper diuersus. terminatur cum paucifrigore, & urina in principio est remissa. inuadit in horis phlegmaticis, frigus est longus & lentum, & calor ait Gilib. gelio est liquidus phlegmatica salinae abundantia, & maxime in statu, & in augmento labia liuida, ructus acidus, & fluxus, & corsio in ventre, & Plat. caput graue, urina inquit Ferra. est alba, & spissa cum inaequali, & non pura subsidentia, in augmento, & statu subpallida, vel spissa. Guil. pulsus est paruus, velox, spissus, & mollis vrina quod plus accedit statu, eo magis subniliatur, & clara fit.

Signa quotidianae nothae factae a phlegmate dulci sunt ait Gal. 2. de differ. paroxif. in horis sanguinis & mane ait Rog. vel in horis phlegmatis circa media noctem. inuadit primo cum paruo frigore, vel nullo, vt vult Gal. le. rigore, vel typo, & vt ait Auic. nisi praecesserint plures paroxif. quia est ex materia dulci, & benigna. postea materia fit maligna, ex quibus accedit typus. vnde Beltramus. haec febris est quasi continua, & nullus adeit typus & calescit gradatim, ac calor fit magnus, inquit Gilib. & Rog. accidentia ait Gilib. sunt calor, sitis, & frigus. medietate adeo quod accidentia coloris remissiora sunt, quam in tertiana vera, & quotidiana a phlegmate falso. itaque accedit dolor capitis grauatiuus, & praecipue frontis: quandoque stomachi fastidium, & oris dulcedo in principio parox. et uariationes facit de quales ex ouis comestis, sator nimis in-

egestione, in flatio laterum, & nulla sitis, urina & ruffa, vel subrufa distincte liuens in subflantia spiffa, hæc Gilib. & post magnum calorem descendit cum maiori sudore, ait Rog. hinc elice duo signa huius febris: nullus. f. uel ferè nullus rigor, & nulla vel pauca sitis respe-
ctu aliarum febrium.

Signa quotidiana facit & phlegmate falso, sunt ait Gilib. quod in hac febre est dispositio medica inter tertianam veram, & quotidianam veram, & hora motus eius est inter motum cholerae, & motum phlegmatis. unde hora diei nona incipit paroxysmus. in meridie innadit igitur ut ait Auicenna cum horripilatione, & non sit vehemens frigus: nam phlegma salum est securum mordacitatem ratione cholerae, quæ mordicat sensitiua membra, & mordicando inducit horripilationem, & phlegma salum, cum sit parum frigidum, parum facit frigus nisi ratione caloris retrahit ad intra calor sequitur magnus, nuda lingua salia, sitis, pulsus velox, & spiffus, capitis grauitas, aurium tinnitus. hæc Gilib. unde Viar. inquit. cum videtur ægrum sitientem, & siccum os habentem, febris est & phlegmate falso, stomachi falsidii ait Ferr. urina inquit Rog. est ruffa, vel subruffa, vel citrina incensa mediocriter spiffa, vel mediocriter. ait Plat. tenuis, & Ferr. superius spiffa, inferius tenuis propter phlegmatis falsi qualitatem, & non phlegmatis admirationem, & idem Gilib. Ferrar. quia hæc febris maxime in ætate, & iunere fit, creditum est dupplicem efflorescere. sed duplex tertiana noctua nullam, aut parum habet requiem: quia una tertiana 24. horas in festat, & alia similiter: & hæc quotidiana minus durat: nã pateret 2. perseverat horas in summo labore, sex in salia quiete, & sex in meta invadit ait Rog. aliquando in horis cholerae, aliquando phlegmaticis, aliquando melancholicis. dicunt quidam: sequitur horripillatio, rigor, & tremor plus, quam in cæteris phlegmaticis, sitis est maior, & siccitas oris, calor maior arina cum aduenit digestio est mediocriter spiffa, cum indigestio est tenuis, uel multum spiffa, pulsus, maior, velocior, & frequentior, somnus minor, & ut plurimum est cum pruritu & scabie.

Signa quotidiana facit & phlegmate vitreo, uel mucillaginoso, ait Plat. sunt qui post tertiam horam noctis inuadunt, & Rog. quædoque in horis phlegmaticis quandoque in horis melancholicis in festat. sed frequentius circa mediam noctem inuadit igitur ait Auicenna. cum frigido magno, & nitreo frigus est intensius quia est frigidius acetofo. frigus tamen non incipit subito, imo paulatim in extremitatibus ob grossiorem materiem & deuenit ad fri-

gus nimis, congelatum, & ait Rog. frangitur tum tuncuratum, & uix calefit, & cum reatit frigoris: quod contingit ob diuersitatem materiei, quæ mouetur ad putredinem: & Aut. cen. forte miscetur in principio frigoris horripillatio, & parua punctio frigus fit ob materiam, quæ cum computruit, & horripillatio propter illam quæ computruit, in flatu. vniuersali, maius est frigus, & maior rigor ob materiam subtiliatam, unde fortius mouetur ob quem motum trahitur calor ad intra, & sequitur maior concussio, quæ ante in primis paroxysmis, quandoque fit paroxysmi. sine frigore, & rigore, vel horripilatione quia materia tunc adeo pigra mouetur, ut non ledui possint membra, ob quam lesionem. retrahatur calor, & non in frigore manifeste. quare febris hæc est pigra, ut ait Ras. in diuis. longi paroxysmi, & difficile calefit ob grossiorem, & con-
gulationem materiei: aiunt, quod incipit cum graui, ac profundo somno, sequitur, ait Ger. debilis, ac lentus calor, ac ouilla sitis, multa oris humiditas, multa salua ob phlegma huius factam, pulsus in principio debilis, & occultus ob sortem constrictionem arteriarum, in statu debilis, paruus, & gracilis ob paucitatem caloris urina alba aquosa, & mediocriter tenuis ob materiei compactionem, opilationem, & cruditatem. sed postea, ob calorem putredinis fit ruffa, & spiffa. Gilib. ait, quod si globa huius phleg. fuerit tenuis, in ea significat phil. vitreum non putrefacientem: si lactea, vel glauca cum globa in fundo, putrefactum. in ege-
stionibus videntur mucilagines ad modum vitri liquefacti, uel albuginis ouid addit Gilib. grauedo capitis, & corporis, & indigestio ventris, & lateris, uiscerum in flatio, dolor stomachi, & intestinorum, grauedo reatum, & inferiorum partium dorsum. tandem ait Plat. sentitur dolor circa loca, & magna frigiditas, in quibus continetur materia. unde Ferrar. si phlegma est in intestinis, tale inducit dolorem, ac si cerebrum perforaret. ciborum indigestio, & in flatio laterum post ubi assumptione & sepe excreantur violenter, & cum magna rui: quandoque album, & clarum, quandoque spiffum, & rotundum quasi cicer, & maxime si materia fuerit in spiritalibus, & quia materia est nimis compacta, febris est nimis longa, & quasi finis est hydropifis.

Signa quotidiana facit & phlegmate acetoso inquit Rog. incipit in horis phlegmaticis & quædoque in horis melancholicis. in festat cum multo frigore, & lento calore, & ad ultimum cum paucio sudore. Plat. in sero incipit inter horas phlegmaticas & melancholicas. parua sit Beltra. est sitis, nullus appetitus, grauedo capitis, uel frontis, conspissatio ventris, dolor in
stoma-

Stomacho, & similiter eius signa sigois quatuor vera cibo assumpto adeit indigestio, tertio, & acetosa erectuario, iostatio post cibum dolor sinistri hypochondrii, & tinnitrix partis capitis, & ex grossa ventrositate generata ex indigestione. vrina subdit Gilib. est pallida, vel subpallida, vel citrina, vel subcitrina cum subuli substantia, & sine globo humoris in fundo, & quo magis est indigesta, eo magis tenuis, deinde phlegmate ente digesto ait Fer. fere per totum inspissatur. hac air, febris non est negligenda, quia ex ea fit etratia, & quartana ait Gilib. ubi est dolor, ibi est locus materiz, & si materia est in spicuatibus, sitis est maior, vrina coloratur, & quedam ampullæ minutæ in superficie eius sunt. Dixit Serapio, omnis quotidiana est longa, & non sine vehementi timore: quia lædit naturam omni die & vt plurimum os stomachi est læsum, & facit nauseam que prohibet cibi assumptionem, & paucitatem digestionis. laluior est, inquit Auicem. que est in interpul. magis munda; vt que fit ex phlegmate dulci, & que est absque accidentibus, & multi sudoris Serapio. que fit à phlegmate vitreo est multorum mentium, unde periculosa est ait Annetro. que à phlegmate mucilaginoso, & que ab acetoso. & que à falso: quia est acutior. Auicem. diurna est longior, & deterior nocturna: quia calor febrilis, & diei vniit exsiccat adeo corpus, vt periculum fiat hædicæ: tum quia contendit eam, quæ aperit poros, & ipsa claudit ob materiz multitudinem: tum demum quia patientes in dicta febre conantur comedere in nocte.

Curatio quotidiana periodica pura.

Omnia febris phlegmatica est difficilis curationis: quia ait Gilib. cum causa antecedens sit frigida, & humida, est contraria morbo, qui est calidus, & siccus. tamen principium curæ est à causa antecedente, & perficitur dixta, & potione. aer igitur sit clarus, subtilis ad calidum, & sic cum declinans naturaliter, vel arte. gaudet æger, quandoque irascatur præsertim si à profundo somno corripitur. quies est fugienda, frictio sit sicca incipiendo ab inferioribus ante cibum, & si tempus permiserit, per horam ante paroxysm. ait Auic. frictio cum tela aranæ, & oleo communi, vel alio aperitiuo iuuat à pro-

prietate, & Ger. fiat citra ventrem, & latera fortiter aliquando cum manibus, aliquando cum pannis asperis secundum diuersitatem particularum aliquando cum hac vntione que Recipit aquæ dulcis libri nna vini vni iiii. acet. vncias ii. radicem apii vncias ii. olei chama. vnc. ii. bulliant simul, unge ventrem, latera, & totum dorsum calida vntione. caue balnea ante signa digestionis & nisi declinatio incipiat, nam ait Rasim. diuis. mane mittat in balneum ut fuder in eo & Haly. sit aqua fusa ex decoctione rerum subtilantium. fuge somnum longum præsertim diurnum, & io paroxysmo usque ad eius declinationem: & ait Auicem. sit somnus tantus ad digestionem materiz, quantæ vigiliæ ad resolutionem bonam superfluitatum. fuge cibos unctuosos, crudos præsertim ait Auicem. & Serapion: aquam frigidam, nec pullos, nec carnes usque ad declinationem. vniuersalem nisi virtus sit debilis: item lac, mel, pisces, oleta, & omnia frigida, & humida. regimen sit magis ait Auic. inbile in hac quam in quartana: quia est à materia ampliori, & humidio. sed nec tantum quantum in cholericis. inquit Rasim. con. subriha regimen usque ad septem diem, & si uider eam diminutam ualde, procede hac ma. in mous, ingrossa, ne virtus decidat: idem dicendum est in augmento & statu, qui cū sit subtilioris diæte, quàm alia tempora, cibi sine aqua cicetis, asparagi cum oleo, & sale ait Sera. spinachia cum aceto, muris, cinnamomo, nuc passæ cū zucchero pistachia, cappares, & ait Isaac. pisces saliti, oliue condite, Alm. acetum, oleum, & sal, caules, sinapis cum omni cibo compententi. potus in quotidiana pura ait Serapione secantisbin, aqua mellis, & aqua zucchari in quotidiana à phlegmate dulci aut falso aqua hordei, zucchero, acetum, limphatum, syrup. acetos. & vinum bene limphatum in aqua hordei. Coque, ait Auerroes masticem, uel pipper, uel radicem feniculi, post septem diem detur uinum cum aqua decoctum sit mastic, mentha, uel anisum. & Isaac si æger sitiat, da aquam calidam, que incidit ob calorem actualem phlegma, & cogit descendere ad inferiura, & sitim reprimat. in quoti. à phlegm. mucilagino. acetoso vitreo, usque ad decimam quartam bibat oximel simpli. deinde compositum, uel aquam mellis, in qua decocta sit mentha, post decimum quartum vinum subtile, limphatum, maxime cum phlegma incipit digerit. ait Guil. bolliat cū p. ullis tartari puluerizatis, & cicotrinizatum, aut

cum iure ouorum : abstergit enim multum à phlegmate stomachum , & intestina. Dicit Serapio . sit hora comedendi post quietem febris , aut ante paroxysm. per tres aut quatuor horas, siue septem , & non minus, quam quatuor ante paroxysm. & Alman. hora sit quantum possibile est distans à paroxysmo .

Cura quotidianæ putæ altera vniuersalis est , alia particularis , & hæc habet sex intentiones , materię digestionem , & æquationem , euacuationem eius , & resolutionem , membrorum confortationem , & rectificationem materię , ne ad nobilia cadat membra , alterationem febris , & accidentium correctionem . vnde cura respicit aut morbum , aut causam morbi , aut accidentia . sed in hac febre intentio maior sit ad materiam , quam ad morbum , quia maior est materia , quam calor , vt ait Haly. quare ait Auerr. 7. collig. febris à phlegmate dulci , ac naturali si facta fuerit incide humorem, subtilia , & apert opilationes plus quam infrigides , & humectes : quia incidunt materiam , & congelant . præter has intentiones stude , ne humor putrescat lenias materias communes, minores, eradicet . leui in principio vniuersali , & euacua materias communes ; quoniam in hac febre plurimè reperiuntur, & id ait Serapio . cum aqua geleniabii , cum aqua iuleb . & cassia , & ait Auicenn. cum geleniabii facto ex zucaro & rosis, quæ soluant. aqua prunorum, & thamaris. & id generis debilitant stomachum . clysteria sunt oportuna , & si nausea afficeret egrum, aliquando consert. vomitus leuis . mane & vespere quotidie cum clystere vel cum suppo. exoneret fœces . & si post lenitionem videris vrinam rubeam crassam & sit æger complexionis sanguinæ mitte sang. qui est materia contingenter reperta . & ex materijs communibus contingenter repertis est materia quædam subtilis aquosa reperta in gibbis hepatis , & venis gibbo vicinis , quæ lenitet per vrinam educenda esse , post tres , vel sex dies digere , & digestio , ait Ras. 16 . con. est transmutatio phlegmatis in sanguinem. quare ait Auicenn. subtilia , incide , & apert idest digere primo cum lenibus, deinde cum fortioribus . quare Auerr. da lisingibin cum iure cicero, & radice liquiritiæ spicam , & masticem. ad digestionem complendam non est opportunum ait Auicenn. quoniam cum materia sit eterogena scilicet alia grossa , alia subtilis , alia viscosa , alia non, oportet, vt ex ea euacuetur aliquid , & in reliquo digestio fiat . vnde Haly . cum signa digestionis

videris , euacua phlegma in hebdomada semel . ait Galen. in libr. primo ad Glauco. vnde des syrupum acetosum , neque valde extinguentia , nisi post tres , vel quatuor dies , vt subtilietur materia à calore febris, nam febris , quæ quotidie affligit , putrefacit phlegma , sed post hos da syrupum acetosum , & ea ait Serapio. quæ prouocant vrinam . detur geleniabii purum , digerit enim materias phlegmaticas in stomacho , abstergit , & confortat ipsum . & Auicenn. & cum illo , & sipe illo da aquam feni. vel endi. vel apij. & hæc post quartum diem . vnde Recip. aquæ feni. & apij ana vnc. iij. & aquæ endi. vnc. iij. vel his rescolati vnc. iij. bulliant vnicâ bullitione, vt depurentur , & Auicenn. hoc tempore da syrupum acetosum cum aqua mellis , vel hyssopi . Fer. oximel simplex cum aqua calida, alij oximel cum modico syrupi endi. vel Recip. menthæ siccæ & hyssopi ana Manip. j. passularum, anisotum ana vnc. vnam endi. uic. dichoreæ, lupulæ capiluen. ana M. med. semis, communium frig. ana vnc. med. fiat decoctio & cum zucaro & gelenia. fiat syru. & da. postea euacua, & post 7. da, ait Auicenn. geleniabii cum confortantibus os stomachi, plus digerunt. sed cum videris digestionem , quod sit in augmento , adiuua eam cum folijs fornicali, apij, radicis squinanti, capiluen. & id generis. transita autem quarta sepeimana , ait Alman. trade trochiscos de rosis completos cum aqua cicieris : quoniam æger potest deuenire ob defectum stomachi , & hepatis in hydropem . vnde in sine augmento, da syrupum, qui Reci. corticum rad. apij, feni. petros. asparagi, brusci , & eorum seminum , anisorum , passularum ana vnc. j. ameos, dauci , carui ana vnc. med. dichoreæ, endiuiæ capiluen. colopen. man. j. squinanti , calami aromatici , corticum rad. cap. menthæ siccæ , hyssopi sicci , calamendi ana vnc. ij. in horum decocto fiat syrupus acetosus cum zucaro, & melle. aromatiza cum ciuamomo , & nucce muscata . veniente statu , da syrupum de bisautis , & de eupatorio , vel Recip. scolopend. eupato. calame. hyssopi, menthæ maioranæ , ana manip. j. corticum radicum cap. ciperi , affari , squinanti , calami aromatici ana vnc. med. quinq. rad. passul. anethi , ameos , seminis apij , petroseli asparagi , brusci ana vnc. vnam fiat elect. & syru. aromatiza , vt supra . ad euacuationem ait Galen. 12. method. frequens , & paulatim fiat euacuatio : & Isaac, licet non ostendat vrinæ digestionem , tamen alia signa eam declarant

rant . alia signa sunt iustatio , & gurgulatio intestinorum, stomachi abhominatio. quæ indicant materiam esse subtiliatam, dissolutam, & paratam expulsionioni . hæc de digestionem, & euacuationem aggredior , quæ completur per secesum, vomitum, & urinam, vomitus multis placeat: quoniam phlegma continetur in stomacho, qui per vomitum facile euacuatur . vnde Serapio. si in hac febre non accidat vomitus non constringas, & proprie in principio paroxysmi. si non natura, tu arte prouoca cum raphano infuso in secaniabin, & aqua tepida, vbi decoctum sit anethum, calamentum , & aliquid salis mixtum cum secaniabin, in quo infusus sit raphanus . & Haly. vomitus est vltimum, si stomachus vacuus non sit, comedat cibos salitos prius . & Ras. in diuis. vomitus sit cum syrupo acetofo cum seminibus subtiliantibus, & incidentibus, vel vomitus cum semine raphani, rape, attriplitis, anethi, & huius. & subdit Auicenna. oportet, vt expellatur septimus dies, quia ante digestionem, agitatur materiam crudam, & cum sit valde laboriosus, potest debilitare stomachum, & attrahere materias ad ipsum, & ait Auicenna. si vomitus sit eis difficilis non prouoces cum sortis vomitino . si in principio paroxysmi accedat vomitus, adiua: si in augmento, & statu, adiua eriam, quia breuem reddit futurum paroxysmum. dicit Viar. si vomitus eueniat spontaneus in iuitio morbi, lenitatem, & subtilitatem materię portendit, si non veniat, ne prouoces arte: quia non moneri vomitum in hac febre grossiciem in principio materię, & coagulationem denuntiat, & tarditatem ad digerendum . De euacuatione secessiva ait Ras. in con. laxatio confert, sed non valde in hac febre, tamen quando necessaria sit, incipe à debiliiori, vel saltem à minori dosi: nam per tempus longum materia inciditur, & subtiliatur, & apta redditur expulsionioni . vnde tunc non timetur forte solutium, & sic procede vsque ad statum, in quo si materia est apta educi natura in crisi, sine sin minus, vt ere euacuatione eradicatiua . & cum videris inquit Auicenna. phlegma iam digestum, scilicet egredi in vrina & dabis omni nocte medicinam de turbit, & parantur pituitæ dulces cum speciebus scilicet elephanginis. si virtus tolerabit, & materię digestio sequetur . sin minus: interpone tempus conueniens, vnde Gual. sumat de tertio in tertium medicamen prædictum aureum vnum . Aliud, quod Recipe turbit optimi vnc. iij. ligni aloes vnc.

j. zuccari albi. vnc. iij. misce. & Auicenna. ait Almanf. dat pilulas de mastiche, quæ non sunt soluturæ bis in hebdomada ad stomachi corroboracionem debilitati ob medicamen solutiuum . & hic modus est regularis. tamen quandoque coacti syncopi, vel alijs accidentibus ehibemus post lenitionem medicinam solutiuam . quare Alm. prequidens hæc nomenclatur dat in principio medicamen de turbit in parua tamen dosi, & sæpe ne sit maior agitatio, quàm euacuatio, & quando phlegma aquosum in stomacho continetur, & vijs propinquis, ne misceas zinziber . quando est grossum in stomacho, & vijs propinquis, misce parum zinzib . si phlegma grossum continetur in locis remotis, misce plus zinziber. Auer. septimo collig. recipit syrup. squigibin factum ex decoctione radicam ireos, seminis apij, & liquiritiæ, & dat per per hebdomadam vnā: quia præparat humorem, digerit, & habilem reddit expulsionioni . & addit agaricum cum med. de turbit, & sineo: quia euacuat humorem grossum, & aperit opilationes . sed causæ colloquant. Serapio. post 14. dies euacuat assidue cum pilulis de aloë, aut de speciebus alephanginis, aut de eupatorio, idem ait. Recipe hieræ vnc. vij. turbit vnc. x. mirabol. chebul. dram. mez. trochisc. de toli. mino. vnc. iij. eupatorijs vnc. med. salis indiduo. iij. bedeguar, suchabana vnc. iij. anisi vnc. iij. confice cum aqua apij bulliata, & colata . valet febrī phlegmaticæ, & roborat caput, & stomachum, & minoratiuum bonum sit ex calisæ pulpæ vnc. j. vel plus in decoctione anisi, tenculi, & liquiritiæ, agarici vnc. vnā: salis gemmæ dram. vnā aut turbit vnc. vnā, zinzib. dram. vnā. Gual. medicamen de turbit. Recip. turbit. vnc. x. zinzib. vnc. med. zucca. albi vnc. xv. masticis vnc. j. est fortius quam illud Almanf. quia plus zinzib. recipit, quod magis aluit turbit. vnde trahit phlegma grossius & magis à remotis . & Almanf. aliud posuit fortius. quod Recipe turbit. vnc. vnā. soc. absinthij quartam vnc. vnā. agarici, hieræ picte ana vnc. mez. mastic. sextam par. vnc. vnā. confice cum syrupo acetofo mellito. conuenient & pilul. stomatichæ, cum turbit decriptæ in Antidot. illis . & plura habes apud Auicenna. si verò ob aliquam causam non potest dari medicamen solutiuum, veni ad prouocantia vrinam, & sudorem, & incipe à debili & procede ad fortiora . itaque Ras. in diuis. ait . cum morbus prorogatur ,

quando scilicet perueit ad statum . da trochif. de eupato . & medica . diureticum , vt semen anib. ameos . & apij . & fac hoc ait Auic. miorata pluries . aut euacuata materia . item ait Auic. nou facias vñtiooes , nec embrocationes . quando morbus est in principio , & humor est in corpore dilatabilis : quoniam mollificant viscera , & humorem fluxibiliorem efficiunt . sed cum apparet digestio , & morbus est in augmento , vel saltem in secunda parte augmenti , hæc vngue ta adinuunt digestionem , & confortat . vñge nisi accideutia sint scua , & virtus sit debilis . coufricando . vt profundius penetrent . sint olea subtilia temperata , & anodina . quidam vngunt spinam . dorsum , & iuncturas ad rigorem prohibendum .

Ad alterationem caloris febrilis in quotidiana . parum aut nihil scribitur : tamen Serapio . ait si necessaria fuerit aqua hordei . coque in ea radices fœotuli , & apij . & detur cum secaniali in dextera . & si accescat in stomacho , da aquam mellis decoctam , aut aquæ hordei adde parum spicæ . & masticis .

Ad coofortationem membrorum principalium . veluti oris stomachi da aromaticum ros. gariof. de ligno aloes . & gradatim ad theriacam . & diatrion pip. deueni . atque præferunt . ait Galen . si hyems . ætas senectutis . complexio frigida . & humida . & vrina alba . & ait Ras. in diuis. nuquam postponas curam stomachi . sed confortata cum olibano . masticæ . ciperò . & huiusmodi cal. stipticis . odorif. ad extra . ait Serapio . in hora status arteode ori stomachi . & Haly . cum confortata cum emplastris constrictiuis . & Viac . cum oleis calidis . vt nardino . masticino . & id generis . & Auic . id facias . in augmento idest post 7 . diem . & post lenitionem mucilaginum . & eorum exclusionem per vomitum . & inquit Auic . masticæ mentham . masticem . & anisum : & misce cum geleniabim decoctum anisi . & masti . & post 14 . dies vtete trochiscis de ros. is . thure . masti . & absy . olea sint chamæ . anethinum . nardum . costinum . & similia simul mixta . cooforta hepar . vt bene sanguificet . & cor . vt addat spiritus . & calorem . cerebrum . vt virtutem animale . sensitiuam . & appetitiuam .

Accideutium correctio . si ceciderit appetitus . ait Auic . da vinum . in quo bullitum sit mellilotum . chamæ . da qili . & absynt . aut fiat ex his emplastrum de foris . si vomitus infestus . da ait Serap . syrupum citroiorum . menthæ . granatorum factum cum melle . aut Recip . granorum granatorum vñc . x . thuris albi . masticis ana vñc . v . menthæ vñc . vij .

coque cum lib. ij . aquæ ad consumptionem mediæ tatis . & da omni hora . & Auic . detur mîua aromatica . & syrup . de mentha .

Si doleat caput . recipiat vaporem decoctionis chamæ . deinde ponat manus . & pedes in dicta aqua bene calida . & stringe crura fortiter . & ne vngas cum oleo : quia opilat vapores . hæc Serapio . & hæc euaporatio si à vapore fiat sôda . potest fieri omni hora paroxismi : si vero ibi esset humor . ne fiat . nisi post minorationem .

Si fluxus ventris fiat . cooforta . ait Auic . ante cum alstringentibus . veluti hepar cum semine cuscute . stomachum cum mastice . & aniso . splenem cum radicibus apij . scolopendriz .

Cum times ait Haly . opilatiorum . ob quam stomachus . & hepar non digerant . vnde superueniat cachexia . da trochif. absyn . aut lacce cum squingibio . & fugiat aquam copiosam . frigidam . quare Auic . si facies . & extrema inflantur & cachexia . dentur trochisci de lacca . & viles sunt . qui Recip . uardi . assari ana . confice cum vino decoctionis saluæ . & cum dicto vino accipe . aliquid squing . ait Auic . si palpebræ & pedes sunt inflati . quia perducit ad hydropem . sed ait Alman . 18 . con . da prouocantia vrinam cum policariis . & absynt . deinde cum diacur . vel Recip . anisi vñc . iij . folij . absynt . spicæ . amigdal . amarum ana vñc . iij . aloes vñc . iij . succi policariæ vñc . iij . sem . apij vñc . j . fac trochiscos cum succo anisi . & apij . & dentur cum decoctione seminis eorû vel cum syrupo acetoso .

Si frigus fuerit superfluum . ait Serapio . accipiat æger in toto corpore vaporem aque decoctionis chamæ . mellilo . sanis . torisina . assari . & id generis . deinde vñge cum oleo decocto . & Auic . post principium vniuersalem da aote paroxysmum aquam decoctionis sem . anisi apij . & oxim gariofil . calidam . & embroca . & vapore . & Rogi . pone quandoque manus . & pedes in aqua calida . aut luxiuo . aut vino . aut in balneo calido . aut ait Auic . frica cum pannis incipiendo ab humeris : deinde vñge cum oleo scilicet dulci . vt de chamæ . de anetho . deinde absterge . & da theriacam . vel alia opiata . vt mitridatum trochisc . de ros . magnos cum aqua feniculi semper ante paroxysm . & materia minorata .

Ad remotionem verò paroxysmi . laudat Gordo . geutianam antea access . cum vino calido . & sicco quod in hac et in quarta valde operatur oximum garioflatum .

pentaphi. folia eius, ciperus, & cuscute mirè profuunt. quidam exhibent vuc. iij. succi apij ante accessionem. Alb. Recip. agarici vnc. mez. succi fumiterre vnc. mez. & da per tres horas ante. quidam dant frequenter ante accessionem vuc. j. agarici cum syrupo acetoso, & valde vile est vitium decoctionis radicum assari. Rasf. 8. cond. da tres guttas, vel quatuor sanguinis extracti ex aure asui cum vnc. ij. aque per horam. curabitur. Empla. ex mica panis, oleo laurino, & vitello oui assato cum melle, & succo, aut pulvere centauree minoris posito super stomachum, & vmbil. alleviat paroxysmum.

In febre facta à phlegmate falso curam maiorem adhibe hepatis, deinde in facta à phlegmate dulci in acetoso stomacho: in mucilla. & vitreo omnibus mutatis.

Quotidiana facta à phlegmate aquoso, curanda est cum victus ratione, & medicina, plus exiccantibus, quam alix febres. leuit cum caliss, melle rosato, aqua hyssopi, menthe, & capili. vomitus maxime confert, digestio sit gelen. aque menthe & sem. mino. sit medicina de turbit. postea digere. cum syrupo de quinque radicibus, & geleoiabin factus acetosus, & aromaticus, cum decocto cyperi, menthe, & squinaori. iterum purga cum medicina de turbit. iterum dig. sit syrups de squinanto, & aqua apij, deinde purga cum pilulis. que Recip. agarici, turbit, chebana vnc. j. specierum. hierc vuc. ij. zinzib. nard. falsis gemæ ana dram. j. in alijs cura vt quotidiana pura.

Facta à phlegmate acetoso, mucillaginoso, & à vitreo, est ferè eadem, tamen accensum postulat medicinas minus aperitivas, incisiuas, & subti. solutius educant materias grossas, difficilis euacuatiouis, & erat. vnde Auetro, 7. collig. hi humores purgandi sunt post iuciosioem, & subtiliationem eorum. Viat. in hora accessionis in facta à phlegmate acetoso, quando rigor incipit, totia vomitum cum oximelle, & aqua calida deco. anethi, & radicum raphani cum calissato decocto politrici, carth. fene & anisi. dig. Recip. hyssopi, haxe, melliss, capil. ven. ana Man. j. radic. apij, petroselin, fenic. endiuie bugloss. ana vuc. j. liquiritie, florum borag. bugloss. thimi. rad. cap. scotopeod. ana vuc. ij. squinanti, menthe ana vnc. iij. passil. sebestem aoa vnc. j. fiat syrupus cum melle, & geleoiabin. aromatizetur cum nardo, mace, ciuauommo, & gariohilis sit medicina de turbit. Viat. in accessione pone pedes, & manuis in decocto chamæ, & anethi mellilo. & td generis, & dentur trochisci de rosis, berbe, & aniso mixtus cum

succo scariole, apij, & oximelle per vnam septimanam. oximel, & mellicratum air const. tu principio huius valde confert.

Facta à phlegmate mucillaginoso, & à vitreo, frictio multa valde conuenit, sed locis, & temporibus idoneis post plures mutationes, cum vino albo subtili, vel meluatico, & aqua. v. rad. vel seminum communium cal. Serapto. air si materia est, valde grossa, potus sit secaniabio: si valde, aqua mellis. Auicen. si est valde frigida, piperis parum, & viuum subtile, sed parum.

Quotidiana continua fit ab eadem causa, à qua periodica, & hæc est aut pura, aut notha. vera sit à phlegmate naturalit putrefacto intra vneas, notha ab innaturali intra venas similiter putrefacto. uotha sit à phlegmate dulci, à falso, ab acetoso, & à vitreo. continua iam altera est latica, alia non latica est occulta, tepera, & vni-formis calor, nec habet typum in principio excrecentiarum. ait Rasf. 18. conphlegmatica continua uouincipit cum frigore to paroxismo, nec terminatur cum tudore, nec in ea est vomitus. in inter-polaris humor est vnus per totum corpus: & extenditur, in continua manet intra venas.

Signa febris phlegmaticæ continuæ non læticæ, sunt quoniam in declinatione, mitescit valde, & excrecentia est quedam iustigidatio circa cutim, & extrema, & maxime circa pedes, osium, & aures, aut quedam somnolentia, alices, & oscitationes. vnde ludæus. multus sit somnus. & Gilius. monetur sine typo, & Giliab. febres frigora. lud. vrina vna die est subtilis, alia: est grossa, ruffa cum multa residentia. calor est multus, corpus est irritatum. non aridum, multum spurum. item obliuio, subeth, pulsus contioio inæqualis, & vrina turbida.

Latica febris est valde similis hecticæ propter vniiformitatem caloris, diuturnitatem, & longam afflictionem, corporis extenuationem, & ariditatem inde sequentem, & etiam ad indigestionem similis est hecticæ: quoniam corpus quotidie magis macrum, & aridum fit. hæc Auicen. sed ait Gvil: à medicis sepe hectica habetur: sed differt: quia in hectica pulsus est subtilis, & stricus, & sicus, & durus: & in latica lentis, & mollis paruis cum quadam lætitudine. hectica quasi semper est vnus tenoris, licet post cibum parum inflammetur: latica

emper magis in principio noctis incipit
nifestare, & circa mediam noctem ma-
gis inflammatur. in hectica urina est qua-
si semper vnius tenoris in substantia. & colo-
re, & est fere similis vrius sanorum, sed olea-
gina in superficie: in lactica sit magis disco-
lorata, grossa, saltem in principio huida, sed
in augmento, & statu sit ruffa, & spissa.
in hectica cutis est aspera, tensa, & arida,
in lactica mollis absque asperitate ma-
nifesta.

Signa febris phlegmaticae continuæ, pu-
re, factæ à phlegmate naturali putrefacto
sunt, ait Gilib. urina ruffa, vel subruffa
per totum spissa, fœculenta, & quasi tur-
batur in superficie liuida, calor enim est con-
tinuus, sed in nocte minor & lentus à prin-
cipio facit modum paroxysmi in horis phleg-
matis siue typo cum capitis gravitate, & to-
tius corporis stupore, facies est tumida,
vel subpallida & litis modica, aut nulla,
oris insipiditas, pulsus latus, mollis, tardus,
& inæqualis, scilicet quandoque fortis,
quandoque debilis. & sicut gartulitas est si-
gnum cholæræ, & taciturnitas melanco-
licæ, ita stupor phlegmatis, palpebrarum a-
dest oppressio, oculorum turbatio, color
subcineritius in facie, ventris inflatio, nau-
sea, & stomachi debilitas & reliqua signa di-
cta in signis periodicæ. & dixit Ras. 18.
con. continuæ febris phleg. quædam est adu-
rens, & inflammatio est circa cor plus,
quam in corpore toto, & id est phlegmate
salso.

Signa febris phlegmaticæ continuæ no-
te sunt omnino similia signis febris phleg-
maticæ periodicæ nothæ, distincta secun-
dum diuersas eius species. verum in phleg-
matica continuâ semper calor est additus (u-
pra calorem periodicæ sibi proportionalis
in materia. Ras. supra, non cognoscitur ut
quem finem debeat peruenire febris phleg-
matica. & quandoque est paucæ quantita-
tis, & in qualitate calor is est periculosus quia
est lactica.

Curatio febris quotidianæ continuæ est si
eius cura ait Ras. diuis. periodicæ, dixit Gi-
lib. in principio vtatur diæta consonante na-
turæ, antequam virtus debilitetur, & bibat
vinum album limphatum, & debile. & si ca-
put est debile, loco vini bibat aquam decoctæ
granorum granatorum, vel sebesten, & mel-
lis, in aqua cicerum rubeorum, folia sielicæ,
cibaria ex folijs feniculi, petro, spinac. car-
næs hedi pullorum, gallinarum iuuenum cū
lactucis, spinachijs, & huius. conditis cum
sacco agrestis, granatorum, & cum cardam-
m. Kog. si in 7. debilitatur, da colaturam galli-

næ. si in 14. & vrius parum digesta, vinum
mellinum limphatum. in continua cibi sint
facilis digestionis, subtiliores, minoris quan-
titatis, & paucæ repletionis, quam in perio-
dica. Phlebotomia magis in continua com-
petit, quam in periodica stantibus conditio-
nibus. dixit Gilib. in facta à phlegmate dulci,
& in naturali, quæ non sit lactica, fiat phlebo-
& Fet. incisio sit lata, vt sanguis crassius creat,
& si status quis sit in venis possit exhalare.
deinde ait Auicem. sit contentus eis, quæ
sunt sicut syrup. acetosus, geleniab. iulep
de melle, & aqua mellis, & aqua feniculi.
apij, petros. Guil. dat oximel, aut mel cola-
tum cum aqua radicum, deinde ait Ras. in
diuis. quando corpus fuerit debile, & febris
tarda tepida, da in portu fortiora in prouoca-
do phlegma, & euacua cum eis, vt trochif. de
eupatorio, & pil. In quibus est pulpa collo-
qui, & aqua seminum, & radicum diutetica-
rum, & aqua mellis, diacymium, & diatri-
piperon conueniunt. idem ait sepe confor-
ma stomachum cum zuccaro rosato, trochif.
eis de rosæ & huius.

Febris melancolica.

Febris melancolica, dixit Gordio. facta est
ab humore melancolico naturali, vel innat-
urali putrefacto. & quamquam Alexand.
sentit melancoliam non putrescere, hoc est
ad comparationem aliorum humorum: re-
sistit enim putrefactioni cum substantia ter-
restri, & frigiditate, & siccitate comple-
xionis. hæc dicitur febris quartana. tamen
quidam asseuerant posse fieri phlegmate a-
cetoso, vitreo, & salso abiquo ipsorum adu-
sione, vel conuersione in melancoliam.
sed Fer. ait quod frequentius sit ex salso, &
non debet reponi in numero melancolica-
rum, sed quis mouetur de quarto, in quar-
tum ob conditiones conuenientes cum mel-
ancolia. Verum ait Auicem. febris quartanæ
causa est ea, quæ significat melancoliam,
& quæ postea putrescit, sed melancolia alia
est ter sanguinis & dicitur naturalis: alia
est eius aduictio, & eius aliorum humorum,
& dicitur innaturalis. hæc Auicem. vera
& certa est facta ex naturali: & notha
ex innaturali, quæ est duplex, aut enim
est innaturalis per aduersionem alterius hu-
moris cum melancolia non vnita, sed mel-
ancolia est tanta, quæ secum trahat ip-
sum, aut per conuersionem alterius hu-
moris, vel ipsius melancoliæ naturalis
in non naturalem, & sic aut sanguines
id est

(est propterea quod sanguis in eam conuer-
sus sit, aut cholerica, aut phlegmatica, aut
melancolica: quia melancolia naturalis
adusta conuerfa sit in innaturalem. sed Ras.
18. con. aucto. Simeo. inquit quod non sit
nisi ex aduisione trium humorum, & quod
melancolia naturalis non potest putrefieri,
postquam est visa, & sicut sunt plures spe-
cies phlegmatis, & cholere, sic plures sunt
generatæ species melancoliz per aduisionem.
ait Gilib. adustum ex sanguine est sal-
sum cum pauca dulcedine, & ad ponticum
trahit. adustum phlegmatis subnolis trahit ad
dulcedinem, grossi ad acetosiratem, & ponti-
citatem, adustum cholere trahit ad amritu-
dinem: adustum melancoliz naturalis
subnolis est acre, sicut acetum, & ebullit su-
per terram, fugiunt melleæ ob horribilitatem
saporis, & odoris eius: spissius est ma-
ioris malitiæ, & acedians, & nimis bullit.
ait Serap. plurimum humoris facientis quar-
tanam est ex aduisione humorum aliorum.
vnde plurimum est notha, & adustum non
intelligitur id quod est incineratum adeo
quod in eo non remanserit humiditas, quæ
facit pabulum febris: sed sit hum. ingrossa-
tum per consumptionem partium subnolium
in quo remanserit humidum, ratione cuius
potest humor adustus ebullire, & pu-
trescere.

Febrim ait Auerto. septimo collig. quæ
ex humoribus melancolicis sunt, quedam
sunt in secunda digestionem, quedam in ter-
tia, adiuuat generationem horum opilatio
pororum, grossities humorum, & difficultas
digestionis quarta tam vera, quam non ve-
ra dividitur in interpolatam, & in contin-
nuam, quæ ait Galen. 2. de different. & Auic-
en sit raro interpolata plurimum: nam
ait Gera. raro reperitur talis humor intra va-
sa ob dissimilitudinem suam ad naturam, &
si quid inest, non recipit putref. & à natura
pellitur extra uenas. Ras. 18. con. auct. Gal.
ait febris facta ex melancolia, quæ spargitur
per totum corpus, est quartana pura, inter-
polata, si melancolia est occulta intra uenas
est quartana continua. & quartæ vera secun-
dum plurimum sit incipiendo: notha sequi-
tur alias egritudines, & maxime febres: quia
generatur ex reliquijs febrium præceden-
tum, præsertim erraticarum, vt ait Hip-
pocrat. 3. progn. euenit, ait Auic. in suc-
cessionem febrium putridarum ob diversita-
tem humorum, ex quibus generantur, & eo-
rum putrefactionem: nam cum adurantur,
& non euacuantur, multiplicatur melanco-
lia scilicet innaturalis, deinde cum putrescit,
fit quartana. Ras. 18. con. quæ accidit post

tertianam, est ex aduisione cholere. & quæ
post quoddianam, phlegmatis. & sic in
alijs. dicitur quidam, quæ sit ex melanco-
lia naturali, vel ex naturali ulla, accidit ma-
xime in senectute: quæ ex melancolia, per
aduisionem aliorum humorum: in iuuentu-
tute, & maxime sine eius quando maior
sit aduilio, & notha frequentius accidit:
quia frequentius accidit incinerari humo-
res, & melancoliam adustam multiplicare,
quam naturalem.

Quartana sepe liberat ab epilepsia, mel-
ancolia, & alijs morbis: & est, ait Auic.
vt plurimum salua ob longam quietam. sed
salua magis est, quæ non fit ab apostemate
splenis, aut cum ea non est apostema sple-
nis, nec durities, nec opilatio, nec cum apo-
stemate hepatis, quoniam vt plurimum per-
ducit ad hydropisim, continua est deterior
interpollata, & deterior est, quia fit ex adu-
sione melancoliz naturalis: deinde quæ cho-
lere, deinde quæ phlegmatis, deinde quæ
sanguinis, quia ait Auic. cito recipit cratio-
nem: & ea, quæ sit ex aduisione cholere na-
turalis, vel phlegmatis naturalis, dicit Zozm.
difficile curantur, nisi in estate, nam ait Galen.
in commen. 3. progn. hyems aduocat in clu-
sionem humorum ad intra corpus, in val-
de senibus, ait Gilib. non curatur ob virtu-
tis debilitatem: nam ait Hippo. in aphor. 6.
morbi chronici in valde senibus assenat
mortem: sicut enim simul morbus & æ-
tas. & ait Auic. febris melancolica lon-
ga perducit ad hydropem. inquit Guil. quæ
tana, quæ non sequitur aliam febrem, siue
morbum, breuior est, & melius curatur, quæ
quartana est breuior, quia melancolia est
minor, subtilioris substantiæ, & calidioris
complexionis. & ait Auic. in quartana
quando non accidit error, non addit supra
annum: quia, inquit Ger. insequitur mor-
tum solis. & quandoque ait Auic. perducit
12. annos, quia committantur maximi
errores. & const. his melancolia est in sine
grossitiei.

Quartanæ periodicæ puræ primum est si-
gnum ait Galen. secundo de crisi, qui rigor
fortis non incipit primo die, sed in dies au-
getur. & Alman. incipit cum tremore adeo
vehementi, vt dentes constringere cogat,
& concutere, iuuatur, atque ossa dolent, ac
si super ea aliquid appensum esset, quod ea
grauaret, & concuteret. quare frigus pro-
fundatur in ossa & ait Auic. est cum aliquo do-
lore, ac si frangantur ossa quoniam ait Viar.
melancolia ob suam grossitiem, & frigidita-
tem super membra sensibilia effluens grauatur
fatigat, & frangit ea, & Isaac non frangit

ossa, sed materia sicca, & terrestis ad intra profundatur, & grauat. vnde æger sibi videtur ossa fraugi, & remanet ibi diu, quia est terrestis, & grossa, & quidam dicant, quod est vapor grossus siccus petens musculos profundos, & paucissimos tepentes ossa, & causat in eis multam seu sationem, ob quam contrahuntur, & æger iudicatur, idem est in ossibus. itaque subdit Auicenu. strident dentes: quia lesio fit in musculis mandibularum, & & quandoque tantus est tremor vellectum tremat. & causa huius tremoris est fortis motus capillorum irritatæ à forti frigore, acedine, & acetositate huius humoris. quando autem materia propè digesta est, & frigus, & acedo minuitur, & ponticitas, & crassities, contrafractio ossium, & stridor dentium remittitur, quæ duo sunt propria signa febrium melancolicarum. ad tremorem rotius corporis quandoque sequitur tremor dentium, vt in febre cholericâ, & phlegmaticâ. sed in quartana sequitur ad contrafractiorem mandibularum, & dentium, & contrafractio fit à contrafractiõne mandibularum & relaxatione. rigor fortis est bonum dummodo non sit in principio vniuersali morbi: quoniam tunc ait Ras. significat multitudinem humoris. est bonum signum, quod humor est digestus: quoniam quando est indigestus, parum exit ad musculos, & paruas partes attingit. & quando fit postea lenis, significat quod materia est diuina, & tunc cognoscit perfecte statum, & declinationem, ait Gilib. in principio accessivus fit prius oscitatio, postea inualefcit, & stridor stridentium ob nervorum contrafractiõnem, & dolor in profundo membrorum, ac si ossa frangerentur. deinde fit frigus, & tremor ait Ras. 18. con. tarde calefit.

Secundum est leuitus calor, vt ait Galen. secundo de differen. ob frigiditatem, & grossiciem humoris. tamen inquit Isaac, disturbat corpus ob materiam laborem facientem. aliquando tamen natura materię dominatur, & æger quiescit: aliquando contrâ: & tunc affligitur. calor tamen inquit Auicenu. cum sit siccus, est maior, quàm febris quotidiana: & magis apparet, & is calor est velut ignis in lignis crassiss, & terrestribus, qui non cito inflammatur, nec subito totum corpus amplectitur, aut nou inreusc, imo calor est intra, & horripilatio extra. verum quando totum occupatur, est iutensa, ait Alman. 18. con.

Tertium ait Serap. paroxif. est 24. horarum, quoad est pura. quando mixta est cholera citrinæ, minuitur. sic Auicenu. verum Guil. paroxif. mouetur, vt plurimum hora

octaua diei: quoniam propinquus est motus melancoliz, quæ quoniam ratione grossici est difficile resolubilis: durat paroxif. plns alijs.

Quartum ait Gal. supra, est sudor in declinatione: quia materia nou sic inuiscatur, vt phlegmatica. vnde magis in calore subtiliatur. & Auicenu. est multus respectu quotidianæ, sed minus, quàm in alijs. imq. ait Ras. 18. con. non est multus: minima enim pars sudoris transit ad musculos.

Quintum ait Gale. primo ad Glauco. pulsus est maior, segnior, & inæqualis, & a. de crisi, vix sentitur in principio parox. & primo ad Glauco. & si pulsus quietem febris, pulsus perseverat tardior, & rarior naturali, febris est quartana, in statu magnus, & plenus ob fortitudinem motus materię naturæ repugnantis.

Sextum ait Gal. 2. de crisi, yuna est subtilis, alba, & aquola, & hoc in principio ait Serap. sed in declinatione est plurimum nigra ob mundificationem humoris melancoliz. est subtilis, ait Isaac, ob liquiditatem materię, & grossiciem, quæ opilat vias. sunt vrina, inquit Paulus, multarum mutationum: propterea quod species melancoliz sunt multe.

Septimum accidentia sunt minora, quam in tertiqua, vnde ad Glaucon. est maior sitis, & Almanfo. minor dolor capitis, & id generis. tamen ait Fer. in augmento, & statu crescunt: & presertim si sit à cholera humor melancolicus. Guil. & acetositas in ore, si materia est in stomacho. ait Plat. & accidit cum scotomia, appetitus est fortis, nisi opilata fuerit via splenis ad stomachum, aut splen debilis, grauitas adest totius corporis precipue crurum, coxarum pigritia, indigestio, laterum iustatio, dolor lumborum, & plurimum fit cum vigilijs. iniqui iudicij & timore in somnis, & aliquando postexpulsiõnem caloris, adest frequenta mingendi.

Octauum ait Serapio. corpus per 48. horas remanet mundum, & materia est quasi ciuis, & Galen. 2. de differen. nihil remanet fumosi, nec semicombusti, vt in phlegmatica.

Nouum ait Galen. primo ad Glaucon. splen maior, & crassior fit. & Viar. est proprium huius febris, & Auicenu. & vt plurimum dolet, & crescit, si, ait Gilib. diu perseverauerit.

Decimum ait Serap. exiccatur valde stercus, quod tendit ad nigrum.

Vndecimum inquit Serapio. cutis arefcit, & siccat. Viar. id ob melancoliz siccitatem.

¶ Dand. nascat Serap. color faciei sit vitidis, & plumbeus, & uitis uigra in processu, & sub phareus inquit Isaac & Gihb. tumet facies, & pedes, & quandoque hydrops. sed in principio parox. vngues, manus, pedes, & labia sunt liuida.

Decimumquiescunt debilitat, ait Auic. visum ob vapores grossos turbidos, petentes nervos visuos, & spiritum ossificantes.

Quartumdecimum Zoar. in processu insit cum difficultate ob exiccationem partium thoracis, & pectoris.

Decimumquiescunt antecedunt febres indigeste, & male curate, aut splenis tumor, apostema, complexio melancholica, ætas, negocia, autumnus, & hæc Gal. & Alm.

Rabi ex auctoritate Gal. de crisi ait. signa quartanæ sunt quatuor. primum est subleuatio omnium signorum tertianæ puræ, immo contrarium. sec. ratio per se accedit, sed sequitur alius. ter. pulsus in principio paroxif. est veluti senis. quar. inchoat cum rigore debili, quæ post in qualibet accessione augetur, & in ipso rigore lentitur tantum frigus, quod ossa videantur frangi. Fer. aut digestio materiæ in quarta cognoscitur si sit vrina colorata, & minus tenuis, vel etiam spissa cum neci sui generis mutatione, cum parafismo intell. proximo, & antipico, atque aliorum symptomatum augmento, quæ sunt per calorem.

De signis quartanæ nothæ.

¶ At Gal. 1. ad Glau. signum nothæ est, quod accessiones variantur secundam diuersitatem humorum.

Signa specierum nothæ phlegmaticæ sunt nouæ. primum est, quod antecessit febris phlegmatica longa, in qua phlegma adustum est. sec. Anie parox. longiores ob viscositatem phlegmatis, & frigus intensius, vel plus durans, & it. reditque ter. ait Auic. sudor est tardior, & minor, quar. Auic. en. urina est grossior. quin. pulsus est minus durus. fer. accidentia, ut litis sunt remissiora. scilicet complexio sit phlegmatica, ætas, regio, tempus anni, & id generis.

Signa nothæ à phlegmate falso, sunt ait Plat. oris falsedo, pruritus in toto corpore, calor intensior, & frigus minus, quàm in aliis phlegmaticis adustis. & dixit raro solent fieri quartanæ ex adustione humorum, siue calefactione hepatis.

Signa nothæ à melancholia factæ ex sanguine adusto sunt quatuor. scilicet. antecessio febrium sangu. urina rubra, & obscura ob adustionem, pulsus plenior, & maior, & fortior, quàm in aliis quartanis, quar. complexio, ætas, tempus frig.

Signa sanguineæ factæ per admixtionem sanguinis cum cholera sunt urina in principio ruffa, spissa & limida in superficie, frigus parum, uel nullum, calor magnus, inflatio sinistri hypochondrii, cum gravitate, & dolore maxime post cibum, splenis durities, grauitas capitis, & præsertim finitæ partis. inchoat in horis sanguinis uel melancholicæ.

Signa nothæ ex adustione cholerae sunt, inquit Auic. pulsus uelocior, & frequenter, quàm in aliis quartanis: quia eius calor est intensior. sec. incipit cum horripilatione, & frigore in carne: quia sentitur magis uersus cutem, quàm uersus profundum. ter. est cum sudore: quia materia est subtilior. quar. est cum siti, uigiliis, & aliis accidentibus comitantibus calorem. unde uidentur ob inflammationem cordis, & cerebri maniaci aliqui & iracundi. quia. urina est ruffa, ignea, subtilior. fer. antecedit morbos cholericos. scilicet. complexio, ætas, anni tempus, &c. Auic. signa nothæ ex adustione melancholicæ naturalis ratio memorata fuit à medicis, quia forte per raro accidunt non enim putrefit, nisi ualde tardè melancholia naturalis, nisi ob eius siccitatem intem.

Curatio febris quartanæ paræ.

¶ Omnis febris melancholica est difficilis curationis, licet sit salubris: quia propter compactionem, duritiem, & siccitatem suæ materiæ difficulter digeritur, curatio tamen variatur secundum variam materiam, & secundum tempora uniuersalia, uel particularia: secundum materiam ut si febris quartana facta sit ex adustione sangu. uel cholerae &c: circa dictam causam frigus, motus fortes exiccantes, uigilias, cibos metiam geuerantes faciet res nauseatas: quoniam turbant egrum, & mouebantur humores uelociter. dixit Haly. non comedant in die accessionis, non moretur diu ad ignem. ait Ras. aggredere egrum cum euse euaginato, uel cum alio terrefaciente in hora parox. quoniam repentinus terror frequenter sanant eas. delitit uratur, ait Auic. quicquid, & somno præter solitum. Haly. deambulatorio lenis, & strictio confert. balneum, ait Auic. in aqua dulci tepida cõfert: quia humectat, et excitat humores, sed uis sudor. sed Haly. uult in statu squæ materiæ est digesta. & Serap. quando est pauca, & Almanf. post 40. dies. i. post 40. parox. dixit Ger. super 9. Alm. cap. de melancholia. quidam bonus homo balneabat quotidie quartanarum bis, ut materia mollificata plus expelleretur in parox. & sic infra mensem liberabat.

Cibus quartanarum ait Auic non sit crudus

imò resoluens cruditatem, uel flatum i nou grossius, imò subtiliſſas: nō conſtrictius, imò ſoluens ueſtrem. ſit generariuſ boni ſanguinis & hi ſint calidi, & hmidī, ut ona ſorbilia, & taro bouina, & quando adeſt ſtatuſ, ciba cū capparibꝯ, ſinapi, almuri, & hniꝯ Auiꝯ. & Iſaac. non deſ cibos vñquofos. ſ. de carnibꝯ vſque ad tres ſeptimanas, deinde ciba cū pullis paruiſ, & poſt 40. dieſ cū aliis carnibꝯ, & ſit Raſ. 18. con. in die acceſſionis. ait Guil. concede fuccum hordei, iꝯ cicerū rubeorum iꝯ gallinarum uel caponū cū mica panis, uñdū album bene limphatū & pone ſuper cibos cardamomum puluerizatum, quia ſudare facit, materiā digerit, & naturalem conſeruat humiditatem. vinum ante 40. dieſ ſit citrinum, odoriferum, limphatum, ſi nulla fuerit opilatio in hepate, aut ſplene. ſi uerò fuerit, ea nō limphatum in diebꝯ quietis. poſt quadragintā dieſ concedit uinum uetus parum limphatū Gordo. in die acceſſionis ciba p tres horas. & in declinatione cōpleta condianſur ſercula cum ſpeciebus, quę R. cinnamo. cardamo. maſti. ana vnc. ʒ. galang. nucis muſ. macis, gariof. ana vnc. i. croci vnc. s. dixit quidam gallina repleatur petroſelino, uittello oui cum albumine, ſanguine porci maris ana ad pondꝯ vnc. vi. bene mixtiſ coque in paſtullo, in furno, & comede, quoniam roborat uirtutem, & appetitum excitat, & febrem expellit.

Quò ad pharmaca quatuor ſerua intentiones. ſ. digerendi, euacuandi materiā, alterandi calorem febrilem, & roborandi membra principalia, accidentia enim parua, aut nulla ſint, non indigent correctione. uerum Al. Iſaac. in quartana quatuor reſpice. primum ne deſ medicina ualde calidam, ne materia caſteſcat, & duę generentur febres, altera continua, altera in terpollata. ſec. nec deſ frigida ne materia inrūdeat. tertio dixit non ſit admodum ſubtiliſ. ne cadat in heciticā, nel phthiſim. quartū non confundas corpus cum pharmaciſ, & præſertim in principio quia materiſ eliquatur, & ſit obediens nature, & digeſtio materiæ cognoſcitur per mitigationem, & abbreviationem, inquit Gord. parox. non per paucos cibos aſumptos, unde urina coloratioſ uideatur. ait Galen. ad Glauconem primo moderate duces in quartana & rege, ſplenem.

Ad digeſtionem ait Haly. da quotidie geleniabini cum ſyruping. ſ. cum aqua cocta, uel borag. uel bugloſæ. Viar. digere materiā cū diureticis debilibꝯ, ut ſucco ſcabioſæ, & apii, ſenic. decoctiſ, & collatiſ cum oximelle arom. & melle roſ. & Auiꝯ. in die paroxiſmi

da geleniabini cum ſyrupo acetoſo in aqua calida. & ualeat in die, & hora paroxiſmi biſ; uel tertio loco aquę hordei, in eſtate bibar à quam hordeaceam, ut aperiat opilationem, & ſecaniabini ſit ex zuecharo in hyeme ex melle & id ait Auiꝯ. ſit ante parox. per tres aut quatuor horas aut da ſyrupū oui R. horum borag. bugl. ſtica ana vnc. ʒ. paſſul. liqñ. ana vnc. v. auiꝯ. fumor. ana vnc. iiii. hordei mudi vnc. i. cuſcutæ vnc. s. ſit decoctio, & cum melle roſ. colato ſit ſy. parum acetoſo ſuo. ordo eſt igitur, ut primum detur ſyrup. acetoſ. deinde ſit leuiſ mino. deinde ſyrup. uiol. deinde mino. poſtea ueni ad fortiora, & ſpleni idonea, uel qui R. ſcolop. capil. uen. ſi pul. thimi, nimbræ ana m. ʒ. cor rad. apii ſena. petroſ. ana vnc. i. radic. bugloſ. boraginis ana vnc. s. meliſſæ, ſtictidos, mentha, cuſcutæ, ſoſiorum, uel ſtrūuini tamari. ana m. s. ſemi. portul. paſſul. liqui. ana vnc. s. coque, & ſit ſyrup. in eſtate cum ſyrupo acetoſo ſimp. in hyeme cum oximel. & is conuenit in principio augmenti ac poſtea iterum minorat, in fine augmenti da ſyrupū qui R. rad. apii, ſena. petroſ. alparagi, bruſci, corti. rad. cap. leniſæ ana vnc. i. cor. medię tamari. ſtrax. pine ſtræ ana vnc. s. ſcolop. thimi, nimbræ, hyſſopi calamienti, chamed. chamepit. rad. aſcori, cuſcutæ ana m. i. ſebeſten, liquirit. petſul. ana vnc. i. ſena. endiuę, portul. ana vnc. ii. ſit ſyrup. cum oximelle compoſio, & ſyrupo bilant. poſtea minorat, & iterum digere, ac minora. circa ſtatuſ ſi neceſſe fuerit. detur idem ſyrupꝯ, additiſ epiſthi. ſena. poliſ. & aromatiza cum cinamomo, cardamomo, noce muſcata, poſtea da trochiſ. quia in principio febrim melancholicarum, inquit Iſaac. & Raſ. 18. con. non competunt quia ingroſſant materiā & Auiꝯ. non deſ in hyeme quartana medi. dige. in forma trochiſ. ſed liquida: quia plures ſunt euacuationeſ, & uiſ ſtrictę, per quas mediſina ſicca nō penetrat imò deſiccatur, & induratur. dat tamen Auiꝯ. in fine augmenti & ſtatu trochiſ. de aſſynthio, & Gal. 1. ad Glanc. diaſtrion piper. diaſpolution, uel piper cum aqua. & Serap. piſceſ ſalitiſ & ſinapi ad uſum med. non cibi ut ſubtilient. & ſic hoc tempore ntere conſeſſionibꝯ calidiſ, ut theriac, ut euacuet humorē per uſinam, uel ſudorem & ſi non euacuet ſed tantum mouerēt, curreret humor, & miſceretur cū aliis boniſ, & ſi ſtare in uno loco augetet febrem, ſi in duobꝯ, faceret duas febres melancholicas. dat Gal. there. per duobꝯ horas ante acceſſionem, ut narrat in lib. de Tber. ad Caſarē. Haly dat præter hæc mēſuradum, uetum digeſta materiæ Alm. dat poſt 40. dieſ in hyeme Auiꝯ. diaſp. hni, diaſia, ʒ.

synapi in omnibus tribus dlebus Raf. 18. co. da calida semel in septimana ad subtiliandū, & alleviandum humorem. & Galen. primo ad Glau. fecerit duplicem quartanam si dederis ante flatum repletio, ait Rasiū diuisit assidua, & da semper aquam sicā, & scus infusus in aqua mellis, ius galli ueteris decocti in aqua, & sale, in qua proiciatur parum polipodii, & sorbeat ante cibum. & Gal. ad Glau. si cibi non emollierint, clysteribus primum utere mollibus, deinde acutioribus. idem affirmat Serap. Haly. & Auic. lenitiuum bonum R. florum boraginis, buglossae, violarum, sticados, & folia senae q. l. coque & misce cassiae q. l. & si materia rapit ad os stomachi, vomē. si in uis urinum, da sco lopen. & endi. si sudat in declina. da uinum album subtile cum aqua hordel calida.

De Pleb. ait Gal. ad Glau. non phlebe, nisi nimia sanguinis sit copia, quae sit causa propria febris. & si sanguis niger, & spissus, extrahit rubens, & tenuis, obstruit uena. sit brachii sinistri, quae mediana est, & A. uic. si dominus est sang. & febris erit ab adusto sang. aut a mixtione melancholicā cum eo, extrahit. & Raf. 18. con. phleb. fiant una uice post aliam, cum patiens est iuuenis, & corpus repletum sium. n. eradicat uel febrem duplicatā, & Auic. in melancholia, melancholica puta digesta materia, & minorata, & signa sanguinis remanent, & alia concutunt cōfert phlebotomia ē basilica, idem si in fine quartanae menstrua, uel hemorroides, uel alia sanguinis euacuatio sit occulta, & si signa sanguinis apparent, fac phlebotomiam quae sit parua, si cū de saluella sinistre, aut ambobus, aut de sapheneis Guil. salua incipiebat in principio, & multi alii sanguis narium ait Auic. si sopitus est fluere humor. aut in loco saphenarum, & scarificatio in dictis locis.

De euacuatione ait Auic. in omnibus speciebus febrium talium in prin. necessaria est minoratio super residuo melius, ac facilius procedat digestio, ac tandem euacuatio minor R. decoctis florum sticados, borag. buglossae capillae. passul. anisi, polip. in qua mixtione: xi. cassiae, diacath. vnc. a. & da, redi ad digestionem, ac postea ad minorationem fortius, ut si addas vnc. i. vel vnc. ii. diacath. vel vnc. lap. laz. lot. vel reubarb. vnc. i. Haly. non minus in principio morbi cum laxa tuō, quando tridus est humor, sed cum si gna digestionis apparent, nō semel, sed multarum euacuabis. ait Gal. ad Glau. cum pharmaco melangogo, si opus fuerit item Guil. nisi materia sit digesta, non dederis pharm. quia subtilem euacuat, & remanet grossam. Raf. 18. con. euacuans in principio cum

medicina forti, nec euacues cum med. forti sed in principio euacua materiam cum polipodio extracta uirtute eius in iure galli ueteris, & oleo amyg. dulcium.

Vomitus expellit materias communes, & proprias, unde prouocat, si expedit obseruatis obseruandis, & si non potes pharmaca sint fortiora. uomitus prouocatur in die paroxismi. & in die interp. si humor ad os stomachi irruat. primum igitur prouoca cum syrupo acetoso, & multa aqua calida: si non poterit, fumar siccam, synapi, salis, & huius. da inde uinum cum multa aqua, deinde syrupum acetosum, in quo infusus fuerit raphanus. si uomerit, debilitabitur rigor, & febris, & hoc in principio paroxismi. unde ait Auic. in princ. parox. educ materias communes, in stomacho repertas, post prius potius proprias. quae sunt sparsae ad stomachum, uel primas uenas, & hepatis. ait Haly. in die accessionis humor est tumultuosus, & calor illum calefacit, unde facile euacuatur. si autē post cibum, somat quinque horis cibum ante paroxysmum & cum incipit erger oscitare, da uomitus prouocantis. sit ait Auic. leue, si euacues materias communes, si multas, & proprias, forte. & Gal. ad Glau. statu utere uomitu, a cibis sepe, & da belledorum album cum raphano.

Medic. eradicat. sit digesta materia, & ait Aliman. non semel, sed pluries, & cum fortibus & pharmacis. dies uero sit ante accessionem sic uult Alm. A. uic. & Haly. quia uirtus est magis fortificata a parox. praeterito, humor subtilior, & magis nobilis, cum iam inoeperit cumulari pro sequenti paroxismo. Med. autē quae putant humorem, & trahunt substantiam eius manifeste habent gradus. in principio sunt myrab. indi, & chebuli. sed acue ob stipticitatem. deinde polip. postea epith. quae cum tardē agant, addunt duo chirit. scamonee, & scr. i. maio. uel loco scamonee turbit. deinde lapis laz. caue aut helledoro, uisū optime corrigatur. haec ait Auic. & Alm. dat sepe per leni. serum cum zucharo & si profundas follic. sene erit mīuo. leue & dat apozima de epi. & myrab. ind. interdum si fortis est calor, ait Raf. in diuis. euacua cum syrupo acetoso, epith. & sena & cum decoct. mirab. nigrorum, & infusione eorum. & si fortior, cum aqua casei sola, & Haly. post digestionem semel in sept. das med. quod R. myrab. indorum, chebul. ana vnc. viii. epith. aqua vnc. iiii. zuchca. ad pondus omnium tere, & bibe cum aqua calida dosin cōuenientem. Raf. 18. con. purga omni quinto die cum his pil. quae R. epith. vnc. i. cerui. anisi ana vnc. vii. feminis apii, seniculi ana vnc. 3. polyppo vnc. vii.

vnc. vi. menthae vnc. i. s. in principio noctis, Gord. R. florū horagi. violana vnc. i. fenē, thimi, epith. ana vnc. s. mymb. citri. vnc. s. coque in lib. i. a. uque usque ad medietatem, cola, & iterum bulliat colatura, donec remaneat vnc. iiii. in qua pone reubar. vnc. s. & parum bulliat, & cola, & adde esule vni. i. Guil. post aliquas accessiones, & mndificationes dat med. quod R. helleb. nigri vnc. s. tere per septe & misce cum vnc. iiii. rob. de uino per noctē, & cola in colatra pone tria, uel quatuor grana diag. non ultime tritirati, & scr. i. reubar. puluerizari & da ante diem per duas, aut tres horas: quia curat quartanam: tamen die sequenti da vnc. s. ther. cum uino puro calido, in aurora.

Vtinam non pronoces ait Auic. in principio cum diuretico sorti, sed potes cum debili ad excludenda per utrinam materias communes liquidas, si quae continentur in uis hepatis.

Sudorem moue ait Ras. in diuisi. quando febra antiquatur, & alleuiatur horripilatio cum diatriou pipereon, & cum duobus uasis ante, & recto plenis aqua bullita cū chama. sicca & anetho. sudorifica in augmēto sint lenia ad euaporandas materias cōses sparsas uersas cutim. & Auic. in principio digestionis usque ad aduentum digestionis completae per extra non euacuet per urinam, uel sudorem. in statu resolue cum fortibus uelut cū trochi. quos dicit quandoque liberare in una uice, qui R. foliorū ruthe vnc. i. croci vnc. iiii. iusquiami albi vnc. i. cassie lignee vnc. ii. sulphuris citrini vnc. iiii. cū aqua fac trochi. vñ. i. & da cum malsa uel aceto ante accessione. Idem efficit uinum decoct. serpilli bibi cum calidum ante accessione & pil. quae R. peoniz. gentiane, castorei, chamedreos, feneg. cap. lact. ana scr. i. da vnc. s. ante accessione, & theriaca sumpta cum medio ciatho succi menthae, & medio nini albi optimi ante accessione curat quartanam: tribus nictibus, & crocus, & rasura eboris cum uino bibatur. item Radix cēanre minoris, item & vnc. i. gensiane cū uino optimo ante accessione per quatuor horas, itē uinū decoctionis eius. itē vnc. s. rad. assari cum uino calido sumpta, dicit Auic. in prin. unigēfali. quidā audent dare forte laxatiuū, & exhibent vnc. ii. succi rad. ebuli, uel plūs. & quidam ante paroxysmum per horam curant febrem. sed hic modus curationis non est bonus. imo est error. Ergo Nicolaus post primā materiz minorationem quartanario exhibui uinum de coctionis menthae cum nnc. ii. theriacle mixte, & vnc. iiii. aq. nius. & liberatus est ante octauam accessione, alijs quoque dedi per

unam horam, uel circā captis à quartana parā, ac ē phleg. post tres uel quatuor bonas minorationes, & liberati sunt. Item aqua uitis cum gario. puluerizari, dicit Gihub. mor detur ante accessione myrrha gum. lii hedet. cum succo uel uino decoctionis chamed. aut cū succo ruthe, uel semine eius: pronocat. n. ap. & destruit melancholiū. Gord. succus calamenti ante accessione curat quartanā.

Non alteres calorem febrilem, ait Ras. t. 8. con. nisi materia sit diminuta: quia non est possibile, cū materia est multa. Alm. tñ uel post 40. dies posse alterari; Anic. inquit, & omnes hae febres indigēt humectatione, sed quāda plus, & quāda minus, quanquam & omnes indigent exsiccatiuis ad incidendū & dissoluendā materiā. Conforta membra, ait Mes. in oib. morbis melancholicis, ueluti cor, hepar, splen, & stomachū. hepar est cū inflammationis, & aduersionis. splen recipit se ex eius, quod adurit Ras. t. 8. con. causae non hepar, & splē apostemerit, & Haly. ne hepar generet humore melancholicū. cordi cōpetit in hac febre diamuscū dulce, cōfec. de gemmis, diamarg. & id gene. hepar, & splen ait Serap. gelen. in principio.

Ad frigus Auic. quia constringit ossa, dat allia, & mel, & syra. acetosē melle implet et bo nō ad pleuū i deinde dat aquā calidā, uel uina. dixit quidā, unge ante accessione totū spln cū oleo de iuniperorū liberat à quartana, aut cū theriaca misce gario. & nardū, & in ciatho, cum uino bono, uel oleo super prunas bulliar modicum, & iunge totū spinam ad magnū ignem ante accessione, quidam coquunt polypodiū, hyp. & epith. ana vnc. iiii. in una quarta uini usque ad consumptionem quinte. partis & quotidie bibant ciathum calū, uel frigilem decoctio seminis fen. & fenē in uino si bibatur quotidie longo usu curat: item nedar, quod R. epith. recentis, follic. feneg. florum borag. ana m. s. xinzib. anisi ana vnc. i. fiat nedar cum uino subtili, albo, & adde si placet mel, uel saccharum.

A proprietate curat quartanam ait Dios. succus plantaginis minoris cum malsa bibicus per duas horas ante accessione. Idē Anic. de radice plantag. cum uino sumptis; Pl. & Serap. iubent esse quatuor. cum uino, & aqua ana vnc. iiii. s. const. qui colligit folia, dicat, pater noster, & coque ea cū quatuor ciathis uini, & aq. usque ad tertiam comedat folia, & bibat uinum calidum Pl. quā. folia pentaph. Albet. dat cum uino tetapetato, & pipere. Serap. ligat uermes in carnis repertos in conio caprino, alii radices

carbonis adligant, collo, vel brachio. o-
culum coturnicis appendit collo. Fidelis dat
succum cassiobarb. ante accessionem. alii dant
vnc.ii. hyp. cum vnc.v. vini albi subtilis ante
access. nec bibit ante, vel post paroxysmum
Gui. de Areto. gallis collo suspensus curat.
18. con. semel hyp. bibitu cum vino. air Alb.
Fid. millefo. bibitu, inquit quidam detur
ante accessionem clathrus aque, in qua extin-
ctus fuerit lapis marmoris. qdā, qz nouū nō
elaboratum fiat amulus, & nouē diebus igni
accessus extinguatur in succo celidoniæ dela-
tus in digito auriculati sinistræ manus curat
quartanam. Fid. sterco hirundi. potum sta-
tum cnrat. Mundin. affirmat plures curatos
esse coquendo m.i. parietariæ, vini albi subti-
lis ad medietatem. comedat & postea herbā
in modum torrelli confectam, & sub lare co-
ctam, & uinum bibant totum. id faciant per
tres uel quatuor accessiones, & curantur. Ex
p. cuiusdam R. membrana, quæ sunt intrin-
se in nucibus disidentia nucleum, coque in vi-
no, & bibe ciathum unum ante accessionem
tribus diebus. item succi enp. vnc.ii. cū mo-
dico uini bibe per duas, uel tres horas ante.
& quidam, bibe vnc.i. crani hominis, & cu-
rabis quartanam sanguineam. itē coque qua-
tuor folia, & quatuor radices berbenæ in ui-
no, & bibe in quartana phlegmatica, ait Ma-
cer. Dioscorides inquit da septem cimices
inclusos in totidem fabis, suffumiga ægrum
cum stercore gatti. Eidelis unge ante accessio-
nem cum oleo, in quo decoctā sitrana uiri-
dis. item sterco hominis bibitu. itē oleum
comune, in quo scorpio pntrefactus sit, in un-
ctū in plantis pedū, mannū, frontem, & tim-
pora, spinā dorsi ante accessionē curat quar-
tanam, tertianā, & quotidianā. item sang. asini
recens inunctus super spinā, hæc fid. qui-
dam ait, fac in manu dextra quatuor angu-
los. in primo scribe lason in sec. Giason, in
ter. ter. in quar. gramaton deinde laua manū
cum uino albo, & bibe statim cum incipit pa-
rox. quoniam in tribus accessionibus succe-
ssive curatur. alius dixit scribe in uno folio
saluæ Christus natus ē, in sec. Christus mor-
tuus est, & sepultus. in ter. Christus resurre-
xit alleluia. bibe pri. in prima accessione. sec.
in secunda. ter. in terna. Guil. scribit trochif.
qui conuertunt quar. in ter. quod non lau-
do. hi R. abapthii, cap. costi, uernicis, ameos,
aristol. longe, scord. myrrhæ, eupho. ana. i.
aloes, bdelli, pitheti, serap. opopo. feminis
cicutæ, amomi, acori ana vnc.i. infunde gnm
mij. in nino, & alia tere, & fac trochif. ponde-
rantes ani. & da in aurora in die accessio-
nis cum aque raph. & oxim. compositum
unciam unam.

Quartana notha curatio.

Maior humectatio conuenit in febribus
quat. nothis factis per aduersionem, & minus
in his quæ sunt ex admixtione melancholice
cum sanguine, uel phlegmate. in factis per
aduersionem expecta ante purgationes post le-
nitronem, & aperitionem plus, & interpo-
ne plus temporis inter euacuationem, & eu-
acuationem: quoniam materia adusta tardius
& difficilius coquitur. unde Guil. iubet med.
euacuantes materiam adustam esse leues, no
acutas in substantia liquida. dixit quar. no-
tharum ex sanguine adusto tendatur plus ad
humidum, & minus ad calidum quam in al-
liis. Guil. dat omni quar. nothæ quotidiē
bis. s. in aurora, & ante cœnam per duas
horas vnc.ii. s. oxim. squil. cum vnc.iii. aque
decoct. hyss. & mellis, & subdit. mūdifica
se in diebus quietis cū pilulindis, aut stomati-
chis Alchindi, aut de helleboro, & huiusmo-
di. In sanguinea ait Viat. i. die accessionis nō
cibes, & parum aliis diebus, & Gordo. absti-
neat in sanguinea & cholericā a carne, & ni-
no usque ad 20. dies, tunc si materia est dige-
sta, & uirtus fortis abstineat donec sit euacua-
ta. Raf. 18. con. quar. ex aduersione sangui. in
princ. phlebotex basilica, sinistræ manū. &
Viat. deinde da pharmacum sang. subtilians,
& incensionem extinguens, quare digest. fiat
sine calef. ut zuc. mel uiol. cum succo scario-
la, & Aui. euacuatio sit lenis, & debilis, & cū
his, quæ mundificāt sanguinē, & Via. in prin-
moue uomitum, cum rigor inieperit, & ma-
teria digesta, phlebotomandus est ex basilica,
uel mediana, ut sanguis grossus exeat.

Quartana cholericā curatur ait Viat. plus
com refriger. & si uenter sit stipticus cum pri-
uis, manna, uiolis, & huius. & cum clysteri-
bus. materia digeratur cum oxī & cum ince-
perit digeri, detur sol. cholera purgans si-
ne labore. Aui. dat my. citr. & uiola. & aquā
casei, quæ euacuat materias adustas si pauca
sint quoniam relaxare non posset: nec si frig-
ubilest stomachus relaxatus. Idem ait, hume-
cta, & refrigera. idem affirmat Alm. 18. con.
& Aui. cen. sedeat in aqua calida, & abluat,
& addit, leni cum uiol. aqua casei, & uirtu-
te poli. aut cum syrupo acetos. folijulep. & cas-
sia. solutio eradicatoria fiat post 20. dies, quia
tunc digestio apparet cōplera. deinde da quæ
subtiliant, & in ciidunt, ut syrup. acetos. cum
aqua endiuie, scenic. & similium. Fer. si mor-
bus diuturnus fuerit, & nimia grauitas mē-
brotum, fiat mjuatio trim. aut quatuor va-
sang. singulis mēsis, ne ex longo febrili ca-
lore sanguis putrefactus sit causa maioris mo-
lestiæ

leſtiz. & ſi perſeuerauerit, da prouocantia ſudorem, & da opiatas. Rog. dat per dig. oxi-
zac. cum oximelle, & fiat minutio de ſalu-
tella in meſibus in ſecunda quadra. lunę. Gor.
digerit cum oxizac. ſyrup. uiolato & de ſu-
mit. & dat medi. qnę R. horum borag. uiol. li-
qui. mundę ana vnc. i. coque in ſero capri-
no, & in decocto diſtemper cor. mirab. nig.
& citri. & fricentur in ea lento igne, cola, &
da in aurora.

In quartana phlegmatica ait Raſ. in diuiſ.
non ſubtilis regimen, ſed da cibos bonos, vt
carnes arietũ, caſtratoꝝ iuuenum. ſed 18.
con. air, quod in die acceſſionis niſi nir-
tus ſit debilis ait Viar. Ger. non concedit car-
nes niſi ad 40. diem, ſi uirtus poteſt tolerare
deinde cibos faciliſ digeſtionis. Alex. prohi-
be ngorem, quia ſi fuerit debilis, & febris.
digeret ait Viar. cum melle roſato cum ſacco
ſcariolę, apii, & feniculi. cane frigida. moue-
ntm clyſteribus, & phar macis phlegmagi-
ſ. Aui. dat ſyrupum acetofum mellitum cū
aqua apii, ſcēnic. & ſimilium. & cum incipit
digefſio apparere, in leniuum miſce uirtu-
tem turbiti polipodii, & huiusmodi. & ad-
dit epithimum, deinde uirtutem agarici. Vo-
mitus ſiat inquit Auic. cum ſyrupo acetofu
mellino de feminibus inciſiſis, & ſubtiliati-
nis, uel vomitinis, ut attriplicis, anethi, rapę
& ſimilium, & dixit adde uirtutem ſinapis
ad incidendum, & hellebori albi ad uomē-
dum, & elleb. in raphano, inquit Viar. incita
ſudorem, & poſt cibum aſſumat diatriop-
ipercon, dianthum, & ſimilia, & ſepe theriacā
diacoſtum, & hæc poſt 40. dies, uel ut uult
Hi. periodos.

Quartan. phleg. falſo, ait Plat. purga, nt
materia exigit in aliis membris: ſed acutior
ſit medicina non in caliditate, ſed in purga-
tione. Gor. digereit cum oximelle compo. &
oxi, diuretico. & ſyrupo de ſumotterę ante,
& purga cum med. qnodo R. horum boragi.
bugloſę, niol. poli. anethi, turbiti, liqui. paſ-
ſularum, abſynthii, aganci, laccę, enp. ana vn-
ci. s. coque in ſero caprino, & in eductiōe
pone cor. mirab. indo emb. ana vnc. i. fricē-
tur in ea lento igne.

Ex frigus per quatuor horas cępit homi-
nem uehemens ante ſolis occaſum, parnus
rigor, nulla panno, caluit per uiginti horas.
ſndauit parum. & ſudor quaſi frigidus per
duas horas. calor ſuit lenius ſine ſiti ſed cū
multa grauitate capitis, & totius corporis.
urina mediocriſ inſtantie tendens ad groſ-
ſitiem, color remiſſas, flatibus plena, pulſus
parnus, & neloꝝ, & ſpiſſus. digeſtio ſuit gele-
niabin cum oximelle comp. & aqua & ſco-
lop. cum fuerit cum reſidentia phleg. euacua

ui cum elec. indo, & dialeſe ana vnc. s. cum
decocto paſſ. ſticados, ſcolop. aniſi, & ſcē. po-
ſtea inuę ſpinam ante acceſſionem per nñ
horam cum oleo de coſto, de mētha, & de pi-
pere. ab extra corroborauit ſtomachum, &
iterauit digeſtionem, & phar macum uſq; ad
22. diem deinde cum oximelle compoſito,
& ſyrupo de calamento cum aqua per ſex
dies, poſtea euacuauit cum turbiti, agarico,
& polypo. ad 30. dies dedi mixturam ex dia-
trionp. arom. gariof. & rad. bugloſi; condi-
tis. doſis vnc. s. cum uino aroma & ſic uſque
ad 40. dies. & tunc dig. quod R. v. rad. diure.
ſic ana vn. ii. paſſ. ſebe. ana vn. i. dactil. n. x. hy-
per. cala. puleg. orig. hiſſo. meliſe, ſticados,
maior. ſaluiz. horũ roriſm. ana m. i. ſem. apii,
ſcē. aniſi, dauci, ameos, amomi, ſemis aſpara-
gi, bruſci, petroſ. ana vn. s. rad. cap. acoꝝ, na-
let. pen. ana vnc. ii. ſcolop. tamaricſi ana
vn. iiii. horum borag. bugloſi; capil. polli. t.
adian. ana m. s. bulliant in ſq. aque cum mel-
le, & aceto ſquillę fiat ſyr. mirabilis in inci-
ſione, & ſubtiliatione humorum groſſoꝝum.

Quartana continua.

Raſ. 18. con. and. Gal. 3. de criſi. cum uide-
ris ſymptomata quarta non eradicata, eſt co-
rinna. & in ea non eſt rigor, nec ſudor. Fer. aſ-
ſigit continuo, ſed magis de quarto, in qua-
rum. Guil. pulſus eſt apparentior, quā in in-
terpollata, magis uelox, & ſpiſſus, calor eſt
continuus, & ſiccitas lingue cum aſperitate
& ſorti ſiri, urina ſemper rubea, aut ruſſa ſub-
tilis, nel ſpiſſi. Cura ait Aui. eſt proportio-
na interpol. ſed refrigeta pluꝝ, ut cū ſyrupo
acetofu. de feminibus calidis moderatę, &
gelenia. cum aqua temperatis cum zucharo
roſ. ſyr. roſ. & phleb. magis conuenit: quia
materia eſt intra uenas. & Auic. ſit tua inten-
tio in prouocando ſecceſſum cum ſuppo. cly.
uel med. leni. clyſt. bonum R. aque decoct.
ſicla; epith. lib. i. olei uiolati vnc. iiii. mellis
vnc. ii. aliis vnc. s.

Febris quintana ſepti.

Hi. p. has recenſet in lib. epy. ſed Gal. in lib.
de diſſer. non uidit niſi quintanam, quę tar-
dabat inuadere niſque ad finem quatuor diei,
quare uidebatur quintana. hę quidē febres
ait Raſ. 18. con. ſiūt ex phlegmate groſſo uel
melancholia. & diuerſificantur iuxta diuerſi-
tatem humorum. idem affirmat Auic. & Ha-
ly & Auice. ſecundum q materia eſt pluꝝ, &
minuſ groſſior, ac ſubtilior mouentur citius,
ac tardius. Guil. quintanę materia eſt phleg-
ma naturale uiſcoſum, & melancholia ex
quibus

quibus fit mixtum causa eius. sex. est phlegma acetosum: sep. est rubeum. oct. est humor compositus ex naturali acetoso, & melancholia. non ex naturali, & melancholia. dec. ex acetoso vitreo, & melancholia, & ait hæc febres sunt de genere quartanæ non verè. Galen. in com. Hip. assignat, causam harum febrium esse malum regimen. Avic. quintana est dete

rior sex. & sex. septi. & c. Cura ait Rat. 18. c6, sicut quartanâ. icide magis, & calefac, quam magis elogatur à quarta. quoniam sunt grossioris materie digestio sit maior per tantum, & humecta. ait Avi. vomitus est maxime utilis cum vomitiis fortibus, & evacuatione cu hyeris, ut logodiô. Ruf. & id generis. sudor fiat cum balneo calido, vel stupha sicca.

F I N I S.

Series chartarum.

a b, A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Vv Xx Yy Zz

Aaa Bbbb Cccc Dddd Eeee Ffff.

Omnes sunt Terniones præter b, & Fff qui sunt Quaterniones.



Venetijs 1575.



propter hoc quod in hoc mundo non est
 quodammodo perfectio. Et hoc est quod
 dicitur in libro primo de civitate dei
 quod in hoc mundo non est perfectio
 quodammodo. Et hoc est quod dicitur
 in libro primo de civitate dei quod
 in hoc mundo non est perfectio quodammodo.

FINIS

Series alphabetica

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Omnis sunt Technicae prout in libro primo de civitate dei

V. 11. 11. 11.



